12

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

<36639065580014

<36639065580014

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

Pharmacopoea universalis,

oder

übersichtliche Zusammenstellung

der Pharmacopöen

von

Amsterdam, Antwerpen, Dublin, Edinburgh, Ferrara, Genf, London, Oldenburg, Würzburg; deren America's, Dänemark's, Finnland's, Frankreich's, Hannover's, Hessen's, Holland's, der Niederlande, Oesterreich's, Parma's, Polen's, Portugal's, Preußen's, Rußland's, Sachsen's, Sardinien's, Schweden's, Spanien's, Würtemberg's;

der Dispensatorien

von Braunschweig, Fulda, Hessen, Lippe und der Pfalz;

der Militärpharmacopöen

Dänemark's, Frankreich's, Portugal's, Preußen's, Rußland's und von Würzburg;

der Armenpharmacopöe

von Hamburg;

der Formularien und Pharmacopöen ꝛc.

Augustin's, Bories's, Brera's, Brugnatelli's, Cadet de Gassicourt's, Coxe's, Ellis's, Ferrarini's, Gray's, Hufeland's, Magendie's, Paris's, Piderit's, Pierquin's, Ratier's, Rennie's, Saunders's, Sainte-Marie's, Spielmann's, Swediaur's, Taddei's und van Mons's.

Zweite, nach

der Pharmacopée universelle des A. J. L. Jourdan,

bearbeitete

mit vielen Zusätzen und einer Pharmacopöe der homöopathischen Lehre vermehrte Ausgabe.

Morbos autem non eloquentia sed remediis curari.

Celsus.

Zweiter Band, I bis Z.

Weimar,

im Verlage des Großh. Sächs. pr. Landes-Industrie-Comptoirs.

1832.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Vorrede

zur ersten und zweiten Ausgabe.

Schon vor dem Erscheinen des Französischen Originals, nach welchem das gegenwärtige Werk bearbeitet ist, und welches den Titel führt:

„Pharmacopée universelle ou Conspectus des Pharmacopées d'Amsterdam etc., — des dispensatoires de Brunswick etc., — des pharmacopées militaires de Danemark etc., — de la pharmacopée des pauvres de Hambourg, des Formulaires et Pharmacopées d'Augustin etc., par A. J. L. Jourdan, Doct. en Méd. etc. Paris 1828.'

war es unsere Absicht, ein ähnliches Werk erscheinen zu lassen; auch waren bereits behufs desselben Vorarbeiten gemacht, jedoch dabei ein anderer Plan zum Grunde gelegt worden, als der von Herrn Jourdan befolgte, nach welchem, so viel wie möglich, das zusammengestellt ist, was vermöge seiner chemischen Bereitung zusammengehört. — Wir glaubten daher, theils weil wir diese Anordnung zweckmäßig fanden, theils auch, um die Herausgabe der deutschen Bearbeitung zu beschleunigen, das Jourdan'sche Werk zum Grunde legen zu müssen, indem wir dabei Sorge trugen, das noch nicht Benutzte hinzuzufügen, und besonders das nachzutragen, was die vierte Ausgabe der Preußischen Pharmacopöe, Berlin 1827, so wie die 1827 in Cassel erschienene Pharmacopoea Hassiae electoralis enthalten. Auch sind die zum Theil nach schon begonnenem Druck erhaltenen Pharmacopöen von Ant. Ferrarini, Bologna 1825, die Farmacopea generale des Taddei, Florenz 1826, so wie die von Wylie herausgegebene Pharmacopoea Castrensis Ruthena, Petropoli 1828, im Verlaufe der Arbeit in Gebrauch gezogen worden.

Was die Uebertragung betrifft, so hat man sich bei Angabe der Bereitungsart der Arznei-Präparate und Formeln im Allgemeinen der lateinischen Sprache bedient, jedoch so viel es, der Deutlichkeit unbeschadet, geschehen konnte, die Kürze des Originals beibehalten. Einige Formeln sind deutsch wiedergegeben worden, weil eine zu weitläufige Umschreibung

Digitized by Google

nöthig gewesen und vielleicht zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben worden seyn würde.

Die Synonymie theils der naturhistorischen arzneilichen Gegenstände, theils der Präparate, ist im Text nicht durchgehends angegeben worden, um das Werk nicht zu weitläufig zu machen; jedoch ist bei dem Register sorgfältig darauf Rücksicht genommen und hinsichtlich der erstern auf die in der Medicin im Allgemeinen angenommenen Linné'schen Namen, bei letztern jedesmal auf das gleichbedeutende chemische Präparat oder Formel hingewiesen.

Um die autoptische Vergleichung der arzneilichen Naturproducte zu erleichtern, sind den angezogenen, meist nur französischen, Kupferwerken besonders deutsche beigefügt worden.

Die gegenwärtige zweite Ausgabe hat, wie man sich aus der stärkern Bogenzahl und aus der Vergleichung des Registers leicht überzeugen kann, bedeutende Vermehrungen erhalten. Es sind namentlich noch die fünfte Ausgabe der preußischen Pharmacopöe, die Pharmacopoea Parmensis. Parmae 1823, die neue Ausgabe der Pharmacop. Lusit. von 1825, die Pharmacopaea Hospit. milit. Lusit. von 1826, die Supplementa Pharmacopoearum Londin., Edinb. etc. von Gray 1831 und Rennie 1829, die sechste Ausgabe von Paris Pharmacologia, so wie, in so fern es möglich, dasjenige benutzt worden, was sich während des fortschreitenden Drucks in medicinischen Journalen vorfand. — Außerdem findet der Leser noch, als zur Vervollständigung zweckmäßigen Anhang, eine Pharmacopöe der homöopathischen Lehre, von einem damit vertraueten Arzte, beigegeben.

In Bezug auf den Gebrauch des Registers muß hier kurz bemerkt werden, daß die meisten englischen, französischen ꝛc. Synonymen so genau als möglich in lateinischer Sprache wiedergegeben, andere dagegen, welche durch eine Uebertragung vielleicht ganz unverständlich geworden seyn würden, in der Ursprache beibehalten worden sind. Die Pharmacopöe der homöopathischen Lehre ist nach alphabetischer Ordnung bearbeitet und bedurfte daher, als für sich abgeschlossenes Ganze, keines besondern Registers.

Digitized by Google

Erklärung der Abkürzungen.

Pharmacopöen und Dispensatorien.

A. Pharmacopoea Austriaca. Vindobonae 1820 in 8.
Am. The Pharmacopoea of the United States of America. Boston 1820 in 8.
Ams. Pharmacopoea Amstelodamensis nova. Amstelod. 1792 in 4.
An. Pharmacopoea manualis. Anvers 1812 in 8.
B. Pharmacopoea Batava. Amstelod. 1805 in 4.
B*. Zusätze von Riemann. (Lips. 1811 2 vol. 4.)
Bz. Pharmacopoea Bavarica. Monachii 1822 in 8.
Bel. Pharmacopoea Belgica. Hagae 1823 in 4.
Bor. Pharmacopoea Borussica. Berolin. 1813 ed. 3.
Bor4. Edit. 4., mit der Bearb. von Dulk. Leipz. 1828. in 4. **Bor5.** edit. 5ta.
BorC. Pharmacopoea Castrensis Borussica. Regiomonti 1823 in 8. ed. 4.
Br. Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicense. Brunsv. 1777 in 4.
D. Pharmacopoea Danica. Hafniae 1803 in 4.
DD. Pharmacop. militaris Danica. Hafn. 1818 in 12.
Du. Pharmacopoea Dublinensis 1807 in 8.
Ed. Pharmacopoea Edinburgensis. Edinb. 1813 in 8.
Fenn. Pharmacopoea Fennica. Aboea 1819 in 8.
Fer. Farmacopea Ferrarense. Padova 1825 in 18 ed 10.
Ful. Dispens. Fuldense. Franc. ad M. 1791 8 ed. 3.
Gal. Pharmacopoea Gallica. Paris 1818 in 4.
GalF. Ausgabe von Fée. Paris 1826 in 8.
GalH. Ausgabe von Ratier und Henry. Paris 1828 in 8.
GalM. Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de France. Paris 1811 in 8.
Gen. Pharmacopoea Genevensis. Genev. 1780 in 8.
Ham. Pharmacopoea pauperum in usum instituti clinici Hamburgensis. Hamb. 1804 in 8. ed. 3.
Han. Pharmacopoea Hannoverana. Hannov. 1819 in 8.
Hass. Dispensat. electorale Hassiacum. Marb. 1806. 8.
HassP. Pharmacopoea Hassiae elect. Cassell's 1827.
His. **His5.** Pharmacopoea Hispanica. Matriti 1798 et 1803 in 8.
Li. Dispensatorium Lippiacum genio moderno accommodatum. Lemgoae 1792 — 1794. 2 vol. in 8.
Lon. u. **LonN.** (nova edit.) Pharmacopoea Londinensis. Lond. 1815 in 8. und 1824 in 8.
LH. **LP.** **Lus.** Pharmacopoea Lusitanic. Lissab. 1711 in fol. et 1805 ed. Pinto, et Castrens. Lus. 1826. 8.
O. Pharmacopoea Oldenburgica. Oldenb. 1801 in 8.
Pal. Dispensatorium medico-pharmaceuticum Palatinatus. Manh. 1764 in fol.
Pm. Pharmacop. Parmensis. Parmae 1823.
Pol. Pharmacop. Regni Poloniae. Varsov. 1817. 8.
R. Pharmacopoea Rossica. Petrop. 1803 in 8.
RC. Pharmacopoea Castrensis Ruthena auct. J. *Wylie*. Petropol. 1808. in 8.
Sar. Pharmacopoea Sardoa. Turin 1773. in 4.
Sax. Pharmacopoea Saxonica. Dresd. 1820. in 8.
Suec. Pharmacopoea Suecica. Stock. 1817 in 4. ed. 5.
Wir. Pharmacopoea Wirtembergica. Stuttg. 1798 in fol. ed. 6.
Wür. Pharmacopoea Herbipolitana. Würceb. 1796 in 8. ed. 2.
WW. Pharmacopoea in usum nosocomii militaris Wurceburgensis. Wurceb. 1815 in 4.
A. *Ainslie* Materia indica etc. Lond. 1826 2 voll. in 8.
Au. *Augustin* Pharmacopoea extemporanea etc. Berol. 1822 in 18. ed. 2.
B. *Brera* Ricettario clinico. Padov. 1825 in 8. ed. 3.
Be. *Bergius* Materia medica etc. Stockh. 1782. 2 voll. in 8.
Bo. *Bories* Formulaire de Montpellier. Montp. 1822 in 12.
Br. *Brugnatelli* Pharmacopée générale etc. Pari 1811 2 voll. in 8. ed. Planche.
***Br**.** Zusätze Planche's.
C. *Coxe* The american dispensatory etc. Philadelphia. 1825 in 8. 1827 in 8.
Ca. *Cadet de Gassicourt* Formulaire magistral etc. Paris 1823 in 18. ed. 5.
E. *Ellis* The medical formulary etc. Philadelphia 1826 in 8.
Fi. *Ferrarini* Farmacopea. Bologna 1825. in 4.
G. *Guibourt* Histoire abrégée des drogues simples. Paris 1826 2 voll. in 8. ed. 2.
Gr. Suppl. to the Pharmacopoeia etc. Lond. 1831.
Huf. *Hufeland* Armenpharmacopoe. Berl. 1825 in 8. ed. 4.
M. *Murray et Gmelin* Apparatus medicaminum etc. Götting. 1776—1796. 8 vol. in 8.
Ma. *Magendie* Formulaire. Paris 1827 in 12. ed. 6.
Par. *Paris* Pharmacologia. Lond. 1825 2 voll. in 8. ed. 6.
ParC. Dispensaire des bureaux de Charité de Paris. Paris 1819 in 8.
Pid. *Piderit* Pharmacia rationalis. Gerlach 1806 in 8.
Pie. *Pierquin* Mémorial pharmaceutique. Montpell. 1824 in 32.
Ra. *Ratier* Formulaire pratique des hôpitaux civils de Paris. Paris 1827 in 18 ed. 3.
Re. A new supplement to the pharmacopoeias of London etc. by *J. Rennie*. London 1829.
Sa. *Saunders* Pharmacopoea in usum studiosorum. Lips. 1790 in 8.
Sm. *Sainte-Marie* Nouveau formulaire médical et pharmaceutique. Paris et Lyon 1820 in 8.
Sp. *Spielmann* Pharmacopoea generalis. Argentor. 1783 in 4.
Sw. *Swediaur* Pharmacopoea medici practici universa. Bruss. 1817. 3 voll. 12 ed. *van Mons*.
***Sw**.** Zusätze von van Mons.
Sy. Pharmacopoea syphilitica (von *Swediaur*.) Paris 1799 in 12.
T. *Tuddei* Farmacopea generale. Firenze 1826.
Vm. *Van Mons* Pharmacopée usuelle, théorique et pratique. Louvain 1821 2 voll. in 8.
Z. *Zarda* Pharmaca vegetabilia juxta pharmacopoeam austriaco-provincialem sistens. Pragae 1778 in 8.

Digitized by Google

Namen von Schriftſtellern.

A. St. H. August St. Hilaire.
Ach. Acharius.
Ait. Aiton.
All. Allioni.
Alp. Alpini.
Aub. Aublet.
B. Beudant.
Bart. Barton.
Be. Berzelius.
Beauv. Palisot de Beauvois.
Big. Bigelow.
Bl. Blainville.
Blackw. Blackwell.
Bon. Bonpland.
Br. Brown.
Brongn. Brongniart.
Brug. Bruguière.
Burm. Burmann.
Cand. Decandolle.
Cass. Cassini.
Cat. Catesby.
Cav. Cavanilles.
Clus. l'Écluse.
Col. Colebrooke.
Coll. Colladon.
Comm. Commelin.
Curt. Curtis.
Cuv. Cuvier.
Daud. Daudin.
Del. Delile.
Dela. Delaunay.
Desc. Descourtilz.
Desf. Desfontaines.
Dill. Dillen.
Dod. Dodoens.
Dryand. Dryander.
Duh. Duhamel.
Dum. Duméril.
Esp. Esper.
Fab. Fabricius.
Fer. Férussac.
Feuill. Feuillée.
Forsk. Forskal.
Forst. Forster.
Gaert. Gaertner.
Garid. Garidel.
Gled. Gleditsch.
Gmel. Gmelin.
Gom. Gomez.
Gualt. Gualtieri.
H. Haüy.
Herm. Hermann.
Hern. Hernandez.
Hum. Humboldt.
J. Jussieu.
Jacq. Jacquin.
K. Kunth.
Kn. Knorr.
Kniph. Kniphoff.
L. Linné.
Lab. Labillardière.
Lac. Lacépède.
Lat. Latreille.
Latour. Latourette.
Lf. Linné filius.
L'Hér. L'Héritier.
Lmk. Lamarck.
Lmx. Lamouroux.
Lob. Lobel.
Lois. Loiseleur-Deslongchamps.
Lyngb. Lyngbye.
Mart. Martyn.
Mat. Maton.
Mér. Mérat.
Merr. Merrem.
Mich. Michaux.
Michel. Micheli.
Mill. Miller.
Moe. Moench.
Mor. Morison.
Murr. Murray.
Mut. Mutis.
Oed. Oeder.
Ol. Olivier.
Pall. Pallas.
Panz. Panzer.
Pers. Persoon.
Plak. Plukenet.
Plum. Plumier.
Poir. Poiret.
Pu. Pursh.
Purm. Purmann.
Rauw. Rauwolf.
Réaum. Réaumur.
Red. Redouté.
Regn. Regnault.
Re. Retzius.
Rich. Richard.
Rivin. Rivinus.
Roem. et Schult. Roemer et Schultes.
Roes. Roesel.
Ro. Roth.
Rottb. Rottboell.
Roxb. Roxburgh.
Ru. et Pav. Ruiz et Pavon.
Rumph. Rumphius.
Sal. Salisbury.
Schaeff. Schaeffer.
Scheuch. Scheuchzer.
Schk. Schkuhr
Schn. Schneider.
Schrad. Schrader.
Schreb. Schreber.
Scop. Scopoli.
Ser. Seringe.
Sl. Sloane.
Sm. Smith.
Sonn. Sonnerat.
Spr. Sprengel.
Sw. Swarz.
Thunb. Thunberg.
Vaill. Vaillant.
Vand. Vandelli.
Vauch. Vaucher.
Vent. Ventenat.
Willd. Willdenow.
Wr. Wright.
Zann. Zannichelli.

Völkernamen.

Ang. Engliſch.
Ar. Arabiſch.
Arm. Armeniſch.
Ba. Bali.
Be. oder *Beng.* Bengaliſch.
Bel. Holländiſch.
B. Böhmiſch.
Br. Braſiliſch.
Cal. Kalmückiſch.
C Chineſiſch.
Ce. Celebes.
Co Cochinchineſiſch.
Cy. Cyngaleſiſch.
D Däniſch.
Duk. Dukhaneſiſch.
Eg. Egyptiſch.
Gr. hod. Neugriechiſch.
Guz. Guzurate.
Heb. Hebräiſch.
Hin. Hinduiſch.
His. Spaniſch.
Hu. Ungariſch.
I. Italieniſch.
J. Japaniſch.
Ja. Javaniſch.
Ir. Irokeſiſch.
Lus. Portugieſiſch.
Ma. Mandſchu.
Mal. Malaiiſch.
Malab. Malabariſch.
Mar. Marattiſch.
Me. Mexicaniſch.
Mo. Mongoliſch.
Moz. Mozambique.
N. Nepaul.
Pe. Perſiſch.
Pol. Polniſch.
R. Ruſſiſch.
Sa. Sanskrit.
Si. Sicilisch.
Suec. Schwediſch.
Syr. Syriſch.
Ta. Tartariſch.
Tam. Tamuliſch.
Te. Tellingu.
Tern. Ternate.
Th. Thibetaniſch.
Tur. Türkiſch.

Digitized by Google

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

II.

Ilex.

Ilex vomitoria, Ait., Cassine Peragua; Brechhülsen, Apalachine, Paraguaythee; Apalachina, Thé de la mer du Sud (*Gal.*)

Br. Gal. Wir. *C. Gr. Sy.*

ħ (Tetrandria Tetragynia, L.; Rhamneae. *J.*) Eine Pflanze Florida's. (Hort. Kew. I. p. 170.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind elliptisch oder lanzettig, stumpf, sägezähnig, glatt und glänzend.

Ein sehr kräftiges Brech- und harntreibendes Mittel.

Imperatoria.

Imperatoria Ostruthium, L.; Meisterwurz, Kaiserwurzel, Ostranz; Imperatoire (*Gal.*); Master wort *Ang.*); Wssedobr (*B.*); Mesterurt (*D.*); Imperatoria (*His. Lus.*); Imperatoria, Erba rena (*I.*); Mesterwortel (*Be.*); Maesterrot (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HasP. His. HisS. Li. R. Sax. Suec. Wir. Wiir. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

ħ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine im gemäßigten Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 279. *Schk.* t. 74. *Plenck* t. 211. *Hayne* VII. t. 15. Fl. méd. IV. 200.)

Man wendet die Wurzel (radix Imperatoriae s. Ostruthii s Magistrantiae s. Astrantiae) an; sie ist dick, ästig, fast knollig, wie geringelt, mit langen Fasern besetzt, außen graulichbraun, inwendig weiß. Sie hat einen starken gewürzhaften Geruch und einen scharfen, bittern und unangenehmen Geschmack.

Reizend, blähungtreibend, die Ausdünstung und Speichelsecretion befördernd; Hoffmann nannte sie ein *divinum remedium*, sie wird aber jetzt nur wenig gebraucht. — Gabe des Pulvers, zwanzig bis dreißig Gran.

Pulvis masticatorius. (Sp.)

℞. Radicis Imperatoriae,
Corticis Sambuci, sing.
semunciam.
Foliorum Lauri sesquidrachmam.
Semin. Sinapis,
— Staphisagriae, sing.
drachmam.
Caryophyllorum scrupulos quatuor.
Myrrhae . . . . drachmas sex.

Gabe, ein Scrupel in einen Knoten geknüpft, zum Kauen bei Sprachlosigkeit und Zungenlähmung.

Infusum Imperatoriae. (Fi.)

Radicis Imperatoriae drachma dimidia vel una cum Aquae bullientis unciis decem.

Indicus Color.

Pigmentum Indicum, Anil, Indicum: Ἰνδικον (Gr.); Indigo; Indigo (*Gal.*); Nil (*Ar. Cy. Duk. Pe.*); Cham nho la (*Co.*); Tarum (*Mal.*); Anil (*Lus.*); Nili, Nilini (*Sa. Tel.*); Nilum (*Tam.*).

Br. Wir. *A. Be. G. Gr. Re. Sp. T.*

Ein Färbestoff in kleinen, derben, brüchigen, sehr dunkelazurblauen Stücken ohne Geruch und Geschmack, welche durch Reiben einen Kupferglanz annehmen.

Man gewinnt den Indigo von Indigofera Anil (*Desc.* Fl. méd. d. Ant. t. 17. *Bert.* Bild. I. 71. f. 1.), argentea und tinctoria, *L.* (Diadelphia Decandria, *L.*; Leguminosae. *J.*), welche in Südamerica gebaut werden. Isatis tinctoria, L. liefert ihn auch, aber in geringerer Menge.

Er enthält mit mehrern andern verschiedenen Stoffen einen eigenthümlichen, den sogenannten Indigostoff, Indigotin (Indigotinum), welcher in gutem Indigo fast die Hälfte beträgt

Die Pharmaceuten wenden ihn bisweilen, jedoch selten an, um manchen Präparaten die Farbe zu geben. — Manche Aerzte geben ihn bei Icterus (*T.*)

Tinctura Resinae Indigo. (*Br.*)

℞. Resinae Indigo drachmam unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit.
Solutionem filtra. — Man erhält das Indigoharz durch Deſtillation von vier Theilen Schwefelſäure über einen Theil Indigo.

Sulphas Pigmenti Indici liquidus. (*Gr. Ma.*)

℞. Pigmenti Ind. Beng. pulv. partem.
Acidi sulph. concent. partes sex.
Actioni calidae subjice et dilue Aquae dest. partibus nongentis nonaginta tribus.

Zur Prüfung der Stärke alkaliſch ſalzſaurer Salze, durch welche die Flüſſigkeit entfärbt wird.

Gr. führt eine *Sulphate of indigo* an: Indigo libr. unam, Ol. Vitrebli perfecte a Gase nitroso liberi novem, als Färbeſtoff und eine *Solution of indigo*: Indigo drachmam, Ol. Vitr. rectif. quatuor in Aq. unciis tribus diluti, acidum Creta neutralisa et liquidum filtra; — Reagens.

I n u l a.

In den Pharmacopöen kommen zwei Arten dieſer Pflanzengattung vor:

1) *Inula dysenterica, L.*; Dürrwurz; Ruhralant; Aunée antidysenterique, Herbe de Saint-Roch (*Gal.*); Niddle seize, Fleabane (*Ang.*); Roo loops alant (*Bel.*).

Br. Gal. *Gr. M. Sp.*

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, *L.*; Synantherae, *Cass.*) Eine in Europa an feuchten Orten häufig wachſende Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 272. *Hayne* VI. t. 46)

Man wendet das Kraut (herba Conyzae mediae s. Arnicae spuriae s. suedensis) an; es beſteht aus einem rundlichen, filzigen Stängel mit umfaſſenden, länglichherzförmigen, ſägezähnigen, wellenförmigen, gerunzelten, etwas filzigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen ſcharfen, etwas gewürzhaften, adſtringirenden Geſchmack.

2) *Inula Helenium, L.*; Alant, Alantwurz, Alantwurzel, Bruſtalant, Oland, Helenenkraut; Aunée commune (*Gal.*); Elecampane (*Ang.*); Usulalrasun (*Ar.*); Women (*B*); Oland Sanct Ellensron (*D.*); Enula campana (*His. Lus.*); Alantswortel (*Bel.*); Enula campana, Elenio (*I.*); Bekhizanjabilischami (*Pe.*); Omanowy (*Pol.*); Aland (*Suec.*).

A. Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ Eine in ganz Europa wachſende Pflanze. (*Blackw.* t. 473. *Plenck* t. 624. *Hayne* VI. t. 45. Düss. off Pfl. IV. t. 9. Fl. méd. I. 48. *Bert.* Bild. VI. 95. f. 1.)

Die Wurzel (radix Enulae s. Enulae Campanae s. Helenii s. Inulae) iſt ſpindelförmig, daumendick, fleiſchig, äſtig, mit wenigen Fäſerchen beſetzt, außen gelbbraun oder braun, inwendig weiß. Friſch hat ſie einen ſtarken durchdringenden Geruch, welcher bei'm Trocknen veilchenähnlich wird. Der Geſchmack iſt eigenthümlich, etwas bitter, gewürzhaft und beißend.

Sie enthält ein flüchtiges Oel, eine Art Stärkemehl, Inulin (Inulinum) genannt, einen bittern und einen harzigen Stoff.

Toniſch, harn- und ſchweißtreibend, den Auswurf und die Reinigung befördernd, wurmwidrig. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen.

§. I. Präparate, welche den Alant in Subſtanz enthalten.

Conserva Inulae. (Gal. Sar. *Fi. T. Vm.*)

℞. Rad. rec. Enulae mund. . libram.
Aquae communis . . libras octo.
Macera per aliquot dies, tunc coque ad mollitiem et in decocto clarifica
Sacchari albi . . . semilibram.

Digere radicem in syrupo per dies tres, coque tunc, donec spississimus factus sit et illam in eo serva vel balnei vaporis ope sicca. (Sar.)

℞. Radicis Enulae . . quantum vis.
Coque in Aquae q. s., donec inter digitos conteri possit; contunde in mortario marmoreo, pulpam per cribrum bombycinum trajice et adde Syrupi ad plumam cocti pondus duplum. (Sar)

Gal. Pulpae partem unam et quatuor Sacchari in Decocto Radicis ad electuarii solidi consistentiam cocti; — *T.* Pulpae libras quatuor et Syrupi Enulae sex; — *Vm.* Pulpae partem unam et tres Sacchari albi; — *Fi.* Radicis libram unam coquere, pulpam per setaceum trajicere, decocti liquidum cum Sacchari albi libris duabus ad syrupi spissi consistentiam coquere, et pulpa additâ, totum ad justam spissitudinem redigere.

Radix Enulae trita reducta (*Gr.*): Radicis, Farin. Hord., sing. partes aeq.; vel: Fabarum libras 56, Amyli? (box dust) libr. 14, Radic. 28; vel: Fabar. et Radic. p. aeq.; vel: Pulv. Rad. lib. 40, Eboris

nigri lib. 12, Cret. praep. 6, Farin. Hord.? 22, Ochrae lut. 1½.

Pulvis Inulae aromatisatus. (*Sa.*)

℞. Pulveris Radicis Inulae partes sex.
— Angelicae . partem unam.
Misce.

Pulvis antilyssicus Ormskirkianus. (B*.)

℞. Pulv. Rad. Inulae drachmam unam.
— Cretae . . . semunciam.
— Boli Armenae drachmas tres.
— Aluminis . . grana decem.
Olei essent. Anisi guttas quinque.
Ehedem ſehr berühmt.

Unguentum Inulae s. Inulae Martiatonis s. Enulae s. Helenii s. enulatum. (B*. Br. His. His3. RC. Wir. *Au. Huf. Sp. Sw.*)

℞. Radicis Enulae . . . semilibram.
Aquae fontanae
uncias centum viginti octo.
Coque et in pulpam redige, cui adde
Butyri recentis . uncias quatuor.
Misce. (B*.)

Sw. Coquere Enulae semilibram in Aquae libra et pulpae addere Butyri uncias tres; — *Au.* et *Huf.* Radicem coquere in Aquae q. s., ut fiat pulpa, quae cum Axungiae Porci q. s. conteratur; — RC. Radicis pulveratae semilibram cum Aquae font. libra una ad consistentiam pultis coquere et addere Adipis suill. praep. uncias tres.

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Axungiae Porci . . semilibram.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Tere in mortario lapideo; coque blando igne ad humidi consumptionem, exprime et colaturae adde
Cerae flavae,
Terebinth. purae, sing.
unciam unam.
Misce bene. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Enulae comp. libras quatuor.
Cerae flavae . . . libram unam.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Liquatis et semirefrigeratis adde
Styracis liquid. drachmas undecim.
Mastichis pulverati drachmas sex.
Agita donec refrixerint. (His. His3.)
Gegen scabies empfohlen.

Theriaca officinalis. (Li.)

℞. Pulv. Enulae . . . uncias duas.
— Zedoariae,
— Myrrhae,
— Aristolochiae rotundae,
— Angelicae, sing.
sesquiunciam.
Rob Juniperi . . . uncias sex.
Mellis depurati,
Syrupi Capit. Papav., sing.
uncias octo.
Misce bene. — Gabe, eine Drachme bis eine halbe Unze.

Trochisci Enulae. (*Bo. Ca.*)

℞. Pulv. Enulae . . . semunciam.
— Irid. Florent. drachmam unam.
Mucilaginis G. Tragacanthae q. s.
Bei Scorbut, Waſſerſucht, Bleichſucht, eine halbe Unze täglich.

§. II. Präparate, welche nur einen Theil der Beſtandtheile des Alants enthalten.

A. Auszug durch Deſtillation.

Aqua Enulae s. Helenii. (Gal. *Fi.*)

℞. Rad. rec. Enulae . partem unam.
Aquae communis partes quinque.
Destillent partes duae.

Aqua antiasthmatica. (Br. Pal. Wir. *Sy.*)

℞. Rad. Enulae,
— Liquiritiae,
— Irid. Flor., sing. uncias duas.
Herbae Hederae terrestris,
— Farfarae,
— Botryos, sing. . semilibram.
— Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Pulegii,
— Salviae, sing. . uncias tres.
Anisi,
Foeniculi, sing. . unciam unam.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae fontanae . . libras decem.
Post tres dies digestionis destillent librae sex vel septem. (Wir.)

℞. Rad. Enulae . . . uncias duas.
— Pimpinellae albae,
— Irid. Flor., sing.
sesquiunciam.
Herbae Hyssopi,
— Marrubii albi,
— Salviae, sing. . uncias duas.
Anisi,
Foeniculi,
Baccar. Juniperi,
— Lauri, sing. unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . . semunciam.
Styracis Calamita . drachmas sex.
Alcoholis . . . libras duodecim.
Aquae Acaciae . . . libras octo.
Post tres dies digestionis destillent librae decem; producto adde
Julep rosati . . . . libras duas.
Aquae Foeniculi . . libras octo.
Misce. (Br.)

℞. Rad. Enulae,

Rad. Liquiritiae,
— Irid. Flor., sing. unciam unam.
— Angelicae,
— Pimpinell. alb., sing. drachmas sex.
Herbae Capilli Veneris,
— Hyssopi,
— Pulmonariae,
— Hederae terrestris,
— Salviae,
— Parfarae,
Semin. Anisi,
— Foeniculi,
— Urticae, sing. . semunciam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae Scabiosae,
— Marrubii,
— Veronicae, sing. semilibram.

Post tres dies digestionis destillatio in balneo aquae instituatur. (Pal.)

℞. Radicis Enulae . . uncias duas.
— Iridis Flor. . sesquiunciam.
Herb. Hyssopi,
— Rorismarini,
— Salviae, sing. unciam unam.
Anisi,
Foeniculi,
Cinnamomi, sing. . semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Croci . . . . . scrupulos duos.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Aquae Hyssopi unc. viginti quatuor.

Digesta per tres dies destillent. (*Sa.*)

Bei feuchtem Huſten alter Leute. — Gabe, Morgens eine oder zwei Unzen.

B. Auszug durch mechaniſche Mittel.

Syrupus Enulae. (Gal.)

℞. Succi Rad. Inulae depur. sesquilibram.
Sacchari albi libras duas c. dimid.
Liqua et cola.

Bruſtmittel.

C. Auszug durch Waſſer.

Tisana Enulae. (Gal.)

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde, cola et adde
Mellis vel Syrupi Capilli Veneris unciam unam.

Extractum (Radicis) Enulae s. Helenii aquosum. (A. Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Gen. HassP. His. His3. LH. Li. Pal. Suec. *Gr. T. Vm.*)

℞. Radicis recentis Enulae . q. vis.
Bene lotam raspa et exprime succum; pulpam cum Aquae pauxillo tritam iterum exprime; succus tunc per manicam trajectus blando calore ad extracti consistentiam evaporet. (Gen. *Vm.*)

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.

Macera per dies quatuor in loco calido et coque parumper; cola exprimendo et colaturam consume. (Br. Li. Pal.)

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.

Macera in vase tecto, subinde agitando et cola; residuo novam Aquam infunde et macera, quo facto leni expressione coletur; liquores mixti et colati in balneo aquae evaporent (Gal.)

℞. Radicis Enulae . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.

Digere per horas viginti quatuor, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuo per horae quadrantem cocto cum Aquae novae partibus quatuor et colato, liquores commisce, et post desidentiam decanthatos consume. (An.)

B. Digestionis horas viginti quatnor et duas bullitionis cum Aquae partibus decem, tunc secundam coctionem per horas duas cum Aquae partibus octo; — Ams. Coctionem primam cum viginti, secundam cum quindecim partibus Aquae, ad dimidium quamque continuatas; — His. His3. Digestionem per horas viginti quatuor et ebullitionem per duas cum partibus decem Aquae et secundam coctionem cum Aquae nova quantitate ad dimidii remanentiam; — HassP. ut extractum colombo; — *T.* ut extractum centaurii minoris; — Bor4. ut extractum aconiti; LH. ut extractum absinthii.

℞. Radicis Inulae . . quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Radice pluribus ebullitionibus sequentibus penitus extracta, liquores misce et decanthatos vaporando consume. (A. Suec.)

Gabe, ein Scrupel bis eine halbe Drachme.

Mixtura pectoralis. (*Ca.*)

℞. Extracti Enulae . scrupulos duos.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Aquae Hyssopi . . semunciam.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Hyssopi, sing. sesquiunciam.

Löffelweiſe.

Mixtura antiasthmatica. (*Sp.*)

℞. Extr. Enulae,
— Cascarillae, sing. scrup. unum.

Essentiae Pimpinellae albae,
— Liquirit., sing. drachmam.
Elixir pect. Wedelii drachmas duas.
Oxymeilis scillitici, semunciam.
Aquae Tussilaginis,
— Pulmonariae,
— Hyssopi,
— Foeniculi,
— Veronicae,
Syrupi Althaeae, sing. . unciam.
Löffelweise.

Decoctum Helenii s. Enulae. (B*.)

℞. Radicis Enulae . . semunciam.
Aquae fontanae quantum sufficit ut coquendo colaturae unciae sex obtineantur.

Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Löffel.

Decoctum Enulae s. Helenii compositum, Hydromel compositum, Tisana expectorans. (LH. *Ra.*)

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Summitatum Hyssopi,
Fol. Hederae terr., sing. drachm. duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et colaturae adde
Syrupi Mellis uncias duas.

LH. Radicis drachmas duas cum Aquae sesquilibra ad libram decoquere et infundere in Hederae terrestris, Hyssopi, singulorum drachmam unam, colato addere Mellis despumati unciam unam.

Schwach reizend, bei chronischen Catarrhen, Asthma und Herzerweiterung empfohlen. — LH. giebt 3 Unzen zwei Mal.

Potio Enulae composita s. cordialis diuretica. (*Ra.*)

℞. Decocti Enulae . uncias quatuor.
Tinct. Digitalis . . semunciam.
— Potassae guttas octodecim.
Syrupi quinque Radicum unciam.

Reizend, harntreibend. — Löffelweise.

Decoctum Carnis s. Jus purificans. (*Pie.*)

℞. Carnis vervecinae (collet) uncias quatuor.
Rad. Enulae . . semidrachmam.
— Hydrolapathi . drachmam.
Cancros contusos . . . no. 2.
Fol. Cichorii,
— Fumariae,
— Nasturtii, sing. . manipulum.
Coque in Aquae q. s.

Oxymel pectorale. (Br. *Ca. Sp.*)

℞. Rad. Enulae . . unciam unam.
— Irid. Flor. . . semunciam.
Aquae fontanae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum viginti quatuor remanentiam, cola et post desidentiam colaturae adde
Mellis albi . . uncias sedecim.
G. Ammoniaci unciam unam, in
Aceti albi . . . . unciis octo dissoluti. Coque ad mellis consistentiam.

Bei Husten und feuchtem Asthma empfohlen. — Löffelweise, von Zeit zu Zeit.

D. Auszug durch Weinessig.

Acetum theriacale. (Pal.)

℞. Rad. Enulae,
— Angelicae,
— Cyperi,
— Zedoariae,
— Caryophyllatae,
— Contrayervae,
— Imperatoriae,
— Valerianae sylvestris,
— Viperinae, sing. semunciam.
Corticis recentis Aurantii,
— — Citri,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangae,
Baccarum Juniperi,
— Lauri,
Summit. Salviae,
— Rorismarini,
— Rutae, sing. drachmas duas.
Aceti . . . . . libras septem.
Macera per mensem in loco calido, cola fortiter exprimendo et adde
Theriacae . . . uncias septem.
Macera per mensem et filtra.

Innerlich zu einem halben bis ganzen Löffel, als schweißtreibend und gegen Ansteckung empfohlen; auch äußerlich in Einreibungen als stärkend.

E. Auszug durch Wein.

Vinum Enulae s. Helenii s. enulatum. (B*. GalM. Sar. *Gr. Vm.*)

℞. Rad. rec. Enulae . partem unam.
Vini albi . . . partes sedecim.
Digere frigide per plures dies, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Sar. Radicis siccae uncias duas, Vini albi libras quatuor et viginti quatuor horas macerationis; — *Gr.* Radicis unciam, Vini rubri libras duas.

℞. Tincturae Enulae partem unam.
Vini rubri partes decem vel viginti.
Misce bene. (GalM.)

℞. Essentiae Enulae drachmam unam.
Vini albi . . . . . uncias sex.
Syrupi simplicis . drachmas sex.
Misce. (B*.) — Ernsting's Formel.

P. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Helenii s. Enulae. (A. Ams. Au. B. Pal. Wir. *Fi. T.*)

℞. Radicis Enulae . partem unam.
Alcoholis (15°) . . . partes sex.
Post tres dies digestionis, blando calore. filtra. (B.)

A. Radicis partem unam, et sex Alcoholis (0,910); — Ams. Radicis partem unam, et sex Alcoholis (0,917); — *Fi.* Alcoholis 24° sex; — Pal. et Wir. Alcoholis quatuor; — *T.* ut tincturam contrayervae.

℞. Radicis Enulae . unciam unam.
Alcoholis (20°) . uncias quatuor.
Infunde in balneo aquae tepido per dies quatuor, cola et residuo infunde
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Macerando continua per dies duos, cola, et colaturas mixtas filtra.

Reizend, blähungtreibend, Ausdünstung befördernd; besonders bei Brustaffectionen empfohlen. — Gabe, sechs Tropfen bis eine Drachme.

Extractum Enulae s. Helenii alcoholicum. (Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Re.*)

℞. Radicis Enulae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . libras novem.
Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destillatione elice, et residuum ad aptam consistentiam consume. (Pol.)

Ba. Bor. Han. O. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — Ful. Radicis unam, Alcoholis sex et tres Aquae.

Bor4. ut extractum aconiti.

℞. Radicis Enulae . libram unam.
Alcoholis libras quinque vel sex.
Post sufficientem extractionem cola fortiter exprimendo; residuum digere et tunc coque parumper cum Aquae libris tribus, decoctum Albuminis ope clarifica, liquores commisce et, alcohole destillando elicito, quod restat ad extracti consistentiam consume. (Wir.)

℞. Radicis Enulae . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut radix quatuor digitorum crassitiem tegatur; digere in loco calido et decantha; coque per horam cum Aqua, cola cum expressione, et colaturam ad mellis consistentiam consume, tincturam sub finem addendo ut massa sit homogenea neque grumosa.

Dieselbe Gabe, wie beim extr. aquosum.

Elixir antihystericum. (*Ca. Vm.*)

℞. Radicis Asari . . . partes tres.
Radicis Irid. Flor. partes quinque.
— Enulae,
— Calami, sing. partes decem.
— Liquiritiae partes quindecim.
Seminum Anisi . partes quinque.
Aquae Vitae . partes octoginta.
Stent in infusione frigida per plures dies, colaturae adde
Camphorae . . . partem unam.
Dissolve. (*Vm.*)

Ca. Liquiritiae sesquidrachmam, Calami, Enulae, sing. drachmam, Iridis, Anisi, sing. semidrachmam, Radicis Asari grana octodecim, Camphorae grana sex et Alcoholis semilibram.

Reizend, besonders bei feuchtem Asthma empfohlen — Gabe, zehen bis dreißig Tropfen in einer Tasse Thee oder irgend einem schwachen Aufguß.

Elixir pectorale Elsneri. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
Croci,
Anisi stellati, sing. partes quatuor.
Radicis Enulae,
— Irid. Flor., sing. partes octo.
Spir. Hyssopi partes nonaginta sex.
Infunde in balneo aquae, filtra et adde colaturae
Balsami Peruviani partem unam.
Mellis Narbonn. partes sedecim.
Sepone per aliquot tempus et filtra.

Elixir Americanum Courcellesii. (B*. *Ca.*)

℞. Alcoholis (32°),
Aquae Vitae (21°), singulorum octarios (litre) octo.
Rad. Enulae . . libras quatuor.
— Sacchari,
— Aristoloch. rot., sing. libras tres.
— Donacis,
Fol. Lauri Perseae, sing. libras duas.
Florum Hyperici . libram unam.
— Sambuci . . semilibram.
Corticis Sideroxyli . uncias sex.
Foliorum Aurantii,
Crotonis balsamiferi,
singulorum uncias quatuor.
Juniperi . . . . . uncias tres.
Opii puri uncias duas cum dimidia.
Justiciae assurgentis,
Florum Aurantii,
— Tiliae,
Summit. Rorismar., sing. uncias duas.
Radicis Asari,
— Chamaeropis humilis,
Cucurbitae Lagen., sing. unciam.
Macera et cola; residuum combure et cinerem in liquore infunde cum
Florum Rhoeados . . unciis sex.

Rubiae tinctoriae . unciis tribus. Filtra. — *Ca.* hat dieſe Formel auf folgende Weiſe verbeſſert:

℞. Alcoholis partes centum viginti.
Radicis Enulae . libras sedecim.
Florum Hyperici . . libras octo.
Foliorum Aurantii . libras sex.
Florum Sambuci libras quinque.
Foliorum Tanaceti libras quatuor.
Flor. Tiliae . libras duas c. dimid.
Radicis Donacis,
Juniperi,
Florum Rorismarini,
Opii, singulorum . libras duas.
Radicis Asari . . libram unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut liquor 24° indicet. Colora cum rhoeado.

Reizmittel, welches in America bei einer Menge Beſchwerden von nervöſen Krämpfen, oder von Schwäche herrührend, ſehr geſchätzt und gleichſam als Univerſalmittel betrachtet wird. — Gabe, ein ſtarker Löffel, allein oder in einem paſſenden Getränk, zwei oder drei Mal zu wiederholen.

G. Auszug durch Oel.

Oleum Inulae s. Enulae s. Helenii compositum. (His. His3)

℞. Radicis Inulae,
— Valerianae,
— Bardanae,
Summitatum Hyperici,
— Abrotani,
— Absinthii,
— Basilici,
— Calaminthae,
— Costi hortensis,
— Majoranae,
— Menthae aquaticae,
— Sabinae,
Foliorum Salviae,
Florum Sambuci, sing. uncias tres.
Summit. floresc. Chamomillae,
— Meliloti,
— Stoechatis, sing. uncias duas.
Fol. rec. Lauri,
— — Ebuli,
— — Rorismarini,
— — Rutae, sing. uncias sex.
Seminum Cumini,
— Foenugraeci,
— Urticae, sing. unciam unam.
Olei Olivarum . libras duodecim.

Macera per dies quatuor, coque tunc ad consumptionem humidi et sepone ut depurificetur.

Iodium.

Iodum s. Iodina s. Iodinium; Jod; Jodine; Iode (*Gal.*).

B*. Ba. Bor4. Fer HassP. *Fi. Gr. Ma. Re. T. Vm.*)

℞. Lixivii Natri Fucorum quantum vis.

Affunde Acidum sulphuricum concentratum in excessu (massae pond. dimid. *Re.*) et coque lente liquorem in retorta vitrea, recipiente instructa; acus s. squamas splendentes in hoc concretas Aquae frigidae parva quantitate lotas blando calore sicca.

Ba. HassP. T. ope Oxydi Mangani et Acidi sulphurici sublimatione paratum indicant; — *Fi.* Lixivii uncias quinque, Mangani nigri pulverati unciam dimidiam, Acidi sulphurici uncias sex, Aquae fontanae sesquiunciam, post horas viginti quatuor digestionis fiat destillatio; iodum obtentum cum pondere quadruplo Magnesiae commisce et purifica; — *Gr.* Omnes partes quae Aqua extrahi possunt, extrahere et sodam vaporatione in crystallos redigere; lixivio addere Ol. Vitriol. excessum, coquere liquidum, exprimere et liquorem filtratum cum Mangan. miscere.

Kräftig reizend, in hohen Gaben ein Gift, unter gewiſſen Umſtänden eine ſehr bedeutende Wirkung auf die Bruſtdrüſen und beſonders auf die Schilddrüſe äußernd, in Folge deren dieſe Organe mehr oder weniger vollkommen ſchwinden. Bei Scrofeln und Kropf, bei lymphatiſchen Geſchwülſten jeder Art, bei'm Tripper, ſelbſt acutem, bei chroniſcher Leukorrhöe, Hodengeſchwülſten ꝛc. empfohlen. — Man wendet es innerlich und äußerlich an, jedoch iſt Vorſicht nöthig und man muß ſogleich damit aufhören, ſobald Abmagerung eintritt, welche im Allgemeinen das erſte Zeichen ſeiner ſchädlichen Wirkung iſt. — Gabe, von einem achtel bis zu einem ganzen Gran, täglich zweimal, in Pillen.

Solutio Iodinae (*Gr.*): Iod. granum unum, Aq. destill. octar. dissolve. — Reagens.

Tinctura s. Alcohol Iodii s. Iodi s. Iodinii s. Iodinae. (B*. Ba. Bor4. Fer. GalF. HassP. *Bo. Fi. Gr. Ma. Pie. Ra. Re. T. Vm.*)

℞. Iodii . . . . . partem unam.
Alcoholis (85°) partes duodecim.
Dissolve. (Fer. GalF. *Bo. Ma. Ra. Re.*)

Pie. Iodii partem unam et octo Alcoholis; — Ba. Alcoholis novemdecim (Spir. rect. viginti *Re.* sec. *Manson*) (viginti HassP. *Tinctura Iodinae diluta* ut reagens); — *Vm.* Alcoholis decem cum pauxillo; — B*. Alcoholis sedecim ad septemdecim; — Bor4. *Gr. Re.* Iodii grana quadraginta octo, Spiritus Vini alcoholisati unciam unam; — HassP. Iodii grana quadraginta, Spiritus Vini rectificatissimi unciam unam;

— *T.* Iodii scrupulos sex, Alcoholis 33° B. uncias duodecim; — *Fi.* Iodi scrupulos duos, Alcoholis 35° unciam.

Zwanzig Tropfen der erſten Formel enthalten etwa einen Gran Jod und der Tropfen wiegt ¾ Gran. — Gabe, für Erwachſene vier bis zehen Tropfen, täglich dreimal, in einem halben Glaſe Zuckerwaſſer, allmälig bis auf zwanzig und mehr Tropfen geſtiegen. — Richond wendet wahrſcheinlich eine ſchwächere Tinctur an, als die Magendie'ſche, da dreißig Tropfen nur etwa einen Gran Jod enthalten; auch giebt er ſie bis zu dreißig Tropfen Morgens und Abends.

Alcoholic solution of iodine for testing (*Gr.*): Iodii drachmam unam, Alcoholis quatuor. — Reagens auf Stärke.

Linimentum Iodinae (*Re.* sec. *Manson*): Linim. Sap. comp. unciam, Tinct. Iodin. drachmam. — Auf Scrofelgeſchwülſte.

Syrupus Iodii. (Fer. *T.*)

℞. Tincturae Iodii . drachmas duas.
Syrupi Sacchari uncias quatuor.
Misce frigide.

Aquae iodatae, Balnea iodata.

No. 1. ℞. Salis marini purif. grammata 66, Tinct. Iodii (Iod. gr. 1. pro gramm.) grammata 50, Aq. destill. libras 100.

No. 2. Salis marini et Aq. easdem quantitates, Tinct. Iod. gramm. 75.

No. 3. Salis et Aq. ut antea, Tinct gramm. 100.

Von Lugol mit Vortheil bei Scrofeln.

Tinctura Iodii aetherea, Aether iodinicus s. ioduratus s. sulphuricus iodu-ratus. (Fer. *Gr. Re.*)

℞. Iodii . . . . . grana sex.
Aetheris (66°) drachmam unam.
Dissolve.

Gr. Iodii grana quinque; — *T.* Alcoholis 36° B. partes vol. duas, Acidi hydroiodici (1,700) partem unam, destillent in balneo aquae; productum cum Aqua tracta.

Pilulae Iodii s. Iodinae s. iodatae. (Fer. *B. Re*)

℞. Iodii . . . . . granum unum.
Liquiritiae pulv. scrupulum unum.
Rob Sambuci . quantum sufficit.
Fiant pilulae duae.

Re. E Mica Panis cum Iodio (⅛ pro gr. iv.).

Unguentum Iodii s. Iodinii s. iodatum, Pomata cum Iodio. (Fer. Pm. *B. Re. T.*)

℞. Iodii . . . . . semidrachmam.
Axungiae praepar. . sesquiunciam.
Terendo exacte misce.

Pm. Iodii partem unam, Axungiae sexaginta quatuor; — *Re.* Iodi scrupulum, Axungiae unciam; — *T.* Iodii scrupulos sex, Axungiae praep. uncias quatuor, Sebi uncias duas.

Tinctura Alcoholis Sulphuris iodata s. Carbureti Sulphuris iodurati. (*Vm.*)

℞. Iodii . . . . . partem unam.
Alcoholis Sulphuris . partes tres.
— Vini . . partes novem.
Misce ut sensim solvatur iodium.

Acidum iodicum. (*Gr. T. Vm.*)

℞. Kali iodici pulverati quantum vis.
Infunde ei Acidi tartarici in Aquae quantitate quam potest minima soluti q. s., liquorem post aliquot tempus decantha, et lenta vaporatione consume, refrigescere sinendo quoque momento, donec nihil amplius subsideat.

Secundum *Davy* purum obtinetur, Iodium cum Gase oxydato Chlori sicco commiscendo, quo facto chloro decomposito acidum iodicum excernitur. (*T.*)

Gr. Iodium in Aqua diffundere, et Gas Chlori per mixturam transmittere, donec clara et decolor sit reddita, tunc ad cryst. vaporare; — *Iodous Acid. Re.* Iodii et Chlorat. Potass. part. aeq. in mortario vitreo vel porcellaneo trita in retorta vitrea calefacere.

Iodas Potassae, Kali iodicum s. iodinicum (Fer. Pm. *Gr. T. Vm.*)

℞. Iodii . . . . . quantum vis.
Liquoris Kali caust. concent. q. s.
Solutione ad siccum evaporata, residuum cum Alcohole lava et quod non solutum remansit, serva (iodatem in Aqua dissolve et crystallisationi subjice.) (Fer. Pm. *Gr. T.*)

℞. Natri Fucorum cribr. et pulv. q. vis.
Aquae leviter potassat. pond. dupl.
Coque et operationem cum eadem Aquae quantitate repete, liquores commixtos filtra, vaporando consume et crystallos, prout formantur collectas et exstillatas pulvera et Aqua calida lava; Aquâ lotionum cum illa exstillata commixtâ totum ad siccum evaporet, residuum serva. (*Vm.*)

Dieſer Rückſtand enthält viel ſalzſaures Natron und Kali. Man könnte ihn ſtatt des Jodinwaſſerſtoffkali anwenden.

Calcaria iodica s. iodinica.

Die Bereitung iſt in keiner Pharmacopöe angegeben.

Boli resolventes deprimentes. (*B.*)

℞. Calcariae iod. grana sex ad decem.

Extr. Aconiti grana viginti quatuor. Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. — Bei chroniſcher Bronchitis und tuberkulöſer Schwindſucht.

Boli emmenagogi resolventes. (*B.*)

℞. Calcariae iodinicae grana decem. Extracti Sabinae grana duodecim. Fiant boli quatuor. — Gabe, alle vier Stunden ein Stück. Bei Mangel der Reinigung mit Scrofelcomplication.

Acidum hydroiodicum. (Fer. GalH. Pm. *Re. T.*)

℞. Phosphureti Iodii . quantum vis. Retortae intromissum parumper humecta et lente calefac; acidum inde evolutum, tubi longi recurvati ope, in fundum catilli angusti excipe.

Immittere potes quoque Iodio Aqua destillata (Alcoholis 26° q. s. soluto Pm.) diluto torrentem Gasis Acidi hydrosulphurici (e Sulphureto Antimonii infuso Acido hydrochlorico extricatum Pm.), donec liquor colore sit privatus, hunc calefacere et filtratum sub recipiente apparatus pneumatici sedulo (ad dimidiae vel tertiae partis remanentam *T.*) concentrare.

Proto-Hydroiodas Potassii.

Hydroiodas Protoxydi Potassii, Hydroiodas s. Hydriotas Potassae s. Potassii s. kalicus, Ioduretum Potassii, Iodetum Kalii, Kali hydroiodicum. (B°. Bor4 Fer. GalF. GalH. HassP. LH Pm. *Fi. Gr. Ma. Re. T.*)

1) Verfahren Turner's.

℞. Solut. Kali caust. (1,150) . q. vis. Adde sensim, blando calore

Iodii . . . . quantum sufficit ad neutralisandum kali (donec liquoris color intense ruber in rubicundum nec flavescentem vergat Bor4.). Evaporatum ad siccum calcina fortiter et in Aqua dissolutum crystallisationi subjice. (Bor4. GalF. GalH. *Ma.*)

8°. Kali cum Acido hydroiodico saturatum ad liquoris spissi consist. evaporare; — *Gr.* e massa ex paratione iodatis potassae, lavando cum Spir. Vini, filtrando et spiritum destillatione separando obtentum.

2) Verfahren Caillot's und Baup's.

℞. Iodii . . . . . partes decem.
Aquae destill. partes quinquaginta.

Retortae vitreae immissis adde sensim, dosibus divisis

Limat. Ferri purae partes quinque, quaque vice vas agitando. Calefac usque liquor colore sit privatus; filtra hunc et filtrum cum Aqua bulliente ablue, donec liquor saporis sit expers; liquorem et Aquam lotionum commisce et totum in arena ad ebullitionem usque calefac; infunde deinde solutionis Kali subcarb. tantum ut omne ferrum oxydatum praecipitetur; filtra et filtrum sedulo ablue; liquores commisce et si charta exploratoria rubra baseos excessum indicet, Acidi hydroiodici pauxillum adde; evaporent tunc in balneo arenae ad cuticulae apparitionem usque; quo facto igne exstincto crystallisationi subjice, Aqua parumper lava et crystallos sicca. (GalH.)

LH. Aquae partes quadraginta octo, caeterum ut GalH.; — HassP. Iodinae purae uncias duas, Aquae dest. octo, Limaturae unam; liquido limpido filtrato et residuo cum Aqua dest. abluto liquores cum Aquae dest. unciis triginta misceantur et Liquoris Cinerum clavellat. depurat. tantum addatur, ut omne oxydum ferri praecipitetur; residuo cum Aqua dest. eloto et expresso, liquores clari vaporent lento calore et crystallisationi subjiciantur etc.; — *Fi.* Iodii drachmam, Aquae dest. unciam, Limaturae sesquidrachmam, Kali subcarbonici q. s.; — Pm. Aquae dest. circiter libram, Limaturae q. s. et ultra, Jodii q. libet.

3) Verfahren Tabbei's.

℞. Iodii . . . . . quantum vis.
Dissolve in
Alcoholis (25° B.) . . . . q. s.

Solutioni deinde infunde per vices Kali hydrosulphuricum (liquidum?), donec colorem lacteum induerit; liquori tunc sponte clarificato adhuc infunde guttas aliquot Kali, filtra, et ad siccum evaporatum crystallisationi subjice. (GalH. *T.*)

Brandes Kali sulphuratum liquidum adhibet.

Dieſe Zuſammenſetzung erhält nur im flüſſigen Zuſtande den Namen iodinwaſſerſtofffaures Kali; cryſtalliſirt iſt es Jodinkali (Ioduretum Potassii).

℞. Acidi hydroiodici partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Infunde sensim Kali subcarb. ad perfectam saturationem usque, filtra et evaporata crystallisationi subjice. (Fer.)

Potio resolvens ex Iodio, Solutio Hydroiodatis Potassae. (Fer. GalF. GalH. LH. *B. Bo. Gr. Ma. Pie. Ra.*)

℞. Hydriodat. Potass. grana triginta sex.
Aquae destillatae unciam unam.
Dissolve

LH. Hydriodatis semidrachmam.

Ein Tropfen dieſer Flüſſigkeit iſt über einen Gran ſchwer. — Man hält ſie all-

gemein für vorzüglicher, als die Tinctur, und verſchreibt ſie auf dieſelbe Weiſe, in denſelben Gaben und unter denſelben Umſtänden, wie dieſe.

Potio stimulans.

℞. Hydroiodatis Potassae grana duo.
Magnesiae sulphuricae semunciam.
Tartari stibiati granum dimidium.
Aquae . . . . . uncias sex.

Gabe, ein Kaffeelöffel drei oder vier Mal täglich, bei Scrofeln.

Solutio atrophica. (*Ma*): Aq. dest. Lactuc. unc. 8, Aq. Menth. drachm. 2, Hydriodat. Potass. drachm. 4, Syr. Alth. unc. 1. — 1 Eßlöffel Morgens und Abends in etwas Waſſer bis auf zwei, gegen Hypertrophie des Herzens. Bei zugleich beſchleunigter Herzbewegung: Aq. dest. Lact. unc. 8, Aq. Flor. Aur. drachm. 2, Hydriod. quatuor, Tinct. Digit. alcoh. unam ad duas, Syr. Alth. sesquiunciam. — Morgens und Abends 1 Eßlöffel in etwas Waſſer oder genauer ½ Unze jedesmal.

Pilulae Hydriodatis Potassae. (*Pie.*)

℞. Hydriod. Potass. drachmas quinque.
Aquae destillatae drachmas sex.
Panis biscocti . quantum sufficit

ut fiat massa in pilulas trecentas dividenda, quarum quaeque salis unum granum continet.

Bei Kropf, Leukorrhoe und weißen Geſchwülſten.

Syrupus Hydriodatis Potassae. (LH.)

℞. Syrupi communis uncias viginti.
Hydriodatis Potassae
semidrachmam.

Hydriodatem in Aquae quam minima potest quantitate solutum exactissime cum syrupo commisce. — Gabe, eine halbe, ganze bis zwei Drachmen und mehr allmälig.

Unguentum Kali hydroiodici s. Hydriodatis Potassae, Pomata cum Hydriodate Potassae. (B*. Bor4. Fer. GalF. GalH. LH. Pm. *B. Bo. E. M. Pic. Ra. T.*)

℞. Hydriod. Potass. semidrachmam.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Misce triturando.

LH. Hydriodatis drachmam unam, Axungiae uncias duas; — Pm. Hydriodatis partem unam, Axungiae triginta. — Bor4. Kali drachmam, Magnesiae carbon. grana sex, tere additis aliquot guttis Aquae destill. cum Unguenti rosati uncia; — *T.* Kali drachmas tres, Axungiae uncias sex; si placet, Essentiae Bergamottae guttas aliquot addere potes.

In Einreibungen, beſonders gegen Kropf. — Gabe, Morgens und Abends, jedesmal haſelnußgroß eingerieben.

Tabellae cum Coffea Moccaënse. (*Pie.*)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor.
Coffeae Mocc. porphyr.
semidrachmam.
Hydriodatis Potassae
grana septuaginta quinque.
Mucilag. G. Tragac. cum Infuso forti Coffeae parat. . . q. s.

Fiant tabellae trecentae. — Bei weißem Fluß, Kropf, Amenorrhoe, Drüſenſtockungen, Scrofeln.

Hydroiodas s. Hydriodas ioduratus Potassae. (Fer. LH. Pm. *Fi. Ma. T.*)

℞. Hydriodatis Potassae partes viginti.
Iodii puri . . . . partes sex

Misce in mortario vitreo et diu tritura ut mixtura sit homogenea et obscure rubra.

LH. Hydriodatis drachmas decem, Iodi tres. — *Fi.* Hydriodatis semidrachmam, Iodii grana decem; — *T.* Hydriodatis drachmas sex, Iodii scrupulos quinque.

Solutio Hydriodatis iodurati Potassae, Solutio Coindeti. (Fer. Pm. *B. Ca. Ma. Re.*)

℞. Hydriod. Potass. grana triginta sex.
Aquae destillatae unciam unam.
Solutioni adde
Iodii . . . . . grana decem.

Ein Tropfen wiegt anderthalb bis zwei Gran.

Aquae iodatae s. Balnea iodata.

No. 1. ℞. Iodii scrupulos duos, Kali iod. quatuor.
No. 2. — Iodii scr. duos c. dimid., Kali quinque.
No. 3. — Iodii scrup. tres, Kali sex.
No. 4. — Iodii scrup. quatuor, Kali octo.

Von Lugol bei Scrofeln. Es kommt ½, ¾ bis 1 Gran auf die halbe Flaſche oder 1 Pfund Salzwaſſer zum Bad. Bei Erwachſenen fängt L. mit der Flüſſigkeit No. 2. an; bei Kindern iſt, nach Erfahrung, der dritte Theil der Auflöſung hinreichend.

Pm. Hydriod. partes duas, Iodii unam, Aq. dest. viginti septem. (*Hydriodas ioduratus Potassae.*)

Syrupus Hydriodatis iodurati Potassae. (LH. *Fi. T.*)

℞. Hydriod. iodur. Potass.
grana octodecim.
Aquae destillatae drachmas duas.

Solutioni adde
Syrupi simplicis . uncias decem.
LH. ut syrupum sydriodatis simplicis sed cum Hydriodate iodurato; — *Fi* Hydriodatis drachmam, Aquae destill. unciam, Syrupi simplicis uncias quadraginta.
Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze in 24 Stunden.

Unguentum s. Pomatum cum s. Hydriodatis iodurati Potassae. (Fer. LH. *B. Bo. Ca. Fi. Ma. Pie. T.*)

℞. Hydriod. iodur. Potass.
semidrachmam.
Iodii grana decem ad quindecim.
Axungiae . . . . sesquiunciam.
Contere bene. (Fer. *Bo. Ca. Ma.*)
℞. Hydriod. Potass. drachmam unam.
Iodii . . . . . grana viginti.
Succi gastrici Vituli . . . q. s. ut fiat, intra horarum viginti quatuor tempus, solutio, cui adde
Axungiae . . . . uncias duas.
Misce bene. (Fer. *B. Pie.*)

LH. *Fi.* et *T.* ut unguentum kali hydriodici sed cum Kali iodurato. (*T.*)
Lugol bereitet sie von dreierlei Stärkegraden: 1) Iodureti Potassii gr. 64, Iodii 8, Axungiae 1000; 2) Iodureti 160, Iodii 22,4, Axungiae 1000; 3) Iodureti 160, Iodii 25 6. Axungiae 1000.
Alle diese Präparate sind wirksamer, als die mit dem einfachen Jodinwasserstoffkali.
Lugol im Ludwigs-Spital gebraucht sie bei Scrofeln, z. B. Knoten, Augenentzündung, Nasengeschwüren, behinderter Menstruation, weißen Scrofelgeschwülsten ꝛc.

Mixtura s. Potio resolvens. (*B.*)

℞. Ononidis . . . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur; colaturae adde
Solutionis Hydriodatis iodurati Potassae . . guttas quadraginta.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei scrofulösen Krankheiten.

Natrum hydroiodinicum, Hydroiodas Sodae, Sodium iodatum. (HassP. *T.*)

Ut kali hydroiodinicum sed cum Sale Sodae depurato, Aqua soluto, loco liquoris cinerum clavell.

Ioduretum Carbonii s. Carburetum Iodii. (*T.*)

℞. Solutionis alcohol. (Alcoholis 33° B) Iodii saturatae . q. libet.
Instilla guttatim
Solutionem Kali caust. alcoholicam ita tamen, ut iodii parva quantitas libera restet; sepone liquorem per aliquot tempus, tunc Aquae magnam copiam ei infunde, squamulae iodureti citrini coloris in Alcohole rectificato solve et hanc solutionem per chartam filtratam in vase vitreo vel porcellaneo amplae superficiei evaporationi spontaneae subjice ut squamulae iodureti purae obtineantur.
Könnte versucht werden bei Krankheiten, wo die Tinctur den Magen angreift.

Hydriodas Ferri, Ferrum hydriodicum.

Die Bereitungsart ist in keiner einzigen Pharmacopöe angegeben.

Solutio ad strumam s. antistrumosa. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Ferri drachmas quatuor et grana quadraginta.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Gabe, zehen Tropfen Morgens und Abends und allmälig gestiegen.

Unguentum ad scrofulas s. antiscrofulosum. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Ferri grana sexaginta.
Axungiae . . . unciam unam.
Wird gegen Leukorrhoe, weiße Geschwülste und Drüsenverstopfungen empfohlen.

Trochisci emmenagogi. (*Pie.*)

℞. Hydriodatis Ferri grana triginta.
Croci, pulverati . semidrachmam.
Sacchari . . . uncias quatuor.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae, Infusi Cinnamomi, sing. . q. s.
Fiant trochisci ducenti quadraginta.
Bei Amenorrhoe und Leukorrhoe gerühmt. — Gabe, fünfzehen bis zwanzig Stück täglich, allmälig gestiegen.

Ioduretum Barii. (*Ma.*)

Calefaciendo Hydriodatem Ferri cum excessu Carbonatis Barytae, evaporando ad siccum, redissolvendo in Aqua et crystallisationi subjiciendo.

Pomatum s. Unguentum cum Iodureto Barii.

℞. Iodureti Barii . grana quatuor.
Axungiae . . . unciam unam.
Misce. — Von Biett in einigen Fällen von Scrofelgeschwülsten.

Ioduretum Arsenici. (*Ma.*)

Calefaciendo in retorta vitrea mixturam ex Arsenici 16 et Iodii 100; vel: coquendo Arsenici pulv. gramm. 30, Iodii 100 in Aq. 1000, liquorem quum colorem perdidit, filtrando et ad siccum evaporando; potest, si necesse videtur, sublimationi subjici.

Unguentum s. Pomatum cum Arsenici Iodureto.

℞. Iodureti Arsenici . . grana tria.
Axungiae . . . unciam unam.

Von Biett in einigen Fällen fressender tuberkulöser Flechten.

Ioduretum Sulphuris. (*Ma.*)

℞. Iodii . . . . partes quatuor.
Sulphuris sublimati partem unam.

Misce et in vitrum medicamentis servandis inserviens (Medicinglas) introducta calefac leviter; quo facto excessus iodi separatur et ioduretum massae instar ad griseum vergenti, crystallos aciculares praebenti remanet.

Unguenta cum Iodureto Sulphuris.

1) ℞. Iodureti Sulphuris . partes 5.
Axungiae . . . . . — 96.

2) ℞. Iodureti Sulphuris . partes 8.
Axungiae . . . . . — 144.

Von Biett bei einigen Jahren bei tuberculösen Hautkrankheiten.

Iodides Zinci. (*Re.*) Bereitung nicht angegeben.

Unguentum Iodidis Zinci. (*Re.*)

℞. Iodidis Zinci . . . drachmam.
Axungiae praep. . . . unciam.

Bei Kropf täglich zu 1 Dr. einzureiben. (*Ure.*)

Ipecacuanha.

Brechwurzel, Ruhrwurzel; Ipecacuanha (*Gal.*); Ipecacuan (*Ang.*); Hipecacuana, Bejuquillo (*His.*); Ipicacuanha, Cipó (*Lus.*); Ipekakuang (*Pol.*); Kraekrot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen Hum. Hun. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sav. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Z.*

Die wahre Ipecacuanha ist die Wurzel von Cephaelis (Callicocca, Viola) Ipecacuanha *Rich.*, einer Pflanze (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae, *J.*), welche in den Wäldern Brasilien's wächst. (Dict. d. Sc. méd. T. XXVI. pl. 1. *Hayne* VIII. 20. *Rich.* Hist. Ip. t. 1 *de Mart.* Spec. mat. med. Bras. t. 1. *Plenck* t. 754. Berl. Jahrb. X et XVII. t. 1. Linn. Trans. VI. t. 6. *St. Hil.* pl. us Bras. t VI.)

Von dieser Wurzel (radix Brasiliensis) kommen im Handel drei Varietäten vor:

1) Die graue, geringelte, schwärzlichgraue, braune Ipecacuanha; sie ist nicht über federspulendick, unregelmäßig geringelt, außen schwärzlichgrau und enthält weniger Holz als Rinde; der Bruch ist weißlich und harzig, der Geschmack bitter und etwas scharf.

2) Röthlichgraue, rothgraue oder graue Ipecacuanha; sie hat äußerlich eine röthliche Farbe, unregelmäßige Ringe, einen harzigen, rosenröthlichweißen Bruch, und ihr Geschmack ist etwas bitterer als der der vorhergehenden.

3) Grauweiße, weiße oder größergeringelte Ipecacuanha, mit wenig hervorstehenden, fast regelmäßigen Ringen, von grauweißer Farbe, harzigem, weißlichem Bruche, bitterem Geschmack und von größerer Dicke, als die beiden vorhergehenden. Im Handel kommen von der ersteren etwa zwei, von der zweiten ein Dritttheil vor, die dritte findet man dagegen äußerst selten.

Noch führen eine Menge anderer Wurzeln den Namen Ipecacuanha; so in America, nach Decandolle, alle die, welche brechenerregende Eigenschaften besitzen. Unter ihnen unterscheidet man besonders die von Psychotria emetica, *Mut.*, einem Strauche Peru's (*Hayne* VIII. 19. Berl. Jahrb. XXII. t. II. *Mart.* Spec. mat. med. Bras. t. 8. f. 8—10 radix. *Rich.* Hist Ip. t. 2. *Desc.* fl. méd. d. Ant. t. 120. *Humb.* Pl. aequin. II. t. 126. Fl. méd. IV. 201. *Bert.* Bild. VII. 24. f. 1.), die sogenannte schwarze, gestreifte, aschgraue, fußholzartige Ipecacuanha. Sie hat gar keine oder nur sehr wenige und unregelmäßige Ringe, aber Längsstreifen. Der Bruch ist harzig, aber weniger dicht, als bei den vorigen, und deutlich schwarzgrau, besonders wenn man sie befeuchtet. Sie hat keinen Geschmack. Sie kommt aus Peru, jedoch nur wenig in den Handel und ist nicht sehr geschätzt. Auch gehört Gillenia trifoliata (Spiraea trif.) hierher.

Noch wird einer weißen oder stärkemehlartigen Ipecacuanha gedacht, die Wurzel von Richardsonia Brasiliensis, *Gom.* (Ionidium Ipecacuanha?) (Lus. *M.*) *Hayne* VII. 21. *Aug. St. Hil.* pl. us. du Brés. t. VIII. *Mart.* l. c. t. 9. f. 13. 14. radix), an welcher man unregelmäßige, kaum halbkreisrunde Ringe bemerkt. Sie hat die Stärke einer Taubenfeder, ist runzelig, gedreht, weißgrau und ohne Geschmack. Sie riecht schimmelig. Der Bruch ist weiß, stärkemehlartig und durchaus nicht harzig. Man findet sie nie unter der käuflichen Ipecacuanha.

Die wahre Ipecacuanha enthält, nach Pelletier, einen fetten Stoff, Gummi, Satzmehl und besonders ein Alcaloid, das sogenannte Emetin (Emetina, Emeti-

num), dem sie ihre Eigenschaften verdankt. Dieses Alcali ist in der Wurzel der Psychotria in geringerer Menge vorhanden, als in der der Cephaëlis, und Richardsonia enthält dessen nur sehr wenig.

Reizend, Brechen und Stuhlausleerungen bewirkend, oder bloß aufregend oder tonisch, wenn man sie in geringer Gabe reicht. — Gabe, als Reizmittel, einen bis vier, als Brechmittel zwölf bis dreißig Gran in vier Unzen Wasser.

Psychotria sulphurea, von welcher Am. und *Gr.* eine *Tinctura Ps. sulph.* anführen, ist sehr bitter und tonisch.

§. I. Präparate, welche die Ipecacuanha in Substanz enthalten.

Pulvis ad diarrhoeam s. antidiarrhoeicus. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Sacchari . . drachmas quatuor.
Olei Nucis moschatae guttas duas.
Fiat pulvis in quatuor partes dividendus. — In vier und zwanzig Stunden, jedes Pulver in einem halben Glase Zuckerwasser zu nehmen und 15 oder 20 Tage lang fortzubrauchen. — Von Frank bei chronischer Diarrhöe empfohlen

Pulvis emeto-catharticus. (*E. Ra.*)

℞. Ipecacuanhae grana viginti quatuor.
Rhei . . . . grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Ra.*)
E. Ipecacuanhae et Rhei, sing. scrupulum; in Syrup zu nehmen.

Pulvis tonicus. (LH.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana tria.
Rhei . . . . grana duodecim.
Divide in tres partes. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal.

Pulvis motum peristalticum invertens s. nauseam ciens. (*Au. B.*)

℞. Ipecacuanhae grani quadrantem.
Sacchari . . grana quindecim.
Alle zwei Stunden zu nehmen. — Von Richter bei eingeklemmten Brüchen. (*Au.*)
℞. Ipecacuanhae . granum unum.
Gummi Arabici,
Sacchari, sing. scrupulum unum.
Alle zwei Stunden bei chronischen Catarrhen. (*B.*)

Pulvis emeticus s. vomicus. (LH. RC. *Au*)

℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi, sing. . scrupulum.
Divide in partes quatuor. — Gabe, ein Stück alle Viertelstunden, bis Erbrechen eintritt.
LH. Singulorum grana viginti; divide in duas partes. — Gabe, einen Theil, den andern, wenn kein Erbrechen erfolgt.
℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi, sing.
grana quindecim.
Sulphur. Antim. aur. grana quinque.
Divide in partes quatuor.
℞. Ipecacuanhae,
Sacchari albi, sing. gr. quindecim.
Tartari stibiati . granum unum.
Divide in partes quatuor.
℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Tartari stibiati . granum unum.
Misce ut fiat pulvis subtilissimus, pro dosi sumendus.

Pulvis febrifugus. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae scrupulum unum.
Magnesiae subcarb. unciam unam.
Divide in partes viginti quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, in einer Tasse Thee. — Von Wichmann.

Pulvis expectorans. (*E. Gr. Par. Ra.*)

℞. Ipecacuanhae gr. viginti quatuor.
Scillae . . . grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Ra.*)
Gr. Scillae grana octo, Ipecacuanhae quinque, Camphorae scrupulum, Pulv. Antim. grana sex, Sacchari puri drachmam, fiant pulv. quatuor. Ein Stück zwei Mal täglich in Gerstenwasser.
℞. Ipecacuanhae . . . grana sex.
Myrrhae . . . grana duodecim.
Nitri . . . . semidrachmam.
Divide in partes quatuor. — Gabe, viertelstündlich ein Stück. (*E. Gr. Par.*)

Pulvis carminativus. (*Pie.*)

℞. Ipecacuanhae . granum unum.
Succini porphyr. grana duodecim.
Fiat pulvis.

Boli digestivi. (*Ca. Sw.*)

℞. Ipecacuanhae gr. duo ad quatuor.
Pulveris aromatici grana decem.
Syrupi Cinnamomi . . . q. s.

Pulvis alexiterius. (Ful.)

℞. Ipecacuanhae,
Extracti Opii, sing. . grana sex.
Kali sulphurici . drachmas tres.
Gabe, zehen Gran.

Boli antidysenterici. (*Ca. Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Theriacae . . scrupulum unum.
Cretae praeparatae . . . q. s.

Boli adstringentes. (*Pie.*)

℞. Ipecacuanhae . . sesquigranum.
Aluminis . . . . . grana sex.
Diascordii . . quantum sufficit.

Fiat bolus.

℞. Ipecacuanhae gr. unum c. dimid.
Laudani liq. Sydenh. granum unum.
Conservae Cynorrhodi . . q. s.
Fiat bolus.

Boli vomitivi. (*Ra.*)

℞. Ipecacuanhae grana octodecim ad viginti quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiant boli tres. — Halbſtündlich.

Pilulae nauseam cientes. (*B.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana sex.
Rob Sambuci . quantum sufficit ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae expectorantes. (*E.*)

℞. Extracti Cicutae,
Pulv. Ipecac., sing. grana decem.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei Stück auf einmal.

℞. Ipecacuanhae . grana quindecim.
Saponis albi . quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück täglich vier Mal.

Linctus s. Marmelada pectoralis. (*Bo.*)

℞. Ipecacuanh. pulv. grana duodecim.
Florum Sulphuris scrupulum unum.
Rad. Irid. Flor. drachmam unam.
Mannae in lacrymis,
Syrupi Althaeae, sing. uncias duas.
Bei'm Keuchhuſten empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Opiatum antidysentericum. (*Ca.*)

℞. Ipecacuanhae . semidrachmam.
Rad. Tormentillae
drachmam unam.
Opii purificati . grana quatuor.
Conservae Rosarum rubrarum,
Syrupi Myrtillor., sing.
drachmas sex.

Electuarium Ipecacuanhae moschatum s. vomitivum. (*Au.*)

℞. Pulv. Rhei,
— Tart. borax., sing.
drachmam unam.
— Ipecacuanhae semidrachmam.
— Moschi . . grana quatuor.
Sulph. aur. Antim. grana decem.
Mellis . . . . quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel, bis ein leichtes Erbrechen erfolgt. — Bärens empfiehlt es bei Keuchhuſten.

Trochisci Ipecacuanhae, Rotulae cum Ipecacuanha, Trochisci Ipecacuanhae saccharati. (An. B*. Ba. Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. His. His8. Pm. Suec. *Br. Ca. Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . . partem unam.
Sacchari albi partes quadraginta.
Mucilag. Tragac. c. Aqua Ros. part. . . . quantum sufficit.
Fiant trochisci granorum duodecim. (Fer. Gal. *Ca.*)

Pm. Ipecacuanhae drachmam unam, Sacchari uncias sex, Mucilaginis Tragacanthae c. Aqua Naphae part. quantum satis ut fiant rotulae centum quadraginta quatuor, quarum singulae continent Ipecacuanhae partem grani dim diam; — Br. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari duodecim et Mucil. G. Arabici ad formandos trochiscos nonaginta quatuor; — Bor4. Ipecacuanhae drachmas duas, Aquae fervidae q. s., stent loco calido per horas aliquot; colaturae expressae adde G. Tragac. q. s. ut cum Sacchari albissimi pulv. unciis sedecim massa fiat in trochiscos formanda; — His. His8 Ipecacuanhae partem unam, Sacchari quadraginta quatuor, G. Tragacanthae tres et Aquae q. s. ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor; — B*. et Ba. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari sexaginta et Mucilag. Tragacanthae q. s. ut fiat massa, cujus drachma quaeque in trochiscos decem dividatur; — An. et Bel. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari septuaginta duas et Mucil. G. Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci granorum decem; — Suec. Ipecacuanhae partem unam, Sacchari nonaginta sex et Mucil. G. Tragacanthae q. s. ad formandos trochiscos sexaginta; — *Fi.* Radicis drachmas duas, Sacchari pulverati uncias sex, Mucil. Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci no. 288; — *Gr.* Ipecacuanh. drachmas quatuor, Sacch. libras duas, Mucilag. G. Tragac. q. s. ut fiant trochisci no. 480, quorum quisque ipecacuanhae gr. $\frac{1}{2}$ continet; — *T.* Radicis drachmas duas, Sacchari pulverati uncias decem, Mucil. Tragacanthae cum Aq. Flor. Aur. parat. et aliquot guttis Essentiae Caryophyllor. aromatisatae q. s. ut fiant trochisci granorum circiter sedecim, quorum quisque ipecac. gr. $\frac{1}{3}$ continet.

℞. Pulv. Ipecacuanhae
grana triginta sex.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s. ut fiant trochisci centum quadraginta quatuor. (Han.)

℞. Pulv. Ipecacuanhae partem unam.
Sacchari . . partes triginta duas.
Ipecacuanham cum aequali pondere sacchari tritam cum reliquo saccharo ad plumam cocto commisce. (*Vm.*)

Trochisci Ipecacuanhae opiatae. (GalH.)

℞. Ipecacuanhae . partes sedecim.
Sacchari albi
partes sexcentas quadraginta.
Extracti Opii . partes quinque.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquae Florum Aurantii . . q. s.
Opium in Aquae pauxillo solutum mucilagini addendo, trochisci formentur.

Trochisci Ipecacuanhae compositae. (B*.)

℞. Ipecacuanhae . scrupulum unum.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Chocolatae pulv. . sesquiunciam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Syrupi Capilli Veneris . . q. s.
Fiant trochisci octoginta.

Potio vomitiva s. emetica. (GalM. *Bo. ParC. Ra. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Ipecacuanhae . grana duodecim.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (*Ra.*)

GalM. et *Bo.* Ipecacuanhae grana viginti et Aquae uncias quatuor.

℞. Ipecacuanhae gr. viginti quatuor.
Aquae purae . . uncias novem.
Syrupi Capill. Ven. unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

ParC. Ipecacuanhae grana decem, Aquae uncias quatuor et Syrupi Sacchari unam.

℞. Ipecacuanhae gr. viginti quinque.
Oxymellis scillit. drachmam unam.
Aquae purae . . unciam unam.
Misce sedulo. (*Sw.*)

Sa. loco aquae purae Aquam alexiteriam simplicem adhibet.

℞. Ipecacuanhae . . grana decem.
Kermetis mineralis granum unum.
Aq. Cinnamomi hord.
drachmas quatuor.
— communis . . . uncias sex.
Misce. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . scrupulum unum.
Tartari emetici . granum unum.
Syrupi Mellis . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce. (*Ra.*)

℞. Ipecacuanhae . . grana viginti.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Tartari emetici . . grana duo.
Misce. (GalM.)

Auf zwei oder auf mehrere Male und ſelbſt auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Ham.)

℞. Ipecacuanhae . . . grana tria.
Aq. Valerianae,
— Menthae pip., sing. uncias tres.
Misce.

Potio antemetica s. antivomitiva. (*Sm.*)

℞. Ipecacuanhae gr. duo ad quatuor.
Natri subcarbonici . grana decem.
Syrupi Capit. Papav.
unciam unam.
Aquae Menthae . . uncias sex.

Gegen krampfhaftes Erbrechen. — Alle Stunden oder zwei oder drei Stunden einen Löffel.

Mixtura emetica s. vomitiva. (B*.)

℞. Ipecacuanhae . . grana viginti.
Olei Amygd. dulc. unciam unam.
Misce bene.

§. II. Präparate, welche das wirkſame Princip der Ipecacuanha ohne das zur Ausziehung benutzte Vehikel enthalten.

Extractum Ipecacuanhae. (*Vm.*)

℞. Cort. Rad. Ipecac. pulv. . q. vis.
Prelo de Real submitte, Aqua frigida humectans; post horas viginti quatuor apparatûs columnae pedum viginti duarum ad quinque Aquae bullientis pressurâ adhibitâ, liquidum, quamdiu colore praeditum prodeat, susceptum per pannum laneum (Flanell) colatum ad extr. consist. consume.

§. III. Präparate, welche das wirkſame Princip der Ipecacuanha zugleich mit dem zur Ausziehung benutzten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Infusum Ipecacuanhae. (Ams. B*. Ful. Ham. Li. *Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horae quadrantem infusionis cola. (Ful. Li.)

℞. Ipecac. contus. . sesquidrachmam.
Corticis Aurantii . drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quinque.
Infunde in vase tecto per semihoram et adde
Cremoris Tartari drachmas duas.
Vas tege et post refrigerationem cola absque expressione. Colaturae unciis quatuor adde
Oxymellis scillitici . semunciam.
Misce bene. (Ams. B*. Han. *Vm.*)

Gabe, alle Viertelſtunden einen bis zwei Löffel.

Infusum tonicum. (*Bo.*)

℞. Ipecac. contus. gr. viginti quinque.

Cort. Aurant. amar. . drachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur, quibus adde
Syrupi Flor. Aurant. unciam unam.
Gabe. ein Eßlöffel eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit.

Decoctum Ipecacuanhae. (*Sp.*)

℞. Ipecac. grossiusc. pulv. drachmas duas.
Aquae fontanae . uncias quatuor.
Decoque blando igne ad dimidium et cola; residuo bis eodem modo cocto, colaturae tunc commisceantur.
Bei Ruhr empfohlen. — Auf dreimal zu nehmen, drei Tage hinter einander.

Syrupus Ipecacuanhae aquosus. (Bor4. Gal. Li. Pm. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Rad. Ipecac. contus. scrup. octo.
Infunde
Aquae communis fervidae . q. s. ad colat. unciar. novem, cui adde
Sacchari albissimi uncias sedecim.
Fiat ebullitione unica syrupus. (Bor4.)
Pm. Ipecac. unciam, Aq. ferv. uncias quatuordecim, infusionem calidam per horas sex et post colaturam atque liquoris filtrationem Sacchari albi libras duas (uncia una grana sedecim Ipecac. continet.); — *Gr.* Ipec. unciam, Aq. ferv. octarium, Sacchari libras duas.
℞. Rad. Ipecac. gris. contus. semilibram.
Aquae . . . . . libras septem.
Coque in vase clauso ad liquidi librarum sex remanentiam; subsideant; tunc clarificatis filtratisque addantur
Sacchari albi . librae duodecim.
Coque ad consistentiam syrupi. (Gal.)
T. Ipecacuanhae uncias duas, Aquae comm. libras duas et uncias quatuor ad librar. duar. remanent. coquere et liquori post refrigerationem et subsidentiam decanthato filtratoque addere Sacchari libras quatuor, ut fiat syrupus; — *Fi.* Ipecacuanhae ciner. unciae uni Aquae bullientis uncias quatuordecim infundere et leviter ad unius librae remanent. coquere, filtrare per chartam et additis Sacchari albissimi libris duabus balnei aquae ope in vase clauso syrupum parare.
℞. Ipecac. grossiusc. contus. part. unam.
Aquae frigidae . . quantum satis ad humectandum. Post horas duodecim adde
Aquae bullientis . partes viginti.
Refrigeratis et colatis adde
Sacchari albi part. viginti quatuor.
Clarifica et vaporando ad syrupi consistentiam inspissa. (*Vm.*)
℞. Ipecacuanhae . . libram unam.
Aquae . . . . . libras sex.
Macera per horas duodecim, residuo infunde Aquae aequal. quant.; infusis tum commixtis et filtratis fiat coctione sufficiente, cum Sacchari libris viginti quatuor syrupus.
℞. Ipecacuanhae . . . semunciam.
Aquae . . . . libras quinque.
Coctis per octo vel decem sexagesimas et colatis adde
Sacch. albi libr. duas cum dimidia.
Coquendo ad syrupi consistentiam redactis adde denique
Aquae Flor. Aurant. unciam unam.
Misce. (Li.)

Syrupus incisivus s. expectorans. (Fer. *Bo. Pie. Sw**)

℞. Rad. Ipecacuanhae drachmas duas.
— Iridis Florentinae,
Lichenis pyxid., sing. . unciam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Fiat syrupus. (*Sw**.)
B. et *Pie.* Rad. Iridis unciam, Lichenis semunciam et Polygalae Virgin. tantidem.

Syrupus Ipecacuanhae compositus s. pectoralis de Courti. (B. Fer. *Pie. T.*)

℞. Polygalae Virginicae,
Lichenis Island., sing. uncias duas.
Chinae rubrae contusae semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Ipecacuanhae . drachmam unam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Fiat syrupus. (*B. Pie.*)
℞. Ipecacuanhae . . uncias duas.
Chinae . . . . uncias quatuor.
Opii . . . . . scrupulos duos.
Aquae . . . . . libras septem.
Macera per dies duos vel tres et decantha, et hoc cum Aqua nova tam diu repete quam haec colorem extrahat; liquoribus filtratis adde
Sacchari albi . . libras novem.
Evaporent in balneo aquae ad syrupi consistentiam. (Fer.)
T. Aquae libras sex, evaporationem ad librarum quatuor c. dimid. remanent., caet. ut Fer.

Potio emetica (*cum Ipecacuanha*) *s. vomitiva.* (Ful. Gal. *Re.*)

℞. Cremoris Tartari semidrachmam.
Aquae bullientis . uncias quatuor.
Colaturae adhuc ferventi adde
Pulv. Ipecacuanhae drachmas duas.
— Cort. Aurant. drachm. unam.
Post aliquot tempus filtra. — Löffelweise

Re. sec. Gal. Syrupi Capilli Veneris unciam unam, Aquae novem, misce, divide in tres doses, cuique addendo Ipecacuanhae grana octo. — In Zwiſchenräumen von einer Viertelſtunde.

Potio febrifuga. (*Ca. Sm.*)

℞. Ipecacuanhae . sesquidrachmam.
Corticis Aurantii . drachmas duas.
Gremoris Tartari . . . unciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coctis et colatis adde
Oxymellis scillitici . semunciam.
Misce bene. (*Ca.*)

Sm. Ipecacuanhae semidrachmam ad drachmam, Cort. Aurant. duas, Cremoris Tartari tantidem, Aquae uncias duodecim coquendo ad octo redactas et Oxymellis scill. uncias duas.
Löffelweiſe zu nehmen.

Potio ex Ipecacuanha composita s. expectorans et incisiva. (Gal. *Bo. Ca. Re.*)

℞. Ipecacuanhae . drachmam unam.
Pollicul. Sennae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horas duodecim infusionis colaturae adde
Oxymellis scillitici,
Syrupi Hyssopi, sing. unciam unam.
Bei'm Keuchhuſten. — Gabe, Kindern des Morgens ſechs Kaffeelöffel.

Mixtura expectorans et tonica. (*Pic.*)

℞. Ipecacuanhae . . grana decem.
Cort. Aurantiorum immatur.,
Lichenis Island., sing.
drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque per semihoram, tunc liquorem infunde
Herbae Hyssopi,
Rad. Polygalae Virg., sing.
manipulo uno.
Cola et adde
Syrupi Boraginis . unciam unam.
Löffelweiſe, bei Catarrhalbeſchwerden

B. Auszug durch Wein.

Vinum s. Tinctura Ipecacuanhae s. Ipecacuannae, Infusum Ipecacuanhae vinosum, Vinum Psychotriae s. Psychotriae emeticae. (Am. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus RC Suec. *Br. C. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Ipecacuanh. contus. partem unam.
Vini albi boni partes quindecim.
Macera per tres dies et filtra. (Ams. B. Bel. Ed. Lus. *Br. Sw.*)

RC. Vinum Hisp. album et dierum septem macerationem; — Am. Du. Lon. *C. Gr.* Ipecacuanhae uncias duas, Vini albi Hisp. octarios duos et macerationem per dies quatuordecim; — Fenn. et Suec. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini albi Hisp. semilibram; — *Vm.* Ipecacuanhae partem unam, Vini Mader. triginta duas; — Li. Ipecacuanhae drachmas sex et Vini Hisp. uncias sex.

℞. Ipecacuanhae contus. uncias duas.
Spiritus ten. fluiduncias duodecim.
Aquae dest. . fluiduncias viginti.
Macera per dies quatuordecim et cola. (LonN. *Gr. Re.*)

LH. LP. Ipecacuanhae unciam unam, Vini albi libram unam, Alcoholis 25° uncias duas et sex (quatuor LP.) dies macerationis.

℞. Ipecacuanhae grossiuscule contusae . . . . . unciam unam.
Vini albi . . . . uncias octo.
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Digere in arenae balneo per tres dies, cola et residuo infunde
Vini albi . . . uncias quatuor.
Alcoholis (20°) . unciam unam.
Post duos dies digestionis cola et colaturas commixtas filtra. (An.)

Vinum emeticum s. Ipecacuanhae s. Ipecacuanhae compositum. (B*. LH. Wür. *Gr.*)

℞. Ipecacuanhae . . . uncias duas.
Corticis Aurantiorum semunciam.
Vini generosi lib. duas c. dimidia.
Infunde frigidè per dies aliquot et cola. (Wür.)

Gr. Vini Canarici libras duas, caet. ut antea.

℞. Vini Ipecacuanhae . uncias duas.
Tartari emetici . granum unum.
Gabe, eine halbe Unze alle 15 Minuten, in den Zwiſchenzeiten lauwarmes Waſſer getrunken, bis Erbrechen erfolgt. (LH.)

℞. Ipecacuanhae . uncias quatuor.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Alcoholis (32°) . . libras duas.
Digere in balneo arenae per hebdomadem et adde
Vini albi . . . . libras octo.
Anisi stellati . . unciam unam.
Sacchari albi . . uncias quatuor.
Post sex dies filtra. (B*.)

Eine Unze iſt gleich 18 Gran Ipecacuanha.

Mistura diaphoretica (Inf. for child) (*Gr*): Liquoris Ammoniae Acetatis uncias quatuor, Vini Antimonii tartarizati semunciam, Vini Ipecacuanhae drachmas duas, Syrupi Papaveris semunciam, Aquae destillatae uncias viginti, misce. 1 Dr. bis 1 Unze alle 3, 4 bis 6 Stun-

den. Bisweilen setzt man spir. aeth. nitr. oder tinct. op. hinzu.

Mistura diaphoretica anodyna (Inf. for child) (*Gr.*): Liquoris Ammoniae Acetatis uncias quatuor, Vini Antimonii tart., Vini Ipecacuanhae, sing. drachmas duas, Spiritus Aetheris nitrici semunciam, Syrupi Papaveris unciam, Extracti Conii grana viginti quatuor, Aquae destillatae uncias duodecim, misce 1 Drachme bis 1 Unze alle 4 bis 6 Stunden.

Syrupus Ipecacuanhae compositus. (*Pie.*)

℞. Ipecacuanhae contusae drachmas quinque et scrupulum unum.
Vini albi . . . . libram unam.
Infusis per horae quadrantem adde
Aquae bullientis . libras quatuor.
Salis vegetabilis . uncias quatuor.
Serpylli . . . . drachmas sex.
Corticis Aurantii amari drachmas quinque et scrupulum unum.
Infunde per horas quatuor, cola et adde
Syrupi Althaeae . . libras duas.
Aq. Flor. Aurant. unc. duodecim.

Syrupus de Desessarts. (*B. Br*. Ca. Pie.*)

℞. Ipecacuanh contus. unciam unam.
Sennae mundatae . uncias tres.
Vini albi . uncias viginti quatuor.
Macera per horas duas, decantha liquorem et filtratum sepone; residuo adde
Magnesiae sulphuricae uncias tres
Summit. Serpylli . unciam unam.
Florum Rhoeados uncias quatuor.
Aquae bullientis . . libras sex.
Stent in infusione per quatuor horas, tunc cola, filtra liquorem et adde
Aq. Florum Aurant. unc. viginti quatuor.
Sacch. albi contus. libr. quindecim et tincturam vinosam, misce et frigide solve.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Ipecacuanhae. (*Gr. T. Vm.*)

℞. Ipecacuanhae . . unciam unam.
Alcoholis 26° B. . uncias octo.
Digere per duodecim vel quindecim dies. (*T.*) Besonders zur Bereitung des syrup. alcoh. ipec.

Gr. Radicis uncias duas, Aquae Vitae octarium.

℞. Ipecacuanhae . . partem unam.
Aquae Vitae,
Vini Maderani, sing. partes quatuor.
Stent in infusione frigida per plures dies, quo facto expressa filtra. (*Vm.*)

Jéromel schlägt folgendes Verfahren vor:

℞. Ipecac. gris. gross. pulv. unc. quatuor.
Alcoholis (37° B.) . libram unam.
Digere in balneo vaporis per horas 24, caloris 34° ope, subinde agitando; refrigerata filtra; residuo infunde
Alcoholis (22°) . . libram unam.
Digere denuo in vaporis balneo per horas 24 et filtra. Residuo infunde.
Aquae fluv. filt. ferv. libram unam.
Continuetur infusio per horas 24; tunc, refrigefactis, quod subsedit, filtri ope separa; commisce tincturas et agitatas sepone, e quibus praecipitatum abundans quod subsedit post horas 12 separatur. E liquore filtrato libris duabus Alcoholis destillatione abstractis, liquidum quod in balneo aquae remansit, filtra et ei Alcoholis 36° B. unciam unam adde.

Die letztere Tinctur ist sehr stark, indem sie in zwei Unzen Flüssigkeit sechs und funfzig Gran Stoff aufgelöst enthält.

Syrupus Psychotriae emeticae s. Ipecacuanhae (alcoholicus). (An. Bel. *Gr. T.*)

℞. Rad. Ipecacuanh. contus. unciam unam.
Alcoholis 20° uncias novem c dim.
Macera radicem per septimanam in alcoholis dimidio; decantha et quod liquidi restat, pulpae infunde. Digere in aquae balneo, filtra et cum tinctura antea parata commisce. Tunc mixturae drachmis quinque Syrupi communis tepidi libram unam addendo fiat syrupus. (An.)

Bel. eandem formulam, sed Alcoholem 10°; — *Jéromel* syrupum parare proposuit commiscendo Tincturae Ipecacuanhae suae uncias duas cum Syrupi communis libra una et unciis duabus et, ut consistentia requisita obtineatur, per momentum coquendo; — *Gr.* Tincturae c. Spir. rect. paratae concentratiss. unciam, Syrupi simplicis libram; — *T.* Tincturae (*T.*) unciam unam, Syrupi simplicis 32° B. uncias triginta; misce agitando.

Tinctura Ipecacuanhae anisata. (*Bo. Ca. Ra*)

℞. Ipecacuanhae pulv. unciam unam.
Spiritus Anisi . uncias quatuor.
Digere. (*Ca.*) — Interdum Sacchari vel Syrupi Capilli Veneris pauxillum additur.

Ra. Ipecacuanhae unciam unam et duas Spiritus; — *Bo.* Spiritus Anisi et Sacchari, sing. uncias quatuor, Tartari emetici grana duodecim, Ipecacuanhae

unciam, Vini albi libras duodecim et quatuordecim dies infusionis.

Ein Brechmittel, welches Albert besonders bei Kindern empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Elixir sudorificum Willisii. (*Ca.*)

℞. Ipecacuanhae,
Bals. Tolutani, sing. . semunciam.
Florum Benzoës,
Opii purificati,
Croci, singulorum drachmas duas.
Olei es‹ent. Anisi drachmam unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis . . . . libras duas.

Reizend, schweißtreibend. — Gabe, eine bis zwei Drachmen. — Eine halbe Unze enthält zwei Gran Opium.

Iris.

In den Pharmacopöen werden mehrere Arten dieser Pflanzengattung aufgeführt:

1) *Iris Germanica*, *L.*; Deutscher, blauer Schwerdtel: Flambe vraie (*Gal.*); Blue flower de Luce (*Ang.*); Kosatec (*B.*); Sverdlilie (*D.*); Lirio de Alemania (*His.*); Blaawe iris (*Bel.*); Giglio celeste azurro (*I.*); Mieczyk ziele (*Pol.*); Lirio roxo dos montes (*Lus.*); Swaeras lilja (*Suec.*).

Ams. Br. Per. Ful. Gal. Gen. His. His3. Pal. Wir. Wür. *Be. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ (Triandria Digynia, L.; Irideae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 141. *Blackw.* t. 69. *Plenck* t. 34. Dict. de Sc. nat. cah. 5. *Zorn.* Ic. pl. t. 188.)

Man wendet die Wurzel (radix Ireos s. Iridis nostratis s. vulgaris s. Gladioli coerulei) an; sie ist lang, walzig, gegliedert, dick, fleischig, runzelig, außen bräunlich und faserig, innen weiß. Frisch ist ihr Geruch unangenehm, getrocknet schwach veilchenartig. Der Geschmack der frischen Wurzel ist scharf und beißend, wird aber bitter und widerlich, wenn sie getrocknet ist.

2) *Iris Pseudacorus*, *L.*; Ackermann, Wasserschwerdtwurzel, gelbe Teichlilie, falsche Acoruswurz, unächter Kalmusschwerdtel; Flambe bâtarde, Faux acore, Acore bâtard (*Gal.*); Yellow iris (*Ang.*); Svaerdlilie (*D.*); Acore bastardo (*His.*); Geel lisch (*Bel.*); Irida gialla (*I.*); Mieczyk zoity (*Pol.*); Svaerds lilja (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. G. Gr. M. Re. Sa. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Bull.* t. 137. *Blackw.* t. 261. *Plenck* t. 36. *Zorn* Ic. pl. t. 187.)

Man wendet die Wurzel (radix Acori palustris s. vulgaris s. Pseudacori s. Acori adulterini s. Ireos palustris s. Gladioli lutei) an; sie ist lang, etwas zusammengedrückt, daumenstark und stärker, außen schwärzlichbraun und runzlig, innen röthlich und schwammig. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen scharfen, styptischen Geschmack.

Beide Wurzeln sind purgirend.

3) *Iris foetidissima*, *L.*; Waldläuseskraut, stinkende Schwerdtlilie; Iris fétide, Glayeul puant (*Gal.*); Stinking gladwyn (*Ang.*).

Gal. *Gr. Re.*

♃ (Triandria Monogynia, L.; Irideae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 158.)

Man wendet die Wurzel (radix Xyridis s. Spathulae foetidae) an; sie besitzt einen unangenehmen Geruch und einen scharfen Geschmack.

4) *Iris Florentina*, *L.*; Florentinischer Schwerdtel, Violenwurzel, Veilchenwurz, Veilchenwurzel; Iris de Florence (*Gal.*); Florentine orris (*Ang.*); Ussul ussosunul assman junie, Irsa (*Ar.*); Fialowy koren (*B.*); Fiolrod (*D.*); Lirio de Florencia (*His.*); Irsa (*Hin.*); Florentynse iris (*Bel.*); Irios, Giaggiolo, Giglio celeste, Iride di Firenze (*I.*); Korzen fiolkowy (*Pol.*); Irio de Florença, Lirio florentino (*Lus.*); Fiolrot (*Suec.*).

A. Am Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM Gen Ham. Han HassP. His. His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sa. Sp.* Z.

♃ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Blackw.* t. 414. *Plenck* t. 35. Fl. méd. IV. 204.)

Die Wurzel (radix Ireos s. Iridis Florentinae), welche angewendet wird, ist dick, knotig, derb, außen bräunlich, innen weiß. Sie hat einen scharfen, bittern und anhaltenden Geschmack. Man verkauft sie gemeiniglich, nachdem man die Oberhaut abgezogen, in walzigen, abgeplatteten, höckrigen Stücken von rosenröthlichweißer Farbe, welche fast ohne Geschmack sind, aber einen sehr angenehmen Veilchengeruch besitzen.

Sie enthält, nach Vogel, Schleimharz, einen braunen Extractivstoff, Satzmehl, ein fettes und ein flüchtiges Oel, Pflanzenfaser ꝛc. Toreri hat Emetin darin entdeckt.

Frisch, purgirend, auch gilt sie als einschneidendes und als Niesemittel. Man verordnet sie bisweilen bei Catarrhen. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel; des Saftes, eine bis zwei Unzen in vier Unzen Wein.

5) *Iris versicolor*, *L.*; bunte Schwerdts-

lilie; Iris variée (*Gal.*); Blue flag (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

4 Eine Pflanze Nordamerica's. (Hort. Elth. t. 155. f. 187.)

Die Wurzel, welche angewendet wird, ist faserig.

Iris tuberosa (*Gr*): Wurzel einschneidend, purgirend, ℈β — ʒβ; von Einigen für Hermodactyli gehalten.

Species diaereos. (An. B*. Br. Pal. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Radicis Iridis Florentinae,
Sacchari crystallisati albi,
Specierum Diatragacanthae frigidarum, singulorum drachmas sex.
Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

B*. Iridis semunciam, Specierum et Sacchari, sing. drachmas duas; — *Vm.* Iridis et Specierum, sing. partem unam et Sacchari unam cum dimidia; — An. Iridis partes duas, G. Tragac. et Sacchari, sing. unam; — Han. Iridis semunciam, G. Tragacanthae et Sacchari, singulorum drachmas duas.

Pulvis puerorum citrinus. (Br.)

℞. Rad. Iridis Florent. uncias octo.
— Liquiritiae . drachmas sex.
Anisi,
Foeniculi, sing. . drachmas tres.
Croci drachmas duas cum dimidia.
Sacchari . pondus toti aequale.
Fiat pulvis.

Species pro odorumento s. odoriferae. (*Sp.*)

℞. Flor. rec. Rosar. rubr. semunciam.
— Lavandulae drachmas duas c. dim.
Ligni Rhodii . . . semunciam.
Radicis Iridis Florentinae uncias duas.
Herb. rec. Basilici,
— — Calaminthae montanae,
— — Majoranae, sing. drachmas duas.
— — Menthae pip. scrupulos quatuor.
— — Origani,
— — Pulegii,
— — Salviae,
— — Saturejae,
Corticis Aurantii,
— Citri, sing. drachmas duas.
Cinnamomi,
Summitatum Rorismarini,
Caryophyllorum,
Macidis, singulorum drachmas tres.
Foliorum Lauri . . semunciam.
Moschi c. Sacch. pauxillo triti grana duo.
Ambrae gris. itidem tritae grana quatuor.
Fiat pulvis grossus.

Species cephalicae pro cucuphis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Rad. Cyperi rotundi,
— Iridis Flor., sing. semunciam.
Flor. Lavandulae.
— Rorismarini,
— Rosarum, sing. drachmas sex.
Ligni Rhodii,
— Santali citrini,
— Aloës, sing. . semunciam.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Succini flavi,
Styracis, singulorum drachmas tres.
Concisa contusaque misce. (Br. Wir.)

℞. Rad. Iridis Flor. . . uncias tres.
Herb. Lavandulae,
— Majoranae, sing. unciam unam.
Ligni Rhodii,
— Santali citr., sing. drachmas sex.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Corticis Aurantii . . semunciam.
— Citri . . sesquiunciam.
Caryophyllorum drachmas duas c. dim.
Benzoës,
Mastichis,
Storacis Calamita,
Succini flavi, sing. . semunciam.
Concisa contusaque misce. (*Sp.*)

℞. Rad. Iridis Flor. . sesquiunciam.
Herb Betonicae,
— Majoranae,
— Rorismar., sing. semunciam.
— Salviae . drachmas duas.
Flor. Rosar., rubr. unciam unam.
— Lavandulae,
— Cheiri, sing. drachmas duas.
Storacis in granis,
Succini rasi, sing. drachmas tres.
Nardi Indicae,
Santali citrini,
Ligni Rhod., sing. drachmas duas.
Caryophyllorum,
Cyperi rotundi,
Cinnamomi,
Benzoës, sing. scrupulos quatuor.
Fiat pulvis. (Pal.)

Infusum Iridis versicoloris (*Gr.*) e Floribus cum Aqua bulliente. Reagens.

Extractum Iridis Florentinae. (Sar. Wir.)

℞. Rad Iridis Flor. . partem unam.
Aquae bullientis . . partes sex.
Infusionem post tres dies coque parumper, cola exprimendo et liquorem

vaporando ad extracti consist. consume. (Wir.)

Sar Infusum pro tertia parte consumere et tunc colare et evaporare.

Faecula Ireos s. Iridis. (Gal. Gen. Pal. *Re. T.*)

℞. Radicis recentis Iridis quantum vis. Raspa et pulpam in saccum e tela confectum inclusam prelo subjice; succum Aquae pauxillo addito, sepone, quo facto, parte limpida decanthata, faecula blando calore siccata pulveretur.

Confectio Iridis. (*Vm.*)

℞. Rad. Iridis Flor. . partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Contere.

Conditum Iridis saccharatum s. Marmelada Iridis. (*Sw**).

℞. Rad. Iridis Flor. . libram unam.
Kali subcarbonici unciam unam.
Scillae contusae drachmam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Macera blando igne donec mollefiant; trajice per cribrum, residuo novam Aquam infunde, macera et iterum cola; et hoc repete donec omnia cribrum transierint. Adde deinde
Sacchari,
Syrupi Sacchari, sing. libras tres.
Evaporatis ad gelatinae spissae consistentiam denique adde
Extracti Martis pomati uncias duas.
Tonisch, Bruſtmittel, bei chroniſchen Lungencatarrhen. — Gabe, vier, fünf oder ſechs Kaffeelöffel täglich.

Rotulae Diaereos, Tabellae Iridis Florentinae compositae, Trochisci bechici albi s. Iridis Florentinae.. (An. Br. Wir. *Gr.*)

℞. Specierum Diaereos unciam unam.
Sacchari albi in Aqua Viol. dissol. et ad glob. cocti
uncias duodecim.
Fiant trochisci. (Br. Wir.)

℞. Radicis Iridis Florentinae
sesquiunciam.
Amyli . uncias duas cum dimidia.
Sacchari albi . . uncias viginti.
Mucilag. G. Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci. (An.)

℞. Radicis Iridis Flor.,
Gummi Arab., sing. drachmas duas.
Rad. Glycyrrhizae . drachmas sex.
Sacchari . libram et uncias octo.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s. ut fiant trochisci. (*Gr.*)

Pasta Iridis Florentinae. (*Vm.*)

℞. Rad. Iridis Flor. . partem unam.
Aquae frigidae . partes sedecim.
Post horarum aliquot infusionem cola; colaturam calefac cum
Gummi Arabici . partibus viginti, et solutioni adde
Sacchari cryst. partes quindecim.
Clarificata Albuminis ope cola et ad gelatinae consist. evaporata marmori oleo illito infunde.

Aqua violacea. (*Sp.*)

℞. Rad. Iridis Flor. uncias quatuor.
Alcoholis . uncias triginta duas.
Stent in infusione per dies quatuordecim.
Schönheitsmittel.
Oleum Iridis destillatum (Essence des violettes) a *Gr. Re.* indicatur.

Oleum Iridis s. Ireos s. irinum s. irinum compositum. (Br. His. His3 Pal. Sar. *T.*)

℞. Rad. et Flor. Iridis
partem unam c. dim.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere in balneo aquae per duos dies, refrigerata exprime et macerationem cum nova Herba repete. (Sar.)

T. Macerare Florum uncias quindecim in Olei Oliv. libris quinque soli exposita per tres vel quatuor dies filtrare hocque cum simili Florum quantitate bis repetere, supremam macerationem per mensem circiter protrahendo et oleum aliquot dierum sepositione clarefactum decanthare.

℞. Radicis et Florum Iridis,
Olei Olivarum, sing. . partes aeq.
Coque blando igne ad humidi usque consumptionem. (Pal.)

℞. Radicis recentis Iridis sesquilibram.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Digere per horas viginti quatuor, coque deinde ad humidi consumpt., cola cum expressione, colaturae infunde Florum Iridis semunciam, digere per horas duodecim, coque ad humidi consumptionem et cola. (His. His3.)

℞. Succi Radicis et Florum Iridis,
Olei Olivarum, sing. . partes aeq.
Coque ad consumptionem humidi et exprime. (Br.)

Unguentum pectorale. (Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Amygdal. dulc.
uncias quatuor.
— Chamomillae,
— Violarum, sing. uncias tres.
Butyri . . . . . uncias sex.
Adipis Gallinarum,
— Anatum, sing. uncias duas.
Cerae albae . . . uncias tres.
Massae liquatae adde

Pulv. Iridis Flor. drachmas duas.
— Croci . . semidrachmam.
Misce bene. — Ehedem Kindern bei mühſamem Huſten und Athmen empfohlen.

Acetum aromaticum. (Fer. *T.*)

℞. Aceti albi . . . . . libras sex.
Radicis Iridis,
Petal. Rosarum,
— Dianthi, sing. unciam unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Corticis Aurantii,
Storacis,
Benzoës, sing. . drachmas duas.
Majoranae,
Menthae,
Thymi,
Dictamni Cret., sing. unciam unam.
Post digestionem per mensem fiat moderato calore destillatio.

Esprit de violettes (*Gr.*): Radicis Iridis Florent. uncias quatuor, Spir. Vin. rect. octar. duos.

Essence of violets (*Gr. Re.*): Radicis uncias duas, Spir. Vin. rect. octo.

Essence of jasmine (*Gr. Re.*): Essent. Viol. unciam, Essent. Bergam. drachmam.

Spirit of jasmine (*Gr.*): Ess Jasmin. semidrachmam, Spirit. rectif. uncias octo.

Essence of neroli (*Gr. Re.*): Cort. Aurant. uncias sex, Irid. Flor. drachmas duas, Ambr. gris. grana tria vel quatuor, Spir. rectif. uncias octo.

Greenough's tincture for the teeth (*Gr. Re.*): Amygd. amar. uncias duas, Lign. Brasil., Bacc. Cass, sing. semunciam, Irid. Florent. drachmas duas, Superoxalat. Potass., Alum. Coccin., sing. drachmam, Spir. Cochl. semunciam, Spir. Vin. octarios duos, digere per dies septem et exprime.

Ruspini's tincture for the teeth (*Gr. Re.*): Irid. Flor. uncias octo, Caryophyll. unam, Ess. Ambr. gris. tantid. (Amb. gris. scrupulum *Re.*), Spir. rect. octarios duos.

Isatis.

Isatis tinctoria, *L.*; Waid, Scharte, Färberwaid; Pastel (*Gal.*); Woad (*Ang.*); Wede (*D.*); Pastel (*His. Lus.*); Verfwede (*Bel.*); Guado (*I.*); Linilo (*Pol.*); Vejde (*Suec.*).

Br. Gal. *Be. G. Gr. Re.*

♂ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 246. *Schk.* t. 188. *Lam.* t. 554. *Zorn* Ic. pl. t. 191. *Bert.* Bild. II. 10. f. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Glasti s. Isatis) an; es beſteht aus glatten, etwas blaugrünen Blättern, von denen die Wurzelblätter lanzettförmig und geſtielt, die Stängelblätter ſitzend, halbumfaſſend und am Grunde in zwei Anhänge verlängert ſind. Es hat einen ſcharfen und etwas bittern Geſchmack.

Man zieht daraus einen dem Indigo ähnlichen Stoff, Indigotin (Indigotinum s. Indigotina, Glastum) oder Iſatin (Isatina s. Isatinum).

J.

Jacea.

In den Pharmacopöen kommen zwei Pflanzen dieſes Namens in Erwähnung:

1) *Jacea nigra*, *Moc.*; gemeine ſchwarze Flockenblume; Jacée (*Gal.*); Common knapweed (*Ang.*); Knopurt (*D.*); Knopkruid (*Bel.*); Knapper (*Suec.*); Erba trinitas, Suocera, Nuora, Fiore del pensiero (*I.*).

Gal. Gen. *Gr.*

4 (Syngenesia Polygamia Frustranea, L.; Synantherae. *Cass.*) Eine in Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 519.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Jaceae nigrae s. Centaureae Jaceae) iſt holzig und hat einen ſchwach adſtringirenden Geſchmack. — Das Kraut beſteht aus einem äſtigen, harten, ſteifen, rauhen, faſt glatten Stängel, deſſen untere Blätter gezähnt, die obern ſitzend, eirundlanzettig und gewöhnlich ganz ſind. Es hat einen ſüßlich bittern Geſchmack.

Schwach adſtringend und toniſch.

2) *Viola tricolor*, *L.*; Dreifaltigkeitsblume, Stiefmütterchen, Freiſamkraut; Pensée (*Gal.*); Three coloured violet (*Ang.*); Stedmodersblomst (*D.*); Pensamientos (*His.*); Drickleurige Viool (*Bel.*); Fiore del pensiero (*I.*); Fiolek potrogny, Brat zsiostra (*Pol.*); Amor perfetto (*Lus.*); Wdowki (*R.*); Styfmorsblomster (*Suec.*)

A. Ams. An B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

⊙ (Syngenesia Monogamia, *L.*; Violaceae, *J.*) Eine in ganz Europa sich findende Pflanze. (*Hayne* III. 4. 5. *Blackw.* t. 44. *Plenck* t. 641. Düss. off. Pfl. II. 8. *Zorn* Ic. pl. t. 290)

Man wendet das Kraut (herba Jaceae s. Violae tricoloris s. Trinitatis) an; es besteht aus einem ästigen, dreikantigen Stängel mit abwechselnden, eirunden, gezähnten, von fiederspaltigen Nebenblättern begleiteten Blättern. Es hat einen etwas scharfen Geschmack.

Reizend, blutreinigend, harntreibend, besonders gegen Flechten und Milchgrind empfohlen.

Extractum Jaceae. (Fenn.)

℞. Herbae Jaceae . . partem unam.
Aquae bullientis . . partes sex.
Coque per horae quadrantem, cola, exprime; residuum cum nova Aqua coctum itidem coquatur; liquores commixti in balneo aquae evaporent.

HassP. inter praeparata nominat sed parationem non communicat.

Unguentum Jaceae.

℞. Extracti Jaceae,
Axungiae praep., sing. part. aeq.

Von Stein mit Nutzen bei verschiedenen Hautkrankheiten.

Decoctum Herbae Jaceae s. Violae tricoloris cum Aqua. (B⁶. *Fi.*)

℞. Herbae Jaceae . drachmas sex.
Aquae fontanae quantum sufficit ut coquendo unciae sex colaturae obtineantur. — Gegen Milchschorf, Flechten und Kopfgrind. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Fi. Herb. recentis drachmam unam vel duas (siccae drachmam), Aquae q. s. ut decocti libra una obtineatur.

Decoctum Jaceae s. Herbae Violae tricoloris cum lacte. (B⁶. *Au. Fi.*)

℞. Herbae Jaceae . . semunciam.
Lactis vaccini . . libram unam.
Coque leniter et cola. — In denselben Fällen wie das vorhergehende empfohlen. — Die vorgeschriebene Gabe Morgens und Abends zu wiederholen.

Fi. ut decoctum aquorum, loco aquae Lac sumendo.

Infusum Herbae Jaceae. (*Au.*)

℞. Herbae Jaceae . drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias duas.
Infusione peracta colaturae adde
Vini stibiati . scrupulum unum.
Syrupi Althaeae . drachmas duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen oder zwei Kaffeelöffel.

℞. Herbae Jaceae,
Sacch. Lactis, sing. drachmas duas.
Sulphuris praecipitati,
Magnes. subcarb., sing.
semidrachmam.
Gabe, einen Scrupel alle zwei Stunden.

Mixtura in haematuria chronica, Tisana leniens. (*B.*)

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti libra una obtineatur. Sub finem adde
Florum Jaceae . . semunciam.
Stent in infusione per tempus aliquot, colaturae infunde
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Jalapa.

Convolvulus Jalapa, L.; Jalape, Jalappwurzel; Jalap (*Gal.*); Jalapa (*Ang.*); Galapa (*B.*); Jalap (*D.*); Jalappe (*Bel.*); Scialappa, Sciarappa, Gialappa, Jalappa (*I.*); Jalapa (*His. Lus. Succ.*); Jalopy (*Pol.*).

Am. Ams. An B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Z.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's. (Ann. du Mus. II. 40. 41. *Plenck* t. 94. Berl. Jahrb. XXV. Fl. méd. IV. 207. *Bert.* Bild. III. 18. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Jalappae s Jalappii s. Gialappae s. Chelapae s. Rhabarbari nigri s. Gelappii s. Mechoacannae nigrae) an; sie ist dick, lang, derb, in runden oder dicken, sehr schweren, runzlichen Stücken, außen schwärzlichbraun, inwendig aschgrau, mit concentrischen Linien, mit glattem, welligem, überall mit glänzenden Puncten bestreutem Bruche. Das Pulver ist bräunlichgelb; der Geruch eigenthümlich, der Geschmack scharf, brißend und etwas widerlich.

Sie enthält, außer Gummi, Harz, Satzmehl ꝛc. einen eigenthümlichen Stoff, die Jalapine (Jalapina), in welchem Hume den Grund ihrer Wirkung sucht.

Gabe des Pulvers, ein oder zwei Scrupel.

§. I. Präparate, welche die Jalape in Substanz enthalten.

Pulvis Jalapae. (*Re.*)

Radicem in pulverem convertendo.
Pulvis laxans s. purgans, *Pulvis*

laxans cum Sale s. cum Mercurio, Pulvis laxativus vegetabilis, Pulvis Jalappae s. Jalapae compositus s. salinus s. tartaricus s. hydrargyratus, Pulvis Radicis Jalappae cum Natro s. Kali sulphurico s. cum Hydrargyro muriatico miti, Species Diajalappae, Specificum jalappinum. (Am. B*. BorC. Br. D. DD. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. His. His3. Li. LP. Pal. RC. Suec. Wir. Wür. WW. *Au. C. Ca. E. Gr. Huf. Pie. Ra. Re. Sa. Sp. Sw.*

1) Ohne ein Salz.

℞. Pulveris Jalapae . uncias duas.
Sacchari albi . . uncias unam.
Misce diu triturando. (Wür.) — Gabe, eine halbe bis eine ganze Drachme.

℞. Jalapae . . . . . grana duo.
Rhei,
Cinnamomi, sing. granum unum.
Misce. (*Ra.*) — Für ein Kind.

℞. Rad. Jalapae . grana quindecim.
— Ipecacuanh. grana quinque.
Ol. Cinnamomi . . guttas duas.
Auf eine Gabe. (*Gr.*)

℞. Jalapae . . . drachmam unam.
Scammonii . . scrupulum unum.
Ipecacuanhae . . grana decem.
Fiat pulvis in partes granorum octo dividendus. (*Pie.*) — Dumas verschrieb es gegen Verschleimung.

℞. Rad. Jalapae partes viginti quatuor.
— Mechoacann. partes duodecim.
— Rhei,
Cinnamomi, sing. . partes octo.
Gummi Guttae . . partes tres.
Fol. sicc. Soldanellae partes sex.
Anisi . . . . . partes duodecim.
Fiat pulvis. (Gal.)

2) Mit Salpeter.

℞. Jalapae pulveratae unciam unam.
Nitri depurati . . semunciam.
Misce. (Gen.)

Pulvis ad ulcera crurum (*Sw.*). Jalapae drachmam unam, Nitri tres; — eine halbe Drachme zwei Mal täglich.

3) Mit einem Eisensalz.

℞. Jalapae,
Millepedum praeparatarum,
Croci Mart. aper., sing.
grana sedecim.
Auf eine Gabe. (*Pie.*)

4) Mit Weinsteinkali.

℞. Jalapae . . . semidrachmam.
Cremoris Tartari scrupulum unum.
Auf eine Gabe. (Ful.)

Am. Ed. Suec. *C. E. Gr. Re.* et *Sw.* Jalapae partem unam et duas Cremor. Tart.; — *Gr.* Cremoris partes tres; — *Sp.* Resinae Jalapae partem unam c. dimid., Cremor. Tart. partes duas c. dimid.; — LP. RC. et *Au.* Jalapae et Cremoris partes aequales.

℞. Jalapae,
Zingiberis,
Cremoris Tart., sing. grana decem.
Auf eine Gabe. (*Sw.*)

℞. Rad. Jalapae uncias duas c. dimid.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Olei Cinnamomi drachmam unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Elaeosacch. Foenic., sing.
part. aeq.
Fiat pulvis. (*Huf.*)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari,
Magnesiae purae, sing. part. aeq.
Misce diu triturando. (His. His3)

℞. Jalapae . . . drachmam unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Divide in partes sex. (*E.*)

℞. Jalapae . . . scrupulum unum.
Rhei . . . . scrupulos duos.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Ol. ess. Cinnamomi guttam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Jalapae,
Cremoris Tartari, sing.
uncias duas.
Resinae Jalapae drachmas tres et
grana duodecim.
Scammonii drachmas duas c. dim.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Misce. (B*. Br.)

℞. Jalapae . . . . uncias duas.
Tartari solubilis . . semunciam.
Sacchari . uncias quatuordecim.
Olei ess. Aurantii drachmas duas.
Elaeosaccharum para cui sal et jalapa admisceantur. (*Ca.*) — Gabe, zwei oder drei Drachmen in einem Nösel (chopine) gekochten Pommeranzenwasser — Ein sehr angenehmes, unter dem Namen sucre orangé purgatif (Saccharum aurantiacum purgans) bekanntes Purgirmittel.

5) Mit schwefelsaurem Kali oder Natron.

℞. Jalapae . . . . . partes duas.
Kali sulphurici . partem unam.
Misce. (D.) — Gabe, eine halbe Drachme.

RC. et *Sw.* Jalapae et Sulphatis partes aeq.; — DD. loco Kali Natron sulphuricum.

℞. Radicis Jalapae . semidrachmam.
Kali sulphurici . semiscrupulum,
Olei Foeniculi . guttam unam.
Fiat pulvis. (BorC. WW. *Au.*) — Auf ein oder zwei Mal.

℞. Radicis Jalapae scrupulos duos.
Resinae Jalapae . grana quatuor.
Kali sulphurici,
Sacchari albi, sing. grana decem.
Fiant doses quatuor. (*Sa.*)

℞. Radicis Jalapae . . uncias duas.
Ipecacuanhae scrupulos quatuor.
Kali sulphurici . . semunciam.
Gabe, zwei Scrupel für einen Erwachsenen. (Li.)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonii, sing. partem unam.
Kali sulphurici . . partes duas.
Fiat pulvis. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae . sesquiunciam.
Res. Jalapae,
— Scammonii, sing.
drachmas tres.
Cremoris Tartari,
Kali sulphur., sing. unciam unam.
Olei ess. Cinnamomi scrup. unum.
Resinis cum Amygdalarum dulc. drachmis duabus contritis adde radicem, sales et denique oleum. (Wir.) — Gabe, ein halber bis ganzer Scrupel bis eine halbe Drachme.

6) Mit schwefelsaurer Magnesia.

℞. Radicis Jalapae,
Magnes. sulph., sing.
semidrachmam.
Olei ess. Foeniculi . guttas duas.
Fiat pulvis. (B^a.)

℞. Rad. Jalapae,
— Gentianae, sing.
unciam unam.
— Zingiberis . drachmas duas.
Magnesiae sulphuricae uncias duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

Pulvis anthelminticus. (LP. *Au. Sw.*)

℞. Seminum Tanaceti,
Radicis Valerianae,
— Jalapae, sing. semiscrupulum.
Misce. (LP.) — Interdum Mercurii dulcis quantitas requisita addi convenit. — Gabe, auf ein oder zwei Mal den Tag über, nach Alter und Umständen.

℞. Radicis Jalapae,
— Valerianae,
Seminis Cinae, sing. unciam unam.
Gabe, Morgens eine halbe bis ganze Drachme. (*Sw.*)

℞. Seminum Tanaceti . grana sex.
Ferri sulphurici . . grana tria.
Radicis Jalapae semidrachmam.
Morgens in Wasser zu nehmen. (*Au.*)

Pulvis febrifugus et purgans. (*Ca.*)

℞. Jalapae . . . . . uncias duas.
Cremor. Tart.
drachmas quatuordecim.
Kali sulphurici,
Succi Allii, sing. unciam unam.
Chinae . . . . drachmas sex.
Scammonii . . . . semunciam.
Tartari natronati drachmas tres.
— emetici . drachmas duas.
Nitri . . . drachmam unam.
Croci,
G. Guttae, sing. grana duodecim.
Cinnabaris . . . . grana sex.
Gabe, achtzehen Gran bis eine halbe Drachme bei Wechselfieber und Wurmbeschwerden.

Boli purgantes s. cathartici, hydragogi s. resolventes. (GalM. LH. *B. Pie. Sa. Sw.*)

℞. Jalapae pulveratae partes decem.
Scammonii . . . partes quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce bene. (GalM.)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
— Zingiberis . . grana sex.
Syrupi Rosarum solutivi . q. s.
Addi potest, si necesse, Cremoris Tartari scrupulus unus vel Mercurii dulcis grana quinque. (*Sa.*)

℞. Jalapae pulveratae grana decem.
Electuarii lenit. scrupulos quatuor.
Adde si necesse est, Mercurii dulcis grana decem. (*Sa.*)

℞. Jalapae . . . . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat bolus unus. (*Sw.*)

LH. Jalapae scrupulum unum, Calomelanos grana duo; Syrupi communis quantum sufficit ut fiat bolus unus. — Gabe, auf ein Mal.

℞. Radicis Jalapae,
Kali sulph., sing. semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. (*Sm.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Zingiberis,
Gummi Guttae,
Cremoris Tartari, singulorum grana quinque ad decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sw.*)

℞. Jalapae pulveratae grana duodecim.
Gummi Guttae,
Mercurii dulcis, sing. grana sex.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sw.*)

℞. Radicis Jalapae semidrachmam.
Resinae Scammonii,
Gummi Guttae,
Salis Absinthii, sing. . grana sex.
Syrupi Rhamni quantum sufficit ut fiant boli tres. (*Pie.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Sacchari, sing. grana viginti quatuor.

Pulveris Rhei . . grana triginta.
Syrupi de Cichorio comp. . q. s.
Fiant boli duodecim. (*B.*)

Pilulae laxantes s. purgantes. (Ful. Ham. *T.*)

℞. Pulveris Jalapae drachmam unam.
— Aloës,
Merc. dulc., sing. semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pil. granorum duorum. (Ham.)

T. Rhei, Aloës, Jalapae, sing. pulv. partes aeq., fiant cum Syrupi simpl. q. s. pilulae.

℞. Saponis Alicantini uncias duas.
Extracti Aloës gummosi,
Pulveris Rhei,
— Jalapae, sing. unciam unam.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Misce. (Ful.)
Gabe, zehen, zwanzig bis dreißig Gran (bis eine halbe Drachme *T.*)

Panes saccharati purgantes. (*Bo. Ca. Pie. Sp.*)

℞. Jalapae pulv. drachmas viginti.
Farinae . . . . . uncias duas.
Ova . . . . . no. 24.
Sacchari . . . . libram unam.
Fiant panes sexaginta. (*Ca. Pie.*)

Bo. Jalapae drachmas duas, Sacchari libram, Anisi drachmas duas, Farinae uncias octo et Vitellos Ovorum no. 8.; — *Sp.* Farinae, Sacchari, sing. uncias quatuor, Vitellos Ovorum no. 3 et Resinae Jalapae q. placet.

Tragemata Radicis Jalapae. (Pm.)

℞. Granulorum e Saccharo et Amylo parat. . . . . uncias duas.
Sacchari albi . . . libras sex.
Amyli subtiliter pulverati libram unam.
Pulveris Jalapae . . uncias duas.
Aquae fontis . . quantum satis.
Saccharo in julapium debitae consistentiae converso, tragemata confice.

Trochisci anthelmintici. (Ful.)

℞. Pulv. Jalapae . . unciam unam.
— Flor. Tanaceti sesquiunciam.
— Ferri sulphurici semunciam.
— Sacchari albi . uncias sex.
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.
Fiant trochisci ducenti quadraginta.
— Gabe, ein, zwei Stück oder mehr, nach dem Alter.

Morsuli s. Trochisci solventes s. solutivi. (Fer.)

℞. Pulveris Jalapae . uncias duas.
— Scammonii unciam unam.
Chocolatae . uncias quindecim.
Fiant morsuli septuaginta duo. — Ein Stück auf ein Mal.

Electuarium hydragogum s. purgans. (Br. *Ca. E. Sm.*)

℞. Jalapae pulveratae,
Kali sulphur., sing. scrupulos duos.
Resin. Scammonii scrup. unum.
Gummi Guttae . grana decem.
Mellis . . . quantum sufficit.
Misce. — Gabe, alle zwei Stunden einen Kaffeelöffel. (*Ca.*) — Gegen Bandwurm, nachdem man drei Tage vorher das mit Zinn bereitete electuarium vermifugum Kuttingeri zu geben angefangen hat.

℞. Pulveris Jalapae . semunciam.
— Zingiberis scrupulos quatuor.
— Kali sulphur. drachmas tres.
Roob Sambuci rubri uncias duas.
Oxymellis Colchici . uncias tres.
Misce. (Ful.) — Gabe, zwei bis sechs Drachmen.

℞. Pulv. Jalapae,
— Salis de Seign., sing. drachmam.
Conservae Nasturtii uncias quatuor.
Syrupi Fumariae . uncias duas.
Misce. (*Sm.*) — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich zwei oder drei Mal.

℞. Jalapae pulv. . scrupulum unum.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Syrupi Althaeae quantum sufficit.
Misce. (*Sm.*) — Gabe, Morgens zweimal einen Kaffeelöffel voll.

℞. Cremoris Tartari,
Jalapae pulveratae,
Nitri, sing. . . . . semunciam.
Confectionis Sennae unciam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (*E.*) — Gabe, haselnußgroß, vier oder fünf Mal täglich.

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Roob Juniperi,
— Ebuli, sing. . uncias duas.
Syrupi Rhamni quantum sufficit.
Misce. (*Ca.*) — Gabe, eine Drachme in kurzen Zwischenräumen, bis reichliche Ausleerung erfolgt ist.

℞. Roob Juniperi,
Pulp. Tamarind., sing. uncias quatuor.
Radicis Jalapae . sesquiunciam.
Scammonii electi unciam unam.
Cinnamomi,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Sacchari clarificati uncias decem.
Misce. (Br.) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium s. Conditum ad vermes s.

vermifugum s. anthelminticum, Opiatum vermifugum. (Ful. GalF. GalH. LP. *Ca. Huf. Sa. Vm.*)

℞. Pulveris Jalapae,
— Valerianae,
Kali sulph., sing.
drachmamunam.
Oxymellis scillitici . uncias tres.
Misce. (Ful. *Sa.*) — Gabe, zwei bis ſechs Drachmen.

GalF. GalH. et *Ca.* loco sulphatis Kali tartaricum adhibent.

℞. Jalapae,
Rhei, sing. . . . partem unam.
Valerianae . . . . partes duas.
Kali sulphurici . partes quatuor.
Santolinae . . . . partes octo.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Misce sedulò (*Vm.*)

℞. Pulv. Valerianae sesquidrachmam.
— Jalapae . drachmam unam.
— Seminis Cinae semunciam.
— Tartari tart. drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (*Huf.*)

℞. Pulveris anthelmintici (LP.)
scrupulum unum cum dimidio.
Syrupi Cichorii compositi
quantum satis
ad consistentiam electuarii. (LP.)

Confectio Anisi laxativa. (Wir. *Sp.*)

℞. Anisi . . . . . uncias tres.

Calefac in vase amplo, cochlearia aliquot Sacchari ad glob. cocti adspergendo; adde tunc sensim
Pulv. Resin. Jalapae
drachm. tres c. dim.

Agita donec massa siccata et Sacchari quantitas unciarum viginti quatuor sit consumpta. (*Sp.*)

Wir. Anisi sesquiunciam, Sacchari libram et mixturam e Jalapae, Mechoacannae albae, sing. pulv. semuncia, Diagrydii sulphurati, Cinnamomi, sing. pulv. drachma una.

Ehedem ſehr ſtark in Gebrauch, beſonders bei Kindern; heutzutage wendet man es nur noch ſehr wenig an.

Opiatum stimulans. (*Pie.*)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
G. Ammon. pulv., sing.
unciam unam.
Milleped. praep. . drachmas sex.
Extracti Aloës . . drachmas tres.
Pulveris Jalapae . semunciam.
— Castorei,
— Croci, sing. drachmas tres.
Extracti Gentianae . . . . q. s.

Gabe, Morgens eine Unze, gegen Schwäche und Schwindel.

Opiatum antiherpeticum. (*Pie.*)

℞. Limaturae Chalybis porphyrisatae,
Myrrhae,
G. Ammoniaci, sing.
drachmas sex.
Extr. Helleb. nigri drachmas duas.
Jalapae pulveratae . semunciam.
Milleped. praep.
drachmas quinque.
Syrupi Fumariae quantum sufficit.

Zehen Tage lang, Morgens nüchtern zu nehmen.

Emulsio purgans. (GalM.)

℞. Amygdal. dulc. mund. . no. 12.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Emulsioni adde
Jalapae pulveratae grana viginti.

Potio purgans. (*Huf. Ra. Sm.*)

℞. Pulveris Jalapae . semidrachmam.
Decocti Cichorii . uncias quatuor.
Misce. (*Ra.*)

Huf. Jalapae grana triginta sex et Decocti Prunor. siccat. uncias quatuor.

℞. Pulveris Jalapae . grana trginta.
Natri sulphurici
drachmas quinque.
Syrupi Mellis . . unciam unam.
Decocti Cichorii . . uncias sex.
Misce. (*Ra.*)

Potio purgans major. (GalM.)

℞. Sennae . . . . drachmas duas.
Natri sulphurici drachmas quatuor.
Aquae . . . . . uncias sex.

Coque per sexagesimas aliquot, cola et adde
Pulv. Jalap. comp. (GalM.)
grana duo ad quatuor.

Mixtura vermifuga et purgans. (*Sm.*)

℞. Tartari natronati,
Jalapae pulveratae,
Valer. sylv., sing. . drachmam.
Oxymellis scillitici uncias quatuor.

Gabe, für Erwachſene Morgens um ſieben und um neun Uhr einen Eßlöffel voll.

§. II. Präparate, welche das wirkſame Princip der Jalappe ohne das zu ſeiner Ausziehung angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Jalapae gummosum. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Jalapae gross. pulv.
partes duodecim.

Macera jalapam ut mollefiat in Aquae q. s., tunc cum gummi trituratam bis

in emulsionem tere; residuo bis cum Aquae partibus septuaginta duabus cocto, decocta bullientia cola; tunc bullitione ad partem octavam voluminis redacta commisce cum emulsione et totum, blando igne et continua agitatione, vaporando ad extracti consistentiam redige.

Extractum Jalapae resinosum. (*Vm.*)

℞. Jalapae contus. et a pulvere subtili separatae . . quantum vis.

Aquam adsperge donec mollis sit redita, tunc Aqua addita cola exprimendo, quod repetatur, quamdiu residuum in emulsionem verti potest; liquores deinde commixti ad extracti consistentiam evaporent.

Extractum (*Radicis*) *Jalapae aquosum*, (Du. *Gr. Sw. Vm.*)

℞. Liquoris a depurat. Jalap. q. vis. Albuminis ope clarificatum ad extracti spissitudinem consume. (*Sw. Vm.*)

℞. Rad. Jalapae gross. contus. et a pulvere separatae . . . q. vis.

Infunde in vase amplo, Aquae frigidae duplum circiter pondus addendo, per duos vel tres dies in maceratione relinque, decantha absque agitatione et liquorem filtratum ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

Extractum Jalapae alcoholicum s. resinosum s. Convolvoli Jalapae. (Am. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Li. Lon. LonN. LP. Lus. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Rad. Jalapae gross. pulv. libram. Alcoholis (0,840) part. (octar.) quatuor.

Post quatuor dies digestionis alcoholem decantha, residuum coque cum Aquae octariis decem (congio uno) ad duos redigend s, decoctum colatum consume, tincturam in retorta destillationi subjice et liquores, quum spissescere coeperint, commixtos ad massae pilularum consistentiam consume. (Am. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

Fi. Aquae q. s., sed infusionem tantum adhibet et in fine tincturam et infusum commixta in balneo aquae salito ad extracti consistentiam evaporare; — Wür. Pulveri Jalapae Alcoholis tantum infundere ut digitorum quatuor crassitiem tegatur, totum blando calore digerere et tinctura decanthatâ, residuum cum Aqua per horam unam coquere, colare cum expressione, colaturam in balneo aquae ad mellis consistent. consumere, ei sub finem tincturam sensim addendo et continuè agitando ut massa homogenea neque grumosa obtineatur; — Suec. Macerare per dies quatuor Jalapae libram in Alcoholis unciis sexaginta quatuor, residuum coquere in Aquae unciis centum sexaginta quatuor ad triginta duas, decoctum vaporationi, tincturam destillationi subjicere, tunc, quum spissescere coeperint, commixta ad aptam spissitudinem consumere; — Wir. quod ad rem attinet, eodem modo procedit; — Lus. Digerere per dies quatuor Jalapae libram unam in Alcoholis quatuor, residuum coquere cum Aquae libris decem ad duarum remanentiam, tunc decoctum evaporatum et tincturam destillatam mixta ad aptam consistentiam redigere; — Ful. et Li. Digerere Jalapae libram unam in Aquae Vitae sex, residuum coquere cum Aquae libris tribus et decoctum tincturamque ad extracti consistentiam redacta rite consumere; — LP. digerere in balneo mariae per horas viginti quatuor Jalapae libras duas, Alcoholis quinque, filtrare, residuo novum Alcoholem superfundere, operationem repetere donec alcohol decolor sit redditus, tincturas miscere; residuum cum Aquae nova quantitate coquere, usque coloris sit expers, tincturam evaporare etc.

T. ut resinam parare eâ tamen differentia, ut destillata tinctura nec per aquam praecipitata, ad mellis consistentiam statim consumatur.

Gabe, ſechs bis funfzehn Gran.

Resina Jalapae s. Gialappae s. Jalappae, Jalapae Magisterium, Extractum Jalappae durum. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Jalapae gross. contus. . . q. vis.

Pluribus digestionibus, singulâ per dies aliquot, in Alcohole calente extrahe, cola fortiter exprimendo, et alcohole destillatione elicito, residuum Aqua tepida lotum sicca atque pulvera. (Pal.)

℞. Radicis Jalapae . quantum vis.

Digere aliquoties in Alcohole calido, tincturis mixtis et filtratis Aquae quadrantem circiter ponderis adde et alcohole destillando ex balneo aquae elicito, resinam in fundo vasis residuam Aqua calida lotam balnei aquae ope sicca. (Ba. Bor. Bor4. Br. Fenn. Ful. Han. Hass. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Gr. Sw.*)

HassP. quamque digestionem cum Alcoholis 12° B. quadruplo per dies tres continuare.

℞. Tincturae Jalapae . quantum vis. Dodrante in balneo aquae destillatione abstracto, residuo Aquae pondus (triplum T.) aequale addendo, praecipitatum ortum filtro excipe, lotum bene cum Aqua destillata et exstillatum caute exprime et in Alcohole tepido dissolutum vaporando ad siccum redige. (Gal. T.)

Fi. fere eodem modo procedit, Radicis q. vis, Alcoholis 24° q. satis et Aquae frigidae partes quadraginta vel quinquaginta sumendo.

℞. Rad. Jalapae contus. partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Digestione repetita ex balneo arenae radicem penitus extrahe, et tincturis commixtis ad dimidium evaporatis, residuo Aquam infunde et praecipitatum bene lotum caloris blandissimi ope sicca. (A. An. D. Lus. Sar. *Br. Sp.*)

Pm. Radicis pulveratae uncias sex cum Alcoholis 24° libris duabus infundere, filtrare, liquorem filtratum per cucurbitam stanneam destillare ad syrupi consistentiam, liquori in cucurbita contento Aquam superaffundere et quod subsedit, bis aut ter abluere et secundum artem exsiccare.

℞. Rad. Jalapae pulv. libras quatuor.
Alcoholis (0,907) libras sedecim.
Destillent, leni igne, spiritus libras duas, residuum refrigeratum exprimendo colatum sepone; spiritum obtentum additis duodecim libris Alcoholis (0,907) residuo reaffunde, et destillatione libram unam elice; residuo tunc refrigerato et iterum cum expressione colato, liquores mixtos post dierum octo sepositionem decantha. adde Aquae libras sex, spiritum leni igne destillationis ope elice, resinam vasi adhaerentem Aqua bulliente lava, donec liquidum saporis expers evadat et Alcoholis rectificati ope mollefactam in massam redige, quae igne blandissimo siccetur. (Ams.)

℞. Rad. Jalapae pulv. libras quatuor.
Alcoholis (30°) . . libras decem.
Digere ex arena, saepius agitando, per triduum, et cum residuo novaque Alcoholis quantitate operationem repete, colaturis sepositione et decanthatione depuratis adde Aquae libras octo, misce et omni alcohole destillationis ope, blando igne, elicito, residuum bene lotum et Alcoholis pauxillo molle redditum in massam redige quae lente siccetur. (B. Bel.)

℞. Jalapae pulveratae partem unam.
Alcoholis rectificati . partes sex.
Radici in balneo aquae tepido alcoholis duos trientes infunde, stent per horas viginti quatuor, tuno refrigerata cum expressione forti colentur; residuum cum reliquo alcohole digestum itidem exprime; colaturis filtratis adde Aquae frigidae partes novem absque vasis agitatione; resina postquam subsedit, horis viginti quatuor lapsis, decantha, Aqua resinae infusà, alcohol in alembico destillationis ope eliciatur; resinae priori quantitati eam quae liquido residuo inest affunde, lava totum primò Aqua frigida deinde calida et lente in balneo arenae sicca. (*Vm.*)

Das durch Präcipitation mittelſt Waſſer erhaltene Harz wird *Magisterium Jalapae* genannt. — Es wird als Purgirmittel nie allein angewendet, indem es heftige Kolik, übermäßiges Purgiren und ſelbſt Darmentzündung hervorbringt. Man giebt es in Pillen, mit Extracten. — Gabe, vier bis ſechs Gran, in Pillen; verſchreibt man es in Pulver, mit Mandeln oder Piniennüſſen abgerieben, was jedoch nicht nachzuahmen iſt, ſo kann man bei ſehr ſtarken Perſonen bis zu einem halben Scrupel und ſelbſt bis zwölf Gran ſteigen.

Resina Jalapae praeparata. (Bor4. *Sp.*)

℞. Resinae Jalapae,
Amygdalar. dulc., sing. part. aeq.
Pulveratas bene misce.

Pilulae purgantes. (*Ca. Vm.*)

℞. Radicis Jalapae,
Scammonii, sing. . uncias quatuor.
Extracti catholici . unciam unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*) — Gabe, von zwei bis fünf Stück, bei Waſſerſucht und Krankheiten von Aſthenie.

Vm. Resinae, Scammonii, sing. partem unam, Extr. cathol. duas et Alcoholis q. s.

Pilulae cephalicae. (*Sp.*)

℞. Massae Pilularum Succini,
Extracti Rhei,
— panchymagogi,
Resinae Jalapae, sing. semunciam.
Gabe, eine halbe Drachme. — Sie haben den Namen von ihrer früheren Anwendung bei ſogenannten ſeröſen Kopfkrankheiten.

Sapo jalapinus s. Jalapae. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. *Ca. Fi. Re. Sm. Sw. T. Vm.*)

℞. Resinae Jalapae pulveratae,
Saponis medic. rasi, sing.
partes aequales.
Alcoholis (20°) q. requir. s. q. s.

Liquata blando calore evaporent continue agitata ad massae pil. consist. (B. Ba. Bor. Bor4. D. Gal. Ham. Han. HassP. Li. O. Pol. Sax. *Ca. Sw. Vm.*)

T. Saponem Alicantinum et Alcoholem 30° adhibet; — *Fi.* Alcoholem 30°; — GalM. Saponis partem unam et Tincturae Jalapae duas; solutio in balneo aquae evaporet; — *Vm.* Resinae partem unam, Saponis unam cum dimidia et Alcoholis q. s.; — Hass. Saponis et Resinae, sing. part. aeq. et Aquae q. s. ad resinam humectandam, et liquationem blando igne faciliorem reddendam, alcohole omisso.

Gabe, bei Kindern zehen bis zwanzig Gran.

Pulvis hydragogus. (*Sw.*)

℞. Saponis jalapini,
Cremoris Tartari, sing. part. aeq.

Gabe, fünf bis dreißig Gran alle vier oder fünf Tage.

Pilulae Jalapae s. purgantes. (Bor4.)

℞. Saponis jalapini . . partes tres.
Rad. Jalapae pulv. partem unam.

Misce ut fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis granorum duorum.

Pilulae laxantes s. laxativae. (Li.)

℞. Saponis jalapini,
Rhei pulv., sing. . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel für Erwachsene.

Sm. Pilulas granorum quatuor e sapone jalapino solo parari jubet.

Mixtura saponacea purgans. (B*. *Ca.*)

℞. Alcoholis rectificati . semilibram.
Resinae Jalapae,
Saponis Amygd., sing.
unciam unam.

Solutionem filtra. (*Ca.*) — Gabe, Kindern eine bis anderthalb Drachmen.

℞. Saponis jalapini,
Syrupi Althaeae, sing.
grana decem.
Tinct. Cinnamomi . grana viginti.

Misce. (B*.) — Auf einmal.

℞. Saponis jalapini . uncias sedecim.
Alcoholis . uncias triginta duas.
Syrupi Sacchari . uncias sedecim.
Tincturae alcalinae,
Olei Menth. pip., sing.
drachmam.

Gabe, eine halbe bis ganze Drachme. (B*.)

Oleum Ricini artificiale. (B*.)

℞. Resinae Jalapae . grana novem.
Saponis Veneti . . . grana tria
Olei Amygd. dulc. . sesquiunciam.

Tritura simul. — Vogler verschreibt alle Stunden oder zwei Stunden einen Eßlöffel für Erwachsene.

Rotulae cocolatae cum Jalapa. (Pm.)

℞. Resinae Jalapae subtiliter pulveratae . . . . .
Pulveris Sacchari albissimi,
singulorum . scrupulos quatuor.
Cocolatae communis libram unam.

Mixta secundum artem fiant rotulae nonaginta sex. — Jedes Plätzchen enthält einen Gran Jalapenharz.

Morsuli s. Tabellae purgantes. (Br. Pal. Wir. *Sp*)

℞. Resinae Jalapae drachmam unam.
Amygd. dulc. excort.
drachmas tres.
Trituratis bene adde
Cardamomi min. . scrup. unum.
Cinnamomi . . scrupulos duos.
Sacchari rosati ad plumam cocti
uncias septem cum dimidia.

Fiant morsuli. (Br. Pal. Wir.)

Sp. cardamomum et cinnamomum omittit. — Gabe, je nach dem Alter von einer bis sechs Drachmen.

Diacydonium jalapinum s. lucidum jalapinum s. solutivum pellucidum, Gelatina purgans. (Br. *Sp.*)

℞. Gelatin. Cydonior.
unc. triginta duas.
Resin. Jalapae c. Nucleis Pineae
tritae . . . . . uncias duas.

Misce bene. (*Sp.*)

℞. Gelatinae Cydoniorum
uncias sexaginta quatuor.
Resinae Jalapae . uncias quatuor.
Alcoholis . . uncias duodecim.

Solutionem resinae alcoholicam cum gelatina misce. (*Sp.*)

Br. Gelatinae libras duas c. dimid., Resinae uncias quatuor et sedecim Alcoholis.

Electuarium pectorale laxans. (*Sp.*)

℞. Looch sani et experti uncias duas.
Syrupi Rhoeados . drachmas sex.
Resinae Jalapae sesquidrachmam.

Misce bene. — Ein Purgirmittel, welches bei Schleimkrankheiten der Kinder empfohlen worden ist.

Electuarium hydragogum. (*Sp.*)

℞. Roob Ebuli,
— Juniperi, sing.
drachmas duas.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Pulv. Resin. Jalapae
sesquidrachmam.
— Kali sulphurici drachmas sex.

Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Emulsio laxans s. purgans s. purgans cum Jalapa s. Jalapae, Julep purgans. (Gal. R. *Bo. Pie. Re. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Resinae Jalapae . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . . unciam unam.
Contere. (*Sw.*)
℞. Resinae Jalapae . . grana octo.
Vitelli Ovi,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Aquae . . . . . semunciam.
Resina cum saccharo et vitello tritis fiat aquae ope emulsio. (R.)
℞. Resinae Jalapae . grana duodecim.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Tere diu, sensim addendo
Vitellum Ovi . . . . . no. $\frac{1}{2}$.
Triturare continua, partitim addendo
Emulsion. simpl. uncias quinque.
Aquae Flor. Aurant.
drachmas duas.
Misce bene. (Gal. *Re.*)

Sm. Resinae grana octo ad decem, Vitellum Ovi unius, Sacchari uncias duas, Emulsionis sex et Aquae Florum Aurantii drachmas duas.

℞. Resinae Jalapae . . grana duo.
Amygdalas dulces . . . no 8.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
— Cerasor. nigr. unciam unam.
Fiat emulsio. (*Sa.*)
℞. Emulsionis communis uncias sex.
Resinae Jalapae,
— Scammonii, sing. grana octo.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce. (*Pie.*)

Bo. Emulsionis uncias quatuor, Resinae Jalapae grana octo, Scammonii grana sex et Sacchari drachmas sex.

§. III. Präparate, welche den wirkſamen Beſtandtheil der Jalappe zugleich mit dem zum Ausziehen angewendeten Vehikel enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Potio purgans anglica. (*Pie.*)

℞. Natri phosphorici . drachmas sex.
— subcarbonici,
Jalapae pulv., sing.
gr. viginti quatuor.
Sacchari . . grana triginta sex.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coctis per sexagesimas duas et filtratis adde
Alcoholis Citri . . guttas duas
et quo momento potio hauritur
Acidi tart. pulv.
grana quadraginta.

Purgativum Leroyi. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Scammonii Aleppensis uncias duas.
Radicis Turpethi . unciam unam.
Jalapae . . . . . uncias octo.
Aquae Vitae (20°) libras duodecim.
Digere in balneo aquae, calore 20°, per horas duodecim, filtra et adde Syrupum cum Infuso e Sennae unciis octo et Aquae bull. libris duabus et Sacchari libris duabus cum dimid. paratum.

Fi. et *T.* quatuor gradus indicant: 1) Scammonii sesquiunciam, Rad. Turpethi drachmas sex, Jalapae uncias sex, Alcoholis 20° libras sedecim et Syrupum cum Sennae mund. unciis sex, Aquae bull. libris duabus, Sacchari albi tribus paratum; 2) Scammonii uncias duas, Rad. Turpethi unam, Jalapae octo, Alcoholis 20° libras sedecim, Sennae uncias octo, Aquae bull. libras duas et uncias octo, Sacchari libras tres et uncias quatuor; 3) Scammonii uncias tres, Rad. Turpethi sesquiunciam, Jalapae libram unam, Alcoholis 21° sedecim, Sennae unam, Aquae bull. quatuor, Sacchari albi duas et uncias octo; 4) Scammonii uncias quatuor, Jalapae, Sennae, sing. sedecim, Rad. Turpethi duas, Alcoholis 22° libras sedecim, Aquae bull. libras quatuor et uncias octo, Sacchari albi libras duas.

Gabe, einen bis zwei Löffel täglich (eine halbe bis höchſtens eine Unze, worüber der Arzt beſtimmen muß *Fi.*). — Iſt für den großen Schaden, den die unvorſichtige Anwendung deſſelben unter denen, welche gern zu Quackſalbermitteln ihre Zuflucht nehmen, angeſtiftet hat, leider nur zu berühmt.

Syrupus jalapinus s. de Jalapa s. Jalapae aromatisatus. (Gal. *Sw*. T. Vm.*)

℞. Jalapae subtiliss. pulv.
drachm. decem.
Seminum Coriandri,
— Foenic., sing.
semidrachmam.
Aquae . uncias duodecim c. dimid.
Lagena immitte quae ad collum usque repleatur, tunc balneo aquae immersâ coque per sexagesimas viginti, quo facto balneum ab igne remotum gradatim refrigescat. Repone deinde lagenam et liquori post horas viginti quatuor decanthato et colato adde
Sacch. albi uncias viginti quinque, quae balnei aquae calore solvantur. (Gal.)

T. Omnium duplicem quantitatem sed eundem agendi modum indicat.

℞. Gummi Arabici,

Resin. Jalapae, sing. part. unam.
Triturando simul, addita sensim Aquae sufficiente quantitate emulsionem spissam para, quae cum
Syrupi Rhei part. sexaginta quatuor commisceatur. (*Vm.*)
*Sw**. Syrupi partes triginta duas.
Gabe, Kindern zwei bis vier Drachmen.

B. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (*Ca. Pie.*)

℞. Jalapae . . . . drachmas tres.
Rhei . . . . . drachmas duas.
Aloës Socotrinae . semidrachmam.
Cerevis. vel Hydromell. libr. duas.
Macera, saepius agitando, per dies duos et filtra. (*Ca.*) — Gab., ein oder zwei Pfund bei lymphatischen Subjecten.

Ca. praeterea: Jalapae, Rhei, sing. drachmas duas, Aloës semidrachmam et Cerevisiae octarium. (*Infusum purgans.*)
℞. Jalapae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Cerevisiae . . octarium unum.
Post duos dies macerationis filtra. (*Pie.*) — Gabe, Morgens ein oder zwei Gläser.

Cerevisia antihydropica s. ad hydropem. (*Sw*. Vm.*)

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
— Inulae,
— Calami,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
Cort. Aurant., sing. unciam unam.
Radicis Bryoniae,
— Rubiae,
Semin. Dauci sylv., sing. sesquiunciam.
Foliorum Absinthii manipulos duos
Cerevisiae fortis octarios quatuor.
Macera per plures dies, decantha et residuo infunde
Cerevisiae fortis . octarios duos.
Post sufficientem macerationem iterum decantha, colaturasque commisce.
Gabe, vier Unzen mehrmals täglich.

C. Auszug durch Wein.

Vinum antiapoplecticum. (*Ca.*)

℞. Radicis Jalapae . . semunciam.
— Armoraciae sesquiunciam.
— Rhei,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Nitri . . . . . semidrachmam.
Vini albi libras duas cum dimidia.
Post dies quatuor frigidae digestionis filtra et adde
Tinct. arom. ammon. drachmas duas.
Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

D. Auszug durch Alkohol.

Tinctura Jalapae s. Jalapii s. Convolvuli Jalapae. (Am. B. Bel. Du. Ed. GalM. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus. Suec. Wür. *Br. C. Gr. Re. Sw.*)

℞. Jalapae . . . . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Digere blando calore per dies sex et cola. (B. Bel.)
GalM. Jalapae partem unam et quatuor Alcoholis (22°); — Du. *Gr.* Jalapae uncias quinque et Alcoholis (0930) octarios duos; — Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Jalapae uncias octo et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Ed. *Gr.* et *Sw.* Jalapae partem unam et quinque Alcoholis (0,935); — Lus. Jalapae uncias quatuor et Aquae Vitae libram; — Suec. Jalapae partem unam et Spirit. tenuis quatuor; — Wür. Jalapae uncias tres et Aquae Vitae libram; — Han. Jalapae uncias octo et Spirit. rectif. triginta; — Br. Jalapae uncias tres et libram Spirit. rectif.; — Gen. Jalapae semilibram et Aquae Vitae libras duas.
Purgirend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura Resinae Jalapae. (Br. Gal. HassP.)

℞. Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
Alcohol. concentr. drachmas decem.
Post sufficientem digestionem filtra. (Br.)
HassP. Resinae partem unam, Spir. Vini rectificatiss. sex; solutio ex tempore fiat, ita ut tincturae filtratae pondus partes sex aequet; — Gal. Resinae partem unam, Alcoholis (26°) quatuor et sex dies digestionis.
Diese Tinctur ist wirksamer als die der Wurzel. — Besser bereitet man sie auf der Stelle, indem man zehen Gran Harz in einer Drachme Branntwein auflöst und nöthigen Falls zwei Drachmen Mandel- oder Althäasyrup zusetzt. Dieß ist die Gabe für einen Erwachsenen.

Tinctura Jalapae roborans s. aromatica. (Ams.)

℞. Jalapae . . . . . uncias tres.
Corticis Citri . . unciam unam.
Cinnamomi . . . . semunciam.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Alcoholis (0,884) . uncias sedecim.
Post dies octo digestionis filtra.

Mixtura Olei Ricini cum Jalapa s. purgans. (*Au.*)

℞. Tincturae Jalapae,
Sacchari albi, sing. . drachmam.
Olei Ricini,
Mannae, sing. . . unciam unam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Gabe, jede halbe Stunde zwei Löffel, bei der Malerkolik.

Tinctura Jalapae composita, Elixir Jalapae compositum s. Citri purgans s. anthelminticum Suecorum, Essentia catholica purgans Rothii, Tinctura purgans. (Gal. R. Suec. Wür. *Ca. Gr. Pie. Sp.*)

℞. Cort. recentis Citri sesquiunciam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Infunde per horas viginti quatuor, tum tincturam decanthatam infunde
Resinae Jalapae . . unciae uni.
Post solutionem filtra. (*Sp.*)

℞. Jalapae electae . . semilibram.
Scammonii . . . unciam unam.
Alcoholis (22°) . . . libras sex.
Post octo dierum macerationem decantha et cola (Gal.)

℞. Jalapae . . . . . semilibram.
Scammonii . . . . uncias duas.
Turpethi veget. drachmam unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Post viginti quatuor horarum infusionem cola. (*Ca.*)

℞. Jalapae . . . . uncias quatuor.
Scammonii . . . . semunciam.
Gummi Guttae . drachmas duas.
Alcoholis Aqua diluti libras duas.
Post tres dies digestionis cola cum expressione. (Suec.)
Gr. Spir. rectif. octarios duos, caeterum ut Suec.

℞. Jalapae . . . . uncias quatuor.
Seminum Carthami . uncias duas.
Scammonii . . . . semunciam.
Gummi Guttae . drachmas duas.
Spirit. Cort. Citri . sesquilibram.
Post dies aliquot decantha; residuo infunde
Spiritus Citri . . libram unam.
Digere iterum; liquoribus mixtis, dodrantem destillatione elice et quod remanet ad usum serva. (Wür.)
Pie. eandem formulam sed nihil de destillatione postrema monens et pro secunda digestione Spiritus Citri semilibram praescribens; — *Sp.* Quinque substantiarum illarum solidarum easdem quant. sed libras duas Alcoholis simpl., infusionem residui tamen non repetendo nec destillationem partis uniu producti jubendo; — Br. Infundere Jalapae unciis novem, Seminum Carthami sex, Scammonii et G. Guttae, sing. drachmis duabus, Spiritus Citri libras quatuor.
Reizend, purgirend, wurmtreibend. — Gabe, sechszig bis hundert Tropfen für einen Erwachsenen mit Syrupus Rhamni.

Potio purgans. (*Ra.*)

℞. Tinct. Jalap. comp.
unc. unam vel duas.
Syr. Rhamni
unciam dimid. ad unam.
Aquae Cichorii . uncias quatuor.

Aqua Vitae s. Spiritus purgans. (*Ca.*)

℞. Aquae Vitae (20°) octar. octodecim.
Sacchari crudi . . libras octo.
Jalapae . . . . . libras tres.
Bacc. Junip
uncias decem c. dimid.
Nitri , . . . drachmas septem.
Scammonii,
Rhei,
Calami,
Cinnamomi, sing.
uncias tres c. dimid.
Post octo dies infusionis filtra. — Gabe, anderthalb Unzen.

Jasminum.

Jasminum officinale, L.; Jasmin; Jasmin commun (*Gal.*); Gelsomino (*His.*).
Br. Fer. Gal. His. His3. R. Sax. Wir. *Be. Br. Gr. M. Re. Sp.*
Ein Strauch (Diandria Monogynia, *L.*; Jasmineae, *J.*) des mittägigen Europa's, des Orient's und Indien's. (*Zorn* Ic. pl. t. 153. *Blackw.* t. 13. *Plenck* t. 9.)
Man wendet die Blüthen (flores Jasmini) an; sie sind weiß, gestielt und bilden weitläufige Sträuße. Frisch haben sie einen angenehmen Geruch, der Geschmack ist etwas bitter.
Die Blüthen von diesem und von J. grandiflorum geben ein wesentliches Oel (Oleum Jasmini, Essence of jasmine. *Gr. Re.*)

Essence of Jasmine. (*Re.*)

E. Floribus recent. per strata inter laminas gossypinas Oleo Benz vel Coryli positis, donec odore sint penetratae, quo facto destillationi balnei aquae subjicitur.

Spiritus Jasmini. (*Sp.*)

℞. Olei Jasmini . . uncias sedecim.
Alcoholis . . uncias octodecim.
Misce fortissime agitando, tunc ad

frigidum locum posito, spiritum ab oleo congelato defunde.

Essentia Jasmini. (*Gr. T.*)

℞. Florum Jasmini . . quantum vis. In scatulam e lamina alba confectam quadrilateram et pollices 6 ad 8 altam, operculo munitam, in cujus fundo pannus laneus Oleo Behen impraegnatus positus est, ingere, ita ut pannus pollicis dimidii circiter altitudinem tegatur et hoc modo scatula alternis stratis florum et panni repleatur, lamina deinde crystallinâ aut plumbea et postremo operculo obtegens, post horas 12 aut 15 flores exemti cum novis mutentur, quod repetendum est. Pannis deinde exemtis Alcohole rectificato frigido superinfuso compressis et lotis, liquidum hoc, oleo expresso impraegnatum retortae tubulatae infunde et destillatione balnei aquae ope partem tertiam aut dimidiam elice

Eodem modo paratur *Essence de tubereuses* (Polyanthes Tuberosa). (*Gr. Re.*)

Juglans.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung werden in der Medicin benutzt:

1) *Juglans cinerea, L.*; weiße Wallnuß; Noyer cendré (*Gal.*); Butter nut, white walnut (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Juglandeae, *Cand.*) Südamerica's. (*Big. Med. Bot* II. t. 32.)

Man wendet die innere Rinde des Stammes und der Wurzel an, welche purgirend wirkt. Die der frischen Wurzel soll Blasen ziehen.

2) *Juglans regia, L.*; Nußbaum, Wallnuß; Noyer commun (*Gal.*): Walnut tree (*Ang.*); Akirut, jowz, Khusif (*Ar.*); Walsky orech (*B.*); Ho-tao (*C.*); Valnood (*D.*); Akirut (*Duk. Hin.*); Nogal (*His.*); Noce (*I.*); Olass-dio (*Ma.*); Girdigan, Charmughz, Jouzirumie (*Pe.*); Orzeszina wloska (*Pol.*); Nogueira (*Lus.*): Greziak orechi (*R.*); Walnaet traet (*Suec.*).

A. An. Ba. Bel Bor Bor4. Br. D. Fer Gal. GalM. Gen. Ham. Hnn Hass. HassP. His. His3. LH. Li. O. Pm. Pol R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Terebinthaceae, *J.*), welcher, in Persien ursprünglich zu Hause, in ganz Europa gezogen wird. (Fl. méd. V. 250. *Blackw.* t 347. *Plenck* t. 672. *Schk.* t 302. *Bert.* Bild. VIII. 27.)

Man wendet die Frucht (Nux Juglans s. Juglandis) entweder reif (Nuces Juglandes maturae) oder unreif (Nuces immaturae) an. Es ist eine eirunde Steinfrucht mit einer grünen, fleischigen Hülle oder Schaale (cortex s. putamen Nucis Juglandis) von bitterem, sehr herben Geschmack. Die darin eingeschlossene Nuß (nucleus Nucis Juglandis) besteht aus einer harten, brüchigen, holzigen, braungelben, außen gefurchten, geruch- und geschmacklosen Schaale, welche einen vierlappigen, sehr unregelmäßigen Kern enthält, der unter einem gelblichen, sehr dünnen, adstringirenden Fellchen (epidermis nuclei Juglandis) ein süßes, öliges Fleisch von sehr angenehmem Geschmack einschließt.

Electuarium antihydrophobicum. (B*.)

℞. Nucum Juglandium matur. no. 30.
Herbae Rutae manipulum unum.
Mellis . . . . . uncias octo.
Contere. — Von Strackwitz gerühmt. — Man läßt Morgens und Abends vor dem Essen einen Löffel nehmen.

Oleum Nucum Juglandium s. Juglandis s. Juglandis regiae. (An. Bor4. Br. Gal. Hass. HassP His. His3. Li. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Gr. Pid. Re T. Vm.*)

℞. Nucum Juglandium matur. q vis. Putamine septisque remotis nucleos contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pastam sacco e tela confecto (cilicino aut cannabino Bor4.) inclusam frigide inter duas laminas stanneas (laminis in Aqua fervente tepefactis Bor4.) exprime.

His3. nihil de laminis monet; — HassP. inter materiae medicae substantias nominat.

Dieses Oel kann, wenn es frisch und nicht ranzig ist, das Süßmandelöl ersetzen.

Roob Nucum s. Corticis Nucum Juglandis regiae, Roob Diacaryon sine melle s. Galeni, Diacaryon, Extractum Juglandis immaturi. (A. B*. Br. Ful. Pal. Wir. Wür. *Gr. Sp. Sw.*)

℞. Nucum Jugland. immat. libram unam.
Contusas in mortario coque cum Aquae libris duabus per horas aliquot; cola exprimendo et succum cum Mellis despumati pondere aequali ad aptam consistentiam consume. (Br. Ful. Wir. *Gr. Sp. Sw.*)

℞. Succi Jugland. immat. expr. libras duas.
Mellis . . . . . libram unam.
Coque blando igne, spumam dehau-

riendo, ad aptam consistentiam. (A. B*. Pal. Wür. *Sp.*)

Schwach adſtringirend, auflöſend, beſonders äußerlich.

Extractum Nucum Juglandium s. Putaminum Nucum s. Juglandis s. Nucum Juglandium viridium. (A. Am. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Han. Hass. HassP Li. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. *C. Vm.*)

℞. Nucum Jugl. immat. . . q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum addendo et succum exprime qui statim in balneo aquae, sub finem cum spathula continue agitatus, evaporet. (A. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Han. Pol. Sax. Suec. *Vm.*)
HassP. ut extractum aconiti.

℞. Putam. Nucum Jugl. partem unam.
Aquae purae . . . partes sex.
Coque, cola et colaturam vaporando rite consume. (Am. Hass. Li. R. Wir. *C. Pid.*)

℞. Putaminum Nucum concisorum uncias sex.
Aquae fontanae ferventis libras sex.
Infunde per tres horas, cola cum expressione, decantha et liquorem cum Albumine Ovi clarificatum in balneo maris ad extracti consistentiam redige. (Pm.)

Reizend, toniſch, bitter, antiſcorbutiſch, wurmtreibend. — Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe Drachme. Man wandte es ehedem auch äußerlich, als reinigendes Mittel, bei übelausſehenden, ſelbſt veneriſchen Geſchwüren an.

Das Wallnußſchaalenextract bildet die Baſis des *Remedium antivenereum Mitié*, zu welchem Alyon und Cadet zwei verſchiedene Formeln gegeben haben.

℞. Fol. Juglandis,
— Apii,
— Trifolii, sing. . pond. aeq.
Contusis simul succum exprime, qui ad massae pilularis consistentiam inspissetur. (*Alyon.*) — Gabe, zwei bis ſechs Stück ſechsgranige Pillen täglich mit einer Tiſane von botrys oder scordium.

2) ℞. Fol. Juglandis . sesquiunciam.
Jalapae pulv. . unciam unam.
Fol. Angelicae,
— Cardui benedicti,
— Saponariae, sing. unc. quatuor.
Fiat infundendo extractum aquosum, quod evaporatum in pilulas granorum sex dividatur. (*Cadet.*)

Außerdem führt Cadet noch folgenden Syrup an:
℞. Fol. virid. Juglandis libras viginti.
Stent cum Aqua fervida in infusione per horas viginti quatuor; infunde tunc
Fol. virid. Angelicae libris sedecim.
Stent iterum per horas viginti quatuor, ita ut in balneo aquae continue calida teneantur; superfunde deinde
Foliorum Saponariae libris sedecim,
Rosarum moschatarum unciis duodecim.
Rosarum vulgarium unciis sex.
Sennae mund. unciis viginti sex.
Infusis per horas viginti quatuor adde et in iis solve Sacchari crudi libras triginta septem, tum coque, Albuminis ope clarifica et ad syrupi consistentiam redige.

Mittié ließ den Kranken Morgens, zwei Stunden vor dem Frühſtück, acht, und zwei Stunden vor dem Abendeſſen, vier Stück Pillen nehmen, und zugleich außerdem Morgens nüchtern vier Löffel Syrup in einem Glaſe Waſſer und zwei Löffel zwei Stunden vor dem Abendeſſen.

Mixtura Nucum Juglandium, Guttae anthelminticae. (Ham. *Au.*)

℞. Extracti Juglandis drachmas duas.
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Gabe, ſechszig Tropfen für ein Kind von zwei Jahren und hundert für einen Erwachſenen.

Essentia s. Tinctura Corticis viridis Nucum Juglandis. (D.)

℞. Cort. Jugland. rec. concisi uncias sex.
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Stent blando calore in digestione per dies quatuor, tum filtrentur. — Bitter, adſtringirend toniſch, aufregend.

Aqua Nucum Juglandium. (Fi.)

℞. Flor. Jugland. rec. libras undecim.
Jugland. rec. immat. libras duodecim.
Aquae communis libras triginta sex.
Coque in lebete stanneo florum libram unam cum aqua ad quadrantis fluidi consumptionem et decoctum colatum cum reliquis floribus in alembico cupreo stanno obducto macerationi per unum diem subjice, quo facto duo trientes fluidi destillent; hanc aquam destillatam nucum viridium contusorum libris sex infunde, ut post unius diei macerationem trientes duo destillent; tum nucibus rejectis, decocto aquam destillatam affundendo reliquas nucum libras sex adde, quo facto aquae librae decem destillatione eliciantur. — Gabe, eine bis ſechs Unzen.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. Corticis viridis Nucum Juglandium. (B*. Gen. *Au.*)

℞. Cort. Jugland. virid. unciam unam.
Aquae bullientis uncias decem.
Coque per horae quadrantem et cola.
(B*. Gen. *Au.*)

℞. Nucum Jugl. paulo ante maturit. decerpt. et siccat. uncias tres.
Aquae fontanae . uncias quatuor.
Decoque ad dimid. et colaturae adde
Mellis albi . . . uncias duas.
Dissolve. (Gen.)

Bei rebelliſchen veneriſch-mercuriellen Krankheiten und ſolchen, welche ſehr reizbare Perſonen befallen, gerühmt. Frank empfiehlt die Flüſſigkeit bei Flechtengeſchwüren in Waſchungen.

Infusum Juglandis compositum. (*Sw.*)

℞. Corticis Juglandis sicci,
Fol. Jugland., sing.
manipulos quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae librae octo obtineantur.
Post unius horae infusionem adde
Calcariae muriaticae sesquiunciam.

Adſtringirend, äußerlich in Bädern bei 36 bis 38° R. gegen Scrofeln, Lungentuberkeln und im Allgemeinen gegen alle Krankheiten, deren Grund man in das Lymphſyſtem ſetzt.

Decoctum Drupae Juglandis regiae s. compositum s. Pollini s. antisyphiliticum Pollini. (B*. GalF. Pm. *Au. Fi. Ra. Sa. Sw Sy. T.*)

℞. Cort. Jugland. virid.
uncias decem.
Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Pumicis,
Antimonii sulphurati in nodulo,
singulorum semunciam.
Aquae . uncias sexaginta quatuor.
Decoque in vase leviter tecto ad dimidii remanentiam. (B*. GalF. *Au.*)

Pm. Aquae libras quatuordecim ad libras septem coquendas, caeterum ut antea

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae, sing. uncias duas.
Cort. Jugland siccat. libram unam.
Antimonii sulphurati in nodulo,
Pumicis in nod., sing. uncias duas.
Aquae . . . . . libras viginti.
Decoque ad librarum decem remanentiam. (B*.)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
— Chinae . . sesquiunciam.
Antim. crudi in nod. uncias duas.
Nuces Jugland. integras. no. 30.
Aquae . . . . . libras decem.
Decoque ad librarum decem remanentiam. (*Sa.*)

℞. Corticis Juglandis uncias octodecim.
Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Antimonii sulphurati in nodulo,
Pumicis in nod., sing. semunciam.
Aquae . . . . . libras octo.
Post horas duodecim macerationis coque in vase tecto, tunc nodulis remotis coquendo continua ad librarum quatuor liquidi remanentiam et cola absque filtratione. (*Sy.*)

Fi. Corticis rec. uncias decem, Radicum et Mineralium, sing. semunciam et Aquae libras quatuordecim post macerationem per noctem unam ad dimidium decoquendas; — *T.* ut antea, sed Corticis tantum uncias quinque

Sy. Decoctum syphiliticum roborans: Antimonii uncias quatuor, Pumicis, Sarsaparillae, Chinae, sing. duas, Nuces ante maturitatem siccatas no. 40, et Aquae libras viginti ad decem redigendas.

℞. Cort. Jugland. sicc. unciam unam.
Sassaparillae,
Chinae, singularum uncias duas.
Antimonii sulphurati in nodulo
uncias quatuor.
Pumicis in nodulo . uncias duas.
Aquae . . . . . libras viginti.
Coquendo dimidium consume. (GalF. *Sw.*)

℞. Chinae grisseae,
Sassaparillae, sing. . uncias tres.
Pumicis,
Antimon. crudi, sing. sesquiunciam.
Corticis Juglandium libram unam.
Aquae . . . . . libras octo.
Coque ad octarii rem. et col. adde
Kali subcarbonici drachmas duas.
Dissolve. (*Ra.*)

Reizend, toniſch, bei Ausſatz, Flechten und hartnäckigen veneriſchen Uebeln. — Gabe, Morgens und Abends ein Pfund. — Auch äußerlich in Waſchungen.

Chamberlain's bilious cordial (*Gr.*): E Cortice Juglandis cinereae interno, cum Speciebus aromaticis. — In Amerika viel gebraucht.

Jujubae.

Zizyphus sativus, vulgaris, Cand. Rhamnus Zizyphus, L.; Bruſtbeerſtrauch; Jujubier (*Gal.*); Jujevtree (*Ang.*); Azufeifas (*His.*); Jotlenboom (*Bel.*); Giuggiolo (*I.*); Anafegas (*Lus.*).

An. Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. His3. Wir. *Be. Fi. G. Gr. M. Rc. Sp.*

Ein Strauch (Pentandria Digynia, L.

Rhamneae, *J.*) Oſtindien's, welchen man im ſüdlichen Europa zieht. (*Lamk.* Ill. gen. t. 185. f 1 *Plenck* t. 142. Nouv. Duh. III t. 16)

Man wendet die Früchte, Bruſtbeeren (Jujubae s. Baccae Jujubae s Zizyphi) an. Es ſind Steinfrüchte von der Geſtalt und Größe einer Olive, von rothgelber oder rother Farbe, welche unter einer dicken Schaale ein weiches, gelbes, ſchleimiges, ſüß und ſchleimig ſchmeckendes Fleiſch, und von demſelben bedeckt, einen länglichen, harten, gefurchten Kern enthalten.

Nach Ainslie's Bericht gebrauchen die Indier die Abkochung der Wurzel gegen manche Fieber, jedoch iſt er der Meinung, daß ſie wohl keine großen Kräfte beſitzen möge.

Species pectorales cum Fructibus s. pro Decocto Florum et Fructuum s. bechicae. (HassP. Pal. Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae uncias duas.
Herb. Capilli Veneris Monspeliaci,
— Endiviae, sing. drachmas duas.
Flor. Boraginis,
— Buglossi,
— Violarum,
— Rosar., sing. . drachmam.
— Lupuli . . drachmas duas.
Jujubarum,
Siliquae dulcis,
Prunor. Damasc., sing. uncias duas.
Tamarindorum . unciam unam.
Grossiuscule concisa misce (Wir.)

Pal. Siliquam omittens, Jujubarum, Prunorum et Fructuum Sebestenae, sing. no. 20; — HassP. Siliquae, Jujubarum, sing. uncias tres, Dactylorum, Caricarum, Passularum min., Hordei mundi, sing. quatuor, Radicis Liquiritiae, Herbae Capill. Vener, Veronicae, Hyssopi, Florum Verbasci, sing. duas.

Pulpa Jujubarum. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Jujubarum . . . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque ad emolliendos fructus, pulpam per crinium trajice, et aquam decocti cum ea commiscens totum blando igne ad aptam consistentiam consume.

Fi. Jujubarum libras septem, Infusi Sennae, Sacchar, sing. libras tres, caeterum ut Gal. ea tamen differentia, ut pulpa cum syrupo ex infusione et saccharo parato commixtâ, totum ad aptam consistentiam consumatur; — *T.* ut pulpam dactylorum.

asta Jujubarum s. de Jujubis. (B*. Ba. Gal. *Fi. Re. T*)

℞ Jujubarum . . . libram unam.
Gummi Senegalensis libras sex.
Sacchari puri . libras quinque.
Aquae filtratae . libras triginta.
Tinct. Cort. Citri unciam unam.

Coque in aquae libris decem et cola decoctum; in aquae reliquo gummi dissolve, colaturas commisce et, addito saccharo, Albumina quinque cum Aqua subacta addendo, coque, spumam eximendo; liquorem ad tertiam partem redactum per linteum cola et ad syrupi spissi consistentiam redige; adde tincturam et evaporationem in aquae balneo ad extracti mollis consistentiam usque continua, quod in formas ferreas stanno obductas, oleo oblitas effusum in vaporario sicca. (Gal. *Re.*)

Fi. ut Gal, sed loco tincturae Aquae aromaticae Citri uncias duas; — *T.* Jujubarum enucleat uncias decem coquere in Aquae q. s., Albumina cum Aquae circiter uncia una subacta et Tincturae alcoholicae Citri drachmas tres cum pondere aequali Aquae dilutae, caeterum ut antea; — B*. et Ba. coquere Jujubarum, Dactylorum, Passularum min., sing. partem unam in Aquae partibus triginta sex ad viginti quatuor, colaturae addere Sacchari pondus duplum et tunc Albuminis cum Aquae pauxillo subacti partem dimidiam et ad syrupi consistentiam redactis addere, continuè agitando, Mucilaginis Gummi Arab. partes viginti quatuor et ad aptam consistentiam redacta in modulos effundere blandoque calore siccare.

Syrupus de Jujubis. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Jujubarum recentium uncias tres.
Liquiritiae . . . drachmas sex.
Capilli Veneris Monspeliaci,
Flor. Violar., sing.
drachmas quinque.
Semin. Malvae,
— Cydoniorum,
— Papav. albi, sing. drach. tres.
Aquae font. libras duas c. dimid.

Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam et in iis dissolve

G. Tragac. elect. drachm. unam.
Sacchari albi uncias triginta duas.

Serva. (Br. Wir.)

℞. Jujubarum . . . . uncias tres.
Radicis Liquiritiae,
Capilli Veneris Monspeliaci,
Hordei mund., sing. unciam unam.
Aquae uncias quadraginta quatuor.

Coque ad unciarum triginta sex remanentiam, sub finem addendo

Florum Violarum uncias quinque.

Cum colatura et

Seminum Malvae unciis quinque.
— Cydoniorum,
— Papaveris albi,
— Melonum,
— Lactuc., sing. drachmis tribus emulsione parata, in liquore d ssolve Sacchari uncias viginti quatuor. G. Tragacanthae drachmas tres. Coque ad syrupi consistentiam. (*Sp.*)

Decoctum pectorale. (Sar. *Ca. T.*)

℞. Jujubarum,
Caricarum pinguium concisarum,
Uvarum passarum mundatarum,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Aquae communis . . libras sex.
Coque fructus in aqua, donec haec ad tertiam partem sit redacta, adde liquiritiam ab igne removens, infunde per tempus aliquot et cola. (Sar.)

Ca. Fructuum pectoral. uncias duas et Aquae libras duas cum dimid., coctione ad libras duas redactas; — *T.* Foliorum sicc. Farfarae uncias sex, Caricarum sicc., Uvarum pass., Jujubarum sicc., sing. duas, Aquae libras duodecim. Coque ad tertiae partis consumptionem, addendo Radicis Liquiritiae uncias duas.

Jusculum pectorale. (*Pie. Sm.*)

℞. Pulmonis vitulini,
Colli vervecis, sing. part. dimid.
Jujubas . . . . . no. 20
Dactylos . . . . . no 12.
Uvarum Damasc. . semunciam.
Radicum Napi . . uncias duas.
Gruti . . . . drachmas duas.
Conservae Angelicae unciam unam.
Aquae . . . . . octarios duos.
Ebulliant. (*Pie.*)
℞. Pulmonis vitulini concisi,
Pulli gallinac. excor., sing. no. ½.
Jujubas . . . . no. 12 aut 15.
Hordei perl. cochlearia duo maj.
Aquae . . . . sesquioctarium.
Parte tertia consumpta, absque despumatione et aliquot momenta antequam ab igne removeris, adde Foliorum viridium Pulmonariae manipulum unum.

Juniperus.

Von dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Juniperus communis*, *L.*; Wachholder, Kaddig; Génévrier commun (*Gal.*); Juniper (*Ang.*); Galowec (*B.*); Ene, Enebaer (*D.*); Enebro (*His.*); Genever (*Bel.*); Ginepro (*I.*); Jalowiec (*Pol.*); Zimbro, Junipero (*Lus.*); En (*Suec*)

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li Lon LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp.* Z.

Ein Baum oder Strauch (Dioecia Monadelphia, L.; Coniferae s.), welcher in Europa einheimisch ist. (*Blackw.* t. 187. *Plenck* t. 719. *Schk.* t. 338. Dict. d. Sc. nat. Livr. VII. *Bert.* Bild. VIII. 32. Fl. méd. IV. 181.)

Man wendet das Holz, die Spitzen und die Früchte an.

Das Holz (lignum Juniperi, lignum cedrinum) ist fest, schwer und sehr harzig, und hat eine außen graue oder röthlichbraune, inwendig gelbliche oder röthlichgelbe Rinde. Der Geruch ist angenehm und balsamisch, der Geschmack gewürzhaft, harzig und etwas bitter. — Die Spitzen oder Enden der Zweige (cacumina s. turiones Juniperi) sind dünn und bestehen aus sitzenden, meist zu drei vereinigten, schmalen, spitzigen, harten und stechenden Blättern (Nadeln). Die Früchte (baccae Juniperi) sind kugelige, schwärzliche Beeren von harzigem Geruch und balsamischem, etwas bittern und zugleich süßlichen Geschmack.

Alle Theile der Pflanze, und besonders die Beeren, werden als kräftig harntreibend angesehen. Auch legt man dem Holze Kräfte gegen die Syphilis bei.

Gabe des Pulvers, zwei bis sechs Drachmen.

2) *Juniperus Virginiana*, *L.*; Virginischer Wachholder; Génévrier de Virginie, Cèdre rouge (*Gal.*); Common red cedertree (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L. Coniferae, J.) Nordamerica's. (*Pluk.* Alm. 201. t. 197. f. 4. *Big.* Am. Bot. T. IV. t. 45.

Die Blätter sind ganz einfach, lanzettförmig und spitzig. Sehr jung angewendet können sie die Sadebaumblätter ersetzen.

3) *Juniperus Sabina*, *L.*; Sadebaum, Sevenbaum; Sabine (*Gal.*); Savine (*Ang.*); Sawina neb klasterska chwogka (*B.*); Sevenbom (*D.*); Sabina (*His. I. Lus.*); Seevenboom (*Bel.*); Sawina (*Pol.*); Saefwenbom (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp.* Z.

Ein Strauch Südeuropa's und der Levante. (*Bull.* t. 139. *Blackw.* t. 214. *Plenck* t. 720. *Schk.* t. 338. *Zorn* Ic. pl. t. 525.)

Man wendet die Blätter (folia s. herba Sabinae) an; sie sind entgegengesetzt, eirund, etwas spitzig und auf dem Rücken

gewölbt. Sie haben einen harzigen, gewürzhaften, ſehr durchdringenden Geruch und einen ſehr bittern Geſchmack.

Kräftig reizend, aufregend und die Reinigung treibend.

Conserva Juniperi. (*Sw.*)

℞. Bacc. rec. Juniperi . uncias octo.
Contusis adde sensim
Sacchari albi . uncias quatuor.
Solve leviter calefaciendo.

Conserva Sabinae. (Han. Pol. Sax. *Sw.*)

℞. Fol. Sabinae contus. partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere. (Pol Sax. *Sw.*)

Han. Foliorum partem unam et tres Sacchari.

Pulvis diureticus. (B*. *Au.*)

℞. Baccarum Juniperi tostarum,
Rad. Pimpin. albae, sing.
grana quinque.
Nitri antimoniati . . grana tria.

Von Theben empfohlen. (B*.)

℞. Baccarum Juniperi tostarum,
Sacchari albi, sing. . partes aeq.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Kaffeelöffel. (*Au.*)

Pulvis emmenagogus. (*E. Gr.*)

℞. Herbae Sabinae,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Divide in partes sex. — Gabe, ein Stück zweimal täglich.

Gr. Fol. Sabin sicc., Zing., sing. semiscrupulum, Potassae Sulphatis sesquidrachmam. — Zweimal täglich.

Pulvis Sabinae s. Sabinae compositus. (RC. *Gr. Re.*)

℞ Pulveris Herbae Sabinae,
Ferri carbonici praecipitati,
Zingiberis vel
Pulveris arom. sing. partem unam.
Misce. — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel, täglich zwei Mal, bei Hypochondrie, Amenorrhoe, Verdauungsbeſchwerden.

℞. Aeruginis praeparatae,
Fol. Sabinae pulv., sing. part. aeq.

Zur Zerſtörung der Warzen. (*Re.* sec. Hunter.)

℞. Fol. Sabin. pulv. . uncias duas.
Aeruginis,
Mercurii praecip. rubri, sing.
semunciam.

Zum Reizen und Zerſtören von Fleiſchgeſchwülſten. (*Gr.*)

Pulvis vermifugus. (*E.*)

℞. Sabinae . . . grana duodecim.
Sennae,
Spigeliae, sing . scrupulos duos.
Fiant doses sex. — Man nimmt drei Tage hintereinander Morgens ein Stück und verſchluckt hierauf Ricinusöl, worauf man, wenn es nöthig iſt, wieder von vorn anfängt.

Boli emmenagogi. (*B. Ca.*)

℞. Pulveris Sabinae drachmam unam.
Syrupi Artemisiae quantum sufficit.
Extracti Aristolochiae,
— Artemisiae,
Pulv. Croci,
— Castorei, sing.
semidrachmam.
Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich, bei Amenorrhoe. (*Ca.*)

℞. Extracti Sabinae grana quatuor.
Pulveris Foliorum Taxi grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (*B.*)

Pilulae emmenagogae. (B*.)

℞. Extracti Sabinae . semunciam.
Pulv. Herb. Sabinae
drachmas duas.
Olei essentialis Sabinae . q. s.
ut fiant pilulae ponderis granorum duorum. — Gabe, acht Stück Morgens und Abends.

℞. Pulveris Sabinae,
Extr. Chamomill., sing.
sesquidrachmam.
Ferri oxydati nigri,
Extr. Aloës, sing. grana quindecim.
Fiant pilulae granor. duor. — Gabe, ſechs Stück auf einmal, bei Bleichſucht.

Electuarium antiarthriticum. (Ham.)

℞. Pulveris Sabinae drachmam unam.
— Calami . drachmas duas.
Mellis despumati . uncias duas.

Extractum Juniperi, Extractum Baccarum Juniperi, Roob Juniperi (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Penn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Bacc. Juniperi integr.
partem unam.
Aquae tepidae . partes quatuor.
Stent in infusione per horas quadraginta octo, subinde agitata, tum colata subsideant; liquor decanthatus blando igne ad extracti consistentiam evaporet. (Ba. Gal. GalM. *Re.*)

Pm. Easdem quantitates sed infusio-

nem per horas duodecim, colare, exprimere, decanthare et evaporare; — *Fi.* Baccarum mat. libras duas in Aquae tep. libris octo per horas 48 digerere agitando subinde, colare et novam Aquam addere quamdiu fluidum saporem praebet, liquores commixtos per semihoram coctos et calide absque expressione colatos leni calore ad extracti consist. redigere. Si infusionibus addas Sacchari uncias octo, *Rob Juniperi* habes. — *T.* Baccarum mat. libras decem cum Aquae bull. quinquaginta digerere loco tepido, subinde agitando; post duos dies decantha liquorem, igne aperto lente ad ⅓ consumere et cuique librae Sacchari uncias tres addendo balnei aquae vel vaporis ope ad consistentiam roob consumere; — *Gr.* Baccae in Aqua frigida macerentur et liquor decanthatus vaporatione inspissetur (*Extractum Baccarum Juniperi optimum, Theriaca Germanorum optima.*); vel: Baccae integrae in Aqua coquantur et decoctum vaporatione inspissetur (*Extr. Bacc. Juniperi sine contusione, Theriaca Germanica vulgaris*).

℞. Baccarum Juniperi quantum vis.
Contunde cum Aquae tepidae pauxillo humectans et pauxillum Fermenti Cerevisiae addens; fermentata calore 15 ad 20° R. cola parumper exprimendo; liquorem coquendo ad dimidium redige, Albuminis ope clarifica et vaporando ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

℞. Residui e destill. Spirit. Junip. q. vis.
Clarificatum rite consume. (*Sw.*)

℞. Bacc. Juniperi contus. libras octo.
Aquae fervidae libras duodecim.
Digere per tres dies, tum in alembico destillationi subjice, donec oleum cum aqua prodire cessaverit, quo seposito residuum fortiter exprime, ad extracti consistentiam consume et oleum bene cum hoc commisce. (Sar.)

℞. Bacc. Juniperi contus. libras quatuor.
Aquae bullientis libras duodecim.
Digere per dies duos aut tres, tunc ad mollitiem baccarum usque coque, cola exprimendo, et liquorem sepositum in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (His. His3.)

Bor. Bor4. Gen. Han. Li. O. RC. et Sax. Baccas coquendo in Aqua emollitas leviter exprimere et colaturam ad mellis vel syrupi spissioris consist. evaporare; — Pal. Macerare eas per dies duos in Aqua absque ebullitione et succum expressum ad eundem consist. gradum redigere; — Penn. repetere macerationem cum eadem Aqua, donec baccae fere sint saporis expertes et liquorem absque bullitione ad mellis consist. consumere; — HassP. Baccarum q. vis cum Aquae q. s. per semihoram coquere, modice exprimere et succum expressum leni calore ad mellis consist. consumere; — *Gr.* Baccas contusas coquere et decoctum evaporare (*Extractum Baccarum Juniperi contusarum, Theriaca pauperum.*).

℞. Baccarum Juniperi libram unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Stent in balneo aquae in infusione; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Evaporent leni igne ad mellis consistentiam. (An.)

Vm. macerare per horas duodecim Baccarum contus. partes duas in Aquae quadraginta octo, per crinium trajicere absque expressione, residuum cum Aquae partibus viginti quatuor maceratum itidem colare, in colaturis mixtis solvere Sacchari albi partem unam et Albumine clarificatum ad mellis consist. redigere; — Fer. Macerare per duos dies Baccarum libras sex in Aquae viginti quatuor, macerationem cum nova Aqua repetere, donec haec saporis expers evadat, liquoribus commixtis et colatis addere Sacchari libras duas et Albumine clarificatas probe consumere.

℞. Baccarum Juniperi quantum vis.
In pulpam redige, Aquae quantitatem necessariam addendo et coque in Aquae q. s. per semihoram, per crinium trajice et residuum exprime; dissolve in succi partibus quatuor Sacchari albi partem unam et ad consist. mellis consume. (A. B. Bel. D. Ham. Pal. Wür.)

Br. Ful. Han. R. Wir. *Pid.* et *Sw.* Sacchari libram unam pro libris octo Baccarum coct.; — *T.* Residui expressi, balnei aquae vel vaporis calore ad syrupi consist. inspissati librae cuique Sacchari uncias tres addere et bene mixta in vaporis vel aquae balneo ad mellis consist. redigere.

Dieſes Extract führt, bloß zur Honigdicke abgedampft und beſonders mit Zucker verſüßt, den Namen *Roob Juniperi s. Baccarum Juniperi, Succus Juniperi inspissatus.*

Reizend, gewürzhaft, blähungtreibend, magenſtärkend, die Hautausdünſtung und Harnabſonderung bethätigend. — Gabe, eine halbe bis eine Unze, am häufigſten in Waſſer.

Extractum Sabinae (aquosum), Extra-

ctum Foliorum Sabinae. (Du. Fer. Pal. Sax. Wir. *Fi. Gr. Re.*)

℞. Summitatum Sabinae libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.
Macera in loco calido per dies quatuor, tum coque leviter, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Pal. Wir.)

℞. Summitatum Sabinae libram unam.
Aquae purae . . . libras octo.
Decoque ad dimidium, cola exprimendo et liquorem blando igne ad massae pilul. consist. consume. (Du. *Gr. Re.*)

Fer. Coquere Sabinae partem unam in Aquae tribus et decoctum clarificatum evaporare; — *Fi.* Sabinae partem unam, Aquae octo ad dimid. coquere, Albumine clarificare, et balnei aquae ope ad extracti consist. redigere.

℞. Summitatum Sabinae partem unam.
Aquae communis . partes octo.
Infusa per horas viginti quatuor coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores, post horarum viginti quatuor sepositionem ad aptam consist. evaporent. (Sax.)

Gabe, zehen Gran bis eine halbe Drachme, zwei oder drei Mal täglich.

Extractum Sabinae alcoholicum. (Wür.)

℞. Summitatum Sabinae,
Alcoholis, sing. . libram unam.
Aquae communis . libras octo.
Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone, liquorem decantha et alcohole destillando elicito, residuum vaporatione ad aptam consistentiam consume.

Electuarium de Junipero s. diureticum. (Sar.)

℞. Roob Juniperi,
Mellis purif, sing. libram unam.
Baccarum Juniperi uncias quatuor.
Cinnamomi,
Cort. sicci Aurant., sing. semunciam.
Roob et melli blando calore liquatis adde reliqua pulverata.

Solutio Roob Juniperi. (B⁶.)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Aquae Juniperi . . libras duas.
Mixtis bene adde
Tincturae Juniperi . uncias duas.
Aetheris nitrici . . semunciam.
Misce bene.

Reizend, von van Swieten bei Bauchwassersucht gerühmt. — Gabe, alle drei Stunden eine bis zwei Unzen.

Elixir juniperinum s. malvaticum juniperinum. (*Sp.*)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Vini Maderani uncias duodecim.
Mixta bene per linteum trajice.

Reizend, blähung- und harntreibend. — Gabe, ein Löffel auf einmal.

Potio juniperina s. hydragoga. (B⁶. *Au. Ca. Sa.*)

℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Aquae Juniperi . . libras duas.
Mixtis bene adde
Spiritus Juniperi . uncias duas.
Misce. (B⁶. *Au. Ca.*)

℞. Roob Juniperi . unciam unam.
Aquae Juniperi . . uncias sex.
Spiritus Juniperi . . semunciam.
— Nitri dulcis semidrachmam.
Misce. (*Sa*)

Gabe, alle zwei oder drei Stunden zwei Unzen.

Tinctura s. Essentia Sabinae. (Ham. HassP.)

℞. Foliorum Sabinae partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Stent per plures dies in digestione, tum colentur cum expressione et filtrentur.

HassP. ut tincturam croci.

Gabe, dreißig Tropfen mehrmals täglich.

Potio emmenagoga. (*E.*)

℞. Tincturae Sabinae unciam unam.
— Hellebori nigri semunciam.
— Castorei . drachmas duas.

Gabe, vierzig Tropfen dreimal täglich.

Tinctura Sabinae kalina s. arthritica. (B⁶. *Au. Sw. Vm.*)

℞. Fol. Sabinae rec. . unciam unam.
Tincturae alcalinae . uncias sex.
Stent in digestione per dies quatuor. (B⁶. *Au. Vm.*)

Ex tempore paratur solvendo Olei essentialis Sabinae drachmas duas in Tincturae alcalinae unciis sex.

Sw. Sabinae unciam unam et Tincturae alcalinae octo.

Ceratum s. Unguentum Sabinae. (Am. B⁶. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Fol. Sabinae rec. . partes duas.
Cerae flavae . . partem unam.
Axungiae Porci . partes quatuor.
Foliis cum axungia coctis ceram adde. (B⁶. Ba. Du. Ed. Lon. LonN. Suec. *Gr. Re. Sw. Vm.*)

Am. et *C.* miscere Cerati resinosi partes sex et Sabinae pulv. unam; —

Fi. Foliorum, Cerae et Axunglae eadem quant. ut antea, in vase ferreo lente coquere ad coloris viridis extractionem et humidi consumptionem; — *T.* Ceram et Axungiam liquatas cum Foliis ad humidi consumptionem coquere; — *Gr.* Folior., Cerae flavae, sing. semilibram, Adipis praep. libras duas.

Als epispasticum angewendet.

Oleum Baccarum Juniperi aethereum s. Baccarum Juniperi communis, Aethereoleum Baccarum Juniperi. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Bacc. Juniperi contus. . q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent et oleum separetur. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus R. Suec. *C. Gr. Re.*)

Ba. Baccarum partem unam et tres Aquae; — Fer. Ful. et *Sw.* Aquae quatuor; — D. et *Vm.* Aquae sex; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Aquae octo; — Bor4. et HassP. ut Bor., caeterum ut oleum absinthii, corticum aurantiorum, calami etc.; — Gal. Baccarum quinque et Aquae septem; — An. et *Br.* Aquae decem; — His. Aquae quadraginta; — LP. Macerationem per aliquot dies et destillationem; — *T.* Baccarum q. vis, Aquae duplum pondus; destillando dimidium vel duas partes quintae liquidi adhibiti elice, cohoba usque quantitas requisita sit obtenta.

℞. Baccarum Juniperi partes quatuor.
Aquae . . . . . partes sedecim.
Salis culinaris . . partem unam.
Post tres dies macerationis fiat destillatio. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Baccarum Juniperi . quantum vis.
Aquae Juniperi quantum sufficit.
Post horas duodecim fiat destillatio. (Wür.)

Gabe, zwei bis zehen Tropfen in einem Vehikel.

Oleum Ligni juniperini aethereum, Aethereoleum Ligni juniperini. (A. Han. Pal.)

℞. Ligni Juniperi . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Destillent. (Han.)

Pal. Ligni partem unam et sex Aquae; — A. Aquae duodecim.

Sar. Oleum obtinet destillando lignum raspatum prope ignem apertum et oleum foetidum a liquore claro, qui antea prodit, separando.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Juniperi. (BorC HassP.)

℞. Olei ess. Juniperi gutt. duodecim.
Sacchari pulverati . semunciam.
Triturando misce

HassP. Olei guttas quatuor, Sacchari drachmas duas.

Pulvis excitans. (*Au.*)

℞. Sacchari albi . . . semunciam.
Olei essent. Juniperi . guttas tres.
Terendo fiat elaeosaccharum, cui adde
Salis culinaris . drachmam unam.
Divide in partes duodecim. — Gabe, drei Stück täglich, bei weißen Gelenkgeschwülsten.

Oleum Sabinae aethereum, Aethereoleum Sabinae. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful Gal. Han. Hass. HassP. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. *C. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Foliorum Sabinae . quantum vis.
Aquae purae . quantum sufficit.
Destillent. (Ams. Ed. Fer. R. *C.*)

T. Sabinae partem unam, Aquae bull. duplum pondus, destillent et repetitae cohobationi subjiciantur; — Ful. et Sar. Sabinae partem unam et Aquae tres; — *Sw.* Aquae quatuor; — *Vm.* Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Aquae octo (caeterum ut oleum calami aethereum Bor4.); — A. Aquae duodecim; — An. Aquae viginti; — Gal. Aquae septem.

℞. Herb. Sabinae
part. viginti quinque.
Aquae . partes sexaginta quatuor.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. *Pid.*)

℞. Herbae Sabinae . quantum vis.
Aquae destillatae Sabinae . q. s.
Destillent. (Wür.)

Gabe, vier bis zwanzig Tropfen in einem Trank.

Potio emmenagoga. (*Ca. Ra.*)

℞. Aquae Artemisiae uncias quinque.
Syrupi Flor. Aurant.
unciam unam.
Aquae Flor. Aurant. . semunciam.
Olei ess. Rutae,
— — Sabinae, sing. guttas sex.
Kaffeelöffelweise.

Aqua Juniperi (*Baccarum et Foliorum*). (A. B*. Ba. BorC. Gal. Hass. HassP. Li. Sax. Wür. *Br. Fi. Gr. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi . partes duas.
Aquae . . . partes quindecim.

Destillent partes quatuor. (Gal.)

T. Baccarum partem unam, Aquae quatuor; destillent partes duae; — *B*. Ba.* Aquae quinque; destillent partes duae; — *Wür* Aquae duodecim; — *A.* Aquae decem; destillent partes sex; — *Br.* Aquae duodecim; destillent partes quatuor vel sex (*Hass. Li. Pid.*) vel duodecim (*Fi.*); — *Sax.* Aquae viginti duae; destillent quindecim; — *Sw.* Baccarum unam et Aquae q. s.; destillent partes viginti; — *HassP.* Baccarum libras tres, Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor.

℞. Fol. rec. Juniperi . partem unam.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— pur. part. centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta, oleum separa et aquam serva. (*Vm.*)

℞. Elaeosacch. Junip. drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Dissolve. (*BorC.*)

Aqua Sabinae. (Wür. *Pid.*)

℞. Herbae Sabinae . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Post macerationem viginti quatuor horarum destillent partes octo. (*Pid.*)

Wir. Sabinae partem unam et sex Aquae.

Spiritus Juniperi, Alcohol juniperatus. (*An. Bor4. Br. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pm. Wir. Wür. Gr. Pid. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis . . partes duodecim.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent. (*Ful. Hass. Pid.*)

An. et *Li.* Baccarum partem unam et Alcoholis octo; — *Br. Pal. Wir.* et *Wür.* Alcoholis duas; — *T.* Baccarum integrarum libras tres, Alcoholis 22° libras octo; post trium dierum digestionem destillent trientes duo; — *Gr.* Spiritus Frumenti bis supra Baccas rectificatas.

℞. Baccarum Juniperi partem unam.
Alcoholis (Spir. Vini rect.)
partes quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent (librae quatuor *Bor4. HassP.*). (*Bor4. Han. HassP.*)

Pm. Baccarum libram unam, Alcoholis 22° libras octo, Aquae sex, post digestionem per diem destillent librae octo.

℞. Bacc. Juniperi . libras quindecim.
Sacchari . . . . semilibram.
Fermenti Cerevisiae uncias duas.
Aquâ tepida infusa bene dilue et temperaturae + 15 — + 18° R. expone; post fermentationem alembico infunde; additis deinde duplo volumine Aquae et Spiritus Fumenti libris octo, destillet spir. 18 ad 20° indicans.

Spiritus Juniperi compositus, Aqua Juniperi composita, Alcohol Juniperi compositum. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Baccarum Juniperi . libram unam.
Carvi,
Foeniculi, sing. . sesquiunciam.
Aquae Vitae . . . octarios octo.
— purae . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent octarii octo. (Am. B. Bel. Ed. Lon. LonN. Suec. *C. Gr. Re. Sw.*)

Fi. Baccarum libram unam, Seminum Cumini, Anisi sing. sesquiunciam, Alcoholis 25° libras sex, Aquae comm. duas; destillent librae sex; — *T.* ut *Fi.* sed Alcoholem 30°, pro aqua simplici Aquam Flor. Aurant., duorum dierum macerationem et destillationem trientium circiter duorum.

℞. Baccarum Juniperi . partes sex.
Fol. rec. Ribium nigr.
partem unam.
Semin. Dauci sylvestris,
— Ribium nigr., sing.
partes duas.
Spir. Frumenti partes triginta sex.
Aquae purae partes centum et octo.
Destillent partes viginti quatuor. (*Vm.*)

Blähung- und harntreibend. — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Spiritus Sabinae. (Han. *Au.*)

℞. Herbae Sabinae . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Aquae purae . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor macerationis fiat destillatio.

Linimentum juniperinum. (*Au.*)

℞. Spiritus Juniperi . uncias duas.
Olei Caryophyllorum,
Bals. Nucist., sing. semidrachmam.

Von Rosenstein bei Ekchymosen und kalten Geschwülsten gerühmt. Chrestien wendet es in Einreibungen auf das Rückgrat und die Lenden bei Frauen, welche zu Mißfällen geneigt sind, an.

Linimentum resolvens et diureticum. (*B.*)

℞. Spiritus Saponis . . uncias tres.
— Juniperi . unciam unam.

Morgens und Abends auf den Unterleib eingerieben, bei Bauchwassersucht mit Atonie.

Linimentum excitans. (*Au.*)

℞. Spiritus Sabinae . . uncias sex.
Ol. ess. Sabinae drachmam unam.
In Einreibungen bei gichtiſchen Schmerzen.

Tinctura hydragoga. (*Bo.*)

℞. Rad. Aristolochiae rot.,
— — long., sing.
sesquiunciam.
Radicis Zingiberis,
— Armoraciae,
Bulbor. Scill. sicc., sing.
semunciam.
Summitatum Absinthii,
— Centaurii minoris,
Bacc. Juniperi, sing.
unciam unam.
Salis Absinthii . . . semunciam.
Alcoholis Juniperi . . libras sex.
Post dierum octo macerationem filtra. — Reizend, harntreibend, von Boerhaave bei Waſſerſucht empfohlen. — Gabe, eine Unze täglich viermal.

Infusum Baccarum Juniperi. (B*. BorC. RC. WW. *Au. Ra.*)

℞. Bacc. Junip. contus. sesquiunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Digere in vase tecto per horam dimidiam et cola. (BorC. WW. *Au.*)
Ra. Baccar. drachmas duas et Aquae libras duas; — B*. Bacc. unciam et Aquae satis ut colaturae unciae tres obtineantur; — RC. Bacc. unciam, Aquae libram; stent per horam. Interdum adduntur: Aetheris sulph. alcoholis. drachmae duae vel Tinct. aromat. vel Calami semuncia.
Aromatiſch, ſchwach urintreibend, bei Waſſerſucht empfohlen. — Glasweiſe.

Infusum Sabinae. (RC. *Au.*)

℞. Herbae Sabinae drachmam unam
Aquae bullientis . uncias septem.
Infunde et cola. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. — Rau rühmt es bei ſogenannten aſtheniſchen Entzündungen des Uterus und der Blaſe.
RC. ut infusum baccarum juniperi.

Infusum Juniperi s. Baccarum Juniperi compositum s. diureticum. (*Gr. Sa.*)

℞. Bacc. Junip. contus. uncias duas.
Aquae Juniperi ; . libras duas.
Digere blando calore per horas tres, cola et adde
Roob Juniperi . . uncias duas.
Oxymellis scillitici . sesquiunciam.
Misce. — Harntreibend. (*Sa.*)
℞. Baccarum Juniperi . uncias duas.
Aquae ferventis . octarium unum.
Macera per bihorium, cola et adde
Spiritus Juniperi compositi
unciam.
Potassae Supertartratis
sesquidrachmam.
(*Sprague. Gr.*)
℞. Baccarum Juniperi . uncias duas.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Aquae ferventis . . . . libram.
Liquoris expressi unciis duodecim adde
Spiritus Juniperi. . uncias duas.
Tincturae Scillae . . drachmam.
Salis Nitri . . . scrupulos duos.
Gabe, einen Theelöffel voll öfters. (*Gr.*)

Decoctum Juniperi. (*Fi. Sa. Sw.*)

℞. Summitatum Juniperi uncias tres.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et sub finem adde
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cola. — Reizend, harntreibend, bei Waſſerſucht, Aſthma und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, vier bis acht Unzen täglich drei Mal.

Decoctum Ligni Juniperi. (B*.)

℞. Ligni Juniperi raspati semunciam.
Aquae fontanae . uncias sedecim.
Decoque ad dimidium et cola. — Reizend, ehedem bei der Behandlung veneriſcher Krankheiten geprieſen. — Der Kranke verbraucht täglich acht Unzen.

Decoctum Sabinae. (B*.)

℞. Herbae Sabinae . unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Decoque ad unciarum sex liquidi remanentiam, cola et adde
Syrupi cujuslibet . unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel.

Potus diureticus, Tisana diuretica. (*Sm. Sw.*)

℞. Bacc. Junip. contus.
manip. unum.
Aquae semisextarios (semi-setiers)
tres.
Coque per semihoram et colat. adde
Syr. Polygalae Virg. uncias duas.
Vini albi . . . . uncias octo.
Misce. (*Sm.*)
℞. Baccarum Juniperi,
Semin. Sinapis, sing.
unciam unam.
— Dauci . . drachmas sex.
Foliorum Absinthii drachmas tres.
Cerevisiae . . . libras quatuor.
Infunde frigide et cola. (*Sw.*)

Decoctum Fructuum s. Baccarum Juni-

peri carminativum, *Fotus carminativus*. (His. His3.)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,
Sal. Ammoniaci, sing.
unciam unam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque leviter, cola et colaturae adde
Alcoholis Vini . . libram unam.

Vinum juniperinum s. diureticum. (*Au.*)

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Sinapis,
Armoraciae, sing. . semunciam.
Kali subcarbonici . semilibram.
Vini Rhenani . octarios quatuor.
Post aliquot dies cola.

℞. Radicis Zedoariae,
— Scillae,
Bacc. Juniperi, sing.
drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Kali subcarbonici sesquidrachmam.
Vini Rhenani . . sesquilibram.
Post sufficientem extractionem cola.

Unguentum Juniperi. (*Vm.*)

℞. Gemmar. Junip. contus.
partem unam.
Axungiae Porci liq. . partes duas.
Macera per horas duas et cola fortiter exprimendo.

Ceratum Juniperi Virginicae. (Am. C.)

℞. Fol. Junip. Virg. . partem unam.
Cerati resinosi . . . partes sex.
Misce.

Justicia.

Justicia pectoralis, *L.*; Zimmermannswundholz; Carmantine pectorale, Herbe aux charpentiers (*Gal.*)
Gal. *Gr.*

♃ (Diandria Monogynia, L.; Acanthaceae, *J.*) Eine auf den Antillen wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. III. t. 3)

Das Kraut, welches angewendet wird, besteht aus vier kantigen, knotigen, glatten Stängeln mit entgegengesetzten, linienlanzettförmigen, spitzigen, ganzen, glatten Blättern. Es ist schwach adstringirend.

K.

Kadmium.

Zincum Silesiacum, *Cadmium*; Cadmium.

Ein sehr seltenes, erst seit wenigen Jahren entdecktes Mittel. Von den Zusammensetzungen desselben wendet man an:

Oxydum Kadmii. (B*.)

℞. Zinci Silesiaci . . . . q. vis.
Acidi sulph. ten. . . . . q. s.
ad solvendum, caloris ope, minerale; per liquorem refrigeratum et filtratum transmitte torrentem Gasis acidi hydrosulphurici; praecipitatum elotum per Acidum hydrochloric. liq. calidum tracta, et solutione fere ad siccum evaporata et Aquâ residuo additâ, Ammoniacum caust. affunde; praecipitatum lotum sicca.

Scheint reizend und, selbst in kleiner Gabe, giftig zu wirken.

Sulphas Kadmii. (B*. *T.*)

℞. Oxydi Kadmii . . . . q. vis.
Acidi sulph. . . . . q. s.
ad dissolutionem. Liquorem vaporando in crystallos coge.

Aqua ophthalmica. (B*.)

℞. Sulph. Kadmii . gr. duo ad octo.
Aq. destill. . . . unciam unam.

Von Gräfe äußerlich bei chron. Augenentzündung gerühmt.

Kalmia.

Kalmia latifolia, *L.*; großblättrige Kalmie; Kalmie à larges feuilles (*Gal.*); Montain laurel (*Ang.*).
C. Re.

♃ (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, *J.*) Eine Pflanze Carolina's und Virginien's. (*Trew Ehret.* t. 38. f. 1. *Catesb.* t. 98. *Pluk.* Alm. t. 379. f. 6. *Wangenheim* t. 24. f. 50.)

Die Blätter sind eirundlänglich, fest, glatt, ganz, zwei bis drei Zoll lang und einen Zoll breit.

Adstringirend.

Decoctum Kalmiae latifoliae. (B*.)

℞. Foliorum Kalmiae unciam unam.
Aquae fontanae . . uncias octo.
Decoque ad dimidium et cola. — Bei chronischem Durchfall empfohlen. — Gabe, sechzig Mal dreißig Tropfen, bis der Kranke Schwindel empfindet.

Kikekunemalo.

Resina Kikekunemalo.

Br. Wir. *M. Sp.*

Ein grünliches, halbdurchsichtiges, brüchiges Harz aus America, in dessen Bruche sich gelbe Körner zeigen, von angenehmem Geruch und etwas bitterem Geschmack.

Nach Guibourt ist es eine Art Anime. Nach Virey kommt es von Bursera gummifera. Man gebraucht es jetzt nicht mehr.

Kino.

Gummi Kino, Gummi Gambiense, Gummi adstringens Fothergilli; Kinoharz, Kinogummi, Gambienser Gummi; Kino, Gomme Kino, Gomme de Gambie (*Gal.*); Tumble hoan (*Tam.*); Dummulackwayn, Kandamurgarittum (*Tel.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. *A. Br. C. Fi. G. Gr M. Par. Re. Sp.* Z.

Man unterscheidet vorzüglich drei Arten Kino.

1) In unregelmäßigen, trocknen, brüchigen, dunkelbraunen, auf dem Bruche fast schwarzen und glänzenden, undurchsichtigen, geruchlosen, adstringirend und etwas bitter schmeckenden Massen. Man hält es für die bis zur Trockenheit abgedunstete Abkochung der Zweige von Nauclea longiflora, *Poir.* (Pentandria Monogynia, L.; Rubiaceae, *J.*), einem Strauche Indien's. (*Rumph* Amb. V. t 34. f. 1.)

2) In sehr kleinen, glänzend schwarzen, undurchsichtigen, aber durchscheinenden, zu dünnen Blättchen zerkleinert, rubinrothen, geruchlosen, deutlich adstringirend schmeckenden Stücken. Es wird für das Product der Abkochung des Holzes von Coccoloba uvifera (Octandria Digynia, L.; Polygoneae, *J.*), einem Baume Jamaica's gehalten.

3) In löcherigen, trüben, an manchen Stellen röthlichen, glänzenden, an andern schwarzen, geruchlosen Massen von adstringirendem Geschmack. Es scheint aus dem Stamme der Eucalyptus resinifera, *Sm.* (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*), einem Baume Neuholland's, (*White* Itin. 23) zu fließen.

Das wahre Kino kömmt nach Dr. Paris (*Rc.*) von Pterocarpus erinacea.

Es enthält viel Gerbestoff und Extractivstoff, doch kennt man seine Bestandtheile nicht genau. — Eisen-, Silber- und Bleisalze, so wie Gallerte dürfen nicht damit verbunden werden.

Kräftig, adstringirend. — Gabe des Pulvers, zehen Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis Kino compositus s. stypticus s. Kino gummosus s. adstringens. (Lon. LonN. LP. RC. *Au. C. Ca. Gr. Re.*)

℞. Kino . . . drachmas quindecim.
Cinnamomi . . . . semunciam.
Opii . . . . drachmam unam.

Gabe, ein Scrupel, bei innern Blutflüssen. (Lon. LonN. *C. Ca. Gr. Rc.*)

℞. Kino . . . . . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.

Fiat pulvis. — Äußerlich bei Blutungen. (*Au.*)

℞. Kino . . . . . drachmas duas.
Katechu,
Aluminis, sing. . sesquidrachmam.
Zingiberis albi . . grana sedecim.

Misce exacte. (LP.). — Bei Blutflüssen, Wechselfieber, Diarrhöe, weißem Fluß. — Gabe, sechs bis zwölf Gran und mehr, allmälig steigend.

Pilulae e Kino et Camphora. (*Au.*)

℞. Kino . . . . . scrupulos duos.
Camphorae . . sesquiscrupulum.
Pulver. aromat. scrupulum unum.
Zinci oxydati . scrupulum unum.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends, bei Harnruhr

Pilulae ad diarrhoeam s. antidiarrhoeicae. (*E.*)

℞. Kino . . . . . grana viginti.
Opii . . . . . grana duo.
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.

Fiant pilulae quatuor. — Gabe, alle Stunden ein Stück.

Pilulae stimulantes ad gonorrhoeam s. adstringentes. (*Sy.*)

℞. Kino . . . . . semunciam.
Balsami Canadensis uncias duas.
Radicis Tormentillae . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quinque.

Electuarium adstringens. (*Sw.*)

℞. Kino . . . . . drachmas sex.
Aluminis,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Durchfall, chronischer Ruhr und Blutflüssen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

Potio adstringens. (*ParC.*)

℞. Rosarum provinc. drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde per horas duas, cola et adde
Kino . . . . semidrachmam.
Aquae Rabelii . . guttas viginti.
Syr. Cort. Granati unciam unam.

Injectio adstringens. (*Sw. Sy.*)

℞. Kino grana viginti ad triginta.

Aquae bullientis . libram unam. Post unius horae infusionem cola. (*Sy.*)

℞. Kino . drachmam unam ad duas. Aluminis grana viginti ad triginta. Aquae bullientis . . libras duas. Post unius horae digestionem cola. (*Sw.*)

Bei chroniſcher Harnröhrenentzündung.

Mixtura roborans. (*Sw.*)

℞. Kino . . . . drachmas duas. Nitri . . . . . drachmam unam. Mucilag. Gummi Arab. uncias duas. Electuarii adstring. drachmas duas. Misce triturando et sensim addendo Aceti . . . . . sesquiunciam. Aquae Cinnamomi . uncias sex. Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Bei Mutterblutfluß. — Gabe, einen oder zwei Löffel, alle vier oder ſechs Stunden.

Syrupus Kino. (*Br*. T.*)

℞. Kino pulv. gr. sexcenta nonaginta. Aquae purae . . libras septem. Sacchari albi . . . libras duas. Tritura per horae quadrantem in mortario marmoreo pulverem cum Aquae bull. fere simul infusae libris quatuor. Liquorem refrigeratum filtra et colaturam repone. Residuo reliquas Aquae ad 60° calefactae libras tres adde et utramque solutionem commisce. Saccharo clarificato et ad electuarii consist. cocto solutionem adde et ad syrupi consist consume.

T. Kino purif uncias duas, Aquae tepidae libras tres; solutioni adde Sacchari libras quatuor.

Tinctura Kino. (Am. An. B*. Bel. Du. Ed. Fer. Ful. HassP. Li. Lon. LonN. Lus. Sax. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Kino . . . . . uncias tres. Alcoholis (0,930) . octarios duos. Post dies quatuordecim filtra. (Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

Du. *Gr.* Kino uncias tres, Alcoholis (0,930) sesquioctarium; — B*. Ed. *Gr.* Kino uncias duas et Alcoholis (0,935) sesquilibram; — Lon. 1809. *Gr.* Kino uncias duas, Alcoholis libras duas; — Fer. et *Sw.* Kino uncias duas, Alcoholis (0,935) libram et octo uncias Aquae Cinnamomi; — Bel. Kino partem unam et octo Alcoholis (20°); — *Br.* sedecim Alcoholis (0,935); — Sax. quinque Spiritus rectif.; — *Vm.* sex Alcoholis; — Lus. Kino uncias duas, Aquae Vitae sesquilibram; — Ful. Kino drachmas duas, Aquae Cinnamomi simpl. sesquiunciam et Aquae Cinnamomi vinos. semunciam; — Li. Kino uncias duas, Aquae dest. uncias sex et Spiritus Nitri dulcis tantidem; — HassP. Kino uncias duas, Spiritus Vini rectif. sedecim, sex dierum digestionem calore 20 ad 24°; pondus tincturae filtratae uncias quatuordecim aequet. — *T.* Kino unciam unam, Alcoholis 25° B. sedecim, digere per dies duodecim vel quindecim, — *Fi.* Kino uncias novem, Alcoholis 24° libras tres, macerata per dies quatuordecim filtra.

RC Kino sesquiunciam, Corticis Lauri Cassiae unciam unam, Alcoholis diluti libram unam.

Gabe, eine Drachme bis halbe Unze.

L.

L a c.

Milch; Lait (*Gal.*); Milk (*Ang.*); Lebn (*Ar.*); Leche (*His.*); Dud (*Hin.*); Melk (*Bel.*); Latte (*I.*); Schir (*Pe.*); Khschira, Payas, Dughda (*Sa.*); Jaelk (*Suec.*); Leite (*Lus.*).

Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. His. Hi3. LH. LP. Suec. Wir. *A. G. Gr. Pid. Sp T.*

Eine undurchſichtige, weiße, etwas fettige, und ſchwerere Flüſſigkeit als Waſſer, welche die Bruſtdrüſen weiblicher Säugthiere kurze Zeit nach der Geburt abzuſondern anfangen. Sie hat einen ſüßen, angenehmen, mehr oder minder zuckerartigen Geſchmack und einen eigenthümlichen Geruch, welcher ſich in dem Maaße, wie ſie erkaltet, verliert.

Man wendet drei Arten Milch an:

1) *Lac vaccinum s. bubulum*, Kuhmilch; Lait de vache (*Gal.*); Cow's milk (*Ang.*); Ellakerrie (*Cy.*); Ghayka dud (*Duk.*); Gaicha dud (*Mah.*); Susu (*Mal.*); Gokschira (*Sa.*); Paschuin paal (*Tam.*); Au palu (*Tel.*)

2) *Lac caprinum*; Ziegenmilch; Lait de chèvre (*Gal.*); Goat's milk (*Ang.*); Jlukirie (*Cy.*); Chaylie ka dud (*Duk.*); Leche de cabra (*His.*); Ajakschira (*Sa.*); Aatu paal, Vellatu paal (*Tam.*); May ka palu. (*Tel.*).

3) *Lac asininum*; Eſelsmilch; Lait d'ânesse (*Gal.*); Asses' milk (*Ang.*); Cotalukirie (*Cy.*); Gadika dud (*Duk.*);

Ghaduva tcha dud (*Mah.*); Kharakhira (*Sa.*); Kalady paal (*Tam.*); Gadilay paalu (*Tel.*).

Die beiden erstern sind einander sehr ähnlich; die letztere enthält weit mehr Rahm als sie.

Ueberläßt man die Milch sich selbst, so trennt sie sich nach einiger Zeit in drei Theile:

1) den *Cremor*; Milchrahm; Crème (*Gal.*); Graedda (*Suec.*);

2) das *Caseum, Caseus*; Käse; Fromage (*Gal.*); Queijo (*Lus.*); und

3) das *Lac ebutyratum, Serum*; Buttermilch; Sérum (*Gal.*); Dogh (*Ar.*); Schaatssh (*Duk.*); Mutha (*Hin.*); Takram, Dandabatam (*Sa.*); Moru (*Tam.*); Tsalla (*Tel.*).

Schlägt man den Rahm, so erhält man die Butter, *Butyrum*, Beurre (*Gal.*); Butter (*Ang.*); Manteca de vacca (*His.*); Manteiya (*Lus.*); Boter (*Bel.*); Burro (*I.*); Smaer (*Suec.*).

A. Ams. B. Ba. Bel. Gal. Hass. His. His3. Li. Pal. Sax. Suec. WW. *G. Gr. Pid. Sp.*

Eine fette und derbe Substanz, von weißer oder gelber Farbe, angenehmem Geschmack und etwas würzigem Geruch, welche, nach Chevreul, Käsestoff, Buttermilch, Elain, Stearin, einen färbenden Stoff, etwas Buttersäure und ein Oel enthält. Die ungesalzene Butter (Butyrum insulsum *Gr.*) wird unmittelbar aus dem Rahm ohne Salz, durch Schlagen bereitet. Sie wird zu Salben gebraucht. Die gereinigte Butter (Butyrum purificatum) wird aus frischer Butter bereitet, indem man sie bei gelinder Wärme schmelzt, sich setzen läßt, und das Klare in ein in kaltes Wasser gestelltes Gefäß gießt.

Der Käsestoff, welchen man in dem Kälberlab findet, führt den Namen présure (Gal. Gen.). Er ist mit Essig-, Salz- und Buttersäure vermischt, welche die Wände dieses Magens absondern, wodurch er einen sauren Geruch bekommt.

Dampft man die Molken ab, so erhält man das

Saccharum Lactis; Milchzucker; Sucre de lait (*Gal.*); Milksugar (*Ang.*); Melksukker (*D.*); Melkzuiker (*Bel.*); Zucchero di latte (*His. I.*).

Ams. Ba. Bor Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Fi. G. Gr. Pid. Sp. T. Vin.*

Eine in weißen Parallelepipeden crystallisirende, halbdurchsichtige Substanz von etwas zuckerartigem, fadem und erdigem Geschmack.

Hydrogale. (*Ra.*)

℞. Lactis vaccini . uncias quatuor.
Aquae Hordei . . . libras duas.

Pulvis pectoralis. (B*.)

℞. Sacchari Lactis . unciam unam.
Gummi Arabici drachmas quinque.
Elaeosacch. Foenic. drachmas tres.

Potus Sacchari Lactis, Tisana pectoralis (*Au.*).

℞. Sacchari Lactis . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.

L a c c a.

Unter diesem Namen sind zwei verschiedene Substanzen bekannt:

1) *Lacca, Gummi Laccae*; *Καγκαμον*?; Lack, Gummilack; Laque, Gomme Laque (*Gal.*); Lake (*Ang.*); Lak (*Ar.*); Kambalo (*Ba.*); Lakada (*Cy.*); Lacca (*His. Lus.*); Lak'h, Lahi (*Hin.*); Balo (*Ja.*); Ambalu (*Mal.*); Leka (*Pol.*); Lakscha (*Sa.*); Lacka (*Suec.*); Komb-urruk (*Tam.*), Commolekka (*Tel.*).

Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. E. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HasP. His. His3 Li. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. T.*

Man unterscheidet zwei Sorten Lack.

1) *Lacca in ramulis s. ramis s. baculis*; Stocklack, Stablack, Stangenlack: Laque en bâtons (*Gal.*); Sticklac (*Ang.*). Es ist mehr oder weniger dunkelroth, fast durchsichtig, ungleich, uneben, hart, zerreiblich, und bildet eine einige Zoll lange, eine Linie dicke Rinde um ein kleines Stöckchen, um welches es jedoch selten ganz herumgeht. Auf seiner Oberfläche bemerkt man viele Löcher, welche mit eben so viel eirunden, unregelmäßig neben einander liegenden Zellen zusammenhangen und aus denen ein weißer filziger Stoff hervorkommt.

2) *Lacca in granis s. seminibus*; Körnerlack; Laque en grains (*Gal.*); Seed Lac (*Ang.*); es sind Stücke des vorigen, von den Zweigen losgebrochen.

3) *Lacca in tabulis s. massis*; Schellack; Laque en masses ou en pains (*Gal.*); Lamplac. Shell lac (*Ang.*); in dünnen Plättchen oder Schuppen, welche durch Schmelzen des vorigen von Unreinigkeiten befreit worden sind.

Das Lack wird durch den Stich des Weibchens von Coccus Laccae, *Ker.*, Coccus Ficus, L., eines halbflügeligen Insects Indien's (Journ. compl. des Sc. méd. T X. p 20.) in der Rinde vieler harziger Bäume hervorgebracht, unter denen man besonders unterscheidet: Ficus religiosa, L., Ficus indica, L., Croton castaneifolium, L., und lacciferum (Lacca Zeylanica), Erythrina monosper-

ma, Rhamnus Jujuba, L., Mimosa cinerea, *Willd.* und Mimosa Corinda, *Willd.* Virey hegt, und wahrscheinlich mit Recht, Latreille entgegen, die Meinung, daß das Harz nicht von dem Insect selbst ausgearbeitet werde, sondern nur nach dem Stiche desselben ausfließe, und daß nur die schöne purpurrothe Farbe desselben von dem Weibchen und den Eiern des Insects herrühre.

Es besteht, nach Funke, aus Harz, einem eigenthümlichen Stoffe, dem Lackstoff (Laccinum), Laccin (*Gal.*), welcher zwischen Wachs und Harz steht, und einem thierischen Farbestoff. John will auch eine eigenthümliche Säure, die Lacksäure (Acidum laccicum), Acide laccique (*Gal.*), darin gefunden haben.

2) *Lacca coerulea, Lacca musica, Tornasolis coerulea, Laccae muscus, Lacmus, Bezetta coerulea, Lacmus tinctorius, L. tinct. albo-coeruleus;* blauer Lack, Lackmus; Tournesol (*Gal.*); Litmus (*Ang.*); Lackmus (*Bel.*).

HassP. *Fi. Gr. Re. T.*

Ein Farbestoff, von welchem man zwei Sorten im Handel unterscheidet:

1) Lackmus in Brodten oder Steinen, Tournesol en pains ou en pierre (*Gal.*). (A. Bel. Br. Du. *G. Gr. M. Re. Sp.*), in kleinen, geraden Parallelepipeden von blauer Farbe, welches man aus mehreren Flechtenarten, z. B., Lichen calcareus, parellus, roccella etc. bereitet, indem man sie pulvert, mit Weinhefenasche und Kalk mischt und mit Menschenharn gähren läßt.

2) Lackmus in Lappen; Tournesol en drapeaux, Becetta, Nezetta (*Gal.*), (*Gal. Gr.*), alte Lappen, welche mit dem Safte der Spitzen von Croton tinctorium, L. (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, *J.*), einer Pflanze (*Lob.* Ic. 26) des südlichen Europa's, getränkt, dann getrocknet und dem Dunste eines Gemisches von Harn und ungelöschtem Kalk so lange ausgesetzt worden sind, bis sie eine blauviolette Farbe bekommen haben.

Infusum Laccae coeruleae (*Gr.*). Reagens.

Tinctura aquosa Laccae s. Gummi Laccae aquosa. (Bor4. Br. His. His3. Pal. R. Sar. Sax. Wir. *Sp. T.*)

℞. Laccae in granis pulv. part unam,
Aluminis crudi partem dimidiam.
Aquae destillatae . partes octo.
Coque ad dimid.; post refrigerat. adde
Aquae Rosarum rubrarum,
— Salviae, sing. partes duas.
Filtra. (R. Sax.)

Fi. et *T.* Aquae dest. partes sex, Aquae Rosar. et Salviae, sing. tres, caeterum ut antea.

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Aluminis . . . . semunciam.
Aquae Rosarum . . libras duas.
Digere in vase tecto et liquorem rubro colore bene impraegnatum filtra. (His. His3.)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.
Aluminis crudi sesquidrachmam.
Aquae Salviae . . uncias tres.
— Rosarum . sesquiunciam.
Coque et filtra. (*Sp.*)

℞. Laccae electae . unciam unam.
Aluminis crudi pulv. drach. unam.
Aq. Salviae,
— Rosarum,
— Cochlear., sing. uncias duas.
Coque lente et cola. (Sar.)

Br. Laccae unciam, Aluminis drachmas duas et Aquarum, sing. uncias duas; — Wir. Laccae unciam, Aluminis sesquidrachmam et Aquarum, sing. sesquiunciam.

℞. Laccae . . . . drachmas sex.
Aluminis . . . drachmas duas.
Aquae Salviae,
— Brunellae,
— Cochlear., sing. libram unam.
Stent in digestione absque bullitione, donec liquor colore rubro bene sit impraegnatus et cola. Addere potes Caryophyllorum scrupulos duos. (Pal.)

Reizend, für antiscorbutisch gehalten. — In Waschungen und Gurgelwassern angewendet.

Alcohol cum Lacca, Tinctura Laccae alcoholica. (Ams. Ful. Pm. *T. Vm.*)

℞. Laccae in ramulis pulv part. unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Infunde per horas duodecim in balneo aquae et filtra. (*Vm.*)

Ams. Laccae partem unam, Alcoholis (0,884) octo et octo dies infusionis; — Ful. Laccae partem unam et Spiritus Cochleariae sedecim; — Pm. Laccae unam, Alcoholis cum Cochlearia octo et dies sex digestionis; — *T.* Laccae unciam, Alcoholis 36° libram; digere.

Bei Krankheiten des Mundes und Zahnfleisches von Schwäche, meist in Form von Gurgelwasser oder collutorium; sie scheint nur vermittelst des darin enthaltenen Alcohols zu wirken.

Tinctura Laccae s. Gummi Laccae composita s. gingivalis balsamica s. Laccae alcoholica composita (Ba. Fer. LH. Lus. R. Sar. Suec. Wür. *Gr.*)

℞. Laccae pulveratae unciam unam.

Myrrhae electae . . uncias tres.
Spiritus Cochleariae sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola. R. Suec.)

Gr. Laccae uncias quatuor, Myrrhae duas, Spir. Cochleariae octarios sex; — Lus. Laccae unciam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies macerationis; — Fer. Laccae unam, Myrrhae drachmas duas et Spiritus Cochleariae sesquilibram; — LH. Laccae Myrrhae, Catechu, sing. drachmas sex, Bals. Peruv. unam, Alcoholis 32°, Spir. Cochlear., sing. uncias quatuor, digere per quatriduum.

℞. Laccae pulveratae . uncias duas.
Alumin. crudi pulv.
sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere ex arena tepida et cola. (Sar.)

Wür digerere Laccae semunciam et Aluminis scrupulos duos in una libra Spiritus Cochleariae, donec liquor pulchrum acceperit rubrum colorem; — Lus. Laccae unciam, Myrrhae drachmas tres, Spiritus libras duas et octo dies digestionis; — Ba. Laccae partes quinque, Aluminis unam, Aquae triginta sex et Spiritus quinque.

Schwach reizend, in Waschungen, Gurgelwassern oder Collutorien, bei Mundgeschwüren von Asthenie. Die nach der zweiten Formel bereitete Tinctur ist wirksamer als die andere und adstringirend.

Tinctura antiscorbutica s. gingivalis balsamica. (LP.)

℞. Myrrhae,
Kino, singulorum . semunciam.
Gummi Laccae . unciam unam.
Balsami Peruviani
drachmam unam.
Spiritus Cochleariae sesquilibram.
Macera per dies sex, cola ac filtra.

Tinctura Laccae kalica s. Laccae cum Spiritu Cochleariae officinalis. Alcohol cum Cochlearia et Lacca. (Bo. Ham. Hass. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Laccae in granis unciam unam.
Myrrhae electae . . semunciam.
Pulveratis infunde
Olei Tartari p. deliq. semunciam.
In pastam redige, blando igne siccandam et massae pulveratae infunde
Spiritus Cochleariae uncias sex.
Post tres aut quatuor dies digestionis filtra.

Fi. et *T.* Laccae pulv. unciam, Kali subcarb. drachmas duas; mixta in patina porcellanea per duos dies aëri stent exposita, quo facto infundantur Spiritus Cochleariae libras unam et digerantur etc. (Si loco spir. cochl. Alcoh. purum adhibetur, *Tincturam Laccae spirituosam s. Alcoholem cum Lacca* habes *Fi.*)

Boerhaave empfahl diese Tinctur innerlich bei Gicht und Rheumatismen, äußerlich bei scorbutischen Affectionen des Mundes und des Zahnfleisches. Er gab sie in Spanischem oder Madera-Wein. Das kohlensäuerliche Kali ist die Hauptursache ihrer Wirksamkeit.

Tinctura Laccae alcoholica s. spirituosa s. aluminata. (An. His. His3. Sar. Wür.)

℞. Laccae pulveratae . uncias duas.
Alum. crudi pulv. sesquidrachmam.
Spiritus Cochleariae libram unam.
Digere in arena tepida et cola. (Sar.)

Wür. Laccae semunciam, Aluminis scrupulos duos et Spiritus libram unam; — An. Laccae unciam unam, Aluminis drachmas duas et Spiritus libram unam.

℞. Laccae pur. contus. unc. unam.
Aluminis in Aqua dissoluti
sesquidrachmam.
Spir. Cochlear. aut Lepidii
uncias octo.
Digere donec liquor bene ruber sit factus et filtra. (His. His3)

Ebenso gebraucht wie die einfache Tinctur, außerdem ist sie etwas adstringirend.

Tinctura Laccae coeruleae. (*Fi. T.*)

℞. Laccae in panibus quantum libet.
Alcoholis diluti 20° B. . . q. s.
Digere, subinde agitando, per dies aliquot, decantha per chartam etc.

Die *Tinctura Laccae coeruleae aquosa*,

℞. Laccae pulv. . drachmam unam.
Aquae dest. bull. sesquiunciam.
Solutionem filtra. (*Fi.*)

bekommt zwar eine intensiver blaue Farbe, ist aber leichter der Verfärbung und dem Verderben unterworfen. (*T.*)

Charta exploratoria coerulea. (Bor4. *T.*)

Laccae muscus in pulverem tritus quatuor Aquae partibus infundatur et per viginti quatuor horas reponatur, vas subinde agitando. Liquore filtrato illinantur segmenta chartae albissimae expansa, quae siccata in vasis bene clausis loco umbroso serventur. (Bor4.)

T. ut chartam exploratoriam aurantiam parari.

Charta exploratoria rubefacta s. rubra. (Bor4. HassP. *T.*)

Charta exploratoria coerulea Aceto destillato aut Acido muriatico valde diluto rubro inficiatur colore, tum siccetur et servetur. (Bor4. *T.*)

HassP. Acidum Aceti vel Phosphori adhibet.

Lacryma Iobi.

Coix Lacryma, L., ovata.; Hiobsthränen; Larme de Job (*Gal.*).

Wir. *Sp.*

☉ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, *J.*) Eine oſtindiſche Pflanze. (*Rumph* Amb. 5. t. 75. f. 2.)

Man wendet den Saamen (semen Lacrymae Job s. Lithagrostis) an; er iſt bläulichweiß, glänzend, ſehr hart, eirund und am Ende etwas ſpitzig.

Er galt ehedem als harntreibend.

Lactuca.

Man wendet in der Medicin an:

1) *Lactuca sativa, L.*; Lattich, Gartenſalat; Laitue cultivée (*Gal.*); Gardenlettuce (*Ang.*); Salat, Locyka (*B.*); Laktuk (*D. R. Suec.*); Leschuga (*His.*); Gewoone salade, Lataw (*Bel.*); Lattuca (*I.*); Loczyga (*Pol.*); Leituga (*Lus.*).

Br. Ed Fer. Gal. GalM. His. HisS. LonV. Wir. *Be. Br. C. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

☉ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in Gärten gebaute Pflanze, wo ſie viele Varietäten hervorbringt. (*Blackw.* t. 88. *Plenck* t. 594. *Hayne* VII. 30. Fl. méd. IV. 213.)

Man wendet das Kraut und die Saamen an.

Das Kraut (herba Lactucae) beſteht aus länglichen, eirunden, welligen Blättern von ſüßlichem, wäſſerigen Geſchmack. — Die Saamen ſind länglich, platt, an beiden Enden ſpitzig und grau.

2) *Lactuca Scariola, L.*; wilder Lattig, Wildlattich, Leberdiſtel, wilder Salat; Laitue sauvage (*Gal.*).

A. Am. Fer. Gal. Li. Wir. *Fi. G. Gr.*

☉ oder ♂. Eine in Europa wachſende Pflanze. (*Hayne* I. 46. *Zorn* Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Lactucae sylvestris s. Scariolae an; es beſteht aus abwechſelnden, ſitzenden, umfaſſenden, länglichen, am Grunde pfeilförmigen, oben ſpitzigen, meiſt fiederſpaltigen, am Rande mit einigen dornigen Zähnen verſehenen, glatten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern Geſchmack.

3) *Lactuca virosa, L.*; giftiger Lattich, ſtinkender Lattich, Giftlattich; Laitue vireuse (*Gal.*); Strong scented lettuce, Hemlock lettuce (*Ang.*); Locyka lesnj neb plana (*B.*); Stinkende laktuk (*D.*); Stinkenda salade (*Bel.*); Salata jadowita, locyga dzika (*Pol.*); Alsace brava (*Lus.*).

An. Ba. Bor4. Br. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. LH Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Br. C. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

☉ oder ♂. Eine Europäiſche Pflanze (*Schk.* t. 217. Düss. off. Pfl. IV. t 22. *Hayne* I. 47. *Zorn.* Ic. pl. t. 285. *Bert.* Bild. V. 38. f. 2.

Man wendet das Kraut (herba Lactucae virosae s. sylvestris majoris odore opii s. Intybi angusti) an; es beſteht aus abwechſelnden, ſitzenden, umfaſſenden langen, eingeſchnittenen, an der Spitze ſtumpfen Blättern, von denen die untern buchtig und gezähnelt ſind. Es hat einen widerlichen Geruch und einen ſcharfen und ſehr bittern Geſchmack.

Gr. führt noch L. perennis, deſſen Kraut die menses beſchränkt und L. elongata an.

Der Gartenſalat wird als beruhigend betrachtet, wirkt aber ohne Zweifel nur erweichend. — Gabe des Safts, eine halbe bis zwei Unzen. Der Giftlattig iſt außerordentlich ſtark reizend, wirkt auf das Nervenſyſtem und vermehrt die Urinabſonderung.

Extractum s. Succus spissatus Lactucae virosae. (A. An Bel. Bor4. Ed. Ful. Han. Hass HassP. Li. R. Wir. Wür. *Br. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis. Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo, exprime succum et illum statim in aquae balneo, agitando continuè sub finem spatulae ope, consume. (Ed. Ful. Ham. Li. R. Wür. *Br.*)

Sw contundere Folior. libras decem, Aquae sex affundendo, succum exprimere et illum semel ebullitum vaporando consumere; — HassP. ut extr. aconiti, belladonnae etc. — Bor4. ut extr. aconiti.

℞. Herbae Lactucae virosae libram. Contunde in mortario marmoreo et exprime succum; residuum per horam coque cum Aquae libris tribus; cola exprimendo, et succo cum decocto mixto totum simul inspissa. (Hass.)

℞ Herbae rec. Lactucae viros. q. vis. Exprime succum, qui in loco frigido, ne fermentet, servetur; decantha, coque per aliquot momenta et per pannum cola, Albumine clarificatum iterum cola, dimidium deinde blando igne consume, refrigeratum et iterum Al-

humine clarificatum atque colatum ad extr. consist. vaporando redige. (Wir.)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; repone, decantha, super igne coagulatum denuo cola; tum ad massae pilularis consist. evaporatum ab igne remove et additâ faecula antea seposita, denuo ad consistentiam aptam vaporando consume. (An. *Vm.*)

℞. Fol. rec. Lactucae viros. q. vis.

Contunde in mortario et exprime succum qui in tantum evaporet ut Pulveris Herbae sicc. Lactucae pars quarta sufficiat ad consist. extracti ei praebendam. (Bel.)

℞. Foliorum Lactucae virosae q. vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Herba pluribus sequentibus bullitionibus perfecte extractâ, liquores mixti et decanthati in balneo aquae evaporent. (A.)

T. ut extractum cicutae praeterea autem ut Bel. vel succum expressum, balnei aquae vel vaporis ope aliquanto condensatum et per manicam laneam filtratum ad mellis consist evaporare, et ab igne remotum, faeculâ addita, ad extracti vel massae pilul. consist. redigere

Gabe, vier bis zwölf Gran und mehr.

Extractum Lactucae sativae. (LonN. *Gr. Re. T.*)

℞. Fol. rec. Lactucae libram unam.

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquae; dein exprime succum, eumque non defaecatum consume, donec idoneam crassitudinem habeat. (LonN. *Gr. Re.*)

T. Succum expressum et cum Aquae copia modica dilutum Albuminis et caloris ope clarificare, filtrare et vapo rando ad extracti consist. inspissare.

Aqua Lactucae sativae. (Gal. Sar. *Fi.*)

℞. Herb. Lactucae rec. partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.

Destillent partes duae. (Sar.)

Fi. Lactucae recentis libram unam, Aquae comm. decem; destillent sex; — Gal Lactucae capitatae partes quinquies mille, Aquae duodecies mille et quingentas; destillare partes decies mille, productum in novam Lactucae recentis quantitatem refundere, Aquae partes decies mille admiscendo, partes dies mille destillando elicere et tertiò hoc repetere.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Pediluvium sedativum. (B*.)

℞. Lactucae plantas integras
no. 8. aut 10.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Stent parumper in infusione, tum coquantur. — Nicht durchgeseiht anzuwenden.

Tinctura s. Essentia Lactucae virosae. (B*. Sax.)

℞. Succi Lactuc. viros. recens expr., Alcoholis concent., sing. part. aeq.

Macera frigide per aliquot dies et filtra. (Sax.)

℞. Herbae Lactucae virosae unciam.
Cinnamomi . . drachmam unam.
Alcoholis concentrati,
Aquae destill., sing.
uncias quatuor.

Post aliquot dies digestionis cola exprimendo et filtra. (B*.)

Reizend, bei Wassersuchten empfohlen. — Narcotisch. — Gabe, funfzehn Tropfen und mehr, allmälig gestiegen.

Lactucarium.

Lactucarium Extractum Lactucae, Succus spissatus Lactucae sativae, Thridax; Θριδαξ; Thridace (*Gal.*); Lettuce opium (*Ang.*).

Am. B*. Ed. *C. Gr. Re. Sp.*

Eine dunkelbraune, harte, brüchige Substanz von etwas betäubendem Geruch und einem sehr merklich bittern Geschmack

Es ist der getrocknete Milchsaft welchen man dadurch erhält, daß man die Stängel von Lactuca sativa, L., in horizontale Scheibchen zerschneidet. Auch quillt er aus in die Epidermis gemachten Stichen bis zum Reifen des Saamens ununterbrochen aus. Ueber Lactucarium und dessen Gewinnung s. Berl. Jahrb. XX. S. 196. Buchners Repert. XV. 2. S. 273 und XXV. S. 104. Taschenb. 1823. S. 24.

Nach Caventou enthält das Lactucarium kein Morphin, sondern Aepfelsäure und Kalk.

Man hält es für Schlaf bewirkend ohne narkotische Nebenwirkung und für ein Verminderungsmittel der Häufigkeit des Pulses und der thierischen Wärme. — Gabe, zwei bis vier Gran und mehr allmälig

Tinctura Lactucarii (B*. *C. Gr.*)

℞. Lactucarii . . . unciam unam.
Aquae Vitae . . octarium unum.

Post sufficientem digestionem filtra. — Gabe, zehen bis sechszig Tropfen.

Syrupus de Thridace. (GalF.)

℞. Succi rec. Stipit. Lactucae, tempore florescentiae foliis privatarum . . . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.

Solve frigide et filtra.

Pilulae torpentes ac resolventes. (B*.)

℞. Lactucarii . grana duodecim.
Roob Sambuci,
Extracti Liquiritiae, sing . q. s.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei hartnäckigem Husten ohne Auswurf und bei sogenannten activen Wassersuchten.

Potio nutriens et sedans s. sedativa. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Aquae fontanae . quantum sufficit ut decocti uncias octo obtineantur; colaturae adde
Lactucarii . . . semidrachmam.
Mucilag. Gummi Arabici semunciam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei hartnäckigem Husten und knotiger Lungensucht.

Ladanum

Labdanum, Gummi Ladanum; *Λαδανον*; Labanum; Ladanum; Labdanum (*Gal.*); Ladun (*Ar.*); Ladano (*His.*); Labdano (*Lus.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Gal Gen. His. His3. LH. LP. Lus. Wir. Wür. *A. Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp T. Z.*

Man unterscheidet zwei Sorten:

1) *Ladanum in massis*; Labanum in Brodten, Ladanum en masses (*Gal.*), in weichen, schlüpfrigen, bei'm Druck jede Form annehmenden, schwärzlichrothen oder schwarzen Massen. — 2) *Ladanum in sortis*, Labanum in Stöcken: Ladanum en bâtons (*Gal.*), in walzigen, platten, schraubenförmig gedrehten, trocknen, harten, brüchigen, schwärzlichgrauen Stücken.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack schwach, aber balsamisch und etwas bitter.

Dieses Harz schwitzt von selbst aus den Blättern und Zweigen von Cistus Creticus, L., einem Strauche (Polyandria Monogynia, L.; Cisteae, *J.*) des Archipels. (Fl. méd. IV. 212.) Das L. in sortis soll nach *Gr.* durch Kochen der Zweige von Cistus ladaniferus gewonnen werden

His3. schreibt eine Reinigung desselben vor, man läßt es, zerstückelt, im kochenden Wasser weichen und preßt die flüssig gewordene Masse durch ein Haarsieb, knetet das nach dem Erkalten auf dem Wasser schwimmende Harz und walzt es oder bewahrt es so auf.

Reizend, aber wenig in Gebrauch.

Emplastrum Picis Burgundicae s. cephalicum s. Labdani s. Ladani s. stomachicum. (Ams. LH. Lon. LP. Lus. *Br. C. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Picis Burgundicae . libras duas.
Labdani . . . . libram unam.
Resinae flavae,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.
Olei . . . . . unciam unam. (*Gr.*)

℞. Ladani . . . . . uncias tres
Olibani . . . . unciam unam.
Liquatis blando calore adde
Olei Nucis moschatae expressi,
Balsami Peruviani,
Cinnamomi pulv, sing. semunciam.
Misce. (Lus.)

Lon. *Br. Gr. Re.* et *Sw.* Olibani unciam unam, Ladani tres; Olei Nucis mosch. semunciam (semidrachm. (*Re.*), Cinnamomi tantidem et Olei Menthae virid. essent. drachmam unam; — C. Ladani uncias tres, Resinae Pini unam, Olei Nucis mosch. sesquiunciam, Cinnamomi tantidem et Olei Menthae drachmam unam; — LH. Picis Burg. libras duas, Ladani unam, Resinae, Cerae flav., sing. uncias quatuor, Olei Nucis mosch. expr. unam. (*Empl. Picis Burgundicae.*); — LP. Cerae flav. libram unam, Resinae flavae uncias duas, Terebinthinae unam, Ladani quatuor, Mastichis, Caryophyl., Bals. Peruv., Olei expr. Nucis mosch., sing. semunciam.

℞. Emplastri communis,
— Cumini, sing. . . libram.
Colophonii . . . . semilibram.
Styracis . . . . . semunciam.
Liquatis igne blando adde
Ladani pulverati . . uncias duas.
Misce bene. (Ams.)

℞. Cerae flavae . . . . . partes sex.
Sebi vervecini,
Colophonii, sing. partes quatuor.
Elemi . . . . . partem unam.
Liquata macera cum
Seminum Cumini,
Baccarum Lauri,
Florum Meliloti, sing.
part. duabus.
Liquorem calidum cola et adde
Empl. Litharg. fusi
part. triginta sex.
Gummi Ammoniaci partem unam.
Ladani . . . . partes quatuor.
Misce. (*Vm.*)

℞. Ladani . . . . libram unam.
Cerae flavae . . . libras decem.
Olei Palmae . . . libras octo.
Resinae nigrae . libras quinque.
Picis Burgundicae libras quatuor.
Olei Macidis expressi uncias duas.
— Carvi . drachmas quatuor

Olei Menthae vulgaris
sesquiunciam.

℞. Ladani,
Mastiches, singulorum semunciam.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing.
drachmas duas.
Tacamahacae . uncias quatuor.

Pulverata et mixta sparge supra Cerae flavae uncias tres, Terebinthinae duas, singulas fusas; massae concrescere coeptae admisce

Storacis Calamita . . semunciam.
Opii . . . . drachmam unam

in Vino albo dissoluta et ad mellis consist. redacta; adde, quum emplastrum consist. butyraceam acceperit, Olei Menthae, Juniperi et Absinthii, sing. guttas aliquot.

Ladanum factitium. (*Gr.*)

℞. Cerae flavae,
Adipis suilli, sing. . . uncias sex.
Eboris usti nigri . uncias quatuor.

Lamium.

Lamium album, *L.*; weißer Bienensaug, weiße Todtenneſſel; Ortie blanche (*Gal.*); White dead-nettle (*Ang.*); Hlucha, Mrtwa, Smzadlawa, Kopriwa (*B.*); Daednelde (*D.*); Ortiga maerta (*His.*); Pokozywa martiva (*Pol.*); Ortiga morta (*Lus.*); Blind nesla (*Suec.*).

An. Br. Gal. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Gr. M. Sp. Z.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, *L.*; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 213. *Blackw.* t. 33. *Hayne* V. 41. *Zorn* Ic. pl. t. 80.

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Lamii albi s. Galeopsidis s. Urticae mortuae) beſteht aus einem faſt glatten oder nur wenig behaarten Stängel und herzförmigen, geſtielten, ſpitzigen, ſpitzig gezähnten Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen ſtyptiſchen Geſchmack. — Die Blüthen, von welchen man nur die Kronen nimmt, ſind weiß und haben einen unangenehmen Geruch und einen ſüßlichen Geſchmack. Sie ſind erweichend.

Lapis nephreticus.

Nephreticus lapis; Griesſtein; Pierre néphrétique, Jade néphrite ou oriental (*Gal.*); Piedra cananor, Piedra nefritica (*His.*).

His. His3. Wir. *Sp.*

Ein grüner Stein von fettigem Anſehen. Ehedem gebrauchte man ihn als Amulet und Schutzmittel gegen Epilepſie.

Laserpitium.

Die Pharmacopöen führen an:

1) *Laserpitium latifolium*, *L.*; Hirſchwurzel, weißer Enzian; Laser à larges feuilles, Gentiane blanche (*Gal.*); Broad leav'd lesserwort (*Ang.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 146 *Schk.* t. 67)

Man wendet die Wurzel (radix Gentianae albae) an; ſie iſt ſehr lang, rund, außen gelblichbraun, inwendig gelblichweiß. Sie hat einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, ſcharfen und etwas bittern Geſchmack.

Toniſch, reizend.

2) *Laserpitium Siler*, *L.*; roßkümmelartiges Laſerkraut; Laser sermontain, (*Gal.*); Mountain lasserwort (*Ang.*); Eselskomin (*Bel.*); Laserpicio silerino (*Lus.*).

Br. Gal. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ Eine Alpenpflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 145. *Hayne* VII 7)

Man wendet den Saamen (semen Sileris montani, Seseli) an; er iſt länglich, platt, gefurcht und ſehr ſchmalgeflügelt. Er hat einen angenehmen gewürzhaften Geruch und einen ſcharfen, gewürzhaften und bittern Geſchmack.

Toniſch, reizend.

Gr. führt noch L. augustifolium und chironium an.

Laurus.

Laurus nobilis, *L.*; Lorbeerbaum; Laurier commun (*Gal.*); Common sweet bey, Laureltree (*Ang.*); Bob (*B.*); Laurbaertrae (*D.*); Laurel (*His.*); Lauricrboom (*Bel.*); Lauro riccio, Alloro, Meloro (*I.*); Bobek drzewo (*Pol.*); Loureiro (*Lus.*); Lagerbaerstraed (*Suec.*).

A. Ams. An. B Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L.; Laurineae, *J.*), welcher urſprünglich in der Levante zu Hauſe, im ſüdlichen Europa naturaliſirt iſt. (*Blackw.* t. 175. *Plenck* t. 315. *Schk.* t. 310 Dict. d. Sc. nat. Cah. IV. *Zorn.* Ic pl. t. 52.

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Lauri) ſind glatt,

hart, ledrig, an den Rändern etwas wellenförmig, vier bis fünf Zoll lang, und haben, wenn man sie reibt, einen starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack. — Die Früchte oder Beeren (baccae Lauri) sind klein, eirund, fast so groß wie Kirschen, frisch dunkelblau, getrocknet schwärzlich und runzelig, und enthalten, unter einer dünnen brüchigen Schaale, gelbe oder gelblichbraune Saamen. Sie haben einen gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen etwas bittern, scharfen und gewürzhaften Geschmack.

Die Blätter dienen eher als Gewürz denn als Arzneimittel. Uebrigens sind sie nicht minder reizend, als die Beeren.

L. Persea liefert ein magenstärkendes Oel. (*Gr.*)

Pulvis Lauri carbonicus s. stimulans. (*Au.*)

℞. Baccarum Lauri . . uncias sex.
Nucis moschatae,
Cornu Cervi calcin., sing.
uncias (?) sex.
Liquiritiae . uncias triginta sex.
Gabe, ein Kaffeelöffel bei Rhachitis.

Oleum Baccarum Lauri destillatum. (His3.)

℞. Bacc. Lauri rec. sicc. libram unam.
Aquae font. . libras quadraginta.
Digere loco calido per dies quatuor ad dimidium et oleum per infundibulum separa.

Oleum laurinum s. laurinum verum s. Lauri nobilis s. Baccarum Lauri s. Lauri expressum. (A. Bor. Bor4. Br. Ed. Ful. Gal. Hass. HassP. His. His3. Lus. Pal. Sar. Wir. *Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas lente in mortario, tere supra lapidem calefactum et exprime. (His.)

His3. Baccas tritas et per setaceum trajectas in mortario ferreo calefacto in massam tenuissimam convertere, et sacco linteo receptam, statim prelo calido subjicere.

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusas in mortario et supra lapidem calefactum tritas coque cum Aqua et post refrigerationem, oleum superficiei inhaerens collige. (A. Br. Gal. Hass. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir.)

℞. Baccarum Lauri . quantum vis.
Contusis in mortario, pastam in sacco e tela confecto inclusam vapori aquae bullientis expone et deinde prelo calefacto submitte. (*Sw.*)

T. Baccas cum Aquae quantitate modica in pastam redigere et hanc sacco e tela confecto inclusam prelo subjicere.

Bor. Bor4. Hass. HassP. O. Pol. et *Vm.* oleum venale praescribunt.

Reizend, auflösend, blähungtreibend, stärkend, nervenstärkend, bei Krankheiten des Uterus, Krämpfen, Koliken, Würmern bei Kindern, Schmerzen und Schwäche der Gelenke, Ohrenschmerzen.

Enema carminativum. (Li.)

℞. Florum Chamomillae semunciam.
Aquae communis . libram unam.
Coque parumper, cola et adde
Olei Baccarum Lauri semunciam.

Linimentum aethereum. (*Au.*)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Olei Baccarum Lauri semunciam.
In Einreibungen auf Brüche, besonders Nabelbrüche der Kinder.

Unguentum s. Pomatum laurinum, Oleum laurinum infusum. (Gal. Pm. Sar. *Fi. Re. T. Vm.*)

℞. Foliorum Lauri . partem unam.
Axungiae . . . . partes duas.
Contunde et coque lente ad consumpt. humidi usque, sub finem addendo
Bacc. Lauri contus. partem unam.
Post horas decem digestionis in balneo aquae, cola et exprime. (Gal. *Re.*)

Sar. Digerere per tres dies in balneo aquae Fol. Lauri rec. concis. libras tres in Olei Oliv. libris sex, colare fortiter exprimendo et colaturam novae per tres dies digestioni subjicere cum Fol. et Baccar. Lauri, sing. sesquilibra; — *Fi.* Axungiae Porci libras decem, Fol. Lauri duas cum dimidia; per tres dies in infusione calida relictas cola fortiter exprimendo, adde Baccarum contus. libras decem, infunde itidem per dies tres et cola; post refrigerationem partem aquosam liquefac lentissimo calore etc.; — *T.* Folior. libras tres, Axungiae sex, Baccar. tres, digestionem 24 hor.

℞. Foliorum recentium Lauri,
Olei Amygd. dulc., sing.
partem unam.
Bacc. Lauri rec. contus.
partes quatuor.
Axungiae Porci . . partes octo.
Folia et deinde baccas contusa coque lente cum axungia per horas duodecim, cola et refrigeratis sedimentum exime; quod restat liqua aut ab initio Aqua calida lava, donec haec clara transeat (*Vm.*)

Jeromel Folior. sicc. et contus. unciis tribus infundere Axungiae Porci

rec. libram, vas per horas duodecim eaedem caloris vi exponere, colare et axungiam liquare in Olei Bacc. Lauri exnr libra una.

Reizend, ſtärkend.

Pm. *Oleum vel Unguentum laurinum ad usum Artis veterinariae:* Fol. rec. libras duas, Adipis porcini depur. libris quatuor per triduum infunde, liquorem cum expressione cola, expresso adde Bacc. Lauri contus. libras duas, infusionem balneo maris repete, cola et praelo submitte, et humorem faecesque separa; — *Gr. Oleum laurinum vulgare:* Fol. libram, Bacc. semilibram, Fol. Brassic. uncias quatuor, Axung. Pedum Tauri libras quinque, Adipis bovill. duas, coque et exprime.

Unguentum nervinum s. Lumbricorum nervinum s. laurinum s. aromaticum s. Rorismarini compositum. (A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. His. His9. Li. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
Summitatum Anethi,
Rad. Pyrethri, sing. drachmas duas.
Bacc. Lauri,
— Juniperi, sing. unciam unam.
Mastichis . . . . semunciam.
Benzoës . . . . drachmas sex.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Olei Lumbricorum,
— Anethi,
— Hyperici,
Adipis vulpinae, sing. uncias tres.
— humanae,
— Felis Cati veri,
— caninae, sing. sesquiunciam.
Terebinth. Venet. . unciam unam.
Coque et cola. (Pal.)

℞. Herbae Salviae,
— Chamaepityos,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Menthae,
— Rutae,
— Lavandulae,
— Hyperici,
— et Florum Primulae veris,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
Florum Hyperici,
Summitatum Anethi,
Bacc. Lauri,
— Juniperi, sing. drachmas sex.
Olei Olivarum . . libram unam.
Macera per aliquot dies, tum coque lente ad humidi usque consumptionem, cola et colaturae adde
Terebinthinae Venetae uncias duas.
Cerae flav. unc. quatuor c. dimid.
Olei Terebinthinae unciam unam.
— Lumbricorum,
— Lauri, sing. . uncias duas.
Benzoës in Alcoholis concentrati unciis tribus solutae unciam unam.
Fiat unguentum. (Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri,
Foliorum recentium Anethi,
— — Lauri,
— — Majoranae,
— — Menthae crispae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
Flor. rec. Chamomillae,
— — Lavandulae,
— — Meliloti,
— — Hyperici, sing. part. quatuor.
Benzoës,
Mastichis, singulorum partes sex.
Baccarum Lauri,
— Juniperi, sing. partes octo.
Axungiae,
Terebinthinae, sing. partes sedecim.
Cerae albae partes quadraginta tres.
Olei Olivar. partes nonaginta sex.
Contunde folia, baccas, flores et radicem cum oleo et axungia, macera in vase clauso, calore modico per horas quatuor, cola et cum Aqua tepida ablue, adde mastichem et benzoën cum terebinthina calefacta, cola et ceram fusam admisce, cola absque expressione et agita donec refrixerint. (*Vm.*)

℞. Herbae Rutae recentis,
Summit. floresc. Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Menthae,
— — Chamaepityos,
— — Verbasci,
— — Lavandulae,
— — Hyperici,
— — Chamomillae,
— — Meliloti, sing. uncias duas.
Baccarum Lauri,
— Juniperi, sing. unciam unam.
Olei Lumbricorum . libras tres.
Macera per dies duos, coque, donec humidum omne evanuerit, cola et colaturae adde

Cerae flavae . . uncias novem.
Massae semirefrigeratae denuo adde
Olei Cerae,
— Terebinth., sing. uncias duas.
Unguenti Althaeae uncias quatuor.
Misce bene. (His. His3.)

℞. Herbae Rorismarini uncias duas.
— Rutae,
— Majoranae,
— Menthae crispae,
Florum Meliloti,
— Lavandulae,
— Chamomillae,
Bacc. Lauri, sing. . unciam unam.
Axungiae Porci . . libram unam.
Sebi vervecini . . . semilibram.
Coque lente ad humidi consumptionem usque et in colatura liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae, sing. uncias duas.
Olei Lauri . . uncias quatuor.
Fiat unguentum. (D.)

℞. Summit. sicc. Rorismarini,
— — Salviae,
— — Lavandulae,
— rec. Rutae, sing. . unciam.
Adipis suillae . . libram unam.
— vervecini . uncias quatuor.
Olei Lauri . . . . uncias octo.
— Terebinthinae sesquiunciam.
Prioribus sex lento calore balnei aquae per quatriduum maceratis et expressis olea adde. (*Fi.*)

℞. Herbae Rorismarini,
— Salviae,
— Lavandulae,
— Rutae, sing. manip. unum.
Baccarum Lauri rec. uncias tres.
Axungiae Porci . libram unam.
Sebi vervecini . uncias quatuor.
Stent per dies quatuor in balneo aquae; coque deinde exprimendo et colaturae adde
Olei Baccarum Lauri uncias octo.
Misce. (*Br.*) — *Unguentum aromaticum.*

℞. Herb. rec. Rorism. libram unam.
— — Majoranae,
— — Rutae, sing. semilibram.
Baccarum Lauri,
Rad. Pyrethri, sing. unc. quatuor. (tres Bor4.)
Axungiae Porci . libras quatuor.
Sebi vervecini . . . libras duas.
Coque ad consumptionem humidi, exprime et adde colaturae
Cerae flavae liquatae semilibram.
Olei Rorismarini,
— Bacc. Junip., sing. uncias tres.
Misce. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)

℞. Florum Rorismarini,
Fol Populi balsamif., sing. unc. quatuor.
Axungiae Porci . . libras duas.
Digere per dies quatuordecim, cola et post refrigerationem adde
Aquae destillatae Lavandulae,
— — Chamomillae,
— Rutae, sing. . semunciam.
Misce. (Hass.)

℞. Fol. Populi balsamif., uncias octo.
Axungiae Porci calidae libras duas.
Post dies quatuordecim cola et adde
Olei Succini,
— Chamomill., sing. semunciam.
— Rutae,
— Menthae, sing. drachmas duas.
Misce. (*Pid.*)

℞. Bacc. rec. Lauri . uncias octo.
Fol. rec. Lauri . . uncias duas.
Contunde et cineribus imposita macera in
Axungiae Porci . unciis sedecim.
Post horas viginti quatuor exprime, Aqua tepidâ lota liqua et repone. (*Sw.*)

℞. Sebi vervecini . . partes octo.
Liqua et ab igne remotis et semirefrigeratis adde, agitando bene
Olei Lauri . . partes duodecim.
— Terebinthinae partem unam.
— Succini rectif part. dimidiam.
— Menthae piperitae,
— Rorismarini,
— Junip, sing. partis octantem.
Misce sedulo. (Sax.) — *Unguentum aromaticum.*

℞. Axungiae Porci . libras quatuor.
Sebi vervecini . . . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Mixturae liquat. et semirefrigerat. adde.
Olei Lauri . . . . uncias duas.
— Rorismarini,
— Bacc. Junip, sing. uncias tres.
Mixta serva. (Pol.)

℞. Axungiae Porci . unciam unam.
Olei Lauri . . . . semunciam.
— Rorismarini,
Ammoniaci liq., sing. sesquidrach.
Misce. (WW.)

℞. Sebi cervini . . . uncias sex.
Liquatis adde
Olei Lauri . . . . uncias sex.
— Terebinthinae unciam unam.
— Succini rectificati,
Salis Ammon., sing. semunciam.
Misce exacte. (Li.)

℞. Axungiae Porci . . uncias tres.
Sebi cervini . . unciam unam.
Liquatis lente, adde
Olei Lauri . . . unciam unam.
— Succini . . . semunciam.
— Menth. crisp. drachmas duas.
Tere ad refrigerationem usque. (Ful.)

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Olei Lauri . . . uncias decem.
Lente liquatis et semirefrig. adde
Essent. Terebinth. unciam unam.
Olei Succini depurati semunciam.
Misce. (An. Bel. Suec. *Sp. Vm.*)

LP. Sebi, Olei Terebinthinae et Succini easdem quantitates ut antea, sed Olei Lauri libram unam et praeterea Camphorae uncias duas.

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Liquatis adde
Olei Baccarum Lauri libram unam.
Essent. Terebinth. sesquiunciam.
Misce bene. (Lus.)

℞. Olei laurini . . . . libras tres.
Ung. Sambuci virid. libram unam.
Axungiae . . . . libras duas.
Olei Succini . . uncias quatuor.
Misce ut fiat ung. (*Gr.*)

℞. Sebi vervecini . . uncias octo.
Massae liquatae adde
Olei Lauri . . . libram unam.
— Terebinthinae unciam unam.
— Petrae . . . semunciam.
Tere ad refrigerationem usque. (B. R.)

Ams. Sebi uncias octo, Olei Lauri libram, Essent. Terebinth. unciam et Olei Cajeput semunciam.

℞. Ung. simpl. libras duas et dimid.
Olei Lauri,
Cerae flavae, sing. . uncias tres.
Mixturae liquat. et semirefrig. adde
Olei ess. Juniperi,
— — Serpylli, sing.
drachmas duas.
Misce. (A.) — *Unguentum aromaticum.*

Aeußerlich als ſtärkend, auflöſend und ſchmelzend angewendet.

Unguentum carminativum. (Ful. Pal.)

℞. Baccarum Lauri . . semunciam.
Fol. rec. Chamomillae manip. duos.
— — Meliloti,
Summit. rec. Abrotani,
— — Hederae terrest.,
— — Menth. crisp.,
— — Tanaceti, sing.
manip. unum.
Semin. Cumini,
— Levistici, sing drachm. duas.
Olei Chamomillae libram unam.
— Anethi,
— Rutae, sing. . semunciam.
Post dierum quatuordecim macerationem coque leviter, donec humidum disparuerit et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias duas.
Styracis liquidae . drachmas sex.
Olei ess. Anisi,
— — Carvi,
Olei ess. Menthae, sing.
drachmam.
Misce. (Pal.)

℞. Axungiae Porci . drachmas sex.
Cerae flavae . drachmam unam.
Mixturae liquat. et semirefrig. adde
Olei Lauri . . drachmam unam.
— Anisi . . guttas octodecim.
— Carvi . . guttas duodecim.
Misce. (Ful.)

Erweichend, krampfſtillend, blähungtreibend.

Unguentum laurino-camphoratum s. aromaticum camphoratum s. contra perniones. (Ba. HassP. *Ca.*)

℞. Sebi vervecini . partes sedecim.
Olei Lauri . . . partes viginti.
Calefac lente et in fine adde
Camphorae in Olei Juniperi pauxillo solutae . . . partes duas.
Misce. (Ba.)

Ca. Liquare Axungiae Porci, Adipis bubulae, Olei Lauri, Cerae, sing. uncias duas et post refrigerationem addere Camphorae in Alcoholis uncia una solut. semunciam; — HassP. Sevi vervecini uncias novem; liquatis et semirefrigeratis admisce Olei Laurini uncias decem et tandem Camphorae unciam unam solutam in Olei Baccarum Juniperi, Lavandulae, destillatorum sing. semuncia.

Unguentum martiatum. (Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Fol. rec. Lauri . . uncias octo.
— — Rutae uncias quinque.
— — Majoranae
uncias quatuor.
— — Rorismarini uncias tres.
— — Myrti,
— — Ebuli,
— — Menthae,
— — Basilici, sing.
unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . . libram unam.
Butyri recentis,
Axungiae ursinae,
— gallinaceae,
Medull. cervin., sing. drachmas sex.
Infunde per dies aliquot, tum coque lente ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Storacis drachmas quinque.
— Mastichis . . semunciam.
— Olibani . . drachmas tres.
Misce. (Wir. *Sp.*)

℞. Fol. rec. Absinthii,
— — Abrotani,
— — Basilici,
— — Calamintae,

Fol. rec. Balsamitae maris,
— — Chamaedryos,
— — Lauri,
— — Majoranae,
— — Menthae aquaticae,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Sabinae,
— — Salviae, sing. part. duas.

Contunde in mortario, succum exprime, quo supra ignem coagulato, faeculam exemtam lava, Aquam quam potest, separa et solve deinde in

Axung. Porci
part. sexaginta quatuor

calefactae cum

Semin. Cumini,
— Foenu gr., sing. parte una.
Nucis moschatae . partibus sex.

Adde deinde

Styracis liquidae,
Cerae albae, sing. partes quatuor.

Cola et donec refrixerint agita. (*Vm.*)

Reizend, auflöſend.

Emplastrum Baccarum Lauri. (Br. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Baccarum Lauri uncias quatuor.
Cyperi rotundi,
Corticis Winterani,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum unciam unam.

Pulverata admisce mixturae liquatae de

Cerae flavae . . . unciis octo.
Resinae Pini,
Olei Lauri,
— Terebinth., sing. unciis duabus.

Reizend, auflöſend.

Electuarium Baccarum s. e Baccis Lauri. (Pal. Sar. *Gr. Sp.*)

℞. Baccarum Lauri . uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Olibani, singulorum unciam unam.
Costi Arabicae,
Cyperi rotundi, sing. semunciam.
Olei Baccarum Lauri,
Terebinth. Chiae, sing. uncias tres.
Mellis purificati . sesquilibram.

Melli calefacto adde terebinthinam et olea liquata et deinde reliquas substantias pulveratas. (Sar.)

℞. Baccarum Lauri . sesquiunciam.
Radicis Calami . drachmas duas.
Herbae Rutae,
— Menthae,
— Origani,
Seminum Ammi,
— Cumini,
— Nigellae,
Seminum Levistici,
— Carvi,
— Carottae,
Piperis nigri,
— longi,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Sagapeni . . . . semunciam.
Opopanacis . . drachmas tres.
Mellis despum. unc. quatuordecim.

Misce. (Pal. *Sp.*)

Gr. Fol. Rutae sicc., Sem. Carvi, Petroselin., Bacc. Lauri, sing. unciam, Sagapeni semidrachmam, Pip. nigri, Cast. Russ., sing drachmas duas, Mellis uncias quindecim.

Alcohol aromaticum. (An.)

℞. Baccarum Lauri . unciam unam.
Myrrhae,
Styracis, singularum drachmas sex.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Caryophyll., sing. drach. duas c. dimid.
Aquae,
Alcoholis (20°), singulorum uncias quinquaginta quatuor.

Post horas viginti quatuor macerationis destillatio eo producatur, donec productum 30° indicet.

Mit Unrecht nennt An. dieſes Präparat *Balsamum Fioravanti*, dieſer enthält keine Terpentintinctur.

Lavandula.

Lavandula Spica, L.: Lavendel; Lavande commune (*Gal.*); Lavandel (*Bel. D. Suec.*); Lavander (*Ang.*); Espliego, Alhugema (*His.*); Lavendola, Spigo Nardo Italiano (*I.*); Lawanda (*Pal.*); Alfazema (*Lus.*).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.*

24 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Bull.* t. 337. *Hayne* VIII. t. 37. *Zorn* Ic. pl. t. 53.)

Man wendet die blühenden Spitzen (herba et flores s. summitates s. spicae florentes Lavandulae s. Spicae s. Spicae vulgaris) an; ſie beſtehen aus aufrechten, veräſtigten Stängeln mit linienförmigen, filzigen, weißlichen Blättern und blauen oder violetten, Wirtel bildenden Blüthen, welche vereinigt eine unterbrochene Aehre zuſammenſetzen, die durch ſchmale linienför-

mige Deckblätter geschützt ist. Sie haben einen durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, bittern Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species aromaticae. (Bor. Bor4. GalM. Han. HassP. LH. Pol. Sar. *Huf. Sp. Sw.*)

℞. Herbae et Florum Rorismarini,
— — — Lavandulae,
— — — Salviae, sing. partes aequales.
Fiant species. (LH.)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae piperitae,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Flor. Lavandulae, sing. partes duas.
Caryophyllorum,
Cubebarum, sing. partem unam.
Fiat pulvis grossus. (Bor. Han. HassP. Pol. Sar.)

Bor4 Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Thymi, Flor. Lavandulae, sing. partes duas, Caryophyllor. unam.

℞. Herbae Rorismarini,
— Rutae,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Lavandulae,
— Absinthii,
— Origani,
— Thymi,
Foliorum Lauri,
Florum Rosarum rubrarum,
— Chamomillae,
— Meliloti,
— Sambuci,
Salis Ammoniaci, sing. part. aeq.
Fiat pulvis grossus. (*Sp.*) — Zum Bähen.

℞. Florum Lavandulae,
— Chamomillae,
Herb. Menthae piperitae,
— Melissae,
— Thymi,
— Majoran., sing. part. aeq.
Concisa misce. (*Huf.*)

℞. Flor. et Summit. Lavandulae,
— — Melissae,
— — Menthae piperitae,
— — Salviae,
— — Thymi,
— — Absinthii,
— — Menthae aquaticae,
— — Origani,
— — Rorism., sing part. aeq.
Concisa misce. (GalM.)

℞. Florum Lavandulae,
— Arnicae,
Herbae Majoranae,
— Serpylli,
— Rorismarini, sing. unciam.
Concisa misce. (*Sw.*)

Species cephalicae pro fomentatione s. epithemate. (Pal. Wir. Wür. *Fi. T. Vm.*)

℞. Herbae Majoranae,
— Menthae,
— Melissae,
— Serpylli,
Flor. Lavandulae,
— Arnicae, sing. . part. aeq.
Concisa misce. (Wür.)

℞. Herbae siccatae Origani,
— — Serpylli,
— — Thymi,
— — Menthae Romanae,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
Flor. Lavandulae,
— Rosar., sing. . . unciam.
Concisa misce. (*Fi. T.*)

℞. Herbae et Summitatum Betonicae,
— — Hyssopi,
— — Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli,
Florum Chamomillae,
— Meliloti,
— Rosarum,
— Sambuci,
Fol. Lauri, sing. . unciam unam.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Concisa et contusa misce. (Pal. Wir. *Vm.*)

Infusum Lavandulae. (GalM.)

℞. Summit sicc. Lavandulae,
Liquirit. rasae, sing. drach. duas c. dimid.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur.

Aqua vulneraria, Tinctura aromatica composita. (GalM.)

℞. Specier. aromat. . partem unam.
Alcoholis (22°) . partes novem.
Species cum alcoholis parte dimidia stent in infusione per octo dies et colentur deinde cum expressione; residuo reliquum Alcoholem infunde et liquores commixtos filtra.

Aeußerlich in Waſchungen und Bähungen, meiſt mit Wein. — Reizend.

Acetum Lavandulae. (Gal. Lus. Pal. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. T.*)

℞. Florum Lavandulae partem unam.
Aceti albi . . . . partes sex.
Macera soli exposita per aliquot dies et cola cum expressione. (Pal. Wir. *Pid.*)

Gal. Lavand. partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — Wür. Lavand. partem unam, Aceti novem et tres septimanas macerationis; — *Fi.* Lavand. libram unam, Aceti fortis duodecim; digere loco tepido per dies sex; — *T.* Lavandulae uncias sex, Aceti libras sex et digestionem per dies sex vel decem; — *Gr.* quantitates non indicat, tres quadrantes abstrahere jubet; praeterea Olei q. pl. cum Aceto destill. miscere.

℞. Flor. sicc Lavand. libram unam.
Aceti . . . . . libras sex.
Post sex dies macerationis coque paramper et colaturae adde
Alcoholis . . . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Gewürzhaft, bisweilen in Form von epithema angewendet.

Acetum Lavandulae compositum, Acidum aceticum aromaticum, Spiritus aromaticus acetosus, Acetum quatuor latronum. (B*. Fenn. *Br. Vm.*)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. . drachmam.
Menthae piperitae . semunciam.
Lavandulae,
Rorismarini, sing. unciam unam.
Aceti . . . . . uncias octo.
Aquae Vitae . . uncias viginti.
Destillent partes viginti octo. (*Vm.*)

℞. Herb. recentis Absinthii,
— Menthae crispae,
— Rutae,
— Rorism., sing. sesquiunciam.
Flor. sicc. Lavand. uncias duas.
Radicis Calami,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Caryophyll., sing. drachmas duas.
Aceti albi . . . libras decem.
Post dierum decem macerationem cola exprimendo et filtra. (*Br.*)

℞. Summitatum Absinthii,
Millefolii,
Herbae Menthae piperitae,
Florum Lavandulae,
Caryophyllorum,
Zingiberis, sing. drachmas quatuor.
Aceti bullient. libras septem c. dimid.
Acidi acetici . . . semilibram.
Macera per dies quatuor, cola exprimendo, Lacte vaccino clarifica, cola iterum et adde colaturae
Spir. Rorismarini uncias quatuor.
Serva. (Fenn.)

℞. Cinnamomi,
Macidis,
Caryophyllor., sing. semunciam.
Ligni Rhodii,
— Santali albi,
Semin. Foenic., sing. drachm. duas.
Aceti . . . . . octarios duos.
Digere blando calore per dies duos; adde deinde
Herbae Absinthii,
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Flor. Lavandulae, sing. semunciam,
Herb. Majoranae drachm. unam.
Stent in digestione per dies duos, tunc coque et refrigerata cola. (B*.)

Aqua Lavandulae s. Lavandulae Florum s. ex Lavandula. (A. Gal. Pal. Pm. Sar. Wir. *Gr.*)

℞. Herb. floresc. Lavand. partem unam,
Aquae communis partes quatuor.
Destillet dimid. pars. (Gal. Pal. Sar.)

Wür. Lavandulae partem unam et sex Aquae; — A. Aquae duodecim; — Pm. Summitatum floridarum libras viginti, Aquae libras quinquaginta, extrahe libras viginti; — *Gr.* Aquam in destillatione olei collectam.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Lavandulae s. Lavandulae aethereum s. destillatum s. Lavandulae Spicae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Hnn. Hass. HassP. His. His8. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Pol. R. Sar Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw.*)

℞. Herb. flor. Lavandulae . q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillatione oleum quod separatur, collige. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fer. Ful. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. *Br. C.*)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Bor. Han. His. His3. Pol. Sax. et *Fi.* Aquae octo; — D. Aquae sex; — An. Herbae sex et viginti Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Ba. Herbae unam et Aquae novem; — A. Aquae duodecim; — *T.* ut oleum florum aurantiorum; — Pm. oleum e destillatione aquae; — LP. macerationem aliquot dierum et destillationem.

℞. Lavandulae partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Lavandulae . . . quantum vis.
Aquae Lavandulae . . . q. s.
Destillent. (Wür.)
Gabe, zwei bis acht Tropfen.
Bor4. et HassP. Oleum venale.

Gr. Oleum Lavandulae latifoliae s. exoticum indicat; — praeterea rectificationem Olei Lavandulae (*Oleum Lavand. rectificatum*).

Olea mixta (*Gr.*) (Mixed oils for sal volatile drops): Essent. Bergam., Limon., sing. unciam, Ol. Lavand., Piment., sing. semunciam.

Sal volatile drops (*Gr.*): Oleor. mixt. uncias duas, Sal. volat. Ammon. viginti, Spir. Vini rectif. congios duos; abstrahe octarios 18 vel 19.

Linimentum aromaticum, Balsamum Lavandulae (*Br. Sw.*)

℞. Olei Lavandulae partem unam.
— Nucis mosch. partes quinque
Misce. (Br.)

℞. Olei Lavandulae,
— Nucis moschatae,
Butyri Cacao, sing. partes aequales.
Misce (*Sw.*)
Dieſes ſehr einfache Präparat erſetzt das unguentum nervinum vollkommen, und wird auch von *Sw.* ſo benannt.

Oleum Lavandulae (*pingue*). (*Fi. T.*)

℞. Flor. Lavand. rec. libram unam.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Macera calide per duos dies, tunc coque per horae quadrantem, exprime et oleum separa; — *T.* Florum uncias quindecim, Olei libras quinque, tres macerationes, priores per tres vel quatuor dies, tertiam per mensem circiter protrahendam.

Spiritus Lavandulae, Alcohol cum Floribus Lavandulae, Aqua Lavandulae spirituosa. (A. Am. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lou. LouN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Lavandulae . . . partem unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.
Spiritus destillatione elicitus 28° indicet. (An. Br. Ed. Hass. Pal. Wir. *Pid.*)
Bel. Lavand. partem unam et sedecim Alcoh.; — Suec. Lavand. partem unam cum dimidia et decem Alcoh.; — Lus. Lavand. partem unam cum dimidia, et decem Alcoh.; — *T.* Flor. recentium libras duas, Spiritus Vini 32° B. octo, destillando libras circiter quinque elice; — Sar. Lavandulae partem unam, Alcoholis quatuor et cohobationem producti supra novam Herbam; — D. Lavandulae partem unam, Alcoholis sex et cohobationem supra novos Flores; — Wür. Lavandulae partem unam cum dimidia, Alcoholis decem, et cohobationem supra novam Herbam; — Fer. Florum sesquilibram et octo Alcoholis; destillent sex.

℞. Lavandulae . . . . partes tres.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae . partes triginta sex.
Destillent partes novem. (*Vm*)
Bor. Han. O. Pol. et Sax. Lavand. partem unam, Alcoh. et Aquae, sing. quatuor; — Ba. Lavand. unam, Alcoh. (0,910) quatuor cum dimidia et Aquae sex; — Fenn Lavand. unam cum dimidia, Alcoh quatuor et tres Aquae; — Du. *Gr.* Herbae sesquilibram, Alcoholis octarios octo et Aquae q. s.; — Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Herbae libras duas, Alcoholis vel Aquae Vitae octarios octo et Aquae q. s. ut empyreuma prohibeatur; — Bor4. HassP. Flor. libram unam, Spir. Vini rect. quatuor, Aquae font. q. s.; post macerationem per horas viginti quatuor, destillando libras quatuor elice; — Pm. Flor. libram unam, Alcoholis 22° octo, Aquae sex, digestionem per diem et balneo maris destillationem liquoris librarum octo. — LP. Summit. sicc. uncias sedecim, Spirit. Vini libras quatuor, Aquae unam, infusionem per triduum et destillationem, usque spiritus non amplius prodeat; — *Gr.* Flor. partem unam, Spir. rectif. tres, vel: Flor. libras duas, Spirit. rectif. pond. octo, destill. pond. libras septem, vel: Flor. libr. quatuordecim, Spirit. rect. congios quinque, Aq. q. s ut congii decem abstrahi possint; praeterea: Olei Lavand. uncias quinque, Spiritus rectif. congios tres, Aquae dest. duos, Alum. ust. ad clarif

℞. Lavandulae . partes duodecim.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Aquae . . . . . partes duas.
Partibus sex destillando elicitis productum novae destillationi cum Lavand. partibus duodecim et Aquae duabus subjiciatur, quo partes sex extrahantur. (*Sw.*)

℞. Lavandulae . . . semilibram.
Aquae Lavandulae libram unam.
Alcoholis . . libras quatuor.
Post infusionis horas viginti quatuor destillent librae tres. (R.)

Gr. praeterea: Olei Lavand. libras duas, Ess. Ambrae gris. semunciam, Spirit. rect. congios duodecim; — Ol. Lavand. uncias duas, Ol. Rorism. unam, Ol. Cinnam. guttas quatuor, Aquae Vitae congium; — Ol. Lavand. uncias tres, Ess. Bergam. unam, Ess. Ambrae griseae drachmas quinque, Spiritus rectif. octarios quatuordecim, Aquae Rosar. opt. duos; — Ol. Lavand. drachmas duas, Ess. Bergam. unam, Ess. Amb. gris. gutt. triginta, Ol. Rhodii, gutt. sex (Mosch. gran. unum?), Spir. rectif. libram; — Ol. Lavand. drachm. duas, Ol. Rorism., Ess. Ambr. gris., sing. unam, Spir. rectif. libras duas.— *Re. Lavender water*: Spir. Vin. opt. congios triginta, Flor. Lavand. max. et recentiss. libras sex, digere per hor. 24 et leni igne congios viginti quinque abstrahe, sepone per dies 10 et adde Ol. Lavand. Angl. opt. uncias decem, misce et per mensem repone.

Tinctura Lavandulae composita s. aromatica, Spiritus Lavandulae compositus, Alcohol cum Lavandula Spica compositus. (Am. An. B*. D. Du. Ed. Fenn. GalF. Gen. Han. Lon. LonN. LP. Pal. Suec. *C. Ca. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Spir. Lavand. partes triginta duas.
— Rorismarini partes sedecim.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. partes duas.
Infunde frigidè per tres dies et adde
Ligni Santali rubri partem unam.
Macera iterum per aliquot dies, tunc cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Han. Spir. Lavand. libras duas, Spir. Rorism. uncias octo, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. drachmas duas, et Ligni Santali rubri semunciam; — B*. et GalF. Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. semunciam et Santali rubri unciam; — Pal. et Suec Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi, Nucis mosch., sing. semunciam et Santali rubri drachmas tres; — *Ca.* Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi, Santali rubri, sing. sesquiunciam et Nucis mosch. unciam; — *Vm.* Spir. Rorism. uncias duodecim, Spir. Lavand. triginta sex, Cinnamomi, Nucis mosch, sing. semunciam, Coccionellae semidrachmam.

LP. Spiritus Lavandulae libram unam, Spiritus Cinnamomi uncias quatuor et Olei Nucis moschatae semidrachmam miscere.

℞. Spiritus Lavandulae . libras tres.
— Rorismarini . libram unam.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. . semunciam.
Coccionell. contus. semidrachmam.
Digere, modico igne, per tres dies et cola. (Fenn.)

℞. Spiritus Lavandulae . libras duas.
— Rorismarini . . uncias sex.
Pulv. Cinnamomi,
— Nucis mosch., sing. semunciam.
— Santali rubri drachmas tres.
Post digestionem per septimanam filtra et residuo infunde
Spiritus Lavandulae libram unam.
— Rorismarini . . uncias sex.
Stent in digestione per tres dies, quo facto colaturae filtratae misceantur. (An.)

℞. Spiritus Lavandulae . libras tres.
— Salviae . . libram unam.
Cinnamomi . . . unciam unam.
Nucis moschatae . . semunciam.
Ras. Santali albi drachmas tres.
Post frigidam per octo dies infusionem cola. (*Sw.*)

℞. Spiritus Lavandulae . libras tres.
— Rorismarini libram unam.
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Santali citrini, sing. . semunciam.
Ambrae griseae . semiscrupulum.
Croci . . . . drachmam unam.
Post octo dies macerationis cola. (Gen.)

℞. Spir. Lavandulae,
— Rorismar., sing. viginti quatuor.
Cinnamomi . . . unciam unam.
Nucis moschatae . . semunciam.
Caryophyllorum . drachmas duas.
Aquae . uncias centum viginti.
Destillent liquidi unciae quadraginta octo, in quibus infunde
Ligni Santali rubri drachmas tres et filtra, vel totum, absque destillatione, infusioni subjice per plures dies cum utroque spiritu et filtra. (*Vm.*)

℞. Spir. Lavandulae part. octoginta quatuor.
— Rorism. part. quadraginta octo.
— Citri . . partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes tres.
Cubebarum,
Caryophyll., sing. . partem unam.
Stent per plures dies in frigida infusione, tum filtrentur. (*Vm.*)

℞. Spiritus Lavandulae octarios tres.
— Rorismarini octarium unum.
Nucis moschatae.
Cinnamomi, sing. . semunciam.
Caryophyllorum . drachmas duas.
Ras. Ligni Santali rub. . unciam.

Post decem dies cola. (Am. Du. *C.*)

Lon. ante 1809. *Gr.* Santali drachmas tres et absque caryophyllis; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Caryophyllos omittunt; — Ed. *Gr.* et *Sw.* Spir. Lavand. libras tres, Spir. Rorism. unam, Cinnamomi unciam, Caryophyll. drachmas duas, Nucis mosch. semunciam, Santali rubri drachmas tres et octo dierum macerationem.

℞. Fol. Lavandulae partes duodecim.
— Rorismarini . . partes sex.
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. . partes tres.
Cubebarum . . partem unam.
Aquae Vitae partes centum quadraginta quatuor.
Aquae purae
partes ducentas octoginta octo.

Destillent partes centum octo. (*Vm.*)

Gr. praeterea: Rasurae Sant. rubri libram, Pimentae, Cass. lig., sing. uncias octo, Spir. rectif. octarios duodecim, digere, exprime et adde Olei Lavand. uncias quatuor, Olei Rorism. duas, Spir. tenuioris congios quatuor; vel: Ras. Sant. rubr. libram, Cass. lign. uncias duas, Nuc. mosch. unam, Croci drachmas quatuor, Pis. Aurant. unciam, Fol. Ros. rubr. duas, Spir. rectif congium, hujus tincturae octariis quatuor adde Ol. Lavand. uncias quatuordecim, Spir. volat. aromat. sex, Spir. rectif. congios quinque, Aq. dest. octarios decem; vel: Santal. rubr. uncias quatuor, Spir. rectif. octarios quatuor, digere, exprime et adde Olei Lavandulae drachmas quatuor, Ol. Rorism. unciam, Ol. Cass. gutt. octo, Ol. Caryophyll. gutt. quatuor, Spir. Amm. comp. q. s. (circiter drachmas sex); vel sec. Du. ut formula antea indicata sed additis Caryoph. drachmis duabus.

D. Lavandulae libras duas, Rorism. unam, Cort. rec. Citri uncias tres, Alcoholis libras duodecim, destillationem ad siccum et infusionem producti cum Cubebarum, Caryophyll., sing. uncia una et Cinnamomi unc. tribus

Reizend. — Gabe, von 3 bis 6 Tropfen bis zu zwei Drachmen in Zuckerwasser.

Spiritus Lavandulae ammoniacalis, Guttae anglicae cephalicae. (*T.*)

℞. Spir. Cornu Cervi (destillatione cornu cervi vel fili bombycini obtenti) . . . . . uncias octo.
Olei ess. Lavand. drachmas duas.
Alcoholis 33° B. . unciam unam.

Aqua odorifera. (B*. Wir.)

℞. Herbae Rorismarini,
Herbae Majoranae,
Flor. Lavand., sing. unciam unam.
— Liliorum Convallium,
— Rosarum, sing. uncias duas.
Ligni Rhodii,
Cort. rec. Citri, sing.
sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . sesquiunciam.
Alcoholis . . . . libras octo.
Aquae . . . . libras quatuor.

Post tres dies digestionis destillent tres quadrantes. (Wir.)

℞. Lavandulae,
Melissae, singularum libras duas.
Radicis Calami . . libram unam.
Caryophyllorum,
Herb. Rorism., sing. . semilibram.
— Majoranae,
— Menthae piperitae,
Cinnamomi, sing. . unciam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Aquae . . . . . libras triginta.

Destillent unciae viginti. (B*.)

Fast nur dem Namen nach von dem Carmeliter- und Kölnischen Wasser verschieden. Es dient zu demselben Gebrauch.

Smith's British Lavander water (*Gr. Re.*): Ol. Lavand. Angl. uncias duas, Ess. Ambr. gris. unam, Aq. Coloniens. octarium unum, Spir. rectif. duos.

Lawsonia.

Lawsonia inermis, L.; rothes Mundholz, rothes Aegyptisches Färbekraut; Henné (*Gal.*); Alkanet (*Ang.*); Pachar (*Jav.*); Pontalesche (*Malab.*).

Ba. Gal. Wir. *A. Gr. M. Sp.*

Ein Strauch (Octandria Monogynia, L.; Salicariae, J.) Ostindien's und Africa's. (Hort. Malab. IV. p. 117. t. 57.)

Man wendet die Wurzel (radix Alcannae verae s. orientalis s. Cypri antiquorum s. Ligustri Aegyptiaci) an; sie ist dunkelroth und hat einen herben, styptischen Geschmack

Schwach adstringirend.

In Ostindien gebraucht man die Wurzel der Lawsonia spinosa, L.; Henné épineux (*Gal.*); Urkan (*Ar.*); Maritondi (*Cy.*); Mayndie (*Duk.*); Daun lacca (*Mal.*); Mail anschi (*Malab.*); Henna (*Pe.*); Sagachero (*Sa.*); Marudanie (*Tam.*); Goruntа chettu (*Tel.*).

Sie hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen und sie soll bei Aussatz und andern Hautkrankheiten, sowohl äußerlich als innerlich angewendet, zu einem halben Kaffeelöffel gegeben, nützlich seyn.

Ledum.

Ledum palustre, L.; Haidebienenkraut, Sumpfporsch, wilder Rosmarin, Porsch, Porst; Romarin sauvage (*Gal.*), Marsh ledum (*Ang.*); Vild rosmarin (*D.*); Wilde rosmaryn (*Bel.*); Ledo (*I.*); Rozmarin czeski (*Pol.*); Getpores Sqwattram (*Suec.*).

A. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

4 (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, *J.*) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Schk.* t. 117. *Plenck* t. 337. *Hayne* III. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)

Man wendet die Spitzen (herba s. folia Ledi palustris cum floribus s. Rorismarini sylvestris s. Anthos sylvestris) an; sie bestehen aus behaarten, röthlichen Zweigen mit linienförmigen, fast sitzenden, am Rande umgeschlagenen, oben grünen, unter filzigen und röthlichen Blättern und weißen, endständige, sitzende Dolden bildenden Blüthen.

Diese Pflanze wird für narkotisch gehalten und in convulsivischen und Krampfkrankheiten gepriesen

Infusum Ledi s. Ledi palustris. (B*. *Siw. Sy.*)

℞. Fol. Ledi
unciam dimidiam ad unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde per horam unam et cola.

Bei Aussatz, Krätze, Kopfgrind, Keichhusten, venerischen Krankheiten empfohlen.

Aqua Ledi palustris. (*Gr.*) wird für Rosenwasser verkauft.

Lens.

Ervum Lens, L.; Linse; Lentille (*Gal.*); Common lentil (*Ang.*); Lentecchia (*I.*); Lins (*Suec.*); Lentilha (*Lus.*).

Gal. LP. *Be. G. Gr. M. Sp.*

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. *Plenck* t. 565. *Schk.* t. 202. *Sturm* Fl. D. I. 32. *Oed.* Fl. Dan. t. 95.)

Man wendet den Saamen (semen Lentis) an; er ist kreisrund, platt, an beiden Seiten bauchig und von gelblicher Farbe

Ehedem gab man die Abkochung bei Blattern; sie ist, schwach bereitet, etwas adstringirend.

Lepidium.

Von dieser Pflanzengattung werden angeführt:

1) *Lepidium latifolium, L.*; Pfefferkraut; Passerage à larges feuilles, grande Passerage (*Gal.*); Broadleav'd paperwort (*Ang.*); Peperur (*D.*); Breedlabig peperkruid (*Bel.*); Lepidio (*I.*); Peparaer (*Suec.*).

Gal. His. His8. *Gr. Sp.*

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. *Blackw.* t. 448. *Oed.* Fl. Dan. t. 557.)

Man wendet das Kraut (herba Lepidii s. Piperitidis) an; es besteht aus einem walzigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, blaß- und selbst blaugrünen, gezähnelten oder bisweilen ungetheilten Blättern, von denen die untern gestielt, die obern sitzend und schmal sind. Es hat einen scharfen, gewürzhaften, pfefferartigen Geschmack.

2) *Lepidium Iberis, L.*; kleines Pfefferkraut; Passerage ibéride, petite Passerage (*Gal.*).

Gen. *Gr.*

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 593.)

Man wendet das Kraut (herba Iberidis) an; es besteht aus einem ästigen Stängel, gestielten, lanzettigen, an der Spitze gezähnten oder selbst eingeschnittenen, fiederspaltigen oder leierförmigen Wurzelblättern und linienförmigen, ganzen und ganzrandigen Stängelblättern. Es hat einen scharfen, starken, dem der Kresse ähnlichen Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut.

Gr. führt außerdem Lepidium procumbens, Ambrosia an; die Saamen sind eröffnend, einschneidend und antiscorbutisch.

Conserva Lepidii. (His. His8.)

℞. Fol. rec. Lepidii . partem unam.
Contundendo pistilli lignei ope in mortario marmoreo in pastam mollem redige, addendo sensim
Sacchari albi pulverati partes duas.

Infusum Lepidii. (B*.)

℞. Herb. Lepidii
unc. dimid. ad unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur.

Dieser Aufguß ist, nach Erdmann in Rußland gegen Wechselfieber in Gebrauch. — Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Lichen.

Wir führen unter diesem Namen an:

1) *Physcia nivalis, Cand.*; Schneeflechte: Lichen blanc de neige (*Gal.*).

Wir.

Ein kryptogamisches Gewächs der Alpen

und der Pyrenäen. (*Dill.* Musc. t. 21. f. 56.)

Es besteht (Lichen terrestris cinereus) aus weißen oder gelblichen, am Grunde etwas abstehenden, oben wieder aufwärts gerichteten, ästigen, fast ausgezackten, krausen Blättern, welche in platte, rundliche oft mit schwarzen Puncten gesäumte Läppchen endigen; die auf den Blättern sitzenden Schildchen sind sehr selten, sitzend, braun und von einem gekerbten Rande eingefaßt.

Das Pulver dieser Pflanze wurde ehedem als ein specificum gegen die Wuth betrachtet.

2) *Scyphophorus cocciferus*, *Cand.*; scharlachfarbige Becherflechte, Feuerkraut, Fiebermoos; Lichen coccifère (*Gal.*)

Gal. *Gr.*

Diese Flechte (herba Ignis s. Musci pyxidati, Lichen cocciferus) besteht aus kleinen, oben grünlichweißen, unten weißeren Blättern, von denen walzige, oft ästige Stängel entspringen, welche sich in Becher erweitern, an deren Rändern rothe Höcker sitzen.

3) *Peltigera canina*, *Cand.*; Hundsflechte; Lichen contre la rage (*Gal.*); Ashcolour'd ground liverwort (*Ang.*); Hondsmoos (*Bel.*); Musgo canino (*Lus.*); Hund mossa (*Suec.*).

Br. Gal. *Gr. M. Sp.*

Ein sehr häufig in Hölzern auf der Erde wachsendes kryptogamisches Gewächs. (*Plenck* t. 747. *Vaill.* Bot. t. 21. f 16.)

Es besteht diese Flechte (herba Musci canini s. Lichen terrestris s. caninus s. cinereus terrestris) aus großen, breiten, lebrigen, rundlichen, aschgrauen oder braunen Blättern, welche unten mit rothen, behaarten, ästigen und unter einander zusammentretenden Rippen versehen und in rundliche Lappen getheilt sind, von denen einige aufsteigende die rothen, ebenen, länglichen, scheitelrecht stehenden Schildchen tragen; der Rand der letztern ist eingewachsen.

Peltigera venosa, horizontalis, polydactyla und aphthosa (*Hoffm.* Lich I. t. 6. f 1. *Jacq.* Coll. IX. t. 17.), welche von der Französischen Pharmacopöe ebenfalls angezeigt sind, haben viel Aehnlichkeit mit ihr.

Ehedem hielt man diese Pflanze als gegen die Wuth für sehr nützlich.

4) *Scyphophorus pyxidatus*, *Cand.*; Becherflechte; Lichen en entonnoir (*Gal.*).

Ful. Gal. GalM. Ham. Li. *Gr. M. Sp.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches man auf der Erde, auf Holz und an alten Mauern antrifft. (Handb. d. pharmac. Bot. t. XCII. f. 427. *Dill.* Musc. t. 14. f. 2.)

Dieses Moos (herba Musci s. Lichenis pyxidati) besteht aus lappigen oder gekerbten, oben etwas grünlichen, unten weißern Blättern, welche regelmäßig von unten nach oben ausgerandete becherförmige Schildchen tragen, an deren Rande dunkelbraune Höcker sitzen.

Ehedem gegen Husten empfohlen.

5) *Usnea plicata*, *Cand.*; Haarflechte, Wickelflechte; Lichen entrelacé, Mousse de chêne (*Gal.*); Hairy treemoss (*Ang.*); Skinslav (*D.*); Musco arboreo (*His.*); Worrig schurfmoos (*Bel.*); Musgo dos carvalhos (*Lus.*); Taf (*Suec.*).

Gal. His. His3. Wir. *Gr. M.*

Ein kryptogamisches Gewächs, welches sich auf den Zweigen alter Bäume häufig findet. (*Dill.* Musc. t. 11. f. 1.)

Es besteht (Muscus albus quernus s. arboreus) aus bisweilen über 1 Fuß langen, sehr festen, höckrigen, in durcheinander gewirrte Aeste getheilten, weißlichen Stängeln und vielen fast endständigen, weißen, mit haardünnen Wimpern am Rande versehenen Schildchen. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas adstringirenden Geschmack.

Schwach adstringirend ehedem für schmerzstillend gehalten und sowohl als magenstärkend, als auch um Ausflüsse jeder Art zu hemmen und Husten zu mildern angewendet.

6) *Physcia Islandica*, *Cand.*; Lungenmoos, Isländisches Moos; Lichen d'Islande (*Gal.*); Iceland lichen, Iceland liverwort (*Ang.*); Gaternjk (*B.*); Islandskmoos, Fielgraes (*D.*); Liquen islandico (*His.*); Yslandisch moos (*Bel.*); Lichene islandico, Musco catartico (*I.*); Meck islandzki (*Pol.*); Musgo islandico (*Lus.*); Islandsmosse (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han Hass. HassP. His. His8. LH. Li Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Ic. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Sar. Sp Va.* Z.

Ein in Europa, besonders im Norden, sehr gemeines kryptogamisches Gewächs. (*Jacq.* Coll. IV. t. 8. f. 1. *Plenck* t. 744. *Blackw.* t. 599. *Oed.* Fl. Dan. t. 158. f. 879.)

Es besteht (herba Lichenis Islandici s. Muscus Islandicus s. catharticus, Cladonia Islandica) aus häutigen, kastanienbraunen oder olivenfarbigen, am Grunde bräunlichrothen, unten blässern, aufrechten, ästigen, in zurückgebogene, fast linienförmige, vielspaltige, hohle, gezähnte und gefranste Lappen getheilten Ausbreitungen;

die breiteren Lappen tragen ebene, sitzende, angedrückte, gleich- oder weniger dunkelgefärbte Schildchen mit erhabenem, ganzem, und gefranst'em Rande.

Nach Prouſt enthält dieſe Pflanze in 100 Theilen, 64 Schleim, 33 ſatzmehlartigen und 3 bittern Stoff.

Es beſitzt, je nachdem man ihm den bittern Stoff entzogen hat oder nicht, entweder bloß nährende oder zugleich auch toniſche Eigenſchaften. Man hat es beſonders in der Lungenſchwindſucht gerühmt. Lichen velleus ſoll ähnliche Eigenſchaften beſitzen.

7) *Imbricaria parietina, Cand.*; Wandflechte, goldgelbe Schuppenflechte, Plankenflechte; Lichen des murs (*Gal.*); Common yellow lichen (*Ank.*); Gunl skorpemoos (*D.*); Maurig schurffmoos (*Bel.*); Vaeggmosse (*Suec.*).

A. Ba. Fer. GalM. Sax.

Ein Kryptogamiſt Europa's. (Fl. Dan. 1005. *Hoff.* Enum. Lich. XVIII. 1. *Hayne* V. t. 47. *Dill.* Musc. t. 24. f. 76.)

Es beſteht aus einem häutigen, geſchindelten, unten weißlichen, oben grünlichen, ſpäter in's Goldgelbe und Aſchgraue übergehenden Laub mit rundlichen, in Lappen getheilten, krauſen, großen, ausgebreiteten Blättern, in deren Mitte zahlreiche Schildchen mit dunkler gefärbter Scheibe und ganzem Rande ſitzen.

Bitter, als Erſatzmittel der China bei Wechſelfiebern ausgegeben. Doch hat die Schrader'ſche Analyſe eine Aehnlichkeit mit der China nicht dargethan.

8) *Physcia Prunastri, Cand.*; weißes Lungenmoos; Lichen du prunellier (*Gal.*).

Wir. *Gr. Sp.*

Dieſe Flechte wächſt in Europa. (*Dill.* Musc. t. 21. f. 54. 55 A.)

Sie beſteht (Muscus arboreus s. Acaciae) aus einer weichen, häutigen, aſchgrauen, weißlichen, bisweilen grünlichen, runzeligen, höckrigen, unten milchweißen, ungleich gabeligen, ſehr äſtigen Ausbreitung mit aufrechten, linienförmigen, verdünnten, ebenen Lappen; die Schildchen ſind einzeln, braun und randſtändig.

Schwach adſtringirend.

9) *Lobaria pulmonaria, Cand.*; Lungenflechte; Lichen pulmonaire, Pulmonaire de chêne (*Gal.*); Lungwort (*Ang.*); Lungemos (*D.*); Pulmonaria de arbol (*His.*); Longachtig lungwort (*Bel.*); Polmonaria di quercia (*I.*); Hepatica dos avores (*Lus.*); Lungmossa (*Suec.*).

Br. Gal. GalM. Gen. Wir. Wür. *Be. Fi. Gr. M. Sp.*

Ein beſonders im Norden Europa's ſehr gemeines kryptogamiſches Gewächs. (*Plenck* t. 745. *Hayne* V. t. 48. *Zorn* Ic. pl. t. 494.)

Es beſteht (herba Pulmonariae arboreae s. Muscus s. Lichen pulmonarius) aus einer oben gelbgrünen Ausbreitung mit einem Netz hervorſtehender Höhlen, unten gleichſam höckrig, weiß und an den Erhöhungen, welche die Höhlen daſelbſt bilden, glatt, in den Zwiſchenräumen derſelben braun und behaart.

Species pectorales. (Ful.)

℞. Lichenis Islandici libram unam.
Radicis Althaeae . . libras duas.
Concisa misce.

Pulvis antilyssus. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Lichen. terrest. ciner. uncias duas.
Piperis nigri . . unciam unam.
Fiat pulvis.

Chocolata Lichenis Islandici, Pasta cacaotina lichenifera s. Cacao cum Lichene Islandico. (Bor4. Sax. *Au.*)

℞. Seminum Cacao tostorum,
Sacchari, sing. . libras quatuor.
Lichenis Islandici . libras duas.
Salep . . . . . uncias tres.

Von Trommsdorff angegeben (*Au.*)

℞. Lichenis Isl. Aqua cal. loti et sicc. partem unam.
Pulveris Salep . partem octavam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Mixtis exacte adde
Past Cacao calidae partem unam.
Fiant tabellae. (Sax.)

℞. Lichenis Islandici uncias quatuor.
Infunde
Aquae comm. fervid. libras duas.
Kali carb. e cin. clav. drachmas duas.
in solut tenentis. Stent per horas tres. Tum liquorem decantha, residuum Aqua comm. frigida probe ablut. et siccat. in pulverem redige. Hujus pulveris unciis tribus adde
Cacao tostae in mortario ferreo calido in massam subtiliss. redact.,
Sacch. albi pulv., sing. sesquilibram.
Radicis Salep pulv. drachmas tres.
Massam intime mixtam aut in cistuas effunde aut refrigeratam in pulverem redige. (Bor4.)

Extractum Lichenis Islandici. (Wür.)

℞. Lichenis Isl. mund. quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut quatuor digitorum crassitiem tegatur; digere blando calore et decantha; residuum cum Aqua coctum coletur cum expressione; colatura in balneo aquae ad mellis consist. evaporet, ad-

dita sensim tinctura et agitatione continua ut massa homogenea neque grumosa obtineatur.

Infusum Lichenis Islandici. (*Sa.*)

℞. Lichenis Islandici drachmas tres.
Aquae bullientis quantum sufficit ut post semihoram infusionis et aliquot momenta ebullitionis, colaturae librae viginti obtineantur, quibus adde
Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

Syrupus Lichenis Islandici. (Han. *Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias sex.
Aquae bullientis . . libras sex.
Decoque ad libras quatuor et adde
Sacchari albi . . libras quinque.
Coque ad consistentiam syrupi. (Ham.)

Vm. Lichenis partem unam, Aquae triginta quinque ad viginti coctione redactas et decem Sacchari.

Syrupus de Musco querno. (Wir.)

℞. Musci querni . . . uncias tres.
Herbae Chenopodii ambrosiaci,
Passular. min., sing. . semunciam.
Rad. Consolidae maj. unciam unam.
— Liquiritiae . . semunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infundè per noctem, tum lente coque. Colatur. unciarum decem clarif. adde
Balsami Tolutani sesquidrachmam.
Sacchari albi pulv. sesquiunciam.
Misce exacte.

Decoctum Lichenis Islandici. (B*. Sax. Suec. *ParC. Ra. T. Vm.*)

℞. Lichenis Islandici partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram et liquidum decanth. rejice. Tum coque lich. cum
Aquae . partibus triginta duabus ad dimidium, cola et exprime. (Sax.)

T. Lichenis uncias duas, Aquae bull. modicam quant., quam decanthatam rejice et lichen coque cum Aquae libris quatuor ad dimid. Si aquam prioris bullitionis non rejicias, addere potes, ad temperandum saporem amarum, momento, quo ab igne removes, Rad. Liquirit. modicam quant.

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . uncias triginta duas.
Solutionem infunde
Lichenis Isl. mund. unciis duabus.
Post macerationem duodecim horarum liquidum decantha, lichen Aqua pura bene ablue et ei infunde
Aquae . uncias quadraginta octo.
Decoque ad unciar. sedecim remanent., cola et exprime. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Coque, antea per sexagesimas quinque Aqua bull. bene ablutum, cum
Aquae communis . libris tribus ad librar. duar. colat. remanent. (*Ra.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aqua calida bene abluto adde
Aquae octarios duos cum dimidio.
Coque ad sesquioctarium et colat. adde
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Misce bene. (*ParC.*)

Decoctum Lichenis s. Lichenis Islandici (amarum). (Am. B*. Ed. GalM. Lon. LonN. RC. Suec. *Au. C. E. Fi. Gr. Re. Sa.*)

℞. Lichenis Islandici unciam unam.
Aquae purae . . uncias sedecim.
Decoque ad unciarum duodecim colaturae remanentiam. (B*. WW. *E.*)

Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Lichenis unciam, Aquae sesquioctarium (sesquilibram *Gr.*), pro triente consumendum; — Ed. *Fi.* Lichenis unciam, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Du. Lichenis uncias duas, Aquae libras duas ad uncias sedecim redigendas; — Suec Lichenis libram et Aquae uncias viginti quatuor ad sedecim redigendas; — RC. Lichenis semunciam, Aquae font. sesquilibram ad libram unam coquenda et sub finem addendo Rad. Liquirit. drachmam vel Mellis puri semunciam.

℞. Lichenis Isl. unciam dimid ad unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad unius librae colat. et adde
Mellis albi . . . unciam unam.
Liqua. (GalM.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae sesquilibra obtineatur; post horae quadrantis ebullit. adde
Syr. Althaeae,
— Papav. albi, sing. unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Lichenis Islandici drachmas duas.
Salep . . . . . grana decem.
Cinnamomi . . . . grana octo.
Aquae . . . . uncias duodecim.
Coque ad unciar. sex rem. et adde
Syrupi Sacchari . quantum vis.
Misce. (*Au.*)

Bitter. — Bei Lungenſchwindſucht, weißem Fluß, Keichhuſten empfohlen. — Gabe, vier Unzen drei oder vier Mal täglich.

Tisane de Lichene Hospit. Paris. (*Va.*)

℞. Lichen Isl. amaritie privat. unciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad tertiam partem, cola et adde
Syrupi Althaeae . . uncias duas.

Warm, kleine Taſſenweiſe, mit Milch oder allein, bei Bruſtkrankheiten. Manche nehmen ſtatt des Waſſers Molken.

Decoctum Lichenis Islandici lacteum. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici . unciam unam.
Seri Lactis . . . uncias viginti.
Decoque ad uncias duodecim et adde
Sacchari lactis . . drachmas sex.

Potio nutriens et sedans. (*B.*)

℞. Lichenis Isl. abluti . uncias duas.
Rasurae Cornu Cervi unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut potio gelatinosa formetur, cui adde
Laudani liq. Sydenh.
gutt. quindecim.

Allmälig den Tag über zu nehmen. — Bei Lungenschwindsucht mit großen Schmerzen empfohlen.

Decoctum pectorale nutriens. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Turionum Abietis . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae libra una obtineatur.

Decoctum pectorale nutriens et incitans s. Lichenis Islandici compositum, Tisana tonico-expectorans. (LH. Wür *Au. B. Sw.*)

℞. Lichenis Isl. abluti unciam unam.
Chinae . . . . . semunciam.
Serpentar. Virg. drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde
Emulsion. gummos. uncias quatuor.
Misce bene. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici,
Hederae terrest., sing. semunciam.
Chinae . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut dec. librae duae obtineantur; adde
Lactis vaccini . . uncias decem.
Misce bene. (*B.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. drachmas duas.
Lichenis Islandici . semunciam.
Dulcamarae . drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Colaturae unciarum quatuor adde
Lactis vaccini . . . uncias sex.
Misce bene. (*B.*)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Rad. Polygalae amar. unciam unam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad librar. duar. colaturam. (*Sw.*)

LH. Lichenis drahmas duas, Polygalae unam, cum Aquae sesquilibra ad libram unam decoquere, colare et refrigerato addere Syrupi communis unciam unam. — Gabe, drei Unzen, zwei Mal.

℞. Lichenis Islandici . drachmas sex.
Fungi Melitensis,
Rad. Consolidae majoris,
— Polygal. amar., sing.
semunciam.
Conserv. Rosar. rubr. uncias duas.
Seminum Hyoscyami drachmas tres.
Aluminis . . . sesquidrachmam.
Aquae fontanae . libras quinque.
Decoque ad librarum trium cum dimidia remanentiam et colaturae adde
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Misce bene. (Wür)

℞. Ligni Quassiae . drachmas duas.
Lichenis Islandici drachmas sex.
Aquae . . . . uncias tredecim.
Decoque ad unc. decem reman. et adde
Extracti Myrrhae drachmam unam.
Tartari stibiati . . . grana duo.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Boleti Salicis,
Summitatum Millefolii,
Florum Salicariae,
Passular. min., sing. . semunciam.
Harum specierum semunciam coque cum Aquae octario uno. (*Au.*)

Gelatina s. Mucilago Lichenis Islandici s. de Lichene Islandico. (Ams. An. B. Bel. BorC. Fenn. Ful. Gal. Han. HassP. Li. LP. Lus. Sax. Suec. Wür. *Au. Ca. Fi. Gr. Huf. Re. T.*)

1) Ohne den bittern Stoff.

℞. Lich. Isl. Aqua alcalina ablut. libram.
Aquae fontanae libras duodecim.
Decoque ad dimidium, cola, exprime et ad locum frigidum repone, ut in gelatinam abeat. (Suec.)

Han. Lichenis Aqua alcalina loti uncias duas, Aquae uncias triginta ad sex redactas et Sacchari libras quatuor; — *Gr.* Lichenis uncias quatuor, Aquae q. s. ut post expressionem sesquioctarius obtineatur, Sacchari albi uncias quatuor.

℞. Lichenis Islandici partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Macera per semihoram, liquidum rejice et residuo infunde
Aquae . . partes triginta duas.
Decoque ad dimidium, tunc ad mellis consist. evaporatum in locum frigidum repone. (Sax.)

Gal. *Ca. Fi. Re.* et *T.* coquere lente Lichenis uncias duas in Aquae q. s., liquidum rejicere, coquere deinde bis residuum in Aqua (unciis duabus), decocta conjungere, addere iis Ichthyocollae solutae drachmam unam (duas *Re.*) et Sacchari albi uncias quatuor, colare, clarificare et evaporando ad semilibrae reman. consumere; — HassP. Lichenis Isl. uncias tres, Aquae fervidae quantum sufficit, infunde et re-

jico aquam, lichenem coque in Aquae libris tribus ad unciarum decem rem., quae leni igne ad sex evaporent.

2) Mit dem bittern Stoff.

℞. Lichenis Islandici libram unam
Aquae . . . . . libras viginti.
Decoque ad librar. sex reman., cola fortiter exprimendo et in locum frigidum sepone. (Fenn.)

BorC. Lichenis unciam unam et Aquae duodecim ad octo redig.; — *Huf.* Lichenis q. s. ut Aquae quantitas arbitraria in mucilaginem redigatur; — *Au.* Lichenis unciam unam et Aquae duodecim ad octo redig.

℞. Lichenis Islandici . uncias tres.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad tertiae partis reman., cola, exprime, vaporando ad libram unam consume et adde
Syrupi cujuslibet . uncias tres.
Misce bene. (*Au.*)

℞. Lichenis Islandici sesquiunciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad colat. unciar. sex et adde
Sacchari albi . . uncias quatuor.
Ad syrupi spissi consistentiam redacta refrigescant. (Ams. An. B. Bel. Li. Lus.)

LP. Lichenis sesquiunciam, Aquae quantum sufficit, coctionem per horam, colare, inspissare ad gelatinae consistentiam et addere Sacchari albi unciam unam.

Regnault: Lichenis uncias sex, Aquae octarios tres, quadrantem horae ebullitionis, colaturae evaporationem ad octarium usque, Sacchari uncias sex et coctionem ad syrupi spissi consist. — *Idt* et *Chevallier* coquere proposuerunt in globo stanneo cochlea instructo, in balneo aquae, Lichenis Aqua calida loti unciam unam cum Aquae unciis quinque per horas tres, decoctum colare et exprimere, addere colaturae Sacchari unciam unam, lente ad unciar. quatuor liquidi reman. consumere, in ollam effundere et postquam concreverint, pelliculam in superficie formatam removere. (GalF.)

3) Mit dem bittern und einem abſtringirenden Stoffe.

℞. Lichenis Islandici,
Musci pulmonarii,
Fungi Melitens., sing. drachm. sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad colaturae sesquilibrae reman., inspissa ad gelatinam, cui adde
Sacchari rosati . . sesquiunciam.
Misce bene. (Wür.)

℞. Lichenis Islandici sesquiunciam.
Musci albi querni,
Petalorum Rosarum,
Rad. Polygal. amar., sing. semunciam.
Ichthyocollae . . unciam unam.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Coque per horas duas et adde col.
Elaeosacchari Citri . uncias duas.
Misce bene. (*Au.*)

Ful. Lichenis Isl. uncias tres, Fungi Melit. unam, Aquae libras quatuor ad tertiam partem redig., evaporationem colaturae ad consistent. aptam et Syrupi Sacchari uncias tres.

Dieſe Gallerte iſt nach der erſten Formel analeptiſch und der Gährung unterworfen, nach der zweiten toniſch, und abſtringirend und ſelbſt blutſtillend nach der dritten. — Gabe, zwei bis ſechs Löffel.

Gelatina Lichenis cum China. (Gal.)

℞. Lichenis Islandici . uncias duas.
Ichthyocollae . drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque lichen leviter in aqua, qua rejecta, coque denuo bis e serie, duobus decoctis adde ichthyocollam separatim dissolutam et
Syrupi Chinae vinosi . uncias sex.
Post levem ebullitionem cola, evaporatione pro parte dimidia consume et ad refrigerandum repone.

Gelatina Lichenis opiata.

℞. Lichenis Islandici,
Ras. Cornu Cervi, sing. semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Decoque ad unciarum quatuor remanentiam et adde colaturae
Syrupi Opii . . unciam unam.

Pasta lichenifera s. cum Lichene Islandico. (GalH. Sax.)

℞. Lichenis Islandici . libras duas.
Sacchari albi,
Gummi Senegal., sing. libras octo.
Extr. Opii gummos. drachmas duas.
Aquae Flor. Aurant. semilibram.
Coque lichen in Aqua per aliquot tempus; liquido rejecto, coctionem continua, colaturam cum saccharo et gummi separatim dissoluta commisce et ad mellis spissi consist. evaporatis adde extractum in aquae flor. aurant. parte una solutum, evaporationem continua, addendo aquae aromaticae quod restat, et coque donec massa non amplius manui adhaereat. (GalH.)

℞. Gelat. Lichen. Isl partes duodecim.
Sacchari pulverati partem unam.
Gummi Arabici pulv. partes duas.

Misce saccharum et gummi cum gelatina adhuc calida. (Sax.)

Trochisci Lichenis Islandici. (GalF. GalH.)

℞. Lichenis . . . . libram unam.
Aqua frigida ablutum coque cum
Aquae . . . . . libris sex
per sexagesimas viginti; colaturae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Evaporata lente ad siccum pulvera; hujus pulveris et Sacchari albi partes aeq. commixtae cum Aquae q. s. in pastam redige in trochiscos dividendam.

Electuarium incrassans. (Wür.)

℞. Gelat. Lichen. Isl. (Wür.)
uncias duas.
G. Tragacanth. . unciam unam.
Rad. Consolidae maj. pulv.
drach. tres.
Conserv. Rosar. rubr.
drachmas sex.
Syrupi Capitum Papaveris . q. s.

Jus pectorale s. Decoctum cum Carne pectorale. (Ca.)

℞. Lichenis Islandici . semunciam.
Helices (Pomatia) albos . no. 6.
Cordis vervecini partem dimidiam.
Pulmonis vitul. concis.
unc. quatuor.
Aquae . . . . sesquioctarium.
Coquendo partem tertiam consume.

Hydromel anticatarrhale (Ca.)

℞ Lichenis Isl. Aqua bull. abluti
uncias duas.
Foliorum Hyssopi . semunciam.
Hydromellis . . . libras duas.
Macera per plures dies, cola et adde
Sacchari albi . . . uncias tres.
Filtra denuo.

Lignum Agallochum.

Lignum Agallochi veri s. Aloës s. aquilinum, Xylaloës; Aloëholz, Paradiesholz; Bois d'Aloes ou de Calambac, de Calembouc (*Gal.*); Calumbuk, Aghaluchie (*Ar.*); Aggur, Agor (*Beng. Hin.*); Sukkiang (*C.*); Chin hiam (*Co.*); Aghir (*Duk.*); Legno aloe, Agallocho, Xilaloe (*I.*); Udhindi (*Pe.*); Legno aloes (*His.*); Pao de aloes (*Lus.*); Aguru (*Sa.*).

Br. Fer. His. His3. Wir. *A. Fi. G. Gr. M. Sp.*

Dieses Holz ist knotig, sehr schwer, derb, fettig und besteht fast ganz aus Harz: es ist außen röthlichbraun, auf der Durchschnittsfläche grauer und mit schwarzen Flecken gezeichnet. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen bittern Geschmack. Es brennt unter Verbreitung eines sehr angenehmen Geruchs

Man leitet es von Excoecaria Agallocha, L., einem Baume (Dioecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, J.) Cochinchina's her. (*Rumph.* Amb. II. t. 79. f. 80.)

Tonisch, reizend.

Species cordiales temperatae. (Wir.)

℞. Sericei crudi usti,
Eboris ad albedinem usti,
Corallii rubri,
— albi, singulorum semunciam.
Margaritarum praep. sesquiunciam.
Rad. Doronici,
— Behen albi,
— — rubri, sing. drach. tres.
Ligni Agallochi . . semunciam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ossis cordis cervini, sing.
drach. tres.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri, sing. drachmam unam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Fiat pulvis, cui adde
Foliorum Auri,
— Argenti, sing. quantum vis.

Ein abgeschmacktes Präparat, welches man ehedem von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme bei bösartigen Fiebern, Herzklopfen und Ohnmachten von Furcht gab.

Extractum Ligni Aloës s. Agallochi. (Br. Pal. Wir.)

℞. Ligni Agallochi . quantum vis.
Alcoholis concentrati . . q. s.
ut lignum penitus extrahatur; tincturam in balneo aquae vaporationi subjice et quod, Alcohole elicito, restat, serva. — Man setzte ehedem dieses Extract zu Haupt-Pulvern und Pillen. — Gabe, ein bis zwei Gran.

Tinctura s. Essentia Ligni Aloës s. Agallochi. (Br. His. His3. Wir.)

℞. Ras. Lig. Agallochi sesquiunciam.
Alcoholis concentrati semilibram.
Post sufficientem macerationem filtra. (Br. Wir.)

His. Ligni partem unam (duas His.) et duodecim Alcoholis.

Reizend, magenstärkend, auf den Uterus, gegen Kopfschmerz und analeptisch wirkend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Lignum Aquilae.

Lignum Aspalathi, Aloës, Aloexylon,

Agallochum; Adlerholz; Bois d'Aigle (*Gal.*); Legno d'Aquila, aspalato (*I.*).

Br. Wir. *Be. Fi. G. Gr.*

Dieſes Holz iſt ſchmutzig gelb, wenig harzig, faſerig, bisweilen ſchlammig und ſchwer zu zerbeißen. Der Geſchmack iſt gewürzhaft, aber nicht bitter. Der Geruch iſt ſchwach, moſchusartig.

Es ſtammt, wie man glaubt, von Aquilaria ovata, *Cav.*, einem Baume (Decandria Monogynia, L.), welcher in Oſtindien wächſt. (*Cav.* Diss. bot. 7. p. 377. t. 224.)

Ein wenig gebrauchtes Reizmittel.

Lignum Brasiliense.

Lignum Brasilianum rubrum s. Fernambuci; Braſilienholz; Bois de Brésil, de Fernambouc (*Gal.*); Ibirapitanga (*Bras.*)

Br. Gal. Li. *G. Gr.*

Dieſes Holz iſt ſchwer, hart, geruchlos und von wenig bemerkbarem Geſchmack; die rothe Farbe deſſelben zeigt verſchiedene Abſtufungen.

Es kommt von Caesalpinia echinata, *Lamk.* oder crista, Brésillet (*Gal.*), einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Braſilien's (*Piso* Bras. p. 164. Ic. *Bert.* Bild. t. 45. fig. 2.)

Abſtringirend, ehedem bei Diarrhöe angewendet, heutzutage aber außer Gebrauch.

Infusum Ligni Brasiliensis (*Gr.*) e Ligno et Aqua bulliente. Reagens.

Lignum Campechianum.

Lignum Campechiense s. Campechense s. Campescanum s. Brasilianum rubrum s. Sappan s. coeruleum s. Haematoxyli; Campeſcheholz, Blauholz; Bois de Campeche (*Gal.*); Logwood (*Ang.*); Campesketraet (*D.*); Palo de Campeche (*His.*); Campechehout (*Bel.*); Legno di Campeggio (*I.*); Niebieskie drzewo (*Pol.*); Pao de Campeche (*Lus.*); Campechetraed (*Suec*).

Ams An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. LP. Lon. LonN. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Re. Va.*

Das Campeſcheholz, welches wir ohne Rinde und Baſt erhalten, iſt hart, ſehr dicht, ſchwer und außen graulichbraun. Die friſche Durchſchnittsfläche hat eine dunkelrothe, etwas in's Gelbliche ziehende Farbe mit der Länge laufenden ſchwärzlichen Adern. Quer durchgeſägt zeigt es kleine, wellenförmig gebogene, dunkelrothe Ringe. Der Geſchmack iſt ſüßlich, abſtringirend, hintennach etwas bitter. Es färbt den Speichel bläulichroth.

Es kömmt von Haematoxylon Campechianum, L., einem Baume (Decandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Südamerica's. (*Blackw.* t. 493. *Plenck* t. 329. *Bert.* Bild. III. 43. f. 2. *Desc.* Fl. Ant. I. 73.)

Chevreul hat darin einen beſonderen färbenden Stoff, das Hämatoxylin oder Hämatin (Haemotoxylinum, Haematinum), Hématine (*Gal.*) entdeckt.

Abſtringirend, toniſch.

Infusum Ligni Campechiensis (*Gr.*) e Ligno et Aqua bulliente. Reagens.

Decoctum Haematoxyli s. Ligni Campechiani s. Campechensis. (B*. Ful. His. His3. RC. Wür. *E. Re. Sa. Sw.*)

℞. Ligni Campechiani unciam unam.
Aquae purae . . libras quatuor.
Digere primum, tunc coque ad dimidii remanentiam usque et cola. (His. His3.)

B* et *E.* Ligni drachmas duas ad quatuor, Aquae libram et decoctionem ad unciar. sex colat. reman.; — *Sa.* Ligni unciam et Aquae q. s. ad colat. librae unius reman.; — *Sw.* Ligni rasp. unciam, Aquae libram, reductionem ad dimidium et si necesse est, additionem Tinct. Chinae unciae unius et Tinct. sedativae guttarum triginta; — Ful. Ligni unciam, Aquae libras duas et decoctionem ad dimidium.

Du. RC. *Re.* Ligni rasi sesquiunciam, Aquae font. libras duas ad unam decoquere et sub finem addere Corticis Cassiae (Cinnamomi) drachmam unam.

℞. Ras. Ligni Campech. uncias duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum cum dimidia remanentiam et adde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . scrupulos quatuor.
Liquorem post unam vel duas ebullitiones cola. (Wür.)

Abſtringirend, bei Durchfall, chroniſcher Ruhr, Leberfluß und Blutungen empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Unzen alle vier Stunden und öfter.

Extractum Ligni Campechiani s. Campechiensis s. Haematoxyli. (Am. Du. Bor. Bor4. Ed. Ful. Han. HassP. Lon. LonN. Pol. RC. Sax. Wür. *C. Gr. Re.*)

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae communis . partes octo.
Macera per horas viginti quatuor, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor

quo facto liquores commixti, post viginti quatuor horarum sepositionem, ad aptam consist. evaporent. (Sax.)

℞. Ras. Ligni Campech. partem unam.
Aquae fontanae . . partes octo.

Coquendo ad dimidium redacta cola exprimendo; tunc liquor ad massae pil. consist. evaporet. (Am. Du. Ed. C.)

Lon. LonN. *Gr.* et *Re.* Ligni libram, Aquae ferventis congium per horas 24 macerare, tum ad octarios quatuor decoquere et liquorem adhuc calentem colatum ad idoneam crassitudinem inspissare; — RC. ut extractum gentianae luteae.

℞. Ligni Campechiani partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur et exprimatur; tunc liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extracti consistentiam evaporent. (Bor.)

Han. coquere binis vel ternis vicibus sequentibus Ligni partem unam in Aquae sex et colaturas conjunctas vaporando inspissare; — Pol. coquere quater per horae quadrantem quaque vice cum Aquae partibus octo; — Bor4. ut extractum cascarillae; — HassP. ut extractum colombo.

℞. Rasurae Ligni Campechiani q. vis.
Alcoholis . . quantum sufficit ut lignum quatuor digitorum crassitiem tegatur; stent blando calore in digestione et decanthentur; residuo cum Aqua per horam cocto et cum expressione colato, colatura in balneo aquae ad mellis consist. evaporet, addita pedetentim tinctura et inter continuam agitationem ut massa homogenea neque grumosa obtineatur. (Ful. Wür.)

Gabe, eine bis zwei Drachmen, in einem paſſenden Vehikel.

Potio adstringens. (*E.*)

℞. Extr. Lig. Campech. drachmas tres.
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Catechu drachmas duas.

Gabe, zwei Löffel alle drei oder vier Stunden, bei Durchfall und Ruhr.

Elixir adstringens. (Ham. *Au.*)

℞. Extr. Lig. Campech. drachmas duas.
Aquae desillatae uncias quatuor.
Elixir acid. Hall. drachmam unam.
Misce exacte. (Ham.)

℞. Ext. Ligni Campech. semunciam.
Vini rubri . . . . uncias duas.

Gabe, alle zwei Stunden ſechszig Tropfen. (*Au.*)

Mixtura adstringens. (*Sw.*)

℞. Extr. Lig. Campech. drachmas tres.
Aquae Cinnam. spirit. sesquiunciam.

Contere et adde
Aquae . . . . uncias septem.
Tincturae Kino drachmas duas.

Gabe, alle vier oder fünf Stunden zwei Löffel.

Solutio Haematini (*Gr.*): Lignum pulv. per horas circiter sex in Aqua temp. 120—130° F. macera, filtra, ad siccum vapora, extractum per hor. 24 in Alcohole macera, filtratum vaporatione inspissa, adde Aquam, et spontaneae siccationi derelinque ut crystalli haematini prodeant, quae Spiritu Vini ablutae in Aqua dissolvantur. — Reagens auf verſchiedene Säuren und Alkalien.

Lignum nephriticum.

Grieshol̃; Bois nephretique (*Gal.*); Palo nefritico (*His.*).

Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. *Be. G. Gr. M. Sp.*

Dieſes Holz iſt ſehr ſchwer, geruchlos und beſteht aus einem weißlichen, ſehr derben Baſt und einem röthlichen, ſehr harten Kern; die Rinde iſt leicht, innen faſerig, auswendig ſchwammig und geborſten. Es hat einen nur wenig bemerkbaren, ſchwach pfefferartigen Geruch.

Einige leiten es von Guilandina Moringa, L., Andere von Mimosa Unguis cati, L., und noch Andere endlich, nach Virey, von einer Cissampelos her. Es kömmt aus Neu-Spanien.

Ehedem ſchrieb man ihm kräftige harntreibende Eigenſchaften zu. Heutzutage iſt es nur noch wenig im Gebrauch.

Lignum Rhodii.

Roſenholz, Rhodiſer Holz; Bois de Rhodes, de rose, de Chypre (*Gal.*).

Ams. Be. Br. Fer. His. His3. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Sp.*

Dieſes Holz iſt hart, ſchwer, gelbbraun, in der Mitte dunkler als im Umkreis und beſteht aus concentriſchen ſehr dichten Schichten. Der Geſchmack iſt etwas bitter; der Geruch, beſonders gerieben, ſtark roſenartig.

Es kommt von der Wurzel und bisweilen von dem untern Ende einer Pflanze, welche man allgemein für Convolvulus scoparius, L., hält, einen großen Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Convol-

vulaceae, J.) der Canarischen Inseln. Manche Schriftsteller leiten es von Genista Canariensis, L., her; jedoch ist dieß weniger wahrscheinlich. Ein L. rhodium liefert auch Amyris balsamifera. (*Gr.*)

Reizend, wenig gebraucht.

Oleum Ligni Rhodii essentiale. (Br. Ful. Gal. Pal. Wir. *Gr. Re.*)

℞. Ras. Ligni Rhodii partes decem.
Salis communis . partem unam.
Aquae purae . . partes viginti.

Post horarum duodecim macerationem fiat destillatio et oleum in fundo producti eximatur. (Gal.)

Br. Wir. Ligni partes sex, Salis unam et Aquae triginta sex; — Ful. Ligni unam, Aquae quatuor, absque sale et quatuor dies digestionis; — Pal. Ligni unam, Aquae sex et quinque vel sex dies digestionis.

Dieses Oel wird mehr als Schönheits-, denn als Arzneimittel gebraucht.

Aqua Ligni Rhodii destillata. (Gal.)

℞. Ligni Rhodii raspati partes duas.
Aquae communis partes sedecim.

Post duodecim horarum infusionem destillent partes octo.

Tinctura Rhodii. (*Gr.*)

℞. Ligni Rhodii ras. uncias quatuor.
Spiritus rectificati . . octarium.

Macera per dies quatuordecim et cola — Eine halbe bis eine Drachme täglich drei Mal in schleimigen Mixturen.

Ligusticum.

Ligusticum Levisticum, L.; Liebstöckel, Badekraut, Badekrautliebstöckel, Bärmutterkraut; Livèche (*Gal.*); Common lavage (*Ang.*); Apich welíky, Apich libecek (*B.*); Lovstilk, Lobstik (*D.*); Ligustico (*His.*); Laveskruid (*Bel.*); Livistico (*I.*); Lakotnego ziele (*Pol.*); Levistico (*Lus.*); Libbsticke (*Suec.*).

A. Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M Pid Sp.* Z.

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze des gemäßigten Europa's (*Blackw.* t. 275. *Hayne* VII. t. 6. Diss. off. Pfl. VI. 12. *Zorn* Ic. pl. t. 233.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an

Die Wurzel (radix Levistici s. Lybistici s. Ligustici s. Laserpitii Germanici) ist einen Fuß lang, fleischig, sehr ästig, außen braungelb, innen weißlich und runzelig. Sie hat einen starken, durchdringenden, wenig angenehmen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und widerlichen Geschmack. — Die Saamen sind länglich, gelb und fünfrippig.

Ligusticum aquilegifolium s. Cornubicum liefert ein Harz (Resina Ligustici (*Gr.*).

Extractum Ligustici s. Levistici. (Bor. Bor4. O. Pol. Sax.)

℞. Radicis Levistici,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo, alcoholem destill. elice et residuum ad aptam consist. inspissa. (Pol.)

Bor. O. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — Bor4. ut extractum aconiti.

Essentia Levistici. (Wir.)

℞. Radicis Levistici . uncias duas.
Seminum Levistici unciam unam.
Alcoholis . . . uncias decem.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, Gegengift, blähung- und harntreibend. — Man hat sie bei Wassersuchten empfohlen.

Ligustrum.

Ligustrum vulgare, L.; Liguster; Troène (*Gal.*); Privet (*Ang.*); Liguster (*Bel. D. Suec.*); Alhena jermanica (*His.*); Ligustro (*I.*); Zoba (*Pol.*); Altena (*Lus.*).

Wir. *Gr. Re. Sp.*

Ein Strauch (Diandria Digynia, L.; Jasmineae, J.) Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 112.)

Man wendet die Blätter und die Blüthen an.

Die Blätter (folia Ligustri) sind lanzettförmig, ganz und ganzrandig, glatt, von bitterem und adstringirendem Geschmack. — Die weißen, angenehm riechenden Blüthen bilden kleine Trauben.

Schwach adstringirend, nicht häufig gebraucht.

Aqua Ligustri. (Pal.)

℞. Florum Ligustri . partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Destillet pars una cum dimidia.

Lilium.

Lilium candidum, album, L.; weiße Lilie; Lis blanc (*Gal.*); White lily (*Ang.*); Lilium bjle (*B.*); Hvide lilie (*D.*); Azucena blanca (*His.*); Witte lelie (*Bel.*);

Liglio bianco (*I.*); Silia (*Pol.*); Lirio branco (*Lus.*); Hwit lilja (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Gal. Gen. HassP. His. His3 Lus. Sax. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Sp.*

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Liliaceae, *J.*) Eine urſprünglich in der Levante einheimiſche, in Gärten cultivirte Pflanze. (*Blackw.* t. 11. *Hayne* VIII. 26. *Plenck* t. 278. *Zorn* Ic. pl. t. 462.)

Man wendet die Zwiebel, die Blüthen und die Staubbeutel an.

Die Zwiebel iſt eirund, gelblich, außen ſchuppig, unten mit dicken büſcheligen Faſern beſetzt. Sie hat keinen Geruch, der Geſchmack iſt etwas ſcharf. — Die Blüthen beſtehen aus fünf weißen, gerieften Blättern von einem angenehmen, durch Trocknen ſich verlierenden Geruch. Die Staubbeutel ſind länglich und gelb.

Conserva Florum Liliorum alborum. (Gen.)

℞. Petal Liliorum alb. partem unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Contere.

Pulpa Lilii. (Gal. *T.*)

℞. Bulb. Liliorum mund. . q. vis.
In chartam involutos coque sub cinere calido donec facile inter digitos conteri possint; partibus ustis remotis contunde reliqua in mortario marmoreo ut fiat pulpa, per cribrum arcte textum trajicienda.

T. Bulbos pastae farinae alicujus cerealis involutos in furno coquere.

Aqua Liliorum. (Gal. Gen. Pal. *T.*)

℞. Flor. rec. Liliorum partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal. *T.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — Gen. Florum libras quatuor et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent libras sex.

Oleum Liliorum alborum. (Ams. An. B. Bel. Br. Gal. HassP. His. His3. Pal. Sar. Wir. *Gr. T.*)

℞. Petal. Liliorum rec. part unam c. dimid.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere in balneo aquae per dies duos, refrigerata exprime et macerationem repete. (Sar.)

HassP. Florum libram unam, Olei sesquilibram, digere ad humidi evaporationem, oleum exprime et refrigeratum serva; — Gal. Petalorum partem unam, Olei quatuor et tres macerationes sequentes quarum postrema per menses tres producatur.

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Post aliquot horas digestionis in aquae balneo, exprime. (An. B. Bel.)

℞. Petalorum Liliorum partem unam.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Macera per dies aliquot in loco calido, tunc coquendo humidum consume et cola cum expressione. (Ams. His.)

His3. Petalorum libras tres, Olei octo, tres vel quatuor dies macerationis salis calore aut loco calido, caeterum ut antea; — *T.* Florum recent. uncias quindecim cum Olei Oliv. libris quinque solis calore per 3 vel 4 dies macerare, exprimere, oleo filtrato, novos Flores addere et ita macerationem bis repetere, supremam per mensem circiter protrahendo, filtrare, exprimere et oleum post aliquot dierum sepositionem clarificatum decanthare.

℞. Petalorum Liliorum,
Olei Olivarum, sing. . partes aeq.
Coquendo humidum consume et exprime. (Pal.)

℞. Petalorum Liliorum . partes duas.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Post octo dies digestionis coque et exprime. (Br. Wir.)

Erweichend, ſchmerzſtillend.

Linaria.

Von dieſer Gattung kommen vor:

1) *Linaria spuria, Mill.*; Baſtardleinkraut; Linaire bâtarde. (*Gal.*)

Gal. *Sp.*

⊙ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrofulariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t 918.)

Man wendet das blühende Kraut an; es beſteht aus einem äſtigen Stängel mit behaarten, eirunden, ganzen Blättern und gelben Blumen mit violetter unterer Lippe, welche einzeln in den Blattachſeln auf langen fadenförmigen Stielen ſitzen.

2) *Linaria vulgaris, Moe.*; gemeines gelbes Flachskraut, Leinkraut, Frauenflachs; Linaire commune (*Gal.*); Common toad flax (*Ang.*); Vild torskemand (*D.*); Linaria (*His.*); Linaria, Lino selvatico; Urinaria (*I.*); Het gemeene vlachskruid (*Bel.*); Lennek panng maigi (*Pol.*); Fluysblomster (*Suec.*).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. His3. Li. O. Sax. Wir. *Be. Br. Gr. M. Sp.*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze (*Blackw.* t. 115. *Zorn* Ic. pl. t. 442.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Linariae s. Antirrhini) an; es

beſteht aus einem einfachen glatten Stängel mit vielen lanzettförmigen, ſitzenden, blaugrünen Blättern und gelben, eine dichte endſtändige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen etwas unangenehmen Geruch, welchen es durch Trocknen verliert. Der Geſchmack iſt bitter und widerlich.

Linimentum antihaemorrhoidale, Unguentum Linariae s. de Linaria. (Ba. Bor. Bor4. Br. Han. HassP. Li. O. Sar. Sax. Wir. *Gr. Pie. Sp.*)

℞. Herb. rec. Linar. cum flor. libram unam.
Axungiae Porci . . libras duas.
Coque lente donec humidum evanuerit, cola et exprime. (Ba. Bor. Bor4. Han. HassP. O. Sax.)

Br. Wir. *Gr.* Herbae et Axungiae part. aeq.; — Li. Herbae partem unam et Adipis tres; — *Pie.* quantitates non indicat.

℞. Herbae Linariae uncias duodecim.
— Sedi minoris uncias duas.
— Hyoscyami unciam unam.
Butyri . . . uncias octodecim.
Macera per dies aliquot, coque tunc ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (*Sp.*)

℞. Herbae Linariae cum floribus, Axung. Porci, sing. libram unam.
Coque donec humidum evanuerit, cola cum expressione et adde
Ol. Ovorum . . . semunciam.
— Semin. Hyosc. expr. drachmas duas.
Succi Sedi minoris drachmas tres.
Misce. (Sar.)

L i n u m.

In der Medicin werden angewendet:

1) *Linum usitatissimum, L.*; Lein, Lin ordinaire (*Gal.*); Flax (*Ang.*); Buzruk (*Ar.*); Len (*B. Pol.*); Linzaad (*Bel.*); Haer (*D.*); Ulsikebinge (*Duk.*), Lino (*His. I.*); Tisi, Pahaha (*Hin.*); Vlasch (*Bel.*); Bidgierammi (*Mal.*); Tokhemkutan (*Pe.*); Linhaça, Linho (*Lus.*); Uma, Atasi (*Sa.*); Lin (*Suec.*); Alleverei, Serru sanulverei (*Tam.*); Alivitulu (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Z.*

☉ (Pentandria Digynia, L.; Lineae. *Cand.*) Eine wahrſcheinlich im Orient urſprünglich einheimiſche, durch einen großen Theil Europa's verbreitete Pflanze. (*Blackw.* t. 160. *Plenck* t. 243. *Hayne* VIII. t. 17. Düss. oft. Pfl. VIII. t. 6. *Pert.* Bild. II. 55. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 251.)

Der Saame (semen Lini s. Lini communis s. usitatissimi) iſt braun, glänzend, eirund, länglich, ſpitzig, platt, ganz glatt, an den Rändern ſcharf. Er enthält unter einer ſchleimigen Schaale einen weißen, öligen Kern von unangenehmem Geſchmack.

Der Kern enthält viel Oel, die Schaale dagegen Schleim. Die Saamen ſind erweichend. — Das Leinkuchenmehl (Farina Lini Placentarum) dient zu Breiumſchlägen, muß aber mit etwas Oel ꝛc. verſetzt werden.

2) *Linum catharticum, L.*; Purgirflachs; Lin purgatif (*Gal.*); Purging flax (*Ang.*); Liven vildhaer (*D.*); Cantilagua (*His.*); Purgeervlasch (*Bel.*); Lino purgativo (*I.*); Linho purgante (*Lus.*); Villhaer (*Suec.*).

Du. Gal. Gen. Li. Lon. LonN. Pm. R. Sax. Wir. *Be. C. Gr. M. Par. Re. Sp.*

☉ Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 368. *Plenck* t. 244. *Hayne* VIII. t. 18. *Zorn* Ic. pl. t. 210.)

Man wendet das Kraut (herba Lini purgativi s. cathartici) an; es beſteht aus einem dünnen, in gabelige Zweige getheilten Stängel mit eirundlänglichen, entgegengeſetzten, glatten Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen ſehr bittern, widerlichen Geſchmack.

Ein wenig gebrauchtes Purgirmittel.

Farinae emollientes. (Gal. *Sp.*)

℞. Farin. Seminis Lini,
— Foenu gr., sing. . part. aeq.
Misce. (*Sp.*)

Gal. Farinae Lini, Frumenti et Hordei, sing. partes aequales.

Species emollientes pro Cataplasmate. (BorC. WW.)

℞. Furfuris triticei,
Sem. Lini contus., sing. part. aeq.
Misce. (BorC.)

WW Seminis Lini, Farinae Frumenti, sing. partem unam et Furfuris triticei duas.

Mucilago Seminum Lini. (Gal. Sar. *Sw.*)

℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.
Digere super cinere calido per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola exprimendo. (Gal.)

Sw. Triturare Aquae bull. et Seminum, sing. partes aequales; — Sar. Macerare per horas duodecim Seminum partem unam in Aquae decem, coquere deinde et exprimendo colare.

Cataplasma Farinae Lini emolliens. (Gal. GalM. LH. Li. RC. *Gr. ParC. Ra. Re. Sw.*)

℞. Farinae Seminis Lini quantum vis.
Aquae bullientis, vel
Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*Sw.*)

RC. Farinae Lini q. vis cum Aquae fontanae vel Lactis q. s. ad aptam crassitudinem coquere; — *Re.* Farinam cum Aqua bull. miscere et cum Adipis, Olei vel Butyri recent. q. s. catapl. parare; — *Gr.* Farinae q. placet, Aq. fervid. q. s.

Sw. praeterea coquere per semihoram Seminum Lini quantitatem arbitrariam cum Aquae q. s., addendo Micae Panis duri q. s. ut fiat cataplasma; — LH. Farinae Sem. Lini uncias tres, Decocti expr. Malvae q. s.; — *Ra.* Farinae Hordei et Lini, sing. part. aeq. et Aquae q. s.; — GalM. Farinae Hordei, Frumenti et Lini partes aeq. et Aquae q. s.; — Gal. et *ParC.* Farinarum emoll. uncias quatuor, dilue in decocti emollientis q. s. et coque tunc, addendo Pulpae Specierum emollientium uncias quatuor vel earum ipsar. specier. pulv. unciam unam; — Li. Seminis Lini pulv. et Lactis vaccini bull. partes aeq. commiscendas.

Infusum Lini s. Lini compositum s. Lini usitatissimi. (Am. B*. Ed. GalM. Lon. LonN. RC. Suec. *Au. C. E. Fi. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sw.*)

℞. Semin. Lini contus. unciam unam.
Liquiritiae contusae . semunciam.
Aquae bullientis . octarios duos.
Digere prope ignem per horas quatuor et cola. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. *Au C. E. Gr. Re. Sa. Sw.*)

Fi. Aquae libras duas, caeterum ut antea; — Ed. Liquiritiae drachmas duas, Lini unciam et Aquae libras duas; — *Ra.* Lini drachmas duas, Liquiritiae drachmam et Aquae libras duas; — GalM. Lini drachmas duas cum dimidia, Liquiritiae drachmas duas et Aquae q. s. ut librae duae colaturae obtineantur; — *ParC.* Lini, Liquiritiae, sing. drachmas duas et Aquae libras duas; — RC. Lini uncias duas, Liquiritiae semunciam, Aquae libras quatuor infundere per horas tres et colare; interdum additur Succus Citri vel Roob Oxycocci vel Oxymel simplex vel Saccharum purum ad gratum saporem.

℞. Seminum Lini . . sesquiunciam.
Pulveris Liquiritiae drachmas tres.
Aquae frigidae . . . libras tres.
Infunde, saepius agitando, et cola. (*Sw*.*)

Erweichend, bei Leiden der Bruſt und der Harnwege nützlich. — Man kann anderthalb Unzen Syrupus emulsivus oder Diacodion hinzuſetzen.

Infusum Lini cathartici. (B*.)

℞. Herb. Lini cathart.
drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias duas.
Infunde et cola. — Schwach purgirend. — Auf einmal.

Fomentatio emolliens. (*Ra.*)

℞. Seminum Lini . drachmas duas.
Foliorum Malvae . uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque et cola.

Balneum emolliens. (*Ca.*)

℞. Specierum emoll. . libras quatuor.
Seminum Lini . . semilibram.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Coque leviter et cola.

Injectio mucilaginosa. (GalM.)

℞. Seminum Lini . . drachmas sex.
Coque leviter in
Aquae . . quantitate sufficiente ut librae duae colaturae obtineantur.

Potio leniens. (*Sm.*)

℞. Semin. Lini contus. drach. unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Infunde, cola et post refrigerationem adde
Syr. Capit. papav.
drachmas quatuor.
Aquae Flor. Aurant.
drachmas duas.

Looch leniens. (*Sm.*)

℞. Semin. Lini contus. . semunciam.
Aquae libram unam (chopine).
Coque ad syrupi consist. et adde
Mellis rosati . . . uncias duas.

Oleum mucilaginosum s. de Mucilaginibus. (Gal. Sar. *Sp. T. Vm.*)

℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini, sing.
partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.
Semina contusa stent per dies duos in balneo arenae; tum cola, sepone et decantha. (*Vm.*)

℞. Seminum Foenu graeci,
— Lini,
Rad. Althaeae, sing. libram unam.
Aquae fervidae . . libras decem.
Digere, subinde agitando, per horas 24, cola fortiter exprimendo et adde
Olei Olivarum . . . libras duas.
Coque donec humidum sit evapora-

tum et cola absque expressione. (Gal. *T.*)

℞. Rad. rec. Althaeae uncias duas c dimidia.
— — Scillae . . semunciam.
Sem. Lini,
— Foenu gr., sing. uncias duas
Aquae . sufficientem quantitatem.
Coquendo fiat mucilago, cui adde
Ol. infusi Anethi,
— — Chamomillae,
— — Lilior., sing. unc. sedecim.

Coque ad humidi usque evaporationem et cola. (*Sp.*)

℞. Radicis Althaeae,
Bulborum Liliorum alborum,
Sem. Foenu gr., sing. . unciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Olei Olivarum,
— Lini, sing . . libras duas.

Maceratis radice, bulbis et seminibus in Aqua ut mucilago extrahatur, olea ei admisce, coque lente ad totius usque humidi evaporationem, cola et adde

Flor. Liliorum recentium,
— Chamomillae, sing. . libram.

Post viginti quatuor horarum in balneo aquae digestionem cola et exprime. (Sar.)

Oleum Lini usitatissimi s. Seminis Lini expressum. (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. *Br. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T.*)

In universum ita paratur, ut semina contusa sacco e tela confecto inclusa inter duas laminas stanneas frigide exprimantur: — His3. nihil de laminis monet; — Gal. contusa mollia reddere, expositione per octo sexagesimas Aquae bullientis vapori; — Bor. Bor4. et Li. prelum Aqua bulliente calefactum adhibent (Bor4. praeterea et oleum venale indicat); — Br. Pal. et Wir. pastam antequam exprimatur, parumper torrere; — *T.* Semina tosta, antequam exprimatur oleum, vapori aquae bullientis exponere *); — *Fi.* Semina contusa per cribrum trajicere, denuo contundendo in pastam redigere, quae vase ferreo, charta interne obtecto immittantur; oleum expressum per chartam filtretur.

HassP. Oleum venale recens expressum indicat; — *Gr. Oleum Lini et Oleum Lini sine igne* habet.

Als ein specifisches Mittel gegen Seitenstechen, sowohl innerlich, zu einer halben bis ganzen Unze in Fleischbrühe, als äußerlich, warm mit Wolle auf die schmerzhafte Stelle aufgeschlagen, angewendet. Der nach dem Auspressen des Oels zurückbleibende Leinkuchen (Lini placenta) dient zum Füttern des Rindviehs und bei Reichen der Pferde.

Clysma involvens s. oleosum s. emolliens s. commune, Enema domesticum. (LH. Li. LP. RC. *Au. Gr. Ra. Sp. Sw.*)

℞. Specierum emoll. unciam unam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Olei Seminum Lini . uncias duas.
Misce. (Li. *Ra. Sp.*)

℞. Lactis vaccini,
Olei Lini, sing. . uncias quatuor.
Misce (*Sp.*)

LH. Decocti Lini (drachmarum duarum) semilibram, Olei semunciam; — LP. Lactis libram unam, Olei uncias tres. — *Sw.* Olei uncias duas et octo Decocti Sem. Lini; — *Sw.* Olei uncias quatuor ad sex et Decocti Hordei tantidem; — RC. Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza libram, Olei unciam. Loco infusi lini recipi potest etiam Natri muriatici vel sulphurici semuncia vel Saponis sebacei drachmae duae, vel Decocti Hordei, vel Avenae, vel Radicis Althaeae, vel Infusi Florum Chamomillae, vel Aquae tepidae libra una; — *Gr.* Jusculi vervecini, Olei Lini, sing. octarii quadrantem, Sacchari rubri unciam.

℞. Herbae Malvae . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae decem colaturae obtineantur; adde
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Clyster antihaemorrhoidale. (LP.)

℞. Gelatinae Gummi Lebbek uncias quatuor.
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce — Bei Hämorrhoidalschmerzen und Tenesmus.

*) Condensatur magis, si cum parte septima vel octava ponderis sui Lithargyrii subtiliss. pulv. ad colorem rubellum usque coquatur, tunc despumatum et sepositione clarificatum decanthatur (*Oleum coctum*).

Liquiritia.

Hierher gehören die Wurzeln zweier Pflanzenarten:

1) *Glycyrrhiza glabra, L.*; Süßholz, Patrizenholz; Réglisse commune (*Gal.*); Liquorice (*Ang.*); Ussulsus (*Ar.*); Lekorice, Sladky koren, Sladky drewo (*B.*); Wellmie, Olinde (*Cy*); Lakrits (*D. Suec.*); Mittie luckerie (*Duk.*); Rogaliza, Pao doce (*His*); Jetimadh (*Hin*); Zoethout (*Bel.*); Legorizia, Ligorizia (*I.*); Oyot manis (*Ja.*); Urat manis (*Mal.*); Bikhmekeb (*Pe.*); Korzen lakrecyawy czyli slodni (*Pol.*); Alcaçuz (*Lus.*); Dubez solotko (*R.*); Madhuka, Yastimadhuka (*Sa.*); Addimodrum (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Sy. Va* Z.

♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae J.) Eine Pflanze, welche in den warmen und gemäßigten Gegenden Europa's wächst. (*Hayne* VI. 41. 42. *Bert.* Bild. IV. 37. f. 1. Fl. med. VI. 293.)

Die Wurzel (radix Liquiritiae s. Glycyrrhizae) ist sehr lang, walzig, ästig, holzig, fingersdick, außen braungelbaschgrau, innen gelblich und geruchlos. Sie hat einen zuckerartigen, etwas schleimigen Geschmack, welcher, wenn man sie lange Zeit kaut, bitter und etwas widerlich wird.

Sie enthält, nach Robiquet, Satzmehl, Eiweiß, ein scharfes, flüchtiges Oel, einen eigenthümlichen zuckerartigen Stoff, Glycyrrhizin (Glycyrrhizinum), Glyrrhizine oder Succo-gommite (*Gal.*) genannt, und einen andern crystallisirbaren Stoff, ebenfalls besonderer Art, welchen man Agedoides (Agédoide *Gal.*) nennt.

2) *Glycyrrhiza echinata, L.*; Igelschotensüßholz; Réglisse épineuse (*Gal.*).

Bor. Bor4. D. Fenn. Han. Hass. O. R. *Gr. M.*

♃ Eine Pflanze Asien's und des südlichen Europa's. (*Jacq.* Hort. Vindob. I. p. 41. t. 95.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen, ist aber dicker.

Species bechicae. (B.)

℞. Rad. Cheiri montani uncias duas.
— Liquiritiae . sesquiunciam.
Herb. Veronicae,
— Hederae terr., sing. manipulum.
Herb. Hyperici . . pugillos tres.
— Centaurii min. pugillos duos.
Seminum Foeniculi drachmas tres.
Concisa et contusa misce.

Species pro Decocto s. pro Potu Infantum s. pectorales. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Ras. Cornu Cervi uncias sedecim.
— Eboris . . . uncias quatuor.
Rad. Liquiritiae uncias duodecim.
— Polypodii . uncias quatuor.
Florum Tiliae . . . uncias duas.
Caricarum,
Siliquae dulcis, sing. uncias octo.
Sem. Anisi,
— Foenic., sing. uncias quatuor.
Concisa misce. (*Sp.*)

℞. Rasurae Cornu Cervi libras duas.
— Eboris . . libram unam.
Radicis Liquiritiae libras quatuor.
— Polypodii . . libras duas.
Caricarum pinguium libras quinque.
Dactylorum,
Jujubar., sing. libras duas c. dimid.
Sem. Coriandri,
— Foeniculi, sing. sesquilibram.
Flor. Boraginis,
— Buglossi,
— Violarum, sing. uncias duas.
Concisa misce. (Pal.)

Wir. Cornu Cervi libras duas, Eboris semilibram, Liquiritiae et Polypodii, sing. tantidem, Caricarum, Siliquae dulcis, sing. libram unam, Foeniculi, Anisi, sing. semilibram, Florum Tiliae uncias quatuor et Cornu Cervi usti libram

Succus Glyzyrrhizae simplex s. Hispanicus s. Liquiritiae crudus s. Extractum Liquiritiae crudum, Jus Liquiritiae. (Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. Ed. Ful. GalM. Han. HassP. O. Pol. Sax. Suec. *G. Gr. M. Re.*)

Dieser Saft kommt im Handel in fast walzenförmigen, etwa 6 Zoll langen, höchstens einen Zoll dicken Stücken in Lorbeerblätter eingewickelt, vor; er hat einen süßen und zugleich etwas bittern Geschmack. Es ist ein Extract, welches man erhält, indem man die Abkochung der Süßholzwurzel bis zur Trockenheit abdampft. Immer ist er mehr oder weniger verbrannt und enthält oft etwas Kupfer. Man bezieht ihn aus Sicilien und besonders aus Spanien.

Succus Liquiritiae depuratus. (B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Sax. *Gr. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae . quantum vis.
Solve in Aqua calida, trajice per pannum et ad massae solidae consist. con-

sume, quae super lamina marmorea oleo obducta circumvoluta, in cylindros parvos formata, et prope ignem siccata in bacillos duorum ad trium pollicum longitudinem concidatur. (*Vm.*)

Bor. Bor4. et HassP. Succus in frustula discissus in Aqua comm. solvatur, solutus per pannum laneum colatus primo leni igne, tandem in balneo vaporis ad extracti densitatem inspissetur; residuum loco calido siccatum in pulverem redige; — Ba. Macerare Succi partem unam in Aquae duodecim per horas viginti quatuor, colare cum expressione et colaturam vaporando ad siccum consumere.

Gr. Succum e radice, coquendo, exprimendo et ad siccum vaporando parare jubet.

Succus Liquiritiae cum Gummi s. gummosus. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici,
Succi Liquirit., sing. . part. aeq.

Dissolve quodque separatim in Aqua et solutiones per pannum trajectas atque commixtas vaporando atque semper agitando, ad massae solidae consistentiam redige.

Succus Liquiritiae anisatus. (*Vm.*)

℞. Succi Liquirit. depur. refrigescentis . uncias quadraginta octo.
Olei Anisi . . . drachmas tres.

Commisce intime, et in baculos teretes super lamina marmorea oleo obducta forma, quos siccatos in parva frusta concide.

Extractum Succi Liquiritiae. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae in frusta minora concisi . . . . quantum vis.
Aquae frigidae . pondus duplum.

Macera per tres dies in vase amplo ac parum profundo, decantha absque agitatione, filtra et ad extracti consistentiam inspissa.

Extractum s. Inspissamentum Glycyrrhizae. (A. An Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Pol. R. RC. Sar. Wür. *C. Gr. Pid. Re. T. Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam. (quatuor His3.)
Aquae bull'entis . libras sedecim.

Infunde calide per horas duodecim, cola, decantha et vaporando, sub finem in aquae balneo, ad extr. consist. redige. (His. His3.)

An. et Bel infundere pro duabus vicibus Liquiritiae Radicis libram unam in Aquae libris octo singula vice et colaturas conjunctas evaporando inspissare; — Fer. infundere per dies duos Liquiritiae uncias duas in Aquae libris decem et colaturam vaporando inspissare.

HassP. ut extractum cardui benedicti; — RC. ut extractum gentianae luteae; — *T.* ut extractum columbo, ubi pro coque macera est legendum.

℞. Radicis Glycyrrhizae quantum vis.

Contunde, Aquae pauxillum addendo, in mortario; succum expressum et sepositione depuratum in balneo Aquae ad extracti consist. redige. (Ful. His. His3.)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Macera in loco calido per dies quatuor et coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Br.)

Sar. infusionem pro tertia parte consumere, colare et evaporare; — Lon. LonN. et *C.* Liquiritiae libram in Aquae octariis octo macerare per horas viginti quatuor et coquere ad quatuor, tunc ad idoneam crassitudinem inspissare; — Li. Radicis libras tres infundere in Aquae bull. novem per horas duodecim, coquere deinde parumper et colaturam per horas sex sepositam inspissare.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.

Coquendo dimidium consume, cola exprimendo et colaturam blando igne ad massae pilularis consist. redige. (Du. *Gr. Re.*)

R. Coquere Radicis sicc. partem unam in Aquae sex vel unam Radicis recent. in Aquae duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem probe inspissare; — D. Coquere Radicis partem unam in Aquae octo, colare cum expressione et colaturam ad massae pilul. consist. consumere; — Wür. Coquere Radicem in Aquae q. s. per horam unam et decoctum decanthatum ad mellis spissi consistentiam redigere; — *Pid.* Coquere Radicis libram unam in Aquae sex et colaturam sepositione depuratam in balneo aquae evaporare.

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae frigidae . . libras decem.

Macera per dies duos, subinde agitando, cola, sepone et decantha liquorem, qui tunc ad extr. consist. evaporet. (A. Pol.)

℞. Rad. Liquir. grossiusc. pulv. q. vis.

Prelo de Réal submissam et Aquae frigida humectatam, post horas duode-

cim macerationis aquae pressioni subjice ut tinctura exprimatur, quae leni calore ad extr. consist. redigatur. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.

Macera per horas viginti quatuor, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum coletur; liquores mixti ad extr. consist. evaporent. (Gal.)

Pasta s. Gelatina s. Mucilago Liquiritiae s. Glycyrrhizae, Saccharum glycyrrhizatum, Glyzyrrhiza lucida, Gluten pectorale. (A. B*. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Fi. Sp. Vm.*)

℞. Rad. Liquirit. ras. s. concis. unc. quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo.

Macera per horas duodecim, cola et in colatura dissolve

Gummi Arab. libr. duas c. dimid.
Sacchari albi . . sesquilibram.

Colata iterum lente consume, donec guttula, supra laminam vitream frigidam effusa in gelatinam concrescat; tunc pellicula sublata in cistulas e laminis ferreis, stanno obductis paratas et oleo inunctas effunde, leni calore sicca et in taleolas concide. (B*. Bor. Han. HassP. O. Pol.)

Bor4. Radicis uncias duas, caeterum ut antea; — Li. Radicis uncias duas, Aquae libras quatuor cum dimidia, Gummi et Sacchari, sing. libras duas; — R. Radicis uncias octo, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, sing. libras duas cum dimidia; — Sax. Radicis partem unam, Aquae viginti duas, Gummi novem et sex Sacchari; — Fenn. Radicis libram unam, Aquae q. s., Gummi libras tres et Sacchari duas cum dimidia; — D. Radicis unciam unam, Aquae libras quinque, Gummi quatuor et Sacchari duas; — Wür. Liquiritiae unciam unam, Aquae libras quatuor, Gummi et Sacchari, sing. uncias sedecim; — *Sp.* Liquiritiae unciam unam, Aquae centum viginti, Gummi sexaginta et Sacchari quadraginta

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . uncias triginta duas.

Decoque ad uncias viginti quatuor et in colatura dissolve

Gummi Arabici . . libras duas.
Sacchari albi . . sesquilibram.

Coque leviter ad consist. requisitam. (Br.)

Suec. Radicis uncias novem, Aquae sedecim ad decem redigendas, Gummi et Sacchari, sing. libras tres.

℞. Radicis Liquiritiae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras tres.

Post horarum duodecim infusionem in colatura dissolve

Gummi Arabici . libram unam.
Sacchari albi . . libras quatuor.

Cola, vaporando dimidium consume, despuma et adde

Aquae Flor. Aurant. semunciam.

In modulos effunde. (A.)

Fi. Easdem ingredientium quantitates sed Gummi et Saccharo in infusione dissolutis, despumare, colare, decoquere ad librarum sex materiae remanent. et ab igne remoto Aquam Flor. Aurant. addere.

℞. Radicis Liquiritiae partem unam.
Aquae . partes septuaginta sex.

Infunde radicem frigidè parte quarta, tunc calide reliqua aqua; post refrigerationem cola et in colatura solve

G. Arab. partes quadraginta octo.
Sacchari cryst. partes viginti quatuor.

Albumine clarificata probe inspissa et in modulos effunde. (*Vm.*)

℞. Radicis Liquiritiae uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quinque.

Post horas duodecim infusionis in colatura solve

Gummi Arabici loti,
Sacchari albi, sing. . libras duas.

Per linteum arcte textum trajecta ad extr. consist. consume, subige fortiter, pedetentim pro libris quinque massae addendo

Albumina Ovorum . . no. 12.
Aquae Flor. Aurant. uncias quatuor.

Inspissa lente et in tabulam marmoream Amylo conspersam extende. (Gal.)

Pal. et Wir. Radicis uncias quatuor, Aquae libras octo coquendo ad quatuor redigendas, Gummi libras duas cum dimidia, Sacchari tantidem et Albumina cum Aqua Flor. Aurant. subacta no. 6.

Pasta Glyzyrrhizae gummata et anisata s. Liquiritiae fusca s. anisata, Succus Liquiritiae de Blois. (Gal. *Re. Sp. T.*)

℞. Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. libram unam.
Gummi Senegalensis libras duas.
Rad. Irid. Flor. drachmam unam.
Ol. ess. Anisi gr. viginti quatuor.

Dissolve gummi in Aquae q. s., solutionem cola et ei extractum adde, consume lente ad mellis consist., adde pulverem iridis et continua evaporationem ad extr. consist., oleum supremum addendo. (Gal.)

Re. Iridis drachmas duas, caet. ut

antea; — *T.* Extracti, Sacchari et Gummi Arab. ut antea, Iridis Florent. scrupulos duos et grana sex, Essentiae Anisi guttas octodecim.

℞. Gummi Arab. uncias triginta duas.
Aquae fontanae . . . . q. s.
Solutionem cola et in colatura solve
Succi Liquiritiae . uncias novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Evaporent lente ad syrupi spissi consistentiam; adde deinde
Pulv. Rad. Irid. Florent.,
— — Inulae, sing. semunciam.
Vaporando continua, donec massa non ultra digitis adhaereat et adde
Olei ess. Anisi scrupulos duos.
Effunde in tabulam marmoream oleo obductam. (*Sp.*)

Pasta Liquiritiae opiacea s. cum Opio. (GalH.)

℞. Gummi Senegalensis,
Sacchari albi, sing. part. quingentas.
Aquae Flor. Aurant. partes triginta.
Extr. Liquir. frigide par. part. sexaginta.
— Opii aquosi . partes duas
Solutioni gummi et sacchari inspissatae infunde extracta antea in Aquae parva quantitate dissoluta.

Tabellae Liquiritiae (*Wm.*)

℞. Extracti Liquiritiae partem unam.
Sacch. super igne liq. part. sedecim.
Extracto pulverato cum saccharo commixto fiant tabellae Amylo conspergendae.

Trochisci bechici s. bechici albi s. Glycyrrhizae s. e Glycyrrhiza, Confectio de rebecha. (Bor4. Ful. Li. Suec. *Au. Sp.*)

℞. Gummi Mimosae pulv. uncias duas
Radicis Iridis Florentinae,
— Glyzyrrhizae echinatae,
Seminis Foeniculi,
— Anisi, sing. pulv. unc quatuor.
Succi Glyzyrrh. depur. . libram.
Sacchari albi . . libras novem.
G. Tragacanth. cum Aquae s. q. in mucilaginem red. q. requiritur
ut fiat l. a massa, in trochiscos formanda. (Bor4.)

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae unciam unam.
— — Irid. Flor. semunciam.
Pulv. Sacch. cryst. flavi libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiant trochisci. (Li.)

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae drachmas tres.
— — Irid. Flor. drachmas sex.
— Amyli . . . semunciam.
— Sacchari albi . uncias octo.
Mucilag. Gummi Tragacanth. q. s.
Fiant trochisci. (Suec.)

Ful. Liquiritiae uncias octo, Iridis quatuor, Amyli unam cum dimidia, Sacchari sex et Mucil. G. Tragacanthae.

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae sesquiunciam.
— — Irid. Flor.,
— G. Arab., sing. semunciam.
— Sacch. albi unc. quadraginta octo.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Baculi Liquiritiae albi. (Wir. *Sp.*)

℞. Gummi Arabici,
Spec. Diaereos simplicium,
— Diatragacanth., sing. semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Amyli, singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . , libras duas.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant baculi.

Trochisci bechici citrini s. flavi, Liquiritia cocta citrina, Tabellae Glyzyrrhizae glabrae compositae. (An. Pal. Suec. Wir. *Gr. Sp.*)

℞ Rad. Liquiritiae,
— Irid. Flor., sing. unciam unam.
Croci . . . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Pulv. Rad Liquiritiae uncias octo.
— G Tragacanthae comp.
— Irid. Flor. comp., sing. sesquiunciam.
— Croci . . scrupulos octo.
— Sacchari . . . libras sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Suec. *Gr.* Liquiritiae drachmas tres, Iridis sex, Amyli semunciam, Croci scrupulos duos, Sacchari uncias octo et Mucilaginem G. Tragacanth.

Bacilli Liquiritiae citrini. (O. Sax. Wir. *Pid.*)

℞. Sacchari albi . partes duodecim.
Radicis Liquiritiae partem unam.

Digitized by Google

Radicis Irid. Flor. partem quartam.
Croci . . . . partem octavam.
Mucilag. G Tragacanth. . q. s.
Fiat massa mollis in baculos dividenda, qui super cribro siccentur. (O. Sax.)

℞. Sacchari albi . . libram unam.
Radicis Liquiritiae unciam unam.
— Iridis Florentinae,
Amyli, singulorum . semunciam.
Croci . . . . semiscrupulum.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant bacilli. (Wir. *Pid.*)

Trochisci bechici nigri s. Liquiritiae s. Glycyrrhizae s. Glycyrrhizae glabrae s. Liquiritiae cum Gummi, Tabellae Anisi compositae. (Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Han. Li. Lus. O. Pal. Wir. Wür. *Au. Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arab., sing. . part. aeq.
Dissolve succum et gummi quodque separatim in Aqua, liquores commisce et vaporando ita consume ut fiant trochisci. (Fer.)

℞. Extracti Liquiritiae,
Gummi Arab., sing. partem unam.
Sacchari . . . . partes duas.
Aquae (calidae *Gr.*) quantum sufficit.
Solutionem probe inspissa ut fiant trochisci. (*C. Ed. Gr. Re.*)

Gr. sec. Lon. post 1745. Extr. Glycyrrh., Sacchari, sing. unc. decem, G. Tragac. semilibram (Troch. bech. nigri) vel uncias tres (Tr. Glycyrrh.), Aq. q. s.; — Lon. ante 1745. *Gr.* Extr., Sacch., sing. unc. decem, G. Tragac., Amygd. dulc decort., sing. sex, Mucil. Semin. Cydon. c Aq. Ros. part. q. s.

℞. Pulv. Succi Liquir. partem unam.
— Sacch crystall. albi part. sedecim.
Mannae . . . partes quatuor.
Contritis adde
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiant trochisci. (*Vm.*)

℞. Pulv. Extr. Liquiritiae uncias octo.
— Sacchari . libram unam.
— Gummi Arabici uncias tres.
Aquae Florum Aurantiorum q. s.
Fiant trochisci. (*Br.*)
Fi. Aquam aromaticam Citri adhibet.

℞. Pulv. Succi Liquiritiae,
— Gummi Arab., sing. partes tres.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Solutioni adde
Sacchari pulverati . partes sex.
Evaporent lente ad aptam consist. (Ams. B. Bel. Ful. Li. Lus. Wir. *Sw.*)

℞. Pulv. Radicis Iridis Florentinae,
Pulv. Rad. Liquiritiae,
— Anisi,
— Foeniculi, sing. . unciam.
Succi Liquiritiae in Aqua Hyssopi dissoluti . . uncias quatuor.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (Br. Han. Wir.)
Pal. saccharum omittit; — Lus. foeniculum omittit, reliquis formulae immutatis; — O. et Sax. Saccharum in Aqua Foeniculi dissolvi jubent.

℞. Pulv. Rad. Glycyrrhizae,
— — Irid. Flor., sing. uncias tres.
— Anisi,
— Foeniculi, sing. semilibram.
Extracti Glycyrrhizae libras duas et uncias octo.
Sacchari albi . libras duodecim.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant tabellae. (An.)

℞. Amygdal. dulc. excort. uncias duas.
Contusis, pastae adde
Pulv. Succi Liquir. uncias quatuor.
— Foeniculi . . semunciam.
— Sacchari . . uncias octo.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Au. Pid.*)

℞. Storacis Calamita . partes sex.
Sacchari albi partes centum quadraginta quatuor.
Contritis adde
Amygdalarum dulcium excort.,
Rad. Irid. Flor., sing. partes duas.
G Tragacanthae . partem unam.
Extr. Liquirit. liq. . . . q. s.
Fiant trochisci. (*Vm.*)
Vm. praeterea Trochiscorum albor. partes triginta sex et unam Storacis Calamita ut fiat cum dissolutionis aquosae Extracti Liquiritiae massa.

℞. Radicis Iridis Florent. uncias tres.
— Liquiritiae,
Anisi,
Foeniculi, sing. . uncias quinque.
Succi Liquiritiae . uncias novem.
Storacis Calamita unciam unam.
Sacchari albi uncias nonaginta sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

Trochisci Glycyrrhizae cum Opio s. thebaici, Trochisci sedativo-balsamici s. pectorales Regis Danorum. (Ed. Lus. Suec. *Br. E. Gr. Sp. Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. unciam unam.
Extracti Opii . . grana quatuor.
Fiant trochisci. (*Sp.*)

℞. Rad. Liquiritiae,
— Althaeae, sing. drachm. novem.

Rad. Iridis Florentinae,
G. Tragacanthae, sing.
drachmas sex.
Opii . . . . scrupulum unum.
Sacchari . . . uncias sedecim.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant trochisci. (*Vm.*)

℞. Succi Liquiritiae,
Gummi Arab., sing.
uncias quinque.
Opii . . . . . drachmas duas.
Tinct. Bals. Tolut. . semunciam.
Syrupi Sacchari . . uncias octo.
Opio cum tinctura contritis adde sensim syrupum et saccharum caloris ope mollefactum, deinde gummi et trochiscos septingentos viginti forma. (Ed. Lus. Suec. *Br Gr. Sw.*)

℞. Gummi Arabici,
Extracti Liquiritiae,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Opii . . . . . grana sex.
Olei Anisi . . . guttas quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Fiant trochisci quadraginta. (*E.*)

Die letztern Trochisken sind bei den Engländern unter dem Namen Cough lozenges of Wistar berühmt.

Looch sanum et expertum. (Pal. Wir. *Pid. Sp.*)

℞. Aquae dest. Looch sani et exp.
unciam.
Nucleorum Pineae mundatorum,
Amygdalarum excorticatarum,
Sem. Papav. albi, sing. semunciam.
Fiat emulsio, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . uncias viginti.
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli, sing. drachmas tres.
— Iridis Flor. drachmas duas.
Misce diu et celeriter agitando. (Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Hyssopi,
— Capilli Veneris Monspeliaci,
— Calaminth. mont., sing.
semunciam.
Anisi,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Aquae font. uncias viginti quatuor.
Coctis parumper, cum decocto et
Amygdalarum excorticatarum,
Nucleorum Pineae mundatorum,
Sem. Papav. albi, sing. uncia una emulsionem para, cujus colaturae adde
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli,
— Irid. Flor., sing.
drachmas sex.
Sacchari albi uncias quadraginta.
Aquae Cinnamomi . uncias duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthae,
Iridis Florentinae,
Anisi,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Capilli Vener. Monsp.
manip. unum.
Aquae fontanae . . libras duas.
Macera per horas 24, destillet deinde liquidi libra una, cum qua et
Nucleor. Pineae mund.
drachmis quinque,
Amygd. dulc. excort.
drachmis tribus emulsionem para, cujus colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Pulveris Liquiritiae,
— Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Amyli, sing. drachmas tres.
— Iridis . . drachmas duas.
Misce. (Pal.)

℞. Pulv. Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing.
unciam unam.
— — Irid. Flor
drachmas sex.
Pulv. G. Tragacanth. unc. unam.
Fiat pulvis, cujus scrupulos quatuor ex tempore cum Syrupi emulsivi unciis duabus commisce. (*Pid.*)

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze.

Looch pulmonale s. de Pulmone Vulpis. (Li. Wir. *Sp.*)

℞. Pulmonis Vulpis pulverati,
Pulveris Succi Liquiritiae,
— Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Anisi,
— Foeniculi, sing. . unciam.
Sacchari clarif. uncias quindecim.
Misce. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti Liquiritiae . semunciam.
Aquae Foeniculi . . uncias duas.
Solutioni adde
Pulveris Hederae terrestris,
— Anisi,
— Foenic., sing. drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Misce. (Li.)

Dieses Looch, von Mesue eingeführt, war bei Husten und Lungenschwindsucht sehr berühmt. — Gabe, zwei bis drei Drachmen.

Elixir pectorale simplex. (Br. Ham.)

℞. Succi Liquiritiae drachmas tres.

Aquae Foeniculi . uncias quatuor.
Dissolve. (Ham.)

Br. Aquae Foeniculi libram unam et Succi Liquiritiae uncias sex.

Infusum Radicis Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (BorC. WW. *Au. T.*)

℞. Rad. Liquiritiae concis. unciam unam.
Aquae bull. unc. novem ad decem.
Digesta vase tecto per semihoram, cola.

T. Liquiritiae sesquiunciam, Aquae bull. libram; stent per horas duas in infusione, tunc colentur.

Decoctum Glycyrrhizae. (*Re.*)

℞. Radicis Liquiritiae sesquiunciam.
Aquae . . . . . mens. libram.
Coque per sexagesimas decem et exprime.

Mel glycyrrhizatum s. Liquiritiae. (GalF. Ham. Pal.)

℞. Radicis Liquiritiae . uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera per horam unam, cola exprimendo, vaporando ad uncias quatuordecim inspissa et adde
Mellis albi . . libras quinque.
Coque leni igne ad syrupi consistentiam. (GalF. Pol.)

Ham. infundere per semihoram Liquiritiae sesquiunciam in Aquae ferv. q. s., ut unciae decem colaturae obtineantur, huic addere Mellis despum. duplum et coctione ad syrupi consist. redigere.

Syrupus Glycyrrhizae s. Liquiritiae. (Bor. Bor4. Br. Han. Wir. *Gr. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Rad. Liquir. ras. et contus. partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Infunde in aquae balneo tepido per horam, tunc in colatura frigida solve
Mellis albi . . . . partes duas
et in calida
Sacchari albi . . . partes duas.
Serva. (*Vm.*)

Sw.* eandem formulam, sed colaturam cum Melle et Saccharo ad syr. consist. coquere.

℞. Rad. Liquiritiae concis. uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera, tunc coque leviter per horae quadrantem; cola et evaporatis ad unciarum quatuordecim liquidi remanentiam, adde
Sacchari albissimi,
Mellis despum., sing. libras duas.
Ebulliant. (Bor. Bor4. Han. HassP.)

℞. Radicis Liquiritiae . uncias duas.
Capilli Vener. Monsp. . unciam.
Hyssopi . . . . . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horas 24, tunc ebullitione ad dimid. redactis, colaturae adde
Mellis despumati . uncias octo.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Fiat syrupus. (Br. Wir. *Sp.*)

Gr. Aquae libras tres, Mellis, Sacch., sing. uncias decem, absque aq. rosar., caeterum ut antea.

Decoctum pectorale. (*Sw.*)

℞. Radicis Liquiritiae,
Herbae Farfarae,
— Hederae terr., sing. unc duas.
Radicis Inulae . unciam unam.
Aquae . . . . . libras novem.
Decoque ad colaturae unius librae remanentiam. — Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt dieſe Tiſane mit Zucker, oder beſſer, mit Honig.

Essentia Liquiritiae. (Br.)

℞. Rad. Liquir. concis. unciam unam.
Aquae Vitae . . . uncias tres.
Post sufficientem extractionem cola et exprime.

Elixir pectorale Regis Daniae s. Danorum s. Ringelmanni s. ex Succo Liquiritiae s. pectorale dulce s. Glycyrrhizae s. e Succo Liquiritiae. (Bor. BorC. Bor4 D. DD. Ful. Han. Li. O. Pol. Sax. Wir. *Sp. Vm.*)

1) Ohne Opium.

℞. Succi Liquiritiae . partem unam.
Aquae Foeniculi . . partes duas.
Alcoholis ammoniacalis partes sex.
Digere blando calore. per horas tres et cola. (DD.)

Li. Succi partem unam, Aquae Foeniculi quatuor et duas Alcoholis ammoniacalis; — Sax. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et duas Alcoholis ammoniac.; — Ful. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et tres Alcoholis ammon.; — Bor4. Han. HassP. Succi duas, Aquae Foeniculi sex et Alcoholis ammon. anis. duas; — *Sp.* Succi unam, Aquae Foeniculi duas et sex Alcoholis ammon. anis.; — *Vm.* Succi duas, Aquae Foeniculi octo et duas Alcoholis ammon. anis.

℞. Succi Liquiritiae . . partes sex.
Aquae Foeniculi partes duodecim.
Semin. virid. Anisi . partem unam.
Alcohol. ammon. partes triginta sex.

Stent in digestione per horas viginti quatuor et colentur. (D.)

Vm. digerere Anisi partem unam in Alcoholis ammon. sex, addere deinde Aquae Foeniculi partes duodecim, Succi Liquiritiae sex et post aliquot dies filtrare.

℞. Succi Liquir. depur. unciam unam.
Aquae Foeniculi . uncias octo.
Liq. Ammonii subcarb.
semidrachmam.
Misce. (BorC.)

℞. Radicis Angelicae . uncias tres.
— Levistici . . semunciam.
Flor. Chamomill. Rom.
sesquiunciam.
Anisi . . . . . uncias octo.
Foeniculi . . . uncias quinque.
Macidis . . . . drachmas tres.
Nucis moschatae,
Myrrhae, sing. . unciam unam.
Kali subcarb. . uncias octodecim.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae fontanae . . libras duas.

Stent in digestione per tres dies, tunc adde

Salis Ammon. pulv. libram unam.

Destillent lente ad librae unius liquidi reman., productum commisce cum

Succi Liquiritiae . unciis quinque solutis in
Aquae Foeniculi . . libra una.

Adde deinde

Croci orientalis . drachmas duas.

Digere per aliquot dies et filtra. (Wir.)

2) Mit Opium. *Elixir ammoniato-opiatum, Extractum thebaicum ammoniacale.* (Bor. O. Pol. *Vm.*)

℞. Succi Liquir. depur. . semunciam.
Aquae Foeniculi . . semilibram.

Dissolve et colaturae adde

Spir. Salis Ammon. anis.
drachmas duas.
Tincturae thebaicae
semidrachmam.
Misce bene. (O.)

Bor. et Pol. Succi uncias duas, Aquae Foeniculi sex, Spir. Ammonii anis. duas et Laudani drachmas duas; — *Vm.* Succi partes octo, Aquae Foeniculi viginti quatuor, Spir. Ammonii anis. et Laudani liq., sing. octo.

Reizend, besonders ehedem bei chronischen Brustleiden empfohlen und für brustlindernd, Auswurf befördernd, blähungtreibend, kolikwidrig, magenstärkend, harntreibend gehalten. — Gabe, sechs und dreißig bis funfzig Tropfen. — Ein, einer Menge Veränderungen fähiges Präparat, welches wohl verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden.

Liriodendron.

Liriodendron tulipifera, L.; Tulpenbaum; Tulipier de Virginie (*Gal.*); Virginian tuliptree, American poplar (*Ang.*); Tulpboom (*Bel.*); Tulipeiro (*Lus.*); Kametraed (*Suec.*).

Am. *C. Gr. Re.*

Ein Baum (Polyandria Polygynia, L.; Magnolieae, *J.*) Südamerica's. (*Cat.* Carol. I. t. 48. *Duh.* éd. nouv. III. t. 18. *Big.* II. t. 31. *Schk.* t. 147. *Bert.* Bild. III. 14. f. 1.)

Man wendet die Rinde, besonders die der Wurzel an; sie ist bitter und gewürzhaft.

Lithospermum.

Lithospermum officinale, L.; Steinsaame; Herbe aux perles, Grémil (*Gal.*); Gromwell (*Ang.*); Steenklinte (*D.*); Ackensteensaad (*Bel.*); Stenfrae (*Suec.*).

Br. Gal. His. His8. Wir. *Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 341.)

Man wendet den Saamen (semen Lithospermi s. Milii Solis) an; er ist klein, sehr hart und hat eine harte, glänzende, perlgraue Schaale. Er besitzt keinen Geruch, aber einen süßlichen, öligen, etwas adstringirenden Geschmack.

Ehedem wurde er für ein lithontripticum gehalten, auch bei Ruhr empfohlen; vielleicht könnte er als Linderungs- und schmerzstillendes Mittel bisweilen von Nutzen seyn.

Lobelia.

Man wendet in der Medicin an:

1) *Lobelia syphilitica, L.*; gemeine Lobelie, blaue Cardinalsblume; Cardinale bleue (*Gal.*); Blue lobelie (*Ang.*); Pokkige lobelia (*Bel.*); Lobelia (*Lus.*).

Ams. Br. Ful. Hass. Li. LP. R. Sax. Wir. Wür. *M. Gr. Re. Sy. Va.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Lobeliaceae, *J.*) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Plenck* t. 649. *Schk.* t. 269. Düss. off. Pfl. I. 24. Dict. d. Sc. nat. cah. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 368.)

Man wendet die Wurzel (radix Lobeliae) an; sie besteht aus dünnen, weißen, mehrere Finger langen Fasern. Sie hat einen unangenehmen, widerlichen Geruch. Der Geschmack derselben ist, wenn sie frisch ist, sehr scharf, bei der getrockneten weniger; er wird alsdann tabacksähnlich und hält lange an.

Reizend, Brechen und Purgiren bewirkend; als Mittel gegen Syphilis.

2) *Lobelia inflata, Willd.*; Indischer Taback; Lobélie renflée (*Gal.*); Indian tobacco (*Ang.*)

Am. *C. Gr. Re.*

⊙ Eine Nordamericanische Pflanze. (*Big. Am. Med. Bot. I. t. 19.*)

Die Blätter sind länglich, sitzend, schwach gezähnelt. Sie sind anfangs geschmacklos, entwickeln aber bald einen stechenden Geschmack und erregen einen beträchtlichen Speichelfluß. In den Vereinigten Staaten wendet man sie als brech- und schweißtreibendes Mittel, in der Gabe von zehn bis zwanzig Gran, in Pulverform an. (Vergl. v. Froriep's Not. d. Nat. u. Heilk. V. 99.)

Gr. führt noch L. urens, circiifolia, tupa und longiflora an; der Saft der meisten ist scharf; L. cardinalis, Wurzel wurmtreibend.

Decoctum Lobeliae syphilitice. (B*. *Sy.*)

℞. Rad. Lobeliae syph. sicc. semunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.
Coquendo tertiâ parte consumtâ, cola. — Glasweise zu trinken.

Tinctura Lobeliae inflatanae. (Am. B*. *Re.*)

℞. Herb. Lobeliae inflat. sicc. uncias duas.
Alcoholis tenuis . octarium unum.
Post decem dies digestionis filtra

Reizmittel, welches nach Cutler besonders von Thacher, bei convulsivischem Asthma, als ein gutes Mittel die Respirationsbeschwerden zu heben, gerühmt wird. — Gabe, ein Kaffeelöffel.

Lunaria.

Botrychium Lunaria, L.; Mondraute; Lunaire (*Gal.*); Moonwort (*Ang.*); Maanerude (*D.*); Maankruid (*Bel.*); Lunaria (*I.*); Lasgraes (*Suec.*).

Gal. Wir. *Gr. Sp.*

4 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic pl t. 65.)

Man wendet das Kraut (herba Osmundae Lunariae s. Lunariae s. Lunariae Botrytidos) an; es stellt sich als ein gefiedertes, aus acht bis zehen halbmondförmigen Blättchen bestehendes Laub dar. Es hat einen schwach styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

Lupinus.

Lupinus albus, L.; Wolfsbohne; Lupin blanc (*Gal.*); White lupine (*Ang.*); Kzjmsky oneb sskrkawicny hrach (*B.*); Witte tvgebone (*Bel.*); Lupino officinale (*I.*).

Br. Fer. Gal. His. His3. Sax. Wir. *Fi G. Gr. M. Re. Sp.*

⊙ (Diadelphia Hexandria, L.; Leguminosae, J.) Eine wahrscheinlich ursprünglich in der Levante einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze (*Blackw.* t. 282. *Zorn* Ic. pl. t. 321.)

Man wendet den Saamen (semen Lupini) an; er ist groß, scheibenförmig, platt und weiß. Die Mandel, welche er enthält, ist gelb und bitter, ohne Geruch und hat einen mehligen, bittern und unangenehmen Geschmack.

Ehedem kam er zu dem Mehl von Breiumschlägen.

L. sylvestris, varius (Gr.)

Lupulus.

Humulus Lupulus, L.; Hopfen; Houblon (*Gal.*); Hope (*Ang.*); Humle (*D. Suec.*); Lupulo (*His. I.*); Hoppe (*Bel.*); Chmiel (*Pol.*); Hombrecillo (*Lus.*).

A. Am. Ams Ba. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. Gal. GalM. Gen Han. HassP. His. His3. LH. Li Lon. LonN. O. Pol. RC Sax Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va.*

4 (Dioecia Pentandria, L.; Urticeae. J.) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Hayne* VIII 36 *Bull.* t. 284. *Plenck* t. 707. *Schk.* t. 326. *Zorn* Ic. pl. t. 522. 541.).

Man wendet die Sprossen der weiblichen Blüthen (strobili s coni s. flores Lupuli) an; sie sind eiförmig und bestehen aus häutigen, eirunden, hohlen, geschindelten, gelblichen Schuppen. Sie haben einen sehr starken, gewürzhaften Geruch und einen bittern Geschmack.

Sie enthalten, nach Yves, einen eigenthümlichen, bittern Stoff, das Lupulin (Lupulina, Lupulinum), in welchem die Wirksamkeit liegt.

Tonisch, etwas narkotisch, besonders bei scrophulösen Krankheiten, Rhachitis und Drüsenverstopfungen gebraucht, aber auch als Fieber- und beruhigendes Mittel gerühmt. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis zwei Drachmen; von dem ausgedrückten Safte zwei bis vier Unzen.

Species aromaticae s. ad fomentum. (B*. Bor. Bor4 Pal. Sar.)

℞. Lupuli . . . . libram unam.
Florum Chamomillae,

Florum Lavandulae,
Herbae Rorismarini,
— Serpylli,
— Tanaceti, sing. uncias tres.
Concisa misce.
Bor4. Tanacetum omittit.

Pilulae Humuli Lupuli. (RC.)

℞. Pulv. conor. Lupuli
scrupulos duos.
Micae Panis et Syrupi vel
Mucilaginis Gummi Arabici, q. s. ut fiat massa in pilulas triginta aequales dividenda. — Gabe, Abends zwei bis drei Stück. — Wirken wie Opium.

Extractum Lupuli s. Humuli (aquosum). (An. Han. Li. Lon. LonN. Suec. *C. Gr. Re. Vm.*)

℞. Lupuli,
Aquae frigid., sing. partem unam.
Macera per horas duodecim et adde deinde
Aquae bullientis . duplum pondus totius massae; refrigerata cola, Albumine clarificata supra ignem colloca et quum liquor spissescere coeperit, per pannum colata, agitando continuè vaporando probe consume. (*Vm.*)
℞. Humuli . . . . partem unam.
Aquae bullientis , . partes octo.
Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni igne ad extracti consist. evaporent. (Han.)

Suec. Coquere parumper Lupulum cum Aquae duplo, exprimere, et residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixtos in aquae balneo inspissare; — Li. Macerare per horas duodecim Lupuli libras tres in Aquae bull. novem, coquere deinde, exprimere et vaporando consumere.

℞. Lupuli . . . . . libras duas.
Aquae communis . libras decem.
Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et liquorem decanthatum ad consist. requisitam consume. (An.)

Lon. LonN. *C. Gr. Re.* coquere Lupuli uncias quatuor in Aquae octariis octo ad quatuor redigendis et colaturam ad idoneam crassitudinem evaporare.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Lupuli alcoholicum. (A.)

℞. Lupuli . . . . . partes duas
Alcoholis (0,910) . , partes tres
Aquae communis partes novem.
Digere in Aquae balneo, cola exprimendo, alcoholem destillatione extrahe et quod restat, in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.
Die Gabe iſt wie bei'm vorigen.

Tinctura Humuli s. Lupuli s. Humuli Lupuli s. Lupuli strobilorum. (Am. An. B*. Ed. Han. Lon. LonN. RC. Suec. *C. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Lupuli . . . . uncias quinque.
Alcoholis (0,935)
libr. duas c. dimidia.
Digere per dies octo et filtra. (Ed. Suec.)

Lon. LonN. *Gr. Re.* Lupuli uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — B. et *Sw.* Lupuli semunciam et Aquae Vitae semilibram; — Au. Lupuli partem unam et Alcoholis (20°) octo; — Han. RC. Lupuli partem unam et sex Alcoholis (vel deficiente hac tinctura. Pulv. Conor. Lupuli grana tria, hora decubitus, superbibendo Succi Citri Medicae vel Acidi acetici impuri cochlear sume. RC.); — Am. et *C.* Lupuli uncias quinque et Alcoholis octarium.

Narkotiſch. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Infusum Lupuli. (*E. Ra.*)

℞. Lupuli . . . . unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. — Gewürzhaft und bitter, bei Scrofeln, Scorbut und ſogenannten aſtheniſchen Krankheiten empfohlen.

Ein wirkſameres Präparat erhält man durch Infuſion des Hopfens in Wein, nachdem man ihn mit einer hinlänglichen Menge Weingeiſt befeuchtet hat.

Oleum Lupuli destillatum a *Gr.* indicatur.

Aqua Lupuli. (B*. Han. *Vm.*)

℞. Lupuli . . . . . partes octo.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Destillent partes viginti quatuor. (B*. Han.)
℞. Lupuli . . . . partes quatuor.
Aquae Vitae . partem quartam.
Aquae . . . . partes triginta.
Destillent partes sex. (*Vm.*)
Magenſtärkend und etwas narkotiſch. — Gabe, ein Löffel.

Mixtura e Lupulo s. stomachica. (B*.).

℞. Extr. Lupuli aquosi
drach. duas ad tres.
Aquae Lupuli . , uncias septem.
Solutioni adde
Tinct. Lupuli semunc. ad unciam.

Syrupi Cort. Aurant. unciam unam.
Gabe alle drei Stunden einen Löffel.

Unguentum Lupuli. (*Sw*.*)

℞. Lupuli siccati . . . uncias duas.
Axungiae Porci . uncias decem.
Digere blando calore per horas aliquot et cola cum expressione.
Bei'm Krebs, um die Schmerzen zu stillen, empfohlen.

Pulvis Lupulini s. Lupulinae. (GalF. GalH. *Ma. Re. Va.*)

℞. Lupulini . . . . partem unam.
Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo
Sacchari albi . . . partes duas.

Pilulae Lupulinae. (*Ma. Re. Va.*)

℞. Lupulinae . . . quantum libet.
Tritura (tempore frigido mortarium calefaciens) in massam et in pil. pond. gr. trium divide. — Zwei bis vier bei erschöpfter Erregbarkeit, Verdauungsbeschwerden und Nervenaufregung, um Schlaf zu erregen. Sie machen keine Verstopfung.
Ma. Va. Lupulini drachmas duas c. dimid., G. Arab. unam, Extr. Cichor. q. s. ut f. pil. pond. gr. 4. — 2 bis 4 täglich gegen Scropheln.

Unguentum s. Pomatum Lupulini. (GalH. *T. Va.*)

℞. Lupulini . . drachmam unam.
Axungiae . . . drachmas tres.
Infunde in aquae balneo et per pannum e tela arcte textum (setaceum *T.*) cola. (Freake.)

Tinctura Lupulini s. Lupulinae. (Fer. GalF. *Gr. Ma. Re. T.*)

℞. Lupulini contusi . unciam unam.
Alcoholis (36°) . . uncias duas.
Digere in vase tecto per dies sex, cola fortiter exprimendo et adde
Alcoholis (86) . quantum sufficit ut tincturae unciae tres obtineantur.
T. Lupulini drachmas tres, Alcoholis (35° B.) unciam; digere, post dies duos exprime et operatione cum residuo repetita, liquores commixti filtrentur.
Gewürzhaft, bitter und tonisch, nach Yves außerdem auch narkotisch. — Die Gabe ist noch nicht bestimmt. *T.* schreibt von seiner Tinctur 40 bis 80 Tropfen vor, in einem passenden Vehikel zu nehmen.

Syrupus Lupulini s. Lupulinae. (GalF. *Gr. Ma. Re. T.*)

℞. Tinct. Lupulini alcoh.
partem unam.
Syrupi communis . partes septem.
Misce.

Extractum Lupulini (*Gr.*): e Lupulino, infusionis in Aqua frigida ope
Extractum Lupulini coctione paratum. (*Gr.*)

Extractum resinosum vel alcoholicum Lupulini. (*T.*)

Obtinetur evaporatione tincturae, solis vel evaporatorii calore, in laminis vitreatis.
Gabe, drei bis vier Gran.

Lycopodium.

Lycopodium clavatum, L.; Streupulvermoos, Bärlapp; Lycopode commun (*Gal.*); Club moss (*Ang.*); Mechowe Seweno (*B.*); Joramos, Ulvefod, Lusegraes (*D.*); Licopodio (*His. I. Lus.*); Geknodstaardmos (*Bel*); Proszek koltunowy (*Pol.*); Gulnicht (*Suec*).
Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. His. His3. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr M. Pid. Re. Sp.* Z.
♃ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Deutschland sehr gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. 47. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)
Man wendet das Kraut und den Saamen an.
Das Kraut (herba Musci clavati s. terrestris) besteht aus einem sehr ästigen Stängel mit zerstreuten, rippenlosen, gebogenen, in eine Borste endigenden Blättern. Es hat weder Geruch, noch Geschmack. — Der Saame (farina s. pulvis s. semen s. sulphur Lycopodii, Sulphur vegetabile; Bärlappsaamen, Hexenmehl, Trutenmehl, Alpmehl, Pillenmehl, Wurmmehl, Klopfpulver, Blitzpulver, Moospulver, Streupulver, Bärlappenpulver) ist ein außerordentlich feines, blaßgelbes, leichtes, einigermaaßen fettig anzufühlendes Pulver, welches sich an die Finger hängt, weder Geruch noch Geschmack besitzt, sich leicht entzündet und aus kleinen, rundlichen, etwas platten und halbdurchsichtigen Körnern besteht.
Aeußerlich austrocknend, innerlich harntreibend. — Gabe, zehen Gran Morgens und Abends, bei Harnstrenge der Kinder.

Mixtura Lycopodii s. diuretica. (B*. *Au*)

℞. Lycopodii . . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias duas.
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Misce. — Gabe, alle zwei Stunden einen halben Löffel. (B*. *Au.*)
℞. Magnesiae subcarb drachmas duas.
Satura
Aceti concentrati . . . . q. s.
Adde deinde

Aquae Menthae,
Syrupi Opii, sing. . uncias duas.
Pulveris Lycopodii drachmas duas.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Eßlöffel. (B*. *Au.*)

℞. Lycopodii . . . . semunciam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit ut fiat looch. — Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Lysimachia.

In den Pharmacopöen findet man zwei Arten dieser Pflanzengattung angezeigt:

1) *Lysimachia vulgaris, L.*; gelber Weiderich; Lysimaque commune, Chasse-bosse (*Gal.*); Common loose strife (*Ang.*); Bastard dueurt (*D.*); Lis de tintureros (*His.*); Gemeene weiderik (*Suec.*).

Gal. Wir. *Gr. Re. Sp.* Z.

2) (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t 278. *Hayne* VIII. t. 15. *Oed.* Fl. Dan. t. 689.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Lysimachiae luteae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit lanzettigen, fast sitzenden, gegenüberstehenden, drei- oder vierzeiligen Blättern und goldgelben, eine endständige Rispe bildenden Blüthen. Es hat fast gar keinen Geruch; der Geschmack ist etwas bitter und styptisch.

Schwach abstringirend.

2) *Lysimachia Nummularia, L.*; Pfennigkraut; Nummulaire (*Gal.*); Moneywort (*Ang.*); Pengekrud (*D.*); Numularia (*His. I. Lus.*); Penning kruid (*Bel.*); Pieniecznik (*Pol.*); Penningeaert (*Suec.*).

Br. Gal. Gen. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

2) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 542. *Hayne* VIII. t. 16. *Zorn* Ic. pl. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Nummulariae s. Centummorbiae) an; es besteht aus einem meist einfachen, schwach vierkantigen Stängel mit entgegengesetzten eirunden, rundlichen, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas styptisch.

Ehedem wendete man es bei Durchfall und Blutungen an.

M.

Magnesium.

Ein ungebräuchliches Metall, von dem man aber folgende Zusammensetzungen anwendet:

Oxydum Magnesii, Magnesia alba calcinata, Magnesia pura s. usta, Oxydum Magnesii; gebrannte Magnesia. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae q. libet.
Calcina igne maxime aucto, in crucibulo, donec particula Acidi (muriatici Pm.) immissa non amplius effervescentiam producat. (Ams. Ba. Bor4. Gal. GalM. Han. O. Pol. Sax.)

T. Solutioni filtratae e Magnesiae sulphuricae venalis libris duabus in Aquae bull. libris duodecim infundere Kali subcarb. liquidum, donec mixturam chartam curcuma tinctam non rubefaciat; praecipitatum cum Aqua communi tam diu lotum, donec lotionum aqua illam chartam non amplius rubefaciat et solis vel balnei vaporis ope siccatum ure inter prunas ut antea etc.; — *Fi.* Magnesiam carbonicam inter prunas ad diminutionem ponderis ejus partium duarum calcinare.

Die Probe auf Säuren allein ist hinlänglich, um die Reinheit der Magnesia zu prüfen; die einstündliche (Fenn. HassP RC. *Br.*), einstündliche und längere (Bor.), ein- bis zweistündliche (R.), zweistündliche (A. B. Bel. D. Du. Ed. His. His3. Lon. LonN. *Re. Sw. Sp.*), dreistündliche (*Re. Br**.) Dauer der Calcination kann hierzu nicht genügen, da der Stärkegrad des Feuers sehr verschieden gewesen seyn kann.

Im Allgemeinen zieht man die gereinigte Magnesia der kohlensauren vor, welche denselben Nutzen gewährt.

Protocarbonas Magnesii, Magnesia communis s. alba s. aërata s. subcarbonica s. mitis s. Nitri s. Edinburgensis s. Salis Ebshamensis s. Epsomensis s. Salis amari s. cretosa s. dulcis s. effervescens, Carbonas Magnesiae s. magnesicum s. magnesicus cum Aqua, Lac terrae, Hypocarbonas Magnesiae, Subcarbonas Oxydi Magnesii s. Magnesiae, Terra amara s. amara aërata s. absorbens minera'is s. talcosa oxyanthracodes; weiße Magnesia, kohlensaure Talkerde, Bittererde.

1) So, wie sie in der Natur vorkömmt.
Am. DD. Gal. GalM. LH. C. *Gr. Par. Sa. Va.*

Weiß, geſchmack- und geruchlos, von erdigem Anſehen, einem etwas derben Gefüge und einem feinen, ſehr zähen Korn.

2) Im Ganzen bereitet.

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*

℞. Magnesiae sulphuricae libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Solutioni filtratae infunde pedetentim aliam Solutionem cum Kali subcarb. libra una et quatuor Aquae font. paratam, donec non ultra turbetur; lava praecipitatum Aquâ fontana, et quum haec Plumbo acetico adjecto non amplius turbatur, pulverem sicca.

Hi3. Sulphatis et Carbonatis Potassae vel Sodae, singulorum libras duas seorsim in Aquae libris decem soluta et filtrata miscere, coquere, liquorem adhuc calentem rursus colare, pulverem album aqua calida abluere et per setaceum trajicere etc.; — Pm. Solutionem filtratam et bullientem Subcarbonatis Potassae librarum octo in Aquae pluvialis sedecim in aliam item filtratam et bullientem e Sulphatis Magnesiae libris decem et Aquae pluvialis quinquaginta, impositam igni infundere, ignem ad ebullitionem urgere, donec omnis gasis acidi carbonici evolutio cessaverit, tunc Aquae pluvialis libras triginta superaffundere, vas ab igne remotum quieti relinquere et contentum omne in conum lineum satis amplum conjicere, sedimen terreum aqua pluviali perfecte edulcorare et magnesiam in glebas formare, quae sub dio vel in hypocausto siccentur. — Bor4. Magnesiae sulph. depur., Kali carbonici e Cin. clav. a terra silicea libri, sing. eandem quantitatem. Solvantur seorsim illa in sextuplo, hoc in quadruplo Aquae comm. ferventis; soluta, filtrata, commixta et spathula ligneâ agitata coquantur per semihoram, Aqua comm. fervida diluantur et per linteum colentur. Quod in linteo remanet, edulcoratum leni calore siccetur. — Praeterea etiam venalem indicat; — HassP. Magnesiae sulph. venalis libras sex, Aquae comm. calidae duodecim; solutionem filtratam cum Aqua comm. calida usque ad libras quadraginta octo dilue et cum hac solutione aliam e Cinerum clavell. depur. libris quatuor et Aquae comm. calidae libris viginti quatuor, utramque filtratam, subcalidam (40 — 50°) sensim perpetua snb agitatione commisce; post magnesiae subsidentiam liquorem defunde et sedimentum elutione, primum cum Aqua subcalida, dein cum frigida repetita depura et sicca etc.; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Magnesiae sulph. libram, Kali subcarb. uncias novem, Aquae octarios viginti quatuor; kali in aquae octariis tribus, magnesiam in quinque solve, reliquam aquam adjice et coque etc.; — LH. Sulphatis et Subcarbonatis partium aequalium solutiones quamque in Aquae ferventis sufficiente quantitate filtratas conjungere, coquere cum Aquae ferventis decuplo, et praecipitatum repetentim Aqua ablutum donec saporis expers sit, statim siccare; — RC. Magnesiae sulph. et Kali subcarb., sing. partes aeq., separatim quodque in Aquae destill. calidae duplo solve, coque cum Aquae bull. octuplo etc.; — *Fi.* Magnesiae sulph. libras sex et Salis Tartari quatuor, quodque seorsim in pondere quadruplo Aquae font. bull. solvere, filtrare, coquere ad magnesiae praecipitationem usque, compositum multa Aqua bull. diluere, post semihorae coctionem per pannum gossypinum filtrare; magnesiam in filtro remanentem Aqua calida lavare et siccare; — *Gr.* sec. Henry Solut. Magnes. sulph. aquosam alia Subcarb. Sodae praecipitare, sedimentum bene abluere et tandem Aqua Rosar. luere.

Außer dieſem Verfahren, welches man, einige unbedeutende Abweichungen abgerechnet, ſonſt allenthalben findet, geben Pal. Sar. und Wir. noch folgendes an:

℞. Residui Lixivii a crystallisatione Nitri (Mater Nitri)
quantum libet.

Evaporet ad siccum igne gradatim aucto, donec materia liquefiat et calcinetur, tum massam pulverulentam Aquae bullienti immitte, praecipitatum exortum lava et sicca.

Dieſes Salz, welches in ſtarker Gabe purgirt, wird nur in geringer Menge angewendet, um gaſtriſche Säuren, deren Gegenwart man Krankheiten zuſchreibt, zu neutraliſiren. Man hat es auch zur Verhütung der Erzeugung harnſaurer Steine empfohlen. — Gabe, drei bis ſechs Drachmen zum Laxiren; ſechs bis zwanzig Gran als Abſorbens.

Pulvis purgans. (Fer. *Au. Ra.*)

℞. Magnesiae subcarb. . scrup. duos.
Cremoris Tartari scrupulum unum.
Misce. (*Ra.*)

Fer. et *Au.* Magnesiae unciam, Rad. Rhei drachmam. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pulvis dentifricius. (*Maury.*)

℞. Magnesiae Anglicae,
Cremoris Tartari, sing. . libram.
Chinini sulph. . drachmas tres.
Olei Neroli . . drachmas duas.
Essentiae Ambrae cum Mosch.,
— Rosarum, ambar. drachmam.
Magnesiam cum essentia in vas infunde, quae prior simulac absorpta fuerit, cum pulveribus commisceatur et per cribrum tenerrimum trajiciatur.

Pulvis digestivus. (*Vm.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae,
Acidi tartar., sing. partes sedecim.
Corticis Cinnamomi partem unam.

Pulvis aërophorus e Magnesia carbonica. (Bor4.)

℞. Magnesiae carbon. drachmas duas.
Acidi tartarici triti semidrachmam.
Elaeosacch. Citri drachmam unam.
Misce.

Pulvis paregoricus. (*Sa.*)

℞. Magnesiae albae . drachmas duas.
Nitri . . . . drachmam unam.
Cort. Cascarillae scrupulum unum.
Mass. Pil. de Cynoglosso grana sex.

Pulvis Magnesiae compositus s. Magnesiae cum Rheo s. absorbens s. antacidus s. galactopoeus s. nutricum s. infantum s. infantum antacidus s. anodynus s. pro infantibus s. puerorum s. infantum citrinus s. epilepticus Marchionum s. ad tormina infantum antacidus s. antiemeticus s. carminativus. (B. Bor4. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. R. Wir. *Au. E. Pid. Pie. Sm. Sp. Sw. T. Va.*)

℞. Magnesiae,
Sacchari albi, sing. partes aequales.
Per longum tempus triturentur in mortario vitreo. (Gal. *T.*). — Melius Magnesia pura sumitur. (*T.*)

℞. Magnesiae . . . . grana octo.
Cinnamomi . . granum unum.
Misce. (R.)

Ham. Magnesiae drachmas sex, Cort. Aurant. pulv. duas; — His. Magnesiae sesquidrachmam, Rad. Columbo drachmam unam; dividetur in sex partes; — *Va.* Hosp. de la Matern. Magnes. calcin. gr. sedecim, Cinnam. duo, div. in part. duas; den Tag über bei Diarrhoe der Rinder.

℞. Magnesiae . . . . partes sex.
Elaeosacch. Menthae pip.
partem unam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Sacchari . . unciam dimidiam.
Misce. (R.)

Ful. Magnesiae sesquiunciam, Cinnamomi drachmam et Sacchari unciam; — Li. et Wir Magnesiae uncias duas, Cinnamomi drachmam et Rad. Liquiritiae semunciam.

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Foeniculi . . drachmam unam.
Sacchari albi . unciam dimidiam.
Misce. (Hass. *Pid.*)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Corticis Aurantii,
Sem. Foenic., sing. drach. duas.
Misce. (Fer. Ful. Li.)

His. Magnesiae semunciam, Foeniculi et Cinnamomi, sing. drachmam; — *Au.* Magnesiae unciam, Foeniculi et Cort. Aurantii, sing. semunciam; — Hosp. d'Allem. *Va.* Magn. calc. semunciam, Cort. Aur., Sacch., sing. drachmam, div. in part. sex; täglich 3 oder 4.

℞. Magnesiae . . . . uncias tres.
Nucis mosch. . . semidrachmam.
Cinnamomi . . sesquidrachmam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Magnesiae,
Sacchari Lactis, sing. uncias duas.
Corticis Cascarillae drachmas duas.
Elaeosacchar. Foenic. drach. sex.
Misce. (*Sm.*)

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.
Radicis Iridis Florentinae,
Seminum Anisi,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Croci . . . . drachmam unam.
Misce. (B*. Han. *Sp.*)
HassP. Croci grana viginti.

℞. Magnesiae . . unciam dimidiam.
Seminis Cumini . drachmas tres.
Rad. Irid. Flor. . drachmas duas.
Croci . . drachmam dimidiam.
Misce. (*Pie. Sp.*)

℞. Magnesiae carbon. unciam unam.
Elaeosacch. Foeniculi semunciam.
Rad. Rhei pulv. . drachmas duas.
Iridis Flor. pulv. sesquidrachmam.
Misce. (Bor4.)

℞. Magnesiae . uncias duas c. dimid.
Radicis Rhei . unciam dimidiam.
Visci albi,
Rad. Liquiritiae, sing.
drachmas sex.
Misce. (Li.)

O. Magnesiae unciam, Radicis Rhei drachmas duas, Pulv. analeptici semidrachmam.

℞. Magnesiae . . unciam dimidiam.
Natri subcarbonici,
Rad. Zingib., sing.
scrupulum unum.
Misce fiat pulvis. (His.)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Radicis Gentianae,

Sem. Foeniculi, sing. drachmas duas.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Magnesiae carbonicae drachmam.
Ipecacuanhae . . . grana tria.
Sacchari albi . drachmas septem.
Olei de Cedro . . . guttas sex.
Misce. (*Pulv. antacid. Vogleri.*)

Die Gabe ist im Allgemeinen ein Kaffeelöffel voll. Mehrere Pharmacopöen, Gal. und His. unter andern, nehmen statt des kohlensäuerlichen Kali's reine Magnesia, welche in der That den Vortheil hat, daß sie im Magen kein kohlensaures Gas entbindet.

Pulvis ecphracticus Sellii. (*Au.*)

℞. Magnesiae subcarbonicae,
Cremoris Tartari,
Florum Sulphuris,
Pulveris Rhei,
— Florum Chamomillae,
Elaeosacch. Foenic., sing. semunciam.

Gabe, ein Kaffeelöffel mehrmals täglich bei Stockungen und Schwäche der Unterleibseingeweide.

Bolus Magnesiae crocatus. (GalM. LH.)

℞. Magnesiae . . partes quinque.
Croci . . . . . partes tres.
Canellae . . . . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

LH. Magnesiae calcinatae grana duodecim, Croci, Cinnamomi, singulorum grana sex, Syrupi communis quantum sufficit ad unum bolum. — Gabe, auf ein Mal.

Tabulae absorbentes s. Magnesiae, Tabellae de Magnesia, Trochisci antacidi s. Magnesiae s. Carbonatis Magnesiae, Rotulae cum Subcarbonatae Magnesiae s. Magnesia. (Am. An. Ed. Gal. Lus. Pm. *Br. C. Fi. Gr. Pie. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Magnesiae . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes octo.

Coque sacchari partes septem octavas ad plumam et reliquum trituratum cum magnesia commisce. (*Vm.*)

℞. Magnesiae . . . partem unam.
Sacchari albi . . partes quatuor.
Mucilag. G. Tragacanthae c. Aqua Flor. Aurant. par. . . . q. s.

Fiant trochisci. (An. Gal. Pm. *Fi. Gr. Re. T.*)

Ed. et *Pie.* Magnesiae uncias sex, Sacchari tres, Nucis mosch scrupulum unum et Mucilag. G. Tragacanthae q s.; — *Br.* Magnesiae uncias tres, Sacchari sesquiunciam, Zingiberis scrupulum unum itemque Mucilaginem Gummi Arab.; — *Gr. Sw.* Magnesiae uncias quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scrupulum unum et Mucilaginem Gummi Arab.; — Lus. Magnesiae uncias sex, Sacchari tres, Fabae Pichurim semidrachmam et Mucilag. G. Tragacanthae; — Am. et *C.* Magnesiae uncias quatuor, Sacchari duas, Zingiberis scrupulum et Syrupi Sacchari q. s.

Chevallier empfiehlt folgende Pastillen:

℞. Succolatae . . . . uncias duas.
Sacchari . . . uncias quinque.
Magnesiae pirae . unciam unam.

Misce fiat cum Mucilagine Gummi Tragacanthae pasta, ad libitum cum aromatibus miscenda, e qua formentur Morsuli granorum octo, sedecim et viginti quatuor.

Purple tablets. (*Gr.*): Magn. libras tres, Sacch. alb. sesquilibram, Laccae in glob. unciam unam, G. Tragacanth. tres, misce.

Electuarium anodynum pro infantibus s. antacidum s. mithridaticum s. pro infantibus. (Br. Li. *Ca. Sp. Sw.*)

℞. Magnesiae . . . unciam unam.
Seminum Anisi unciam dimidiam.
Syrupi Cichorii comp. uncias tres.
Misce. (Br.)

Ca. et *Sp.* Magnesiae drachmas sex, Anisi semunciam, Croci drachmam et Syrupi Cichorii compos. q s.

℞. Magnesiae . . . drachmas sex.
Seminum Foeniculi,
Carbonis, sing. . drachmas tres.
Croci . . . . drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . uncias octo.
Petalorum Rhoeados . . . q. s. ad tingendum colore rubescenti brunneo. (Li.)

℞ Magnesiae . . . sesquiunciam.
Herb. Menthae crisp. unciam unam.
Croci . . . . drachmam unam.
Radicis Rhei . . drachmas duas.
Mellis depurati . . uncias sex.
Carbonis . . . quantum sufficit ad tingendum colore nigrescenti viridi. (Li.)

℞. Conserv. Menthae crisp. unciam.
Pulveris aromat. drachmam unam.
Magnesiae . . . drachmas duas.
Syrupi Menthae crispae . . q. s.
Misce. (*Sw.*)

Gabe, eine bis zwei Drachmen und mehr.

Aqua Magnesiae (aërata). (Am. B*. GalH. *C. Gr. Re.*)

℞ Aquae . . . . . octarios octo,
Magnesiae subcarb. drachmas tres.

Antiliae pressoriae ope solutioni inculcetur volumen circiter decuplum

Gas acidi carbonici. (Am. B*. *Gr. Re.*)

℞. Magnesiae carbonicae (hydratae) partes quatuor.
Aquae acidul. gasis quadruplo vol. Acidi impraegnatae part. quingentas.
Misce (GalH.)

Aqua Pyrmontana factitia. (Gal.)

℞ Aquae acidulae, Gas acidi carbonici mensuras quinque continentis uncias viginti cum dimidia.
Salis culinaris . . grana duo.
Magnesiae sulphuricae grana octo.
— subcarbon. grana duodecim.
Ferri subcarbonici granum unum.

Mixtura antacida, Emulsio Amygdalarum composita, Mixtura Subcarbonatis Magnesiae. (Ham. Han. RC. *Gr.*)

℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.
Aquae Foeniculi . sesquiunciam.
Tincturae Rhei aquosae,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Misce. (Ham.)

℞. Saponis Hisp. . scrupulum unum
Magnesiae . . drachmam unam.
Aquae destillatae . . uncias tres.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Misce. (Ham.)

℞. Amygdalarum dulc. . semunciam.
Sem. Hyoscyami drachmam unam.
Aquae Cerasor. nigr. uncias octo.
Pacta emulsione, colaturae adde
Sacchari albi . . drachmas sex.
Magnesiae . . drachmam unam.
Misce. (Han.)

℞. Subcarbonat. Magnesiae drachmam.
Aquae fontanae, vel
— Menthae crispae semilibram.
Tincturae aromat. drachmas duas.
Ammoniae liq. drachmam unam.
Bei Cardialgie. — Gabe, eine bis zwei Unzen. (RC.)

℞. Magnesiae albae. semidrachmam.
Aquae Menthae pip. uncias duas cum dimidia.
Spiritus Lavandulae comp. semidrachmam.
Syrupi Carvi . drachmas quatuor.
— Zingiberis . drachmas duas.
Gabe, ein halber oder kleiner Eßlöffel nach Umständen. (*Gr.*)

Potio purgans. (Am. *C. E. Pic. Sm. Va.*)

℞. Magnesiae . . drachmas duas.
Decocti Seminum Ciceris vitrum.
Syrupi Capilli Veneris uncias duas.
Misce (*Pic.*)

℞. Radicis Rhei . drachmam unam.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coctis ad dimidium, colat. adde
Magnesiae . . drachmam unam.
Essent. Anisi gutt. duas ad quatuor.
Misce. (*Sm.*)

℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.
Radicis Rhei . . . grana sex.
Sacchari . . . drachmam unam.
Essentiae Menthae pip. guttas sex.
Aquae unciam unam cum dimidia.
Gabe, Kindern einen Eßlöffel voll alle zwei Stunden. (*E. Va.*)

℞. Magnesiae . drachmam dimidiam.
Tinct. Asae foet. guttas quadraginta.
— Opii . . . guttas viginti.
Sacchari . . . drachmam unam.
Aquae . . . . . unciam unam.
Gabe, fünf und zwanzig Tropfen für ein Kind von zwei bis vier Monaten. — Dewees wendet diese Formel sehr häufig an.

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Liq. Ammonii subcarb. unciam unam.
Aquae Cinnamomi . uncias tres.
— purae unc. quinque c. dimid.
Misce. (Am. *C.*)

Mixtura carminativa. (*Gr.*)

℞. Magnesiae ustae grana triginta quinque.
Pulveris Rhei . . . grana octo.
Sacchari albi . sesquidrachmam.
Olei Anisi . . . guttas quinque.
Tincturae Castorei gu'tas quindecim.
— Opii . . guttas quatuor.
Aquae fontanae . . uncias duas.
Misce. — 1 bis 3 Drachmen für Kinder.

Dalby's carminative. (*Gr. Re.*): Magnesiae albae scrupulos duos, Ol. Menth. pip. guttam unam, Ol. Nucis mosch., Ol. Anisi, sing. guttas tres, Tinct. Cast. gutt. triginta, Tinct. As. foet. quindecim, Tinct. Opii quinque, Spiritus Pulegii quindecim, Tinct. Cardam. triginta, Aquae Menthae pip. uncias duas.

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Infusi Gentianae . . uncias sex.
Von Brande in Fällen von vorherrschender Harnsäure empfohlen. — Gabe, ein Glas voll dreimal täglich.

Phosphas Magnesiae, Magnesia phosphorica. (B*.)

℞. Magnesiae purae . quantum libet.
Acidi phosphorici quantum sufficit ad neutralisandum; tum liquor filtratus evaporet ad siccum.
Bei anfangender Rhachitis gerühmt. — Gabe, zehen Gran bis eine halbe Drachme.

In ſtärkerer Gabe, von einer Drachme und mehr, purgirt es.

Magnesia sulphurica, Magnesia vitriolata, Sal amarum s. Anglicanum s. Anglicum s. Anglicanum catharticum s. catharticum amarum s. catharticus amarus s. Ebshamense s. Epsomense s. Seidschützense s. Seidlitzense s. Sedlitzense, Sulphas Magnesiae, Terra amara sulphurica s. vitriolata, Vitriolicum Magnesiae; Bitterſalz, ſchwefelſaure Talkerde, Engliſches Salz; Protosulfate de Magnésium, Sulfate de protoxide de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Magnésie sulfatée, Sel de canal, Sel cathartique amer, Sel d'Epsom, de Seidlitz, de Seidschütz, Vitriol magnésien (*Gal.*); Bittersalt (*Ang.*); Engelsk Laxeersalt (*D.*); Sal amargo, Sal de la higuera (*His.*); Sale amaro (*I.*); Sal gorzka (*Pol.*); Sal cathartico amargo (*Lus.*); Bittersalt, eller engelsk salt (*Suec.*)

1) Im Handel vorkommend.

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

In vierſeitigen Prismen, welche in vierſeitige Pyramiden oder in eine zweiſeitige Spitze ausgehen, weiß, zerfallend, am Feuer ſchmelzend, von ſehr bitterem Geſchmack.

Alle Pharmacopöen laſſen ſie auf die Weiſe reinigen, daß man ſie in heißem Waſſer auflöſ't, und die bis zur Salzhaut verdunſtete Flüſſigkeit cryſtalliſiren läßt.

2) Im Ganzen bereitet.

℞. Magnesiae subcarb. pulv. q. libet.
Acidi sulphurici (15°) . . q. s. ad neutralisandam magnesiam; cocta leviter et colata evaporent, donec liquor 25 gradus indicat, tum reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat. (Gal. *Gr.*)

Purgirend. — Gabe, von drei Drachmen bis zu einer und einer halben Unze in einem Pfund Waſſer; eine bis zwei Unzen und mehr, in Klyſtir. Salzſaures Ammoniak und Kalk, kohlenſaures Kali und Natron, eſſigſaures Blei und ſalpeterſaures Silber dürfen nicht damit verbunden werden.

Sulphas Magnesiae exsiccatus. (His3) Sulphas in olla figulina non vitreata eodem modo, quo sulphas aluminae, exsiccatur s calcinatur.

Liquor Magnesiae Sulphatis s. sulphuricae s. Salis amari. (Bor4 HassP.)

℞. Salis . . . . . drachmas duas.
Aquae destillatae . . . unciam.
Ut reagens. (HassP.) — Bor4. parandi modum non indicat.

Pulvis salinus compositus s. Cheltenhamensis, Cheltenham salts. (B*. Ed. *C. Gr. Re.*)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Salis culinaris, sing. part. quatuor.
Kali sulphurici . . . partes tres.
Salia quodlibet separatim pulverata triturando misce. (B*. Ed. *C. Re.*)

B*. Salis comm. grana centum viginti, Salis Epsomenis sexaginta sex, Kali sulphurici decem et Ferri sulph. granum dimidium; — *Gr.* Sal. Glaub., Epsom., et comm., sing. part. aeq. siccare in furno et in pulverem vertere; — vel: dissolvere, filtrare, ad siccum vaporare et addere Vitr. virid. semidrachmam; — vel: Sal. Glaub. drachmas duas, Epsom. gr. sexaginta sex, Sal. comm. decem, Sal. Martis semigranum.

Gabe, einen Kaffeelöffel voll in einer Pinte Waſſer.

Pulvis digestivus. (Br.)

℞. Salis Sedlitzensis . uncias duas.
Nitri depurati,
Cremoris Tartari,
Rad. Ari macul. pulv., sing. unciam unam.
Salis Ammoniaci . drachmas sex.
Misce fiat pulvis. — Anwendung, wie bei'm vorhergehenden.

Pulvis purgans. (*E.*)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Pulv. Chinae, sing. drachmas sex.
Misce et divide in quatuor partes. — Gabe, ein Pulver alle zwei Stunden.

Potio cathartica s. laxans, Liquor salinus laxativus. Haustus catharticus salinus, Mixtura e Magnesia sulphurica, Aqua mineralis cathartica. (Fer. Wir. WW. *Au. B. E. Sa. Sw.*)

℞. Magnesiae sulphuricae,
Mannae Calabr., sing. unciam unam.
Aquae calidae . uncias quatuor.
Solutionem cola. (WW.)

℞. Magnesiae sulph. unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Solutioni adde
Magnesiae grana octo ad decem.
Misce. (*Sw*)

Swediaur giebt dieſe Formel unter dem Namen *Potio cathartica* und *Aqua mineralis cathartica.* Die Flüſſigkeit kann das Sedlitzer Waſſer erſetzen.

℞. Magnesiae sulphuricae,

Tinct. Rhei aquos., sing, unciam unam.
Aquae Melissae . . uncias duas.
Auf zwei oder vier Mal, Morgens und Abends, zu nehmen. (*Au.*)

℞. Magnesiae sulph. unciam unam.
Tartari stibiati . granum unum.
Succi Citri . . . unciam unam.
Aquae purae . . . uncias tres.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel voll.

℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infundendo colatura sit unciarum octo, quibus adde
Magnesiae sulphur. unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen.

℞. Foliorum Sennae unciam dimidiam.
Aquae . . . quantum sufficit ut infundendo colaturae sit unciarum quatuor, cui adde
Tincturae Rhei aquosae uncias sex.
Magnesiae sulphur. unciam unam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen. (*B.*)

℞. Foliorum Sennae . drachmas sex
Mannae,
Magnesiae sulph., sing. unc. unam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horae quadrantem et cola. — Gabe, alle Stunden eine Tasse voll. (*E.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Magnesiae sulphur. drachmas sex.
Aquae bullientis . . uncias sex
Post duodecim horarum infusionem cola. (Fer.)

Potio salina. (Ham.)

℞. Tartari stibiati . granum unum.
Magnesiae sulphur. unciam unam.
Dissolve in
Aquae fontanae . . unciis octo.
Solutioni adde
Mellis glyzyrrhizati unciam unam.
Auf vier oder fünf Mal zu nehmen. (Ham.)

Cu. giebt unter dem Namen *Aqua Travezii* folgende Formel:

℞. Magnesiae sulphur. unciam unam.
Tartari stibiati granum dimidium.
Aquae . . . . . libras duas.
Gabe, stündlich ein Glas voll, zum Abführen.

Mixtura salina antacida. (B*.)

℞. Magnesiae sulph. drachmas duas.
— subcarb. scrup. unum.
Syrupi Althaeae . . sesquiunciam.
Aquae Flor. Chamomill. unc. duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel voll, bei Kindern.

Mixtura carminativa. (*Gr.*) (Inf. for child.)

℞. Magnesiae Sulphatis sesquiunciam.
— Carbonatis drachmas duas cum dimidia.
Tincturae Cardamomi compositae sesquidrachmam.
— Castorei guttas quadraginta.
Olei Anisi . . . guttas decem.
Aquae Anethi . uncias duodecim.
— purae . . . uncias octo.
Misce. — 2 Dr. bis ½ Unze alle 4—6 Stunden.

Mixtura oleoso-salina. (Ham.)

℞. Salis Anglicani . unciam unam.
Aquae . . . libram dimidiam.
Solutioni adde
Ol. Ricini c. Vitello Ovi triti unciam.

Aqua Sedlitzensis artificialis. (Gal.)

℞. Aquae triplo vol. Gas acidi carb. impraegn. unc. viginti c. dimidia.
Magnesiae sulph. drachmas duas.
— hydrochlor. gr. octodecim.
Dissolve. — Man kann es gehaltreicher und dem natürlichen Wasser ähnlicher machen, indem man vier Drachmen schwefelsaure Magnesia und sechs und dreißig Gran salzsaure Bittererde in derselben Menge Sauerwasser auflöst.

Enema purgans s. catharticum, Clyster catharticus s. Sulphatis Magnesiae. (Du. LP. RC. WW. *Au. E. Fi. Gr. Re*)

℞. Mannae . . . . unciam unam.
Dec. Chamomill. comp. uncias decem.
Solutioni adde
Olei Olivarum . unciam unam.
Magnesiae sulph. unciam dimidiam.
Misce. (Du. *C. Gr. Re.*)

WW. Solutionem Magnesiae sulph. drachmarum sex in Aquae calidae unciis decem; — *E* Magnesiae sulph. unciarum duarum in Infusi Sennae octario uno; aut: Salis unciarum duarum in Decocti tepidi Amyli octario uno, addendo Olei Olivarum unciam; — RC Infusi Fol. Sennae uncias quatuor, Magnesiae sulph. unam, Aquae tepidae septem, Olei Lini vel Olivarum unam; — *Fi. Gr.* Decocti Malvae uncias decem, Magnesiae sulph. semunciam (unam *Gr.*), Olei Olivarum uncias duas.

℞. Florum Chamomillae uncias duas.
Seminum Lini . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit

ut coquendo unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde

Magnesiae sulphuricae semunciam.
Olei Lini . . . sesquiunciam.
Misce. (*Au.*)

℞. Sulphatis Magnesiae,
Olei Lini, sing. . unciam unam.
Aquae communis . semilibram.
Misce sulphatem cum aqua et adde oleum.

℞. Decocti Gruti . . uncias octo.
Magnesiae sulph. drachmas duas.
Saponis medicinalis . semunciam.
Misce. (*Au.*)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.
— purae . . . grana sex.
Aquae . . . . . uncias tres.
Tinct. Cardamomi drachmam unam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Magnesiae sulph. drachmas sex.
Aquae fontanae . . uncias tres.
Tincturae Sennae . drachmas sex.
Misce. (*Sa.*)

℞. Magnesiae sulphuricae uncias tres.
Kali sulphurici,
— tartarici, sing. . semunciam.
Aquae . . . uncias quindecim.
Solutionem filtra. (Wir.)

Aqua amara s. *Sulphatis Magnesiae carbonicae.* (Fer. Ful. Suec. *Fi. Ra. Vm.*)

℞. Magnesiae sulph. partes septem.
Aquae fontanae partes triginta sex.
Solutionem colatam Acido carbonico satura. (Suec.)

℞. Magnesiae sulphuricae partes tres.
Aquae . . . partes viginti duas.
Solutioni adde
Acidi carb. liq. partes viginti duas.
Misce exacte. (Fenn. *Vm.*)

℞. Aquae . libras tres cum dimidia.
Acidi sulph. part. sex Aquae dil. drachmas decem.
Magnesiae subcarb. drachmas tres.
Dissolve in lagena pro partibus tertiis duabus solum repleta. (*Ra.*)

℞. Magnesiae sulph. unciam unam.
Aquae purae . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Ammonii subcarbonici liquidi,
Acidi sulph. Aqua dil., sing. scrup. unum.
Auf einmal zu nehmen. (Fer. *Fi. T.*) Auch kann man irgend einen Syrup hinzusetzen. (*Fi.*) — Man will, mit drei solchen Gaben, Wechselfieber mit gastrischen Symptomen ohne China geheilt haben.

Serum Lactis aperitivum. (*Sm.*)

℞. Seri clarificati libram (chopine).
Radicis et Herbae Taraxaci,
Herbae Fumariae,
Fol. Nasturtii aquatici,
— Chaerophylli, ambor. pugill. unum.
Bulliant per sex circiter temporis momenta, tum cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Salis Seignette drach. unam ad duas.
Mellis Narbonn. . drachmas sex.

Von van Swieten bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide empfohlen. Alle Morgen nüchtern vier Gläser in Zwischenräumen von einer Stunde zu nehmen. Nach einem Monat ersetzt man es durch Spaawasser.

Protosulphas Magnesiae cum Deutosulphate Sodii, Sulphas Magnesiae et Sodae, Sal Modenense artificiale (*Fi.*).

℞. Magnesiae sulph. depur. libras duas.
Natri sulphurici . libram unam.
Aquae fontanae purae libras sex.
Solve salia, per chartam filtra et ad cuticulam usque consume; fluidum calidum adhuc in vase fictili vitreato ad crystallisandum sepone etc.

Magnesia hydrochlorica, Proto-hydrochloras Magnesii, Hydrochloras s. Murias Magnesiae, Chloruretum Magnesii. (Pm. RC. *Fi. T. Vm.*)

℞. Magnesiae sulph. partes decem.
Kali hydrochlorici partes septem.
Pulverata salia misce in patina (Terrine) arenacea, superfunde Aquae tepidae dimidium ponderis eorum, refrigerata et decanthata tum evaporent, et crystallis ortis separatis, liquorem concentratissimum lapidi sicco infunde. (*Vm.*)

℞. Magnesiae subcarb. quantum vis.
Acidi muriatici quantum sufficit.
Magnesiae vasi vitreo ingestae acidum infunde, donec effervescentia cessaverit, filtra per chartam et in vasi vitreo vaporando ad siccum usque redige. (Pm. RC. *Fi. T.*)

Magnesia silicica, Silicas Magnesiae.

1) *Creta Gallica, Brianzonica*; Französische, Briançoner Kreide; Craie de Briançon.
Br. *Gr.*
In derben, aus kleinen perlmutter- oder seidenglänzenden Schuppen bestehenden Stükken.

2) *Talcum Venetae, Stella Terrae*; gemeiner Talk, Talch; Talc (*Gal.*).
Br. Wir. *G. Gr. Re. Sp.*
In verschieden gebogenen, glänzenden, grünlichweißen, fettig anzufühlenden, sehr

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MÜNCHEN

zarten, biegsamen, nicht elastischen, leicht zu ritzenden Platten.

Arcanum cosmeticum. (B*.)

℞. Talci Venetae drachmam unam.
Olei Camphorae drachmas duas.
Digere in balneo aquae et misce.

Talc Water (*Re.*): Talcum cum Sulphure calcinetur et Aqua calida abluatur, residuum in fundo vasis, aqua defusa, siccetur et in fornace vehementi igne per bihorium calcinetur. Hujus talci calcinati libra una cum Muriatis Ammoniae unciis duabus pulverata in lagena vitrea vaporatorio immitte, quo facto talco omni sponte dissoluto, liquorem caute, ne disturbetur, defunde. — Schönheitsmittel.

Oil of talc (*Re.*): Talci Venet. pars una, Borac. calcin. duae perfecte pulv. et mixta in crucibulum immittantur obtegendum et in fornacem collocandum; per horam igni vehementi expone, massam vitream viridi flavam pulvera, cum Subcarb. Potassae part. duabus misce et totum in crucibulo liqua, massam inde obtentam in cavam, vitro inclinato, repone, vas supterponendo, quo talcum in liquorem conversum defluat.

Magnolia.

Magnolia glauca, L.; blaugrüne Magnolie; Magnolier glauque (*Gal.*); Sweet scented magnolia (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein kleiner Strauch (Polyandria Polygynia, L.; Magnoliaceae, J.) Nordamerica's. (*Dill.* Elth. t. 168. f. 205. *Big.* II. t. 27.)

Die Rinde hat einen gewürzhaften, sassafrasähnlichen Geruch.

Tonisch, reizend, schweißtreibend. — Man wendet die Tinctur bei chronischen Rheumatismen an; auch gebraucht man sie gegen Wechselfieber.

Gr. führt noch andere Arten an, unter denen besonders M. tripetala, deren Rinde statt der China gebraucht wird, und M. precia, Yu-lan, deren Saamen bitter, fiebertreibend, zu bemerken sind.

Maltum.

Malthum, Bina; Gerstenmalz; Malt (*Gal.*); Byne, Malt (*Ang.*); Malt (*D. Suec.*); Grano tosto (*I.*); Stod jeczmienny (*Pol.*).

Ba. Bor. BorC. Bor4. D. Du. Han. Hass. Pol. R. RC. Sax. Suec. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

Gerste, welche man durch Anwendung einer starken Hitze im Keimen unterbrochen hat, dann trocknen läßt und wovon man die Keime trennt.

Das Malz enthält mehr Satzmehl Zucker und Schleimharz als die nicht gekeimte Gerste; auch ist es dieser als erweichendes Mittel vorzuziehen. Es bildet den Grundbestandtheil des Biers. Vielleicht hat man es etwas zu voreilig unter die antiscorbutischen Mittel gezählt.

Infusum Malthi s. Bynes s. Binae. (His. Li. Suec. *Sp.*)

℞. Malti gross. moliti libram unam.
Aquae bullientis libras duodecim.
Infunde per horas aliquot et cola. (Suec. *Sp.*)

Li. Malti uncias quatuor, Aquae bull. libram et quatuor horas infusionis; — His. Essentiae Malti octarium et tres Aquae bull.

Wird dieser Aufguß bis zur Honigdicke abgedampft, so erhält er den Namen *Essentia Malti*; Malzessenz; Essence de malt. Auf diese Weise bereitet führt man ihn auf langen Reisen bei sich, um Bier zu bereiten.

Decoctum s. Apozema Malti, Mustum Hordei, Decoctum Malti per se s. acidulum s. compositum. (B*. BorC. GalM. RC. Wür. *Au. Sa. Sw.*)

℞. Malti moliti . . uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum trium remanentiam. (BorC. *Au.*)

℞. Malti . . . . . semilibram.
Aquae fontanae . . libras sex.
Decoque ad colaturam librarum quatuor, cui interdum adduntur:
Acidi tartarici drachmae duae, vel
— sulph. diluti semuncia, vel
Roob Raccarum Oxycocci, vel
Molasses, vel
Oxymellis simplicis, vel
Succi Citri . . . . unciae tres.
(RC.) — Gabe, allein zum gewöhnlichen Getränk bei Scorbut; in Verbindung mit den genannten Zusätzen täglich ein bis zwei Pfund.

℞. Malti . . . . . uncias sex.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Post horae quadrantem bullitionis adde
Seminum Foeniculi semidrachmam.
Stent, leni calore, in digestione vase tecto, tum colentur. (*Sa.*)

℞. Malti moliti . . uncias quatuor.
Coque cum
Aquae . . sufficiente quantitate ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur, sub finem addendo
Rad. Liquiritiae drachmam unam.

Decantha. (GalM.)

B*. Malti uncias sex et Aquae libras sex ad quatuor redigendas. In fine addi possunt Foeniculi scrupuli quatuor et Liquiritiae drachmae tres.

℞. Malti . . . . . uncias sex.
Aquae . . . . libras quinque.
Ad libras quatuor redactis, colaturae adde
Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Malti sicci . . . uncias duas.
Aquae communis libras quatuor.
Coque et colaturae, si necesse est, adde
Oxymellis uncias tres vel quatuor.
Coqui cum malto possunt etiam Uvae passae. (Wür.)

Gabe, täglich zwei bis vier Pfund.

℞. Malti Hordei uncias quatuor.
Spec. Turion. Pini comp. unc. duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad librarum trium colaturae remanentiam, vel

℞. Decocti Malti per se
— antiscorb. aciduli, sing. part. aeq.

Gabe, drei bis vier Mal täglich vier Unzen. (RC.)

Gargarisma antiscorbuticum. (*Sm.*)

℞. Malti . . . . . unciam unam.
Nasturtii aquat. manipulum unum.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad librarum duarum remanentiam et adde
Aluminis . . . drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam unam.

Malva.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmocopöen drei Pflanzen vor:

1) *Althaea* (Alcea) *rosea, Cav.*; Pappelrosen, Stockroseneibisch; Passerose, Rose trémière (*Gal.*); Hollyhock (*Ang.*); Zahradnj neb kzjmsky slez (*B.*): Haestrose (*D.*); Stokros (*Bel*); Alcea, Malvone, Rosone (*I.*); Czarna roza (*Pol.*); Stockros (*Suec.*).

Ba. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. Gr. M. Pid. Sp. Z.*

♂ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine ursprünglich im Orient einheimische, in Europäischen Gärten gebaute Pflanze. (*Hayne* II. 26. *Blackw.* t. 54. *Cav.* diss. II. t. 28. f. 1. *Plenck* t. 542. Düss. off. Pfl. IV. t. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 286.)

Man wendet die Blüthen (flores Malvae arboreae s. roseae s. hortensis an; sie sind groß und von sehr verschiedener Farbe; man nimmt nur die dunkelschwarzen oder bräunlichrothen. Sie haben einen schwachen Geruch und einen schleimigen, etwas styptischen Geschmack.

2) *Malva rotundifolia, L.*; gemeine oder Käsepappel, Gänsepappel, rundblättrige Malve; Mauve à feuilles rondes, petite mauve (*Gal.*); Round leav'd mallow (*Ang.*); Zagecj slez (*B.*); Store kattevst (*D.*); Malva de hoja redonda (*His.*); Rondbladige maluwe (*Bel.*); Malva minore (*I.*); Szluz ziele (*Pol.*); Malva ordinaria (*Lus.*); Kattost (*Suec.*).

A. An. B Ba. Bel. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Sp. Va. Z.*

⊙ (Monadelphia Polyandria, L.; Malvaceae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* II. t. 27. *Plenck* t. 541. *Blackw.* t. 22. Düss. off. Pfl. V. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 237.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an

Die Wurzel (radix Malvae minoris s. vulgaris) ist dünn, walzig, faserig, weiß. Sie hat einen süßen, fast zuckerartigen Geschmack

Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten Stängel und kreisrunden, herzförmigen, fast fünflappigen Blättern von schleimigem, etwas bitterem Geschmack.

Die Blüthen sind sehr klein, hellpurpurroth, fast weiß.

Der Saame ist klein, nierförmig, schwarz.

3) *Malva sylvestris, L.*; wilde, Wald-Malve; Mauve sauvage (*Gal.*); Common mallow (*Ang.*); Lillekatost (*D.*); Wilde maluwe (*Bel.*); Malvone (*I.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. His3. LH. Lon. LonN. Lus. O. Pal. WW. *C. Gr. M. Re. Va.*

⊙ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 22. *Plenck* t. 540. *Hayne* II. t. 28. Düss. off. Pfl. VII. t. 23. *Zorn* Ic. pl. t. 480.)

Man wendet ebenfalls die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Malvae sylvestris) ist weißlich, von süßem und klebrigem Geschmack.

Das Kraut besteht aus einem walzigen, schwach behaarten, ästigen Stängel und rundlichen, am Grunde herzförmig ausgerandeten, an den Rändern gekerbten, in fünf bis sieben kurze Lappen getheilten Blättern.

Die Blüthen sind sehr groß, rosenroth, rothgestreift, bisweilen weiß.

Der Saame ist gelblich und glatt.

Beide Pflanzen sind erweichend, eben so

auch die von *Gr.* angeführten M. crispa, alcea (Alcea) und moschata.

Species emollientes, Species pro gargarismate emolliente. (Ful. Li. Suec *Fi.*)

℞. Foliorum Malvae partes duodecim.
Florum Chamomillae partes sex.
Seminis Lini . . . partes tres.
Concisa et contusa misce. (Ful. Li. Suec.)

℞. Foliorum siccatorum Malvae,
— — Althaeae,
— — Verbasci, sing. uncias sex.
Florum Sambuci . . uncias tres.
Concisa misce. (*Fi.*)

Flores bechici. (Gal.)

℞. Florum Malvae,
— Immortellae,
— Farfarae,
— Rhoeados, sing. partes aeq.
Misce.

Conserva Malvae. (An. Sar. Wür. *T.*)

℞. Flor. Malvae contrit. partem unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Fiat pasta homogenea. (Wür.)

℞. Florum Malvae cum Sacchari pauxillo contusorum partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant. (Sar.)

℞. Flor. Malvae subtil. pulv. part. unam.
Aquae Malvae q. s. ut fiat pasta, quae in vase clauso per horas 8—10 teneatur, ut pulvis penitus mollefiat; adde Solutionem Sacchari albi pulv. in Aqua Malvae et pastae refrigeratae adde Sacchari albi subtilissime pulv. tantum ut omne saccharum partes quinque impleat. (*T.*)

℞. Pulv. Fol. Malvae sicc. partem unam.
Sacchari albi . . partes quinque.
Aquae destillatae . partes duas.
Contere. (An.)

Cataplasma emolliens. (Fer.)

℞. Malvae pulveratae uncias quatuor.
Rad. Althaeae pulv. . uncias duas
Decocti Althaeae quantum sufficit ut fiat coctione pasta mollis.

Aqua Malvae. (Sar.)

℞. Herbae Malvae rec. partem unam
Aquae purae . . . partes duas.
Destillent trientes duo.

Infusum Malvae s. bechicum. (GalM. *ParC. Ra. Sy. T. Va.* Hosp. Char.)

℞. Fol. Malvae sicc. manipulos tres.
Aquae bullientis . libras quatuor.
Infunde et cola. (*Sy.*)

℞. Fol. Malvae sicc. drachmas duas.
Liquiritiae rasae drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut colaturae octarius unus obtineatur. (GalM. *ParC.*)

℞. Florum Malvae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra. Va.*)
Erweichend.
T. Cujusque partes dimidias.
Infusum Florum Malvae (*Gr.*) e Floribus cum Aqua bulliente Reagens.

Decoctum Malvae. (*T.*)

℞. Fol. Malvae unc. tres (recentium sex).
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad dimidium et cola.

Decoctum pro enemate s. Malvae compositum. (B*. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

℞. Fol. Malvae sicc. unc. (drach. *Re.*) unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . octarium (libram) unum.
Coque per horae quadrantem et cola.
In Bähungen und Klystiren.

Decoctum Malvarum carminativum s. carminativo-emolliens. (His3.)

℞. Foliorum Malvae recentium,
Radicis Althaeae concisae, singulorum unciam unam.
Seminum Anisi drachmam unam.
Florum Chamomillae drachmas duas.
Aquae purae . . sesquilibram.
Coque ad librae unius remanentiam et tepide cola.

Tisana pectoralis. (Gal.)

℞. Florum bechicor. drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post horae quadrantem infusionis cola et adde
Syr. Capilli Veneris unciam unam.

Clyster emolliens s. Foliorum Malvarum emolliens (His. His3. *Ra. Sp. Sw.*)

℞. Foliorum Malvae . semunciam.
Aquae bullientis . libram unam.
Coque et cola. (*Ra.*)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coquendo partem tertiam consume. (*Sw.*)

℞. Foliorum Malvae unciam unam.
Florum Chamomillae,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Aquae . . . uncias duodecim.
Coque et cola. (*Sp.*)

℞. Fol. Malvae,
— Betae Cyclae, sing. uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Decocto adde
Olei Olivarum . . uncias tres.
Misce bene. (*Ra.*)
His. His3. Decocti Malvae uncias decem, Mellis et Olei Olivarum, sing. duas.

Gargarisma leniens. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Decocti Malvae uncias quatuor.
Lactis vaccini . . unciam unam.
Misce.

Fomentatio Malvae. (*Va.* Hosp. Char.)

℞. Foliorum Malvae . . unciam.
Aquae . . . . . libram.
Erweichend.

Fomentatio antihaemorrhoidalis. (*Pie.*)

℞. Fol. Malvae,
— Verbasci, sing. . manip. tres.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coque et cola.

Unguentum Malvae s. malvinum. (*Fi. T. Vm.*)

℞. Herb. Malvae recent. sesquilibram.
Butyri recentis . . libras duas.
Coque lente ut humidum evanescat et cola exprimendo. (*Vm.*)
℞. Axungiae Porci colatae libras duas.
Adipis bubuli colati libram unam.
Foliorum Malvae virid. libras tres.
Axungiae et adipi liquatis adde folia contusa et coque per horae spatium et exprime; refrigerato unguento aquam separa, liquefac et ad consistentiam melleam consume. (*Fi. T.*)

Tinctura Alceae purpureae. (*Fi.*)

℞. Petal. Alceae purp. sicc. drachmam.
Alcoholis 24° . . . uncias duas.
Post duorum dierum tepidam infusionem filtra.

Solutio Extracti Malvae sylv. alcoholici (*Gr.*): Folia siccata in Alcohole 40° B. macera, alcoholem destillando separa et extractum in Aqua dissolve. — Teſtmittel.

Manganesium.

Man wendet in der Medicin von dieſem Metall folgende Präparate an:

Tetroxydum Manganesii, Tritoxydum Manganesii, Magnesia nigra s. vitriariorum, Magnesium oxydatum nativum s. nigrum, Manganesium ochraceum nigrum s. oxydatum nativum, Manganum oxydatum nativum s. hyperoxydatum, Manganesium, Manganum, Manganum hyperoxydatum, Molybdaenum Magnesii, Oxides Mangani nativa, Oxydum Mangani nativum, Oxydum Magnesii s. Mangani nigrum s. nigrum nativum, Peroxydum Manganesii s. Manganesii nigrum nativum, Superoxydum manganicum; Braunſtein, Graubraunſteinerz; Tetroxide de manganèse, Magnésie noire, Manganèse oxidé, *H.*, Oxide noir de Manganèse, Peroxide de Manganèse, B., Acide manganésique, Savon des verriers, Savon de verre (*Gal.*); Manganese (*Ang.*); Brunsteen (*D.*); Magnesia (*His. Lus.*); Magnesia nera, Manganese, Sapone de Vetraj (*I.*); Bruinsteen (*Bel.*); Mangana (*Pol.*); Marganezi (*R.*); Brunsten (*Suec.*).

An. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. C. Fi. G. Gr. Re. T.*

In matten, in der Farbe vom reinen Schwarzen bis zum Braunen und Violetbraunen wechſelnden Maſſen.

Die mediciniſche Anwendung dieſes Oxyds iſt beſchränkt Man hat es, mit gleichen Theilen Schmeer gemiſcht, bei Kopfgrind, Krätze und Flechten benutzt. Man braucht auch nur die leidenden Theile mit dem Pulver zu beſtreuen. Beſonders aber bedient man ſich deſſelben zur Bereitung des Chlor's.

Boli emmenagogi.

℞. Mangani oxyd. nig. gr. quatuordecim.
Extracti Sabinae,
— Aloës, sing. . grana decem.
Fiant boli sex. — Den Tag über zu nehmen.

Hydrochloras Manganesii, Manganesium muriaticum oxydulatum, Murias Manganesii. (B*.)

℞. Manganesii . . . quantum vis.
Acidi hydrochlor. tenuis . q. s. ad solutionem metalli. Liquor evaporet.

In Auflöſung zu 1 und mehrern Granen. Aeußerlich von Kapp in Gerſtendecoct mit Arab. Gummi und Honig zu Gurgelwaſſern bei ſcorb. und ſyphil. Geſchwüren im Munde und Halſe.

Pilulae Manganesii muriatici s. Hydrochloratis Manganesii. (B*. *Au.*)

℞. Manganesii muriat. . scrup. duos.
Gummi Arabici,
Rad. Liquiritiae, sing. scrup unum.
Fiant pilulae granorum duorum, Pulvere Cinnamomi conspergendae.

Gabe, zehen bis zwanzig Stück bei Flechtenübeln.

Man hat auch eine wäſſerige Auflöſung dieſes Salzes in Gurgelwaſſer gegen Schwämmchen gerühmt. Auch das eſſigſau-

re Mangan (*Manganesium aceticum*), ein Scrupel auf drei Unzen Waſſer, ſo wie eine Salbe aus gleichen Theilen ſchwefelſaurem Mangan (*M. sulphuricum oxydulatum*) und Schmeer, oder 1 Drachme auf 1 Unze friſche ungeſalzene Butter bei Krätze (wirkt aber langſamer als Schwefelſalbe) ſind gleichfalls empfohlen worden. (*Au.*)

Manna.

Μελία; Manna; Manne (*Gal.*); Manna (*Ang. E. D. I. Lus. Pol. R. Suec.*); Mun, Terinjebin (*Ar.*); Mana (*His.*); Schirkischt (*Hin. Pe.*); Gambing (*Ja.*); Kapurrimba (*Mal.*).

A. Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va. Z.*

Eine zuckerige Subſtanz, von welcher man mehrere Sorten unterſcheidet:

1) *Manna canellata s. canaliculata s. cannulata s. longa*; Manna in Stäben, Manne en bâtons (*Gal.*); in auf der einen Seite hohlen, auf der andern gewölbten, leichten, weißlichen oder hellgelben, bisweilen röthlichen Stücken von angenehmem Geſchmack, Manna in lacrymis s. lacrymata genannt, wenn ſie kleiner ſind.

2) *Manna in sortis s. communis s. pinguis*; gemeine Manna; Manne commune ou en sorte (*Gal.*) in rundlichen Brodten oder länglichen, gelblichen, weichen, fettig anzufühlenden, ſchweren, die Hände beſchmierenden Stücken von etwas widerlichem Geſchmack. Man nennt ſie auch Manna von Giaraci oder Gerace oder von Capachi (erſteres in Niedercalabrien, letzteres auf Sicilien gelegen), Manne geracy, Manne capacy (*Gal.*). Die körnigen und weißen Stücke von erſterer werden unter dem Namen Manna electa s. granulosa, Manne choisie ou en grains (*Gal.*) abgeſondert.

3) *Manna grassa, spissa, sordida, pinguis*, iſt ſehr feucht, gelblich, weich, klebrig und mit fremden Körpern verunreinigt.

Man erhält faſt alle dieſe Subſtanzen durch Einſchnitte, welche man in den Stamm von Fraxinus excelsior, L., rotundifolia, *Lmk.*, parviflora, *Lmk.*, subrufescens, *Mér.*, Ornus, L. und argentea, *Lois.* macht. Die von ſelbſt ausfließende Manna iſt ſelten und in Körnern von der Größe der Waizenkörner, ſie führt den Namen Mastichina, Manna di fronde.

Die Manna enthält, nach Thénard, Zucker, einen eigenthümlichen Stoff, Mannita genannt, und einen eckelerregenden Stoff.

Außerdem kennt man noch die

1) *Manna Brigantina s. laricina*; Manne de Briançon (*Gal.*), in kleinen, weißen, klebrigen Körnern. Sie ſchwitzt im Süden aus den Blättern von Larix Europaea aus.

2) *Manna Persica*; Manne d'alhagi (*Gal.*); Transchibil, Tarandjubin (*Pe.*), in kleinen gelben, röthlichen oder braunen Körnern, welche in Orient aus den Blättern und Zweigen von Hedysarum Alhagi ausſchwitzen.

Trochisci Mannae, Tabellae Calabricae, Tabellae Saccharo et Manna confectae. (GalF. GalH. Pm. *Vm.*)

℞. Sacchari albissimi libram unam.
Mannae cannulatae . uncias tres.
Aquae fontanae . quantum satis.

Saccharum et mannam seorsim soluta et clarificata ad necessariam spissitudinem coque; liquores inspissatos commisce cum

Aquae Florum Aurantii
drachmis duabus;

supra lapidem projice et in tabellas divide. (Pm.)

℞. G. Tragacanthae partem unam.
Sacchari albi partes nonaginta sex.

Contere et adde

Mannae . partes viginti quatuor.
Aquae Florum Aurantiorum q. s.

ut fiat pasta in trochiscos dividenda. (*Vm.*)

℞. Rad. Althaeae partes nonaginta sex.
Aquae purae partes duodecies mille.

Coque per sexagesimas sex et adde

Sacchari . . . partes ter mille.
Mannae Calabrinae
partes centum nonaginta duas.

Cola et Albumine clarificatis adde

Extracti Opii gummosi partes sex.
Olei ess. Bergamott. part. decem.
Aquae Flor. Aur.
partes nonaginta sex.

In modulos chartaceos oleo obductos effunde et antequam refrigescat in trochiscos divide. (GalF. GalH.)

Gelatina laxans. (*Pie.*)

℞. Carnis vitulinae . . libras duas.
Aquae . . . . . octarios duos.

Coque per horas duas et adde

Mannae in lacrymis uncias tres.

Coque iterum per horas duas et per cribrum trajecta ad refrigerandum repone. — Eßlöffelweiſe alle Stunden.

Electuarium s. Pulticula de Manna. (Fenn. Pal. Suec. Wir. *Sw. Va. Vm.*)

℞. Mannae purae . . . partes tres

Olei Amygd. dulc. partem unam.
Tere et adde pedetentim
Syrupi Mannae (Gummi *Va.*)
part. unam.
Misce bene. (*Va.* Hosp. d'Allem. *Vm.*)

℞. Mannae electae . . uncias duas.
Aquae Foeniculi . unciam unam.
Tere frigide, cola et colaturam tritura cum
Sacchari . . . . unciis duabus.
Iridis Florentinae . drachma una.
Producto adde
Olei Amygd. dulc. unciam unam.
Misce. (*Vm.*)

Fenn. et Suec. Mannae uncias duas, Sacchari, Aquae Foeniculi, sing. tantidem, Iridis Flor. drachmam et Olei Amygd. dulc. unciam; — Pal. et Wir. Sacchari, Mannae, Aquae Florum Prunellae, sing. uncias duas, Iridis drachmam et Olei unciam; — Wir. Mannae, Sacchari, Aquae Rosarum, sing. uncias duas, Iridis drachmam et Olei semunciam.

Ein ſanftes Abführmittel, welches beſonders bei neugebornen Kindern empfohlen iſt. — Gabe, eine bis vier Drachmen.

Electuarium bechicum. (GalF. *Va.*)

℞. Mannae electae . unciam unam.
Aquae Florum Aurantior. . q. s. ut manna triturando in mortario marmoreo mollis fiat; terendo continuè adde
Pulv. Gummi Arab. . semunciam.
Extr. Liquirit. mollis drachmam.
Syrupi Capilli Veneris . . q. s.

Electuarium antihaemorrhoidale. (*Ca.*)

℞. Mannae in lacrymis uncias duas.
Kali sulphurici,
Nitri,
Magisterii Sulph., sing.
drachm duas.
Mellis albi . . quantum sufficit
Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich.

Looch Mannae s. de Manna. (GalH.)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althaeae,
Mannae in lacrymis, sing.
part. quatuor.
Aquae Flor. Aurant. partem unam.
— purae . . . partes duas.
Mannam in aqua blando calore solutam oleo et syrupo mixtis adde et misce exacte.

Von Chevallier und Idt vorgeſchlagen und nur wenig von dem Linctus s. Marmelada Tronchini verſchieden. Uebrigens giebt es noch ähnliche, unter dem Namen: *Linctus mannatus* (Wür. *Sa. Sw.*), *Linctus aperiens* (*Sa.*), *Mixtura laxans* (*Sy.*) und *Potio purgans* (*Pie. Sm.*), zu denen die Formeln folgende ſind:

℞. Mannae purae . . uncias tres.
Olei Amygd. dulc. sesquiunciam.
Misce triturando. (*Sw.*)

Sa. Mannae et Olei part. aeq., Vitelli Ovorum q. s.; — Wür. Mannae, Olei et Syrupi Violarum part. aeq.; — *Sa.* Olei, Mannae, sing. unciam unam et Syrupi Rosarum solutivi semunciam.

℞. Gummi Arabici . unciam unam.
Olei Amygd. dulc. . uncias duas.
Decocti Hordei . uncias decem.
Mannae . . . . unciam unam.
Mellis . . . . . semunciam.
Misce. (*Sy.*)

℞. Ol. Ricini c. Vitello Ovi subacti,
Mannae elect., sing. unciam unam.
Magnesiae subcarb drachmas duas.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.
Misce. (*Sw.*)

℞. Flor. Persicae,
— Violarum, sing.
semimanipulum.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Coctis leviter, in colatura solve
Mannae . . . . uncias duas.
Adde deinde
Olei Amygd. dulc. unciam unam.
Misce bene. (*Pie.*)

Cassia cum Manna, Decoctum Mannae purgans s. laxativum s. carminativum, Potio s. Ptisana angelica s. laxativa s. anticolica s. Mannae s. Mannae tamarindinata s. salina mannata, Aqua angelica Viennensis s. laxativa, Manna liquida. (GalM. His. His3. Pal. *Au. B. Ra. Sp. T.*)

℞. Mannae . . . . . uncias tres.
Aquae communis . . uncias sex.
Dissolve. (*Ra. Va.*)

℞. Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.
Solutioni adde
Pulpae Cassiae . unciam unam.
Auf zweimal zu nehmen. (*B.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quinque.
Mannae electae . . uncias duas.
Solutionem cola. (*Sp.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae fontanae . . uncias octo.
Coque et adde
Mannae canaliculatae uncias duas.
Manna vix soluta, vasi ab igne remoto infunde Succi Limonum expressi semunciam et cum Albumine subacto clarifica, addendo Cort. rec. Limonis frustum; post refrigerationem filtra per linteum. (*T.*)

℞. Pulpae Cassiae . . semunciam.

Salis vegetabilis sesquidrachmam.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae fontanae uncias quinque.
Solutionem cola. (*Sp.*)

℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae Chamomillae uncias novem
Solutionem cola. (*Au.*)

℞. Mannae . . . . unciam unam.
Natri sulphurici . sesquiunciam.
Aquae . . . . . uncias sex
Dissolve (*Au.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis. . uncias octo.
Solutioni adde
Mannae . . . . . uncias duas.
Salis vegetabilis sesquidrachmam.
Succi Citri Fructus . no. 1.
Infunde totum Cortici Citri et clarificatum Albumine cola. (Pal. *Sp.*)

℞. Mannae . . . . uncias duas.
Foliorum Sennae . drachmas sex.
Magnesiae sulphur. drachmas duas.
Aquae . . uncias quatuordecim.
Coque leviter ad librae unius remanentiam et cola deinde. (His. His3.)

℞. Sennae . . . . drachmas duas.
Natri sulphurici . . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque per sexagesimas aliquot et adde
Mannae . . . uncias quatuor.
Cola. (GalM.)

℞. Aquae . . . . . uncias octo.
Agita cum Albumine et adde deinde
Foliorum Sennae . drachmas tres.
Mannae . . . . . uncias tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Dissolutionem coquendo clarificatam saepius per manicam cola et adde tandem
Aquae Cinnamomi scrupul. unum.
Auf einmal zu nehmen. (His. His3.)

℞. Mannae . . . uncias quatuor.
Fol. Sennae mund. unciam unam.
Cremoris Tartari,
Seminum Anisi, sing. semunciam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Digere per semihoram, tunc coque parumper et cola.
Gabe, sechs Unzen. (His.)

Emulsio cum Manna s. purgans, Potio Mannae emulsiva. (Fer. His. His3. *Au. Ra. Va.* Hosp. Paris.)

℞. Amygdal. dulc. drachmas quatuor.
Mannae in lacrymis . uncias duas.
Syr. Flor. Persicae unciam unam.
Infusi Liquiritiae . uncias quatuor.
Aquae Flor. Aurant.
drachm. quatuor.
Fiat emulsio. (*Ra. Va.*)

℞. Emulsionis non saccharatae
uncias sex.
Mannae . . . . . uncias tres.
Solutioni colatae adde
Aquae Cinnam. vinos. drachmam.
Misce. (His. His3.)

Fer. Emulsionis uncias sex, Mannae duas et Aquae Cinnamomi drachmam.

℞. Emulsion. gummos. uncias novem.
Mannae . . . . sesquiunciam.
Dissolve. (*Au.*)

Serum Lactis mannatum s. purgans. (*Au. B. Va.* Hosp. d'Allem.)

℞. Mannae . . . . unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Seri Lactis clarificati uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas. (*Au. Va.*)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, sing. . . sesquiunciam.
Seri Lactis . . quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur. (*B.*)

Potio antihydropica. (Br.)

℞. Succi Iridis . . . . uncias tres.
Mannae . . . . sesquiunciam.
Dissolve

Syrupus Mannae s. de Manna. (Ba. Bor4. Br. Ful. *Pid. Va.* Hosp. d'Allem.)

℞. Mannae electae . uncias decem.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Solutioni colatae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Coque ad syrupi consistentiam. (Br.)
Va. Mannae uncias quinque, caet. ut antea; — *Pid.* Mannae unc. duas, Aquae viginti et Sacchari libras duas; — Ba. Mannae partem unam, Aquae quatuor et pro quaque parte colaturae Sacchari partem unam cum dimidia; — Ful. Mannae unciam unam, Aquae sesquiunciam et Sacchari drachmas sex; — Bor4. Mannae electae semilibram, Aquae ferv. q. s. ad colaturam unciar. octodecim; solutioni adde Sacchari albiss. libras duas; unica ebullitione fiat syrupus.

Syrupus e Manna s. Mannae cum Senna s. de Manna laxativus. (Bor. Br. D. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Wir. *Fi. Sp. T.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias quatuor.
Seminum Foeniculi . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde in vase tecto per horas aliquot, cola exprimendo et unciis septemdecim colaturae adde
Sacchari albi . . . . libras duas.
Mannae electae . . semilibram.
Fiat coquendo syrupus. (O.)

R. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bull. libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari viginti

duas; — Bor. Han. HassP. Li Pal. Sennae uncias quatuor, Foeniculi semunciam, Aquae libras duas et pro unciis octodecim colaturae Sacchari libras duas et Mannae semilibram; — *Fi.* Foliorum Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas quatuor, Mannae calabrinae uncias sex, Sacchari albi, Aquae bull., sing. libras duas, digestionem horarum sex, additionem Albuminum duorum et additis saccharo et manna coctionem ad syrupi consist.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Foeniculi,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae depuratae adde
Mannae Calabrinae . uncias sex.
Sacchari albi uncias viginti duas.
Coque ad syrupi consistentiam. (D.)

℞. Radicis Polypodii. sesquiunciam.
Specier. pro Dec. Flor. et Fruct.,
Passular. min., sing. uncias duas.
Aquae bull. . libras duas c. dimid.
Infunde per noctem; altero mane coquendo parte tertiâ consumpta, in colatura infunde
Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Anisi,
— Foeniculi,
Galangae,
Macidis,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Post viginti quatuor horarum digestionem in loco calido cola exprimendo, Albumine clarifica et adde
Mannae Calabrinae . uncias sex.
Sacchari albi uncias viginti duas.
Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Radicis Polypodii . drachmas sex.
— Iridis Flor. . semunciam.
Uvarum passarum drachmas tres.
Mellis . . . . uncias quatuor.
Aquae font. uncias viginti quatuor.
Decoque ad unciarum liquidi duodecim remanentiam, in colatura per horas duodecim infunde
Flor. quatuor pectoral. manip. unum.
Fol. Sennae mund. sesquiunciam.
Cinnamomi . . semidrachmam.
In colatura dissolve
Mannae Calabrinae . uncias tres.
Sacchari , . . uncias duodecim.
Coque ad syrupi consistentiam. (*Sp.*)

℞. Sennae mundatae . uncias octo.
Seminum Foeniculi . semunciam.
Infunde
Aquae bullientis, c. Kali subcarb. drachma una impraegn. libras decem.
Post horarum sex digestionem liquido adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Mannae electae . . libras duas.
Caloris et Albuminis ope clarificata ad syrupi consist. evaporent, filtrentur etc. (*T.*)

Marrubium.

Marrubium vulgare, L.; Marienwurzel, weißer Andorn; Marrube blanc (*Gal.*); White horehound (*Ang.*); Gablecnjk bilj (*B*); Hvid marrube (*D.*); Marrubio blanco (*His.*); Witte andoorn (*Bel.*); Marrobio bianco (*I.*); Szanta biala (*Pol.*); Marroio branco, Marroio (*Lus.*); Andorn (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 165. *Blackw.* t. 479. *Plenck* t. 487. Flor. méd. IV. 226.)

Man wendet das Kraut (herba Marrubii albi s. Prassii s. Phrasi) an; es besteht aus einem filzigen, ästigen Stängel mit eirunden, rundlichen, gestielten, gekerbten, oben runzeligen, unten filzigen weißlichen Blättern. Es hat einen starken, durch Trocknen sich verlierenden Geruch und einen bittern, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, die Regeln treibend, krampfstillend, fieberwidrig und bisweilen abführend.

Conserva Marrubii albi. (Ams.)

℞. Summit. Marrubii rec. contus. partem.
Sacchari albi . . . partes tres.
Triturando misce.

Succus Marrubii albi. (Wür.)

℞. Herbae Marrubii recentis q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva, cuique libræ Alcoholis drachmam unam addendo.
Gabe, eine bis zwei Unzen.

Marrubium conditum. (*Gr.*)

℞. Succi Marrubii . . . octarium.
Sacchari albi . . libras quatuor.
— fusci . . . libras sex.

Infusum Marrubii. (*Gr.*)

℞. Herbae Marrubii exsiccatae semunciam.
Aquae destillatae ferventis semioctarium.

Eine halbe bis zwei Unzen dreimal täglich.

Extractum Marrubii albi aquosum. (A. Ams. An. Bor. D. Fer. Han. Hass. HassP. Li. LP. Lus. O. Pol. Sax. *Fi. Pid. Vm.*)

℞. Fol. Marrubii recent. . . q. vis.
Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum trajice; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; ad massae pilul. consist. redacto et ab igne remoto adde faeculam antea repositam et iterum vaporando ad aptam spissitudinem redige. (*Vm.*)

℞. Herbae Marrubii . partem unam.
Aquae communis . partes octo.
Macera per horas 24, tunc per horae quadrantem coque et cola fortiter exprimendo; residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commixti post horarum 24 sepositionem ad extracti consist. evaporent. (Li. Sax.)

℞. Herbae Marrubii . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo, residuum cum quatuor partibus Aquae coctum itidem colatur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati leni calore ad extr. consist. evaporent. (Bor. D. Han. O.)

A. et Pol. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere et liquores commixtos et decanthatos in balneo aquae vaporatione inspissare.

HassP. ut extractum cardui benedicti; — *T.* ut extractum centaurii minoris.

℞. Herbae Marrubii albi
libram unam.
Aquae fontanae . . libras decem.
Coque per horas duas, cola exprimendo et liquorem repositum atque per manicam trajectum ita consume, donec non ultra digitis adhaereat. (Ams.)

Hass. Lus. et *Pid.* coquere Herbae partem unam in Aquae sex, colare exprimendo et liquorem decanthatum post horarum viginti quatuor sepositionem vaporare; — An. Coquere Herbae libras duas in Aquae decem per horae quadrantem et decoctum decanthatum vaporare; — Fer. Coquere Herbae partem unam in Aquae tribus, Albumine clarificare et colaturam vaporatione inspissare.

LP. ut extractum centaurii minoris; — *Fi.* ut extractum absinthii.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Marrubii albi alcoholicum. (Bor4. Ful. Wür.)

℞. Herbae Marrubii albi,
Alcoholis, sing. . libram unam.
Aquae communis . . libras octo.
Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, repone et decantha liquorem, alcoholem destillatione elice et residuum ad aptam consist. consume.

Bor4. ut extractum absinthii.

Mixtura Marrubii, Potio pectoralis. (*Au.*)

℞. Extr. Marrubii,
— Graminis, sing.
drachmas duas.
Decocti Taraxaci . uncias decem.
Oxymellis scillitici,
Syr. Foenic., sing. . uncias duas.
Gabe, alle zwei Stunden ein halbes Glas.

Syrupus de Marrubio s. de Prassio s. Marrubii s. Prassii albi. (Gal. His. His3. *Gr. Re. T.*)

℞. Fol. Marrubii albi sicc.
uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Infunde et adde colaturae
Sacchari . . . libras quatuor.
Syrupum cola. (His. His3.)

T. Marrubii uncias sex, Aquae bullientis libras quatuor, infunde per horas duodecim et colaturae adde Sacchari pondus duplum.

℞. Fol. sicc. Marrubii albi
unciam unam.
Aquae dest. Marrubii albi
libras duas.
Digere in balneo aquae, vase tecto, per horas duas, cola, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Solve in balneo aquae. (Gal.)

GalH. Infusionis partem unam cum tribus Syrupi communis, antea ad globulum cocti, miscendo syrupum parare; — *Re.* Marrubii manip., Aq. bull. q. s. ut colat. octarius obtineatur, vapora et adde Sacch. ut fiat syrupus.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Marrubium conditum (Candied horehound) (*Re.*). E Decocto Marrubii et Saccharo.

Aqua Marrubii. (Pal. Sar.)

℞. Herbae Marrubii rec. part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars.

M a s t i x.

Mastiche, Mastice, Resina Mastichis s. Lentisci s. lentiscina s. Pistaciae Lentisci; *Μαστιχη*; Maſtix; Mastic (*Gal.*); Mastiche (*Ang.*); Arah, Auluk bagdadie (*Ar.*); Mastix (*D. Suec.*); Almacigu (*His.*); Rumie mustakie (*Duk. Hin.*); Mastico (*I.*); Kinneh (*Pe.*); Mastyx (*Pol.*); Almecega (*Lus.*); Rumie mustiki (*Tam.*); Sakes (*Turc.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T. Va. Z.*

In Tropfen oder unregelmäßigen, trocknen, zerreiblichen, gelblichen, halbdurchſichtigen Maſſen, gerieben von angenehmem Geruch und gekaut, ſich erweichend, von ſcharfem, gewürzhaften Geſchmack und einem glänzenden, glaſigen Bruche.

Es iſt ein Harz, welches aus Einſchnitten in die Rinde von Lentiscus vulgaris, Pistacia Lentiscus, L., einem Strauche (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*) des ſüdlichen Europa's, ausfließt. (*Blackw.* Herb. t. 195. *Plenck* t. 710. Düss. off. Pfl. IX. 16. *Hayne* Bild. II. 94. f. 2.) — Auch Schinus molle in Peru liefert eine Art Maſtix.

Toniſch, reizend, magenſtärkend.

Pulvis ad fluorem album. (Pal.)

℞. Radicis Iridis Flor. . semunciam.
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Ossis Sepiae,
Corallii albi praeparati,
Crystalli mineralis (?),
Olibani,
Mastichis, sing. drachmam unam.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben Drachme bis zu zwei Scrupel und mehr, in einem paſſenden Vehikel.

Trochisci masticatorii. (*Au.*)

℞. Mastichis,
Cerae albae,
Zingiberis, sing. . partes aequales.

Fiant trochisci pond. semidrachmae.

Massa odontalgica. (B*. *Br**.)

℞. Mastichis,
Sandaracae, sing. drachmas duas.
Kino . . . . . grana decem.
Opii . . . . . grana duo.
Olei ess. Rorismarini guttas octo.
Spiritus Cochleariae . . . q. s.

Fiat massa mollis. (B*.)

*Br**. Mastichis, Sandaracae, sing. drachmas duas, Sanguinis Draconis semidrachmam, Opii grana sex, Olei Rorismarini guttas octo et Spir. Cochleariae q. s.

Man füllt damit die angefreſſenen Zähne aus.

Decoctum mastichinum. (Br.)

℞. Mastichis electi . unciam unam.
Crustae Panis albi . semilibram.
Macidis . . . drachmam unam.
Aquae purae . . libras quatuor.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, Rasurae Cornu Cervi ope clarifica et cola; colaturae adde

Conservae Rosarum uncias quatuor.
Aquae Cinnam. simpl. uncias duas.

Aqua mastichina. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Mastichis . . . uncias quatuor.
Nucis moschatae . unciam unam.
Alcoholis . . . . libram unam.

Post tres dies digestionis adde

Aquae purae . . libras quatuor.

Destillent librae tres. (Br. Wir. *Sp.*)

Pal. Mastichis uncias quatuor, Macidis duas, Caryophyllorum unam, Cinnamomi dimidiam et Vini generosi libras quatuor.

Magenſtärkend. — Gabe, bis zu einer Unze.

Spiritus Masticches compositus s. matricalis. (Ams. B*. Bor. Bor4. Br. Han. O. Pal. Sax. Wir.)

℞. Masticches,
Myrrhae,
Olibani, sing. . . partem unam.
Alcoholis . partes viginti quatuor.

Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes duae. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Sax.)

Br. Cujusque trium dictarum substantiarum sesquiunciam et Alcoholis libras quatuor.

℞. Masticches,
Myrrhae,
Olibani,
Succini, sing. . . . uncias duas.
Alcoholis (0.907) . . libras tres.

Post quatuor dierum digestionem destillet sesquilibra. (Ams.)

Pal. et Wir. Quatuor substantiarum cujusque semunciam et Alcoholis nonaginta sex.

℞. Masticches . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae, sing.
drachmas tres.
Zingiberis,
Galangae,
Cardamomi minoris,

Cort. Winterani, sing. drach. duas.
Alcoholis . . . . libras decem.
Post aliquot dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.
Destillent librae novem. (Br. Wir.)
In Waschungen bei Schwäche und Lähmungen.

Elixir mastichinum s. Mastichis. (Br. Wir.)

℞ Spiritus Mastiches . libras duas.
Aquae fontanae . libram unam.
Sacchari albi . . uncias decem.
Misce.

Syrupus mastichinus s. Mastichis. (Br. Wir.)

℞. Mastichis electi parumper contusi uncias duas.
Aquae Mastiches uncias duodecim.
Infunde in vase bene clauso per tres dies, cola deinde et colaturae adde
Sacchari albi . . uncias sedecim.

Oleum Mastiches s. mastichinum. (Br. Sar. Wir. *Fi. T. Vm.*)

℞. Mastiches . . . partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Dissolve in balneo aquae (Sar. *Vm.*)
Br. et Wir. vel cujusque part. aeq. vel Mastiches partem unam et quatuor Olei Rosarum.
T. Mastiches uncias sex, Olei Rosarum libras duas; — *Fi.* Olei Rosarum libram, Mastiches uncias tres, Vini albi generosi uncias quatuor; coque ad consumptionem vini et cola.
Ehedem zur Stillung von Erbrechen und Durchfall. — Bei Magen- und Verdauungsbeschwerden auf die Magengegend ꝛc. eingerieben. (*T.*)

Liquor ad odontalgiam s. antiodontalgicus (*Sw.*)

℞. Mastiches . . . quantum vis.
Essentiae Terebinthinae . q. s.
Dissolve.

Emplastrum ad dolores dentium s. antiodontalgicum s. mastichinum. (Br. Pal.)

℞. Mastiches,
Carannae,
Elemi,
Tacamahacae, sing. unciam unam.
Storacis Calamita . semunciam.
Olei Nucis mosch. scrupulos octo.
Terebinthinae . . semunciam.
Misce. (Pal.)
Br. Mastiches sesquiunciam, Animae, Elemi, Tacamahacae, sing. semunciam, Cerae flavae uncias tres, Olei Mastiches semunciam et Terebinthinae drachmas duas.

Tinctura s. Essentia Mastiches s. Mastichis s. vulneraria simplex s. mastichina. (Ams. Br. Ful. LP. *Gr. Sw.*)

℞. Mastiches electi . partem unam.
Alcoholis (0,884) . partes octo.
Infunde per dies septem et cola. (Ams. Ful.)
Gr. has quantitates *Aquae Luciae* formulae cuidam; — Br. Mastiches unciam unam et quatuor Alcoholis concentrati; — LP. *Sw.* Mastiches unciam et Alcoholis (0,935 *Sw.*) libram.
Schwach reizend, ehedem besonders bei Beinfraß und Knochenwunden, so wie auch bei hartnäckigen Diarrhöen.

Tinctura Mastiches composita. (*Ca.*)

℞. Mastiches,
Olibani,
Myrrhae, sing. unc. duas c. dimid.
Alcoholis . . . uncias sexaginta.
Post sufficientem digestionem filtra. — Reizend, bei Schrunden und Frostbeulen der Füße und Hände.

Matricaria.

Matricaria Parthenium, L.; Mutterkraut; Matricaire (*Gal.*); Common fever-few (*Ang.*); Matecnjk, Kzimbaba (*B.*); Matrum (*D.*); Matricaria (*His. I. Lus.*); Maruma ziele (*Pol.*); Matram (*Suec.*)
Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. Li. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.*
♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VI. 20. *Bull.* t 205. *Blackw* t. 291. *Plenck* t. 618. *Zorn* Ic pl. t. 166)
Man wendet das Kraut (herba Matricariae s. Parthenii) an; es besteht aus einem gerieften Stängel und abwechselnden, gestielten, gefiederten, in fiederspaltige Läppchen, deren kleinere Fiederchen eingeschnitten und etwas stumpf sind, getheilten Blättern. — Die Spitzen bestehen aus endständigen Sträußen strahliger, in der Mitte gelber, im Umkreise weißer Blüthenköpfchen.
Der Geruch ist stark, durchdringend und unangenehm, verliert sich aber durch Trocknen; der Geschmack ist bitter und gewürzhaft.
Reizend, antihysterisch, die Regeln und Würmer treibend. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel bis eine Drachme; des Saftes, eine bis zwei Unzen; des destillirten

Wassers, eine bis drei Unzen. — Eine oder zwei Drachmen sind für zwei Pfund Aufguß hinreichend.

Syrupus Matricariae (*T.*) ut syrupus erysimi paratur.

Extractum Matricariae (*Fi.*) ut extractum absinthii.

Aqua Matricariae. (*Fi. T.*)

℞. Florum Matricariae . libras tres.
Aquae communis libras duodecim.
Destillent librae sex. (*Fi.*)
T. ut aquam florum chamomillae.

Mechoacanna.

Convolvulus Mechoacanna, *Röm.* et *Schult.*; Mechoacanna; Mechoacan, Jalap blanc, Rhubarbe blanche ou des Indes, Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique (*Gal.*).

Ams. B. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Sp* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine Pflanze Mexico's und Brasilien's. (*Piso* de med. Bras. p. 93.)

Man wendet die Wurzel (radix Mechoacannae s. Mechoacannae albae s. Jalappae albae) an; sie ist sehr dick, außen aschgrau oder rothbraun, innen weiß, Man verkauft sie in trocknen, weißlichen, etwas weichen und faserigen Stücken. Der Geschmack ist süßlich, aber etwas scharf.

Sie enthält kein Harz, aber einen ihm ähnlichen öligen Stoff und viel Satzmehl.

Ein wenig angewendetes Purgirmittel. — Gabe, von vier Scrupel bis zu zwei Drachmen.

Melilotus.

Von dieser Pflanzengattung kommen vor:

1) *Melilotus coeruleus*, *Lamk.*, *Trifolium odoratum. coeruleum*; blauer Steinklee, Siebengezeit; Mélilot bleu, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trèfle musqué (*Gal.*); Blue melilot trifoil (*Ang.*); Bleauwe melilot (*Bel.*).

Gal. Wir. *Gr. Sp.*

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 284.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Aegyptiaca s. Meliloti coerulei s. Loti odoratae s. urbanae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit aus drei eirunden, fein sägezähnigen Blättchen bestehenden, an der Basis großen gezähnten Nebenblättern begleiteten Blättern; die blaßblauen Blüthen stehen in den Blattwinkeln auf langen Stielen und bilden Trauben, welche eirunde, gedrängte Aehren zusammensetzen. Es hat einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch und einen etwas scharfen Geschmack.

2) *Melilotus officinalis*, *Lamk.*, *Trifolium Melilotus officinale*, *L.*; Steinklee, Melilotenklee: Mélilot officinal (*Gal.*); Melilot trifoil (*Ang.*); Komonice (*B.*); Amur, Steenklover, Meloten (*D.*); Meliloto (*His. Lus.*); Meliloto, Ghirlandetta, Erba solfanina o vetturina (*I.*); Meloten (*Bel. Suec.*); Komonika swoyska (*Pol.*); Meliloto (*Lus.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sv.* Z.

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* II. 31. *Bull.* t. 255. *Blackw.* t. 80. *Plenck* t. 567. Düss. off. Pfl. VII. 13. *Bert.* Bild. VII. 27. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 204.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Meliloti citrinae) an; es besteht aus einem glatten, ästigen Stängel mit eirunden, sägezähnigen Blättern und langen Trauben gelber Blüthen in den Achseln der obern Blätter. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack bitter und etwas scharf.

Beide Pflanzen sind erweichend.

Sacculus resolvens. (*Bo.*)

℞. Flor. Meliloti pulv. unciam unam.
Camphorae . drachmam unam.
Misce.

Oleum volatile Florum Meliloti (*T.*) Ut oleum florum aurantii.

Oleum Meliloti. (Gal. Sar. *Sw*. T.*)

℞. Florum Meliloti . partem unam.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Infunde leni calore per dies tres, cola et filtra. (*Sw**.)

Sar. Digerere Florum partem unam in Olei duabus in balneo aquae per tres dies, post refrigerationem exprimere et macerationem repetere; — Gal. Macerare soli exposita per tres dies Florum partem unam in Olei quatuor, operationem ternis sequentibus vicibus repetere et tertia vice per menses tres productam; — *T.* Florum partem unam, Olei duodecim, flores siccatos tamen in aqua tepida antea mollefactos.

Aeußerlich gegen Scropheln und erstentstandene Frostbeulen.

Emplastrum Meliloti s. de Meliloto simplex s. Trifolii Meliloti officinalis. (An. B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ful. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O.

Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerae flavae,
Colophonii pulverati,
Olei Olivarum, sing. part. unam.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde
Pulv. Herbae Meliloti partes duas.
Misce bene. (Sax. *Sw.*)

Bor. Fenn. Han. Fol. et Suec. Cerae partes duas, Colophonii unam, Olei unam et duas Meliloti pulverati; — Bor4. HassP. Cerae flavae libram, Colophonii, Olei, sing. semilibram, Meliloti libram; — O. Cerae uncias quatuordecim, Colophonii, Olei, sing. sex, Pulv. Meliloti libram et Extracti Meliloti unciam; — R. Cerae partes tres, Resinae sex, Sevi vervecini quatuor, Olei unam et duodecim Pulv. Meliloti; — An. Cerae partes octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae duas cum dimidia et Pulv. Meliloti quatuor.

℞. Summit. floresc. Meliloti
partes tres.
Sevi hircini . . partes quatuor.
Coque ad humidi consumptionem, cola et adde
Colophonii . . . . . partes sex.
Cerae . . . . . partes tres.
Liqua simul.

His. His3. Summitatum floresc. partes quatuor, Sevi hircini quinque, Colophonii octo et Cerae quatuor (*Emplastrum Meliloti simplex*); — Pul. Summitatum floresc. tres, Sevi duas, Resinae Pini tres et Cerae unam cum dimidia; — *Gr. Re.* Resinae flavae libras octo, Cerae flavae quatuor, Sevi ovilli duas, Meliloti quinque; vel: (*Gr.*) Resinae flavae libras viginti octo, Cerae flavae quatuor, Sevi, Meliloti decem (Veterin.); — *Vm.* Cerae flavae octo, Resinae Pini quatuor, Terebinthinae unam, quatuor Summitatum flor., duodecim horas digestionis et additionem Styracis liquidae partis dimidiae.

℞. Emplastri Plumbi,
Cerae flavae, sing. libram unam.
Olei Olivarum . . uncias sex.
Mixturae fusae ac semirefrig. adde
Pulveris Meliloti . uncias octo.
Misce bene. (Bel.)

B. eandem ipsam formulam sed Pulv. Meliloti libram unam.

℞. Emplastri citrini . sesquilibram.
Olei Olivarum . libram unam.
Resinae Pini . . . libras sex.
Cerae flavae . . . libras tres.
Gummi Ammoniaci uncias quatuor.
Liquatis post semirefrigerationem sensim adde
Pulv. Herb. floresc. Meliloti
libras duas.
— — — Absinthii
libram unam.
Misce. (D.)

DD. Sevi vervecini uncias viginti sex, Resinae Pini triginta sex, Cerae flavae octodecim, Olei Napi sex, G. Ammoniaci duas, Pulv. Meliloti duodecim et Pulv. Absinthii sex; — Hass. et *Pid.* Emplastri citrini sesquilibram, Pulv. Meliloti uncias quinque, Pulv. Rad. Althaeae duas, G. Ammoniaci unam et Terebinthinae Venet. duas; — *Fi.* Olei Olivarum, Flor. Meliloti recent., sing. libras duas, Flor. Meliloti sicc. pulv., Terebinthinae, sing. uncias sex, Sevi vervecini libram, Cerae flavae uncias octo, G. Ammoniaci, Sagapeni, sing. sesquiunciam; flores recentes cum oleo infundantur et post repetitam digestionem lege artis reliqua addantur; — Pm. Pulveris Meliloti uncias sex, Gummi Ammoniaci uncias duas, Terebinthinae uncias tres, Cerae flavae uncias sex, Sevi bovini sesquiunciam, Olei Olivarum libram unam.

℞. Olei Meliloti . . . libras duas.
Sevi hircini . . . libram unam.
Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis adde
Gummi Ammoniaci,
Sagapeni, sing. . sesquiunciam.
Pulveris Meliloti . . uncias sex.
Misce bene. (Sar.)

Li. Emplastri citrini sesquilibram, Pulv. Meliloti uncias sex et unam G. Ammoniaci.

℞. Herb. flor. Meliloti
uncias quatuor.
Florum Absinthii,
— Chamomillae,
Baccarum Lauri,
Seminum Apii, sing. drachmas sex.
Styracis . . . . . semunciam.
Gummi Ammoniaci unciam unam.
Commisce cum mixtura fusa e
Cerae flavae . . . unciis octo.
Sevi hircini . . unciis quatuor.
Terebinthinae,
Resinae Pini, sing. . sesquiuncia.
Olei Chamomillae unciis duabus.
Misce bene. (Br. Pal. Wir.)

℞. Empl. Meliloti simplicis
libras tres.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis blando igne adde
Pulv. Flor. Chamomillae,
— — Meliloti, sing.
uncias tres.
— Rad. Iridis,

Pulv. Rad. Althaeae, sing. unciam unam.
— Croci . . . . semunciam.
— Gummi Ammoniaci,
— Bdellii, sing. . uncias duas.
— Foenu graeci unciam unam.
Misce. (His. His8.) (*Emplastrum M. compositum.*)

Ceratum Meliloti simplex s. Baumei, Unguentum emplasticum. (Fi. T.)

℞. Florum Meliloti,
Cerae flavae, sing. . libras tres.
Sevi bubuli . . libras quatuor.
Resinae Pini . . . . libras sex.
Flores contusi et cum sevo commixti coquantur ad humidi consumptionem, colatis adde resinam et iterum cola, refrigeratis faeces separa, tum liquefac denuo et ceram adde.
T. Florum libras tres, Sevi bubuli libras quatuor, Resinae tres, Cerae sex.

Emplastrum Meliloti camphoratum. (DD.)

℞. Emplastri Meliloti . uncias duas.
Camphorae pulv. drachmam unam.
Misce sedulò.

Melissa.

Unter diesem Namen finden sich in den Pharmacopöen folgende Pflanzen:

1) *Melissa Calaminta, L.*; Bergmünze; Calament de montagne (*Gal.*); Montain balm (*Ang.*); Plana mata, Poleg, Natkowe korenj, Marulka hornj (*B.*); Berg calaminth (*Bel.*).

Br. Fer. Gal. Gen. His. His8. Wir. Wür. *Br. G. Gr. M. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine südeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 166. *Bull.* t. 201. *Plenck* t. 501. *Zorn* Ic. pl. t. 111.)

Man wendet das Kraut (herba Calaminthae s. Calaminthae montanae s. vulgaris s. Menthae Calaminthae s. Calmontanae) an; es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, ebenfalls behaarten, am Grunde fast herzförmigen, gleichgezähnten, fast stumpfen Blättern. Es hat einen starken gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen sehr vermindert und einen scharfen, gewürzhaften Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

2) *Melissa Nepeta, L.*; poleyartige Kalamint; Calament des champs, petit Calament (*Gal.*); Field balm (*Ang.*); Veldkalaminth (*Bel.*).

Gal. Wür. *Gr.*

♃ Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 167.)

Man wendet das Kraut (herba Nepetae s. Calaminthae Pulegii odore s. Calaminthae agrestis) an; es besteht aus einem etwas behaarten Stängel mit fast rundlichen und glatten, an jedem Rande mit zwei oder drei ungleichen Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen gewürzhaften Geruch und Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

3) *Melissa officinalis, L.*; Melisse, Melissenkraut, Citronenmelisse, Citronenkraut; Mélisse officinale (*Gal.*); Common balm (*Ang.*); Bucklilulfaristum (*Ar.*); Melissa, Medunka (*B.*); Hiertenfryd (*D.*); Mekka subza (*Duk.*); Torongil (*His.*); Melissa officinale, Erba Cedronella (*I.*); Citronenkruid (*Bel.*); Badrunjbuyeh (*P.*); Melisse cytrynowa (*Pol.*); Herva cidreira (*Lus.*); Citron meliss (*Suec.*); Parsi cunjamkoray (*Tam.*).

A. Ams. An. B. Ba Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP His. His8. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.* Z.

♃ Eine im mittägigen Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VI. 32. *Blackw.* t. 27. *Plenck* t. 500. *Zorn* Ic. pl. t. 134.)

Man wendet das Kraut (herba Melissae citrinae s. citratae s. hortensis s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierseitigen, ästigen, fast glatten Stängel mit gestielten, eirunden, am Grunde schwach ausgerandeten, am Rande gekerbten Blättern. Es hat einen angenehmen, citronenartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

4) *Dracocephalum Moldavicum, L.*; Türkische Melisse; Melisse de Moldavie, Moldavique (*Gal.*); Moldavian mint (*Ang.*).

Br. Gal. Li. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

⊙ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in der Moldau und in Sibirien wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 294.)

Man wendet das Kraut (herba Melissae turcicae s. Cedronellae) an; es besteht aus einem vierkantigen, glatten, ästigen Stängel mit eirundlanzettigen, fast glatten, gekerbten Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch.

Beide letztere Pflanzen sind reizend und werden zu den krampfstillenden Mitteln gezählt.

Species pro thea. (HassP. *Huf.*)

℞. Herbae Melissae unciam unam.
Foeniculi . . . drachmas tres.

Liquiritiae . . drachmas duas.
Concisa misce.

Conserva Melissae. (R. *Fi. T.*)

℞. Fol. Melissae rec. contus part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Misce exacte et in loco frigido serva. *Fi.* ut conservam cochleariae; — *T.* Foliorum et Sacchari, sing. pond. aequale, contunde et pulpam per crinium trajice, quae cum libris duabus Sacchari in Aquae dimidio pondere soluti et coquendo vaporati commisceatur.

Cataplasma aromaticum. (GalM. *Br.*)

℞. Herbae Melissae . . uncias sex.
Florum Chamomillae uncias tres.
Baccarum Juniperi uncias quatuor.
Coque in
Aquae Vitae sufficiente quantitate ad pastae mollis consistentiam. (*Br.*)
GalM. coquere Farinae Hordei et Cerealis, sing. partes centum in Vini rubri centum, sub finem addendo Pulv. aromatici partem tertiam.

Extractum Melissae. (Fer. Sar.)

℞. Herbae Melissae . partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Coque, cola exprimendo, colaturam Albumine clarifica et probe inspissa. (Fer.)
℞. Herb. Melissae rec. et cont. libras octo.
Digere in alembico per tres dies, destillatione in balneo aquae deinde uncias duas circiter extrahe, residuo Aquae triplum infunde, coctione trientes duos consume et liquorem clarif. et colatum vaporando ad electuarii consist. redige eique tepido aquam destillatam adde. (Sar.)

Infusum Melissae. (GalM. *Ra. Va.*)

℞. Foliorum Melissae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra. Va.*)
℞. Herbae siccae Melissae,
Liquiritiae rasae, sing. drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis . . . . q. s. ut colaturae libras duas obtineas. (GalM.)
Gewürzhaft, schwach reizend, bei nicht entzündlichen Kolicken und Verdauungsbeschwerden von Magenschwäche empfohlen.

Tisana carminativa. (*Ca.*)

℞. Foliorum Melissae drachmas duas.
Anisi,
Foeniculi,
Coriandri, sing. . semidrachmam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et adde
Sacchari albi . . . . . q. s.

Syrupus Melissae. (Wir.)

℞. Fol. sicc. Melissae uncias quatuor.
Aquae dest. Melissae libram unam.
Digere in vase tecto per dies duos, exprime et adde
Sacchari albi. . uncias sedecim.
Ebulliant semel.

Essentia Melissae composita. (*Vm.*)

℞. Foliorum Melissae . partes duas.
— Rutae,
— Pulegii,
Cort. Citri rec., sing. partem unam cum dimidia.
Cinnamomi . . . partem unam.
Spir. Melissae part. viginti quatuor.
Infunde frigidè per plures dies, cola exprimendo et filtra.

Tinctura Melissae. (An. *Vm.*)

℞. Herbae Melissae . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Post tres dies infusionis filtra. — Reizend.

Oleum Melissae aethereum, Aethereoleum Melissae. (Br. Fer. Han. Pal. R. Wir. Wür. *Gr. Pid. Re. Sw*)

℞. Herbae Melissae recentis q. vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillent et oleum servetur. (Fer. R.)
Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — Han. octo Aquae.
℞ Herb. Melissae rec. part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Pal. Wir. *Pid.*)
℞. Herbae Melissae recentis . q. vis.
Aquae destillatae Melissae . q. s.
Destillent. (Wür.)

Aqua Melissae s. ex Melissa (simplex et cohobata). (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Wir. WW. *Br. Fi. Gr. Pid. T. Vm.*)

℞. Herb. Melissae rec. partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor infusionis destillent partes decem. (Ams. Bor. O. Pal.)
Bor4. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillando libras viginti elice; —

HassP. Melissae libras tres, Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — D. et GalF. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes viginti; — Han. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes tres; — Gen. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes sex; — Gal. Pal. *Fi. T.* Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Pm. Herbae libras duodecim, Aquae libras quadraginta octo, destillent librae duodecim (*Aqua simplex*); — Herbae libras viginti quinque, Aquae quinquaginta, educantur librae sex (*Aqua cohobata*); — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* Aquae sex, destillent trientes duo; — Hass. et *Pid.* octo Aquae; destillet dimidia pars; — A. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba. Aquae sedecim; destillet quarta pars.

℞. Herb. Melissae rec. partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars atque destillatio repetatur supra novam Herbam. (Sar.)

℞. Herb. Melissae rec. . partes tres.
Sacculo e tela confecto inclusam medio cucurbitae suspende continentis
Aquae . . . partes duodecim ita ut liquidum attingere non possit; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Herb. Melissae flor. partem unam.
Vini albi . . . partes quatuor.
Destillet pars dimidia. (Br. Wir.)

Vm. Herbae floresc. partes decem, Aquae Vitae dimidiam et Aquae centum; destillent partes quadraginta.

Aqua Melissae spirituosa. (Li.)

℞. Aquae dest. Melissae partes duas.
Essentiae Melissae partem unam.
Misce.

Aqua Melissae antihysterica. (Wir.)

℞. Fol. Melissae rec. . libram unam.
Baccarum Lauri,
Sem. Cumini, sing. unciam unam.
Myrrhae . . . . . semunciam.
Castorei . . . drachmas duas.
Vini albi generosi libras duodecim.
Post sufficientem digestionem destillet dimidia pars.

Spiritus Melissae. (An. Br. Ful. Gal. Li. LP. Lus. Pal R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Gr. Pid. Re. T. Vm.*)

℞. Herbae Melissae . partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillet spiritus (28°) indicans. (An.)

Vm. Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — LP. Herbae uncias sedecim, Spiritus Vini libras quatuor, Aquae unam, infunde per triduum et destillando perge donec nullus amplius prodeat spiritus.

℞. Herbae Melissae . partem unam.
Aquae Melissae . . partes duas.
Alcoholis . . . . partes octo.
Post horarum viginti quatuor macerationem destillent partes sex. (R.)

Gal. Herbae, Aquae Melissae, sing. partes duodecim et Alcoholis (22°) triginta sex; destillent partes triginta.

℞. Herb. Melissae
part. unam c. dimidia.
Aquae Vitae . . partes decem.
Post horas duodecim destillet dimidia pars. (Lus.)

Br. Pal. Sax. Wir. et *Pid.* Herbae partem unam et quatuor Aquae Vitae; — Ful. et Li. sex Aquae Vitae; — *Gr. Re.* Summitatum libram, Aquae Vitae congium; — *T.* Melissae libras duas, Spiritus Vini 32° B. libras octo; destillando libras quinque circiter elice.

℞. Herb. Melissae rec. partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post viginti quatuor horarum digestionem destillent in balneo aquae ferè ad siccum; productum cum nova herba digere et destillationi subjice. (Sar.)

Wür. Herbae sesquilibram et sex Alcoholis; destillent iterum supra Herbae uncias tres.

Aqua aromatica, Spiritus aromaticus s. Melissae magistralis officinalis, Alcohol Melissae s. cum Melissa compositus, Aqua Melissae composita s. Carmelitana s. Carmelitarum s. Melissae spirituosa composita, Spiritus Melissae compositus. (A. Ams. B. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. His3. LH. LP. Lus. Pal. Pm. Sar. Wir. *Br. Ca. Fi. Gr. Huf. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Herb. Melissae rec. sesquilibram.
Cort. Citri rec. . uncias quatuor.
Nucis moschatae,
Coriandri, sing. . . uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyll., sing. unciam unam.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Aquae Melissae . . . libras tres.
Post dierum trium digestionem destillent librae sex. (Br. D. Sar. Wir.)

℞. Herbae Melissae uncias duodecim.
Corticis Citri . . . uncias duas.
Nucis moschatae . unciam unam.
Coriandri . . . uncias quatuor.

Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. . unciam unam.
Radicis Angelicae . semunciam.
Alcoholis uncias sexaginta quatuor.
Infunde per aliquot dies et destillando uncias octoginta octo elice. (Fer. *Sp.*)

Gr. Re. Fol. Meliss. sicc. uncias quatuor, Cort. Limon. sicc. duas, Nuc. mosch., Coriand., sing. unam, Caryophyll., Cinnam., Rad. Angel. opt., sing. drachmas quatuor, Spir. rectif., Aquae Vitae, sing. libras duas. — Han. Melissae uncias octodecim, Cort. Citri quatuor, Nucis mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cinnamomi, sing. unam, Alcoholis libras sex, Aquae Melissae tres et tres dies digestionis; destillent librae septem; — *Br.* Melissae libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Nucis mosch. duas, Coriandri octo, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. semunciam, Alcoholis centum viginti et tres digestionis dies; destillent in balneo aquae unciae centum viginti; — *Fi.* Melissae, Cort. Limonum, Nucis mosch., Coriandri, easdem quantitates ut *Br.* sed Alcoholis libras duodecim, Cinnamomi, Caryophyllorum, Rad. Angelicae, sing. unciam, Aquae libras tres et post trium dierum digestionem, destillationem librarum decem; — Ful. Melissae uncias sedecim, Cort. Citri quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Vini albi libras octo et viginti quatuor horas digestionis; destillent librae quatuor; — Lus. Melissae libras duas, Cort. Citri uncias quatuor, Cinnamomi duas, Nucis mosch. unam, Caryophyllorum drachmas duas, Aquae Vitae libras decem et tres dies macerationis; destillent librae quinque; — LH. Omnium easdem quantitates sed Alcoholis 25° libras quinque, macerationem per triduum, Aquae libras quinque et destillationem quinque librarum. — Pm. Flavedinis Citri recentis uncias duas, Nucis moschatae, Coriandri, singulorum unciam unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, Angelicae, singulorum semunciam, Alcoholis 36° libras duas, Aquae Melissae cohobatae uncias quindecim, infusis per diem, destillationem fere ad siccitatem urge; — HassP. Melissae recentis libras duas, Cort. Citri rec. uncias quatuor, Nucum mosch., Rad. Angelicae, sing. tres, Caryophyllorum, Cassiae cinnamomeae, sing. unam, Spiritus Vini rectif. libras sex, Aquae Melissae tres; post trium dierum macerationem destillent librae septem; — Ams. B. et Bel. Melissae uncias quatuor, Cort. Citri, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Caryophyllorum, Cinnamomi, sing. semunciam, Aquae Vitae libras quinque et tres dies digestionis; destillent librae tres; — His. His3. Melissae uncias octo, Cort. Citri, Cort. Aurantii, sing. uncias duas, Nucis mosch., Coriandri, sing. unam, Cinnamomi semunciam, Aquae Vitae libras quatuor et macerationis horas viginti quatuor (viginti His3.); destillet dimidia pars; — *Sw.* Nucis mosch. unciam unam, Coriandri quatuor, Cinnamomi, Rad. Angelicae, sing. sesquiunciam, Caryophyllorum unam, Cort. Citri duas, Aquae Melissae libras duas, Alcoholis libras quatuor et octo dies digestionis; destillent; — A. Melissae libras duas, Cort. Fructuum Citri decem, Radicis Angelicae, Cinnamomi, sing. uncias tres, Coriandri sex, Alcoholis (0,910) libras undecim et Aquae font. sex; destillent librae decem.

LP. Melissae recentis libras tres, Baccarum Juniperi uncias quinque, Corticis Limonis quatuor, Cinnamomi optimi sex, Nucis moschatae duas, Caryophyllorum dimidiam, Spiritus Vini libras duodecim, Aquae communis quatuor, macerationem per quatriduum.

℞. Herbae Melissae,
— Menthae piperitae,
— Salviae,
— Rorismarini,
Florum Lavandulae,
Foeniculi, sing. . . uncias tres.
Radicis Angelicae . uncias duas.
— Calami . uncias quatuor.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae . sufficientem quantitatem.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent librae duodecim. (B*. *Huf.*)

℞. Flor. Rosarum rubrarum,
— Rorismar., sing. uncias quatuor.
— Lavandulae,
— Lilior. Convall., sing. manip. tres.
Herb. Majoranae,
— Melissae, sing. manip. unum.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Macidis,
Cubebarum, sing. . unciam unam.
Cinnamomi . . . . uncias duas.
Spir. Cerasorum nigr. octarios sex.
Post decem dies digestionis destillent. (Pal.)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,

Nucis moschatae,
Anisi,
Coriandri, sing. . partem unam.
Hyssopi,
Majoranae,
Rorismarini,
Salviae,
Thymi, singulorum . partes duas.
Corticis Citri recentis,
Rad. Angelicae, sing.
partes quatuor.
Melissae recentis partes duodecim.
Aquae Vitae partes centum nonaginta duas.
— purae . partes quingentas septuaginta sex.
Destillent partes centum viginti octo. (*Vm.*)

℞. 1) Melissae . . . partes viginti.
Angelicae . . partes quinque.
Alcoholis (22°)
partes ducentas quinquaginta.
2) Cinnamomi . partes quinque.
Caryophyllorum,
Nucis mosch, sing partes tres.
Alcoholis (22°)
partes centum et decem.
3) Anisi . . . . . partes duas.
Coriandri . . partes quinque.
Cort. Citri sicc partem unam.
Alcoholis (22°) partes octoginta.
4) Rorismarini,
Majoranae,
Hyssopi,
Thymi, sing. . . partes duas.
Salviae . . . partes quatuor.
Alcoholis (22°)
partes centum viginti.
Destillent seorsim in aquae balneo, tunc productis quatuor commixtis adde Aquae ponderis totius mixturae partem decimam et in balneo aquae destillatione quatuor partes quintas elice. (GalM)

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum integrorum,
Nucis moschatae,
Anisi,
Coryandri,
Cort. sicc. Citri, sing.
partem unam.
Alcoholis (22°) . . partes mille.
Macera harum substantiarum quamque seorsim per dies duos vel tres in Alcoholis partibus nonaginta sex; destillent deinde in balneo aquae et quodque productum seorsim excipe. Praeterea per duos dies in Alcoholis eadem ipsa quantitate infunde et quamque seorsim destillationi subjice
Herb. Angelicae integrae,
— flor. Rorismarini,
— — Majoranae,
— — Hyssopi,
— — Thymi,
— — Salviae, sing.
partem unam.
Macera praeterea et destillationi subjice
Fol. Melissae rec. . partem unam.
Recipe deinde urceolos tres, quorum primo infundas
Spir. Cinnamomi,
— Coriandri, sing.
part. tres c. dimid.
— Caryophyllorum,
— Nucis mosch., sing.
partes tres.
— Anisi . . . . partes duas.
— Cort. Citri partem quartam, secundo
Spir. Angelicae partes decem.
— Rorismarini . . partes sex.
— Majoranae,
— Thymi, sing. partes septem.
— Hyssopi . . . partes octo.
— Salviae . partes quindecim cum dimidia.
Spiritu Melissae solo tertio urceolo intromisso, commisce contenti urceoli primi partes quinque, quinque secundi et quinque cum dimidia tertii, omnia retortae infunde, adde totius partem decimam Aquae fontanae et Sacchari pulverati partem octogesimam, et destillationem ad quintae partis remanentiam continua, quod in excipulum transiit excipiendo. (Gal. *Ca.*)

T. Aquarum spirit. Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucum mosch., Coriandri, Anisi, Citri, sing. uncias quatuor, lagenae immissas Aquae spirit. Angelicae, Rorismarini, Majoranae, Hyssopi, Thymi, Salviae alii lagenae ingestas; in retortam vitream amplam tubulatam intromissis (singulis 30° B. indicantibus) infunde Aquae spirit. simpl. Melissae libras duas, addendo Aquae pluv. vel dest. uncias duodecim et Sacchari albi raffinati duas; destillent libras quinque cum dimidia; in lagenis smiri obturatis per tempus aliquot in mixtura e glacie contusa et sale communi immersa tene *).; — *Gr. Re.* Spir. Meliss. octarios octo, Spir. Cort. Citri quatuor, Spir. Nucis mosch., Spir. Co-

*) Das Eintauchen in eine kältende Mischung ist nämlich das wirksamste Mittel, den brenzlichen Geruch schnell zu benehmen. (*T*)

riand., sing. duos, Spir. Rorism., Sp. Thymi, Spir. Anisi., Sp. Anis. virid., Sp. Major., Spir. Hyssop., Sp. Salv., Sp. Rad. Angel., Sp. Caryoph. arom., sing. unum, misce, destillationi sub jice et per annum in cava glacie repleta serva.

Vegetable extract (Gr.): Spir. rectif. sesquilibram, Mellis uncias quatuor, Ess. Bergam. drachmas duas, Aq. Carmelit. libram.

Aqua dentifricia. (Pic.)

℞. Alcoholis . . . uncias viginti.
Spiritus Cinnamomi,
— Lavandulae,
— Citri,
Aquae Meliss. comp., sing. drachm. quinque.

Misce.

Acetum odoratum s. bezoardicum s. odoriferum s. aromaticum. (B*. Br. Ful.)

℞. Herbae Levistici . uncias duas.
Fol. Melissae,
— Rutae, sing. uncias quatuor.
Jugland. virid. concis. libras duas.
Fruct. Citri rec. contus. libram unam.
Aceti . . . . . libras decem.

Post horas duodecim digestionis destillent ferè ad siccum. (Br.)

℞. Aceti . . . . . uncias duas.
Spiritus Melissae . . semunciam.
Olei ess. Citri,
— — Lavand., sing. guttas decem.
— — Caryophyll. guttas quatuor.

Misce. (B. Ful.)

Melittis.

Melittis Melissophyllum, L.; Wanzenmelisse; Melitte à feuilles de mélisse (*Gal.*); Bastard balm (*Ang.*); Vild hiertens fryd (*D.*); Melissebladig kruisbloem (*Bel.*).

Gal. Wir. Wür. *Gr. M. Sp.*

(Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Jacq.* Fl. Aust. t. 26.)

Man wendet das Kraut (herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissae humilis s. Fuchsii) an; es besteht aus einem vierseitigen, behaarten Stängel mit gestielten, eirunblänglichen, spitzigen, gekerbten Blättern. Es hat einen unangenehmen, bei'm Trocknen angenehm gewürzhaft werdenden Geruch und einen etwas bittern Geschmack.

Reizend, ehedem als Gries abführendes und die Regeln treibendes Mittel betrachtet.

Meloë.

In der Medicin benutzt man:

1) *Meloë majalis, Oliv.;* Maikäfer, Maiwurm; Meloë de mai (*Gal.*); Oil beetle (*Ang.*); Oliebille (*D.*); Carralejas, Aradejos (*His.*); Meyworm (*Bel.*); Majbagge (*Suec.*).

Fer. Ful. Han. Sax. Wir. *Br. G. Gr.*

Ein zu der Abtheilung der Heteromeren (Trachelides Cantharidiae, *Lat.*) gehöriger, in Europa gemeiner Käfer. (*Leach* Trans. Soc. Linn XI. VI 1 2. *Panz.* X. 13.) Der Körper ist bronzirt und kupferroth.

In Schweden mit Erfolg gegen Rheumatism.

2) *Meloë Proscarabaeus, L.;* Meloë proscarabée. (*Gal.*)

Br. D. Fer. Ful. Han. His. His3. R. Sax. Wir. *G. Gr. Sp.*

Ein Insect (Vermis majalis s. Scarabaeus unctuarius), (*Leach.* l. c. VII. 6. 7. *Panz.* X. 12) von violettschwarzer Farbe, chagrinartig und glänzend.

Electuarium antilyssicum s. ad rabiem. (B*. Ful. Wir.)

℞. Meloas absque capitibus no. 24.
Theriacae . . . . uncias duas.
Ligni Taxi . . drachmas duas.
Rad. Serpent. Virg. drach. unam.
Fungi querni . . grana viginti.
Mellis in quo insecta sunt suffocata . . . quantum sufficit.

Fiat electuarium. (Wir.)

℞. Meloën . . . . . no. 1.
Mellis in cujus libra una insecta octoginta sunt suffocata . q. s. ut fiat pulpa.
Theriacae . . grana quadraginta.
Olei Meloum infusi . guttas sex.
Ligni Ebeni parvam quantitatem.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Misce. (B*.)

Dieses von Friedrich II. erkaufte Geheimmittel genoß nur bis zum Jahr 1782 einigen Ruhm als gegen die Wuth wirksam.

Sp's Oleum Scarabaeorum. Scarabaeorum stercor. uncias octo, Olei Lauri sedecim, coque ad humidi usque consumptionem — wird für nervenstärkend und auflösend gehalten.

Potio antilyssica s. ad rabiem. (B*. *Au.*)

℞. Meloas . . . . . no. 8.
Theriacae Andromach. semunciam.
Salis Cornu Cervi drachmas duas.
Camphorae . . drachmam unam.
Spiritus Mindereri . uncias octo.

Von Selle empfohlen.

Mentha.

Folgende Arten werden angezeigt:

1) *Mentha gentilis*, *L.*; Gartenmünze, Gartenbalſam; Menthe apparente, Baume des jardins (*Gal.*).

Gal. *Be. G. Gr. Re. Sp.*

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 736. *Schk.* t. 158.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae Balsaminae) an; es beſteht aus einem etwas behaarten, ſehr äſtigen Stängel mit eirunden, geſtielten und gezähnten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen etwas ſcharfen und bittern Geſchmack.

2) *Mentha aquatica*, *L.*; Waſſermünze, Bachmünze; Menthe aquatique (*Gal.*); Watermint (*Ang.*); Czerwena mata (*B.*); Hestermynte (*D.*); Yerba buena dos rios (*His*); Watermint (*Bel.*); Menta acquatica (*I.*).

A. Fer. Gal. GalM. WW. *G. Gr. Sp.* Z

4 Eine Pflanze Europa's. (*Blackw.* Herba. t 32.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae aquaticae s. rubrae s. Balsami palustris, Sisymbrium sylvestre) an; es beſteht aus glatten Stängeln mit ebenfalls glatten, geſtielten, eirundherzförmigen, gezähnten Blättern. Der Geruch iſt nicht ſehr angenehm, aber ſtark, der Geſchmack bitter und etwas ſcharf.

3) *Mentha arvensis*, *L.*; Ackermünze; Menthe des champs, Poul ot thym (*Gal.*); Corn mint (*Ang.*).

Gal. *Gr.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 512.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae equinae s sylvestris, Calamintha aquatica) an: es beſteht aus einem viereckigen, ſchwachen, äſtigen Stängel mit gegenüberſtehenden, eirunden, ſpitzigen, geſtielten, ſtumpfzähnigen, graulichen Blättern. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern, etwas ſcharfen Geſchmack.

4) *Mentha crispa*, *L.*; Krauſemünze, Blumenkopfkrauſemünze; Menthe crépue (*Gal.*); Curled leaved mint (*Ang.*); Kaderawa mata, Kolssam zahradny (*B.*); Krusemynte (*D.*); Menta rizada (*His.*); Kruizenmunt (*Bel.*); Menta crispa (*I.*); Faka (*Jap.*); Fodor mentha (*M.*); Mienta kedzierzawa (*Pol.*); Hortela vulgar (*Lus.*); Miata (*R.*); Krusmynta (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. LH. Li. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp Va. Z.*

4 Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 290. *Plenck* t. 467. Fl. méd t. 232.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae crispae) an; es beſteht aus filzigen Stängeln, mit eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, ungleich großgezähnten Blättern. Der Geruch iſt ſtark, balſamiſch, eigenthümlich und nicht angenehm; der Geſchmack brennend, gewürzhaft und etwas bitter.

5) *Mentha sativa*, *L.*; zahme Münze, Frauenmünze; Menthe cultivée (*Gal.*); Nana, Hibbuk (*Ar.*); Pudina (*Duk. Pe.*); Menta romana (*I.*); Widdatilam (*Tam.*).

Du. His. His3. *A. Gr. Par. Re.*

4 Eine Europäiſche Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan t. 794.)

Man gebraucht das Kraut (herba Menthae verticillatae s. crispae verticillatae); es beſteht aus einem einfachen oder nur wenig äſtigen, glatten Stängel mit eirunden, ſpitzigen, gezähnten, geſtielten Blättern. Geruch und Geſchmack ähneln dem der Krauſemünze.

6) *Mentha rotundifolia*, *L.*; rundblättrige Münze; Menthe à feuilles rondes, Baume sauvage (*Gal.*); Mastranzo (*His.*).

Gal. His. His3. *Gr.*

4 Eine Europäiſche Pflanze.

Man benutzt das Kraut (herba Menthae sylvestris folio rotundiore); es beſteht aus einem filzigen Stängel mit ſitzenden eirunden oder rundlichen, oben runzligen, unten weißfilzigen, gezähnten Blättern. Es hat einen ſtarken und angenehmen Geruch.

7) *Mentha piperita*, *L.*; Pfeffermünze; Menthe poivrée (*Gal.*); Peppermint (*Ang.*); Peprowa mata (*B.*); Pebermynte (*D.*); Verbabuena de sapor de pimenta (*His.*); Peperminte (*Bel.*); Mienta pieprzna (*Pol.*); Hortela apimentada o pimenta (*Lus.*); Peparmynta (*Suec.*)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH Li. Lon. LonN. LP. Lus O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par Pid. Re. Sp. Va. Z.*

4 Eine in ganz Europa verbreitete, wahrſcheinlich aber urſprünglich in England einheimiſche Pflanze. (*Blackw.* t 291. *Plenck* t. 468. *Bert.* Bild. IV. 42. f. 2. Fl. méd. t. 233.)

Das Kraut (herba Menthae piperitae s. piperitidis s. Piperis sapore) beſteht aus einem äſtigen, etwas behaarten Stängel mit geſtielten, eirunden, ſpitzigen oder

lanzettigen, gezähnten, glatten, oben dunkelgrünen Blättern. Es hat einen gewürzhaften, durchdringenden, sehr angenehmen Geruch und einen balsamischen, beißenden, brennenden, kampherartigen Geschmack, und läßt dabei zugleich ein Gefühl von Kälte im Munde zurück.

8) *Mentha sylvestris, L.*: Roßmünze; Menthe sauvage (*Gal.*); Hortela brava (*Lus.*).

Gal. LP. *Be. G Gr. M. Sp*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl t. 354.)

Man wendet das Kraut (herba Menthae sylvestris s. longifoliae, Menthastrum) an; es ist filzig und hat einen mit sitzenden, länglichen, lanzettigen, ungleich gezähnten, weißlichen Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr stark und angenehm, der Geschmack bitter.

9) *Mentha viridis, L.*; grüne Münze; Menthe verde, Baume vert (*Gal.*).

Am. Fer. Gen. Lon. LonN. Sax. *B. C. Fi. G. Gr. Re. Va*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 290.)

Man gebraucht das blühende Kraut (herba et flores Menthastri). Es besteht aus einem glatten Stängel mit lanzettigen, sitzenden, weitgezähnten Blättern und purpurrothen, wirtelförmig stehenden, eine lange, endständige Aehre bildenden Blüthen. Der Geruch ist angenehm und gewürzhaft

Gr. führt außerdem noch Mentha odorata an.

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger reizend; die wirksamste unter allen ist die Pfeffermünze. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Species cephalicae s. nervinae externae. (HassP. Li.)

℞. Herbae Menthae crispae,
— Majoranae,
— Origani,
— Serpylli, sing. . uncias tres.
Florum Chamomillae,
— Lavandulae,
Baccarum Lauri,
— Juniperi,
Seminum Carvi, sing. sesquiunciam.

HassP. Herbae Menthae pip., Majoranae, Rorismarini, Serpylli, Flor Lavandulae, sing. uncias duas, Caryophyllorum, Cubebarum, sing. unam.

Conserva Menthae s. Foliorum Menthae sativae, crispae, piperitae et viridis. (Ams. An. B. Bel. Ful. Gen. LP. Lus. Pal. R. Sax. Wir. Wür. *Fi. Gr. Sw. T. Vm.*)

℞. Fol. Menthae rec. contus. part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere et in loco frigido serva. (B. Bel. Ful. Lus. Pal. R. Wir. Wür. *Sw.*)

Ams. Gen. LP. *Gr.* Menthae partem unam et tres Sacchari; — Sar. Sing. partes aeq.

℞. Herb. Menthae rec. partem unam.
Sacchari . . . . . partes duas.
Contunde herbam, pulpam cum saccharo contere et in balneo aquae calefac ad solutionem sacchari usque. (*Vm.*)

T. ut conservam melissae.

℞. Fol. Menthae pulv. drach. unam.
Sacchari albi drachmas quinque.
Aquae purae . . drachmas duas.
Misce. (*Au.*)

℞. Menthae . . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras tres.
Menthâ cum sacchari libra una in mortario contusâ, pulpam per cribrum trajice et cum reliquo saccharo ad mellis consistentiam cocto et adhuc tepido commisce. (*Fi.*)

Sacculus aromaticus. (*Au.*)

℞. Florum Chamomillae Romanae,
Menthae crispae,
Rutae,
Calami, singulorum . uncias tres.
Camphorae . . . drachmas sex.
Fiat pulvis grossiusculus. — Mit warmem Branntwein befeuchtet, auf den Kopf aufzuschlagen.

Infusum Menthae. (DD. Du. GalM. RC. *Ra. Re.*)

℞. Herbae Menthae pip. vel aqu. sicc., Liquiritiae rasae, sing. semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius unus (litre) obtineatur; cola. (GalM.)

℞. Foliorum Menthae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde. (*Ra.*)

DD. Menthae drachmam et Aquae uncias duodecim; — RC. Menthae unciam, Aquae bull. libram; stent per horam in vase clauso, tunc colentur; interdum adduntur Aetheris sulph. alcohol. drachmae duae vel Tincturae arom. vel Calami semuncia; — *Re.* Fol. sicc. uncias (drachmas?) duas, Aq. q. s. ut colat. unciis sex aequeat.

Schwach reizend, in Fällen, wo man etwas reizend auf den Magen einwirken will, auch bei sogenannten nervösen Coliken empfohlen.

Infusum Menthae s. Menthae compositum. (B*. Du. *C. Gr. Re. Va.*)

℞. Fol. Menthae comm. (sat.) sicc. drachmas duas.
Aquae bullientis quantum sufficit ut unciae sex colaturae obtineantur; digere per semihoram in vase tecto, post refrigerat. cola et colatur. adde

Sacchari albi . drachmas duas.
Ol. Menth. comm. (sat.)
guttas tres.
Tinct. Cardamomi comp.
semunciam.
Misce. — Ein ſehr angenehmes magenſtärkendes und die Ausdünſtung beförderndes Mittel. — Gabe, einen bis zwei Löffel.

℞. Menthae viridis exsiccatae
sesquiunciam.
Petalorum Rosae Gallicae
sesquidrachmam.
Aquae ferventis . . . octarium.
Acidi sulphurici . . drachmam.
Infunde, exprime liquorem et adde
Acidi sulphurici . . drachmam.
Sacchari purificati sesquiunciam.
Ein kräftiges antiemeticum. (*Sprague. Gr.*)

Syrupus Menthae s. Menthae crispae. (Ams. An. B. Bor4. Br. Gal. Han. His. His3. Pal. Sar. Wir *T.*)

℞. Fol. Menthae crisp. sicc.
uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Infunde et colaturae adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Syrupum cola. (His. His3. Sar.)
Han. infundere Menthae uncias octo in Aquae libris tribus et in colatura unciarum viginti solvere Sacchari libras quatuor; — Bor4. Menthae uncias duas, Aquae ferv. q. s. et ad colaturam unciarum tredecim Sacchari albi libras duas.

℞. Fol. Menthae crisp. sicc. unciam.
Aquae Menthae crisp. libras duas.
Digere in balneo aquae per duas horas in vase tecto; cola, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Liqua in balneo aquae. (Gal. *T.*)
Br. et Wir. Menthae uncias quatuor, Aquae dest. libram, duos dies digestionis et Sacchari uncias sedecim ut fiat brevi coctione syrupus.

℞. Succi Menthae crisp. seposit. depur.,
Sacchari albi, sing. . libras tres.
Coque. (Pal.)
Sar. Loco sacchari Syrupum commun.

℞. Herbae Menthae sicc. semilibram.
Aquae purae . . libras quinque.
Macera per horas duodecim, tunc destillando liquidi uncias quatuor elice, in quibus Sacchari unciae octo solvantur. Residuo expresso et colato adde
Sacchari albi
libr. duas et unc. quatuor.
Coque ad consistentiam requisitam et syrupos refrigeratos commisce. (Ams.)

℞. Summit. Menthae floresc. sicc.
unc. quatuor.
Aquae . . . . . libras tres.
Infunde in vase tecto per horas duodecim, cola leviter exprimendo, sepone, filtra et adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Clarificata ad requisitam consistent. evaporent; syrupo refrigerato adde alium ex
Aquae Menthae crispae libra una.
Sacchari albi . . unciis viginti.
Serva. (An.)
B. infundere Herbae sicc. uncias quatuor in Aquae libris quatuor per horas 24, destillando deinde elicere liquidi uncias tres et in illo solvere Sacchari uncias sex, residuum exprimere, colaturae addere Sacchari libras duas cum dimidia, leni calore syrupum parare et refrigeratum cum praecedente commiscere.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus Menthae piperitae s. piperitidis s. de Mentha piperita. (B. Bel. Gal. GalH. *Fi. T.*)

℞. Summ sicc Menthae pip. unciam.
Aquae dest. Menthae pip.
libras duas.
Digere in bal. aq. per horas 24 in vase tecto; cola, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Dissolve in bal. aq. et post refrigerationem per pannum cola. (Gal. *T.*)
Fi. infundere per horas duas, caeterum ut Gal.; — GalH. Infusionis partem unam cum tribus Sacchari communis antea ad globulum usque coctis.

℞. Summ. Menthae pip.
uncias quatuor.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Digere in vase clauso per tres dies, exprime et sepositione depuratis atque colatis adde
Aquae Menthae pip. sesquilibram.
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat leni calore syrupus. (Bel.)

℞. Herb. Menthae pip. sicc.
unc. quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Digere in vase tecto per horas 24, destillatione liquidi uncias tres elice, cum quibus et cum
Sacchari . . . . . unciis sex
leni calore syrupum para. Residuo expresso colaturae adde
Sacchari albi libras duas c. dim.
Fiat syrupus, qui refrigeratus cum praecedenti commisceatur. (B.)

Syrupus Menthae viridis. (*Fi.*)
Ut syrupus menthae pip. paratur.

Syrupus Menthae piperitae vinosus. (*Vm.*)

℞. Aq. Menthae pip. vinos.
part. quinque.

Sacchari albi . . partes novem.
Liqua in balneo aquae tepido et in vase tecto.

Tinctura s. Essentia Menthae piperitae. (Am. An. Br. HassP. *C.*)

℞. Herb. Menthae pip. partem unam.
Alcoholis (20°) . . partes octo.
Post tres dies macerationis filtra. (An.)

HassP. Easdem ut An. Summitatum et Spiritus quant., calore 24 ad 30° per dies sex digerere, tincturam refrigeratam exprimere et filtrare per chartam bib.; habeat pondus unciarum viginti.

℞. Summ. flor. Menthae pip.
uncias quatuor.
Spiritus Vini rectificati libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturam infunde
Herb. Menthae pip. flor.
unc. duabus.
Digere iterum per aliquot tempus, cola exprimendo et filtra. (Br.)

℞. Olei Menthae pip. drachmas duas.
Alcoholis . . . octarium unum.
Post tres dies digestionis filtra. — Reizend.

Tinctura Menthae viridis. (Am. *C.*)

℞. Olei Menthae vir. drachmas duas.
Alcoholis . . . octarium unum.
Dissolve. — Reizend.

Oleum Menthae infusum. (Br. O. Sar. Sax. Wir. *T.*)

℞. Herbae Menthae . partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.
Post aliquot dies digestionis exprime. (Sax.)

T. Summit. uncias quindecim, Olei Oliv. libras quinque macerare solis calore per 3 vel 4 dies, filtrare, exprimere et oleo filtrato aliam similem Summitatum quant. addendo, operationem bis repetere, supremo per mensem macerationem protrahendo etc.

℞. Herbae Menthae partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere per dies quatuor in loco calido, exprime, operationem cum nova Herba repete et filtra. (O.)

Sar. Herbae part. unam et duas Olei.

℞. Herbae Menthae,
Olei Olivarum, sing. part. aequales
Coque lente ad humidi consumptionem et exprime. (Br. Wir.)
Magenſtärkend, blähungtreibend.

Oleum Menthae aethereum s. destillatum, Aethereoleum Menthae.

℞. Herbae Menthae recentis q. vis.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Destillando oleum quod supernatat, collige. (Am. Ams. B. Bel. Ed. Fenn. Fer. Gen. Lon. LonN. Lus. R. Suec. *Br. C. Gr. Re.*)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — D. Herbae unam et Aquae sex; — Bor. Bor4. Han. HassP. His. His8. O. Pol. Sax. *Fi.* Aquae octo; — Ba. Aquae novem; — A. duodecim Aquae; *Sw.* Aquae quatuor; — *T.* ut oleum florum aurantii; — Pm. oleum e destillatione Aquae; — LP. maserationem per aliquot dies et destillationem.

℞. Herb. Menthae
part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae . quantum vis.
Aquae Menthae dest. q. necesse.
Destillent. (Wür.)

Oleum Menthae sativae indicatum est a Du. *Gr.* et *T.*; *Oleum Menthae viridis* ab Am. Gen. Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T.*; *Oleum Menthae crispae et vulgaris* ab A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. LP. Lus. O. Pal. R. Sax. Wir. Wür. *Gr. Pid. Sw. T.*; *Oleum Menthae piperitae s. Herbae Menthae piperitae florescentis* denique ab A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. (venale) ponderis sp. = 0,920) D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Gr. Pid. Re.* et *Sw.* — *Oleum Menthae piperitae rectificatum* a *Gr.* indicatur.

Gabe, zwei bis ſechs Tropfen.

Oleum Menthae piperitis reductum (*Gr.*): Olei libras tres, Spir. rectif. unam.

Oleum Menthae crispae terebinthinatum. (Bor4.)

℞. Herb. Menthae crisp. libr. triginta.
Olei Terebinthinae . libras duas.
Aquae fontanae . quantum satis.
Fiat lege artis destillatio et oleum separetur.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Menthae piperitae. (A. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. RC. Wir. *Br*. Fi. Gr. Re.*)

℞. Sacchari albi . . unciam unam.
Olei ess. Menthae pip.
guttas octo.
Tritura simul (*D. Br*. Re.*)

Bor. BorC. Han. O. et RC. Sacchari semunciam et Olei guttas duodecim (Bor4. duplum adhibet); — *Re.* Ol. semidrachmam, Sacch. sesquiunciam; — A. Sacchari drachmam et Olei grana tria; — *Fi.* Sacchari drachmam, Olei guttas duas ad tres; — Wir. *Gr.* Sacchari unciam, Olei (et Magnesiae albae, sing. *Gr.*) guttas sedecim; — HassP. Sacchari drachmas duas, Olei guttas quatuor. (Eodem modo paratur *Elaeosaccharum Menthae crispae.* HassP.)

Pastilli de Mentha piperita, Rotulae s. Morsuli s. Trochisci Menthae piperitae. (A. B*. Ba Bor4. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Sax. Wir. *Gr. Re. T.*)

℞. Sacchari albi,
Aquae Menthae pip., sing.
uncias duas.

Coque ad electuarii mollis consist., adde elaeosaccharum praeparatum ex
Sacchari albi . . unciis quatuor.
Olei ess. Menthae pip.
semidrachma.

Mixturam guttatim instilla tabulae marmoreae politae et guttas post concretionem leni calore supra cribrum per plures horas sicca. (Gal. *Re.*)

Li. et Wir. Sacchari drachmas quatuordecim c. dim., Aquae Menthae semidrachmam et grana quindecim et Elaeosaccharum praep. cum Sacchari sesquidrachma et Olei guttis decem; — Sax. Sacchari q. vis, Aquae Menthae quartam circiter partem et Elaeosacchari talem quant. ut librae duae massae totius Olei ess. drachmas circiter duas continent; — O. Sacchari semilibram, Aquae Menthae q. s. et Elaeosaccharum praep. cum Sacchari semidrachma et Olei guttis triginta; — A. Sacchari unciam, Aquae Menthae q. s. et Olei ess. grana viginti quatuor; — *T.* Sacchari cribrati, Aquae Menthae pip, sing. uncias sex, coque mite calore ad glob.; syrupo adde Sacchari grossiuscule pulv. libram et Olei Menthae pip. sesquidrachmam; — *Gr.* Sacch. drachm. quatuordecim c. dimid., liqua et adde Sacch. sesquidrachmam c Ol. Menth. pip. guttis quadraginta quinque mixtam et guttatim instilla etc

℞. Sacchari albi . . . semilibram.
Aquae destillatae unciam unam.

Calefac in tantum, donec gutta refrigeratione solida fiat; massae semirefrigeratae adde
Olei ess Menthae semidrachmam.
Fiant rotulae. (Hass.)

Han. Sacchari uncias quatuor, Aquae q. s. et Olei guttas triginta sex; — Ba. Sacchari et Elaeosacch. Menthae, sing. part aeq. coquere, pauxillum Aquae Menthae pip. addendo

HassP. Sacchari albissimi pulv. q. vis, Aquae Menthae pip. q. s. ut fiat massa spissitudinis unguenti, cui, probe calefactae et liquatae, ingere Sacchari albiss. pulv. q. s. ut guttulae exemtae indurescant, tunc cuilibet unciae sacchari adhibiti admisce Olei Menthae pip. dest. guttas duodecim, ut fiant rotulae etc.

℞. Sacchari ad glob. cocti uncias sex.
Pulv. Herb. Menthae pip.
drachmas sex.

Mixtis bene, massae semirefrig. adde
Olei ess. Menthae pip.
guttas triginta.

Fiant rotulae triginta. (Ful.)

℞. Sacchari pulverati unciam unam.
Olei Menthae piperitae guttas sex.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s.

Fiant trochisci. (Ful.)

Fer. Olei semidrachmam, Sacchari uncias sex et Mucil. G. Arab. cum Aqua Menthae parati q. s.; — *Gr.* Sacchari libras duas, Amyli uncias duas, Ess. Menth. pip. q. p., Mucil. G. Tragac. q. s.; vel: Sacch. albi libras quatuor, Mucil. G. Tragac. q. s., Ol. Menth. pip. drachm. sex, vel: Sacch. uncias sex, Ol. M. pip. gutt. triginta sex, Alb. Ovor. no. 2.

℞. Ichthyocollae . drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias tres.

Solutioni adde
Elaeosacch. Menthae pip.
libram unam.

Fiant trochisci. (B*. *Gr.*)

℞. Rotular. Sacchar. uncias quatuor.

Immitte in vas vitreum, antea
Aetheris acetici guttis triginta, et
Olei Menthae pip.
guttis duodecim.

probe mixtis agitatione intus obductum. Tunc vas bene agitetur ut rotulae perfecte humectentur. (Bor4.)

Gr. Trochiscos Ros. (Manus Christi) semilibram imbibe Ol. Menth. pip. semidrachma, dissolut. in Alcoholis sesquidrachma.

Aqua Menthae crispae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Han. Hass. HassP. Li. LP. Lus. O Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wür. *Br. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Herb. Menthae crisp. rec. part. unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Post horas viginti quatuor digestionis destillent partes decem. (Ams. B. Bel *Sw.*)

Bor. D. O. et Pal. Herbae partem

unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — Han. Herbae partes octo et Aquae q. s.; destillent partes viginti quatuor; — Fenn. et Suec. Herbae partes quatuor et Aquae q. s.; destillent partes sex; — LP. Fol. uncias sex, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma, infusionem per decem vel duodecim horas et abstractionem librarum duarum; — Lus. Herbae partes sex et Aquae q. s.; destillent partes octo; — Fer. et Pal. Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* et Aquae sex; destillent partes duae; — Hass. R. et *Pid.* Aquae octo; destillent partes quatuor; — A. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Du. Herbae sesquilibram et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — *T.* ut aquam flor. aurant.; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillent librae viginti; — HassP. Herbae libras duas c. dimid., Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor; — RC. Herbae flor. libras duas vel sicc unam, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae decem; — Pm. Menthae libras viginti quatuor, Aquae libras quadraginta octo, eliciantur Aquae librae duodecim (*Aqua ex Mentha cohobata*).

℞. Herb. Menthae crisp. part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Parte quarta destillata productum supra novam Herbam cohoba. (Sar.)

℞. Herb. Menthae crisp. rec. part. decem
Aquae Vitae . partem dimidiam
— purae part. centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)
Br. Herbae partem unam et Vini albi quatuor; destillet pars una cum dimidia.

℞. Elaeosacch. Menthae crisp. semunciam.
Aquae fontana . libram unam.
Misce. (RC.)
LH. Olei Menthae crisp. guttas duodecim, solve in Alcoholis 33° uncia, adde Aquae comm. libram.

Aqua Menthae piperitae s. ex Mentha piperita s. Menthae piperitidis. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Rc. Sw. T. Vm.*)

℞. Herb. rec. Menthae pip. part. unam.
Aquae sufficientem quantitatem.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes decem. (Ams. B. Bel. Du. *Sw.*)

Am. Du. Lon. et LonN. Herbae sesquilibram et Aquae q. s.; destillent partes (octarii) octo (LonN. *Gr.* Herbae sicc. sesquilibram vel rec. duplum vel Olei drachmas tres [pro congio Aquae *Gr.*]); — *Gr.* (sec. Lon. ante 1745) Herbae rec. libras octo; (post 1745 Du.), Herbae sicc. sesquilibram, vel rec. tres; (Ed.) Herbae flor. libras tres; vel: Olei unciam, Aquae q. s. abstrahe congios decem; vel: Olei duas; abstrahe congios novem; vel: Olei libram, abstrahe congios triginta; — Bor. Han. O. et Pol. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes septem; — Bor4. Herbae libras duas, Aquae q. s.; destillent librae quatuordecim; — HassP. ut aquam menthae crispae; — Gen. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes sex; — Fenn. et Suec. Herbae partes duas et Aquae q. s.; destillent partes tres; — Pm. Menthae libras sedecim, Aquae communis quadraginta octo, extrahantur librae viginti quatuor; — Lus. Herbae partes tres et Aquae q. s.; destillent partes quatuor; — Gal. *Fi.* Herbae partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae (macerationem per horas sex *Fi.*): — An. Aquae quinque; destillent partes quatuor; — A. Br. Wür. et *Pid.* Aquae sex; destillent partes duae; — Hass. et R. Aquae octo; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent partes decem; — Ba. Aquae sedecim; destillent partes octo; — RC. ut aquam menthae crispae; — *T.* ut aquam flor. aurant.

℞. Herb. Menthae pip. rec. part. tres.
In sacculum immitte medio cucurbitae Aquae partes duodecim continentis ita ut liquidum attingere non possit, suspensum, quo facto partes decem destillent. (Ful. Li.)

℞. Herbae Menthae pip. part. decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae part. centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta (*Vm.*)
Ed. et *C.* miscere Herbae libram cum Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma, destillando libras decem elicere et producto addere Aquae Vitae uncias quinque.

℞. Elaeosacch. Menthae pip. drachmam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Tere ut solvatur. (BorC.)

℞. Olei Menthae piperitae guttas duodecim.
Alcoholis 33° . . unciam unam.
Aquae communis . libram unam.
Dissolve. (LH.)

℞. Olei ess. Menthae partem unam.
Sacchari,
Alcoholis (22°), sing. partes tres.
Aquae partes mille et ducentas.
Dissolve. (Gal.)

Gabe, eine bis vier Unzen.

Guttae Menthae pip., Peppermint drops (*Gr*): Sacch. libras duas, Aq. Menth. pip. uncias quatuor; Ess. Menthae pip. addi potest.

Aqua Menthae viridis, vulgaris simplex, sativae. (Am. B*. Lon. LonN. *Fi. Gr. Re. Sw.*)

℞. Herbae flor. Menthae vir. libr. tres.
Aquae sufficientem quantitatem ad prohibendum empyreuma. Post sufficientem digestionem destillent octarii decem. (Am. B*.)

Lon. Herbae sesquilibram et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — LonN. *Gr.* ut aquam menthae pip.; — *Sw.* Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — *Fi.* ut aquam menthae piperitae; — *Gr.* sec. Lon. ante 1745. Herbae rec. libras octo pro congio Aquae; post 1745. Herbae sicc. sesquilibram pro congio; — Olei Menthae viridis unciam, abstrahe congium.

Spiritus Menthae, Aqua Menthae piperitae s. piperitidis, vulgaris, sativae, viridis spirituosa s. vinosa s. alcoholica.

℞. Herb. Menthae rec. partem unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.
Destillet spiritus 28° indicans. (An.)

Bel. Herbae partem unam et sedecim Alcoholis; destillet spiritus 16°; — Br. Pal. et Wir. Alcoholis quatuor; destillet dimidia pars; — Ams. Herbae partes duas et novem Alcoholis; destillent; — Lus. Herbae partem unam cum dimidia et decem Alcoholis: destillent partes quinque; — *Sw.* Herbae partem unam et Alcoholis quatuordecim; destillent partes quindecim (?); — *Br.* Herbae libram et uncias decem et octo Alcoholis; — *Gr.* sec. Lon 1809. Herbae flore c. s. sicc. sesquilibram, Aquae Vitae congium; — Fer. Herbae partem unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex; — T. ut spiritum lavandulae.

℞. Herb. Menthae rec. partem unam.
Alcoholis (9,910) part. quatuor c. dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.
Post horas viginti quatuor macerationis destillent partes quatuor. (An.)

Ed. Lon. LonN et *C.* Herbae partem unam cum dimidia, Aquae Vitae novem et Aquae q. s; destillent partes novem; — *Vin.* Herbae partem unam, Alcoholis tres et sex Aquae; destillent partes duae cum dimidia; — Bor. Bor4. Han. O. et Pol. Herbae partem unam, Alcoholis unam cum dimidia et Aquae q. s.; destillent partes sex; — HassP. Herbae libram unam, Spiritus rectif. duas, Aquae q. s.; destillent librae decem; — *Fi.* Herbae libram unam, Alcoholis 22° septem, Aquae quatuor; destillent librae septem; — Ba. Herbae partem unam, Alcoholis duas cum dimidia et sedecim Aquae; destillent partes octo.

℞. Herb. Menthae rec. partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post horas viginti quatuor digestionis destillent fere ad siccum. Macera cum nova Herba et iterum destilla. (Sar.)

Wür. Herbae sesquilibram, Alcoholis decem et producti cohobationem supra Herbae novae uncias tres; — *Sw.* Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et duas Aquae; destillent partes sex, productum cum Aquae partibus duabus infunde Herbae recentis duodecim, et destillando partes sex abstrahe.

℞. Herbae Menthae rec. libras duas.
Alcoholis,
Aquae, sing. partium aequalium q. s. ut librae octo obtineantur, adde
Aquae communis,
Sacchari albi, sing. uncias duas.
Serva. (Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae flor. part. duodecim.
Alcoholis (22°) partes triginta sex.
Aq. Menthae dest. part. duodecim.
Post quatuor dies infusionis destillent in balneo aquae partes triginta. (Gal.)

R. Herbae partem dimidiam, Alcoholis quatuor, Aquae Menthae unam et viginti quatuor horas infusionis; destillent partes tres.

℞. Olei Menth. pond. scrup. sex c. dimid.
Spir. rectif. octar. quatuor c dim.
Aquae . . . . quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillet lento igne congius. (LonN. *Gr. Re.*)

℞. Aquae Menthae . libram unam.
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce. (*Br.*)

Spiritum Menthae viridis habent Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re. Sw.* et *T.*; *Spiritum Menthae crispae:* A. Ams. An. B. Br. Gal. Li. Lus. R. et *Sw.*; *Spiritum Menthae piperitae:* Ams. Au. B. Ba. Bor Bor4. Br. Ed. Gal. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Wir. Wür. *Br. C Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T.* et *Vm.*

Essence of peppermint (*Gr*): Spiritus rectif. octarium, immitte Kali praep. antea calefacti unciam, decantha et adde Olei Menth. pip. semunciam, misce; vel: Olei M. pip. libram, Spir. rectif. congios duos, Herbae sicc. uncias octo, misce; vel: Ol. uncias tres, Spir. rect. cum Spinachia color. octarios duos, misce.

Aqua stomachica s. Menthae composita. (Wir. *Sp.*)

℞. Herb. Menthae crisp. rec. uncias tres.
Galangae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi, sing. unciam unam
Vini generosi . . . libras octo.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Herb. rec. Menthae unc. viginti quatuor.
— — Absinthii uncias tres.
— — Basilici,
— — Pulegii, sing. unc. duas.
— — Rorismarini,
Flor. Lavand., sing. drachmas duas.
Cinnamomi . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Coriandri, sing. drachmam unam
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Aquae Menthae uncias sexaginta.
Destillent fere ad siccum. (*Sp.*)
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Spiritus Menthae saccharatus, Potio carminativa, Julep de Mentha. (*Sa. Sm. Sw. Vm.*)

℞. Spiritus Menthae piperitae uncias septuaginta quatuor.
— Sacchari uncias duodecim.
Tinct. Menth. pip. drachmas tres.
Mixta post aliquot dies filtrentur. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae . . uncias sex.
Spiritus Menthae piperitae,
Syr Menthae pip., sing unc. unam.
Olei essentialis Menthae guttas sex.
Sacchari . . . . . semunciam.
Misce. (*Vm.*)

℞. Aquae Menthae . . uncias octo.
Spiritus Menthae . sesquiunciam.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Misce. (*Sa.*)

Sw. Aquae Menthae viridis uncias octo, Tinct. et Syrupi Menthae, sing. unam; — *Crême de Menthe* (*Re.*): E Spir. rect., Ol. Menth. et Saccharo.
Löffelweise.

Potio stomachica. (*Sm.*)

℞. Aq. Menthae crisp. uncias quatuor.
— — piperitae,
— Cinnamomi hordeatae,
Syrupi Capit. Papav., sing. unciam.

Aqua ad tormina infantum, Potio antispasmodica s. stimulans. (*Sm. Sp.*)

℞. Aq. Menthae,
— Chamomillae, sing. uncias duas.
Syr. Rhoeados,
— Chamomillae, sing. semunciam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Olei ess. Cinnamomi guttas duas.
— Menthae piperitae guttas tres.
Spir. Menthae pip. unciam unam.
Syrupus Althaeae . uncias tres.
Aquae dest. Menthae pip. uncias quatuor.
Misce. (*Sm. Va.*)
Löffelweise. (*Alibert.*)

Mixtura stimulans (*Gr.*); Ammonii carbonici semidrachmam, Aquae Menthae pip. uncias septem, Syrupi Aurantiorum semunciam; — ein kleiner Löffel; praeterea: Mixturae Camphorae unciam, Spiritus Aetheris sulphurici drachmas duas, Tincturae Cardamomi comp. quatuor, Spiritus Amsi sex, Olei Carvi guttas duodecim, Syrupi Zingiberis drachmas duas, Aquae Menthae piperitae uncias quinque cum dimidia. Zwei Eßlöffel, nach Umständen, in der Windkolik.

Potio stimulans cum Aqua Menthae. (Hospit. St. Ant. *Va.*)

℞. Aquae Menthae . uncias quatuor.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Aetheris . . . . semidrachmam.
Aeußerlich in Waschungen und Bähungen.

Liquor philodonticus et antispasmodicus (*Maury.*): Alcohol 38° octarios (litres) duos, Ol. Menth. crisp. unciam, Ess. Cinnam. drach. duas, Ol. Neroli quatuor, Ess. Ambr. c. Moscho, Ess. Ros., sing. sesquidrachm., Aeth. sulph. semidrach.

Mercurialis.

Mercurialis annua, L.; jähriges Bingelkraut; Mercuriale annuelle (*Gal.*); Annual mercury (*Ang.*); Merkuryalis, neb pluna bazolicka (*B.*); Bingelurt (*D.*); Jaarliks bingelkruid (*Bel.*); Mercorella (*I.*); Mercuryasez (*Pol.*); Bingelaert (*Suec.*).

Ams. An. Bel. Br. Gal. Gen. His. His3. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Sp.* Z.

⊙ (Dioecia Enneandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 162. *Schk* t. 332. *Pleneck* t. 717. *Hayne* V. 11. *Zorn* Ic. pl. t 103. 104.)

Man wendet das Kraut (herba Mercurialis, Merc. Mas et Femina) an; es besteht aus einem äſtigen, glatten Stängel mit eirunden, lanzettigen, gezähnten, hellgrünen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen ſchleimigen, etwas ſalzigen Geſchmack.

Es enthält, nach Feneulle, einen bittern, leicht purgirenden Stoff, Chlorophyll oder Pflanzengrün, Eiweiß, einen fetten Stoff, flüchtiges Oel, pectiſche Säure, Salze ꝛc.

Gr. und *Re.* führen noch außerdem Merc. perennis, Cynocrambe, welche ſtatt jener gebraucht worden iſt, aber gefährliche Zufälle verurſacht hat, und *Gr.* M. tomentosa, Phyllon, deren Abkochung gegen Waſſerſcheu empfohlen wurde, an.

Clyster s. Enema purgans. (*Ra.*)

℞. Herbae Mercurialis . semunciam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et cola.

Decoctum Mercurialis. (*Sa.*)

℞. Foliorum Sennae . drachmas sex.
Herb. Mercurialis . sesquimanip.
Aquae . sufficientem quantitatem ut colaturae sesquilibra obtineatur. Post semihoram ebullitionis in vase tecto adde
Mellis pectoralis . uncias duas.
Misce.

Mel mercuriale s. Mercurialis annuae. (An. Gal. Pal. Sar Wir. *Sp. T. Vm.*)

℞. Succi Mercurialis,
Mellis electi, sing. part. aequales.
Coque despumando, ad syrupi consist. et per pannum cole. (Gal. Sar. *T.*)

An. Pal. et Wir. Mellis partes duas et tres Succi; — *Sp.* Succi et Mellis ut antea; — *Vm.* Succi unam et Mellis unam cum dimidia.

Ehedem in Klyſtir angewendet. Mit Nutzen bei Blähungskolik, Hyſterismus ꝛc. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einem erweichenden Decoct.

Syrupus Mercurialis s. prophylacticus s. longae vitae, Mellitis Mercurialis composita. (Gal. Wir. *Sp.*)

℞. Succi Mercurialis libras quatuor.
— Boraginis,
— Buglossi, sing. . libr. unam.
Mellis albi . . . . libras sex.
Coque et despuma; tunc recipe
Gentianae . . . uncias duas.
Radicis Iridis nostratis uncias tres.
Vini albi . . . . sesquilibram.
Macera per horas viginti quatuor et exprime; colaturam cum succis et melle mixtam coque blando igne ad syrupi consistentiam et cola.

Sp. eundem agendi modum indicat, sed Succi Mercurialis uncias octoginta sex, Succi Boraginis viginti quatuor, Succi Buglossi tantidem, Mellis triginta duas, Gentianae quatuor, Iridis octo et Vini quadraginta octo; — Gal. Succi Mercurialis libras quatuor, Succi Boraginis et Buglossi, sing. unam, Mellis sex, Gentianae uncias duas, Iridis quatuor et Vini libras duas.

Purgirend, magenſtärkend, emmenagogiſch.

Mercurius.

Mercurius vivus, Argentum vivum, Hydrargyrum, Hydrargyrum virgineum, Hydrargyrus; Queckſilber, lebendiges Queckſilber; Mercure, Vif-argent (*Gal.*); Mercury, Quicksilver (*Ang.*); Abuk, Zibakk (*Ar.*); Chug-yin (*Ch.*); Queckſolv (*D.*); Azogue, Mercurio (*His. Lus.*); Para, Parah (*Hin. Duk.*); Kwikzilva (*Bel.*); Argento vivo, Mercurio (*I.*); Rasa (*Ma.*); Seemab (*Pe.*); Parada, Rasa, Sutam (*Sa.*); Quicksilfver (*Suec.*); Rasam (*Tam. Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *C. Fi. Gr. Par. Re. T.*

Das käufliche Queckſilber kann zu mediciniſchen Zwecken erſt dann benutzt werden, wenn es von beigemiſchten fremden Subſtanzen gereinigt worden iſt. Man nennt es dann:

Argentum vivum purificatum, Mercurius vivus depuratus s. rectificatus, Hydrargyrum purificatum s. depuratum s. purum, Hydrargyrus purificatus. Nicht alle Pharmacopöen geben das dazu anzuwendende Verfahren an.

Ba. Fer. Gen. Han. His. His3. Lus.

O. R. Suec. Wir. *Br. Pid.* et *Sw.* destillare mercurium in retorta communicante cum recipiente pro dimidia parte Aqua repleto; — Fenn. et Hass. eundem agendi modum adhibent, in retortam tamen immittunt mixturam e Metalli libris tribus et Sulphuris uncia una; — Bor4. Hydrargyri libram unam cum Ferri limati tantum ut superficies obtecta sit in retorta igne sensim sed non nimis aucto destillationi subjicere et partes novem abstrahere; — LonN. *Gr. Re.* mercurium in retorta ferrea destillare; — Pm. e retorta vitrea balneo arenae impositam, cujus osculum in vas aqua repletum desinat, destillare et siccare; — RC. in retorta ferrea pro dimidio Metallo repleta atque cum recipiente vitreo ad dimidium Aqua frigida repleto conjuncta destillare; — Am. Ams. Ed. Lon. Sar. et *C.* Terere Mercurii partes sex cum Limaturae Ferri una et mixturam destillationi subjicere; — *Br.* Metallum cum Kali subcarbonico vel Calce viva destillare et trajicere deinde per pellem caprin.; — Li. in recipiente pro dimidia parte Aqua repleto destillare et per horas duodecim digerere in Acidi nitrici Aquae partibus tribus diluti et deinde bene abluere; — Gen. *T.* Destillationem solam indicant.

Sax Destillare mixturam ex Aethiopis mineralis et Calcis vivae, sing. partibus aeq.; — Ful. liquefacere Sulphuris in baculis uncias sex in mortario ferreo, addere per vices Mercurii libras duas et post illorum intimam conjunctionem massam nigram inde productam pulv. cum Calcis vivae pulv unciis octodecim mixtam in retortam immittere, atque productum in excipulo Aqua pro parte dimidia repleto recipere; — Fer. Gal. His. Pol. *Gr. T.* et *Vm.* Cinnabarem cum Limaturae Ferri parte dimidia vel partes aequales eorum destillare; — His3. Sulphureti Hydrargyri nativi q. v. e retorta ferrea aut fictili non vitreata vehementi igne in receptaculum, pro dimidia Aqua repletum, destilla; — *Fi.* Mercurii calefacti libras tres affundere Sulphuri in baculis in crucibulo in fusione existenti, cum spathula ferrea agitando et, tunc massae per momentum refrigeratae et pulveratae addere Limaturae Ferri uncias viginti, destillare etc. (*Mercurius redivivus Cinnabaris*); — HassP. Mercurii uncias decem et Mercurii nitrosi crystall. inter parandum mercurium solub. Hahn. ex merc. venali obtenti Aq. solut. unciam unam, per horas duas, subinde agitando, coquere, liquorem defundere et merc. cum Aquae destillatae unciis quatuor abluere.

Idt et *Chevallier* Mercurium in retortam liquatoriam pro duobus trientibus solum eo replendam immittere et hanc in furnum, operculo tectum collocare, cui tubus ferreus, in fine nodulo linteo humefacto, cujus una extremitas patinae profundae (Terrine) Aqua repletae immergit, instructus adaptatus est; operatione peracta, Aqua decanthatur et metallum chartae josephinae ope deficcatum per pellem caprinam trajicitur.

Professor G. *Branchi* Metallum in lagena epistomio et smiri obturata et parietibus valde resistentibus praedita cum Acido sulphurico per longum tempus agitando et concutiendo saepius, tenere, acidum decanthare et metallum residuum cum multa Aqua ablutum et siccatum per chartam filtrare. (Ein sehr wohlfeiles Verfahren *T.*)

Das metallische Queckſilber in Subſtanz, in nur ſehr wenigen, ſelten gebrauchten Präparaten angewendet, bringt nur durch ſeine Schwere eine Wirkung auf den thieriſchen Organismus hervor, und mit Unrecht halten es Viele für ein Gift. In einem ſehr getheilten Zuſtande iſt es eins der kräftigſten Reizmittel, welche man kennt, und kann ſelbſt giftig werden, entweder durch ſeine Menge oder durch die Dauer ſeiner Wirkung, obgleich es im letzteren Falle eine Reihe pathologiſcher Erſcheinungen hervorzubringen pflegt, welche allmälig den Leidenden zum Tode führen.

Obgleich es genugſam erwieſen iſt, daß das Queckſilber auf dem Wege der Einſaugung in den Kreislauf kömmt, ſo ſcheinen doch ſeine Wirkungen einzig von der ſympathiſchen Reaction der mittelſt nervöſer Connexe oder ähnlichen Baues mit denjenigen Organen, auf deren Oberfläche man es anbringt, abhängig zu ſeyn. Zu Gunſten dieſer Meinung ſpricht die unendliche Mannichfaltigkeit der Wirkungen des Queckſilbers, nach den äußern Umſtänden, der Conſtitution oder dem Zuſtande des Subjects, nach der Natur des Präparats, der Gabe ꝛc.; eine Mannichfaltigkeit, welche es zugleich den krampfſtillenden, Harn und Regeln treibenden, reizenden, purgirenden, Speichel- und Schweißausſonderung befördernden Mitteln zuzählen ließ, je nachdem man es nämlich dieſen oder jenen Ab- oder Ausſonderungsproceß bethätigen ſah.

Es giebt eine ſehr große Menge Präparate deſſelben, von denen viele jetzt ganz oder faſt ungebräuchlich ſind.

Metalliſches Queckſilber.

§. I. Präparate, indenen die Wirkung des Queckſilbers nicht oder doch auf keine merkliche Weiſe durch andere Subſtanzen modificirt iſt.

A. Queckſilber in Subſtanz.

Potio Mercurii vivi s. mercurialis. (*B.*)

℞. Mercurii purificati
unc. duas ad quatuor.
Divide in doses octo. — Alle zwei Stunden eine Gabe, bei volvulus.

Brera hat einem Kranken das Queckſilber bis zu ſechs und zwanzig Unzen gegeben; es bewirkte zwar keine Heilung, erleichterte aber beträchtlich.

Aqua Mercurii vivi cocta s. mercurialis simplex, Decoctum Hydrargyri. (Ful. *Br. Fi. T. Va.*)

℞. Mercurii . . . . libras duas.
Aquae communis libras quatuor.
Coque in retorta per horas duas et decantha. (Ful. *Br.*)

T. Mercurii libram unam, Aquae (pluvialis *T.*) duas, coquere per horam unam, (*Fi. Va.*) per duas.

Wurmwidrig. — Allein oder mit Zucker verſetzt, bei Kindern gegen Maden und Spulwürmer. — Gabe, ein- bis ſechsjährigen, eine halbe bis zwei, drei Unzen.

Decoctum Hydrargyri s. Mercurii. (Wür.)

℞. Mercurii purificati . uncias duas.
Aquae Tanaceti . libram unam.
Coque in olla fictili tecta, metallum saepius baculo agitando; decantha et adde aquae
Syr. Flor. Persicae unciam unam.
Wurmwidrig.

Decoctum anthelminticum Rosensteinii. (*Au. Pid*)

℞. Radicis Graminis . semunciam.
Cort. Aurantior. . semidrachmam.
Cinnamomi . . semiscrupulum.
Aquae fontanae . libras octo.
Coque ad trium quadrantium consumptionem, cola et adde
Mercurii , . . . uncias duas.
Coque iterum in vase fict., agitando saepius baculi ope, tunc lente decantha

Bei Wurmbeſchwerden der Kinder in der Gabe von acht Unzen bis zu einem Pfund, allein oder mit Milch, empfohlen.

Emplastrum resolvens s. fundans. (*Bo.*)

℞. Emplastri Diabotani uncias duas
Succi Solani nigri drachmas duas
Cum Vitello Ovi unius tritis adde
Amalgamatis Mercurii et Plumbi partium aeq. . drachmas duas.
Cetacei . . . sesquidrachmam.

B. Queckſilber mittelſt Schleim zertheilt.

Mucilago mercurialis Plenkii s. Gummi Arabici mercurialis. (Sax. Wir. *Br.*)

℞. Mercurii purif. drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Aquae communis cochlearia duo.
Agita mixturam in mortario pistilli vitrei ope, donec metallum disparuerit. (*Br.*)

Sax. et Wir. Mercurii drachmam, Gummi semunciam et Aquae q. s. — Enthält um die Hälfte weniger Queckſilber, als der vorige.

Reizend, revulſiv, wegen letzterer Wirkung bisweilen als ſchwächend betrachtet: bei entzündlicher Ruhr und einigen andern entzündlichen Krankheiten empfohlen; äußerlich bei ſogenannter veneriſcher Gonorrhöe, Augen- und Halsentzündung angewendet. Auch gegen große Ascariden. Innerlich giebt man ihn vermiſcht, z. B. mit acht Unzen Aqua Fumariae und einer halben Unze Syrup, zu einem oder zwei Löffel Morgens und Abends.

Syrupus Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis s. de Mercurio et Gummi s. Mercurii gummosus, Mercurius gummosus Plenkii. (B*. Fer. Ful Gal. Hass. Li. *Fi. Re. Sa. Sp. T. Vm.*)

℞. Mercurii purif. drachmam unam.
Gummi Arab. pulv. drachmas tres.
Tritura ad extinctionem usque et adde deinde
Syr. Capitum Papav. semunciam.
Tritura iterum in mortario marmoreo et in mucilaginem redige. (B*, Fer. Gal. Hass. Li. *Fi. Sp.*)

Re. Merc. drachmam unam, Gummi Arab. duas, Syr. simpl. unciam contere addendo Aq. pluv. unciam; — *T.* Mercurii drachmas duas cum triplici pondere Gummi, aliquot guttis Aquae Menthae vel Florum Aurantii additis triturando in mucilaginem redacti ad extinctionem terere et addere Syrupi Diacodii unciam.

℞. Mucilag. Gummi Arab.
drachmas sex.
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad extinct. et adde
Syrupi Sacchari . uncias quatuor.
Misce bene. (Ful.)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Gummi Arabici . sesquidrachmam.
Aquae . . . . cochlear unum.
Tritura ad extinct. et adde

Syrupi Violarum . . uncias duas.
Aq. Flor. Sambuci unciam unam.
Misce bene (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Aquae . drach. septem c. dimid.
Fiat mucilago, cui adde
Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati . sesquidrachmam.
Contere bene et sensim admisce intime
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Serva. (*Vm.*)

Wenn man dieſen Syrup anwendet, muß man ihn ſo geben, daß der Kranke drei bis ſechs oder acht Gran Queckſilber täglich bekommt. Dieſe letztere Formel unterſcheidet ſich kaum von der des folgenden Präparats.

Mercurius gummatus s. Massa mercurialis sicca. (Pm.)

℞. Mercurii puri . . unciam unam.
Pulveris Gummi Arabici uncias duas.
Aquae fontanae . quantum satis.
Misce in mortario marmoreo ad perfectam mercurii extinctionem, massam exsiccatam in pulverem redige. Gabe, ein Scrupel bis zur Drachme.

Conditum hydrargyro-unguinosum, Marmelada mercurialis, Linimentum mercuriale. (*Sw. Vm.*)

℞. Unguenti Mercurialis cum Butyro Cacao parati . drachmas tres.
Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.
Misce ut fiat emulsio, cui sensim adde
Mellis albi . . uncias quatuor.

Bei unterdrückter hitziger Harnröhrenentzündung durch Mißbrauch oder unzeitigen Gebrauch von Purgirmitteln empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Kaffeelöffel.

Syrupus mercurialis gummosus de Lagneau. (*Ca. Va.*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Gummi Arabici . . unciam unam.
Syrupi Cichorii compositi . q. s.
Tritura in mortario vitreo ad perfectam metalli extinct. usque et adde
Syr. Cichorii comp. sesquiunciam.

Anwendung, wie bei'm vorhergehenden.

Mixtura Mercurii gummosa s. mercurialis, Potio mercurialis Plenkii. (Br. Lus. Sar.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Mucilag. G. Tragacanthae semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Misce bene. (Lus.)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Aquae Menthae . . uncias sex.
— Junip. comp. unciam unam.
Misce exacte. (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Cum Aquae pauxillo in mucilaginem tere, cui adde
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad perfectam extinctionem et adde sensim continuè terendo
Syrupi kermesini . . semunciam.
Aquae Fumariae . . uncias octo.
Misce bene. (Br.)

Die Anwendungsweiſe ſiehe oben unter Mucilago mercurialis.

Aehnlich wirkt Schleſinger's *Solutio Hydrargyri gummosi*:

℞. Mercurii . . . . grana decem.
Cetacei . . . . semidrachmam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias duas.
Misce triturando. (*Au.*)

Mixtura mercurialis balsamica. (Br.)

℞. Balsami Copaivae,
Gummi Arab , sing semidrachmam.
Mercurii . . drachmam unam.
Tritura ad extinctionem et adde
Syrupi kermesini,
Aquae Fumariae sing. uncias duas.
Misce benè. — Beſonders bei Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lac mercuriale Plenkii. (*Bt. Sm.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici drachmas quatuor.
Syrupi Capitum Papaveris . q. s. ut fiat mucilago. Post longam triturationem in mortario adde sensim
Lactis vaccini bull. . uncias octo.

In Waſchungen bei ſogenannter gonorrhoiſcher Augenentzündung, in Bädern bei Phimoſis von Geſchwüren auf der Eichel und in Gurgelwaſſer bei ſogenannter ſyphilitiſcher Bräune.

Injectio Hydrargyri s. hydrargyrica s. mercurialis simplex. (*Re. Sw.*)

℞. Ung. mercurialis drachmas duas.
Mucilag. Gummi Arab. semunciam.
Emulsionem para, cui sensim adde
Aquae . . . . . uncias tres.

Bei chroniſchem Tripper. — Man ſpritzt vier Mal täglich zwei Drachmen ein.

Re. Ung. mercur. drachmam, Ol. Oliv. unciam, intime misce; vel: Mer-

curii puri drachmam, Mucil. G. Arab., Aq. destill., sing. sesquiunciam, tritura et misce sec. artem.

Injectio mercurialis Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas tres.
Syr. Capitum Papav. semunciam.
Tritura ad extinctionem et adde
Aquae fontanae uncias duodecim.
— Rutae . . . uncias duas.

Bei Gonorrhöe und habituellem weißen Fluß.

Einfacher iſt folgende Injection Hufeland's:

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . . semunciam.
Syrupi Opii . . . . . q. s.

Tere mercurium cum gummi, syrupum sensim addendo, donec omnia in mucilaginem sint conversa. (*Au.*)

Gargarisma mercuriale Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Gummi Arabici . drachmas tres.
Syr. Capitum Papav. semunciam.
Mercurii dulcis . . . grana sex.
Tritura ad extinctionem et adde
Decocti e Herb Clematitis erect. semuncia c. Aqua unc. viginti sex.
Mellis rosati . . unciam unam.
Essent. Myrrhae drachmam unam.

Bei ſogenannten ſyphilitiſchen Bräunen und Naſengeſchwüren geprieſen.

Trochisci Mercurii saccharini s. de Lagneau. (*Ca*)

℞. Sacchari pulverati uncias decem.
Mercurii . . . . uncias duas.
Gummi Arabici . unciam unam.
Vanillae . . . drachmam unam.

Fiant l. a. trochisci centum septuaginta sex. — Eine jede enthält zwei Gran Queckſilber.

Trochisci Mercurii saccharati s. saccharini. (*Sy.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Sacchari crystallisati uncias duas.

Tritura cum Aquae guttis aliquot ad metalli perfectam extinctionem et adde
Mucilag Gummi Arabici . q. s.

Fiant trochisci granorum sex, quibus, si necesse est, aliquot guttae Olei essentialis Juniperi vel Florum Aurantiorum addantur.

Pilulae mercuriales Plenkii s. Hydrargyri gummosae s. mercuriales gummosae (An. Bel. LH. *Au. Sy. Vm.*)

℞. Mercurii gummosi partem unam.
Micae Panis part. unam c. dimid. Mellis albi . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici,
Mellis, singulorum drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae . semunciam.

Fiant pilulae trium granorum. (*Au*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Amyli . . . drachmam unam.
Mucilag. Gummi Arabici . q s.

Tritura ad perf. extinct. et adde
Pulveris Liquiritiae . . . q. s. ut fiat massa in pilulas viginti dividenda. (*Sy.*)

℞. Mercurii,
Pulveris Gummi Arabici, singulorum . . . . . unciam unam.
Aquae . . . . drachmas sex.

Mercurio trituratione extincto adde
Pulveris Liquiritiae vel Conservae Rosarum . . . uncias duas.

Fiat massa in 480 pilulas dividenda. (LH)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arab. pulv. drachmas tres.
Syrupi Rhei . . . . . q. s.

Tritura in mortario marmoreo ad perfectam metalli extinctionem et adde
Micae Panis albi . semunciam.

Fiat massa pilularis. (An. Bel.)

Pilulae mercuriales Plenkii compositae s. antisyphiliticae Plenkii. (Fer. Gal. *Br. Ca. Fi. Pie. T. Vm.*)

℞. Mercurii gummosi . partes tres.
Extracti Cicutae . partem unam.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s. ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii purissimi,
Extr. Cicutae, sing . drachmam.
Mucilag. Gummi Arab. drach. sex.
Rad. Liquiritiae pulv. . . q. s.

Mercurio cum mucilagine ad extinctionem trito adde liquiritiam ut fiat massa pilularis, in 288 pilulas dividenda. (*Fi*)

T. Ingredientium dictorum, sing. duplum ut fiant pilulae pondere trium vel quatuor granorum.

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Gummi Arabici . drachmas sex.

Tritura ad extinctionem et adde
Extracti Cicutae drachmam unam.

Fiant pilulae granorum duorum. (Fer. Gal. *Br. Ca. Pie.*)

Gabe, vier bis ſechs Pillen.

Pilulae mercuriales cum Opio. (*Fi.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Gummi Arabici pulv. uncias duas.

Contere, Aquam addendo, ad extinct. merc., ut f. pasta mollis, cui adde
Opii puri pulverati scrupulos octo.

Rad. Liquiritiae pulv. unciam unam.

Fiat cum Aquae q. s. massa in 240 pilulas dividenda. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

C Queckſilber mittelſt zuckerartiger Subſtanzen zertheilt.

Mercurius saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Aethiops saccharatus, Oxydum Hydrargyri saccharatum, Saccharum Mercurii vermifugum s. anthelminticum s. mercuriale, Pulvis Mercurii saccharinus de Lagneau. (Fer. Ful Han. His. His3. Li. Sar. Wür. *Ca. Fi. Gr. Sp. T. Va. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.

Tritura ad perfectam metalli extinctionem usque. (Han. Sar. *Sp. Va. Vm.*)

Ful. Li. et *Ca.* Saccharum crystallis. flavum adhibent.

℞. Mercurii . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Aquae . . . . quantum sufficit

ut fiat pasta mollis, quam ad perfectam metalli usque extinctionem tere. (His. His3.)

℞. Mercurii,
Sacchari albi, sing. . semunciam.
Olei Tanaceti . guttas viginti sex.

Tritura ad perf. metalli extinct. (Wür.)

Gr. Olei guttas sedecim, caet. ut antea.

℞. Mercurii,
Sacchari albi, sing. . semunciam.
Cremoris Tartari scrupulos duos

Tritura ad perf. extinct (Fer. *Fi.*)

T. Ingredientium dup. quant.

Bei Kindern und zarten Perſonen, welche an Syphilis leiden, in Chocolate oder in Kaffee.

Mel Hydrargyri s. hydrargyratum s. mercuriale. (B*. *Re. Siw. Sy.*)

℞. Mercurii,
Mellis despum., sing. . unciam

Tritura ad extinctionem usque.

Re. Mercurii partes duas, Mellis unam.

Potio anodyna s. leniens Andryi. (*Ca.*)

℞. Aquae Flor. Aurant. uncias duas.
— Rosarum,
Syr. Capit. Papav., sing. unciam.
Mercuri . . . . drachmas sex.

Terendo mercurium in syrupo extingue et massam deinde cum aquis commisce. — Bei Cardialgie, Gaſtrodynie und krampfhaftem Erbrechen. — Gabe, ein Löffel Morgens und Abends.

Boli coerulei. (*Au. E. Sa.*)

℞. Mercurii . . . . grana decem.
Conservae Rosarum . scrupulum.

Tritura ad extinctionem usque.

Hydrargyrum glycyrrhizatum, Succus Liquiritiae mercurialis: Hydrarg. et Succi Liquir. part. aeq.

Boli e Mercurio glycyrrhizato. (*Au. Sy.*)

℞. Mercurii . . . . grana decem.
Extr. Liquirit. moll. scrup. unum.

Tritura ad extinctionem usque.

Pilulae Hydrargyri s. coeruleae. (Am. B*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec. *Br. C. Ca. E. Gr. Ra. Re. Va. Vm.*)

℞. Mercurii,
Conserv. Cynorrhodi, sing. drachmam.

Trituratis ad extinctionem, fiant c. Pulv. Liquirit. pilulae triginta sex aeq. (*Ra.*)

Gen. Mercurii partem unam et duas Conservae Rosarum.

℞. Mercurii,
Conserv. Rosarum, sing. drachmam.

Tritura cum Mucilaginis Gummi Arab. parva quant. ad extinct. et adde
Amyli pulverati . . uncias duas.

Fiant pilulae quadraginta octo. (Ed. *Br. Ca. E. Vm.*)

Gr. Mercurii, Conserv., sing. unciam et pil. no. 480, caet. ut antea.

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Conservae Rosarum drachmas tres.

Extingue mercurium et adde
Pulv. Liquiritiae drachmam unam.

Fiat massa pilularis. (Am. B*. Du. Lon. LonN. *Br. C. Gr. Re. Va.*)

℞. Mercurii,
Conserv. Rosar., sing. drachmas duas.
Sacchari albi . drachmam unam.

Post extinctionem metalli adde
Pulv. Amyli,
— Succi Liquir., sing. semidrachmam.
Aquae . . parvam quantitatem.

Fiant pilulae ducentae octoginta octo. (Suec.)

Von den Pillen der erſten Formel enthält jede zwei Gran Queckſilber; die der zweiten je eine anderthalb und von denen der letzten jede bloß einen halben Gran.

Pilulae Hydrargyri Edinburgenses et Hydrargyri glyzyrrhizatae s. mercuriales s. Mercurii melliti s. Mellis hydrargyrati. (His. His3.)

℞. Mercurii,
Mellis, singulorum unciam unam.

Post metalli extinctionem adde
Micae Panis albi rec. uncias duas.

Fiat massa pilularis.

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Mellis uncias duas cum dimidia.

Tritura ad extinctionem et adde
Pulveris Liquiritiae sesquiunciam.
Fiat massa pilularis.

Pilulae ex Hydrargyro s. Mercurii glycyrrhizati. (Lus. *Gr. Sy.*)

℞. Mercurii,
Mellis, singulorum unciam unam.
Extracti Liquiritiae uncias duas.
Fiat massa pilularis. (*Sy.*)

℞. Mercurii,
Extr. Liquirit., sing. . part. octo.
Pulveris Liquiritiae partem unam.
Fiat massa pilularis. (*Sy.*)

Lus. *Gr.* Mercurii, Extracti, sing. partes duas et unam Pulveris.

Pulvis anthelminticus s. vermifugus. (Wür.)

℞. Radicis Jalappae . semunciam.
— Valerianae,
— Filicis Maris,
Mercurii sacch., sing. drach duas.
Ferri sulph. exsicc. scrupulos duos.
Elaeosacchari Tanaceti semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus.

D. Queckſilber, mittelſt erdiger Subſtanzen zertheilt.

Mercurius alcalisatus s. cum Creta, Hydrargyrum cum Creta, Aethiops alcalisatus, Pulvis Mercurii et Cretae. (Du. Ful. Lon. LonN. Wir. Wür. *Gr. Pid. Re. Va.*)

℞. Mercurii . . . . . partes tres.
Cretae praeparatae partes quinque.
Tritura ad perfectam usque metalli extinctionem. (Lon. LonN. *Gr. Re. Va.*)

Ful. Wir. Wür. et *Pid.* loco cretae Oculos Cancrorum praep., caeterum easdem quantitates secundum Wir.; — Ful. Wür. et *Pid.* Mercurii unam et duas Oculorum Cancrorum.

℞. Mercurii,
Mannae, singulorum unciam unam.
Cretae praeparatae . semunciam.
Tritura mercurium cum manna et Aquae guttis aliquot ad perf. usque extinct; adde Mannae drachmam, continue triturando; mixtione perfecta massae infunde Aquae octarium, sepone per aliquot tempus et liquidum decantha; ablutione bis repetita, sedimentum humidum adhuc cum reliqua creta commisce et totum super charta josephina sicca. (Du.)

Gr. Cretae drachmam, caet. ut. antea.

Hydrargyrus s. Hydrargyrum cum Magnesia, Mercurius alcalisatus s. cum Magnesia. (Du. Li. *Gr. Re.*)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Magnesiae albae . unciam unam.
Tritura ad perf. extinct. (Li.)

Du. eundem pulverem quam pro praeparatione mercurii alcalisati indicat; — *Gr. Re.* Mercurii, Mannae, sing. unciam, Magnesiae semunciam.

Dieſes und das folgende Präparat ſind die beſten, welche man anwenden kann, wenn man metalliſches Queckſilber zu geben die Abſicht hat.

Boli mercuriales. (*Sa.*)

℞. Mercurii alcalisati semidrachmam.
Conservae Rosarum scrup. unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Topicum detersivum. (*Bo.*)

℞. Mercurii,
Cretae albae, sing. . semunciam.
Post extinctionem metalli adde
Mellis rosati . . . uncias duas.

Fouquet wendete dieſes Präparat auf veneriſche Geſchwüre an.

Liquor resolvens. (*Sm.*)

℞. Mercurii . . . semidrachmam.
Calcis vivae . . drachmas duas.
Tritura ad perfectam extinctionem usque et mixturam lagenae ingere repletae Aqua in solutione tenente
Saponis grisei drachmas quatuor.

Gilt als ein kräftiges Auflöſungsmittel bei kalten und ſchmerzloſen Geſchwülſten, beſonders bei Anſchwellungen der Schilddrüſe. — Man läßt ihn erwärmen und tränkt Compreſſen damit.

E. Queckſilber, mittelſt fetter und harziger Körper zertheilt.

Injectio hydrargyro - terebinthinata. (*Sw*.*)

℞. Mercurii,
Terebinthinae, sing. drach. duas.
Tritura per horam unam et adde deinde
Axungiae . . . semidrachmam.
Fiat cum
Mucilag. G. Arab. drach. duabus,
Aquae . . . . . unciis tribus emulsio. — Bei hartnäckigen Ausflüſſen aus der Harnröhre empfohlen. — Zwei Drachmen täglich dreimal.

Pilulae Mercurii terebinthinati. (*Sw*. Sy.*)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Terebinthinae . . partem unam.
Post extinctionem metalli fiat cum
Mucilag. spissi G. Arab. part. duabus emulsio, cui adde deinde
Panis albi biscocti (Biscuit) pulverati quantitatem sufficientem

ut fiant pilulae quinque granorum. (*Sw*.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinth. Venet. sesquidrachmam.
Metallum extingue addendo, si necesse, Essentiae Terebinthinae guttas aliquot; fiant cum
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
pilulae octoginta. (*Sy.*)

Sw. praeterea: Mercurii, Terebinthinae, sing. drachmas duas et post extinctionem, mixturae e Pulv Liquiritiae et Rad. Althaeae, sing. partibus aeq. q. s.

Pilulae mercuriales. (Fer. *Pic.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam
Terebinthinae . quantum sufficit ad extinctionem metalli; adde
Pulv. Succini,
— Liquirit., sing. . drach. duas.
Syrupi Althaeae . . . . q. s.
ut fiant pil. quatuor granorum. (*Pic.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Balsami Meccaënsis sesquiunciam.
Tritura ad extinct., exacte admisce
Massae Pilul. c. Opio
drach. unam.
Fiat massa pilularis. (Fer.)
Gabe, acht bis zwölf Gran.

Unguentum mercuriale s. mercuriale cinereum s. mercuriale simplex s. Oxydi Hydrargyri cinerei s. Hydrargyri s. Hydrargyri cinereum s. Hydrargyri sine et cum Terebinthina s. Neapolitanum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. GalM. Gen Han. Hass. HassP His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *B. Br. C. Ca. Fi. Gr. Pid. Ra. Re. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*

Da es eine lange und mühevolle Arbeit ist, das Queckſilber gänzlich zu zertheilen, ſo hat man, um dieſe zu beſchleunigen, verſchiedene Mittel vorgeſchlagen, welche auf ſieben zurückgeführt werden können, nämlich:

1) Zuſatz von Terpentin;
2) von etwas alter Queckſilberſalbe;
3) von einer kleinen Menge oxygenirter Salbe.

4) Verfahren Dufilho's. Man bringt das Queckſilber in eine Flaſche mit gewölbtem, ſpitzzulaufenden Grunde, füllt letztere zur Hälfte mit reinem Waſſer, ſchüttelt ſie einige Zeit lang, indem man die Oeffnung mit dem Daumen zuhält, läßt dann die Kügelchen ſich ſetzen, gießt das Waſſer ab und ſchüttet das Queckſilber auf das Fett; zwanzig Minuten ſind zu ſeiner Zertheilung hinreichend. Bompois bediente ſich, nach Fée, eines ähnlichen Verfahrens, welches darin beſteht, daß er acht Unzen Queckſilber und ſechs Unzen zerlaſſenen Schmeer mit zwei Unzen Baumöl in eine Flaſche von einem Litre Gehalt einträgt, letztere dann verpfropft und ſo lange ſchüttelt, bis das Gemiſch die Conſiſtenz eines Zuckerſyrups angenommen: hierauf das Ganze in einen Mörſer gießt und es eine halbe Stunde lang ſtark zuſammenreibt.

5) Verfahren Dumesnil's. Man thut vier Unzen Fett, ein Pfund Queckſilber und eine Unze ſüßes Mandelöl in einen Mörſer und ſchüttelt ihn eine Viertelſtunde lang gelinde um, welches zur gänzlichen Zertheilung des Metalls hinreichend iſt.

6) Verfahren Planche's. Man reibt das Queckſilber mit Eieröl zuſammen und ſetzt dann das Fett, wie gewöhnlich, hinzu.

7) Verfahren Hernandez's. Man erwärmt den Mörſer, um das Fett zu zerlaſſen, ſetzt dann das Queckſilber hinzu und reibt es zuſammen bis zum völligen Erkalten. Das Heſſiſche Dispenſatorium giebt ſchon ein ähnliches Verfahren an; man läßt nämlich das Fett am Feuer ſchmelzen und ſetzt es dann zurück, hierauf thut man, wenn es kalt zu werden anfängt, das Queckſilber hinzu, und reibt es zuſammen

Die Wirkung iſt, ungeachtet der etwas verſchiedenen Bereitungsart, ziemlich dieſelbe, aber Zuſatz von alter Salbe, Terpentin verurſacht einen unangenehmen Geruch und einen ſchmutzigen Ueberzug auf der Haut; ranzige Salbe bringt gern rothlaufartige Hautentzündung hervor.

Die Kenntniß der Verhältniſſe des Queckſilbers und ſeines Excipiens iſt dem Arzte wünſchenswerth — Dieſe Verhältniſſe bieten aber eine faſt unendliche Mannigfaltigkeit dar. Mehrere Pharmacopöen geben nur eine einzige, andere dagegen führen zwei und ſelbſt drei an. Sehr allgemein, jedoch nicht immer, führen die Salben, welche die geringſte Menge Queckſilber enthalten, den Namen *Unguentum griseum. Unguentum neapolitanum* wird ohne Unterſchied zur Bezeichnung beider gebraucht, obgleich, ſtreng genommen, nur die am wenigſten queckſilberhaltigen ſo genannt werden ſollten.

Man kann, nach dem Verhältniß des Queckſilbers zu den fetten, ihm als Excipiens dienenden Körpern, zehn Abtheilungen aufſtellen. Es kömmt nämlich das Queckſilber vor:

1) Im Verhältniß von 1 zu 1:

An. Ba. Bel. Du. Gal. GalM. Gen. Hass. LH. *Be. Br. Ca. Gr. Ra. Sp.* Mercurii et Axungiae Porci praep et

lotae, sing. unciam unam (libram unam LH.).

Fenn. Suec. Mercurii uncias duas, Axungiae Porci et Sevi Hirci, sing. unam.

Lon. LonN. *Gr.* Mercurii libras duas, Axungiae uncias viginti tres et Sevi ovilli unam (*Ungt. Hydr. fortius*, Blue ointment); — Fer. *Fi.* Mercurii libram, Axungiae uncias novem et Sevi tres; — *T.* Mercurii uncias quadraginta, Axungiae triginta et Sevi decem.

Sw. Mercurii uncias quatuor, Axungiae tres cum dimidia et Unguenti mercurialis semunciam.

Sy. Mercurii uncias duas, Sevi vervecini semunciam et Butyri Cacao sesquiunciam.

Pm. Adipis suilli depurati uncias novem, Sevi bovini depurati uncias tres, Terebinthinae uncias duas, Mercurii uncias quatuordecim.

Die letztere Salbe iſt etwas ſtärker, als die vorhergehenden, wie auch die von *Vm.* vorgeſchriebene:

Mercurii partes sedecim, Unguenti mercurialis partem unam.

Die folgenden ſind dagegen etwas ſchwächer.

Sar. Mercurii partem unam, Terebinthinae q. ad metalli extinctionem sufficiat, Axungiae partem unam.

Am. *C.* Mercurii partes tres, Sevi unam et Axungiae tres

GalH. *Ca. Re.* Mercurii unciam unam, Olei Ovorum recentis guttas viginti (decem *Re.*), Butyri Cacao in Olei Amygdalarum dulcium pauxillo liquefacti unciam unam.

Man bringt das Queckſilber und das Eieröl in einen kleinen, ſehr weiten marmornen Mörſer und reibt es eine Viertelſtunde lang zuſammen, andererſeits erwärmt man einen Porcellanmörſer und deſſen Keule und thut die Cacaobutter hinein; ſobald ſie flüſſig iſt, ſetzt man das durch das Eieröl zertheilte Queckſilber hinzu, indem man den Mörſer inſoweit warm erhält, daß die Butter in einem gewiſſen Grade flüſſig bleibt; man läßt dann den Mörſer allmälig erkalten, indem man das Reiben noch eine Viertelſtunde lang fortſetzt. (*Planche.*)

2) Im Verhältniß von 1 zu 2.

Du His. HisS. R. Sax. *Gr. Sw.* Mercurii partem unam et duas Axungiae. (Strong mercurial ointment *Gr.*)

Bor. Han. Pol. Mercurii libram, Sevi vervecini uncias octo, Axungiae Porci sedecim et Olei Citri drachmam; — Bor4 et HassP. Oleum citri omittunt: ut mercurius citius aboleatur, eum una cum sevo et portiuncula ejusdem unguenti, prius praeparati et nondum corrupti terere licet (HassP.). — Ed. Mercurii partem unam, Sevi vervecini et Axungiae, sing. unam; praeterea Unguenta duo alia indicat: unum cum duplo; alterum cum triplo Mercurii; — BorC. O. Mercurii partes duodecim, Sevi vervecini octo et sedecim Axungiae; — Ful. Mercurii semunciam, Sevi vervecini drachmam et Axungiae uncias duas; — Ba. Mercurii partes tres, Sevi vervecini duas et quatuor Axungiae; — Ams. Mercurii, Sevi, sing. semilibram, et Axungiae sesquilibram.

Br. Wir. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam, Axungiae Porci uncias decem et Olei ess. Lavandulae drachmam; — LP. Mercurii semilibram, Terebinthinae uncias duas, Axungiae libram unam et Cerae albae uncias tres.

3) Im Verhältniß von 2 zu 5

Sax. Mercurii partes quatuor, Terebinthinae q. s. ad extinguendum et Axungiae Porci partes decem.

4) Im Verhältniß von 1 zu 3.

Am. Ed. *C. Gr. Re.* Mercurii e protochlorureto calcis ope praecipitati partem unam et tres Axungiae; — *Pid.* Mercurii uncias duas, Terebinthinae drachmas quinque, Axungiae uncias quinque et Olei Olivarum semidrachmam; — Wür Mercurii unciam unam, Terebinthinae semunciam et Axungiae uncias tres; — RC. Mercurii unciam, Terebinthinae semunciam, Unguenti simpl. vel Adipis suillae drachmas quatuordecim.

5) Im Verhältniß von 1 zu 4 und 5:

D. Lus. Mercurii, Sevi, sing. unciam unam et tres Axungiae; — A. Mercurii uncias tres, Terebinthinae semunciam et Cerati citrini libram; — B. Bel. Mercurii partes duas, Unguenti oxygenati unam, Axungiae sex et unam Olei; — *Gr. Re.* sec. Du Ed. Gal. Mercurii, Sevi, sing. part. unam, Axungiae tres.

6) Im Verhältniß von 2 zu 7 und 9:

Gr. Merc. partem unam, Axungiae septem (Weak mercurial ointment); — Han. HassP. Li. Mercurii uncias quatuor, Terebinthinae duas et Axungiae sedecim. (*Unguentum mitius.* HassP.)

7) Im Verhältniß von 1 zu 6:

Gen. *Ra.* Mercurii unciam unam et

sex Axungiae; — *Vm.* Mercurii partes duas, unam Terebinthinae et Axungiae duodecim; — *Fi.* Mercurii uncias duas, Axungiae libram. (*Unguentum mitius.*)

Lon. LonN. *Gr. Re. Unguentum Hydrargyri mitius:* Unguenti mercurialis communis partem unam et duas Axungiae

8) Im Verhältniß von 1 zu 8:

Gal. GalM. Unguenti mercurialis unciam unam et tres Axungiae; — *T* Unguenti mercurialis, Sevi, sing. uncias decem, et Axungiae viginti.

9) Im Verhältniß von 1 zu 10:

An. Unguenti mercurialis uncias tres et Axungiae libram.

10) Im Verhältniß von 1 zu 16:

Ed. Unguenti mercurialis partem unam et tres Axungiae.

Nimmt man zu diesen zahlreichen, heutzutage sich findenden Verschiedenheiten noch die bereits in Vergessenheit gekommenen hinzu, so ist leicht einzusehen, mit welcher Vorsicht man bei Lesung älterer sowohl als neuerer Abhandlungen über syphilitische Krankheiten zu Werke gehen müsse, wenn man rücksichtlich des Mercurs als Heilmittel derselben, richtige Schlüsse daraus ziehen will. Wendet man heutzutage eine Salbe, aus gleichen Theilen Quecksilber und Fett bereitet, an, so reibt man gewöhnlich jedesmal eine halbe bis eine Drachme ein, wenn dieß täglich, und eine bis zwei Drachmen, wenn es bloß einen Tag um den andern geschieht. Selten reibt man mehr ein, und es ist auch gefährlich, dieß zu thun.

Ceratum mercuriale. (*Gr. Ra. Re. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Unguenti mercur. uncias quatuor.
Cerati simplicis . uncias decem.
Misce triturando.

Besonders zum Verbinden syphilitischer Geschwüre empfohlen.

Gr. Re. Cerae flavae, Axungiae Porci, sing. semilibram, Mercurii uncias tres, Balsami Sulphuris drachmam.

Unguentum Cerae cum Hydrargyro. (*Re.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias octo.
Axungiae praep. . uncias quatuor.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Unguenti mercurialis uncias sex.

Misce S. A. — Bei atonischen Geschwüren mit callösen Rändern.

Unguentum s. Pomatum mercuriale oxygenatum. (*Vm.*)

℞. Unguenti mercur. partem unam.
— oxygenati . . partes duas.

Ung. oxygenato liquefacto leni calore momento quo ut concrescat in eo est, ung. merc. admisce.

Unguentum digestivum mercuriale. (*Ra. Va.* Hosp Syph.)

℞. Ung. mercurialis,
— digest. simpl., sing. uncias quatuor.

Terendo misce. — Zum Verbinden venerischer atonischer Geschwüre empfohlen.

Balsamum mercuriale Plenkii. (*Sp.*)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae drachmam unam.
Trituratis ad extinct. usque adde
Axungiae Porci drachmas sex.
Balsami Arcaei drachmas novem.
Mercurii dulcis grana viginti tria.

Von Plenk zum Verbinden venerischer Geschwüre gerühmt.

Unguentum antiarthriticum. (*Sw.*)

℞. Unguenti merc. drachmam unam.
— Althaeae . drachmas tres.

Misce. — Man reibt mit einer Drachme von dieser Salbe Abends die von Gicht befallenen Theile ein; auch soll sie bei chronischer Leberentzündung in Einreibungen auf die Lebergegend, unter Zusatz von einer halben Drachme Kampfer, von Nutzen seyn.

Unguentum s. Pomatum mercuriale Sanchezii. (*Sm.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Mellis Narbonn. . drach. quatuor.
Post extinctionem metalli adde
Camphorae pulv. drach. quatuor.
Butyri Cacao . . . uncias octo.

Tritura per horas septuaginta. — In Einreibungen, von zwei Drachmen bis zu einer Unze

E. Unguentum mercuriale camphoratum: ex Unguenti simplicis uncia et Camphorae drachma.

Pilulae Unguenti mercurialis. (GalH. *Ra. Va.*)

℞. Unguenti mercur. unciam unam.
Amyli vel Pulv. Rad. Althaeae q. s. ut fiat pasta homogenea. (GalH.)

Ra. Va. Hosp. Char. Unguent. drachmas duas et Pulv. Liquirit. q. s. f. pil. centum quadraginta quatuor.

Pilulae mercuriales no. 3. dictae s. de

Sedillot. (*Bo. Ca. Pic. Ra. Va.* Hosp. Lud.)

℞. Unguenti mercurialis uncias tres.
Saponis medicinalis uncias duas.
Amyli vel Pulv. Liquirit. unciam.
Fiant pilulae quatuor ad sex granorum.

Va. Amyli uncias duas c. dimid et pil. parare pond. granorum quatuor.

℞. Unguenti mercurialis cum Butyro Cacao parati . . semunciam.
Sacchari pulverati drachmas duas.
Mucilaginis Gummi Arab. . q s. ut fiat massa in centum quadraginta quatuor pil. dividenda; addi possunt Saponis drachmae duae vel tres. (*Lagneau.*)

Ein unannehmliches Präparat, welches auch, besonders wegen des darin unbestimmt vertheilten Queckſilbers, zu verwerfen iſt: die Paſtillen Lagneaus oder die Plenckſchen Pillen ſind, hinſichtlich ihrer Annehmlichkeit und der genauern Beſtimmung des darin enthaltenen Queckſilbers weit vorzuziehen; man könnte den letztern nöthigenfalls durch Zuſatz von Seife eine purgirende Wirkung mittheilen.

Sapo mercurialis. (Hosp. Matern. *Va.*)

℞. Unguenti mercurialis uncias tres c. dimid.
Solutionis Sodae caust. uncias tres.
Triturando intime commisce et in modulos chartaceos immitte. — In Einreibungen bei Syphilis, Krätze ꝛc.

Unguentum pediculorum s. Sabadillae cum Mercurio s. cum Staphysagria s. de Staphysagria s. de Staphysagria compositum. (Br. Han. O. Pal. Pm. Sar. Wir. *Fi. Sp.*)

℞. Mercurii . . . sesquiunciam.
Axungiae Porci . sesquilibram.
Post extinctionem metalli adde
Staphysagriae pulv. unc. quatuor.
Misce bene. (Sar.)

℞. Mercurii puri . . . uncias tres.
Terebinthinae,
Olei laurini, sing. . uncias duas.
Adipis suilli depurati libras tres.
Semin. Staphysagriae subtil. pulv. uncias sex.
Mercurio cum terebinthina perfecte extincto, adde oleum, adipem et pulverem (Pm.)

℞. Mercurii . . . uncias duas.
Terebinthinae . . unciam unam.
Trituratis ad extinct. adde
Axungiae Porci . . libras tres.
Olei Lauri . . . . semilibram.
Pulv. Sabadillae . . uncias duas.
— Rad. Helleb. nigri unciam.
Misce intime (O.)

℞. Unguenti merc. uncias octodecim.
Pulv. Sabadillae,
— Staphysagriae, sing. unc. duas.
— Hellebori albi unciam unam.
Olei Lauri . . . uncias novem.
— Lavandulae . unciam unam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias tres.
Solve in Aqua et coque cum
Axungiae Porci . . libris tribus ad humidi consumpt. usque; adde
Olei Lauri . . . . uncias sex.
Pulv. Sem. Staphysagr. unc. duas.
— Rad. Helleb. albi . unciam.
Mercurii cum Terebinthinae unc. una ad extinct. triti unc. unam.
Misce sedulo. (Br. Han. Pal. Wir.)

Fi. Seminum Staphysagriae, Saponis Veneti, sing. uncias duas, Mercurii puri sesquiunciam, Terebinthinae q. s., Axungiae Porci uncias tres.

Emplastrum vel Unguentum Juchii. (*Vm.*)

℞. Mercurii . . . . . partes tres.
Terebinthinae . . partem unam.
Trituratis ad extinct. adde sensim
Sevi vervecini . partem unam, et tunc mixturam ex
Terebinthinae . . . parte una,
Cetacei parte una cum dimidia,
Cerae flavae . partibus quinque, liquatis et semiconcretis.

Emplastrum Hydrargyri s. cum duplici dosi Hydrargyri s. Ranarum cum Hydrargyro s. Protoxydi Plumbi cum Mercurio s. commune cum Mercurio s. Lithargyri cum Hydrargyro s. ex Hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale s. mercuriale resolvens, Ceratum de Ranis c. Mercurio reformatum s. mercuriale.

1) Ohne Blei. (Ba. Ful. Li. Lus. Sax.)

℞. Mercurii . . . . . partes tres.
Terebinthinae . . partem unam.
Tere ad extinct., tunc ad perfectam refrigerat. usque tritura cum mixtura liquefacta et semirefrig ex
Sevi ovilli part. duabus c. dim.
Cerae flavae part. quinque c. dim.
Serva. (Ba.)

℞. Mercurii cum parte tertia Terebinthinae extincti . partes sex.
Tritura cum mixtura liquata nec adhuc refrigerata e
Cerae flavae . partibus decem.
Cetacei . . . partibus tribus.
Sevi vervecini . partibus duabus.
Misce. (Sax.)

℞. Emplastri Cerae . libram unam.

Mercurii in Terebinthinae uncia una extincti . . uncias tres.
Misce triturando. (Li.)

Ful et Lus. Mercurii partem unam cum Terebinthina extinctam et Emplastri Cicutae vel alius partes sedecim.

2) Mit Blei. (Am. Ams. An B. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Ed. Fenn. Fer. Hass. HassP. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. Pal. Pm. R. Suec. Wir. Wür. *B. C. Gr. Fi. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Liquato lente adde
Unguenti mercurialis uncias tres.
Misce exacte. (Fer. *T.*)

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Olei sulphurati drachmam unam.
Trituratis ad extinct. adde sensim
Empl. Diachyli simpl. liquati libram.
Misce bene. (Lon. LonN. *B. C. Gr. Re.*)

℞. Mercurii . . . . partes tres.
Resinae Pini,
Olei Olivarum, sing. part unam.
Liquatis resinae et oleo et mixtis antequam refrixerint, adde mercurium et ad extinct. usque trituratis adde sensim
Empl. Diachyli simpl. fusi part. sex (quatuor *Gr.*)
et continuè agitando misce. (Am B. Ed. *C. Gr.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae semunciam.
Tritura ad extinct. et adde sensim
Empl. Diachyli simpl. fusi unc. duodecim.
Misce triturando. (DD.)

Hass. et *Pid* Mercurii, Terebinthinae, sing. uncias tres et Emplastri libram; — R. Mercurii uncias tres, Terebinthinae sesquiunciam et Emplastri libram; — *Sw.* Mercurii uncias octo, Terebinthinae drachmas tres et Emplastri libram; — D. et Wür. Mercurii cum Terebinthina ad disparitionem triti sesquiunciam et Emplastri libram; — *Fi.* Merc. sesquiunciam, Diachyl. simpl. libram, Terebinth. q. s.

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Axungiae Porci . sesquiunciam.
Sevi vervecini . . semunciam.
Tritura ad extinct. usque et adde sensim mixtur. liquefactam ex
Empl. Diachyli simpl. libra una.
Cerae flavae . . unciis tribus.
Misce bene. (Ams.)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Unguenti mercurialis,
Terebinth. Venet, sing. unciam unam.
Tritura ad extinct. usque, tunc adde mixturam liquatam ex
Empl. Diachyli gummosi lib. una.
Cerae flavae . . . . uncia una.
Misce in mortario leviter calefacto. (An. Bel.)

Pm. Hydrargyri uncias novem cum Terebinthinae duabus perfecte divide et exacte admisce Axungiae suillae depuratae uncias duas, tunc Emplastri simplicis libris quatuor liquatis per vices adde Unguentum mercuriale jam paratum et diligenter misce. — LP. Emplastri gummati libram unam, Mercurii in Terebinthina extincti uncias tres; — *Gr.* Emplastri simplicis libras viginti quatuor, Mercurii tres, Ungut. mercurialis fortioris q. s. ut mercurius dividatur.

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Terebinth. comm. drachmas tres.
Post extinctionem metalli adde
Empl. Diachyli simpl. uncias duas,
Cerae flavae . . . semunciam simul liquata. (Fenn. Suec.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol. Mercurii uncias octo, Terebinthinae quatuor, Emplastri libras duas et Cerae semilibram; — HassP. sing. cujusque partem dimidiam.

℞. Emplastri Diachyli gummati libram unam.
Mercurii Terebinthinae ope extincti . . . . uncias tres.
Fiat lege artis explastrum. (LH.)

℞. Mercurii . . . partes duodecim.
Terebinthinae Venetae partes tres.
Post extinctionem metalli tritura cum
Styracis liquidae partibus duabus.
Tunc adde
Olei Lauri . part. unam c dimid.
Mortario in aquam fervidam collocato, adde sensim
Empl. Diachyli simpl. part. quadraginta octo,
Cerae flavae . . . . partes tres liquata et bene mixta. (*Vm.*)

*Sw**. Mercurii uncias viginti, Terebinthinae quinque, Styracis tres, Olei Lauri duas cum dimidia, Emplastri septuaginta et Cerae unam cum dimid.

℞. Mercurii . . . . libram unam.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Tritura ad extinctionem et adde
Emplastri fusi de Vigo (Ranarum His3.) libras sex et uncias octo.
Misce bene. (His. His3.)

Wir. Emplastro de Vigo simpl. addere Mercurii in Terebinthina extincti sesquiunciam; — *Sp.* unciam unam; — Pal. uncias quatuor.

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Terebinthinae . . sesquiunciam.

Metallo extincto adde
Empl. Diabotani fusi libram unam.
Misce bene. (His.)

Reizend, auflöſend und ſchmelzend. Man wendet es auf ſchmerzloſe Geſchwülſte von Anſchwellung der Lymphdrüſen an. Die vorletzte Formel giebt das berühmte *Emplastrum de Vigo cum Mercurio*, welches ſich von den andern nur durch ſeine große Complication und deßwegen durch die weit geringere Wirkſamkeit unterſcheidet, indem das Queckſilber in demſelben durch eine abentheuerliche Zuſammenhäufung ganz verſchiedenartiger Ingredienzen gleichſam erſtickt iſt.

Cereoli mercuriales, Candelae probatoriae. (Gr. Vm.)

℞. Empl. mercurialis fusi partes tres.
Cerae flavae liquat. partem unam.
Misce bene, ut fiant cereoli.

Gr. Fila e membrana intestinali confecta (Darmsaiten) vel fascias linteas Emplastro Hydrargyri liquato calido immerge ut fiant cereoli.

Emplastrum Ammoniaci s. de s. ex Ammoniaco cum Mercurio s. mercuriale s. Hydrargyro s. mercuriale gummosum s. ammoniaco-mercuriale.

1) Ohne Blei. (Du. Lon. LonN. *Br. C. Ca. Gr. Re. Sp. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.
Terebinthinae . . . drachmam.
Post disparitionem globulorum adde
G. Ammon. liquati libram unam.
Misce bene. (Du. *Gr.*)

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.
Olei sulphurati drachmam unam.
Triturati ad extinct. adde
G. Ammon. liquati . libram unam.
Misce. (Lon. LonN. *Br. C. Ca. Gr. Re.*)

Vm. Mercurii partes novem, Balsami unam et Gummi triginta sex.

℞. Mercurii . . . . . uncias tres.
Bals. Sulph. Rulandi. drachmam.
Post extinctionem metalli adde
G. Ammon. liquati
unc. duodecim.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Misce. (*Sp.*)

2) Mit Blei. (Br. Gal. GalM. Sar. Wir. *Gr.*)

℞. Mercurii . . . . . uncias octo.
Terebinth. Venet. unciam unam.
Styracis liquidae . . semunciam.
Triturati ad extinct. adde
Empl. Diachyli simpl.
libram unam
antea liquati et cum
G Ammoniaci pulv. . semil bra mixti Misce bene (Br. Sar. Wir.)

Gr Mercurii uncias octo, Styracis liquidae sesquiunciam, Terebinthinae Venetae unciam, Diachyli simplicis libram, Gummi Ammoniaci sesquilibram, Vitrioli albi semunciam.

℞. Mercurii part. trecent. octoginta.
Terebinth. purae
part. sexaginta quatuor.
Styracis liq.
part. centum nonaginta duas.
Triturati in mortario ferreo ad extinctionem metalli, recipe.
Empl. Diachyli simpl.
part. ducent. quinquaginta.
Cerae flavae,
Resinae Pini, sing.
partes octoginta quatuor.
Liqua et mixturae semirefrigeratae adde mixturam ex
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Bdellii,
— Olibani,
— Myrrhae, sing.
partibus viginti
et deinde
Pulveris Croci . partes duodecim
et supremo mercurium extinctum; misce intime, addendo antequam penitus refrixerit
Olei ess. Lavandulae partes octo.
Serva. (Gal.)

℞. Mercurii partes nonaginta quinque.
Styracis liq.
part. quadraginta octo.
Tritura ad extinctionem usque. Seorsim et simul liqua
Emplastri Diachyli simplicis
partes trecentas duodecim.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Mixturae adde
Terebinthinae purae,
Resinae purae, sing. part. sedecim.
Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Myrrhae, sing. . partes quinque.
Admisce deinde
Pulveris Croci . . . partes tres
et massam mercurialem jam antea praeparatam. (GalM.)

Von dieſem Pflaſter gilt das ſchon bei'm Mercurialpflaſter Bemerkte.

Emplastrum ad bubones venereos.

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Tritis ad extinct. adde
Plumbi acet. cryst. drachmas tres.
Mixta exacte subige cum unaix liquata et semirefrigerata ex
Emplastri Ammoniaci,
— Meliloti,
— Cumini,
— Galbani,

Emplastri Sagapeni, sing. semuncia.

Emplastrum resolvens e quatuor fundantibus s. ex mixtis quatuor, quae dicuntur resolventia. (Gal. *B. Ca.*)

℞. Emplastri mercurialis,
— Diachyli gummosi,
— Cicutae,
— Saponis, sing. . part. aeq.
Liquata intime misce. (Gal. *Ca.*)
B. hoc emplastrum: *Emplastrum resolvens compositum* appellans, emplastrum saponis omittit.
Reizend, ſchmelzend, reifmachend.

Emplastrum Hydrargyri cum Conio s. resolvens cum Mercurio. (DD.)

℞. Emplastri Hydrargyri,
— Conii, sing. . semunciam.
Malaxentur.

Emplastrum Hydrargyri s. Mercurii cum Conio et Opio (DD.)

℞. Empl. mercur. c. Conio unc. unam.
Opii pulverati . semidrachmam.
Misce intime.

Axungia antipsorica. (*Vm.*)

℞. Peroxydi Plumbi
partes undecim cum dimidio.
Mercurii . . partes novemdecim.
Tritura, guttas aliquot Aquae addendo; post extinctionem cum massa siccata intime commisce
Axung. Porci . part. triginta octo.

Unguentum mundificans Stahlii. (Wir. *Sp.*)

℞. Mercurii
Plumbi, sing. . . unciam unam.
Plumbo liquato adde mercurium et mixta tritura cum
Tripelae . . . . . uncia una.
Pulverem deinde bene misce cum
Ung. albi camphorati . unciis octo.
Bei pſoriſchen, beſonders trocknen und pruriginöſen Hautkrankheiten empfohlen.

Emplastrum resolvens. (*Sm.*)

℞. Empl. de Vigo c. Merc. . unciam.
— Cicut c G. Ammon.
drachm. quatuor.
Mercurii . . . . grana triginta.
Minii . . . . drachmas duas.
Styracis liquidae . . . . q. s.
Fiat emplastrum.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Queckſilbers mehr oder weniger durch andere Subſtanzen modificirt iſt.

A. Durch Ammoniak.

Linimentum mercuriale s. mercuriale ammoniacale, Sapo mercurialis volatilis. (LP. *Ra. Va.* Hosp. Ven *Vm.*)

℞. Unguenti mercur. . partem unam.
Ammoniaci liq. concentr.
part. duas.
Tere in mortario et in vase bene obturato serva. (*Vm.*)

℞. Unguenti mercur. (e part. aeq.)
Ammonii liq., sing. . drachmam.
Olei Olivarum . . unciam unam.
Contere. (*Ra. Va.*)
LP. Mercurii in Terebinthina extincti emunciam, Olei communis uncias duas, Ammoniaci liquidi semunciam.
Reizend, in Einreibungen zur Auflöſung veneriſcher Leiſtenbeulen empfohlen.

Linimentum Hydrargyri s. Hydrargyri ammoniatum s. mercuriale ammoniacale camphoratum. (Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Unguenti merc. (e. part. aeq.),
Axungiae praep., sing.
unc. quatuor.
Camphorae . . . uncam unam.
Alcoholis (0,835) guttas quindecim.
Ammoniaci liquidi uncias quatuor.
Trituratae camphorae cum alcohole, cum axungia et cum unguento, sensim adde ammonium
Re. praeterea: Ung. merc. fort., Axung. praep., sing. drachmam unam, Camphorae duas, Solut. Ammoniae uncias quatuor. — Auf veneriſche Knoten bei Taubheit auf das Schläfebein.

B. Durch Arſenik.

Aethiops auripigmentalis. (Br.)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Auripigmenti . . . partes duas.
Tritura ad perf. extinct. usque.

C. Durch Kampher.

Unguentum mercuriale s. Hydrargyri camphoratum s. ad blennorrhagiam chordatam (*B. Br. Re. Sy.*)

℞. Mercurii,
Axung. Porci, sing. partem unam.
Tritura ad disparitionem globulorum et pro unciis duabus mixturae adde Camphorae semunciam. (*Br.*)
Sy. pro uncia una Unguenti cinerei Camphorae semunciam; — *B.* Unguenti duplicis et Camphorae, sing. part. aeq.; — *Re.* Ung. Hydrarg. fortioris unciam, Camphorae semidrachmam.

Bei Tripper mit chorda in Einreibungen längs der Harnröhre.

Unguentum resolvens, Pomatum mercuriale saponaceum. (*Sy.*)

℞. Unguenti cinerei . unciam unam.
Saponis nigri . . drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Tritura simul. — Bei Knochenhautentzündungen und Anschwellungen des Nebenhoden

D. Durch Eisen.

Aethiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (B*. *Sa. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Graphitae pulveratae partes duas.
Tritura ad perf. extinct. usque.
Wurde gegen Flechten gepriesen. — Gabe, zehen Gran.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (*B.*)

℞. Aethiopis graphitici drachmas duas.
Rhei . . . . . semidrachmam.
Extracti Cichorii . . semunciam.
Mellis despumati . . . . q. s.
Misce.

E. Durch Opium.

Linimentum mercuriale opiaceum s. antivenereum. (*Sm.*)

℞. Unguenti mercurialis (e partibus aequalibus) . scrupulos quatuor.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.
Laudani liq. Sydenh. . drachmam.
Misce bene. — Bei sehr entzündlichen Eichelgeschwüren, in Bädern oder Einspritzungen, je nach dem Zustande der Vorhaut, zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum mercuriale opiaceum. (*B. Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Unguenti mercurialis grana decem.
Opii . . . . . granum unum.
Misce. (*B.*)

℞. Pomati mercurialis,
Cerati opiacei, sing. . part. aeq.
Misce bene. (*Ra. Va*)

Chaussier verordnete oft zwei oder drei Einreibungen täglich auf den Unterleib aus einer Drachme der letztern Salbe gegen das Ende der Bauchfellentzündung als ein die Entzündung beendigendes Mittel.

Unguentum mercuriale opiatum. (*Ra.*)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) . . . . uncias quatuor.
Opii crudi pulverati . uncias duas.
Zum Verbinden heftig schmerzender venerischer Geschwüre.

F. Durch purgirende Substanzen.

Saccharum mercuriale compositum. (Br.)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Post perf. extinct. adde
Pulv. Rad. Jalapae . semunciam.
Misce bene

Pilulae purgativae. (*E.*)

℞. Massae Pilul. caerul. scrup. unum.
Pulv. Aloës grana viginti quinque.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Pilulae Hydrargyri et Rhei Hosp. Angl. (*Va.*)

℞. Pilularum coerulearum,
Pulveris Rhei, sing. drachmas duas.
Aquae . . . . . q. s.
Fiant pil. no 24 (½ gr. merc. sing.). — 1 oder 2 Stück ein oder zwei Mal täglich.

Pilulae Bellostii s. mercuriales, Massa mercurialis mollis.

℞. Mercurii . partes nonaginta sex.
Mellis albi
partes ducentas quinquaginta.
Triturat s ad extinct. adde
Pulv. Agarici albi,
— Aloës Soc., sing.
part. sedecim.
— Scammon.
part. sexaginta quatuor.
— Piper. albi part. duodecim.
Misce fiant pilulae in pulvere e Mechoacannae et Jalappae Alcoholis ope extractorum part. aeq. circumvolvendae. (GalF GalH.)

Dieß ist die eigentliche Formel dieser Pillen, welche zu gleicher Zeit als antisyphilitisches und als Purgirmittel berühmt sind. Sie sind auf sehr vielfach verschiedene Weise verändert worden, und daher hat man eine Menge *Pilulae mercuriales, neapolitanae, antivenereae*, welche sich nur durch die Wahl und die Gabe der dazu genommenen Purgirmittel von einander unterscheiden.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . . . partes quadraginta.
Tritura ad extinct. usque et adde
Aloës Socotrinae,
Agarici albi, sing. . partes octo.
Macidis,
Cinnamomi, sing. partem unam.
Fiant pilulae trium granorum. (GalM.)

Diese Formel hat Aehnlichkeit mit der Belloste'schen. Die folgende ist eine Abänderung der berüchtigten Pillen von Barbarossa durch Lemery, nach wel-

chen, wie bekannt, die Belloste'schen gemodelt sind.

℞. Mercurii . . . . drachmas sex.
Terebinthinae . quantum sufficit ad extinguendum metallum; adde
Pulveris Aloës . . drachmas sex.
— Agarici albi . semunciam.
— Rhei . drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*)

℞. Mercurii,
Terebinth. Venet., sing. unciam unam.
Trituratis ad extinct. adde
Scammonii,
Rhei,
Jalappae pulv., sing . . unciam.
Mellis depurati . . . . . q. s. ut fiat massa pilularis. (Fer.)

Fi. T. Mercurii uncias duas, caeterum ut Fer.

℞. Mercurii,
Scammonii, sing. . unciam unam.
Cremoris Tartari,
Resinae Jalappae,
Rhei, sing. . . . . semunciam.
Syrupi Sacchari, ... q. s.
Mercurio cum tartaro et syrupi pauxillo extincto adde reliqua, ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

Den Belloste'schen ähnlich sind auch die *Pilulae mercuriales purgativae*:

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Mellis . quantitatem sufficientem ad metalli extinctionem; adde
Pulv. Cinnamomi,
— Macidis, sing. partem unam.
— Aloës,
— Scammon., sing. part. octo.
Mellis . . . . quantum sufficit ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (Gal. *Vm.*)

Ihnen nahe verwandt sind auch die *Pilulae neapolitanae.*

℞. Mercurii . . . . drachmas sex.
Mellis Narbonnensis . . . q. s. ad extinctionem metalli; adde
Pulv. Aloës Socot. drachmas quatuor.
— Rhei . . . . drachmas tres.
— Scammonii . drachmas duas
— Agarici albi . . drachmam.
— Sassafras,
— Cinnamomi,
Pulv. Macidis, sing. . scrupulum.
Misce bene. (*Ca. Pie.*)

Baumé hat die Belloste'sche Formel auf folgende Weise verbessert:

℞. Mercurii,
Cremoris Tartari, sing. unciam.
Trituratis cum Mellis pauxillo ad disparitionem metalli adde
Pulv. Scammonii,
— Jalappae, sing. unciam unam.
Mellis despumati quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (An. *Sp.*)

Ra. Va. Hosp. d. Ven. Mercurii uncias tres, Cremoris Tartari grana decem, Scammonii, Jalappae, sing. drachmas tres et Syrupi q. s.; — *Vm.* Mercurii partes quatuor, Cremoris Tartari duas, Syrupi Sacchari q. s. ad extinct., Gummi Arabici partem unam, Jalappae, Scammonii, sing. quatuor et Syrupi satis ut fiat massa pilularis; — Pm. Mercurii unciam unam, Cremoris semunciam, Scammonii, Jalappae, singulorum unciam unam, Syrupi simplicis quantum satis. (℈j — ℥β)

℞. Mercurii,
Scammonii, sing. . unciam unam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Tritura ad disparitionem metalli usque, humectando cum Vini albi pauxillo et adde
Pulveris Jalappae unciam unam.
Misce bene. (*Ca*)

Gr. Hydrarg. libram, Sacch. uncias quatuor, Scammon., Rad. Jalap. sing. libram, Vini albi q. s., — nonnulli loco sacchari Cremorem Tartari.

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Terebinthinae Venetae . . q. s. ad extinctionem metalli; adde
Pulv. Scammonii,
— Jalappae,
— G. Guttae, sing. drach. duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s. ut fiat massa pilularis. (*Sa.*)

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Mannae in lacrymis unciam unam.
Pulveris Jalappae uncias quatuor.
Terebinthinae,
Florum Sulphuris,
G. Guttae pulv., sing. drach. duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s. ut fiat massa in pilulas granorum quatuor dividenda. (*Ca.*)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Mucilag. G. Arab. unciam unam.
Tritura ad perf. extinct. et adde
Extracti Ligni Guajaci,
Pulv. Aloës Socotrinae,
— Jalappae, sing. . semunciam.
Syrupi Rhei . . . . . q. s. ut fiat massa homogenea. (Sar.)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Tritura ad perf. extinct., Oxymellis q. s. adspergendo et adde tunc pedetentim
Pulv. Scammonii,
— Jalappae, sing. . . unciam.
Oxymellis . . quantum sufficit et sub finem
Kali nitrici . drachmam unam.
Camphorae . . . . grana sex.

Fiant pilulae granorum decem. (*Pie.*)
Begreiflicherweiſe iſt die Gabe nicht bei allen dieſen Pillen dieſelbe, ſondern nach der Wirkſamkeit der damit verbundenen Purgirmittel verſchieden. Die der Lemery'ſchen Pillen iſt eine Drachme; die der Baumé'ſchen eine halbe Drachme.

Pilulae Hydrargyri s. mercuriales. (*Gr.*)

℞. Hydrargyri . drachmas quinque
Terebinth. Argent. drachmas duas.
Contritis adde
Extracti cathart. . scrupulos tres.
Rhei . . . . . drachmam.
Praeterea: Hydrarg. uncias duodecim, Terebinth. comm. q. s., Rhei unc. duas et drachm. duas, Pulp. Colocynth. unc. quatuor. — Deſobſtruirend, alterirend, 5—20 Gr. zwei oder drei Mal täglich, gegen Syphilis ꝛc.

Pilulae contra taeniam. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . . . sesquiunciam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Post extinctionem metalli adde
Pulveris Aloës Socotrinae . q. s.
ut fiat massa in pil. gran. quatuor dividenda.

Pilulae ad gonorrhoeam. (*Bo. Pie.*)

℞. Aethiopis mineralis sesquiunciam.
Pulv. Rhei,
— Myrrhae, sing. drach. duas.
Syrupi Cichorii compositi . q. s.
Fiant pilulae granorum sex. — Barbeyrac ließ davon Morgens zweimal die Woche, zwei oder drei Monate lang nehmen.

Pulvis e Sulphureto Hydrargyri nigro s. vermifugus mercurialis. (Gal. Ham. *Re.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulv. Rad. Jalappae, sing.
drachmam.
— — Valerianae sylvest.
drach. duas.
Misce. (Ham.)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulv. cornachini, sing. part. aeq.
Tritura simul in mortario. (Gal. *Re.*)

Pilulae antiscrophulosae s. ad scrophulas s. Oxydi Antimonii et Sulphureti Mercurii. (Gal.)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulv. Scammonii, sing. uncias duas.
Oxydi albi Antimonii,
Asellorum praeparatorum,
Saponis amygdal., sing.
drach. tres.
Extracti Liquiritiae, vel Syrupi Quinque Radicum . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quatuor.

Tabellae anthelminticae. (Ful.)

℞. Aethiopis antimonialis,
Pulv. Rad. Jalapae, sing.
drach. tres.
— Flor. Tanaceti unciam unam.
— Cinnamomi . . drach. duas.
Sacchari albi cum Aquae unciis quatuor ad requisitam tabellar. spissitud. cocti . . unc. octo.
Fiant tabellae. — Gabe, eine bis ſechs Drachmen

Opiatum aperiens et purgans. (*Bo.*)

℞. Aethiopis mineralis . semunciam.
Electuarii lenitivi unciam unam.
Pulv. Sennae,
— Rhei,
— Jalapae,
— Asellorum, sing. drach. duas.
— Scammonii . drach. unam.
— Magnesiae sulph. semunciam.
Syrupi Quinque Radicum . q. s.
Bei Unterleibsverſtopfungen und Waſſerſucht. — Gabe, Morgens nüchtern eine Drachme.

G. Durch China.

Electuarium anthelminticum Heisteri. (Br. *Ca. Sp.*)

℞. Mercurii . . . . semunciam.
Gummi Arabici . unciam unam.
Aquae . quantitatem sufficientem.
Tritura ad perf. extinct. et adde
Chinae subtiliss. pulv.
unciam unam.
Syrupi Menthae quantum sufficit ut mixtura consistentiam electuarii mollis obtineat.
Die Gabe iſt nach dem Alter verſchieden. Gewöhnlich giebt man Morgens und Abends einen Kaffeelöffel.

H. Durch Schwefel.

Aethiops mineralis, Sulphuretum Mercurii s. Hydrargyri nigrum s. simplex, Hydrargyrus sulphuratus niger s. cum Sulphure, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Mercurius cum Sulphure, Pulvis hypnoticus, Aethiops narcoticus; mineraliſcher Mohr. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. Han. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. O. Pal. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Par. Re. Sp. T. Vm.*)

℞. Mercurii,
Florum Sulph. lot., sing. part. aeq.
Tritura in mortario marmoreo pistilli vitrei ope ad perfectam globulorum usque disparitionem et donec in pulverem nigerrimum sit conversum. (A.

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fer. Han. LH. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. Sax. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T.*)

LH. Mercurii uncias tres, Sulphuris sublim. semunciam; — LP. Mercurii uncias quatuor, Florum duodecim; — praeterea: Sulphuris liquefacti unciis quatuor addere Mercurii calefacti unam et spatulae ferreae ope miscere, vel: Solutioni Nitratis Mercurii addere aliam Sulphureti Potassae; — *Gr.* Merc. partem unam, Flor. Sulph. duas; — An. et Bor4. Aquae pauxillum addere jubent; — LonN. Mercurii uncias quadraginta, Florum Sulphuris octo; hydrargyrum cum sulphure ad ignem liquefacto misce et quam primum intumescat massa, vas ab igne remove et fortiter tege ne fiat inflammatio; deinde in pulverem tere et sublima. (*T.* cujusque partes aequales.)

Destouches mixturae inter operationem Kali hydrosulphuratum, *Geiger* Ammonium hydrothionicum adspergere.

℞. Mercurii . . . . partes duas.
Flor. Sulphuris lot. . part. unam
(partes quatuor His3)

Fac ut supra dictum. (A. Gal. His. His3. R. *Br*. Sp.*)

Br. Pal. et Wir. Mercurii partes tres et duas Sulphuris; — Sar. Mercurii duas et Sulphuris unam cum dimidia.

Vm. quatuor hujus nominis praeparata habet, nimirum: 1) *Aethiopem mineralem s. Sulphuretum Mercurii triturat.*, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope per horae quadrantem Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia et Mercurii novemdecim; 2) *Aethiopem mineralem Harrisii*, e Mercurii et Sulphuris sing. pro arbitrio, triturando mercurium cum sulphuris parte duodecima ad extinct., tunc alteram partem duodecimam et postremo successive reliquum sulphur addendo; — 3) *Aethiopem mineralem oxydulatum s. Sulphuretum Mercurii oxydulatum* (Sulfure de mercure à oxidule) triturando Sulphuris in baculis partem unam cum dimidia, Mercurii novem cum dimidia et Oxydi Mercurii rubri decem et quadrantem; 4) *Aethiopem mineralem trituratum duplum s. Supersulphuretum Mercurii*, triturando partes novem Mercurii et Sulphuris in baculis unam cum dimidia obtentum

In *Giornale di Chimica Fisica* etc. *di Pavia* Decad. II. T. 6. p. 497 sequens agendi modus indicatur: Mercurii purificati libram unam et Acidi sulphurici destillationis ope purif. tres in retorta balnei vaporis calori expone, massam ad siccum ferè redactam et refrigeratam, retorta fractâ, a fragmentis vitri mundatam in mortario porphyreo tritura, Florum Sulphuris uncias undecim admiscendo. Mixturam deinde in amplo catino fictili interne vitreato tracta cum Solutione aquosa Hepatis Sulphuris filtrata, in parvis partiunculis addenda et massam continue agitando, quae vivaciter effervescens colorem albo-cinereum et deinde obscurum accipit; sepone tunc per aliquot momenta et liquidum decantha; massae obscurae, quae subsedit, aliam quantitatem Hydrosulphatis sulphurati alcalini in excessu infunde, continue agitando et caloris mitis ope, donec pulchrum colorem nigrum acceperit. Repone, liquidum decantha et materiam pulverulentam residuam cum Aqua repetite ablue, donec haec saporis expers evadat. Exstillet aethiops obtentus supra filtrum chartaceum et levi calore siccatus trituretur. — Loco Sulphatis mercurialis Nitras Deutoxydi Mercurii ad siccum quasi redactus adhiberi potest triturando et bene miscendo cum Florum Sulphuris talibus dosibus ut sit pondus ejus pro mercurio ut 10 ad 12. Adhibetur deinde kali sulphuratum ut antea; — Etiam Sublimatus corrosivus (12 unc. in Aq. calidae suff. quant. et cum Flor. Sulph. unc. 7½ mixt.) eodem modo per kali antea dictum tractatur. (*T.*)

Der mineraliſche Mohr iſt ein bloßes Gemeng von Queckſilber und Schwefel. Martius hat ihn bereitet, indem er ein Gemeng von Schwefel und Queckſilber in einer Flaſche vierzehn Tage lang dem Mechanismus einer Sägemühle ausſetzte.

Reizend, gegen Syphilis und Würmer, aber nie allein angewendet.

Pulvis ad strumam s. antistrumalis. (*Sm.*)

℞. Aethiopis min. drachmas quatuor.
Oculor. Cancri praep. uncias duas.
Succini pulverati unciam unam.

Misce et in doses sexaginta quatuor divide — Anfangs täglich ein, dann zwei Stück in einem Glaſe Zuckerwaſſer.

Pulvis contra vermes s. vermifugus. (*Sp.*)

℞. Aethiopis mineralis drachmas duas.
Pulv. Helmintochorti semunciam.
Olei ess. Absinthii semiscrupulum.

Fuller empfahl dieſes Pulver bei Kindern; er gab davon Morgens und Abends eine Meſſerſpitze voll, was jedoch zu unbeſtimmt iſt, da ein Kind auf jede Gabe nur

zwei bis höchstens vier Gran Mohr erhalten darf.

Rotulae contra vermes. (Fer. Wir. *Fi.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Seminum Cinae,
Helmintochorti,
Cinnamomi, sing. scrupulos duos.
Sacchari albi in Aqua Ros. sol. et ad consist. tabulati coct.
unc. quatuor.
Fiant rotulae. (Wir.)

℞. Chocolatae . uncias quindecim.
Aethiopis mineralis drachmas sex.
Seminum Cinae . unciam unam.
Fiant rotulae septuaginta duae. (Fer.)

Fi. Chocolatae uncias tredecim, Aethiopis et Seminum ut Fer. sed in rotulas centum octoginta dividenda.

Opiatum vermifugum. (*Pie.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Sem. Hyperici,
— Rutae,
— Absinthii,
— Tanaceti, sing. . semunciam.
Syrupi Absinthii . . . . q. s.

Chirac gab Morgens und Abends eine halbe Drachme und ließ dann eine Abkochung der Wurzel des männlichen Farnkrauts trinken.

Electuarium alterans. (*Sa. Sw.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Resin. Guajaci, sing. semunciam.
Pulpae Prunorum unciam unam.
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Bei scabies und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Unguentum mundificans. (Wür.)

℞. Aethiopis mineralis unciam unam.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Misce triturando.

Unguentum e Sulphure hydrargyrato s. aethiopicum s. Mercurii sulphurati. (*Sw*. Vm.*)

℞. Flor. Sulphuris lot partem unam.
Unguenti mercurialis partes duas.
Diu contritis adde sensim
Axungiae Porci partes quindecim.
Misce bene. (*Vm.*)

Sw.* Sulphuris partem unam, Unguenti et Axungiae, singulorum duas.

In Einreibungen bei Krätze von Nutzen.

Unguentum antipsoricum. (*Sw*.*)

℞. Aethiopis mineralis unciam unam.
Saponis viridis . . semunciam.
Misce triturando et adde
Cerati camphorati sesquiunciam

Bei hartnäckiger Krätze. — Ebenso, wie die beiden vorhergehenden, mit Vorsicht.

Ceratum mercuriale. (LP.)

℞. Mercurii puri . . uncias duas.
Sulphureti saponacei (LP.) semilibram.
Cerae flavae . . . uncias tres.

Mercurium cum sulphureti uncia una ad perfectam extinctionem contritum commisce cum Cera flava et reliquo sulphureto bene contritis. — Bei alten Geschwüren, um Callositäten derselben zu zertheilen.

Ceratum antipsoricum. (*Vm.*)

℞. Aethiopis mineralis partes quatuor.
Sulphureti Plumbi praep. part. unam.
Commisce in mortario et adde
Cerati liquati . partes sedecim.
Tritura sedulo.

Pilulae resolventes. (*Sm.*)

℞. Aethiopis min. scrupulum unum.
Extracti Taraxaci drachmas tres.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae pulveratae semidrachmam.
Syrupi cujuslibet . . . . q. s.
Fiant pilulae granorum trium.

Finke pries diese Pillen bei Wassersucht von Verstopfung der Unterleibseingeweide. — Gabe, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae antiherpeticae. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . . . uncias duas.
Florum Sulphuris,
Kali sulphurici, sing. semunciam.
Camphorae . . semidrachmam.
Tritura ad extinct., adde
Resinae Guajaci . unciam unam.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Syrupi Dianthi quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. —

Von Barthez als schmelzend und Ausdünstung befördernd, bei Flechten und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück auf einmal.

K. Durch Schwefel und Spießglanz.

Cinnabaris Antimonii, Sulphuretum Hydrargyri. (*Gr.*)

Obtinetur productum secundarium in praeparatione butyri antimonii, ignem, postquam butyrum transierit, augendo.

℞. Mercurii . . libras quindecim.
Sulphuris . . . libras quinque.
Antimonii . . . sesquilibram.
Misce et sublima.

Aethiops antimonialis s. antimonialis Huxhami, Sulphuretum Hydrargyri et Stibii s. stibiatum s. Hydrargyri ni-

grum et Stibii s. Hydrargyri stibiatum, Hydrargyrum stibiato - sulphuratum, Spießglanzmohr. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br*. Ca. Fi. Pid. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi praep. uncias tres.
Sulphuris . . . . uncias duas.
Tritura ad perfectam extinct. usque. (Ams. B. Bel. Fenn. Hass. *Ca. Fi. Pid. T.*)

Gen. Hass. Li. et *Pid.* guttas aliquot Aquae addere jubent.

Li. Mercurii, Antimonii, sing. unciam, Sulphuris semunciam; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. Sax. et *Sw.* Mercurii, Sulphuris, sing. unciam unam et duas Antimonii (laevigati, Bor4.) Aqua humectata modico calore terere; — HassP. item et Aquam adhibet; — *Vm.* Mercurii partes novem cum dimidia, Antimonii quinque cum dimidia et Sulphuris unam cum dimidia.

℞. Mercurii,
Antimonii crudi praep., sing. part. aeq.
Tritura. (A. Ba. R.)

Br. D. O. Sar. Wir. *Br*. Sp.* et *Sw.* Antimonii partes duas et unam Mercurii.

℞. Mercurii partes tres cum dimidia.
Kermetis mineralis partem unam.
Tritura ad extinctionem usque. (*Vm.*)

Vm. praeterea Mercurii partes duas et tres Sulphuris Antimonii aurati; — Lus. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Sulphuris aurati; — Fer. Mercurii partem unam cum dimidia et unam Kermetis mineralis; — *Aethiops mineralis auratus, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum aurantiacum*: Merc. et Sulph. aurat. Antim. part. aeq.

℞. Aethiopis mineralis (sec. Giornal. d. Chim. praep.) uncias quinque
Oxydi Antimonii via humida parati unciam unam.
Contere bene in mortario vitreo vel porcellaneo. (*T.*)

Re. Aethiopem antimonialem reductum simili modo praeparare jubet.

Der Spießglanzmohr iſt ebenfalls nur ein Gemeng, welches metalliſches Queckſilber ſehr zertheilt enthält. — Gabe, ſechs bis zwanzig Gran.

Pulvis ex Aethiope antimoniali s. ex Hydrargyro stibiato-sulphurato. (BorC. WW. *Au.*)

℞. Aethiopis antimonialis grana sex.
Pulv. Rad. Liquirit. grana decem.
Misce bene. (WW.)

BorC. et *Au.* Aethiopis grana quinque et quindecim Liquiritiae.

Alle vier Stunden.

Pulvis ad herpetem. (Ham.)

℞. Aethiopis antimonialis,
— min., sing. semidrachmam.
Pulv. Resinae Guajaci,
— Radicis Liquiritiae,
— Magnesiae, sing. drachmam.
Misce intime.

Pulvis purificans. (*Huf.*)

℞. Resinae Guajaci semidrachmam.
Aethiopis antimonialis,
Magnesiae subcarb., sing. semiscrupulum.
Elaeosacch. Foenic. semidrachmam.

Gabe, für einen Erwachſenen in vier und zwanzig Stunden; Kindern von ſieben Jahren die Hälfte, von vier Jahren ein Drittel.

Pulvis Hydrargyri stibiato-sulphurati cum Cicuta s. aethiopicus. (*Au. Vm.*)

℞. Aethiopis antimonialis,
Faeculae siccae Cicutae,
Magnesiae subcarbonicae,
Sacchari albi, sing. partes aequales.
Misce triturando. — Gabe, vier bis ſechszehn Gran. — Von Hufeland bei chroniſchen Exanthemen der Kinder; aber lange Zeit fortzubrauchen.

Pilulae aethiopicae s. Mercurii sulphurato-stibiati. (*Sy.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Antimonii crudi . . uncias tres.
Sulphuris . . . . uncias duas.
Trituratis ad perf. extinct. adde
Mellis . sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas quinque granorum dividenda.

Pilulae aethiopicae s. aethiopicae compositae. (D. Ham. LH. Lus. Wir. Wür. *Au. Sp. Vm.*)

℞. Aethiopis antimon. unciam unam.
Extracti Guajaci pulv. semunciam.
Mellis . . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Lus.)

℞. Aethiopis antimonialis,
Resin. Guajaci, sing. drachmam.
Extr. Dulcamarae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

℞. Aethiopis mineralis,
Pulv. Reguli Antimonii medicin.,
— Resin. Guajaci, sing. semunciam.
Extr. Sarsaparillae unciam unam.
Fiat massa pilularis. (Wir. *Sp.*)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Mellis . . . . . semunciam.
Trituratis ad perf. extinct. adde
Pulv. Sulphuris Antimonii aurati,
— Resin. Guajaci, sing.
semunciam.
Mucilaginis Gummi Arabici q. s. ut fiat massa homogenea. (Wür.)

LH. Mercurii, Sulphuris aurati et Guajaci ut antea, sed Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam sine melle.

℞. Mercurii . . . . partes tres.
Sulphuris Antimonii aurati,
Mellis albi, sing. . partes duas.
Post extinctionem metalli adde
Pulv. Gummi Arab. partem unam.
— Resinae Guajaci partes duas.
Syrupi Sacchari . . . . q. s. ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii . . . drachmas sex.
Sulph. aurati Antim. semunciam.
Trituratis ad extinct. adde
Saponis Hispanici,
Pulv. Res. Guajaci, sing.
semunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (D.)

℞. Aethiopis antimonialis,
— mineralis, sing. drachmam.
Extracti Cicutae sesquidrachmam.
Pulv. Herb. Cicutae
semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

Dieſe und die vorhergehenden Pillen ſind als reinigend und ſchmelzend in Ruf. Man empfiehlt ſie beſonders bei Krätze, Waſſerſucht und bösartigen Geſchwüren. — Gabe, bis zu einer halben Drachme.

Pilulae Baldingeri. (*Sm.*)

℞. Mercurii . . drachmam unam.
Antimonii crudi scrupulos quatuor.
Florum Sulphuris scrupulos duos.
Opii puri . . scrupulum unum.
Misce exacte triturando cum
Syrupi Althaeae . . . . q. s. ut fiant pilulae centum quinquaginta.

Hurham empfahl dieſe durch Baldinger veränderten Pillen bei veneriſchen Knochenſchmerzen und weißem Fluß, bei Kopfgrind, Scropheln, Krätze. — Gabe, fünf bis ſechs Stück täglich.

Pilulae diaphoreticae. (*Pie.*)

℞. Aethiopis antimonialis,
Resinae Guajaci, sing. semunciam.
Saponis albi,
Extr. Dulcamarae, sing. unciam.
Conservae Fumariae,
Syrupi quinque Radicum aperient., sing. . . . . q. s.

Gabe, vier Stück Morgens und Abends.

Boli in necrosi syphilitica s. antivenerei. (*B.*)

℞. Merc. praecip. rub. granum unum.
Aethiopis antim.
grana quadraginta octo.
Roob Sambuci,
Pulv. Liquirit., sing. . . . q. s.

Fiant boli octo. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Electuarium purificans. (*Sm.*)

℞. Mercurii,
Antimonii crudi, sing. semunciam.
Resinae Guajaci . unciam unam.
Post extinct. adde Roob Sambuci cum Aquae Sambuci destillatae tertia parte diluti q. s. ut fiat electuarium.

Von Herrenſchwand bei ſyphilitiſchen Hautkrankheiten geprieſen. — Gabe, zweimal täglich eine Drachme, indem man mit einem Scrupel anfängt und allmälig ſteigt.

Electuarium antiherpeticum s. ad herpetem. (*Bo.*)

℞. Mercurii . . scrupulum unum.
Florum Sulphuris,
Reguli Antimonii, sing.
semunciam.
Extracti Dulcamarae,
— Pulsatillae nigricantis,
Pulv. Jaceae, sing. drachmas duas.
Camphorae . drachmam unam.
Syrupi Fumariae . . . . q. s.

Bei hartnäckigen, beſonders ſogenannten ſcrophulöſen und veneriſchen Flechten gerühmt. — Gabe, eine Drachme Morgens und Abends.

Oxydum Mercurii.

§. I. Mit metalliſchem Queckſilber gemiſcht.

Aethiops per se. (*Gr.*)

Paratur conquassando mercurium in lagena ampla, vel triturando cum Aqua.

Mercurius cinereus s. niger s. solubilis Moscati, Pulvis cinereus Hydrargyri, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii nigrum s. cinereum, Oxydum hydrargyrosum, Oxydum hydrargyricum praecipitatum, Oxydulum Hydrargyri nigrum, Protoxydum Mercurii, Hydrargyrum oxydulatum nigrum. (A. Am. B. Bor. Ed. Fenn. Fer. Lon. LonN. LP. Pm. Suec. *Bo. C. Fi. Gr. Par. Re. Sw. T.*)

℞. Mercurii dulc. pulv. partem unam.
Solutionis Kali caust. partes tres.
Aquae dest. partes sex (libram).
Coque, subinde agitando, per horam; pulverem Aqua frigida bene lotum,

blando calore sicca. (A. Fenn. Fer. Fi. T.)

Pm. Mercurii dulcis unciam cum Potassae caust. duabus in Aquae dest. sex solutis per semihoram coquere, oxydum pluries Aqua dest. abluere, donec saporis omnino expers evadat, et siccare; — LP. Mercurii dulcis unciam unam, Solutionis Sodae concentratae quatuor; — Du. Re. Calomellis partem unam, Potass. caust., Aquae ferv., sing. quatuor.

Bo. Natrum causticum et *Sw**. Barytam causticam adhibent.

Bor. Mercurium dulcem praecipitatum, adhuc ex praeparatione humidum, in loco frigido et obscuro macerare cum Solutionis Kali caustici q. s., et pulverem cum Aqua saepius lotum siccare.

℞. Mercurii dulc. pulv.
partem unam.
Aquae Calcis . . partes viginti.

Coque, continue agitando per horam, liquorem decantha, et magma aequali Aquae Calcis quantitate infusa coque; pulverem cum Aqua calida bene lotum lente sicca. (B.)

Ed. et *C.* Mercurii dulcis semunciam, Aquae Calcis libras quinque semel per horae quadrantem ebullire; — Am. Lon. LonN. *Gr. Re.* Mercurii dulcis unciam unam et Aquae Calcis octarios octo.

Reizend, Speichelfluß und Purgiren bewirkend. — Gabe, von einem achtel bis zu zwei Gran.

Pulvis Mercurii Moscati. (*Au.*)

℞. Mercurii solub. Moscati grana tria.
Sacchari . . . sesquidrachmam.
Opii . . . . . grana duo.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

Boli resolventes. (*B.*)

℞. Natri subcarbonici scrupulos duos.
Mercurii dulcis . . grana sex.
Roob Sambuci,
Pulv. Liquirit., sing. . . . q. s

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Mercurii solub. Moscati gr. unum.
Extracti Cicutae . . grana tria.
— Dulcamarae . . . . q. s.

Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Die ersten dieser Bissen werden bei schleichenden Entzündungen, besonders des Bauchfells, empfohlen; die andern bei kalten Geschwülsten, scrofulösen oder gichtischen Geschwülsten und Anschwellungen der Eingeweide nach Entzündungen.

Pilulae Hydrargyri Oxydi cinerei. (*Re.*)

℞. Oxydi Hydrarg. cinerei
drachmas duas.
Conservae Rosarum . . . q. s.

ut fiant pil. no. 60. — Ein oder zwei Stück Abends und Morgens.

Pilulae antivenereae. (*Au.*)

℞. Mercurii solub. Moscati drachmam.
Micae Panis . . . . . q. s.

ut fiant pilulae sexaginta. — Gabe, ein Stück täglich.

℞. Mercurii solub. Moscati grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.

ut fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein bis zwei Stück täglich.

Boli antisyphilitici stomachici. (*B.*)

℞. Mercurii solubilis Moscati
granum unum ad quatuor.
Extr. Gentianae drachmam unam.

Fiant boli tres. — Den Tag über zu nehmen.

Boli resolventes et antisyphilitici. (*B.*)

℞. Mercurii solubilis Moscati
granum unum cum dimidio.
Extracti Aconiti grana duodecim.

Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Pilulae antiarthriticae s. ad arthritidem. (*Au.*)

℞. Mercurii solub. Moscati gr. decem.
Opii puri,
Extr. Cicutae, sing. grana quinque.
Sulph. Antimonii aur.
scrup. unum.
Resinae Guajaci drachmam unam.
Balsami Copaivae . . . . q. s.

Fiant pilulae ponderis grani unius. — Gabe, zwei bis vier Stück alle zwei Stunden.

Pilulae resolventes. (*Au.*)

℞. Mercurii solub. Moscati
scrupulum.
Extracti Millefolii drachmas duas.
— Hyoscyami scrupulos duos.
Rhei pulveratae scrupulum unum.

Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, funfzehn Stück täglich, auf drei Mal, bei Drüsenanschwellungen.

Pilulae mercuriales Moscati. (*Bo. Ca.*)

℞. Mercurii solub. Moscati
scrup. duos.
Extr. Opii gummosi gr. duodecim.
— mollis Chinae drachmas duas.

Misce ut fiant pilulae viginti.

Jeromel schlägt statt der Plenckschen

Pillen folgende Formel vor, welche der eben angegebenen ähnlich ist:

℞. Merc. solub. Moscati drach unam.
Pulv. Rad. Althaeae drach. quatuor
Extracti Cicutae drachmam unam.
Fiant pilulae ponderis gran. duorum.

Trochisci cum Oxydo Mercurii nigri et Saccharo aromatisati Swediaur. (*Fi. T.*)

℞. Mercurii Moscati unciam unam.
Olei volatilis Citri guttas viginti.
Sacchari albi pulver. uncias duas.
Fiat cum Mucilagine Gummi Arabici pasta in trochiscos 288 dividenda. (*Fi.*)

T. Sacchari uncias quatuor et Mucilaginem Tragacanthae, caeterum ut *Fi.*, ut fiant trochisci octo circiter granorum. — Von ersteren enthält jede zwei, von letzteren jede ungefähr einen Gran merc. solub.

Aqua nigra s. Hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra, Lotio Hydrargyri s. nigra s. Hydrargyri nigra, Black wash. (B*. DD. *Au. E. Gr. Re. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Merc. dulcis pulv. gr. sedecim.
Aquae Calcis . uncias quatuor.
Misce triturando. (DD.)

B*. *Au. Gr. Re.* Mercurii dulcis drachmas duas et Aquae Calcis libram; — *Vm.* Mercurii dulcis scrupulos duos et Aquae Calcis uncias viginti octo; — *E. Sw.* et *Sy.* Mercurii dulcis drachmam et Aquae Calcis uncias quatuor.

In Waschungen, besonders bei den Engländern, bei sogenannter venerischer Krätze, altem weißen Fluß und bisweilen auch zum Verbinden venerischer Geschwüre.

Injectio vaginalis cum Mercurio s. mercurialis. (*Au. B.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae Calcis . . sesquiunciam.
— Plantaginis . uncias tres.

Dreimal täglich bei Blennorrhöe mit etwas örtlicher Anschwellung. (*B.*)

Au. Mercurii dulcis, Gummi Arabici, sing. drachmam, Aquae purae et Aquae Calcis, sing. uncias duas.

Unguentum Hydrargyri fortius, Donovan's Ointment (*Gr. Re.*) ex Oxydi Hydrargyri nigri granis viginti uno et Axungiae uncia una ad 350° F. part.; vel (*Gr.*): liquando Ung. merc. comm. in Aquae balneo et lente refrigerato, stratum superius griseum separando; residuum cum Magnesia alba terendo, pars major hydrargyri reducitur; vel: Unguent. Oxyd. Hydr. ciner. per horas aliquot aestui circiter 360° exponendo.

Mercurius solubilis Morettí. (Gal. *Ca. Sw.*)

℞. Mercurii . . . uncias quinque.
Acidi sulph. concentr. uncias sex.

Immitte in retortam vitream supra balneum arenae et adaptato recipiente destillationem, igne sensim aucto, continua donec nulli amplius vapores evolvantur; vasibus tunc refrigeratis, sal e retorta desumptum tritura in mortario vitreo cum

Mercurii . . . unciis quinque ad perfectam combinationem usque. Coque deinde massam cum

Kali caust. in Aqua dissol. q. s.

Totum filtro immitte et iterum cum kali coque, donec praecipitatum in Acido acetico penitus dissolvatur, quod deinde cum Aqua pura bene ablutum in loco umbroso siccetur. (*Ca.*)

*Sw**. fere eundem agendi modum sed Natrum causticum indicat.

Dieser ist die folgende Formel ähnlich:

℞. Protonitratis Mercurii part. unam.
Aquae destillatae partes sedecim.
Solutioni sensim infunde
Kali puri liquidi . . . . q. s.

vel tantum, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem cum Aqua ablutum sicca. (Gal.)

Gabe, wie bei'm Moscatischen Quecksilber, von welchem es sich im Grunde nicht unterscheidet. Ehedem betrachtete man beide als Protoxyde des Quecksilbers; Guibourt hat aber erwiesen, daß sie bloß ein Gemisch von sehr zertheiltem Quecksilber mit rothem Oxyd sind.

Unguentum ad scabiem s. antipsoricum. (*Sw.*)

℞. Mercurii praecipitati rubri,
Mercurii, singulorum partem unam.
Sulphuris praecip. partes sedecim.
Triturandis ad extinct. adde
Axungiae . partes triginta duas.

Obgleich diese Salbe in der Krätze nicht sehr zu empfehlen ist, so verdient sie doch den Vorzug vor der Double- und Plenche'schen, von denen später die Rede seyn wird. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, je nach dem Alter des Kranken, Abends in Einreibung.

Unguentum Hydrargyri griseum. (*Sw. Sy.*)

℞. Merc. praecip. rubri partem unam.
Mercurii . . . . partes tres.
Triturandis ad extinct. adde
Axungiae Porci . . partes octo.
Misce bene. (*Sw.*)

Sy. Oxydi partem unam, metalli et Axungiae, singulorum quadraginta octo.

Man glaubte, durch dieſe Miſchung den Uebergang des Queckſilbers in den Zuſtand des Protoxyds zu beſchleunigen; dieß findet freilich nicht ſtatt, jedoch iſt die Salbe etwas wirkſamer als die gewöhnliche Queckſilberſalbe.

Unguentum griseum camphoratum. (*Au.*)

℞. Ung. grisei . drachmam unam.
— albi camphor. . drach. tres.

Lentin empfahl dieſe Salbe in Einreibungen bei ſogenannten aſtheniſchen Rheumatismen.

§. II. Im Zuſtande der Reinheit.

Dieß iſt das Oxydum Mercurii rubrum, Deutoxydum oder Peroxydum Mercurii genannt, als man das Metall für zweier Oxydationsgrade fähig hielt.

Li. führt es in der Materia medica auf, giebt aber noch außerdem das Bereitungsverfahren an

A. Im Zuſtande des Hydrats.

℞. Solut. Sublim. corros. aquosae q. vis.
— Potassae causticae . q. s.
Hanc illi infunde, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem ablutum sicca. (Suec.)

Aqua muriatico-mercurialis rubra s. phagedaenica, Hydrochloras Calcis solutus Hydrate Deutoxydi Hydrargyri mixtus, Liquor Muriatis Deutoxydi hydrargyro-calcarei, Lotio flava s. lutea Hydrargyri, Solutio Muriatis Calcis hydrargyrata, Yellow wash. (Ams. An. Ba. Bor4. DD. Fer. GalH. GalM. Han. HassP. His. His8. Pm. R. Sar. Wir. Wür. *Br. E. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Aquae Calcis . uncias quatuor.
Tritura sublimatum, aquam sensim addendo. (An. DD.)

Han. R. et Wir. Sublimati grana viginti quatuor et Aquae Calcis uncias sedecim; — GalM. Sublimati grana novemdecim et Aquae Calcis octarium; — Pm. Sublimati scrupulum unum, Aquae Calcis libram unam; — *Gr. Sp.* Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis uncias duodecim; — *Re.* Sublimati grana quindecim, Aq. Calc. octarium; — Ams. et Wür. Sublimati semidrachmam et Aquae Calcis libram; — *Vm.* Sublimati drachmam et Aquae Calcis uncias triginta duas; — Ba. Sublimati drachmas duas et Aquae Calcis uncias duodecim; — His. Sublimati granum unum ad tria et Aquae Calcis unciam; — Fer. *Fi.* Sublimati grana viginti et Aquae Calcis libram.

Bor4. Sublimati grana viginti quatuor, Aquae Calcariae uncias sedecim; — HassP. Sublimati grana duo, Aquae Calcis sesquiunciam.

℞. Sublimati corrosivi . part. 1¼.
Aquae . . . . . partes 875.
Solutioni adde
Aquae Calcis . . . partes 1,000.
Misce bene. (GalH.)

Br. Sublimati scrupulum unum in Aquae q. s. solvere et addere Aquae Calcis uncias sedecim; — *T.* Sublimati grana octo, Aquae destill. drachmas tres, Aquae Calcis secundae recentis uncias quatuor.

℞. Sublimati corr. drachmam unam.
Aquae Calcis . . libram unam.
Solutioni adde
Aquae Vitae . . uncias quatuor.
Misce bene. (Wir.)

Sw. et *Sy.* Sublimati grana triginta ad sexaginta, Aquae libras duas et Aquae Vitae semilibram.

Dieſes Präparat beſteht aus einer ſehr verdünnten Auflöſung des ſalzſauren Kalks, durch einen Niederſchlag getrübt, welcher ſich, wenn er eine gelbe Farbe hat, als Hydrat des Queckſilberdeutoxyds und wenn er eine rothe oder beſſer ziegelrothe Farbe hat, als ein Gemiſch des Deutochlorürs mit dem Deutoxyd verhält.

℞ Sublimati corr. drachmam unam.
Aquae Calcis primae libras duas.
Tritura. (Sar.)

Da die aqua calcis prima etwas Kali enthält, ſo findet ſich hier in der Flüſſigkeit ſalzſaures Kali vor.

℞. Sublimati corr. scrupulum unum.
Kali subcarbonici drachmam unam.
Tritura in mortario vitreo, sensim addendo
Aquae destillatae . libram unam.
Misce bene. (His. His8.)

Dieſes Präparat kommt dem vorhergehenden nahe, unterſcheidet ſich aber dadurch, daß das aufgelöſ'te Salz bloß hydrochlorſaures Kali und der Niederſchlag kohlenſäuerlich s Queckſilber iſt.

Dieſes Waſſer, welches man mit Unrecht Aqua phagedaenica nennt, wird als Waſchmittel gegen veneriſche, ſcrophulöſe oder andere Geſchwüre von freſſendem und bösartigem Character angewendet. Es muß vor der Anwendung umgeſchüttelt werden, um den Bodenſatz in demſelben gleichmäßig zu vertheilen, von welchem es, wenn nicht die ganze, doch wenigſtens den größten Theil ſeiner Wirkſamkeit hat.

Aqua aloëtica mercurialis. (Ful. *Sp.*)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aquae Calcis . uncias duodecim.
Solutioni adde
Pulveris Aloës . . drachmas sex.
Mellis rosati . . sesquiunciam.
Misce. (*Sp.*)

Ful. Sublimati scrupulum, Aquae Calcis libram, Salis Ammoniaci grana duodecim et Extracti Aloës gummosi decem.

Wie das vorhergehende zum Verbinden von Geschwüren, aber wirksamer und reizender.

Aqua cosmetica. (*Vm.*)

℞. Amygd. amar contus. . unc. sex.
Decocti Carnis bub. et vitul. concentr. . unc. sexaginta quatuor.
Fiat emulsio, cui adde mixturam ex
Sublimati corrosivi . . semuncia.
Succi Citri . . . unciis decem.
Liq. concent. Kali subcarb. semuncia.
Commisce sensim cum
Albuminis subacti . . unciis sex.
Colatis per pannum adde deinde
Camphorae cum Mucilaginis Gummi Arabici semidrachma in emulsionem redactae semidrachmam.

Ein fortwährender Gebrauch würde Gefahr bringen; daher verwerflich.

B. Mittelst des Feuers bereitet.

Hydrargyrus s. Hydrargyrum s. Mercurius calcinatus, Oxydum Mercurii s. Hydrargyri s. Hydrargyri rubrum per ignem, Calx Hydrargyri rubra, Arcanum corallinum Mercurius praecipitatus per se, Praecipitatum per se.

℞. Mercurii . . . . quantum vis.
In retortam fundi latioris et plani immitte ita, ut stratum quatuor linearum crassitiem formet; collum prope lampadem extrahe; tunc vase balneo arenae imposito, coque metallum, donec ferè penitus in pulverem rubrum sit conversum. (Du. Fer. Gal. Lon. LonN. LP. Wür. *Br. C. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

C. Mittelst Salpetersäure bereitet.

Hydrargyrus nitratus ruber, Hydrargyrum oxydatum rubrum s. rubrum praeparatum, Hydrargyri nitrici Oxydum s. Nitrico-Oxydum, Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. praecipitatus s. praecipitatus corrosivus s. nitratus ruber s. praecipitatus ruber praeparatus s. calcinatus ruber, Praecipitatus ruber, Deutoxydum Mercurii, s. Hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per Acidum nitricum s nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum, Oxydum hydrargyricum s. hydrargyricum praeparatum, Panacea Mercurii rubra, Pulvis Joannis s. Johannis s. Johannis de Vigo s. de Vigonis s. Principis, Oxodes Hydrargyri rubrum, Hyperoxodes Hydrargyri, Deutoxydum s. Peroxydum Hydrargyri; rother Präcipitat.

℞. Mercurii . . . . quantum vis.
Acidi nitrici (32°) . . . . q. s.
ut omne metallum solvatur; intromitte in retortam fundi latioris et in arenam tepidam impositam, superfunde acidum et parumper calefac; dissolutione peracta, igne aucto liquor ad siccum evaporet; ignem deinde ita auge ut vapores nitrosi solum evolvantur et massa pulchrum colorem rubrum accipiat, quam post refrigerationem serva. (A. Ams. B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Br. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

His. Mercurii, Acidi part. aeq.; — LH. Mercurii uncias sex, Acidi nitrici 32° octo; — Bor4. Mercurii in Acidi nitrici q. s. soluti libram in vase idoneo igne primum leni deinde fortiori ad siccum evaporare, tum Mercurii libram unam addendo ad extinct. terere, pulverem in vase fictili non vitreato latioris fundi, interdum spathula vitrea movendo prudenter urere, donec colorem rubicundum referat. — Parari potest quoque ex Praecipitato rubro venali si satis purus prostat, coquendo Aquae destill q. s., liquorem decanthando et residuum ablutione edulcorando (Bor4.); — *Gr.* Mercurii, Aquae fortis compositae, sing. libram, dissolve, decantha et in balneo arenae ad ruborem vapora; vel: Mercurii, Acidi nitrici, sing. uncias duodecim, Acidi muriatici drachmam dissolvere et evaporare; — vel: Solutionem Mercurii in Acido nitrico caloris ope, evaporare, donec massa sicca relinquatur, quae calcinetur in vase amplo, usque non amplius vapores rubros emittat; vel: Mercurii libras tres in Aquae fortis quinque dissolvere, digerere per biduum, destillare ad siccum etc. et postremo massam calcinare.

Ki. Mercurii uncias quindecim, Acidi nitrici diluti libras duas et in universum eundem agendi methodum; — LP. Mercurii, Acidi, singulorum libram unam, solve et in vase vitreo balneo arenae imposito calefac, ignem

augendo ut acidum dissipetur, et pulvis ruber remaneat.

℞. Mercurii . . . . partes duas.
Solve coquendo in
Acidi nitrici . . partibus tribus
et solutionem exsicca; sal siccum subtilissime pulveratum cum
Mercurii . . . partibus duabus
Aquae pauxillum adspergendo ad extinct. usque contere; in cucurbita vitrea latioris fundi, agglutinato alembico et adaptato excipulo Aquae uncias aliquot continente etc. torreatur massa igne lento sensim aucto, donec cucurbitae collum pelluceat ac massa colorem atro-rubrum acquirat. Haec refrigerata squamas splendentes rubras exhibet, quae protracta calcinatione, donec loco vaporum nitrosorum Gas Oxygenium emittere incipiat, dein coctione in Aquae destill. partibus decem digestione tandem calida per horas aliquot cum Lixivii caust. diluti parva quantitate ab omni mercurio nitroso, si forte adhaereat, exacte liberetur. Pulvis remanens repetita Aquae dest. calidae affusione probe elotus et in filtro siccatus servetur. (HassP.)

Lon. LonN. *Re* Mercurii libras tres, Acidi nitrici sesquilibram, Aquae dest. octarios duos misce et coque, donec liquetur mercurius et aquâ consumpta materia alba restet, quae in pulverem trita in vas aliud quam minime profundum conjice leni et tunc aucto igne adhibito, donec vapor ruber prodire cessaverit.

Folgendes Verfahren von Paissé wird für das beſte gehalten:

℞. Mercurii . . . . libras centum.
Acidi nitrici (pond. 1,3 ad 1,37)
libras centum quadraginta.

Dissolve balnei arenae caloris ope, destillatione evapora et simulac formatio gasis nitrosi decompositionem nitratis indicat, recipiente remoto, per horas octo circiter calore modico sed constante usus continua, donec fomes modo extinctus denuo ignem capiat in retortam introductus.

Pm. Mercurii, Acidi (nitrosi) 36° partes aeq. mixtas leni calore dissolvere, solutionem, igne per gradus aucto, ad siccitatem redigere et ignem urgere, donec vapores rubri non amplius ascendant; — GalH. Ignem non ita augere, donec oxygenium evolvatur, ut Ba et Paissé, quod sit indicium decompositionis incipientis oxydi.

Ams. Bor. et Han. His. O. Pal. R. Wür. et *C.* operationem duabus vicibus perficere et post evaporationem dissolutionis salinae ad siccum, residuum pulveratum in novo vase calcinare.

B. Digerere productum per horas aliquot cum Aquae calidae partibus decem et Kali liquidi parva quantitate, ac pulverem deinde cum Aqua calida repetito abluere. Oxydum hoc modo ab acidi nitrici, vel potius subdeutonitratis mercurii pauxillo, quod forte illi adhaeserit, liberatum prodit.

℞. Salis mercurialis praecedenti modo obtenti,
Mercurii, sing. . partem unam.
Aquae destillatae . . . . q. s.
Tritura simul ad perf. extinct. usque et calcina deinde, ut supra, in crucibulo. (An. *Sw.*)

Ba. et Fenn. Mercurii partes duas; — Suec. Metalli trientes duos.

T. Paratur decomponendo crystallos Nitratis Mercurii in retortis vitreis vel in lagenis calori balnei arenae expositis, donec sal colore rubicundo acquisito, vapores nitrosos non amplius exhalet.

RC. Nitratis Hydrargyri liquidi q. vis in vase vitreo ad siccum coque et pulverem calori moderato expone, donec colorem laete rubrum prae se tulerit.

Reizend, aufregend, in hohem Grade giftig. Doch hat man es ehedem häufig angewendet und benutzt es noch heutzutage bei der Behandlung ſyphilitiſcher Krankheiten, ſowohl innerlich zu einem halben bis ganzen Gran, als äußerlich in Einreibungen, mit Speichel, zehen Gran auf jede Einreibung.

Pulvis Hydrargyri oxydati rubri.
B*. *Au.)*

℞. Oxydi Mercurii rubri . gr. unum.
Antimonii crudi . drachmas duas.
Triturata in partes octo aeq. divide.

Bei veneriſchen Uebeln empfohlen. — Gabe, ein Stück auf zweimal, Morgens und Abends, in Waſſer. Nöthigenfalls vermehrt man dieſe Gabe etwas.

Pulvis ex Hydrargyro rubro cum Alumine, Pulvis causticus s. causticus Plenkii s. aluminoso-mercurialis s. Sulphatis Aluminis compositus s. Supersulphatis Aluminae et Potassae compositus s. escharoticus s. angelicus Sharpii. (B*. BorC. Fer. Ful. LP. RC. *Au. Fi. Sw Sy. T. Va.*)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Aluminis crudi . . partes duas.
Triturando misce exacte (B*. BorC. Fer. Ful. *Au. Fi. Sw. T.*)

LP. *Sy.* Cujusque partes aequales.

℞. Praecipitati rubri,

Aluminis calcinati, sing. drachmam.
Pulveris Sabinae . . semunciam.
Misce intime (B*. *Va.* Hosp. d'Allem.)
Gegen Warzen und wildes Fleisch bei Geschwüren.

Pulvis escharoticus. (B*. RC.)

℞. Praecipitati rubri,
Plumbi acetici,
Kali fusi,
Aluminis, sing. . drachmam unam.
Pulveris Sabinae,
Carbonis lignei, sing. drach. duas.
Misce triturando ut fiat pulvis subtilissimus.

RC. Aluminis usti, Praecipitati rubri, Acetatis Cupri, sing. partem unam, Foliorum Sabinae vel Rhei palmati vel Calami vel Radicis Colombo partes duas vel Carbonis Ligni tantumdem.
Zu demselben Gebrauch, wie das vorige; es ist aber weit wirksamer.

Collyrium siccum. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Oxydi Mercurii rubri gr. decem.
Tutiae . . . . . grana viginti.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Contere. — Bei Hornhautflecken nach chronischen Augenentzündungen in das Auge zu blasen

Mercurius praecipitatus viridis, Lacerta viridis (Wir. *Gr.*)

℞. Mercurii . . . uncias quatuor.
Cupri . . . . . semunciam.
Metallis quoque seorsim in Acidi nitrici q. s. dissolutis, solutiones commixtas in lagena balnei arenae ope evapora; residuo infunde Aceti dest. libram, digere ad perfectam solutionem usque; tunc destillando aceto elicito massa viridis in retorta residua pulveratur.

Gr. Metallorum, sing. unciam in Acidi nitrici q. s. solvere, solutiones commixtas ad siccum evaporare, residuum calcinare, donec nullus fumus ruber appareat.

Caustisch, ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man als specifisch bei venerischen Krankheiten gepriesen und auch äußerlich zur Austrocknung von Geschwüren angewendet hat. Es ist ein fürchterliches Gift.

Bolus ex Hydrargyro oxydato rubro. (*Au. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri,
Opii, sing. . . . granum unum.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat bolus.

Pilulae antivenereae s. syphiliticae s. polychrestae s. Hydrargyri Oxydi rubri s. Praecipitati rubri. (Ful. Wür. *E. Re. Sa. Sy.*)

℞. Praecipitati rubri . grana octo.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas duodecim dividenda. (*Sy.*)

℞. Praecipitati rubri granum unum.
Corallii rubri praeparati grana duo.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiat pilula. (*Sa.*)

℞. Praecipitati rubri . . grana tria.
Opii pulverati . granum unum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Fiant pilulae tres. (*E.*)

℞. Praecipitati rubri,
Opii puri, sing. . drachmam unam.
Balsami Peruviani quantum sufficit ut fiant pilulae grani unius. (Wür.)

Re. Oxydi rubri, Opii, sing. drachmam, Syr. simpl. q. s. ut f. pil. no. 60. — 1 oder 2 Stück Abends und Morgens.

℞ Praecipitati rubri . grana decem.
Sulphuris Antimonii,
Asae foetidae, sing. grana viginti.
Opii . . . . . grana quinque.
Syrupi Capitum Papaveris . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Nach jeder der drei ersten Formeln höchstens eine Pille, nach den letztern zwei bis acht Gran. Sie gelten für schmelzend und krampfstillend, welche letztere Eigenschaft auch den vorhergehenden zugeschrieben wird.

Mel mercuriale. (*Su. Va.*)

℞. Praecipitati rubri,
Sacchari albi, sing. scrup. unum.
Triturati simul sensim adde
Mellis albi spississimi uncias tres.
Zum Verbinden mancher syphilitischen Geschwüre empfohlen.

Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum Deutoxydi Hydrargyri nitrati s. Hydrargyri nitrico-oxydi s. Hydrargyri rubri s. ex Hydrargyro oxydato rubro s. Mercurii s. Hydrargyri rubrum s. ophthalmicum rubrum s. Oxydi Hydrargyri rubri s. Oxydi Hydrargyri rubrum Tittmanni s. Oxydi hydrargyrici nitrati s. Subnitratis Hydrargyri s. hydrargyrici, Pomatum de Praecipitato rubro, Butyrum cum Oxydo Mercurii rubro, Unguentum cathaereticum s. corrodens, Ceratum mercuriale, Unguentum s. Pomatum antipsoricum s. Lugdunense (Lyon) *s. ophthalmicum Pelletani.* (Am. Ams. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. Ed. Ham. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax.

Suec. WW. *Au. Bo. Br. C. Ca. Fi. Gr. Huf. Ra. Re. Sp. Va. Vm.*)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Axung. Porci . part. triginta duas.
Misce triturando. (B. Bel. *Au.*)

Am. Ed. *C. Gr.* Oxydi partem unam et octo (novem *Gr.*) Axungiae; — Han. HassP. Axungiae decem; — Ams. Axungiae quadraginta octo; — *Huf.* Axungiae triginta sex; — *Au.* Oxydi granum unum ad quatuor et Olei Juglandium drachmas duas.

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri recentis blando igne liquefacti . . . . . partes octo.
Triturando exacte misce. (D. Suec.)

Fi. Praecipitati partem unam et tres Butyri; — RC. Butyri quatuor; — *Re.* Oxyd Hydr. nitrat. drachmam, Butyri inculs. unciam (Ware's golden ointment).

℞. Praecipitati rubri . partes octo.
Axungiae Porci . partes octoginta.
Olei ess. Citri . . part. unam.
Misce sedulo. (Bor.)

℞. Praecip. rubri pulv. partem unam.
Axungiae praeparatae . partes sex.
Cerae albae . . . partes duas.
Tere oxydum cum reliquis liquatis. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Re. Ferri Subcarb. drachma hujus unguenti unciae bene additur; — Bor4. Praecipitati grana decem, Unguenti simplicis unciam; — BorC. Praecipitati partem unam, Butyri recentis quatuor et Cerae flavae duas; — *Vm.* Oxydi partem unam, Butyri duodecim, Cerae flavae sex (*Balsamum ophthalmicum citrinum s. flavum*); — *Ra.* Oxydi partem unam cum dimidia, Cerae albae quatuor et Butyri viginti quatuor; — R. Oxydi grana septemdecim, Butyri drachmas tres et Cerae albae grana quadraginta quinque; — Sax. Oxydi partem unam, Butyri novem et Cerae albae tres; — *Sp.* Oxydi drachmas duas et grana quindecim, Butyri uncias tres et Cerae albae drachmas sex; — Han. et O. Oxxdi partem unam, Butyri et Cerae albae, sing. duas

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Cerae albae . . . . partes tres.
Olei Olivarum . . partes octo.
Cerae cum oleo contritae oxydum admisce et tere. (*Br.*) (*Ceratum mercuriale*).

Planche (*Br**.): Oxydi partem unam, Cerae albae quatuor et octo Olei (*Pomatum antipsoricum*); — Wür. Praecipitati partem unam et sex Cerati communis; — Pal. Oxydi partem unam et Cerati decem; — *Gr.* Oxydi semunciam, Ungt. Cerae semilibram.

℞. Oxydi rubri Mercurii part unam.
Unguenti rosati . . partes octo.
Misce sedulo. (*Ra. Va.* Hot. D.)

Bo. et *Ca.* Oxydi partem unam et duas Unguenti rosati

℞. Praecipitati rubri . grana decem.
Camphorae . . . grana sex.
Butyri recentis . drachmas duas.
Contere. (*Au.*)

Diese Salbe, deren Stärke wegen des so abwechselnden Verhältnisses des Oxyds zum Fett, von 1 zu 2 bis 1 zu 48, so verschieden ist, wird als Reizmittel bei chronischen Leiden der Augenlider und des Augapfels, wenn keine Entzündung mehr vorhanden oder nur wenig davon bemerkbar ist, angewendet. Man bringt davon, zweimal täglich, einen bis zwei Gran in den innern Augenwinkel. Double empfiehlt die Salbe von Planche gegen Krätze; man theilt die Gabe in zehen Theile, wovon man Abends bei'm Schlafengehen einen Theil bei'm Feuer einreibt. Eine Salbe aber, in welcher der Präcipitat zu einem Dreizehntheil enthalten ist, ist sicherlich ein wenig zu empfehlendes und selbst gefährliches Mittel gegen krätzige Uebel.

Unguentum ophthalmicum Richteri. (*Han.*)

℞. Praecipitati rubri partem unam.
Butyri Cacao,
Axung. Porci ablut., sing. part. tres.
Butyro et axungiae post liquationem mixtis et semirefrigeratis oxydum terendo admisce.

Unguentum escharoticum. (*E.*)

℞. Praecipitati rubri drachmam unam.
Terebinth. Venet. . unciam unam.
Triturando commisce.

Unguentum antivenereum. (*Au.*)

℞. Praecipitati rubri grana quinque.
Ung. Praecip. grisei . drachmam.
Auf einmal einzureiben. — Der bis zum hinlänglichen Speichelfluß fortgesetzte Gebrauch dieser Salbe, der gleichzeitige Aufenthalt im Bett in einem warmen Zimmer und ein strenges wässeriges Regim während mehrerer Wochen ist die Methode, welche Louvrier und Rust zur gründlichen Heilung der Syphilis anpreisen.

Unguentum fuscum, Unguentum Picis cum Oxydo Mercurii rubro s. mercuciale Baeckingii. (GalM. *Ra. Sa. Sm. Sy. Va.* Hosp. milit.)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Unguenti basilici . . partes sex.

Misce exacte. (*Sa.*)

Va. Oxydi partem unam, Unguenti octo; — *Sy.* Oxydi partem unam et decem Unguenti; — *Sm.* Unguenti duodecim; — GalM. Unguenti sedecim; — *Ra.* Unguenti quadraginta octo.

Zum Verbinden schmerzloser, besonders venerischer Geschwüre, um die Vitalität der Gewebe zu bethätigen. Man fängt am sichersten mit einer sehr schwachen Salbe an, deren Stärke man, je nach der Wirkung, vermehrt oder vermindert.

Ceratum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum. (LP.)

℞. Praecipitati rubri . semunciam.
Cerati diapalmae, . semilibram.
Misce exacte. — Bei scrofulösen, phagedänischen ꝛc. Geschwüren.

Unguentum mercuriale. (*Sm.*)

℞. Praecipitati rubri,
Camphorae pulv, sing. drachmam.
Butyri recentis . uncias quatuor.
Cerae virgineae . drachmas tres.
Oxydo cum cera in butyro liquata trito camphoram adde. — Bei Entzündungen der Eichel auf diese alle Abende bei'm Schlafengehen vierzehn Tage lang eingerieben. Ein unfehlbares Mittel, diese leichte Krankheit, welche bei Reinlichkeit in wenigen Tagen von selbst aufhört, langwierig zu machen.

Balsamum ophthalmicum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercur rubri
part. quatuor.
Cinnabaris . . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Cerati albi part.
nonaginta quatuor.
Terendo misce. — Hat viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Salbe.

Unguentum stimulans s. Elemi cum Alumine. (*Au.*)

℞. Unguenti Elemi . . semunciam.
— Styracis . drachmas duas.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Praecipitati rubri grana quindecim.
Aluminis calcinati grana quinque
Olei Hyperici . quantum sufficit
Michaelis hat diese Salbe zum Verbinden übelaussehender Geschwüre empfohlen.

Unguentum ad ulcera lymphatica s. scrophulosa. (*Sw.*)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Emplastri Cicutae,
Ung basilici, sing.
part quadraginta
Misce exacte.

Unguentum ad ulcera venerea. (*Sw*.*)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Unguenti mercur. partes quatuor.
— basilici partes triginta duas.
Misce exactissime.

Unguentum suppurativum. (*Sw*.*)

℞. Praecipitati rubri . partem unam.
Tritura cum Olei camphorati guttis aliquot et adde deinde
Balsami Arcaei partes duodecim.
Ung. basilici
part. quadraginta octo.
Misce bene.

Balsamum ophthalmicum Yveanum s. de St. Yves, Balsamum mercuriale, Unguentum Hydrargyri rubrum. (Br. Ful. Han. Hass. HassP. Li. R. Sax. Wür. *Au. Ca. Pid. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Praecipitati rubri partes quinque.
Florum Zinci . . . partes duas.
Mixta cum
Butyri recentis . partibus viginti,
Cerae flavae . . partibus decem
simul liquatis tritura et misce. (Li.)

Ful. Oxydi Mercurii partes quindecim, Oxydi Zinci sex, Butyri sexaginta et Cerae triginta.

℞. Praecipitati rubri partes triginta.
Florum Zinci . partes duodecim.
Camphorae in Oleo Ovorum dissolutae . . . . partes novem.
Cerae albae part. quadraginta octo.
Butyri recentis . partes ducentas quadraginta octo.
Ceram et butyrum simul liquata et mixta fere refrigerata cum pulveribus tritura. (Br. Han. Hass. R. Wür. *Ca. Pid. Pie. Sp.*)

HassP. Butyri unciam, Cerae scrupulos quatuor, Mercurii calcinati rubri scrupulos duos cum dimidio, Flor. Zinci scrupulum, Camphorae in Oleo Ovorum solutae grana quindecim; — *Vm.* Praecipitati partes tres, Oxydi Zinci tantidem, Camphorae cum Oleo Amygdalarum dulcium triturata unam, Cerae sedecim et Butyri nonaginta sex.

℞. Ung. Praecip. rubri simpl.
part. sexaginta.
Florum Zinci . . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Misce bene. (Sax.)

Sp. Unguenti partes nonaginta sex, Oxydi Zinci tres et duas Camphorae; — *Au.* Praecipitati rubri grana quinque, Tutiae quatuor, Camphorae duas et Butyri recentis drachmas duas, vel: Praecipitati grana quatuor, Oxydi Zin-

ci decem, Extracti Opii tantidem et Axungiae drachmas duas.

Iſt von der einfachen rothen Queckſilberſalbe nur wenig verſchieden, doch ſoll ſie bei ſtattfindender Entzündung ihr vorzuziehen ſeyn. Sie gilt für austrocknend, auflöſend, kühlend und ſtärkend. Sicher iſt ſie ſehr reizend.

Unguentum s. Pomatum cum Oxydo Hydrargyri rubro s. ophthalmicum Dupuytrenii. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Oxydi Mercur. rubri part. unam.
Sulphatis Zinci . . partes duas.
Axungiae Porci
part. nonaginta sex.

Bei chroniſchen und rebelliſchen ſogenannten ſcropbulöſen Augenentzündungen. Man ſtreicht ſie leicht auf den Rand der Augenlider.

Unguentum rubrum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri,
Minii pulverati, sing.
partem unam.
Axungiae . . . . . partes octo.

Axungiam cum oxydis, pro parvis partiunculis addendo, contere.

Unguentum mercuriale rubrum, vulgo Placentinum. (Pm.)

℞. Olei Olivarum . . . uncias sex.
Cerae albae . . . sesquiunciam.
Praecipitati rubri drachmas sex.
Minii . . . . . uncias duas.

Cerae oleo solutae, praecipitatum et minium, subtiliter pulverata assidue agitando commisce.

Unguentum Joerdensii. (B*. *Au.*)

℞. Oxydi Merc. rubri . part. unam.
Butyri recentis . partes sedecim.

Misce bene et adde

Subacet. Plumbi liq. . partes sex.

Tere, donec omne liquidum disparuerit.

Unguentum Rustii. (*Au.*)

℞. Praecip. rubri gr. quatuor ad sex.
Butyri recentis . drachmas duas.
Subacetatis Plumbi liquidi,
Laud. Sydenh., sing.
semidrachmam.

Unguentum Oxydi Mercurii rubri per Acidum nitricum s. Regentii. (Gal. GalM. LP. *Pie.*)

℞. Butyri recentis cum Aqua Rosarum loti . . . . . 4,05.
Camphorae,
Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi, sing. . . 0,25.

Tritura diu ut fiat unguentum. (Gal.)

GalM. Praecipitati, Camphorae, Acetatis Plumbi crystallisati, sing. partem unam et Axungiae bene lotae octodecim; — LP. Praecipitati grana viginti quinque, Tutiae quindecim, Camphorae in Alcohole solutae sex, Acetatis Plumbi quatuor, Axungiae Porci sesquidrachmam; — *Pie.* Praecipitati, Acetatis Plumbi, sing. partes viginti, Camphorae unam et Butyri Aqua Rosarum loti septuaginta.

Unguentum s. Pomatum Desaulti. (*Ca. Pie. Ra. Va.*)

℞. Praecipitati rubri,
Acetatis Plumbi crystallisati,
Aluminis calcinati,
Tutiae, sing. . . . semunciam.
Sublimati corrosivi granum unum.
Axungiae lotae . . uncias tres.

Misce triturando. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Sublimati grana viginti quinque, reliquorum partes dimidias; — *Pie.* Praecipitati, Acetatis, Aluminis, Tutiae, sing. drachmas quatuor, Sublimati grana quadraginta octo et Axungiae uncias tres; — *Ca.* Praecipitati rubri, Lithargyri, Tutiae, Aluminis calcinati, sing. drachmam unam, Sublimati grana duodecim et Cerati non loti vel Unguenti rosati q. s.

Dieſe Salbe iſt gegen Flechtenübel und chroniſche Augenliderentzündungen berühmt. Sie unterſcheidet ſich von den vorigen nur durch die ſtärkere Reizwirkung.

Unguentum s. Pomatum Bellii. (*Bo.*)

℞. Praecipitati rubri,
Calaminae praep., sing.
sesquidrachmam.
Lithargyri praeparati . drachmam.
Tutiae praeparatae semidrachmam.
Cinnabaris pulv., . scrup. unum.
Axungiae Porci . . uncias duas.

Triturati sedulo adde

Balsami Peruv. guttas quindecim.

Unguentum ophthalmicum. (*Au.*)

℞. Praecip. rubri
gr. decem ad viginti.
Butyri recentis . drachmas tres.
Aeruginis . . grana sex ad octo.
Boli albae,
Opii, sing. . . scrupulum unum.

Misce triturando. — Benedict empfiehlt ſie bei'm Flügelfell (pterygium).

℞. Praecipitati rubri . . grana sex.
Aeruginis . . . . grana decem.
Tutiae grana duodecim ad quatuordecim.
Butyri recentis . . semunciam.

Contere.

Ceratum detergens s. mercuriale Falckii. (Wir. *Ca. Pid. Vm.*)

℞. Praecip. rubri porphyr.
semunciam.
Mercurii dulc. porphyr. unc. duas.
Acet. Plumbi porphyr. unc. unam.
Commisce intime cum mixtura liquata e
Cerae albae . . unciis quatuor.
Olei Olivarum . . . unciis sex.
Adde deinde
Olei ess. Lavand. semidrachmam.
Misce bene. (*Pid.*)

Wür. eandem formulam omisso tamen oleo lavandulae; — *Ca.* loco olivarum Oleum Juglandis, Cerae unciam.

℞. Oxydi Mercurii rubri part. dimid.
Acet. Plumbi cryst. partem unam.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Cerae flavae . . partem unam.
Tritis seorsim oxydo et sale cum olei pauxillo adde reliquum olei et cerae prope ignem lenem liquefactae et miscellae primum sal deinde oxydum admisce. (*Vm.*)

Reizend, austrocknend, zum Verbinden syphilitischer Geschwüre. Man wendet es in Einreibung oder auf Charpie gestrichen an.

Unguentum Falckii. (*Ca.*)

℞. Praecipitati rubri drachmas duas
Amalgamatis e Stanni et Mercurii part. aeq. drachmas quatuor.
Unguenti rosati . unciam unam.
Trituratis adde
Olei ess. Menthae pip.
guttas viginti.

Gegen Hämorrhoidalknoten empfohlen.

Cereoli Falckii. (Hass. *Pid.*)

℞. Terebinth. Venet.
drachmam unam.
Laccae pulveratae semidrachmam.
Liquatis prope ignem adde
Emplastri mercurialis uncias duas.
Merc. dulcis pulv. drachmas duas.
Praecip. rubri porphyr.
scrup. duos.
Misce bene agitando ut fiant cereoli.

Sulphuretum Mercurii.

§. I. Sulphuretum nigrum.

Ba. Fer. Li. Suec. *Vm.*

Man hat es lange Zeit unter dem Namen *Aethiops mineralis* mit einer Mischung aus Schwefel und sehr zertheiltem Quecksilber verwechselt; allein es unterscheidet sich von dieser durch die sich gleichbleibenden Verhältnisse, und daß man es, nach Seguin, durch gehöriges Erhizzen in einer Röhre, in rothes Schwefelquecksilber (sulfure rouge) verwandeln kann, ohne daß es etwas von seinem Gewichte verliert.

A. Im Zustande der Reinheit.

I. Mittelst Feuer bereitet.

℞. Flor. Sulphuris lot. partem unam.
Liqua leni igne in olla fictili et sensim adde
Mercurii in cochleari ferreo calefacti . . . . . partem unam.
Agita continue, donec massa colorem nigrum uniformem acceperit et post refrigerationem porphyrisa. (Ba. Suec. (*Vm.*)

Fer. Sulphuris partes tres et duas Mercurii.

II. Durch Fällen (Präcipitation) bereitet. *Aethiops mineralis praecipitatus, Superhydrosulphuretum Mercurii.*

℞. Sublim. corr.
part. duodecim c. dimidia.
Hydrosulphatis Ferri,
Acidi sulph. concent., sing.
part. quinque.

Sublimato in Aqua fuso, liquori immitte gas ex duabus reliquis substantiis et Aquae quintuplo acidi pondere extricatum; praecipitatum collectum et lotum sicca (*Vm.*)

℞. Subcarbonat. Potassae unc. duas.
Florum Sulphuris lot.
uncias quatuor.
Aquae Calcis . . . libras duas.

Coque in cucurbita vitrea longicolli super arena, donec sulphur sit dissolutum; refrigerata filtra et liquori guttatim instilla solutionem frigidam Mercurii unc. duarum in Acidi nitrici unc. quatuor; effervescentia cessata liquorem sepone, quod super praecipitato natat decantha et hoc Aqua destill. ablutum blando calore sicca. (Fer. Li. *Vm.*)

Vm. loco subcarbonatis Potassam liquidam.

B. Mit Schwefelspießglanz gemischt

Dieses Präparat war ebenfalls mit dem Aethiops antimonialis verwechselt worden.

℞. Sulphuris . part. unam c. dimid.
Potassae causticae fusae,
Sulphureti Antimonii pulv., sing.
part. quinque cum dimidia.

Coque in Aqua, donec nihil amplius dissolvatur et filtra. Colaturae coctae instilla Nitratis Mercurii in Aqua soluti, quamdiu praecipitatum formatur, quod lotum siccetur. (*Vm.*)

Vm. praeterea 1) loco solutionis nitratis illum Sublimati corrosivi et li-

quori subito infundere partes ejus duodecim; 2) liquefacere simul Sulphureti Potassii partes sex et Sulphureti Antimonii quinque cum dimidia, mixturam refrigeratam atque pulveratam cum Aquae pauxillo terere, addere Sublimati corrosivi in Aqua dissoluti partes duodecim vel Mercurii dulcis pulv. viginti et praecipitatum deinde multa Aqua ablutum siccare.

§. II. Sulphuretum rubrum.

Cinnabaris, Sulphuretum Mercurii s. Hydrargyri rubrum, Deutosulphuretum Hydrargyri rubrum, Bisulphuretum Hydrargyri; Zinnober; Cinabre (*Gal.*); Cinabrio (His.).

A. *Cinnabaris nativa;* natürlicher Zinnober; Cinabre naturel ou natif (*Gal.*); Cinabrio nativo (His.).

Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Ed. Fenn. GalM. Gen. Han. His. His3. LH. Pol. Sax. Wir. Wür. *Gr. Sp.* führen ihn unter den natürlichen Arzneimitteln auf. Er darf aber nicht ohne vorgängige Reinigung durch Sublimiren angewendet werden.

B. *Oxydum Mercurii sulphuratum rubrum, Cinnabaris factitia s. artificialis, Sulphuretum Hydrargyri rubrum s. sublimatum s. factitium.* (Am. An. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Pal. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Par. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞ Sulphuris sublimati partem unam.
Mercurii . . partes quinque.

Mercurium sulphuri fuso adde, quam massam, quum intumescit, ab igne remove, vas tegendo ne forte deflagret; tum pulveratam sublima. (Am. Du. Fer. Lon. LonN. LP. Suec. *C Gr. Re.*)

An. Wür. et *T.* Sulphuris partem unam et quatuor Mercurii; — Br. His. His3. Pal. Sar Wir. et *Fi.* Mercurii tres; — Gen. Mercurii tres cum dimidia; — HassP. Sulphuris uncias duas, Mercurii duodecim; — Ful. Li. Sax. *Br.* et *Sp.* Sulphuris unam et septem Mercurii; — Ba. Sulphuris unam et Mercurii septem cum quinta parte; — Gal. Sulphuris 150 et Mercurii 1,080; — *Gr.* Mercurii libras centum septuaginta, Sulphuris quinquaginta; — *Sw.* Partes aequales i. e. sublimationem aethiopis sui; — *Sw** Sulphuris quatuor et Mercurii viginti quinque.

℞. Sulphuris in baculis . partes tres.
Mercurii . . partes novemdecim.

Tere ad extinct. usque et mixturam in retorta in balneo arenae collocata sensim calefaciendo sublima. (*Vm.*)

Vm. praeterea et modum agendi praemonitum cum iisdem proportionibus indicat.

Reizend, innerlich wenig, aber äußerlich häufig in Räucherungen zu einer oder zwei Drachmen auf einmal, mit Weihrauch angewendet.

Cinnabaris praeparata, Sulphuretum Mercurii praeparatum, Cinnabaris nativae laevigatio. (Gal. His3. Li. Sar. Wir. *Sp.*)

Cinnabaris et artificialis et nativa pulverata et porphyrisata multa Aqua abluitur et moleculae subtilissimae sepositione liquoris colliguntur (Li.); vel antequam porphyrisetur et abluatur, sublimationi submittitur (Sar. Wir. *Sp.*)

His3. nativam pulveratam, per setaceum trajectam in aceto destillato per aliquot dies macerare, tunc aceto separato pulverem Aqua pura edulcorare, laevigare et in umbra siccare jubet.

Sp. Cremorem Cinnabaris indicat obtinendum coquendo Cinnabarem in Aqua et desumendo pelliculas in superficie liquidi formatas, quae siccatae pulverantur.

Fumigatio Cinnabaris Hosp. St. Lud. et Char. s. mercurialis Hosp. Ven. s. antivenerea. (LH. *Va.*)

℞. Cinnabaris . . semiscrupulum.
Olibani,
Sacchari albi, sing.
scrupulum unum.

Va. Cinnabaris sesquidrachmam ad tres; praeterea: Cinnabaris semunciam, Olibani drachmas duas.

Pulvis anthelminticus. (*Au.*)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Rad. Jalapae, sing.
drachmam unam
— Valerianae . drachmas duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel.

Pulvis antilyssicus. (*Bo.*)

℞. Cinnab. nativae,
— artific., sing.
gr. viginti quatuor.
Moschi . . . . grana sedecim.

Misce et porphyrisa. — Auf einmal, in einem Löffel Alcohol zu nehmen. — Sicherlich ist die Hundswuth noch nie dadurch geheilt worden.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (B*. Br. O. Wir. *Sp. Sw.*)

℞. Cinnabaris . . . . semunciam.
Sacchari crystallisati uncias tres.
Olei Cinnam. drach. dim. ad unam.
Tritura bene. (B*. Br. O. *Sw.*)

Wir. et *Sp.* Cinnabaris drachmas sex, Sacchari uncias duas et Olei Cinnamomi scrupulos duos.

Reizend, als herz- und magenstärkend sehr berühmt. — Gabe, ein Scrupel.

Pulvis roborans s. confortans Camerarii. (Wir.)

℞. Cinnabaris nativae drachmam unam.
Cornu Cervi usti drach. quinque.
Dentium Apri,
Ungulae Alces,
Boli Armen., sing. semidrachmam.
Terrae sigillatae drachmas duas.
Sardonycis,
Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Smaragdi, sing. gr. viginti quinque.
Succini,
Corallii albi,
— rubri
Margaritarum orientalium,
Aegagropilae occidentalis,
— orient., sing. drachmam.

Fiat pulvis subtilissimus. — Ein lächerliches Präparat, welches nöthigenfalls durch das vorhergehende ersetzt werden würde. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis cephalicus Camerarii. (Wir.)

℞. Cinnabaris . . semidrachmam.
Crystalli mineralis,
Succini praeparati,
Ungulae Alces, sing. . drachmam.
Cornu Alces absque igne praep.,
— Cervi absque igne praeparati, singulorum drachmas tres.
Cranii Hominis praep. drach. sex.
Sacchari albi . . sesquiunciam.

Fiat pulvis. — Nicht weniger lächerlich als das vorige und durch den pulvis analepticus zu ersetzen. — Gabe, von einem halben bis zu drei Scrupel.

Pulvis epilepticus ruber s. ad guttetam s. antiepilepticus. (Sar. Wir. *Bo. Pie.*)

℞. Cinnabaris nativae,
Succini praeparati,
Unicornu marini, sing. . unciam.
Radicis Paeoniae,
Corallii rubri, sing. . uncias duas.

Fiat pulvis. (Wir.). — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae,
Cornu Cervi,
Succini praep., sing. semunciam.
Castorei . . . drachmam unam.
Cinnabaris . . drachmas duas.

Fiat pulvis subtilissimus. (Sar.)

℞. Rad. Paeoniae,
Rad. Valerianae sylv., sing. unciam.
Seminum Rutae,
Myrrhae,
Castorei,
Succini albi, sing. . semunciam.
Cinnabaris . . . . uncias duas.

Fiat pulvis. (*Bo. Pie.*)

℞. Visci querni,
Cinnabaris,
Ungulae Alces, sing. drach. duas.
Cranii Hominis absque igne praeparati . . . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.) — Gabe, einen halben Scrupel bei Kindern und von einem Scrupel bis zur halben Drachme bei Erwachsenen.

Pulvis cephalicus ruber, Specificum cephalicum. (Li. Wir. *Sp.*)

℞. Cinnabaris . . . . uncias tres.
Radicis Paeoniae . sesquiunciam.
Cranii Hominis,
Ungulae Alces,
Cornu Cervi absque igne praep.,
Smaragdi praeparati,
Corallii rubri praep., sing. drachmas duas.
Margaritarum orient. praep.,
Unicornu marini,
Succini praep., sing. semidrachmam.

Trituratis diu fiat pulvis subtilissimus (Wir.)

Sp. Cinnabaris uncias tres, Paeoniae sesquiunciam, Smaragdi drachmas duas, Ungulae Alces unam, Cranii Hominis scrupulos duos, Corallii et Cornu Cervi tantidem et Unicornu, Margaritarum et Succini, sing. unum.

℞. Cinnabaris,
Succini albi,
Unicornu marini,
Dentium Hippopotami, singulorum semidrachmam.
Cranii Hominis drachmam unam.
Ungulae Alces,
Corallii rubri,
Chrysolithi,
Smaragdi,
Margarit. praep., sing. scrup. duos.
Seminum Paeoniae,
Cornu Cervi absque igne parati, singulorum sesquidrachmam.
Visci querni . . drachmas duas.
Radicis Paeoniae . drachmas sex.
Folia Auri . . . . . no. 2.

Fiat pulvis subtilissimus. (Wir.) — Noch lächerlicher als die beiden vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Li. hanc formulam correctam ita indicat:

℞. Cinnabaris praeparatae,
Magnesiae albae, sing. unc. unam.
Pulv. Visci,
— Paeoniae, sing. . semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis de Sulphate Potassae compositus s. antispasmodicus s. nitrosus cinnabarinus s. salinus compositus s. temperans ruber s. Stahlii. (Ams. B. Bel. Br. Gal. Li. O. Pal. Wir. *Ca. Fi. Pie. Re. Sa. Sw. Vm.*)

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Nitratis Potassae partes quatuor.
Sulphatis Potassae partem unam.
Misce triturando. (B. Bel.)

Ams. et *Vm.* Cinnabaris partem unam et quatuor cujusque Salium; — *Sw.* Cinnabaris unam, sedecim Nitri et octo Sulphatis; — *Vm.* Cinnabaris unam et Salium, sing. sedecim; — O. Cinnabaris unam et duodecim cujusque Salium; — *Fi.* Cinnabaris duas et tres Salium; — Gal. *Ca. Pie. Re.* Cinnabaris duas et Salium cujusque novem; — Li. et Wir Cinnabaris tres et cujusque Salium sedecim.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Concharum praeparatarum,
Kali nitrici,
— sulphurici, sing. partes duas.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

Pal. Nitri, Sulphatis, Concharum, sing. drachmas sex et tres Cinnabaris.

℞. Cinnabaris . . . partem unam.
Oculorum Cancri . . partes sex.
Misce triturando. (*Sa.*)

℞. Cinnabaris porphyr. part. quinque.
Oculorum Cancri,
Corallii rubri praeparati,
singulorum partes octo.
Matris Perlarum praeparatae,
Kali sulphur., sing part. sedecim.
— nitrici partes triginta duas.
Fiat pulvis tener. (Br. Wir.)

Dieſes Pulver iſt offenbar reizend. Die Gabe iſt wegen der Mannichfaltigkeit ſeiner Zuſammenſetzung ſchwer zu beſtimmen; nach der letztern Formel iſt ſie ein bis zwei Scrupel.

Potio temperans. (*Sm.*)

℞. Pulveris temperantis Stahlii grana duodecim ad quindecim.
Emulsionis simplicis . uncias sex.
Syr. Althaeae vel Ribium unciam.
Aquae Flor. Aurant. drach. quatuor.
Misce

Im Anfang hitziger Krankheiten empfohlen; kann aber wegen der dadurch bedingten Reizung nur ſchaden und verdient daher den gegebenen Namen nicht.

Bolus ruber s. Sulphureti Mercurii s. cinnabarinus. (*Sa. Sw. Va.*)

℞. Cinnabaris . . scrupulum unum.
Conservae Rosarum grana quatuor.
Fiat bolus. (*Sw.*)

Va. Cinnabaris scrup. duos, Cons. q. s. Sar. Conservae Aurantii, Sulphureti mercurialis antimonialis, sing drachmam, ut fiat pulvis, cui addi potest, si requiritur, Moschi vel Serpentariae Virginicae scrupulus unus.

Bei Kopfſchmerz und bei veralteten, ſogenannten nervöſen Affectionen geprieſen.

B. Cinnabaris semigranum et Roob Juniperi grana sex, fiat bolus — Sollen mit Erfolg in einem Falle von Bauchwaſſerſucht, vier Stück täglich, gegeben worden ſeyn.

Boli diaphoretici. (*Sm.*)

℞. Cinnabaris . . scrupulum unum.
Camphorae . . scrupulos duos.
Theriacae . . . unciam unam.
Syr. Capilli Ven. vel Dianthi q. s. ut fiat massa in bolos viginti quatuor dividenda. — Täglich drei Stück, indem man zugleich einen ſehr warmen Aufguß von grünem Thee oder Flieder trinkt.

Pisa pro fonticulis. (*Gr.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.
Radicis Iridis Florentinae
uncias duas.
Cinnabaris . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae . . q. s. ut pisa formari possint.

Pilulae Conii cinnabarinae. (*Au.*)

℞. Cinnabaris,
Extr. Millefolii,
— Cicutae, sing. . drachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, ſieben Stück Morgens und Abends, bei veneriſchen Drüſenanſchwellungen.

Pilulae rubrae Boerhaavii (*Re.*): E Sulphureto Mercurii cum Mica Panis vel Mucilagine in pilulas redacto.

Chamberlain's restorative pills (*Re.*): E Cinnabare, Sulphure, Sulphate Calcis et materiae vegetabilis pauxillo. — Sollen bei Scrofeln, Fiſteln ꝛc. nützen, aber oft die Cur 2 Jahr dauern.

Storey's worm cakes (*Re.*): Jalapae scrupulum, Zingib. drachmam, Sacchari scrup. duos, Cinnabaris unciam et Syrupi q. s.

Trochisci mercuriales. (*Sp.*)

℞. Cinnabaris porphyr. . scrup. duos.
Succini praep. scrupulum unum.
Mucilag. G. Tragacanthae . q. s. ut fiant trochisci magnitudinis arbitrariae. — Zu Zinnoberräucherungen.

Ceratum rubrum. (*Sw.*)

℞. Cinnabaris . . grana quindecim.
Resinae flavae . . semunciam.
Cerae flavae,
Axungiae Porci, sing. semilibram.
Cinnabarem pulveratum cum reliquis fusis et mixtis commisce. — Reizend, austrocknend, zum Verbinden von Geschwüren.

Unguentum ad scabiem (Bailey's itch ointment) (*Re.*) constat ex Alumine, Cinnabare, Nitro et Vitriolo albo, cum Adipe et Oleo in unguenti formam redactis, Radice Alcannae coloratis, additis Oleis Lavandulae, Anisi et Majoranae.

Unguentum nigrum. (*Vm.*)

℞. Cinnabaris . . . . partes tres.
Hydrosulphatis Plumbi part. unam.
Medullae bubulae partes duodecim.
Misce triturando.

Unguentum Sulphureti Hydrargyri sublimati s. cinnabarinum s. rubrum. (His. His3.)

℞. Cinnabaris . . . uncias duas.
Lithargyri . . . uncias quatuor.
Cerussae . . . . sesquiunciam.
Mercurii dulcis . drachmas duas.
Seorsim pulverata misce et intime commisce cum mixtura liquata e
Cerae flavae . . . . unciis sex,
Olei Rosarum . . libris duabus.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (LH. *Sm.*)

℞. Cinnabaris . . drachmam unam.
Camphorae . scrupulum unum.
Cerati communis . unciam unam.
Contere. — Von Alibert oft mit Erfolg zum Verbinden von Flechten angewendet; man wiederholt die Anwendung wenigstens zweimal täglich.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum s. Cinnabaris no. 4, dicta Hosp. St. Lud. (*Ra. Va.*)

℞. Cinnabaris . . sesquidrachmam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Triturates simul adde
Aquae Rosarum drachmam unam.
Besonders bei Phthiriasis empfohlen, um das Jucken zu mäßigen und die Erzeugung des Ungeziefers zu mindern.

Electuarium antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Cinnabaris . . . sesquiunciam.
Conservae Rosarum uncias duas.
Resin. Guajaci pulv. . unc. unam.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit
Bei rheumatischen Schmerzen ohne Fieber empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich zweimal.

Electuarium purgans. (*Ra. Va.* Hosp. Char.)

℞. Sulphureti Mercurii nigri,
Pulv. Jalapae, sing. drachmas duas.
Scammonii . . drachmam unam.
Scillae,
Res. Jalapae, sing. sesquidrachmam.
Syrupi Rhamni . . . . . q. s.
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen. — Von Fouquier bei Wassersucht und Bleikolik angewendet.

Sparadrap rubrum. (*Vm.*)

℞. Cinnabaris porphyr. part. unam.
Admisce intime mixturae liquatae e
Terebinthinae . . partibus sex.
Cerae albae partibus duodecim.
Linteum massae immerge, quod tunc laevigetur.

Extractum Opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (His. His3.)

℞. Extracti Opii aquosi drachmas sex.
Croci pulverati,
Cinnab. porphyr., sing. drach. tres.
Fiat cum Aquae pauxillo massa in trochiscos dividenda.

Protochloruretum Mercurii, Antiquartium, Aquila alba s. mitigata, Calomelanos, Chloretum Hydrargyri, Chloruretum Mercurii sublimatione aut praecipitatione paratum, Draco mitigatus, Hydrochloratum Deutoxydi Mercurii, Hydrargyrus muriaticus dulcis s. oxydulatus s. muriatus mitis s. dulcis, Hydrargyrum muriaticum mite, Mercurius dulcis s. mitis s. muriaticus s. praecipitatus s. praecipitatus albus s. sublimatus dulcis, Murias Hydrargyri sublimatus s. Hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. suboxygenatus praecipitatione paratus s. hydrargyrosus mitis s. Oxyduli Hydrargyri mitis, Manna Metallorum, Panchymagogum minerale, Panchymagogus Quercetanus, Protochloruretum Hydrargyri, Submurias Hydrargyri s. Mercurii s. Hydrargyri mitis s. praecipitatus s. praecipitatum s. sublimatum, Calomel, Calomelas s. Calomelas praecipitatus, Murias Protoxydi Hydrargyri s. Hydrargyri dulcis sublimatus s. Mercurii dulcis s. Mercurii suboxygenatus, Panacea mercurialis, Protohydrochloras Mercurii, Sublimatus dulcis; salzsaures Quecksilberoxydul, Calomel. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal, GalM. Gen. Han. Hass.

HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Gewöhnliches Verfahren.

℞. Sublimati corr. pulv. part. quatuor.
Mercurii . . . . . partes tres.

Tritura in mortario vitreo, Alcoholis pauxillum addendo, ad perf. extinct. usque; pulverem in lagenam intromitte pro triente tantum illo replendam, qua supra ignem collocata cum obturamento primum chartaceo deinde cum vitreo obturatâ ignis gradatim augeatur et ita nutriatur, donec nihil amplius in fundo vasis restet. Massam sublimatam tunc pulvera et coque cum Aquae dest. duplo et Hydrochloratis Ammoniaci parte vigesima; liquido decanthato pulverem bis terve Aqua destillata lotum leni calore sicca. (An. B. Bel. Fer. R.)

Bor. Ed. Han. O. RC. Sar. Sax. *Gr.* easdem proportiones indicant sed Aquam solum ad lavandum; — Bor4. Sublimati partes quatuor, Mercurii partes tres, duas sublimationes et digestionem pulveris cum Spiritus Vini alcoholisati q. s. (ad separandum sublimatum forte immixtum), qui tunc filtratione separatur; — Sax. unam tantum, reliqui duas sublimationes; — Br. Pal. Wir. Sublimati et Mercurii, sing. part. aeq., triturationem cum Alcohole, duas sublimationes successivas, lotionem cum dissolutione bullienti drachmae unius Salis Ammoniaci pro Aquae octario; — Wür. Sublimati et Mercurii part. aeq., triturationem cum Alcohole, unam sublimationem et unam lotionem cum Aqua bull.; — A. Sublimati uncias quinque et quatuor Mercurii, unam sublimationem et lotionem cum Aqua frigida; — D. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Ams. Sublimati libram, Mercurii uncias decem cum dimidia, triturationem cum Aquae pauxillo et tres sublimationes absque lotione; — GalM. Sublimati partes viginti quatuor, Mercurii quindecim, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — LH. Sublimati et Mercurii quantitates easdem ut GalM., tres sublimationes et repetitam cum Aqua destillata ablutionem; — LP. Sublimati et Mercurii part. aeq., sublimatum cum Aqua triturare, addere mercurium et denuo per semihorium triturare, digerere in lagenis vel retortis parvis in balneo arenae etc.; — Lon. Lus. Sublimati libram, Mercurii uncias novem, triturationem cum Aqua, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Gal. Sublimati 480, Mercurii 320, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — *Sw.* Sublimati uncias quindecim, Mercurii duodecim, triturationem cum Alcohole, duas sublimationes et lotionem cum Aqua bull.; — Ba. Sublimati partes quatuor, Mercurii duas, sublimationes duas et lotionem cum Alcoholis bull. partibus quatuor; — *Vm.* Sublimati 12,7, Mercurii 9,5, sublimationem unam absque lotione; — *Br.* Sublimati et Metalli part. aeq., triturationem cum Aqua absque lotione; — His. His8. Sublimati partes octo, Mercurii sex, triturationem cum Aqua, plures sublimationes successivas et lotionem cum Aqua bull.; — *Sp.* Sublimati uncias triginta duas, Mercurii viginti quatuor et duas sublimationes; — Am. Du. *C.* Sublimati libram, Mercurii uncias novem et duas sublimationes successivas; — Pm. Sublimati uncias duodecim cum Aquae pauxillo terere, Mercurii octo uncias addere et valde miscere, donec mercurius inconspicuus reddatur, pulverem sublimare, chloruretum subtiliter pulveratum Aqua destillata ferventi abluere et exsiccare; — *Gr.* sublimationes sex (*Calomel*, *Mercurius dulcis sexies sublimatus*) et novem (*Panacea mercurialis*) indicat.

Hass. et *Pid.* Sublimati libram, Mercurii uncias decem et triturationem cum Aqua, post primam sublimationem tamen volunt productum sedulo triturari cum Mercurii uncia et mixturam denuo sublimari.

Lotio omissa a pluribus pharmacopoeis est alicujus momenti quoad liberationem Mercurii dulcis a parva quantitate sublimati corrosivi semper ei adhaerenti. (GalH.)

2) Verfahren Scheele's.

℞. Mercurii uncias septem (octo *Re.*).
Acidi nitr. Aqua dil. unc. quinque.

Acidum metallo infunde et sub finem effervescentiae digere leni calore, vas subinde agitando, per horas sex. Ignem deinde ita auge, ut liquidum parumper bulliat; decantha tunc a mercurio non dissoluto et statim misce cum solutione bulliente, antea praeparata de

Salis communis . unciis quatuor in Aquae libris sex; praecipitatum Aqua destillata fervente ablue, donec a

kali subcarbonico non ultra turbetur, quo facto siccetur. (Du. *C. Gr. Re.*)

Pm. Mercurii uncias octo, Acidi tenuioris s. 20° vel cujus densitas 1,157 aequet, libram unam misce et coque per semihoram, liquorem limpidum adhuc calidum decantha a hydrargyro et huic Salis marini solutionem saturatam affunde, donec nihil amplius subsideat; decantha et chloruretum albissimum in fundo residuum pluries Aqua destillata elue, donec ista omnino insipida evadat; in umbra aut in hypocausto sicca.

Das Product iſt eins von denen, welche man gewöhnlich mit dem Namen *Praecipitatus albus s. Praecipitatum album* bezeichnet.

Am. Ams. Bel. Br. Ed. Fenn. Fer. Pul. Gal. His. Lus. Pal. R. Sar. Suec. Wir. et *Sw.* ferè eandem formulam. — His5. Solutionem Hydrargyri unciarum quatuor in Acidi nitrici puri sex cum solutione Muriatis Sodae unciarum quatuor in Aquae destillatae libris tribus confundere, addere Aquae purissimae uncias sedecim, liquorem defundere, pulverem album Aqua pura pluries eluere et in umbra exsiccare. — LH. Solutioni Protonitratis Hydrargyri aliam Hydrochloratis Sodii infundere, donec nullum amplius oritur praecipitatum. — Die folgende Formel iſt eine Modification der vorigen.

℞. Nitratis Mercurii crystallisati,
Mercurii, sing. . partem unam.
Salis communis dimidium pondus mixturae. Tritura in mortario vitreo ad extinct. usque et sublima. (*Br.*)

3) Verfahren Hermbſtädt's.

℞. Deutosulphatem Mercurii non ablutum, destillando in retorta ad siccum Mercurii uncias sex et dimidiam et Acidi sulphurici quatuor obtentum.
Mercurii uncias tres cum dimidia. Trituratis ad extinct. adde
Salis comm. unc. quinque et dim. Misce bene triturando et sublima. (GalH. *Br. C.*)

Fer. Mercurii partes duodecim, Acidi sulph. quatuordecim, salis pulverationem cum Mercurii partibus duodecim, mixtionem massae hoc modo obtentae partium octo cum tribus Salis decrepitati et sublimationem; — *Fi.* Mercurii uncias viginti, Acidi sulph. uncias decem; mercurii unciae decem cum acido sulph. commixtae in balneo arenae ad siccum destillentur et massa igne vehementer aucto bene exsiccetur, retortâ diffractâ massae in mortario marmoreo reliquae decem unciae Mercurii et Salis marini decrepitati tres ponderis octantes addantur, quo facto mixta et subtilissime pulverata in lagena vitrea pro tertia parte replenda in balneo arenae igne per horas quinque nutrito sublimentur etc.; — *T.* Sulphatis Protoxydi Mercurii, Mercurii et Salis comm. decrepitati, sing. uncias viginti, caeterum idem ut GalH. agendi modus; — LH. Protosulphatis Mercurii et Chlorureti Sodae partes aequales sublimare.

℞. Mercurii,
Acidi sulph., sing. uncias quatuor.
Acidum guttatim metallo instilla in retortam vitream ingesto, quae in balneo arenae calefiat, donec mixtura in massam albam sit conversa. Apparatu refrigerato sal pulveratum ad perf. extinct. tritura cum
Mercurii unc. duabus cum dimidia.
Adde deinde
Salis mar. decrep. unc. quatuor et dimidiam.
Mixta calefac pedetentim, donec totum sit sublimatum; productum pulveratum iterum sublima. Massam denuo subtiliss. pulv. coque per horam cum dissolutione
Salis Ammoniaci . sesquiunciae in Aquae destillatae libris quinque; filtrato deinde liquore, pulverem Aqua dest. lotum lente super charta josephina sicca. (Li.)

LonN. *Re.* Mercurii libras duas (quatuor *Re.*) cum Acidi sulph. unciis triginta in vase vitreo coque ad exsiccationem; refrigerata cum Mercurii libris duabus in mortario fictili contere, ut optime misceantur, adde Salis marini sesquilibram et tere ad extinct. usque, tum sublima, sublimatum in pulverem subtiliss. contere, per cribrum transmitte et cum Ammonii muriatici unciis octo in Aquae dest. ferv. congio prius liquefacti diligenter misce, sepone ut subsideat pulvis, liquorem effunde et pulverem Aqua dest. ferv. saepius ablue, donec Liquore Ammoniae instillato nihil dejiciatur, fiat pulvis subtilissimus.

Ein ſehr gebräuchliches Praparat, beſonders in England, wo es, wie es ſcheint, als eine Art Panacee betrachtet wird. In hohem Grade reizend, alterirend, wurmtreibend, krampfſtillend, reinigend, ſchweiß-, harntreibend, Nießmittel, ſchmelzend, abführend, auflöſend oder die Speichelexcretion befördernd, je nach der Gabe, Anwendungsweiſe, Umſtänden, Conſtitution des Subjects und den Subſtanzen, mit welchen man es verbindet. Beſonders bei

wirklich venerischen oder als solche betrachteten Krankheiten, bei Scrophelkrankheit, chronischer Leberentzündung, convulsivischen Krankheiten, rheumatischen Schmerzen, veralteten Krankheiten des Hautgewebes und hartnäckiger Verstopfung.

Im Allgemeinen wirkt es bloß alterirend, d. h. als reizendes oder aufregendes Revulsivmittel, in der Gabe von einem bis fünf Gran; von fünf bis fünfzehen Gran genommen, führt es ab.

Man darf weder Chlor, noch Salpetersäure, keine Alkalien, keine kohlensauren Salze oder ihre Schwefelverbindungen, weder Kalkwasser, noch Kupfer, und eben sowenig Eisen und Blei damit verbinden, da es dadurch zersetzt wird.

Flores Calomellis (*Gr.*): Destilletur Calomel in retorta profunda, collo brevissimo et amplo instructa, ita in fornace disposita, ut, collo nimis calido quam quod calomel adhaerere possit, hoc in recipientem amplum, pro dimidio Aqua fervente repletum transmittatur etc. — Alterirend, 1 Gran Abends und Morgens, cathartisch, 5 bis 8 oder 10 Gran.

§. I. Präparate, in denen die Wirkung des salzsauren Queckſilberoxyduls durch nichts oder wenigstens nicht merklich verändert wird.

Pulvis e Calomelle s. Mercurio dulci. (DD. *Sw. Sy. Va.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Amyli pulverati scrupulum unum.
Misce. (DD.)

℞. Mercurii dulcis gr. unum ad duo.
Sacchari pulv. grana quindecim.
Misce. (*Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Pulveris Amyli grana duodecim.
— Sacchari albi semidrachmam.
Misce bene. (*Sw. Va.*)

Alle diese Pulver können auf eine einzige Gabe angewendet werden. Bei venerischen Krankheiten jüngerer Kinder hat man das Folgende empfohlen:

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Sacchari pulverati
scrupulum unum.
Misce sedulo et in partes tres divide per diem sumendas.

Eine Mischung von zwei Drachmen mercurius dulcis mit einer halben Unze Zucker und ebensoviel Weihrauch kann in Räucherungen, eine oder zwei Drachmen auf die Räucherung, in manchen Fällen von venerischen Krankheiten von Nutzen seyn. Eine andere Mischung von vier Gran Calomel und einem halben Scrupel Armenischen Bolus, in vier Theile für den Tag getheilt, ist, nach Clare's und Brachet's Methode, in Einreibungen auf das Zahnfleisch, die innere Fläche der Lippen, die Zunge und den Gaumen vorgeschlagen worden.

Pulvis ad strumam. (RC.)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Muriatis Ferri ammoniacalis (Pharm. Ross.) . . . . grana tria.
Pulveris Rhei . grana quatuor.
Spongiae ustae . . grana decem.
Pulveris Cassiae . grana duo.
Misce fiat pulvis subtilissimus; dentur doses duodecim. — Ein Stück, zweimal in der Woche, mit etwas Syrup bei'm Schlafengehen.

Remedium antitaeniosum, Pulvis vermifugus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Cornu Cervi calcinati,
Cinnabaris, sing. . grana decem.

Alle vier oder fünf Stunden Nachmittags zu nehmen, den Abend trinkt man zwei Unzen Süßmandelöl; den folgenden Morgen nimmt man nüchtern, in Syrup, den dritten Theil eines Pulvers aus einer Drachme Farrnkraut, einer halben Drachme Jalappe, ebensoviel Cardebenedicten und thierischer Kohle; wenn der Bandwurm nicht abgeht, so nimmt man nach zwei Stunden das zweite, und zwei Stunden später das letzte Drittel. — Von Beck vorgeschlagen.

Injectio Hydrargyri Submuriatis s. ex Muriate Hydrargyri s. e Mercurio dulci. (*Re. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Aquae destillatae . uncias octo.

Bei hitziger Harnröhrenentzündung empfohlen, aber höchstens bei manchen chronischen Harnröhrenentzündungen von Nutzen. Folgende Formel von Lagneau ist vorzüglicher:

℞. Mercurii dulcis porph. semunciam.
Solutionis G. Arab. unc. duodecim.

℞. Calomellis . . drachmas duas.
Mucilaginis G. Arab. semunciam.
Trituratis adde
Aqu. Calcariae . . . octarium.

Statt des mucil. g. arab. auch Quittenschleim (*Re.*)

Gargarisma antivenereum. (*Sy.*)

℞. Gummi Arabici drachmam unam.
Decocti Hordei uncias quinque.
Solutioni adde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam
et tunc admisce, bene agitando
Mercurii dulcis pulv. gr. quindecim.

Collyrium antivenereum. (LH.)

℞. Aquae Rosarum . uncias octo.
Calomelanos . . semiscrupulum.
Gummi Arabici drachmam unam.
Calomelani cum gummi contrito adde aquam.

Enema s. Clyster mercuriale. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Amyli,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Misce triturando.

Lotio Veratri mercurialis s. antipsorica. (*Au.*)

℞. Decocti Hellebori albi uncias octo.
Mercurii dulcis drachmam unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Salis Ammoniaci . uncias duas.
Ein schlechtes Präparat, welches Wilson als ein vortreffliches antipsoricum gepriesen hat.

Mixtura cum Calomelle. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis semiscrupulum.
Syrupi Fumariae . uncias duas.
Aquae Fumariae . libram unam.
Halbunzen- oder unzenweise.

Mel e Muriate Hydrargyri s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis. (*Sw. Sy. Va.*)

℞. Merc. dulcis pulv. drach. unam ad duas,
Mellis despumati unciam unam.
Misce triturando. — Bei venerischen Halsgeschwüren empfohlen und bei denen der Geschlechtstheile der Salbe vorzuziehen.

Unguentum de Calomelle s. Mercurii dulci. (*Sy.*)

℞. Merc. dulc. drach unam ad duas.
Cerati albi absque aqua vel Medullae bovinae unciam unam.
Mixtionem par horae quadrantem continua — Bei venerischen Krankheiten, in Einreibungen auf die Haut oder bloß auf die kranke Stelle anzuwenden.

B*. sub eodem nomine indicat pomatum sequens: Mercurii dulcis scrupulos duos, Unguenti basilici unciam. — Marryanus rühmte sie bei verschiedenen pustulösen Affectionen der Haut und bei Aussatz.

Pommade fondante (Hosp. Char. *Va.*): Calomellis, Cerati partes aeq. — Bei manchen Leberanschwellungen auf den Unterleib.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*Ra. Va.* Hot. D.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Unguenti Rosarum drachmas tres.
Dieser ähnlich ist das von Dupuytren gebrauchte *Pomatum antiherpeticum Anglicum* (*Pie.*): Mercurii dulcis drachmam, Axungiae vel Ung. populei uncias quatuor; — es ist aber weniger wirksam.

Pomatum s. Unguentum antiherpeticum. (*Ra. Va.* Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Florum Sulphuris drachmas duas.
Axungiae depuratae unciam unam.
Von Fouquier empfohlen.

Unguentum vel Pomata ophthalmica.

℞. Unguenti rosati simplicis drachmas sex.
Tuthiae praeparatae,
Boli orientalis praeparati, sing. grana novem.
Chlorureti Mercurii praecipitatione parati . . . . grana quatuor.
Misce in mortario vitreo.

Injectio ad carnem luxuriantem urethrae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Olei Scorpionum unciam unam.
Balsami tranquilli . uncias duas.
Nach dem Urinlassen spritzt man ungefähr einen großen Fingerhut voll von dieser Mischung in die Harnröhre und behält sie wenigstens fünf Minuten lang bei sich. Dieses wiederholt man einen Monat lang täglich dreimal. Diese sonderbare Zusammensetzung könnte in manchen Fällen von chronischer hartnäckiger Harnröhrenentzündung von Nutzen seyn.

Bolus e Muriate Hydrargyri s. Mercurio dulci. (*Sw.*)

℞. Merc. dulc. gr. quinque ad decem.
Syrupi simplicis . . . . q. s.
ut fiat cum Pulvere Lycopodii bolus unus. — Soll bei Wasserkopf von Nutzen seyn.

Boli anthelmintico-tonici. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extr. Absinthii drachmam unam.
Fiant boli quatuor. — Auf einmal.
℞. Mercurii dulcis . grana quatuor.
Extr. Seminis Cinae drach. unam.
Fiant boli quatuor. — Alle zwei Stunden ein Stück.
Man empfiehlt sie bei Würmern mit etwas Atonie im Darmcanal.

Boli anthelmintico-nervini. (*B.*)

℞. Merc. dulcis gr. quatuor ad octo.
Extracti Valerianae scrupulos duos.
Fiant boli quatuor. — Gabe, alle drei

Stunden ein Stück, bei Wurmkrankheiten mit nervösen Symptomen.

Pilulae ex Hydrargyro muriatico miti s. e Mercurio dulci. (DD. WW. *Au. E. Ra. Va.*)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae duodecim. (Sax.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Aconiti, sing. drach. unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit
ut fiant pilulae centum viginti. (*Au.*)

℞. Pulv. Mercurii dulcis,
— Micae Panis sicc., sing. semidrachmam.
Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae triginta, lycopodio conspergendae (DD.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Althaeae, sing. part. aeq.
Syrupi simplicis quantum sufficit
ut fiant pilulae granorum duorum. (*Rc. Va.* Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Succi Liquir. pulv. sesquidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat massa, in pilulas sexaginta dividenda. (WW.)

Die Gabe dieser Pillen ist je nach der bezweckten Wirkung, nach der Constitution und nach ihrer eignen Zusammensetzung verschieden; in den ersten ist ein halber, in den zweiten ein ganzer und in den letzten bloß ein Viertelgran merc. dulc. enthalten.

Pilulae antiictericae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Extr. Saponariae drachmas duas.
Misce ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda. — Zwei Stück täglich drei oder vier Mal.

Pilulae resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . grana quatuor.
Extracti Taraxaci grana octodecim.
Fiant pilulae quatuor. — In vier und zwanzig Stunden bei Unterleibsverstopfungen zu nehmen.

Pilulae antisyphiliticae et resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Dulcamarae . . . q. s.
ut fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen.

Bolus ex Sabina s. emmenagogus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Extracti Sabinae grana quatuor.
Syrupi Rhoeados . . . . q. s.
Fiat bolus unus. — Von Perfect mit Nutzen bei Manie von Amenorrhoe angewendet.

Pilulae alterantes. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Electuarii Scordii drachmas duas.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant pilulae septuaginta duae.

Pilulae purgantes. (Am. HassP. *C.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Saponis Alicantini scrup. unum.
Aquae sufficientem quantitatem
ut fiant pilulae quadraginta. (Am. *C.*)

Muß wegen der Einwirkung der Seife auf das Quecksilber, welches dadurch zersetzt wird, verworfen werden.

℞. Saponis jalappini . partes octo.
Mercurii dulcis . partem unam.
Tinct. Cort. Aurantiorum . q. s.
Fiat massa in pilulas ponderis granorum duorum dividenda. — Gabe, für einen Erwachsenen sechs, zwölf bis achtzehen Stück. (HassP.)

Pilulae fondantes s. resolventes Hosp. Char. (*Va.*): Calomellis et Saponis, sing. part. aeq.

Pilulae de Vigarous. (*Bo. Pie Sm.*)

℞. Mercurii . . drachmas quatuor.
Sublimati corros. drachmas duas.
Tritura, addendo Succi Citri guttas aliquot, ad extinct. et adde
Amyli Tritici . uncias quinque.
Fiat cum Succo Citri massa in pilulas duorum granorum dividenda.

Ein schlechtes Präparat, wegen der unsichern Einwirkung des Sublimats und des Calomels auf einander und wegen der Gefahr, den erstern unzersetzt zu geben. Vigarous gab anfangs täglich eine Pille und stieg allmälig bis zu drei Morgens und Abends.

Boli in pertussi. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis grana quatuor.
Extracti Belladonnae grana duo.
Terebinthinae . . . grana sex.
Mellis despumati,
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.
ut fiant boli octo. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück für ein Kind von acht bis zehen Jahren.

Pilulae antivenereae. (*Pie.*)

℞. Mercurii,
Sublimati corros., sing. semunciam.
Radicis Pyrethri,
Sennae pulveratae,
Agarici albi, sing. unciam unam.
Mellis Narbonnensis . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum sex. — Von

ihnen gilt daſſelbe, was von den vorhergehenden geſagt wurde.

Pastilli purgantes (Va.): Calomellis grana sex, Chocolatae scrupulum, fiant pastilli no. 6. — Jeden Abend ein Stück, ein bequemes purgans für Kinder.

Worm pills (Gr.): Calom. unciam, Sacch. duas, Amyli unciam, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. pil. no. 248. — 1 Stück Abends und Morgens für Kinder.

Rotulae vermifugae. (Sp.)

℞. Mercurii dulcis . . uncias duas.
Sacchari cum Succo Berberidis ad apt. consist. decocti unc. quatuor.

Misce ut fiant rotulae.

Trochisci vermifugi Barthezii. (Bo. Ca. Pie.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilag. Gummi Arab. . q. s.

ut fiant trochisci magnitudine monetae franc dictae. — Man giebt davon Kindern ein oder zwei, Erwachſenen ſechs oder acht Stück.

Trochisci anthelmintici Doctoris Ching. (Au. Gr. Re.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Sacchari albi . drachmas decem.
Essentiae Croci . guttas viginti.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s.

Fiant trochisci centum viginti. — Gabe, zwei oder drei Stück.

Gr. Re. Submuriatis Alcohole loti libras duas (unam *Gr.*), Croci semunciam in Aquae octario cocti et expressi, Sacchari albi libras viginti octo, cum Mucil. Tragacanth. in massam redacta. (*Yellow lozenges*). Jede Trochiske ſoll 1 Gran Calomel enthalten. Abends bei'm Schlafengehen 1 Stück und den folgenden Morgen ein Stück von den *Brown lozenges* II. p. 174

Drageae vermifugae. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Sacchari . . . unciam unam.
Amyli . . . . . semunciam.
Mucilaginis Gummi Tragacanthae,
Essent. Bergamottae, sing. q. s.

Fiant pilulae centum quadraginta quatuor ovoideae. — Morgens und Abends ein Stück.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Calomels mehr oder weniger durch fremde Subſtanzen modificirt iſt, nämlich:

A. Durch Aloë.

Opiatum purgans s. purgativum. (Pie.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Aloës, sing. semiscrupulum.
Kali subcarbonici . grana duo.
Syrupi Fumariae . . . . q. s.

Zu verwerfen, weil das Salz einen Theil des Queckſilbers zerſetzt.

Pilulae anthelminticae. (Ful. Ham. Au.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Aloës gummosi, sing. scrupulum.
— Juglandis,
Asae foetidae, sing. scrup. quatuor.

Essentiae Tanaceti quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Ful. Ham.)

℞. Mercurii dulcis,
Aloës Socotrinae,
Res. Jalapae, sing. drachmam unam.

Tincturae Rhei . quantum sufficit ut fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

Wurmtreibend, krampfſtillend, ſchmelzend und laxirend. — Gabe, ſechs bis zwanzig Gran.

Pilulae anthelminticae purgantes. (Ful.)

℞. Mercurii dulcis . . grana tria.
Extracti Aloës gummosi,
— Rhei,
— Tanaceti, sing. grana sex.
Tincturae Tanaceti . . . q. s.

Auf einmal zu nehmen, für einen Erwachſenen.

Boli drastici. (Bo. Pie.)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aloës Socotrinae,
Scammonii Alepp., sing. grana sex.
Rhei pulveratae grana quindecim.
Pulpae Cassiae . . . . . q. s.

Bei rheumatiſchen Affectionen und Hüftweh empfohlen, wegen der heilſamen Ableitung, welche ſie bisweilen bewirken, indem ſie Stuhlausleerungen und Hämorrhoidalfluß hervorrufen.

Boli alterantes pro equis. (Re.)

℞. Aloës Barbadensis drachmas decem.
Calomellis . drachmas tres (vel Sublimati gr. decem).
Seminum Carvi . unciam unam.
Zingiberis . . . drachmas tres.
Olei Caryophyllorum guttas quinquaginta.
Molasses,
Amyli, sing. . . . . q. s.

ad formandam massam, in bolos quatuor dividendam. — Bei Pferden jeden Tag ein Stück, bis Oeffnung erfolgt. (Art. veterin.)

Pilulae ad variolam s. prophylacticae ad variolam. (*Pie. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Aloës, sing.
grana duodecim.
Camphorae . . . . grana octo.
Resinae Guajaci . grana sedecim.
Fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda.

Rosenstein empfiehlt sie als Schutzmittel vor Blattern und als Vorbereitungsmittel zu der Inoculation derselben. — Die Gabe ist nach dem Alter des Subjects verschieden.

B. Durch Spießglanzpräparate.

Aethiops Plummeri, Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis s. mercurialis antimoniatus s. ex Hydrargyro muriatico miti cum Sulphure Stibii aurantiaco s. Hydrargyri stibiatus. (B*. Ba. BorC. Br. D. DD. Fer. Ful. GalM. Ham. Han. HassP. Li. LP. R. Wir. *Au. Ca. Gr. Huf. Ra. Sp. T. Va.*)

℞. Mercurii dulcis porphyrisati,
Sulph. aur. Antim., sing.
part. aeq.
Diu tritura ad obtinendum pulverem subtilissimum. (Ba. Br. D Fer. Ham. Han. HassP. Li. LP. R. Wir. *Ca. Gr. Sp. T.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Sulph. aur. Antim. . partes duas.
Misce triturando. (Ful. *Va.* Hosp. Angl.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
part. unam.
Sacchari albi . . partes novem.
Tritura simul. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

Huf. Mercurii dulcis semiscrupulum, Sulphuris aurati tantidem et Sacchari drachmas tres.

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
part. unam.
Gummi Arabici . partes decem.
Misce bene terendo. (GalM.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
part. unam.
Sacchari albi,
Amyli, sing. . . . partes decem.
Terendo misce intime. (DD.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. Antim. aur., sing.
part. unam.
Gummi Arabici . partes quinque.
Sacchari albi . . . . partes octo.
Fiat pulvis subtilissimus. (B*.)

Au. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. part unam, Gummi quinque et decem Sacchari.

Obgleich dieses reizende Präparat als schmelzendes, alterirendes und reinigendes Mittel bei Scropheln und venerischen, besonders Hautkrankheiten sehr in Ansehen gestanden, so darf man sich doch nicht sehr darauf verlassen. Die Einwirkung seiner beiden Bestandtheile auf einander macht dasselbe, so wie alle Präparate, zu denen es kommt, zu einem sehr unsichern Mittel. — Gabe, sechs, acht und zehen Gran von gleichen Theilen des Gemisches ohne fremde Substanzen.

Pilulae Plummeri s. alterantes Plummeri simplices s. ex Stibio et Hydrargyro s. ex Hydrargyro muriatico miti cum Sulphure stibiato aurantiaco s. antiherpeticae s. ex Protochlorureto Mercurii cum Sulphure aurato (Deutosulphureto) Antimonii. (B*. Ful. Gen. Ham. LH. Lus. RC. WW. *Au. Ca. Ra. Sp. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
part. aeq.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas granorum trium dividenda. (*Sw.*)

Ca. Mercurii dulcis uncias tres, Sulphuris aurati tantidem, Succi Liquiritiae depurati drachmas duas et Mucilaginis Gummi Arabici q. s. ut fiat massa in pilulas granorum sex dividenda; — *Au.* Mercurii dulcis grana quindecim, Sulphuris aurati tantidem et Succi Liquiritiae drachmam ut fiant pilulae granorum duorum; — B*. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas duas, Extr. Liquiritiae scrupulos quatuor et Mucilaginis Gummi Arab. q. s.; — Ham. Sulphuris aurati semidrachmam, Mercurii dulcis grana quindecim, Extracti Erysimi drachmam et Pulveris Liquiritiae q. s. ut fiat massa in pilulas quadraginta quinque dividenda; — *Sp.* Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas sex, Extracti Gentianae quatuor; — RC. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. partes tres, Extracti Gentianae vel amari, Saponis oleosi, sing. unam et si opus, Syrupi simplicis q. s. ut fiat massa; — Lus. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. drachmas sex et Extracti Liquiritiae quatuor; — WW. Mercurii dulcis Sulphuris aurati, sing. grana quindecim et Extracti Conii maculati sesquidrachmam ut fiant pilulae sexaginta; — *Ra.* Mercurii dul-

cis, Sulphuris aurati, sing. semidrachmam, Extracti Cicutae semunciam et Pulveris Cicutae q. s. ut fiat massa in pilulas triginta sex dividenda; — Gen. Mercurii dulcis, Sulphuris aurati, sing. scrupulum unum, Roob Sambuci q. s. ut fiant pilulae viginti quatuor; — LH. Calomelanos, Sulphuris aurati, sing. drachmam unam, Gummi Guajaci sesquidrachmam, Syrupi communis q. s. ut fiant pilulae granorum quatuor.

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Sulph. aur. Antim. semidrachmam.
Extracti Cicutae drachmas duas.
Balsami Copaivae quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (Ful.)

Pilulae diaphoreticae (*Sm.*): Mercurii dulcis, Kermetis mineralis, sing. scrupulos duos, Syrupi Capilli Veneris q. s. ut fiat massa in pilulas sexaginta dividenda.

Pilulae resolventes Finkii. (*Sm.*)

℞. Pulv. Plummeri . grana duodecim.
Extracti Taraxaci . . grana tria.
Gummi Ammoniaci . grana duo.
Scillae pulveratae semidrachmam
Misce ut fiant pilulae trium granorum. — Fünf Stück täglich drei oder vier Mal, und Cichorienthee nachzutrinken. — Besonders nach Wechselfiebern und bei Anschoppungen in den Eingeweiden des Unterleibs mit Oedem der Füße.

Pulvis alterans s. Plummeri compositus. (Hass. Wür. *Pid.*)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.
Sulph. aur. Antim. . drach. unam.
Resinae Guajaci sesquidrachmam.
Fiat pulvis. (Hass. *Pid.*)

Wür. Trium harum Substantiarum part. aeq. et resinam cum aequali Sacchari quantitate triturare.

Pulvis basilicus. (*Gr. Sa.*)

℞. Mercurii dulcis,
Antimonii diaphoretici abluti,
Scammonii Aleppensis,
Cremoris Tartari, sing. part. aeq.
Misce exacte.

Pilulae Plummeri s. alterantes Plummeri s. Hydrargyri Submuriatis s. Calomellis compositae s. Submuriatis Hydrargyri compositae s. resolventes cum Mercurio s. depurantes. (Am. B*. BorC. Hass. Lon. LonN. LP. R. Sar. Wir. Wür. *Au. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. Va. Vm.*)

℞. Pulv. alterantis simpl. semunciam.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.
Balsami Copaivae quantum sufficit
ut fiat massa, e cujus drachma quaque pilulae duodecim formantur. (Wir.)

Gr. Calomell., Sulph. Antim. praecip., sing. drachmam unam, G. Guajaci duas, Bals. Copaiv. q. s.

℞. Balsami Copaivae . partem unam.
Resinae Guajaci partes duodecim.
Contere, addendo sensim
Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing. part. sex.
Alcoholis . . . quantum sufficit
ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
grana quinque.
Succi Liquiritiae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Sulph. aur Antim. . drachmam.
Resinae Guajaci,
Extr. Gentianae, sing.
sesquidrachmam.
Commisce bene. (R.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Res. Guajaci, sing. drachmas duas.
Myrrhae . . . drachmam unam.
Balsami Tolutani . . . . q. s.
Fiant pilulae quinque granorum. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim, sing.
part. unam.
Resinae Guajaci . . partes duas.
Trituratis simul adde
Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.
Fiat massa pilularis. (Am. Ed. Lon. *C. Gr. Re.*)

LonN. *Gr. Re.* loco mucilaginis Spiritus rectificati partis quadrantem addunt; — *Va.* Hosp. Angl. Pilulas pond. granorum quinque parare; — LP. Pulveris alterantis (LP.) scrupulos duos, Resinae Guajaci, Extracti Cicutae, singulorum unum, Mucilaginis Gummi Arabici quantum sufficit ut massa pilularum fiat in pilulas ponderis granorum duorum dividenda. (Gabe, anfangs drei Morgens und Abends, bis nach und nach zwanzig täglich.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim, sing.
drachmas sex.
Trituratis simul adde
Resinae Guajaci,
Extr Liquiritiae, sing. drach. tres.
Mucilaginis Gummi Arab. . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Wür.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing.
scrup. duos.
Extracti Dulcamarae,
Saponis guajac., sing. semunciam.
Misce ut fiant pilulae granorum duorum. (BorC.)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Resinae Guajaci, sing. partes aeq.
Extracti Fumariae,
Balsami Copaivae, ... q. s.
Fiant pilulae quatuor granorum. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.
Sulph. aur. Antim. . drachmam.
Resinae Guajaci sesquidrachmam.
Alcoholis quantitatem sufficientem.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, ein bis vier Stück. (*Au.*)

℞. Saponis guajacini,
Extr. Dulcamarae, sing. semunciam.
Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing. scrup. duos.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sieben bis funfzehn Stück, Morgens und Abends. (*Au.*)

℞. Saponis guajacini sesquidrachmam.
Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Radicis Polygalae Virginicae,
Camphorae, sing. grana quindecim.
Aceti scillitici . . . . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, wie bei den vorhergehenden. (*Au.*)

Pilulae anthelminticae. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Extracti Rhei compositi,
Asae foetidae, sing. drach. unam.
Fiant pilulae grani unius cum dimidio. — Gabe, Morgens vier Stück und täglich um zwei gestiegen.

Pilulae resolventes. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Ferri sulphurici,
Myrrhae, sing. . drachmam unam.
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.
Fiant pilulae trium granorum. — Bei Anschoppungen in den Unterleibseingeweiden nach Wechselfiebern — Gabe, Morgens und Abends vier Stück.

Pilulae resolventes. (*Sa.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Sulphuris aurati Antimonii,
Camphorae, sing. scrupulum unum.
Resinae Guajaci . . semunciam.
Extr. Pimpinellae albae,
— Cicutae, sing. drach. unam
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae antiherpeticae. (*Bo.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Sulph. aur. Antim. grana quinque.
Aethiopis mineralis grana sexaginta.
Extracti Scabiosae grana triginta.
Syrupi Fumariae quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, Morgens nüchtern drei Stück und bis auf sechs Stück täglich auf zwei Mal gestiegen.

Pilulae antivenereae Kaempfii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulph. aur. Antim., sing. scrup. duos.
Trituratis diu adde
Extracti Saponariae,
Res. Guajaci, sing. scrup. quatuor.
Camphorae . . semidrachmam.
Commisce cum
Theriacae . sufficiente quantitate ut fiat massa in pilulas granorum duorum dividenda. — Gabe, sechs Stück, täglich drei Mal, mit einer starken Abkochung von China-, Kletten- oder Sassaparillwurzel, und allmälig bis auf zehen oder zwölf Gran gestiegen.

Pulvis Hydrargyri stibiatus cum Hyoscyamo s. antispasmodicus. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Hyoscyami, sing. gr. unum.
Sulph. aurati Antim. . grana tria.
Sacchari . . . semidrachmam.
Morgens und Abends bei entzündlichen, asthenischen und Krampfkrankheiten. — Besonderen Nutzen gewährt es bei Nyctalopie.

Pilulae sthenicae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphuris aurati Antimonii,
Opii puri, sing. . grana decem.
Kermetis miner. grana quindecim.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae grani unius. — Bei Lungenschwindsucht, Wassersuchten und Krämpfen empfohlen. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück.

Pilulae Antimonii compositae. (*Br.*)

℞. Mercurii dulcis,
Sulphureti Antim. abluti, sing. drachm. tres.
Extracti Gentianae,
Saponis duri, sing. drachm. unam.
Trituratis mercurio et sulphureto adde extractum ut fiat cum sapone mollefacto massa. — Ein schlechtes Präparat.

Pilulae antisyphiliticae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Kermetis min., sing. drach. duas.
Resinae Guajaci drachmas quatuor.

Balsami Peruviani quantum sufficit ut fiat massa cujus drachma quaeque in pilulas duodecim dividatur. — Besonders bei chronischen, vermuthlich syphilitischen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal und allmälig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

Pilulae resolventes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Kermetis min. . grana duodecim.
Roob Sambuci . . . . . q. s.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, gegen das Ende von Lungenentzündungen und bei symptomatischem Husten von Würmern bei Kindern.

Pilulae succicae. (*Ra. Va.* Hôt. D)

℞. Mercurii dulcis sesquidrachmam.
Kermetis mineralis,
Aethiopis miner., sing. drachmam.
Mi. ae Panis . . quantum sufficit ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor. — Gegen Syphilis.

Pulvis e Mercurio s. mercurialis. (Gen.)

℞. Mercurii dulcis . . uncias duas.
Pulveris laxantis (e Tartari, Tartari emet., sing. drachma una et Sacchari drachmis viginti duabus) . . . . . unciam unam.
Magnesiae subcarb. unc. quinque.
Misce.

Tabellae de Mercurio s. mercuriales. (Gen.)

℞. Mercurii dulc. porphyr. drachm. unam.
Pulveris laxantis (formula antea dicta) . . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Aquae Florum Aurant. . . q. s. ut fiant tabellae septuaginta duae, Oleo Bergamottae aromatizandae. — Jede enthält einen Gran mercurius dulcis.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis
Sulph. aur. Antim., sing. grana sex.
Resinae Guajaci drachmam unam.
Fiant doses sex. — Gabe, Morgens und Abends bei Hautkrankheiten.

Boli resolventes et incitantes. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . grana sedecim.
Kermetis mineralis . grana octo.
Camphorae . . . grana triginta.
Roob Sambuci . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Entzündungen der Eingeweide mit Neigung zu Asthenie.

Pilulae antimoniales compositae s. Mercurii dulcis et Opii compositae. (Am. *C. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Opii . . . . grana quindecim.
Tartari stibiati . grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi . . q. s. ut fiat massa in pilulas quindecim dividenda. (*Sy.*)
Am. et *E.* Mercurii dulcis drachmas duas, Opii unam, Tartari stibiati scrupulum et Syrupi Sacchari q. s. ut fiant pilulae sexaginta.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydulati stibiatae. (RC.)

℞. Tartari emetici grana quindecim.
Mercurii dulcis,
Camphorae cum aliquot guttis Alcoholis pulver., sing. drachmam.
Opii . . . . . semidrachmam.
Mucilag. Gummi Arab. . q. s. ut fiat massa in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Rheumatische Schmerzen und syphilitische Knochenschmerzen. — Gabe, zwei Stück täglich zwei Mal.

Pilulae hydragogae. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulveris Jamesii,
Scammonii, sing. grana quinque.
Fiant pilulae tres. — Auf eine Gabe.

Pilulae expectorantes. (*E.*)

℞. Mercur. dulcis gr. viginti quatuor.
Scillae . . . . semidrachmam.
Tartari stibiati . . . grana sex.
Opii . . . . grana octodecim.
Fiant pilulae viginti quatuor. — Gabe, alle Abende ein Stück, bei catarrhalischen Affectionen.

Pilulae hydragogae Janini. (*Ca. Huf.*)

℞. Aquae communis . . libras sex.
Jalapae,
Aloës Socotrinae,
Sennae, singularum libram unam.
Ferri subcarbonici,
Nitri, sing. uncias octo c. dimid.
Agarici,
Mechoacannae,
Rhei,
Scammonii,
Radicis Ericae,
Hermodact., sing. unc. sex et drach. duas.
Aethiopis mineralis uncias quinque.
Cremoris Tartari uncias duas et sesquidrachmam.
Turpethi gummosi,
Gummi Guttae,
Trochiscorum Alhandal,
Mercurii dulcis,
Tartari stibiati, sing. uncias duas.

Coque sennam et cremorem in aqua per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et liquori in olla ferrea calefacto adde substantias reliquas porphyrisatas et mixtas, agitando continuè, leni igne ut obtineatur massa in pilulas quatuor granorum dividenda, quae in pulvere Jalapae volutae siccentur.

Stark purgirend. — Gabe, nach den Umständen, anfangs vier Pillen und bis zum bezweckten Erfolg gestiegen.

C. Durch Stinkasand.

Pulvis Gratiolae cum Hydrargyro s. vermifugus. (*Au.*)

℞. Herbae Gratiolae scrupulos duos
Mercurii dulcis . grana quinque.
Asae foetidae . semidrachmam.
Olei Menthae piperitae guttas tres.

Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. — Von Hargens gegen Bandwurm gepriesen.

Pilulae anthelminticae. (*Au. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Asae foetidae . . . partes tres.
Ferri sulphurici . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Fiant pilulae. (*Vm.*)

*Sw**. loco syrupi Acetum scillit. addere et pilulas granorum quatuor parare.

℞ Mercurii dulcis,
Asae foetidae,
Rhei,
Sagapeni, sing. drachmam unam.
Tincturae Gentianae . . . q. s.

ut fiant pilulae grani unius. (*Sp.*)

Gegen Aëcariden und Bandwurm empfohlen. — Gabe, von den erstern zwei, selten drei, zwei Mal täglich.

℞. Extracti Rhei,
— Juglandis,
Asae foetidae,
Mercur. dulcis, sing.
semidrachmum.

Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ein bis vier Stück täglich. (*Au.*)

Boli anthelmintici et antispasmodici. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Asae foetidae . scrupulum unum.
Extracti Valerianae . scrup. duos.

Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Wurmkrankheiten mit Epilepsie, Veitstanz und Krampfkoliken.

Pilulae resolventes. (*Sa.*)

℞. Asae foetidae . drachmam unam.
Pulveris Glandium Quercûs,
Aethiopis min., sing. semigrenum.
Mercurii dulcis . grana quinque.
Syrupi Papaveris,
Pulveris Liquiritiae, sing. . q. s.

Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae emmenagogae. (*Pie.*)

℞. Extr. Taraxaci,
— Saponariae, sing. drachmam.
Boracis electi,
Asae foetidae, sing. semidrachmam.
Aethiopis mineralis,
Mercurii dulcis, sing.
grana viginti.
Syrupi Hederae terrestris . q. s.

D. Durch Copaivabalsam.

Pilulae ad gonorrhaeam. (*Ca. Pie. Ra.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Conserv. Ros. rubr.
uncias quatuor.
Sanguinis Draconis . . semunciam.
Balsami Copaivae unciam unam.

Fiant pilulae granorum sex. — Bei veralteten Gonorrhöen von Atonie gerühmt. — Gabe, ein, dann zwei und drei Stück, Morgens und Abends, mit eisenhaltigem Wasser zum Getränk.

E. Durch Catechu.

Pilulae adstringentes. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu,
Bals. Copaivae, sing.
drach. quinque.
Syrupi Consolidae majoris . q. s.

ut fiant pilulae centum quinquaginta. Gabe, vier Stück täglich drei Mal — Bei verdächtigem weißen Fluß und sogenannten atonischen Blennorrhöen gepriesen.

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.
Catechu . . . scrupulum unum.
Oculor. Cancror. scrupulos duos.
Balsami Copaivae semiscrupulum.
Syrupi Chinae vel Consolidae majoris . . . . quantum sufficit

ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Morand bei Schleimflüssen von Atonie. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal und allmälig bis auf sechs in vier und zwanzig Stunden gestiegen.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Catechu . . . drachmas duas.
Gummi Arabici scrupulos quatuor.
Terebinthinae coctae . . . q. s.

ut fiant pilulae centum quinquaginta. — Quarin, dessen Formel Saintes-Marie etwas verändert hat, verordnete diese Pillen bei weißem Fluß und Tripper, zu vier Stück täglich drei Mal.

F. Durch Kampher.

Pulvis Hydrargyri cum Camphora s. excitans. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis gr. viginti quatuor.

Camphorae,
Conchar. praep., sing. scrup. duos.
Divide in partes octo. — Gabe, täglich drei bis vier, bei Waſſerſuchten, um die Functionen des abſorbirenden Syſtems zu bethätigen.

Pilulae Muriatis Hydrargyri camphoratae s. Muriatis Hydrargyri oxydulati et Camphorae s. Mercurii dulcis et Camphorae s. mercuriales camphoratae. (RC. *Ca. Ra. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Camphorae . . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat cum Pulvere Liquiritiae pilula. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Camphorae grana viginti quatuor.
Mucilag. Gummi Arab. . . q s. ut fiat massa in pilulas duodecim aequales dividenda. — Gabe, zwei Stück.
Addi possunt pro rei necessitate: Opii grana duodecim aut Extracti Aconiti tantidem aut Extracti Conii grana octodecim aut Extracti Hyoscyami tantidem; — dann giebt man zwei oder drei Stück. (RC.)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.
Camphorae cum guttis quinque Alcoholis triturat. . drach unam.
Sacchari albi pulv. drachmas tres.
Mucilaginis Gummi Arab. . q. s. ut fiant pilulae ducentae quadraginta. (*Ra.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes octo.
Camphorae cum Alcohole pulveratae . . . . partes quatuor.
Sacchari albi . partes duodecim.
G. Tragacanthae . partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae. (*Vm.*)

G. Durch Zimmt.

Boli purgantes et tonici. (*Bo. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis,
Cinnamomi, sing. . grana decem.
Hermodactylorum . drach. unam.
Syrupi Florum Persicae . . q. s. ut fiant boli decem.

H. Durch Coloquinten.

Pilulae trium diabulorum. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.
Trochiscorum Alhandal,
Scammonii Alepp., sing. grana quatuor.
Syrupi Stoechatis quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor. — Bei Harnröhrenentzündung, zur Linderung und Verminderung der Entzündung gerühmt.

Pilulae mercuriales. (Br. *Sa.*)

℞ Mercurii dulcis . . semunciam.
Extr. panchymagogi sesquiunciam.
Misce ut fiant pilulae. (Br.)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Massae Pil. Colocynth. c. Aloë unciam unam.
Syrupi Rhamni . . . . . q. s.
Fiat massa pilularis. (*Sa.*)

I. Durch Spießglanzmohr.

Boli purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis grana quindecim.
Aethiopis mineralis grana decem.
Pulpae Cassiae recentis . . q. s.
Morgens nüchtern zu nehmen.

Pilulae antisyphiliticae. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Aethiopis min, sing. . drachmam.
Farinae Lini in solutione Gummi Arabici dilutae quantum sufficit ut fiant pilulae triginta sex. — Im zweiten Stadium der Harnröhrenentzündung. — Gabe, täglich zwei Stück, Morgens und Abends und alle fünf Tage ein Purgirmittel.

Pilulae lac repellentes. (*Bo.*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Aethiopis min. drachmam unam.
Kali sulphurici . . semunciam.
— nitrici . drachmam unam.
Camphorae . . semidrachmam.
Resinae Jalapae scrupulum unum.
Gummi Arabici drachmam unam.
Syrupi Quinque Radicum . q. s. ut fiant pilulae quatuor granorum. — Morgens und Abends zwei Stück, mehrere Stunden vor und nach der Mahlzeit.

Opiatum antisyphiliticum. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis unc. duas c. dimid.
Aethiopis mineralis uncias duas.
Saponis Veneti . . uncias octo.
Gummi Tragacanthae . . q. s.
Fiat massa homogenea, cui adde
Extr. Boraginis,
— Bugulae, sing. . uncias tres.
Camphorae . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulo. — Bei veneriſchen Krankheiten mit Scrophelcomplication. — Eine halbe bis eine Drachme in Pillen oder in einer paſſenden Flüſſigkeit.

J. Durch Eiſen.

Murias Hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus, Hydrochloras Mercurii ferratus, Calomelas ferruginosus. (*Ca. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes sex.
Oxydi Ferri nigri partem unam.
Triturata sublima. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes tres.

Hydrochloratis Ferri ammoniacalis . . . . . partem unam.
Misce bene triturando. (*Ca. Sw*)

Von Hartmann in ſcrophulöſen Krankheiten, Lymphgeſchwülſten und Wurmbeſchwerden empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Gran.

Opiatum purgans et tonicum. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Asellor., sing. . drach. duas.
— Croci Martis aperitivi,
— Chinae, sing. . semunciam.
Extracti Juniperi . . . . q. s.
Misce sedulò.

K. Durch Guajacharz.

Pulvis errhinus s. sternutatorius. (*Au.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Camphorae,
Res. Guajaci, sing. grana quinque.
Sacchari crystall. semidrachmam.
Chinae . . . scrupulum unum.
Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Camphorae,
Resinae Guajaci, sing. grana decem.
Sacchari crystall. scrupulos duos.
Chinae . . . scrupulum unum.
Olei Caryophyllorum guttas duas.
Divide in partes viginti.

℞. Mercurii dulcis . scrupulos duos.
Camphorae,
Res. Guajaci, sing. grana decem.
Sacchari crystallisati scrupulos duos.
Chinae,
Rad. Helleb. albi, sing. grana decem.
Olei Cajeput . . guttas quinque.
Divide in partes viginti. — Alle drei Pulver werden von Kleber bei Amauroſe geprieſen.

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Sacchari . . . . grana decem.
Tinct. Guajaci ammon. gutt. unam.
Misce sedulo.

Pilulae Mercurii dulcis et Guajaci. (BorC.)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Pulv. Succi Liquiritiae,
— Res. Guajaci, sing. scrup. quatuor.
Fiant pilulae octoginta.

Pilulae antiherpeticae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Resinae Guajaci drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae . . . q. s.
Fiant pilulae septuaginta duae. — Morgens und Abends zwei Stück mit einem ſtarken Hopfenaufguß.

Pilulae antisyphiliticae. (*Ca. Va.* Hosp. Ludov.)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Guajaci, sing. drachmas (uncias *Va.*) duas.
Pulv. R. Althaeae uncias quatuor.
Syrupi Cydoniorum . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Alibert verordnet fünf bis ſechs Stück täglich.

Pilulae antirheumaticae. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . granum unum.
Pulv. Resinae Guajaci,
— Flor. Arnicae, sing. gr. quatuor.
Fiant pilulae duae. — Von Vigarous geprieſen; er giebt ſie auf einmal.

Pilulae antiarthriticae. (*Pie. Sa.*)

℞. Mercurii dulcis,
Res. Guajaci, sing. drach. unam.
Saponis medicinalis . semunciam.
Extr. Fellis Tauri drachmas duas.
Ligni Guajaci pulverati. . q. s.
ut fiant pilulae granorum quatuor. — Ein Präparat, welches wegen der darin ſtattfindenden Zerſetzung des ſalzſauern Queckſilberoxyduls zu verwerfen iſt. — Gabe, zwei bis vier Pillen auf zwei Mal den Tag über.

Pilulae antiherpeticae. (B.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Rhois toxicod., sing. drach. unam.
Sulphureti Calcis,
Res. Guajaci, sing. drachmas duas.
Tartari stibiati grana duodecim.
Extr. Opii gumm. grana quindecim.
— Saponariae . . . . q. s.
ut fiant pilulae centum viginti. — Ein ſchlechtes Präparat wegen Zerſetzung des Calomel.

Pilulae mercuriales. (Fer.)

℞. Mercurii dulcis,
Extr. Guajaci, sing. unciam unam.
Camphorae . . sesquidrachmam.
Balsami Copaivae quantum sufficit ut fiat massa pilularis. — Gabe, zwölf Gran bis eine halbe Drachme.

L. Durch Ammoniakgummi.

Pilulae resolventes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Gummi Ammoniaci in Aceto scill. soluti . . . . . semunciam.
Rhei . . . . drachmas duas.

Saponis albi,
Extr. Saponariae, sing. unc. unam.
Conservae Inulae,
Syr. Quinque Radicum, sing. q. s. ut fiant pilulae granorum quatuor. — Aus der früher genannten Urſache zu verwerfen.

M. Durch Gummigutt.

Pulvis vermifugus. (His.)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
G. Guttae . grana sex ad decem.

Gabe, für einen Erwachſenen, Morgens in Syrup zu nehmen.

Pulvis catharticus. (*Gr.*)

℞. Submur. Hydrargyri,
G. Guttae,
Jalapae,
Cinnamomi, sing. . drach. duas.
Misce. — 5 Gran bis 1 Scrupel.

Pilulae anthelminticae. (*Gr. Re.*)

℞. Hydrarg. Submuriat. grana quinque.
Gummi Guttae . . grana octo.
Fiant cum Mucilagine pilulae. — Auf eine Gabe Morgens. (!?)

Pilulae catharticae (*Gr.*): Calomel. gr. decem, Pil Cambog. comp., Extr. Colocynth. c., sing. gr. quindecim, Syr. Zingib. q. s. ut f. pil. no. 12. — Bei Verſtopfung Abends und Morgens zwei Stück.

Pilulae de Gutta Gamandra (*Gr.*): Res. Jalap., Scammonii, Guttae, Calom., sing. semunciam, G. Ammon. in Succo Irid. solut. drach. tres, Tart. vitriol. duas, Mastich. unam, Croci scrupulum, Ol. Tereb. gutt. quadraginta, Syr. Rhamni q. s.

N. Durch Ipecacuanha.

Pulvis Ipecacuanhae hydrargyratus s. cum Calomelane s. mercurialis. (Suec. *Gr*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Pulv. Rad. Ipecacuanh. part. quatuor.
Tritura simul.

Gr. Calomell. drachmam unam, Ipecac. duas, Cinnam semidrachm, Sacch. alb. sesquidrachmam, misce. — 2—5 Gran.

Enema mercuriale s. mannatum. (*Au.*)

℞. Mannae . unciam unam ad duas.
Aquae . . . . . uncias sex.
Olei Ricini cum Vitello Ovi triti unciam unam ad duas.
Mercurii dulcis scrupulum unum.
Ipecac. pulv. semidrachmam ad drachmam.

Loco olei Infusum Jalapae adhiberi potest.

℞. Mercurii dulcis,
Ipecac. pulv., sing. . scrupulum.
Olei Lini . . . unciam unam.
Infusi Chamomillae uncias octo.
Misce sedulo.

Pilulae Calomellis et Ipecacuanhae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Calomellis . . grana quinque.
Ipecacuanhae pulv. grana decem.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Misce fiant pil. no. 10. — 1—3 täglich.

O. Durch Jalape.

Pulvis ad lumbricos s. purgans s. anthelminticus s. vermifugus s. Jalapae et Muriatis Hydrargyri oxydulati. (DD. LH. RC. Suec. *E. Pie. Ra. Sa. Sw. Sy. Va. Vm.*)

℞. Radicis Jalappae . grana viginti.
Mercurii dulcis . grana decem.
Misce. (*Sw. Sy.*)

Suec. Jalapae partes tres et Mercurii dulcis unam; — DD. Jalapae partes sex et Mercurii dulcis unam; — His. Jalapae decem et quinque vel decem Mercurii dulcis; — RC. Jalapae scrupulum, Mercurii dulcis grana quinque.

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei . . . . . grana sex.
Jalapae . . . . grana triginta.
Misce. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Mercurii dulcis . . grana octo.
Jalapae . . . . grana triginta.
Scammonii . . . grana septem.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis. (*Pie.*) — In Hühnerbrühe zu nehmen.

Sa. Mercurii dulcis unciam, Resinae Jalapae drachmas duas, Scammonii sesquiunciam et Corallii tantidem.

℞. Calomelanos . . . grana tria.
Seminis Cinae,
Radicis Valerianae,
— Jalapae, sing. grana duodecim.
Misce. — Gabe, auf ein oder zwei Mal. (LH.)

℞. Jalapae . . . . . partes duas.
Rhei,
Santolinae, singularum partes sex.
Kali sulphurici . partem unam.
Mercurii dulcis partem dimidiam.
Misce. (*Vm.*)

℞. Mercurii dulcis,
Jalapae,
Rhei, singulorum grana quinque.
Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.

Fiat pulvis. (*E.*)
Gabe, funfzehen oder zwanzig Gran, in Syrup.

Pulvis evacuans s. laxans puerorum. (B*. Br. *Sp.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae,
Amygd. dulc. excort., sing. drach. duas.
Sacchari albi . . unciam unam.
Antimon. diaphor. scrupulos duos.
Olei Citri . . . . guttas duas.
Fiat pulvis. (B*. Br.)

Sp. Mercurii dulcis unciam, Resinae Jalapae drachmas tres, Amygdalarum dulc. sesquidrachmam, Cinnabaris drachmam et Sacchari sesquiunciam.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran und mehr.

Pilulae catharticae s. Calomelanos s. ex Hydrargyro cathartice s. purgantes cum Hydrargyro muriatico miti s. Mercurii dulcis et Jalapae simplices s. purgantes de Calomelle. (DD. *Gr. Re. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
Pulv. Rad. Jalapae semidrachmam.
Mucilag. Gummi Arab. . q. s.
Fiant pilulae quindecim. (DD.) — Auf zwei Mal.

Re. Calomel. gr. quinque, Rad. Jalapae quindecim, Cons. Cynosbati q. s. — Auf eine Gabe. — *Gr.* Calom. gr. tria, Jalap. novem, Mucil. G. Arab. q. s. ut f. pil. tres. — Nachts.

℞. Mercurii dulcis drachmam unam
Rad. Jalapae pulv. drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*)
— Sechs bis zehen Stück auf einmal.

Trochisci vermifugi. (GalH.)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Rad. Jalapae, sing. part. viginti quatuor.
Sacchari albi partes quingentas.
Gummi Tragacanthae partes octo.
Aquae Florum Aurantiorum q. s.

Trochisci contra vermes s. hermetici s. vermifugi s. anthelmintici Doct. Ching. (Br. *Gr. Re. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis partes quatuor.
Resinae Jalapae . partem unam
Sacchari albi . partes sedecim.
Misce exacte et cum
Mucilag. Gummi Arab. . q. s
fiant massae, in globulos formandae et Pulvere Amyli conspergendae, quarum pondus pro quoque aetatis anno pro granis quinque augendum est; quaeque, modulorum ligneorum ope et deprimendo illas, annorum numerum cui pondus respondet indicans. (*Vm.*)

Gr. Re. Submuriatis uncias septem cum Alcohole loti, Jalapae libras tres cum dimidia, Sacch. alb. libras novem, Mucil. Tragac. q. s. ad formandam massam, in trochiscos dividendam, quorum quisque submuriatis semigranum continet (Ching's brown lozenges, (f. früher.) Nicht ſicher. — *Sw*. Triturare simul Rad. Jalapae et Gummi Arab, sing. drachmas duas, mixturam cum Aquae semuncia diluere, emulsioni huic addere mixturam e Mercurii dulcis drachmis decem, Sacchari albi unciis quatuor et Gummi Tragacanthae sesquidrachma, triturare cum Aquae q. s. et massam parare modo praemonito in trochiscos formandam; — *Gr.* Calomel. unciam unam, Res. Jalap. duas, Sacch. alb. libr. duas, Mucil. G. Tragacanth. c. Aq. Rosar. praep q. s. ut f. past. no. 1960. (jede enthält ½ Gr. Calomel und ½ Gr. Jalape); praeterea: Calomel scrupulum, Jalap. drachmam, Zingib. scrup. duos, Sacch. unciam, Cinnab. Antim. q. s. ad colorand., Syr. simpl. q. s.

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque.
Pulv. Cinnamomi gr. quadraginta.
— Resinae Jalapae grana septuaginta quinque.
Sacchari albi . . sesquiunciam,
Mucilag. G. Tragacanthae q. s. ut fiant trochisci (cujus ponderis? . — Für Kinder, ſo viel Stück, als ſie Jahre alt ſind, doch nicht über zehen. (*Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Pulv. Rad. Jalapae, sing. scrup duos.
— Sem. Cinae drachmas duas.
— Sacch. albi . unc. quatuor.
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.
Fiat massa, cujus quaeque drachma in decem trochiscos dividatur. (Br.)

Pilulae Hydrargyri jalappinae s. mercuriales s. purgantes s. ex Resina Jalapae s laxantes s. Saponis compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae s. mercuriales saponaceae. (B. Bor. BorC. Br. Han. Hass. HassP. O. Pol. WW. *Huf. Ra. Va.* Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis,
Resinae Jalapae, sing. part. unam.
Saponis medicinalis . partes duas.
Fiant pilulae granorum duorum. — Ein oder zwei Stück auf einmal. (Br. *Ra.*)

Va. Trium omnium ingredientium partes aequales et pilulas granor. quatuor.

℞. Mercurii dulcis . unciam unam.
Resinae Jalapae,

Saponis Alicant., sing. sesquiunciam. Fiant pilulae granorum duorum. — Zwei oder vier Stück auf einmal. (BorC. WW.)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Resinae Jalapae,
Saponis Alicant , sing. uncias sex.
Essentiae Aurantiorum . . q. s. ut fiat massa pilularis. Von sechszehn bis zu dreißig Gran. (Hass.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Saponis jalappini partes quinque. Misce. (O.)

B. Bor. Han. Pol. et *Huf.* Mercurii dulcis partem unam et tres Saponis jalappini; — HassP. s. Pilulae purgantes.

Keine gute Zusammensetzung wegen der Zersetzung des Quecksilberoxyduls, wie alle folgende, welche Seife enthalten.

Pilulae Jalapae compositae s. Mercurii dulcis et Jalapae saponaceae compositae. (Am. *C.*)

℞. Mercurii dulc. drach. sex et scrup. duos.
Pulveris Jalapae,
— Rhei,
Saponis Alicant , sing. unciam unam.
Tartari stibiati grana octodecim.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat massa pilularis.

Pilulae hydragogae. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis,
Saponis jalapini,
Pulv. G. Guttae, sing. drach. duas.
Fiant pilulae granorum quatuor. — Drei bis sechs auf einmal.

Pilulae cathartico-diureticae. (RC.)

℞. Pulveris Scillae . . grana sex.
— Jalapae . . grana decem.
Mercurii dulcis . grana quatuor.
Pulveris aromatici . grana sex.
Fiant cum Syrupo Zingiberis pilulae quatuor granorum, una vice, noctibus alternis propinandae et Pulv's Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis quovis solutus ideneo liquido, mane insequenti exhibendus. — Opii granum unum subinde addi potest.

Pilulae catarrhales s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum Mercurio. (D. Pal. Wir. Sa *Sp. Sy.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae drachmam unam.
Extr. panchymagogi unc. unam.
Olei ess. Aurant. guttas triginta.
Fiat massa pilularis. (D. *Sp.*)

Sa. Mercurii dulcis grana duo, Resinae Jalappae tantidem et Extracti panchymagogi grana sex; — *Sy.* Mercurii dulcis grana quatuor, Resinae Jalapae tantidem et Pilularum Rufi semidrachmam.

℞. Mercurii dulcis,
Scammonii,
Resinae Jalapae,
Extr. panchymagogi,
— catholici, sing. drachmam.
Tincturae Sassafras quantum sufficit ut fiant pilulae viginti quinque. — Gabe, zwei Stück auf einmal; nach zwei Stunden nimmt man eine gleiche Gabe, wenn die erste nicht hinreichend ist.

Pilulae albae. (*Ca.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Pulveris Jalapae . . semunciam.
Croci Martis aperit. drach. duas.
Asellorum . . scrupulos duos.
Syrupi Quinque Radicum . q. s. ut fiant pilulae granorum quatuor. — Von Barthez bei Scropheln empfohlen. — Gabe, zwei Stück täglich.

Boli purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Resinae Jalapae,
Kali sulphurici, sing. . grana sex.
Syr. Cichorii comp. . . . q. s.
Chirac machte häufig Gebrauch davon.

Chocolata purgans. (*Bo. Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . unciam unam.
Jalapae . . . . sesquiunciam.
Chocolatae simplicis libram unam.
Fiant morsuli drachmae unius. (*Pie.*)

Bo. Mercurii dulcis drachmam unam, Jalapae sex et Chocolatae libram.

Pilulae laxantes et resolventes. (*Ca.*)

℞. Radicis Zingiberis,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Camphorae,
Moschi, sing. . semidrachmam.
Mercurii . . . grana duodecim.
Sublimati,
Turpethi, singulorum grana octo.
Tritura exacte et adde deinde
Extr. Jalapae,
— cathartici, sing. drach. duas.
Asae foetidae,
Kali sulphurici, sing. semunciam.
Massae Pilularum Rufi,
Galbani,
Extr. Liquiritiae, sing. drachmam.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Elixir proprietat. non acidi q. s. ut fiant pilulae quatuor granorum — Eine unförmliche Zusammensetzung. — Sanchez verordnete vier Pillen täglich, indem er allmälig bis auf funfzehen stieg.

Tabellae purgantes. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . . semunciam.
Resinae Jalapae scrupulos quatuor.
Scammonii . scrupulos quinque.
Sacchari . . . . uncias tres.
Gummi Tragacanthae . . q. s.

Erwachsenen eine Drachme, Kindern von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum neapolitanum. (*Pie.*)

℞. Pulv. Mercurii dulcis,
— Jalapae, sing. sesquidrachm.
— Scammonii scrupulum unum.
— Rhei,
— Sennae, sing. drachmas duas.
— Guajaci,
— Sassaparillae,
— Chinae, sing. . semunciam.
Syrupi Rosarum solutivi . q. s.

Misce exacte. — Bei chronischen Harnröhrenflüssen. — Gabe, alle zwei Tage, Morgens nüchtern eine bis zwei Drachmen, drei Wochen lang.

Panes (biscuits) purgantes et vermifugi. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Pulveris Jalapae . . uncias tres.
— Coriandri drachmam unam.
Farinae Tritici . libram unam.
Sacchari albi . . sesquilibram.
Ova . . . . . no. 24.
Corticem Citri . . . . no. 1.
Essent. Bergamot. guttas viginti quatuor.
Aquae Flor. Aurant. unciam unam.

Fiant panes unciae unius. — Jedes Biscuit enthält funfzehen Gran salzsaures Queckſilberoxydul und dreißig Gran Jalape.

Pomatum s. Unguentum purgans. (Fer.)

℞. Pulv. Jalapae grana quadraginta.
— Scammonii gr. viginti quatuor.
— Mercur. dulcis gr. duodecim.
Succi gastrici animalis . . q. s. ut fiat pasta.

P. Durch Magnesia.

Boli laxantes Chaussieri (*Ra. Va.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana tria.
Sulphatis Magnesiae gr. quatuor.
Syrupi Rhamni quantum sufficit ut fiat bolus.

Hosp. de la Mat. Va. Bolos tales quatuor de die sumendos.

Q. Durch Opium.

Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus s. Muriatis Mercurii dulcis opiatus s. Hydrargyri s. Mercurii dulcis cum Opio. (DD. LP. Suec. *Au. Va.*)

℞. Mercurii dulcis,
Opii pulverati, sing. . semunciam.
Misce.
℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Pulveris Opii . granum unum.
— Amyli . scrupulum unum.
Misce bene. (DD. Suec.)

Au. Va. Hosp. d'Allem. Opii grana duo, Mercurii dulcis sex et Sacchari drachmam, in partes sex dividenda — Als vortreffliches Mittel gegen Leberentzündung gerühmt. LP. empfiehlt es gegen Geschwüre, Krebs ꝛc.

Collyrium siccum. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Mercurii dulcis,
Sacchari pulv., sing. scrup. unum.
Opii . . . . . grana quatuor.
Tritura simul. — Bei rebellischen, besonders sogen. syphilitischen Augenentzündungen.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis . grana sedecim.
Opii . . . . . grana quatuor.
Ipecacuanhae . . . grana octo.
Fiant doses octo. — Gabe, ein Stück alle Stunden oder zwei Stunden. — Von Chapman bei Ruhr empfohlen.

℞. Opii . . . . . grana tria.
Ipecacuanhae . . . grana sex.
Mercurii dulcis . sesquigranum.
Nitri . . . . semidrachmam.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei oder vier Stunden.

Pulvis expectorans. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Opii . . . . . grana tria.
Ipecacuanhae . . . grana sex.
Nitri . . . . drachmam unam.
Fiant doses sex — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden, in Syrup.

Aqua mercurialis balsamica Plenkii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulos duos.
Tinct. Myrrhae drachmas quatuor.
Lauduni liquidi Sydenhami,
Dec. Chinae concent., sing. unciam.
Misce terendo. — Bei schmerzlosen venerischen Geschwüren, wo es die Thätigkeit der Gewebe belebt, einige Mal mit Erfolg gebraucht; man tränkt Charpie damit.

Mixtura antisyphilitica. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmas duas.

Opii puri . . . grana duodecim.
Conservae Rosarum unc. quatuor.
Misce exacte. — Diese Gabe soll zu einer vollständigen antisyphilitischen Behandlung hinreichend seyn. — Man nimmt sie portionenweise des Morgens in Mandelsyrup mit einer concentrirten Abkochung von Guajac.

Pomatum s. Unguentum antivenereum. (*Pie. Sm.*)

℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Laudani liq. Sydenh. drach. duas.
Cerati Galeni . . unciam unam.
Exacte trituratis adde
Essentiae Rosarum guttam unam.
Als Schutzmittel gegen venerische Ansteckung, eine Stunde vor dem Beischlaf auf die Eichel eingerieben und selbst als aphrodisiacum mit Unrecht empfohlen.

Pilulae Hydrargyri Submuriatis s. Hydrargyri Submuriatis cum Opio s Mercurii dulcis et Opii. (DD. *Re. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis partes duodecim.
Opii . . . . . partem unam.
Micae Panis partes septemdecim.
Mellis depurati quantum sufficit ut fiant pilulae gran. duor c. dimid. (*Vm.*)

*Sw**. Mercurii dulcis partes quatuor, Opii unam, Micae Panis tres et Syrupi Sacchari q. s. ut fiant pilulae grani unius; — DD. Calomelanos partes quatuor, Opii unam et quatuor Micae Panis ut fiant pilulae triginta; — *Re.* Submuriatis drachmam unam, Pulv. opiati tres, Syrupi simpl. q. s ad pil. no. 60; praeterea: Submuriatis drachmam unam, Antim. tartariz. grana quindecim, Opii purif. semidrachmam, Syrup. simpl. q. s. ad pil. no. 60.
Bei venerischen, besonders mit Geschwüren verbundenen Krankheiten, empfohlen.

Pilulae antihydropicae. (*Au*)

℞. Mercurii dulcis semidrachmam.
Opii . . . . scrupulum unum.
Rhei pulveratae drachmam unam.
Extracti Quassiae drachmas tres.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, neun bis zehen täglich drei Mal.

Pilulae de Leslie. (*Pie.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Opii . . . . . semigranum.
Misce bene. — Bei Gesichtsschmerz. — Dreimal täglich.

Pilulae purgantes. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis grana duodecim.
Pulveris Rhei . . grana viginti.
Pulveris Opii . granum unum.
Fiant pilulae octo. — Gabe, vier Stück auf einmal. Die übrigen, wenn keine Wirkung erfolgt ist, nach einer Stunde.

Pilulae Pringelii. (Gen.)

℞. Extr. cathartici scrupulum unum.
Mercurii dulcis grana quinque.
Opii . . . . . sesquigranum.
Fiant pilulae duodecim.

Pilulae aperientes hydrargyratae. (*Sw**.)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Opii . . . . . grana duo.
Pulveris aperientis sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. — Bei Blennorrhagie und Hodenentzündung. — Gabe, drei bis vier Stück täglich drei Mal.

Pilulae depurantes. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Extracti Opii . grana octodecim.
— Cicutae drachmas quatuor.
Syrupi Althaeae . . . . . q. s.
Fiant pilulae triginta duae (sex *Va.*). — Von Dubois bei Verstopfung zur Linderung der Schmerzen, und allmälig gestiegen.

Pilulae sialagogae. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis,
Camphorae, sing. . scrup. unum.
Opii . . . . grana duodecim.
Syrupi Sacchari . quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti — Gabe, ein oder zwei Stück täglich drei Mal.

Opiatum antisyphiliticum. (*Va.*)

℞. Calomellis . . . drachmas duas.
Opii purif. . . grana duodecim.
Conservae Rosarum unc. quatuor.
Misce exacte — Einer Bohne groß Morgens nüchtern und zur Verhütung des Speichelflusses eine Tasse Guajacthee nachzutrinken. Andre Practiker verordnen alle 5 — 6 Tage eine Purganz.

B. Durch Blei und Zink.

Injectio in gonorrhoea. (*Sa.*)

℞. Gummi Arabici . . semunciam.
Dissolve in
Aquae bullientis unciis duodecim.
Colaturae adde
Mercurii dulcis . drachmas tres.
Plumbi acet. cryst. grana quatuor.
Dreimal täglich eine Drachme einzuspritzen, bei Harnröhrenentzündung.

Ceratum exsiccans. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae . partes quadraginta.
Liqua et adde

Emplastri simplicis,
Terebinth. coct., sing.
part. quinque
et post horum fusionem
Cerussae . . . . . partes duas.
Mercurii dulcis . partem unam.
Misce bene.

Candelae s. Cereoli mercuriales. (Ful. *Sp. Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . . uncias sex.
Liqua et adde
Extracti Saturni . . semunciam.
Pulv. Mercur. dulcis drach. duas.
Fiant cereoli. — Plenck empfahl ſie zur Wiederherſtellung des unterdrückten Trippers. Sie ſind aber nicht wirkſamer als die gewöhnlichen Bougie's.

Unguentum ad tineam. (*E.*)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.
Aluminis calcinati,
Cerussae, sing. . . semunciam.
Olei Terebinthinae drachmas duas.
Cerati simplicis . sesquiunciam.
Man legt dieſe Salbe Abends auf und nimmt ſie Morgens wieder weg.

Linimentum ophthalmicum. (LP.)

℞. Hydra ryri muriatici praecipitati
scrupulos duos.
Oxydi Zinci . drachmam unam.
Axungiae Porci bene lotae
drachmas tres.
Olei Amygdalarum drachmas duas.
Misce ut fiat linimentum. — Bei Augenentzündungen.

Unguentum Muriatis mercurialis per praecipitationem. (LP.)

℞. Muriatis mercurialis
drachmas duas.
Acetatis Plumbi . semidrachmam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Axungiae Porci praep. uncias tres.
Olei Bergamotae . guttas sedecim.
Misce exacte ut fiat unguentum. — Bei Hautaffectionen.

S. Durch Rhabarber.

Pulvis catharticus. (Gen. RC. *E. Sa. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam,
Rhei . . . . . partes duas.
Misce triturando. (*Sa. Sw.*)
RC. Rhei palmati scrupulum, Mercurii dulcis grana sex. (Pro dosi e melle vel syrupo dandus, alvo concta vel tribus vicibus, intervallo duarum, trium, quatuor, quinque horarum.)
℞. Mercurii dulcis,
Rhei, sing. . . . grana decem.
Olei essent. Cinnamomi
guttam unam.
Misce. (*E.*)
Gabe, zwanzig Gran.
℞. Mercurii dulcis drachmam unam.
Rhei . . . . scrupulos quatuor.
Pulv. relaxantis scrupulum unum.
Misce. (Gen.)
Stomachic purgative ball for thin ill-conditioned horses (*Gr.*): Aloës Barbad. semunc., Rhei drach. duas, Calom. unum, Zingib. sesquidrach., Ol. Carvi gutt. decem, Sapon. Hisp. drach. duas, Syrupi q. s. ut fiat bolus.
Mercurial ball (*Rc.*): Calomel. drachmam, Aloës Barb. semunc., Mucil. G. Arab. q. s. absque rheo.

Boli vermifugi. (*Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Rhei . . scrup. dimid. ad duos.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Pilulae Werlhofii. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis scrupulum unum.
Extracti Rhei . drachmas duas
Syrupi Consolidae majoris . q. s.
ut fiant pilulae septuaginta duae. — Gegen verdächtigen weißen Fluß. — Gabe, Morgens und Abends zwei Stück. — Man muß den Gebrauch lange Zeit fortſetzen.
Pilulae antivenereae (LH.): Extr. Tarax., Rhei, sing. sem. scrup., Sap. med. gr. quatuor, Calomel. sesquigranum, f. pil. 4. — 1 oder 2 Stück zweimal täglich.

Mixtura anthelmintica. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Tinct. Rhei aquos. . uncias octo.
Syr. Cichorii comp. uncias duas.
Löffelweiſe in ſogenannten gaſtriſchen Wurmfiebern.

T. Durch Scammonium.

Pulvis purgans anthelminticus, hydragogus. (*B. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Scammonii . . . . partes duas.
Misce. (*Sw.*) — Gabe, fünf bis dreißig Gran, alle vier oder fünf Tage.
℞. Mercurii dulcis,
Diagryd. sulphurati, sing.
grana tria.
Misce. (*B.*) — Für ein Kind von ſechs Jahren, indem man um ſo viele Gran, je nachdem das Kind älter oder jünger iſt, ſteigt oder fällt.

Pulvis resolvens s. digestivus. (*Sm.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes tres.

Diagrydii sulphurati partes octo. Misce. — Von Finke bei Verſtopfungen der Unterleibseingeweide. — Gabe, zwölf Gran, alle Morgen nüchtern, mehrere Tage hintereinander, in Kalbfleiſchbrühe.

Pulvis vermifugus s. e Scammonio cum Calomelane. (Wür. *Ca. Gr. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis . grana quinque.
Pulveris Scammonii . grana sex.
— Rhei . . . grana quatuor.
Misce. (*Sp.*)

Ca Mercurii dulcis, Rhei, Scammonii, sing. drachmam unam et Sacchari tres.

℞. Mercurii dulcis,
Scammonii, sing. grana duodecim.
Gummi Guttae . grana quinque.
Misce. (Wür.)

℞. Scammonii . . . . semunciam.
Calomellis,
Sacchari albi, sing. drachmas duas.
Misce. (*Gr.*)

Boli Scammonii compositi (Fenn.) e Pulveribus modo dictis Conservae Absinthii et Syrupi Sacchari ope in bolos conversis.

Boli anthelmintico-laxantes. (*B. Sp.*)

℞. Mercurii dulcis,
Scammonii, sing. . grana decem.
Gummi Guttae . . . grana sex.
Confectionis hyacinthinae . q. s. ut fiant boli duo vel tres. (*Sp.*)

Dieſe Biſſen bilden den Grundbeſtandtheil des berühmten Ruffer'ſchen Mittels gegen den Bandwurm. Man nimmt ſie alle Viertelſtunden, nachdem man drei Drachmen gepulverte Farrnkrautwurzel in ſechs Unzen Lindenblüthaufguß genommen hat und dazu noch eine oder zwei Taſſen Thee trinkt.

℞. Mercurii dulcis . . . grana sex.
Diagrydii sulphurati . grana octo.
Rob Sambuci . quantum sufficit.
Fiant boli quatuor. — Ein Stück alle zwei Stunden. (*B.*)

Pilulae Calomelanos (*Gr.*): Sublimat. corros. scrupulum, Hydrarg. unciam, G. Tragac. grana duodecim, Scammon, Jalap, sing. drachmas quinque, Syr. simpl. q. s. ut f. pil. pond. gr. 4. — Bei Syphilis. Nachts 2 — 4.

Trochisci anthelminthici s. hermetici Seretae, Rotulae anthelminticae. (Pal. Wir. *B. Gr.*)

℞. Calomellis . . . . uncias tres.
Scammonii Alepp.,
Jalapae, sing. . . . uncias duas.
Cremoris Tart. . uncias quatuor.
Sacchari albi . . . libras tres.
Mucil. G. Tragac. . . . . q. s.
Fiant trochisci. (*Gr.*)

Gr. praeterea: Calomel. semunciam, Scammon., Crem. Tart., sing. unciam unam, Sacch. alb. drachmam, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. troch. no. 80.

℞. Mercurii dulcis . grana decem.
Diagrydii sulphurati scrup. unum.
Saponis albi,
Mucilag. G. Arab., sing. drachmam.
Fiant trochisci decem. (*B.*)

℞. Mercurii dulcis . sesquiunciam.
Cornu Cervi absque igne praeparati scrupulos duos.
Cinnamomi,
Diagryd. sulph., sing. scrup. unum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Conserv. Rosar. rubr. drach. duas.
Fiant Mucilag. G. Tragacanthae c. Aqua Rosarum parati ope trochisci sexaginta quatuor. (Wir.)

℞. Mercurii dulcis . drachmas duas.
Pulveris Herbae Carlinae,
— Seminis Cinae,
— Cornu Cervi usti, sing. drachmam unam.
Diagrydii sulphur. semidrachmam.
Cinnamomi . . semiscrupulum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.

U. Durch Scille.

Pilulae diureticae. (*E. Gr. Par.*)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae, sing. . grana duodecim.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends. (*E.*)

Gr. Pilul. Scill. drachmam, Calomel. gr. quinque, f. pil. 15. (2 Stück jede Nacht.)

℞. Mercurii dulcis . . grana sex.
Scillae . . . . grana quatuor.
Foliorum Digitalis . grana decem.
Myrrhae . . scrupulum unum.
Asae foetidae . . semidrachmam.
Extracti Gentianae . . . . q. s.
Fiant pilulae quindecim. (*E. Gr. Par.*) — Gabe, ein Stück Morgens und Abends.

Pilulae scillinae et Muriatis Hydrargyri oxydulati. (RC.)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Pulveris Scillae . . partes duas.
— aromatici . . partes tres.
Syrupi simplicis . quantum satis.

Bei aſthmatiſchen Lungenkrankheiten, Waſſerſucht, Hypochondrie, beſonders mit etwas Aloë und Seife. — Gabe, ſechs Gran täglich zwei Mal.

Pilulae antihydropicae. (*Pie. Va.* Hosp. Char.)

℞. Mercurii dulcis
drachm. duas c. dimidia.
Scillae pulv. . drachmas quatuor.
Oxymellis scillitici . . . . q. s.
Fiant pilulae centum. — Purgirend, schmelzend, harntreibend. — Gabe, Anfangs Morgens und Abends zwei Stück und allmälig gestiegen. Der Kranke trinkt einen Aufguß von Ruscus aculeatus mit Meerzwiebelsauerhonig. (*Pie.*)

Va. Calomellis grana octo, Scillae, Rhei, sing. quatuor, Syrupi quinque Radicum q. s. Fiant pil. no. 4. — in 24 Stunden.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Mercurii dulcis,
Scillae pulv., sing. semidrachmam.
Axungiae praep. . drachmas duas.
Olei Rosarum . guttas quatuor.
Von Dupuytren in Einreibungen bei chronischen Gelenkanschwellungen.

V. Durch Fingerhut.

Pulvis Calomelanos cum Digitale. (*Gr.*)

℞. Hydrarg. Submuriatis,
Sacchari albi, sing. . unc. unam.
Pulveris Digitalis . . semunciam.
Misce. — Gabe, 1 bis 5 Gran.

W. Durch Wurmsaamen.

Pulvis vermifugus. (*Au. Sw.*)

℞. Mercurii dulcis . semidrachmam.
Rhei . . . . . uncias duas.
Seminis Cinae . . . semunciam.
Fiat pulvis subtilissimus. (*Sw.*)

Au. Mercurii dulcis, Rhei, Seminis Cinae, sing. grana sex et Olei Cinnamomi guttas duas; — vel: Seminis Cinae grana quindecim, Rhei duodecim, Aloës sex, Mercurii dulcis tres et unum Ipecacuanhae, ut fiant doses tres. — Ein Stück des Morgens, einem dreijährigen Kinde.

Bolus vermifugus. (*Ra. Va.* Hosp. de la Mat.)

℞. Mercurii dulcis . . grana duo.
Seminis Cinae . . . grana octo.
Camphorae . . . . grana sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (*Sw*.*)

℞. Mercurii dulcis . semiscrupulum.
Pulv. Rhei,
— Seminis Cinae,
— Rad. Valerianae, sing.
drachm. duas.
Conservae Absinthii sesquiunciam.
Oxymellis scillitici . . . . q. s.
Bei Epilepsie mit Wurmcomplication empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze nach dem Alter und den Kräften des Kranken.

Electuarium anthelminticum s. anthelminticum Vogleri. (*Br. Ca. Fi. Sw.*)

℞. Mercur. dulcis
gr. sex ad duodecim.
Pulv Semin. Cinae drachmas duas.
— Jalappae drachmam unam.
— Cinnamomi semidrachmam.
Syrupi Florum Persicae . . q. s.
Morgens in befeuchteter Oblate zu nehmen. — Gabe, den zwölften Theil dieser Masse für Kinder von zwei bis vier Jahren, den achten für fünf- bis achtjährige, den vierten Theil und mehr für Erwachsene. Man trinkt darauf eine Tasse von einem bittern Aufguß.

Fi. Seminis Cinae pulv. drachmas duas, Rad Jalappae unam, Mercurii dulcis grana duodecim, Syrupi Cinnamomi q. s. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

W. Durch Terpentin.

Injectio Muriatis Hydrargyri s. Mercurii camphorata, Collyrium Fernandezii. (His. His3.)

℞. Mercurii dulcis . semiscrupulum (semidrachmam His3.)
Aluminis,
Aetheris sulphurici alcoholisati,
Camphorae, sing.
scrupulum (drachmam His3.)
Terebinthinae . . . semunciam.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Aquae communis . . libras duas.
Misce terendo in mortario vitreo et cola exprimendo.

Opiatum adstringens. (*Sm.*)

℞. Terebinth. Venet.
drachmas quatuor.
Rhei . . . . . drachmas tres.
Mercurii dulcis . semiscrupulum.
Syrupi Consolidae majoris . q. s.
Gabe, ein Scrupel täglich drei Mal, am Ende von Blennorrhagie.

Deuto-chloruretum Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrus muriatus s. muriatus corrosivus, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Hydrargyrus corrosivus albus, Hydrargyri Oxymurias, s. Permurias, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus s. corrosivus albus, Murias Hydrargyri corrosivus s. oxygenatus s. oxygenatus sublimatione s. praecipitatione paratus, Murias hydrargyricum corrosivum, Sublimatus corrosivus,

Murias oxygenatus Mercurii s. oxygenatus Hydrargyri sublimatus, Supermurias Hydrargyri, Murias Hydrargyri basi Oxydi imperfecti, Perchloridum s. Perchloruretum s. Bichloruretum s. Bichloretum Hydrargyri s. Mercurii, Murias superoxygenatus, Oxymurias s. Deutomurias s. Deutohydrochloras Hydrargyri; Queckſilberſublimat, ſalzſaures Queckſilberoxyd. (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RG. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

1) Alte Verfahrungsweiſe.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi nitrici . quantum sufficit.

Solutione peracta, liquor ad siccum evaporet et massae pulv. addantur

Salis communis decrepitati,
Vitrioli viridis ad alborem calcinati, sing. . . partes quinque.

Misce bene triturando et in lagenam, pro dimidio inde replendam immissa lente calefac in balneo arenae, orificium lagenae non prius obturando, quam vapores aquosi et acidi enasci cessaverint; tunc illâ occlusâ ignis pedetentim augeatur; evaporatione finita, lagenam frange et massam albam a scoriis separa. (Ams. B. Bel Br. Gen. Sar. Wir. Wür. *Br. Pid. Sp. Sw.*)

Gr. Merc. libram, Acidi circiter sesquilibram, Salis decrep. et Vitriol. calcin. libram, misce et sublima, vel melius destilla e retorta breve, amplo et brevi collo instructa; — LP. Nitratis Mercurii bene sicci, Muriatis Sodae, Sulphatis Ferri ad album calcinati, sing. unciam unam, in retorta pro una parte replenda, balneo arenae expone etc.

2) Verfahren Kunkel's.

℞. Mercurii . . uncias duodecim.
Acidi sulph. concent. uncias viginti.

Destillent ad siccum; residuo in mortario vitreo pulverato adde

Salis Ammon. pulv. pond. illor. aeq.

Tritura bene et mixta in lagenam ad dimid. circiter replendam ingere in balneum arenae igne lento et blando calefacto collocandam; quae quamdiu vapores aquosi et acidi evolvuntur aperta, deinde obturamento chartaceo occludatur et ignis sensim augeatur. Operatione finitâ, lagenam rumpe et massam albam sublimatam ab omni impuritate, facici internae adhaerente separa. (A. Am. Ba. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ham. His. His3. Li. Lus. O. R. Sax. Suec. Wir. *C. Sw.*)

Bor. Bor4. loco salis ammoniaci Natrum muriat. siccum adhibent. (Praeterea quoque Sublimatum venalem indicat Bor4.); — Lon. LonN. RG. Mercurii *pondere* libras duas, Acidi sulphurici *pondere* uncias triginta, Natri muriatici siccati libras quatuor; — Pm. Merc., Acidi 66° part. aeq, Natri muriat. unc. sex; — *Gr.* Merc., Acidi, sing. libras duas ad sicc. coquere, refrig. addere Natri mur. lib. tres c. dimid. et sublimare.

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Acidi sulph. (66°) partes quinque.

Coque ad partium quinque remanentiam. Recipe deinde hujus

Deutosulphatis Mercurii acidi,
Salis marini pulverati,
Oxydi nigri Mangani, sing. partes aeq.

et misce. Post aliquot dies immitte in unam vel plures retortas fundi latioris, ad tertiam partem usque repletas et ad collum balneo arenae immersas; orificio olla parva inversa tecto, calefac pedetentim, donec massa tota sit sublimata. (GalM.)

Gal. Sulphatis, Salis marini, singulorum partes quadringentas octoginta, Oxydi quadringentas quinquaginta; — GalH. partem quartam postremi sufficere dicit, quod nonnisi eo utatur, ut in deutosulphatem mutetur protosulphas, qui in sale primùm obtento adesse posset; — LH. Mercurii libras quatuor, Acidi quinque, Salis decrepitati quatuor, Mangani unam; — HassP. Mercurii uncias decem, Salis comm. sicci octo, Mangani oxyd. sex; tritis ad extinct. usque adde Olei Vitrioli Anglici uncias undecim, celeriter agitando etc.; — *Gr.* Merc. libram unam, Ol. Vitriol. septem ad siccum coquere et addendo Salis comm. et Oxyd. Mangani nigri pondus praeced., sublimare; — *T.* Salis comm. siccati vel decrepitati libras quatuor, Oxydi Mangani unam, Sulphatis Mercurii ex Mercurii libris quatuor et Acidi sulphurici concentrati q. s. coquendo parati; — Fer. dissolvere Mercurii uncias sex in Acidi sulphurici aequali quantitate, solutionem ad siccum evaporare, residuum cum Salis communis pondere suo aequali terere et mixturam sublimationi subjicere; — *Fi. Re.* Mercurii libras duas, Acidi sulphurici libras duas cum dimidia, Salis marini siccati quatuor, caeterum destillationem ad siccum et destillationem residui cum sale marino in retorta vitrea pro tertia parte repleu-

da; — *Gr.* Merc. Spir. Salis, sing. libras duas, Spir. Nitri unam destillare.

3) ℞. Oxydi Mercurii rubri,
partes decem cum quadrante.
Acidi nitrici . quantum sufficit ad oxydi dissolutionem Evaporatis ad siccumo residuum tere cum
Salis communis partibus quinque et mixturam sublimationi subjice. (*Vm.*)

4) ℞. Mercurii . . . libram unam.
Acidi nitrici . quantum sufficit ut metallum caloris ope solvatur. Liquori infunde solutionem calidam ex Salis communis sesquilibra in Aquae q. s., vapores rubri evoluti evitando; praecipitatum abundans primo exortum statim redissolvitur. Mixtura refrigerata sepositione demittit crystallos prismaticas, quibus separatis, liquor supernatans ad cuticulam evaporatus denuo crystallisationi subjiciatur. (Ful.)

5) ℞. Oxydi Mercurii rubri . q. vis.
Acidi hydrochlorici . . q. s. ad solutionem. Evaporata in vase vitreo ad crystallisandum reponantur. (An. LH. *Gr. Sw*. T. Vm.*)

LP. Oxydi et Acidi partes aequales; — praeterea Mercurium in Acido muriatico oxygenato solvere et solutionem vaporare.

Der Aetzsublimat, eins der heftigsten Gifte, welche man kennt, wird innerlich als Reizmittel und äußerlich als cathaereticum und in einigen Künsten zur Erhaltung thierischer Stoffe angewendet, welche dadurch der Fäulniß widerstehen, indem sie die Härte des Holzes bekommen. Besonders genoß und genießt er als Mittel gegen Syphilis einen großen Ruhm. Die Engländer sehen es als ausgemacht an, daß man in dieser Eigenschaft nicht auf ihn rechnen könne und überlassen daher fast allgemein seine Anwendung den Quacksalbern. Doch verdient er weder einen solchen rücksichtslosen Tadel, noch die übertriebenen Lobeserhebungen van Swieten's. Mit Geschick angewendet, wird er ein heroisches Arzneimittel, welches unter vielen Umständen von Nutzen ist, obgleich er, einer rohen Empirie und einer blinden Routine überlassen, allerdings großen Schaden stiften kann.

Alkalien, kohlensäuerliche Salze und alkalische Schwefelsalze, Brechweinstein, essigsaures Blei, salpetersaures Silber, Eiweiß, Kleber, Blei, flüchtige Oele, Aufgüsse und Abkochungen adstringirender Pflanzen zersetzen ihn und dürfen daher nicht mit ihm verbunden werden. Ja Boullay behauptet sogar, alle vegetabilische und animalische Stoffe haben die Eigenschaft, nach einer für einen jeden derselben verschiedenen Zeit ihn zu zersetzen.

Gabe, ein Sechszehentheil, ein Achtel, ein Viertel oder ein halber Gran.

§ II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats nicht oder wenigstens nicht merklich, durch einen fremden Stoff verändert ist.

Aqua divina Fernelii s. phagedaenica, Liquor mercurialis s. Muriatis Hydrargyri s. Hydrargyri muriatici corrosivi, Liquor Deutochlorureti Mercurii, Deutohydrochloras Mercurii, Solutio Sublimati corrosivi aquosa. (Ams. B. Ba. BorC. DD. Fer. Ham. Hass. Li. Sax. WW. *Ca. Fi. Gr. Pid. Sa. Sw.*)

℞. Sublimati corros. . drach. unam.
Aquae destillatae . libram unam.
Triturando in mortario lapideo fiat dissolutio. (Ams.)

B. et Fer. Sublimati drachmam et Aquae libras duas; — BorC. DD. Sax. WW. et *Sa.* Sublimati granum et Aquae unciam; — *Sw.* Sublimati grana viginti ad triginta et Aquae libras duas; — Han. Sublimati scrupulum et Aquae uncias duodecim; — Li. Sublimati scrupulum et Aquae sesquilibram; — Hass. et *Pid.* Sublimati grana quadraginta quatuor et Aquae libram; — Ba. Sublimati partem unam et Aquae viginti quatuor; — WW. Sublimati grana decem et Aquae uncias quatuor; — *Ca* Sublimati grana duodecim ad octodecim et Aquae libras duas; — *Gr.* Sublim. drachmas duas, Aq. dest. decem.

Die meisten dieser Auflösungen werden äußerlich, in Waschungen, besonders gegen Krätze angewendet; einige jedoch, z. B. die von Ba., *Gr.*, werden als Reagentien angeführt

Man erinnere sich, daß der Sublimat zu seiner Auflösung bei gewöhnlicher Temperatur ungefähr zwanzig Theile und vom kochenden Wasser das Dreifache seines Gewichts erfordert.

HassP. *Liquor Mercurii sublimati corrosivi:* Sublimati semidrachma, Aquae dest. drachmae decem — ut reagens.

Collyrium ex Muriate Hydrargyri oxygenato, Aqua opthalmica mercurialis. (Ful. *Sw.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve. (Ful.)

Sw. Sublimati semigranum ad granum unum et Aquae uncias quatuor.

Gilt als austrocknend, auflösend und antisyphilitisch.

Collyrium Hydrargyri Oxymuriatis (*Re.*): Oxymuriatis grana duo, Salis Ammon. quinque, Aquae dest. uncias sex.

Gargarisma Oxymuriatis Hydrargyri (*Re.*): Oxymuriatis grana tria, Aq. destill. octarium.

Lotio Hydrargyri s. Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis. (Gen. *Au. Gr. Re.*)

℞. Sublimati corr. scrupulum unum.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Acidi muriat. gutt. viginti quatuor.
Misce. (Gen.)

Au. Solutionem Sublimati granorum trium in Aquae purae vel Rosarum libris duabus; — *Rc.* Solutionis Sublimati guttas quadraginta Aq. Rosar. octarium; vel: Sublimati grana duo, Acid. muriat. gutt. sex in mortario terendo, adde Emuls. Amygd. uncias septem (*Lotio Goulardi.* — bei acne und lepra.); — *Gr.* Amygd amar. unc. unam, Sacch. duas, Aq. dest. libras duas, Sublim. cum Spir. rectif. drachm. duabus triti scrup. duos (*Lot. Goulardi*).

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Aeruginis . . . . . grana sex.
Aquae . . . . . libras duas.
Besonders bei hartnäckiger tinea. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Praecipitati rubri . grana decem.
Spir. Angelicae,
— Rorismarini, sing. drach. duas.
Aquae . . . . . octarios duos.
Gegen Krätze empfohlen. (*Au.*)

Clyster s. Enema mercuriale. (*Au. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Infusi Seminum Lini uncias octo.
Va. Infusi libram.
Gegen Ascariden von Nutzen.

Injectio Hydrargyri Oxymuriatis s. mercurialis. (*Au. Re.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae bullientis . unciam unam.
Gegen weißen Fluß. — Auguſtin empfiehlt, nach Monteggia, bei habituellem Tripper einen Gran Sublimat in vier Unzen Waſſer aufgelöſ't.

℞. Sublimati corros. . . grana duo.
Muriatis Ammoniae grana decem.
Aq. destillatae . uncias decem.
Misce. (*Re.*)

Praeterea: Solutionis Sublim. corros. guttas duas, Aquae destillatae uncias quatuor, misce: — bei Gonorrhoe. (*Rc.*)

Injectio ad ulcera fistulosa (for fistulous sores) (*Re.*): Sublimati drachmam unam, Acidi muriat. duas, Aquae vel Spir. rectif. quinque, misce. (Pharm. Veterin. College.)

Lotio mercurialis Aliberti, Aqua rubra. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Sublimati corros. drachmam unam.
Aquae destillatae . libram unam.
Alcannae . . quantum sufficit.
Man taucht Leinwand oder einen Schwamm in dieſe Flüſſigkeit und badet die mit entzündlichen, beſonders veneriſchen Flechten behafteten Theile damit.

Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium mercuriale. (*Au. Huf. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi semigranum.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Solutioni adde
Mucil. Sem. Cydon. drach. unam.
Aq. Laurocerasi dest. gutt. triginta.
Misce. (*Huf. Va.*)

Au. mixturam Solutionis Sublimati corros. guttae unius et Aquae destill. unciarum quatuor; — *Va* Sublimati grana quatuor, Aq. Rosar. uncias sex (bei ſchwärenden Augenlidern und chroniſchen ſyphilitiſchen Augenentzündungen).

Balneum antisyphiliticum s. mercuriale. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Sublimati grana sex ad duodecim.
Aquae destillatae . • libras octo.
— comm. (30°) libr. ducentas.
Man kann auch zwei Drachmen bis eine Unze Sublimat und zweihundert Pfund Waſſer (*Va.* Mais. de Sainté.) nehmen. — Dieſe Bäder, welche man in einer hölzernen Badewanne nehmen muß, ſind ungeachtet der pomphaften Lobeserhebungen, welche man von ihnen macht, ſehr gefährlich.

Solutio Sublimati, Potio cum Deutochlorureto Mercurii s. antisyphilitica. (GalM. Gen. *E. Va.* Hosp. Am.)

℞. Solutionis Sublimati part. decem.
Gummi Arabici . partem unam.
Aquae destillatae partes centum.
Dissolve gummi in aqua et adde solutionem. (GalM.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae purae . . . uncias sex.
Spiritus Cinnamomi,
Syrupi Sacchari, sing. unc. unam.
Misce. (*E. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Acidi hydrochlor. guttas duodecim.
Syrupi Papaveris . unciam unam.
Misce. (Gen.)

Gabe, einen oder zwei Löffel, zwei oder drei Mal täglich.

Gargarisma Sublimati corrosivi s. in ulceribus venereis s. mercuriale s. antisyphiliticum. (*Au. B. Gr. Ra. Sy. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Aquae destillatae . libram unam.
Solve. (*Gr.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Decocti Hordei . libram unam.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce bene (*Sy.*)

Va Hosp. Ital. Sublimati granum unum, Mellis rosati semunciam; — *Ra. Va.* Hosp. Ven Sublimati granum unum ad duo in Aquae Althaeae unciis sex vel: Sublimati grana duo, Aquae dest. uncias quatuor et Syrupi Mellis semunciam (Hosp. Char.); — *B.* Sublimati granum, Decocti Hordei libram et Mellis rosati semunciam.

Mercurius fluctuans Guidotti. (Pm.)

℞. Sublimati corrosivi drachmas duas.
Mellis nostratis . . uncias tres.
Aquae destillatae . . libras duas.
Sublimatum subtiliter pulveratum cum melle rite commisce, tunc aquam sensim affunde, in loco temperato digere per quindecim dies, tandem liquorem filtra.

Clyster s. Enema antisyphiliticum s. mercuriale. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae destillatae . uncias duas.
Decocti Seminis Lini libram unam.
Bei ſyphilitiſchen Affectionen des rectum oder wenn der Kranke den Sublimat nicht durch den Magen verträgt.

Injectio in necrosi syphilitica s. detergens. (*B. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Decocti Hordei . libram unam.
Tinct. Myrrhae drachmam unam.
Misce.

Aqua phagedaenica composita. (*Vm.*)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Extracti Myrrhae drachmam unam.
Mixtis et dilutis adde
Tincturae Myrrhae . semunciam.

Aqua phagedaenica Pideritii. (*Pid.*)

℞. Aquae phagedaenicae uncias sex.
Essentiae Croci . . semunciam.
Solutionis Myrrhae drach. unam.
Sief albi Rhazis . unciam unam.
Dieſes Waſſer muß verworfen werden.

Liquor Hydrargyri Oxymuriatis s. Swietenii s. syphiliticus Turneri s. Swietenii, Murias Hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio Mercurii corrosivi s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. alcoholica Sublimati corrosivi, Aqua Swietenii. (Am. An. B*. DD. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. LH. Lon. LonN. Sax. Wür. *C. Ca. E. Fi. Gr. Ra. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Sublimati corros. grana duodecim.
Spir. Frumenti bis rectif. lib. duas.
Dissolve terendo in mortario. (An. Wür *Sp. Sw. Vm.*)

DD. Sublimati granum et Aquae Vitae uncias quatuor; — Sax. Sublimati grana octo et Aquae Vitae libram; — *E.* Sublimati grana duo et Aquae Vitae uncias quatuor; — LH. Sublimati grana duodecim, Alcoholis 12° uncias triginta quinque.

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae uncias quindecim.
Solutioni adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (Am. Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T.*)

Ra. Sublimati grana sedecim, Aquae libram et Alcoholis semidrachmam; — GalM. Sublimati partem unam, Aquae nongentas et Alcoholis (33°) centum; — Gal. Sublimati grana octo, Aquae uncias quatuordecim cum dimidia et Alcoholis (36°) sesquiunciam; — Fer. Sublimati grana sex, Aquae uncias quatuor et Alcoholis octo; — *Ca.* Sublimati grana viginti, Alcoholis (36°) drachmas viginti quinque et Aquae libras duas.

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Sacchari albi . . . semunciam.
Trituratis ad intimam mixtionem usque adde
Aquae Vitae . . uncias decem.
Post dissolutionem filtra. (*Sw*.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Alcoholis . . uncias duodecim.
Dissolve et liquori adde
Syrupi balsamici . sesquiunciam.
Misce bene. (B*. Ful.)

℞. Sublimati corrosivi . grana octo.
Aquae destillatae unc as quindecim.
Ac di hydrochlor. guttas duodecim.
Syr. Capit. Papav. . unc. unam.
M sce. (Gen.)

Nach mehreren Verſuchen blieb Van Swieten bei zwölf Gran Sublimat auf zwei Pfund Kornbranntwein Er gab, Morgens und Abends einen Löffel oder eine halbe Unze von dieſer Flüſſigkeit, d. h. einen Viertelgran Sublimat, indem er hierauf ein Pfund einer erweichenden Abkochung mit einem Dritttheil oder Viertheil Milch verſetzt, trinken ließ Heutzutage läßt man in Frankreich acht Gran Sublimat in einer Drachme Alcohol auflöſen und die Auflö-

Mer. Mr. and Mrs. Merry, Lower Merry, Merry Hill, Merry Lea, Merry Mount, Merry Vale, Merry Wood.

Merc. Mercer, Mercers' Hall, Mercers' Row, Mercers' Street, Mercer's Wood.

Merch. Merchant, Merchant Adventurers' Hall, Merchant Adventurers' Street, Merchant Seamen's Orphan Asylum, Merchant Taylors' Hall, Merchant Taylors' School, Merchant Vessel, Merchant Vessel Inn, Merchant Vessel Yard, Merchant Vessel Yard Inn, Merchant Vessel Yard Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf Street, Merchant Vessel Yard Wharf, Merchant Vessel Yard Wharf Inn, Merchant Vessel Yard Wharf

mati cum Melle et Mucilagine triturati; sec. *Sw.* Alcali volatile continet; sec. *Brodie* sequenti similis: ℞. Rad. Bard. unc. duas, Rad. Tarax., Menth. virid. recent., sing. unciam unam, Fol. Sennae, Sem. Coriandri, Rad. Liquir. rec., sing. sesquidrachmam, Aquae sesquioctarium, coque ad octar. unum, trajice et refrig. addendo Sacch. libram coque ad syrupi consist. et adde Solutionis Oxymur. Hydr. parvam copiam (*Paris*).

Gargarisma antisyphiliticum. (*Ca.*)

℞. Liquoris Swietenii drachmam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Syrupi Cuisinerii . uncias duas.
Misce.

Aqua caustica ad condylomata s. phagedaenica Grindelii, Liquor mercurialis camphoratus s. Hydrargyri camphorati s. ad condylomata. (B*. *Au. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis rectificati unciam unam.

Von Rust zur Zerstörung der Condylomen empfohlen.

Injectio Whately. (*E. Sm.*)

℞. Sublimati . . drachmam unam.
Alcoholis . . . unciam unam.
Dissolve et hujus solutionis guttas duas ad viginti misce cum
Aquae destillatae unciis quatuor.
Sulph. Zinci gr. quatuor ad decem.

Bei Blennorrhöe empfohlen. — Gabe, eine Drachme auf einmal. Man wiederholt die Einspritzung dreimal täglich. — Der Sublimat ist darin durch das Zinksalz zersetzt.

E. Sulphatis Zinci grana decem, Sublimati duas et Aquae Rosarum uncias octo.

Tinctura antisyphilitica. (*Au.*)

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Balsami Canadensis,
Resinae Guajaci, sing. uncias duas solutas in
Alcoholis . . . unciis quatuor.
Adde
Olei Sassafras . drachmas duas.

Gabe, zehen Tropfen alle Stunden, bei chronischer Gonorrhöe.

Aether mercurialis, Solutio Sublimati corrosivi aetherea. (B*. *Fi. T. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aetheris sulphurici unciam unam.

Diese Formel ist von Cheron. — Gabe, vier bis sechs oder zehen bis zwölf Tropfen (♍j—βj und mehr allmälig täglich zwei Mal *Va.*) in Milch, Gummi-, Zuckerwasser; und zwei Drachmen bis eine halbe Unze, äußerlich in Einreibungen in der Nähe der Geburtstheile.

Lange vor Cheron hatte Lafontaine empfohlen, Morgens und Abends in einer Tasse schleimiger Tisane zehen bis zwanzig Tropfen einer Auflösung von vier Gran Sublimat in einer halben Unze Schwefeläther zu nehmen

Die Flüchtigkeit des Excipiens empfiehlt aber dieses Präparat sehr wenig.

Emulsio Sublimati corrosivi. (B*.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aetheris sulphur. drachmam unam.
Solutionem subige cum
Vitellis Ovorum . . . . no. 2.
et adde sensim
Aq. Menthae pip. uncias quinque.
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Syrupus mercurialis Cheroni. (*Va.*)

℞. Sacchari albi purif. sesquilibram.
Aquae destillatae . libram unam.

Saccharo blando calore in aqua soluto, post perfectam refrigerationem adde

Aetheris mercurialis unciam unam.

Va. Aetheris drachmas duas, Syr. Sacch. uncias octo. — ℥β-j und mehr allmälig in Milch oder Wasser.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale aptyalizomenon s. Muriatis Hydrargyri oxygenati s. antivenereum, Adeps Muriate Hydrargyri oxygenati medicatus, Pomatum Deutochlorureti Mercurii. (B*. Fer. Gal GalM. LH. RC. Sax. *Bo. Br. Ca. Fi. Huf. Re. T.*)

M. Sublimati pulv. . partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.

Diu in mortario vitreo triturata tere deinde supra laminam porphyream. (Fer. Gal. GalM. RC. *Br* Fi. T.*)

Cirillo hatte zuletzt etwas Salmiak zugesetzt, wie sich in Folgendem findet:

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing. partem unam.
Axungiae . . . . partes octo.

Tritura per horas viginti quatuor. (B*. Sax *Huf.*)

LH. *Bo.* et *Ca.* Sublimati drachmam, Salis Ammoniaci grana decem et Axungiae unciam.

Cirillo verschrieb eine Drachme in Einreibungen in die Fußsohlen, Cullerier anfangs nur eine halbe.

Emplastrum corrosivum. (Gen.)

℞. Sublimati corrosivi semidrachmam.
Axungiae Porci . . semunciam.
Cerae albae . . drachmas duas.
Misce.

Unguentum s. Pomatum Cyrilli opiaceum. (Br*.)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Axungiae praeparatae partes octo.
Triturati simul adde
Extracti Opii . . grana decem.
Gegen rebelliſche Tripper in ſchwachen Einreibungen auf das Mittelfleiſch.

Unguentum Hydrargyri praecipitati per Calcem. (*Re.*)

℞. Praecipitati e mixtione Oxymuriatis Hydrargyri cum Aqua Calcis drachmam.
Unguenti Florum Sambuci, vel
Axungiae praeparatae unciam unam.
Misce. — Bei phagedäniſchen, ſtrumöſen Geſchwüren und Hautaffectionen.

Unguentum Hydrargyri cinereum fortius. (Han.)

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Mercurii . . . . . uncias sex.
Sevi vervecini . . uncias duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.
Tritura in mortario lapideo ad perfectam metalli extinctionem usque. — Der Sublimat wird in dieſem Präparat bald zerſetzt und in ſalzſaures Oxydul umgeändert.

Unguentum Hydrargyri Oxymuriatis s. Muriatis oxygenati Hydrargyri s. antipsoricum s. ad scabiem cum Perchlorureto Mercurii s. Hydrargyri ad scabiem. (His. His3. Pm. *Bo. Re.*)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Cerussae . . partes quindecim.
Axungiae Porci . partes triginta.
Misce triturando (*Bo.*)

Pm. Sublimati, Cerussae, singulorum subtilissime pulveratorum uncias duas cum Axungiae depuratae libris quatuor frigide simul in vase terreo vitreato cum pistillo ligneo agitare. (— Gabe, eine bis anderthalb Drachmen); — *Re.* Sublimati grana decem, Vitellum Ovi unius, Axung. praep. unciam; — bei atoniſchen Geſchwüren und chron. Entzünder Augenlider.

℞. Butyri recentis . uncias quatuor.
Terebinthinae,
Olei Rosarum, sing. unciam unam.
Liquatis blando igne adde
Pulv. Cerussae unc. duas c. dimid.
Sublimati corrosivi,
Aluminis calcin., sing. drach. duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Succi Citri . . . uncias duas.
Misce bene. — Ein ſchlechtes Präparat, in welchem der Sublimat bald zerſetzt wird.

Pilulae mercuriales s. Sublimati s. majores Hoffmanni. (Br. Fer. Ham. Han. Wir. *Au. B. Pie. Ra. Sm. Sp. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Sublimati . . grana quindecim.
Aquae destillatae . drachmas sex.
Dissolutioni adde
Micae Panis albi drach. duas c. dimidia.
Misce bene ut fiant pilulae centum viginti. — Jede enthält einen Achtelgran Sublimat, auch kann man ſie pulvern und mit Zucker vermiſchen. (Br. Han. Wir.)

Sp. Sublimati drachmam, Aquae q. s. ad solutionem et Micae Panis drachmas novem ut fiant pilulae grani unius (sexcentae), quarum quaeque decimam grani partem continet. — Spielmann verordnet, aus einem unbegreiflichen Irrthum, vier bis fünf Stück täglich dreimal.

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Soluto in Aquae dest. q. s. adde
Micae Panis,
Sacchari albi, sing. qnantum satis ut fiant pilulae centum octoginta, quarum quaeque trigesimam grani partem sublimati continet. (Ham. *Au.*)

℞. Sublimati corros. . scrup. unum.
Alcoholis . . . drachmas duas.
Farinae Tritici . drachmas tres.
Aquae destillatae quantum sufficit ut fiant pilulae 160 (144 *Va.*), quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (*Ra. Va.* Pil. dictae no. 1. Hosp. St. Louis.)

Fer. et *B.* Sublimati semigranum, Alcoholis q. s. ad solutionem et Micae Panis q. s. ut fiant pilulae quatuor.

℞. Sublimati corrosivi grana viginti.
Amyli . . . . . semunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae communis quantum sufficit ut fiant pilulae centum sexaginta. (*Ra. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Sacchari crystallisati,
Paeculae Solani tuberosi,
singulorum drachmam unam.
Aquae sufficientem quantitatem ut fiat massa in pilulas octoginta dividenda, quarum quaeque sublimati octavam grani partem continet. (*Pie.*)

℞. Sublimati . . grana duodecim.
Aquae destillatae drachmam unam.
Solutioni adde

Mannae in lacrymis drach. duas.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas nonaginta sex dividenda. (*Sm.*)

Die letztere Formel ist von Pelletan und die beste von allen. Man giebt Morgens und Abends Anfangs ein, dann zwei Stück.

Pilulae Vogleri. (B*.)

℞. Succi Liquir. depur. drach. unam.
G. Tragacanthae scrupulos duos.
Sublimati corrosivi semiscrupulum.
Misce triturando succum cum gummi, sal in Aquae pauxillo solutum infundendo ut fiat massa in pilulas centum dividenda, quarum quaeque sublimati decimam grani partem continet.

Pilulae Muriatis Hydrargyri oxydati. (RC.)

℞. Sublimati,
Salis Ammoniaci, sing. gr. decem.
Aquae destillatae drachmam unam.
Pulveris Radicis Liquiritiae, vel
Amyli . . . . scrupulos octo.
Mellis . . . drachmam unam.
Fiat massa in octoginta pilulas dividenda. — Gabe, zwei bis vier zwei- oder dreimal täglich, mit schleimigem Trank. Bisweilen mit Zusatz von einem Scrupel Opium oder acht Gran Brechweinstein zu der Masse.

Pilulae sialagogae s. Deutochlorureti Mercurii. (*E. Va.* Hosp. Angl.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. gr. quinque.
Aquae destillatae guttas triginta ad quadraginta.
Conservae Rosarum scrup. unum.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiant pilulae quadraginta, quarum quaeque sublimati partem grani octavam continet.

Va. Sublim. grana octo, Salis Amm. decem, Aq. bull. drachmas duas, Micae Panis q. s. ut f. pil. no. 40. (¼ gr. sing.) — täglich 1 bis 2 Stück.

Trochisci Muriatis oxygenati Hydrargyri s. escharotici s. Hydrargyri escharotici s. escharotici albi. (Gal. GalM. His. His3. *Fi. T.*)

℞. Sublimati corrosivi partem unam.
Amyli . . . . . partes duas.
Mucilaginis Gummi Arab. q. s.
ut fiant trochisci. (Gal. GalM. *Fi.*)

His. His3. Sublimati partes quatuor, Amyli septem et unam G. Tragacanthae pulverata Aquae purae ope in massam homogeneam redigere.

Chocolata antivenerea.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Spiritus Frumenti quantum sufficit ad solutionem.
Balsami Peruv. liq. drach. quatuor.
Pastae Cacao praep. unc. quatuordecim.
Sacchari pulverati . uncias duas.
Libra quaeque in partes triginta duas dividatur. — Gabe, von einem Viertel bis zu zwei Theilen. — Ein schlechtes, verwerfliches Präparat.

§. II. Präparate, in denen die Wirkung des Sublimats durch fremde Substanzen mehr oder weniger verändert ist.

A. Durch Eisenhut.

Pilulae Aconiti mercuriales s. antiherpeticae. (*Br*. Pie. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Extr. Aconiti Napelli scrup. unum.
Tritura diu in mortario vitreo ut fiant pilulae viginti. — In chronischen Krankheiten des Lymphsystems und Flechten, besonders mit Krätz-, Scrophel- und syphilitischer Complication. — Gabe, eine Pille Morgens und Abends, alle zehen Tage um eine gestiegen

Va. Pulverem Aconiti addit et pilulas no. 24 parare jubet, anfangs Morgens und Abends ein Stück und allmälig gestiegen. (1/12 gr. subl. et extr. aconit. 1 gr. sing.)

B. Durch Alaun.

Aqua Mercurii vitriolati s. aluminosa. (Ful. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis, sing. . drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.
Coquendo dimidium consume et filtra. — Ein schlechtes, keine Spur von Sublimat behaltendes Präparat.

C. Durch Spießglanz.

Electuarium antiherpeticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Antimonii crudi pulv. semunciam.
Extracti Fumariae unciam unam.
Resinae Guajaci . . semunciam.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Fouquet verschreibt davon eine halbe bis zwei Drachmen täglich.

Spilbury's antiscorbutic drops (*Gr.*): Subl. corros., Rad. Gent., Cort. Aurant. sicc., sing. drachmas duas, Antim. crudi, Santal. rubr., sing. drachmam, Spir. rect., Aquae, sing. uncias octo; vel:

Sublim. corros. scrup. quatuor, Antim. tart. drachmas decem et scrupulos duos, Coccin. drach. quinque scrupul. unum, Rad. Gent. unc. quatuor, Aq. font. octarios quatuor, Ol. Vitr. q. s.

D. Durch Schierling.

Pilulae antisyphiliticae. (Ful. *E.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Aquae destillatae quantum sufficit ad dissolvendum; adde
Extracti Cicutae drachmam unam.
Pulveris Cicutae quantum sufficit ut fiant pilulae quadraginta octo.

Pilulae antiherpeticae. (*Pic.*)

℞. Sublimati corrosivi grana octo.
Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis medicinalis,
Extr. Conii, sing. drachmas duas.
Fiant pilulae sexaginta quatuor. — Ein ſchlechtes und verwerfliches Präparat.

Pilulae antisyphiliticae et antiherpeticae. (Hosp. Pitié. *Va.*)

℞. Sublimati . . . . . grana tria.
Extracti Cicutae,
— Colocynth., sing. gr. octodecim.
— Chrysanthemi semidrachmam.
— Dulcamarae,
Saponis albi, sing. . drachmam.
Misce fiant pil. no. 72. (½ subl. et ¼ gr. cicut. sing) 1 Stück Morgens und Abends und alle ſechs oder acht Tage um eine geſtiegen.

Gargarisma Belladonnae cum Hydrargyro s. mercuriale. (*Au.*)

℞. Herbae Belladonnae,
— Cicutae, sing. manip. unum.
Seminis Lini . . . uncias duas.
Sublimati . grana sex ad decem.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque per momenta aliquot. — Sander empfiehlt dieſes Gurgelwaſſer bei Halsaffectionen nach Scharlach.

E. Durch Löffelkraut.

Syrupus antiscorbuticus Portali. (GalH *Br. Ca.*)

℞. Radicis Gentianae unciam unam.
— Rubiae,
Chinae, sing. drachmas quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque ad librarum liquidi duarum remanentiam, cola et adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Albuminis ope clarificata coque ad syrupi consistentiam et cola.
Praeterea recipe
Fol. Nasturtii aquatici,
— Cochleariae, sing. unc. quatuor.
Radicis Armoraciae unciam unam.
Contunde in mortario; in succo expresso et frigide filtrato solve balnei aquae ope
Sacchari albi uncias viginti duas.
Cola, syrupum cum praemonito commisce et adde
Sublimati corrosivi grana quatuor, antea dissoluti in
Alcoholis . . drachmis duabus.
Bei Hautkrankheiten, Scropheln, Scorbut und allen ſyphilitiſchen Uebeln. — Gabe, eine bis zwei Unzen in einer paſſenden Tiſane.

Rob antiscorbuticum mercuriale (LP.) paratur, addendo rob antiscorbutico simplici (LP.) Sublimati corrosivi grana octo. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen.

F. Durch Copaivabalſam.

Opiatum Pajot-Laforesti.

℞. Sublimati corrosivi,
Pulveris Gummi Kino,
Bals. Copaivae, sing. semunciam.
Gummi Arab. pulv. sesquiunciam.
Sacchari albi pulv. unc. quinque.
Aquae Menthae quantum sufficit.
Gummi cum aqua in mucilaginem tritis admisce triturando kino, sublimatum et balsamum, miscellae Aqua Rosarum leviter humefactae adde sensim saccharum et Aquae Rosarum quantum ad electuarii consistentiam ei praebendam sufficit. — Bei chroniſchen Ausflüſſen aus der Urethra und im Anfange hitziger Harnröhrenentzündung. — Gabe, zwei Drachmen Morgens und Abends. — Man giebt es allein, entweder mit einem Aufguß von Gamander oder mit einer Taſſe eiſenhaltigem Waſſer mit Aetherſyrup verſüßt.

G. Durch Kupfer.

Pulvis causticus Krügeri. (*Ca*)

℞. Sublimati corrosivi,
Cupri sulph., sing. grana decem.
Argenti nitrici . . . grana sex.
Ein ſchlechtes Präparat, welches auf veneriſche Auswüchſe empfohlen wird; man befeuchtet ſie damit mittelſt eines Pinſels.

Collyrium siccum. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Muriatis Cupri, sing. grana quatuor.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Sacchari albissimi drachmas duas.
Misce.

H. Durch Guajac.

Elixir balsamicum purificans, Essentia Balsami Canadensis mundificans, Tinctura balsamica purificans s. antivenerea Falkii. (Wür. *Bo. Pid. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Alcoholis . . . unciam unam.
Dissolve et solutioni adde
Resinae Guajaci,
Bals. Canadensis, sing. unc. unam dissoluta in
Alcoholis . . unciis septem.
Filtra et adde deinde
Olei ess. Sassafras drachmas duas.
Misce lagenam agitando. (*Bo. Pie. Sp.*)

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Alcoholis rectificati uncias quatuor.
Dissolve et liquori adde
Terebinthinae Venetae,
Resinae Guajaci, . sing. unciam solutas in
Alcoholis . . . unciis quatuor.
Misce bene et adde
Olei ess. Sassafras drachmas duas.
Serva. (Wür.)

Pid. eandem formulam sed loco terebinthinae Balsamum Canadense.

Van Mons hat dieſes Präparat mit Glück vereinfacht:

℞. Sublimati . . scrupulum unum.
Olei Sassafras . drachmas duas.
Tinct. Resinae Guajaci unc. octo.
Aquae Vitae . uncias duodecim.
Post dissolutionem filtra.

Ein kräftiges Reizmittel, welches bei vermuthlichen ſyphilitiſchen Uebeln und Krankheiten von andern Schärfen empfohlen wird. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen, Morgens und Abends, in einem paſſenden Vehikel.

I. Durch Kleber.

Pilulae Taddei.

℞. Amyli Tritici . . libram unam
Fiat cum Aqua destillata pasta, quae sub aqua, amyli removendi causa malaxetur; gluten per horas viginti quatuor hiberno, per octo vel decem horas aestivo tempore sibi ipsi relictum comprime deinde et agita cum Solutione semunciae Saponis amygd. in Aquae libra una, donec liquor homogeneus evadat, qui per cribrum trajiciatur; Sublimati drachmam unam in Aquae q. s. dissolve et liquoris glutinosi talem excessum ei tunc infunde, donec flocci exoriri desierint, qui post aliquot horarum repositionem supra linteum recepti et siccati cum Extracto Guajaci vel Juniperi in pastam redigantur in pilulas centum quadraginta quatuor dividendam.

T. Sublimati drachmas duas, Aquae dest. q. s.; solutioni capsulae porcellanae immissae infunde, continue agitando, excessum glutinis tritici ope Solutionis Saponis teneri cum Aqua saturatae in emulsionem redacti; praecipitatione peracta miscellam crinio immitte ad separanda coagula sublimati et glutinis, quae collecta et inter manus deinde vero inter diversa strata chartae bibulae compressa, rupta et attenuata denique cum Extracto Graminis in pilulas 288 redigantur. — Jede Pille enthält einen halben Gran.

Taddei preiſt dieſe Pillen in veneriſchen Krankheiten, zu zwei oder drei bis ſechs, acht und ſelbſt mehr täglich gegeben; ſie ſind aber zu verwerfen, weil ihre innere Zuſammenſetzung noch nicht bekannt iſt. Der Sublimat iſt darin in zerſetztem Zuſtande vorhanden, außerdem könnte man deren nicht acht nehmen, welche vier Gran Sublimat gleichkommen würden.

J. Durch Gnadenkraut (Gratiola).

Electuarium antisyphiliticum. (*Au. Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas tres
Roob Sambuci . . uncias tres.
Misce. — Stoll verordnete dieſe Latwerge bei ſchmerzhaften, von ſyphilitiſchem Gift hergeleiteten Geſchwülſten.

Mixtura antisyphilitica de Haen. (*Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Extracti Gratiolae drachmas duas.
— Aconiti drachmam unam.
Roob Sambuci . . . uncias sex.
Misce bene. — Bei chroniſcher ausgearteter Syphilis empfohlen. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, indem man mit der gratiola allmälig bis auf eine halbe Unze ſteigt.

K. Durch Opium

Pilulae Sublimati corrosivi cum Opio s. Opii s. antivenereae. (BorC. LH. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Opii puri . . grana quinque.
Aquae calidae . quantum sufficit ad totius solutionem; adde
Micae Panis albi vetusti pulverati scrupulos sex.
Succi Liquiritiae scrup. quatuor.
Misce ut fiant pilulae centum. — Gabe, ein oder zwei Stück Morgens und Abends (BorC. *Au.*)

℞. Sublimati,
Extracti Opii gummosi, sing. semigranum.

Radicis Althaeae pulveratae grana duodecim.
Mellis . . . quantum sufficit ut fiant pilulae quatuor aequales. — Gabe, anfangs 1, dann 1½, zuletzt 2 Stück täglich zwei Mal. (LH.)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae . . . quantum sufficit.
Solutioni adde
Opii . . . . . grana quatuor.
Camphorae . . . . grana octo.
Sacchari . . . semidrachmam.
Micae Panis . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. — Gabe, drei bis fünf, Morgens und Abends. (*Au.*)

Pilulae antivenereae s. antisyphiliticae. (*Ra. Sm. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit ad dissolvendum; liquori adde
Extr. Opii gummosi gr. duodecim.
— Chinae . scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae sedecim, quarum quaeque sublimati partem grani quartam continet. (*Sm.*)

Diese Pillen sind von Frank; Dupuytren hat sie auf folgende Weise verändert:

℞. Sublimati corrosivi,
Extracti Opii, sing. semigranum.
— Chinae . . grana decem.
Pulveris Chinae quantum sufficit ut fiant pilulae duae. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Subl., Extr. Op., sing. grana quinque, Extr. Chinae centum, Chinae pulv. q. s. ut f pil. no. 20. (¼ gr. subl. et op. sing.) 1 — 3 Stück täglich.

Solutio Sublimati corrosivi alcoholica opiacea. (B°. DD. *Au.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Tinct. Opii spirit. drachmam unam.
Misce bene. (DD.)

℞. Sublimati . . drachmas (?) duas.
Aquae Cinnamomi vinosae unciam.
Solutioni adde
Laudani Sydenh. . scrup. unum.
Misce bene. (B°.)

Au. Sublimati grana quatuor, Aquae Cinnamomi vinosae uncias tres et Tinct. Opii scrupulos duos. — Es ist ein ungeheures Mißverhältniß zwischen beiden Formeln, die erste ist aber der zweiten vorzuziehen.

Liquor Spangenbergii. (*Pic. Sm.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Tincturae Opii drachmam unam.
Aquae Rosarum. uncias quatuor.
Als Waschmittel nach verdächtigem Beischlaf empfohlen.

Injectio antivenerea s. mercurialis opiacea. (LH. *Ra. Va.*)

℞. Sublimati corros. grana duodecim.
Aquae destillatae . . libras duas.
Solutioni adde
Laudani liq. Sydenh. unc. unam.
Bei Frauen, welche an venerischen Geschwüren leiden (*Ra. Va.* Hosp. Veu.)

℞. Sublimati . . . . grana duo.
Aquae destillatae . uncias octo.
Laudani . . . drachmas duas.

Litus Hydrargyri, Collutorium mercuriale. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana sex.
Extr. Cicutae.
— Chamomillae, sing. drachmas duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Von Rust empfohlen.

Aqua ophthalmica Conradi s. mercurialis s. Hydrargyri muriatici corrosivi cum Opio, Collyrium ex Hydrargyro muriatico corrosivo. (DD. Han. WW. *Au. Ra. Va. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Inf. Flor. Sambuci uncias quatuor.
Tinct. Opii spirit. drachmam unam.
Sublimato in infusione soluto adde tincturam. (DD.)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aq. Flor. Sambuci . drachmas sex.
Tincturae Opii . guttas decem.
Succi Liquiritiae drachmam unam.
Misce. (*Au.*) — Man giebt diese Auflösung innerlich zu zwanzig Tropfen alle drei Stunden.

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Extracti Opii . . . grana duo.
Misce. (WW.)

Han. et *Vm.* Sublimati granum unum, Aquae Rosarum uncias sex et Laudani Sydenhami scrupulos duos; — *Ra. Va.* Hosp. St. Anton. Sublimati granum, Tragacanthae scrupulum, Aquae Rosarum uncias quatuor et Laudani guttas octodecim.

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Extracti Opii . . semiscrupulum.
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Solutioni adde
Mucilag. Sem. Cydon. semunciam.
Diese Formel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen. (*Vm.*)

℞. Aquae Chamomillae unciam unam.
Sem. Cydoniorum . grana viginti.
Fiat mucilago, cui adde
Sublimati corrosivi granum unum.
Misce sedulo. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi granum unum.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Laudani Sydenh. . semidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Gargarisma mercuriale. LP. *Ra.*)

℞. Fol. sicc. Cicutae . semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque et adde colaturae
Sublimati corrosivi . grana tria.
Laudani Sydenh. drachmam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
LP. Sublimati grana duo, Decocti expressi Cicutae libram unam, Syrupi Diacodion unciam unam.

Elixir Weighti. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Pimentae . . . drachmas duas.
Serpentariae Virg. drachmas tres.
Aquae Vitae unc. octoginta duas.
Infunde frigide, post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde
Resinae Guajaci drachmas decem et pòst hujus solutionem
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Dissolve et filtra.

Cereoli mercuriales dissolubiles. (*Au.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Extracti Opii . drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Gummi Arabici quantum sufficit ut fiat solutio spissa, cui repetitò fila gossypina immergantur, post quamque immersionem siccanda. — Hecker empfahl ſie bei chroniſcher Gonorrhöe.

L. Durch Blei.

Trochisci de Perchlorureto Mercurii et Deutoxydo Plumbi s. Deutoxydi Plumbi s. de Minio s. escharotici. (Gal. LH. Pm. Sar. Wir. *Ca. Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi . partes duas.
Minii . . . . . partem unam.
Micae Panis pulv. partes quatuor.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant trochisci voluminis et formae grani avenae. (Gal. *Sp.*)

Wir. Sublimati, Minii, sing. partem unam, Amyli, Micae Panis, sing. duas et Mucilaginis G. Tragacanthae q. s.; — *Vm.* Sublimati partes duas, Minii unam, Micae Panis octo et Aquae q. s.; — Pm. loco micae Amylum, sed omnium ingredientium eandem, quam *Vm.* quantitatem; — LH. Sublimati partes duas, Minii unam, Micae duodecim, Aquae quantum sufficit; — Sar. Sublimati, Minii, sing. drachmam, Micae Panis octo et Aquae q. s.; — *Ca.* Sublimati unciam, Minii semunciam, Micae Panis uncias sex et Aquae q. s.; — *Fi.* Minii semidrachmam, Sublimati drachmam unam, Micae Panis semunciam, Aquae Rosarum q. s.; — *T.* Micae Panis uncias tres, Sublimati corrosivi drachmas sex et Aquae Rosarum q. s.

Injectio hydrargyro-saturnina s. de Plumbo et Mercurio, Solutio hydrargyrata. (*Sw. Sy.*)

℞. Lithargyri . . . unciam unam.
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Aceti . . . . uncias quinque.
Digere in loco calido per horas duodecim, vas saepius agitando; partem liquidi limpidam decantha et hujus liquoris drachmis duabus vel quatuor adde
Aquae destillatae uncias quatuor.
Misce bene. (*Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Plumbi acet. cryst., sing. semidrachmam.
Aquae Rosarum . libram unam.
Dissolve. (*Sy.*)

℞. Sublimati corrosivi . grana duo.
Aquae purae . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Plumbi subacet. liq. guttas triginta.
Misce bene. (*Sy.*)

Sw. Sublimati semigranum, Aquae uncias quatuor et Subacetatis guttas octo; — vel: Sublimati semiscrupulum, Aquae uncias quindecim et Subacetatis drachmas duas; — vel: Sublimati semidrachmam, Subacetatis uncias quinque et cuique drachmae miscellae harum substantiarum simul trituratarum Aquae librae unius additionem.

Ein ſchlechtes Präparat. — Man hat es bei chroniſcher und ſelbſt bei hitziger Harnröhrenentzündung empfohlen.

Lotio Plumbi composita s. exsiccans. (*Sw.*)

℞. Acetatis Plumbi liquidi,
Sulphatis Zinci, sing semunciam.
Sublimati corrosivi grana viginti.
Aquae . . . . . libras duas.
Ein ſchlechtes Präparat; bei manchen pruriginöſen Ausſchlägen an dem Scrotum und den Geſchlechtstheilen empfohlen.

Aqua antiherpetica Cardinalis de Lugnes. (*Bo. Ca. Pic*)

℞. Sublimati . . sesquidrachmam.
Cerussae . . drachmas quatuor.
Aluminis . . . drachmas tres.
Albumen Ovi . . . . . no. 1.

Aquae Rosarum . . uncias octo.
Commisce bene. (*Pic.*)

Bo. et *Ca.* Sublimati semunciam, Cerussae uncias duas, Aluminis unciam et Aquae communis libras duas.

Ein ſchlechtes Präparat; man tränkt Compreſſen damit, welche vorſichtig auf Flechten anzuwenden ſind.

Liquor ad condylomata, Aqua caustica, Aqua cathaeretica Plenckii. (Wür. *Au. Ca. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Aluminis, sing. . . unciam unam.
Cerussae,
Camphorae, sing. drachmam unam.
Alcoholis,
Aceti albi, sing. uncias duodecim.
Misce et absque filtratione serva. (Wür. *Vm.*)

Ca. Sublimati, Aluminis, Cerussae, Camphorae, sing drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. sesquilibram.

℞. Sublimati . . drachmam unam.
Aluminis,
Camphorae,
Acet. Plumbi cryst., sing. semidrachmam.
Alcoholis,
Aceti, sing. . . . . semunciam.
Misce bene. (*Sy.*)

Au. et *Sw.* omisso plumbo Sublimati drachmam, Aluminis, Camphorae, sing. semidrachmam, Aceti, Alcoholis, sing. semunciam; — vel: Sublimati, Aluminis, sing. uncias duas, Camphorae drachmas duas, Alcoholis et Aceti, sing. libras duas.

Ein ſchlechtes Präparat; man tränkt Plumaseaux damit, welche man auf veneriſche Auswüchſe applicirt. — Das folgende iſt noch weniger rationell und muß ganz verworfen werden.

Aqua mercurialis s. Srettinensis ad usus externos. (Br. Wir.)

℞. Florum Granati . . semunciam.
Plumbi acetici crystallisati,
Tartari albi, sing. . drachmam.
Rad. Tormentillae drachmas duas.
Aluminis saccharati unciam unam.
Sublimati corrosivi,
Ligni Santali rubri, sing. drachmam.
Alcoholis rectif. . uncias sedecim.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo. (Br.)

℞. Cerussae . . . . unciam unam.
Aluminis . . . . . drachmas sex.
Lithargyri . . . . semunciam.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.
Aquae Solani nigri,
Aquae Plantaginis,
— Rosarum,
— Nymphaeae, sing. unc. quatuor.
Aceti . . . . . semilibram.
Coque leviter et absque colando serva. (Wir.)

Unguentum siccativum. (*Sw.*)

℞. Tutiae praeparatae,
Sublimati, sing. scrupulum unum.
Oxydi Mercurii rubri,
Acetatis Plumbi,
Aluminis calcin., sing. drach. duas.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Misce triturando.

M. Durch Rhabarber.

Pilulae mercuriales. (GalF. *Ra. Va.*)

℞. Sublimati corrosivi grana quatuor.
Alcoholis . . . guttas aliquot.
Solutioni pedetentim adde
Pulveris Rhei,
— Guajaci, sing. . drachmam.
Extracti Liquiritiae . . . q. s. ut fiant pilulae granorum quinque. (GalF.)

Ra. Va. Hosp. St. Louis. Sublimati scrupulum, Rhei drachmas duas, Saponis medic. semunciam, Pulv. Liquiritiae et Syrupi Flor. Aurant. q. s. ut fiant pilulae centum quadraginta quatuor (dictae no. 2.) — Die letztere Formel iſt zu verwerfen.

N. Durch Scammonium.

Pilulae Scammonii hydrargyrosae s. mercuriales s. e Scammonio compositae. (Suec.)

℞. Sublimati corrosivi,
Scammonii, sing. grana duodecim.
Gummi Gutti . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae sex. (!)

Durch Zuſatz einer Drachme Rhabarberextract und durch Vertheilung der Maſſe in vier und zwanzig Pillen würde man ein leichter zu behandelndes und weniger gefährliches Präparat erhalten.

O. Durch Senna.

Pilulae antivenereae Lassönne. (*Sm.*)

℞. Sublimati . . grana octodecim.
Mercurii dulcis grana quinquaginta quatuor.
Diu trituratis adde
Resinae Guajaci . semidrachmam.
Sennae pulv. . drachmam unam.
Syrupi Dianthi . quantum sufficit ut fiant pilulae duorum granorum. —

Gabe, drei Stück täglich, allmälig gestiegen. — Ein schlechtes Präparat.

Decoctum Rasorii a Soresina. (Pm.)

℞. Corticum Radicis Bardanae uncias octo.
Foliorum Fumariae siccatorum unciam unam.
— Sennae orientalis sesquiunciam.
Aluminis usti . . . semunciam.
Sublimati corrosivi grana quadraginta.
Aquae fontanae . libras viginti.

Decoque diligenter in vase terreo vitreato ad librarum decem remanentiam, et cola leni expressione. — Gabe, von drei bis acht Unzen.

Iodureta Mercurii.

§. I. Proto-Ioduretum.

Fer. GalH. *Gr. Ma. Re. T.*

℞. Protonitrat. Merc. cryst. part. centum.
Aquae . . partes quadringentas.

Dissolve, filtra liquorem et ei sensim infunde

Iodureti Potassii in Aqua Acido nitr. acidulata soluti . . q. s. ut non amplius enascatur praecipitatum, quod filtro receptum Aqua dest. abluatur, donec a potassa non amplius nigrum praecipitetur, quo facto siccatum a luce tutum serva.

T. Obtinetur reciproca decompositione Hydriodatis Potassae et Nitratis Protoxydi Mercurii.

§. II. Deuto-Ioduretum.

Fer. *Fi. Gr. Ma. Re. T.*

℞. Sublimati . . partes septuaginta.
Iodureti Potassii . partes centum.

Dissolutis seorsim in Aquae dest., liquores filtrati sensim commisceantur; praecipitatum in filtro receptum Aqua destill. ablue, donec saporis expers evadat, quo facto siccatum et pulveratum a luce tutum servetur. (*Gr. Ma.*)

℞. Solut. Hydriodatis Potassae q. vis.

Infunde ei guttatim Solutionem Sublimati, donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum lotum sicca. (Fer. *Fi.*)

T. Solutioni filtratae Hydriodatis Potassae puri semunciae vel unius in Aquae destillatae q. s. Solutionem infundere filtratum Sublimati cum Aqua dest paratam.

Gr. Solutionem Iodatis Potassae adde Solutioni Mercurii nitrici. (*Iodas Hydrargyri.*)

Die Quecksilberiodüren sind kräftige Reizmittel, von denen das zweite an Wirksamkeit selbst den Sublimat übertrifft; man hat sie besonders bei der Behandlung venerischer Krankheiten mit Scrophelcomplication angewendet. Es bedurfte bisweilen nur einer Berührung von wenigen Augenblicken mit dem Deutoiodüre, um eine sehr heftige rothlaufartige Hautentzündung hervorzubringen. Man fängt mit einem Sechszehntheil an und steigt allmälig bis zu einem Viertelgran.

Solutio s. Tinctura Deuto-Iodureti Mercurii alcoholica, Alcohol cum Deuto-Iodureto Mercurii. (Fer. GalF. GalH. *Fi. Gr. Ma. Va.*)

℞. Deuto-Iodureti Mercurii grana viginti.
Alcoholis (86°) . . sesquiunciam.
Dissolve. (GalF. GalH. *Ma.*)

Sechs und zwanzig Tropfen enthalten beinahe einen Achtelgran Jodüre.

Fer. Alcoholis unciam unam; — *Fi.* Alcoholis 86° unciam unam, Deutoiodureti scrupulum unum; — *Gr.* Deutoiodureti grana sedecim; — *Re.* Iodureti grana quindecim; — Zehen Tropfen enthalten einen Sechszehntheilgran Jodüre. — Gabe, zehen, fünfzehen und zwanzig Tropfen in einem Glase destillirtem Wasser, da das gemeine reine Wasser eine Zersetzung bewirken würde.

Solutio Deutoiodureti Mercurii aetherea, Aether sulphuricus cum Deutoiodureto Mercurii. (GalF. *Gr. Ma. Re. Va.*)

℞. Deutoiodureti Merc. grana viginti.
Aetheris sulphurici sesquiunciam.

Gr. Deutoiodureti grana sedecim, Aeth. sesquiunciam.

Die Gabe ist etwas geringer als bei der alcoholischen Auflösung. (5 bis 15 Tropfen.)

Pilulae Proto- vel-Deuto-Iodureti Mercurii. (Fer. GalF. GalH. *B. Ma. Re. Va.*)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii granum unum.
Extr. Liquiritiae grana duodecim.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s. ut fiant pilulae octo. (*Ma.*)

GalF. GalH. *Va.* loco extracti liquiritiae Extractum Juniperi adhibent.

℞. Deuto- vel Protoiodureti Mercurii granum unum.
Pulveris Liquiritiae . grana sex.
Roob Sambuci . quantum sufficit ut fiant pilulae octo. (Fer.)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii granum unum.
Extracti Juniperi . grana sedecim.

Pulveris Liquiritiae . . . q. s. ut fiant boli octo. (*B.*)

Re. Extracti Juniperi grana duodecim, caet. ut antea.

Gabe, Morgens und Abends zwei Stück, bis vier auf die jedesmalige Gabe geſtiegen.

Unguentum s. Pomatum Iodureti s. Protoiodureti s. Deutoiodureti Hydrargyri s. Mercurii, Pomatum Iodii. (GalH. *B. Gr. Ma. Pic. Ra. Re. T. Va.*)

℞. Proto- vel Deutoiodureti Mercurii grana viginti.
Axungiae praep. . sesquiunciam.
Misce triturando. (*Ma. Va.*)

Gr. Iodureti grana sedecim; — *T.* Deutoiodureti drachmam, Axungiae praep. unciam; mercurium extingue in axungiae pondere circiter aequali et adde tunc per vices reliquam axungiam. Paratur quoque extempore.

℞. Deutoiodureti . grana quindecim.
Axungiae . . . . uncias duas.
Essent. Bergamottae gutt. viginti.
Misce. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Protoiodureti . . semidrachmam.
Axungiae . . . . sesquiunciam.
Essent. Bergamottae gutt. quindecim.
Misce. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

Pic. Re. Iodureti grana quindecim, Axungiae unciam unam et Essentiae Caryophyllorum guttas viginti. (*Re.* absque ess.)

Zur Beſchleunigung der Vernarbung ſchmerzloſer Geſchwüre, auch zum Einreiben auf Drüſengeſchwülſte empfohlen. Die mit dem Deutoiodüre iſt reizender als die andere, und muß in geringerer Menge angewendet werden.

Unguenta cum Protoiodureto. (Hosp. St. Lud. *Va.*)

No. 1. Scrupulos duos, No. 2. tres, No. 3. quatuor pro Axungiae unciis duabus. — Von Lugol bei Hautſcroſeln mit Syphilis.

Cyanuretum Mercurii.

Hydrocyanas s. Prussias Hydrargyri s. Mercurii, Borussias s. Cyanuretum Hydrargyri, Mercurius hydrocyanicus, Hydrargyrium Borussicum s. hydrocyanicum s. bicyanatum; blauſaures Queckſilber. (B*. Bel. Fer. Gal. HassP. LH. *Br*. Gr. Re. T. Va. Vm.*)

℞. Coerulei Borussici . partes duas.
Oxydi Mercurii rubri. part. unam.
Pulverata et bene mixta in capsulam vitream ingere iisque infunde
Aquae purae . . . partes octo.
Coque continuè cum spathula ferrea agitando, donec mixtura flavum colorem acceperit, filtra deinde et residuum ablue cum
Aquae purae . partibus quatuor.
Liquores commixti vaporent, donec guttula, corpori frigido instillata, concrescat; tum ad locum frigidum repone, ut in crystallos abeant, quae nova crystallisatione purificentur. (Bel. Fer. Gal. *T.*)

LH. Easdem quantitates et agendi rationes, sed ad purificandum productum ab oxydo ferri, solutionem in aqua et coctionem cum Mercurio rubro; ab excessu cyanureti, acidum hydrocyanicum addere suadet; — Pm. Coerulei uncias duas, Praecipitati rubri unam, Aquae ad ebullitionem uncias duodecim et duas ad elotionem.

HassP. Coerulei Parisiensis puri partes duas, Oxydi tres, coquere cum Aquae dest. partibus sedecim per semihoram etc., residuum Aquae dest. fervidae quantitate necessaria eluere et crystallos si flavescentes evadunt, resolutione in Aqua dest. et coctione cum Mercurii calcinati rubri parva quantitate a ferro liberare et nova crystallisatione depurare; — GalH. ab initio Coeruleum borussicum Acido sulphurico vel muriatico tenui lavare, ut alumen separetur, quo neglecto agendum foret cum incerta et variabili ferrocyanatis ferri quantitate; — *Re.* sec. Du. Cyanureti Ferri partes sex, Oxydi rubri quinque, Aq. destill. ferv. quadraginta per semihoram coquere, filtrare, residuum Aq. destill. abluere, et vaporando in crystallos cogere; — *Gr.* Praecip. rubri unc. unam, Coerul. Boruss. duas, Aq. dest. sex coquere per semihoram, filtrare, addita nova Aqua denuo coquere, filtrare et solutiones mixtas evaporare.

℞. Oxydi rubri Mercurii part. decem.
Coerulei borussici partes septem.
Pulverata seorsim, secundo pauxillum Alcoholis addendo, in retortam immitte cum
Aquae . . . partibus octoginta.
Coque in balneo arenae, donec massa colorem flavescenti viridem acceperit; filtra bis per eandem chartam; residuum Aqua frigida edulcoratum in balneum arenae remitte et tunc ab igne remove; lente in crystallos abeat et nova crystallisatione purificetur. (B*. *Vm.*)

℞. Oxydi rubri Mercurii drachmas duodecim.
Coerulei Borussici . uncias octo.
Aquae dest. . unc. viginti septem.
Porphyrisata seorsim oxydum et sal cum Aquae unciis novem in capsulam

porcellaneam immitte, et per semihoram cocta inter continuam agitationem, decantha et filtra; residuo infunde Aquae bull. uncias octodecim; coque per semihoram et filtra; colaturae commixtae evaporent ad cuticulae usque apparitionem et sepositione in loco frigido in crystallos abeant. (*Br**.)

Ein fürchterliches Gift, welches in venerischen Krankheiten versucht worden, aber nicht angewendet werden sollte. Man giebt es wie den Sublimat, aber in etwas minder starken Gaben. Außerdem hat es nur pharmaceutischen Nutzen.

Hydrocyanas Mercurii, Liquor antisyphiliticus s. antisyphiliticus Chaussieri. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Cyanureti Mercurii . grana octo.
Aquae destillatae . libram unam.

Jede Unze enthält einen halben Gran Cyanure.

Pilulae Cyanureti Mercurii. (*Va.*)

℞. Cyanureti Mercurii . grana octo.
Gummi Arab. pulv.,
Extr. Cichorii, sing.
semidrachmam.
Althaeae pulv. . . . . q. s.

Fiant pil. 64. (½ gr. cyan. sing.) Anfangs Morgens und Abends 1 Stück und allmälig gestiegen.

Unguentum Hydrargyri Prussiatis. (*Re.*): Mercur. hydrosublimat. drachmas duas c. dimid., Acidi hydrocyanici gutt. viginti, Ung. Spermaceti unciam, misce sedulo in mort. vitreo.

Unguentum s. Pomatum Cyanureti Mercurii. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Cyanureti Merc. . grana sedecim.
Axungiae Porci . unciam unam.
Essentiae Citri . guttas quindecim.

Bei schuppigen feuchten Flechten mit starker Entzündung und heftigem Jucken empfohlen.

Ammoniuretum Hydrargyri s. Mercurii. (B*. *Br. Fi. Vm.*)

℞. Oxydi rubri Merc. pulv.
partes duas.
Ammoniaci liq. concentratiss.
partem unam.

Agitata vivaciter repone per horas aliquot; agita iterum et sic perge, donec massa adspectum crystallinum prae se ferat, decantha deinde et leviter lotam sicca, pulvera et iterum lotam denuo sicca. (B*. *Vm.*)

℞. Praecipitati albi . . . . q. vis.
Ammoniaci liquidi quantum sufficit ad dissolutionem praecipitati. (*Br. Fi.*)

Letztere Formel giebt ein ganz von der vorigen verschiedenes Product, nämlich Ammoniumquecksilbersulphat

Das Ammoniumquecksilber ist äußerlich zur Zertheilung von Exostosen empfohlen worden.

Linimentum Ammoniureti Mercurii. (*Br**.)

℞. Olei Olivarum drachmas novem.
Ammoniureti Mercurii semunciam.

Contere in mortario vitreo — Dieses Liniment besteht aus Ammoniumquecksilbersulphat.

Boras Hydrargyri, Sal sedativum mercuriale, Mercurius boraxatus. (B*. *Gr. Sp. Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitr. concent., sing.
uncias duas.

Solutione peracta, liquori Aquae partibus quatuor diluto et filtrato infunde sensim Solutionem aquosam Subboratis Sodae, donec nullum prodeat amplius praecipitatum, quod lotum siccetur. (*Gr. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . . partes 2,22.
Boratis neutralis Sodae . . 26,5.

Tritura simul in mortario vitreo; post horae quadrantem adde Aquae parvam, deinde majorem et denique magnam quantitatem; liquido decantato, praecipitatum bene ablue, donec aqua saporis sit expers, et sicca. (B*. *Gr. Vm.*)

Dieses Salz kann den mercurius dulcis ersetzen. — Gabe, zwei Gran täglich, allmälig gestiegen.

Carbonas Mercurii. (Fer. *Fi. T. Vm.*)

℞. Solut. Sublimati satur
part. quatuor.
Acidi carbonici liq. part. sedecim.

In lagenam intromissis adde sensim, probe agitando, Solutionem ex
Carbonat. neutr. Potass. parte una.

Lagena tunc per quatuordecim vel plures dies in loco frigido relicta, crystallos in superficie liquidi conspicuas leviter ablue et sicca. (*Vm.*)

Man kann hierher die Formel von Pal. zur Bereitung des Turpethum minerale ziehen, wovon man, wenn man sich nach ihr richtet, nicht ein Atom erhält, da nach derselben eine Auflösung des Sublimats durch eine andre von kohlensäuerlichem Kali zersetzt werden soll.

℞. Acetatis Mercurii . quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit ad dissolvendum; liquori calido adhuc filtrato infunde Ammonium subcarb. liq., donec praecipitatum edere cessa-

verit, quod lotum siccetur. (Fer. *Fi. T.*)

Mercurius praecipitatus fuscus s. Wurtzii, Turpethum rubrum. (Li.)

℞. Protonitrat. Mercur. liq. libras duas.
Infunde sensim
Natri subcarb. liq. . . . . q. s. donec nullum amplius provocetur praecipitatum, quod separatum et Aqua calida lotum siccetur

Phosphas Hydrargyri s. Protoxydi Hydrargyri s. Mercurii, Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum. (B*. Br. O. *C. Gr. Sw. Vm.*)

℞. Nitratis Mercurii . quantum vis.
Infunde sensim
Solut. aquos. Subphosphatis Sodae quant. sufficit
ut non amplius prodeat praecipitatum, quod ablutum siccetur (B*. Br. O. *Sw. Vm.*)

Gr. Mercurium in Acido nitrico dissolve, adde Solutionem Phosphatis Sodae, quamdiu sedimentum oriatur etc.

℞. Sublimati corrosivi . quantum vis.
Dissoluto in Aqua calida adde sensim
Solut. aquos. calidae Subphosphatis Sodae . . quantum sufficit
ut non amplius exoriatur praecipitatum, quod lotum sicca. (*Sw*. Vm.*)

℞. Mercurii dulcis . partem unam.
Subphosphatis Sodae partes duas.
Bene mixtis adde, triturando in mortario vitreo,
Aquae calidae . partes quatuor.
Post horam unam liquido decantato praecipitatum lotum super filtro siccetur. (*Sw*. Vm.*)

C. Solutionem Nitratis Mercurii ope illius Subphosphatis Sodae decomponere jubet.

Parari quoque potest addendo Acidum phosphoricum Solutioni Mercurii in Acido nitrico (*Hydrargyrum oxydatum phosphoricum acidum, Mercurius phosphoratus Fuchsii*). Massa obtenta in Aq. unciis octo soluta seponitur, ut omnia insolubilia praecipitentur; liquor defusus bulliat, addendo de residuo quamdiu aliquid solvitur; liquidum hoc modo saturatum Aquae tanta quant. solutum ut totum unciar. sit octo, quiete refrigeret ut excessus hydr. phosphorici subsideat, vel ipsum nomine *Liquor Hydrargyri oxydati phosphorici acidi* servetur.

In England und Deutschland hat dieses Präparat einigen Ruf gegen rebellische und ausgeartete syphilitische Uebel, in Frankreich ist es dagegen wenig in Gebrauch. — Gabe, ein halber oder ganzer Gran, in Pulver mit Zucker und Zimmt. Auch äußerlich in Salbenform. Der Merc. phosp. Fuchsii vorzüglich bei syphilitischen Uebeln kleiner Kinder, aber auch bei häutiger Bräune, chronischen Exanthemen ꝛc. innerlich und äußerlich zu 1 oder mehreren Granen, ganz kleinen Kindern 3 Gran in 3 Unzen Wasser, theelöffelweise. Boudet glaubt, statt seiner so wie für viele andere ähnliche Präparate die von ihm entdeckte *Phosphas ammoniaco-mercurialis*, welche sehr leicht auflöslich ist, anwenden zu können. Dieses Präparat kömmt mit dem merc. dulcis und wahrscheinlich mit noch andern Quecksilbersalzen zu dem *Praecipitatus roseus* oder *Rosa mineralis*, welchen man erhält, indem man in eine wässerige Auflösung des salpetersauren Quecksilbers Urin gießt; man verschrieb ihn ehedem als Purgirmittel zu sechs bis zehen Gran.

Pulvis antivenereus. (*C.*); Phosphatis Hydrargyri grana quatuor, Cinnamomi pulv. grana quotuordecim, Sacchari albi semidrachmam; misce f. pulv. 8. Morgens und Abends ein Pulver, bis Speichelfluß droht, wo es dann auszusetzen ist, bei alten vener. Geschwüren, besonders an den Geschlechtstheilen, vener. Ophthalmie, Schanker, Rheumatismen ꝛc.

Subdeutosulphas Hydrargyri s. Mercurii, Calx Mercurii vitriolata, Hydrargyrus vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. flavus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. praecipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum Hydrargyri sulphuricum s. Mercurii flavum per Acidum sulphuricum, Sulphas Hydrargyri s. Hydrargyri luteum s. cum excessu Oxydi, Subsulphas Hydrargyri peroxydati s. flavus, Turpethum minerale, Praecipitatus flavus, Sulphas Mercurii oxydulatum; Mineralturpith. (A. Ams. B*. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. HassP. Li. LP. Lus. Sar. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . partem unam.
Acidi sulphurici . . partes duas.
Calefac gradatim, donec massa alba salina prodierit, quâ igne aucto siccata Aqua dest. adspersâ, totum in mortario vitreo triturctur; sepone deinde, liquidum decantha et pulverem in fundo subsidentem Aqua dest. ablue, donec haec saporis expers evadat. (Ams. Gen. Lus. Sar. Wür.)

B*. Mercurii partes duas et Acidi unam c. dimid.; — *Br.* Mercurii tres et Acidi quatuor c. dimid.; — Gal. Mercurii duas et Acidi (66°) duas c. dim.; — Am. Ed. *C. Re.* et *Sp.* Mercurii duas et tres Acidi; — Du. Mer-

curii unam et Acidi unam c. dim.; — Br. Fer. et Wir. Sing. partes aeq.; — LP. Mercurii libram unam, Acidi sulphurici concentrati sesquilibram in balneo arenae per horas duodecim digerere, deinde ignem ad bullitionem acidi augere, quo peracto siccare, lavare Aqua etc.; — *Vm.* Mercurii 190 et Acidi 200; — HassP. Mercurii uncias quatuor, Acidi Vitrioli concentrati uncias quinque in cucurbita calefacere ad ebullitionem acidi et donec massa salina in cucurbita restans sicca appareat, caeterum fere ut Ams. Gen. etc.; — *Fi.* Mercurii libras duas, Acidi sulphur. tres, Aquae destill. vel pluvialis viginti, acido in retorta vitrea mercurio infuso in balneo arenae ad siccum destillent etc.; — *Gr.* Mercurium in Olei Vitrioli pondere fere aequali ad siccum coque, massam albam in Aquae bullientis magnam copiam effunde etc.; — Li. Mercurii uncias quinque, Acidi sulph. concent. sex; solutione peracta, sal siccatum et pulveratum in lagenam immitte continentem Aquae bull. libras duas et Olei Tartari per deliq. unciam, tunc praecipitatum separatum sicca.

℞. Acidi sulphurici pondere ipsi aequali diluti . . quantum vis.
Oxydi rubri Mercurii . . . q. s.
ad saturandum acidum. Evaporatae ad siccum et pulveratae massae infunde Aquae bull. pondus decuplum, agita, sepone, decantha et praecipitatum lotum sicca. (*Vm.*)

T. triturare in mortario porphyreo Sulphatem Deutoxydi Mercurii et inter continuam triturationem Aquam bull. affundendo, post aliquot momentorum sepositionem liquidum decanthare, pulveri residuo novam Aquae quant. per vices infundere, donec pulchrum colorem flavum acceperit, et siccare.

Re. Persulphatis Hydrargyri partem unam, Aq. bull. viginti conterere, liquoram defundere et pulverem flavum Aq. dest. ferv. ablutum siccare.

Ein heftiges Brech- und Purgirmittel, welches man ehedem als Sicherungsmittel gegen Pocken empfahl, heutzutage aber nur noch bei hartnäckigen Exanthemen anwendet, gegen welche es noch für das wirksamste aller Quecksilberpräparate gilt. — Gabe, von einem Viertelgran zwei oder drei Mal täglich, bis zu einem, zwei oder höchstens drei Gran.

Boli emetici. (*Pie. Sa.*)

℞. Turpethi mineralis grana septem.
Conserv. Rosar. rubr.
scrup. unum.
Fiat bolus unus. (*Sa.*)

Pie. Turpethi grana quinque.

Beide Gaben sind zu stark, besonders die erste, drei Gran sind hinreichend. — Besser, man verzichtet auf ein solches Brechmittel ganz.

Unguentum Turpethi mineralis s. Sulphatis Hydrargyri s. Oxydi albi Mercurii per Acidum sulphuricum. (B*. *Br. Ca. Ra. Sm. Sw. Va.*)

℞. Turpethi min. pulv. partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.
Tritura sal in mortario vitreo, cum axungia leni calore liquata commisce et ad refrigerationem usque tritura. (*Sm. Sw.*)

Br. Turpethi partem unam et quatuor Axungiae; — *Ca. Ra. Va.* Hosp. St. Lud. Turpethi unam et sedecim Axungiae.

℞. Turpethi min. pulv. partem unam.
Cerati simplicis . partes decem.
Misce bene. (B*.)

Alibert wendet diese Salbe oft an zur Reizung mancher Flechten.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Cullerieri. (*Pie. Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Turpethi mineralis,
Laudani liq. Sydenh., sing. drachmam.
Flor. Sulphuris lot. semidrachmam.
Axungiae Porci . unciam unam.
Tritura simul.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Chevallieri. (GalH.)

℞. Turpethi mineralis drachmas duas.
Calcariae muriaticae drachmas tres.
Olei Amygdal. dulc. drachmas sex.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce triturando.

Sulphas Mercurii, Sulphas Protoxydi et Deutoxydi Mercurii. (GalH. *Br. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . uncias tres.
Acidi sulph. uncias quatuor c. dim.
Calefac, balnei arenae ope, in retorta, donec vapores acidi sulphurosi prodire coeperint, tunc ab igne remove et massam salinam formatam separatam in lagena vitrea serva. (*Br.*)

Vm. 1) commiscere Oxydi rubri Mercurii partes decem c. dimid. et Acidi sulph. quinque, Aqua sensim addita, et commixtione peracta ad perf. usque siccitatem calefacere; — 2) coquere Mercurii et Acidi part. aeq. ad perf. exsiccationem usque; — 3) calefacere simul Mercurii partes novem c. dimid. et Acidi decem, et massam ad siccum

evaporatam adhuc calidam triturare cum Mercurii partibus 4,75.

Dieſe vier Verfahrungsweiſen geben, vielleicht mit Ausnahme der zweiten, ein Deutoſulphat mit einer gewiſſen Menge Protoſulphat vermiſcht.

T. 1) Mercurii partem unam in duplici circiter Acidi sulph. concent. pondere coquere et ad siccum redigere — vel 2) Solutioni Nitratis Protoxydi Mercurii infundere parvum excessum Sulphatis Sodae, decanthare et praecipitatum album obtentum in filtro charta ceo exstillare. — Sulphas Deutoxydi eodem modo ut 1) sed in proportione ut 1 ad 5 adhibitis mercurio et acido.

Secundum GalH. Protosulphas obtinetur decompositione Protonitratis puri in Aqua Acido nitrico acidulata soluti per Sulphatis Sodae vel Potassae q. s, praecipitatum sedulo abluendo et a luce tutum siccando. (GalH.)

Beide ſind in der Medicin ungebräuchlich, dienen aber, beſonders das erſte, zu mehreren pharmaceutiſchen Operationen.

Persulphas Hydrargyri. (Du. *Re.*) Mercurii pur., Acidi sulph., sing. part. sex, Acidi nitr. unam in vase vitreo aestui aucto exponere, donec massa perfecte sicca et alba reddatur.

Subdeutosulphas ammoniaco-mercurialis, Oxydum album Mercurii per Acidum sulphuricum. (LP. *Br. Fi. Sw.*)

℞. Mercurii . . . . libras duas.
Acidi sulphurici . . libras tres.

Digerendo in balneo aquae dissolve, tunc liquorem Aqua dilue, praecipitatum turpethi mineralis formatum separa et supersulphati mercuriali supernatanti infunde sensim Subcarbonatem Ammoniaci liquidi vel Ammonium causticum liquidum, donec praecipitatum non amplius evadat, quod Aqua destillata bene ablutum leni igne siccetur.

LP. *Fi.* Solutionis Turpethi libram unam, Carbonatis Ammoniaci liquidi quantum sufficit ut effervescentia producatur et praecipitatum subsideat, etc.; — Dieſes Präparat dient nur zur Bereitung des von Brugnatelli uneigentlich ſogenannten Ammoniuretum Mercurii.

Hyposulphis Mercurii et Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae et Mercurii. (*Vm.*)

℞. Hyposulphitis Potassae
partes duas cum dimidia.
Oxydi rubri Mercurii partem unam.

Dissolve sal in Aqua bull., adde oxyd. pulveratum et agita ad dissolutionem usque; liquorem adhuc calidum filtra, tunc postquam refrixerit, crystallos Aquae frigidae pauxillo ablutas solve in Aquae calidae minima qua potest quantitate, et liquorem novae crystallisationi subjice.

Auf gleiche Weiſe bereitet man die *Hyposulphis Mercurii et Sodae* und die *Hyposulphis Mercurii et Ammonii.*

Sub-Protonitras Mercurii, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum Hydrargyri Hahnemanni s. salinum s. ammoniacale, Mercurius solubilis Hahnemanni, Calx cinerea Mercurii, Oxydum Hydrargyri s. Mercurii cinereum s. nigrum s. nigrum mediante Ammoniae praecipitatum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum s. hydrargyrosum, Oxodes Hydrargyri nigrum, Oxynitras Hydrargyri et Ammoniae, Praecipitatus niger s. solubilis niger, Protoxydum Hydrargyri nitrico-ammoniacale, Sub-Protonitras Hydrargyri et Ammoniae, Hydrargyrum oxydulatum nitrico-ammoniatum, Mercurius praecipitatus niger, Pulvis Hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum; Hahnemann'ſches Queckſilber. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. LH. Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Gr. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Acidi nitrici . . uncias quinque.

Infunde in cucurbitam vasi magno Aqua frigida repleto immersam et loco frigido positam; adde

Mercurii purissimi . semunciam.

Metallo dissoluto, iterum unam primum, deinde uncias tres cum dimidia adde, balneum, si ut caleſiat in eo est, refrigefaciendo. Crystallos si quae oriantur, quae ab acido non dissolvuntur, vaporationi spontaneae subjice et tunc liquorem decantha. Crystallos Aquae dest. pauxillo ablutas in filtro absque calore sicca, tunc in Aquae dest. libris quinque dissolve, et solutionem filtratam agitando Ammoniaco satura ac sepone; decantha liquidum supernatans praecipitato, quod Aqua destillata lotum et aëri expositum absque igne siccatum pulvera. (Li.)

HassP. fere eodem modo procedit; — RC. Mercurii arbitrariam quantitatem in Acidi nitrici q. s. intra phialam vasi amplo, Aqua fluviali frigida repleto impositam solvere, crystallis Aqua destillata ablutis, solutis et filtratis addere guttatim, saepius agitando, Ammoniae liquidae q. s. ad mercurium penitus praecipitandum, pulverem repetitis vicibus Aqua fervida abluere et absque calore siccare.

Dieß iſt das von Hahnemann ſelbſt empfohlene Verfahren; das in allen andern Pharmacopöen angezeigte iſt nicht weſentlich davon verſchieden.

℞. Mercurii . . . . partes tres.
Acidi nitrici 33° . partes duas.

In phialam immissa et in balneo arenae collocata modice calefac et coquere continua, donec crystalli formari coeperint; ab igne remove, agita ut crystallisatio confusa provocetur, mortario vitreo immitte, triturando, et adde Aquae dest. parvam quantitatem cum Acidi nitrici pauxillo commixtam; sepone, decantha et eandem operationem cum residuo repete, donec mercurius penitus sit solutus; liquoribus commixtis guttatim instilla Ammoniacum caust. liq., continue agitando; post subsidentiam pulvis pluribus vicibus Aqua lotus et supra filtrum eguttatus in balneo vaporis siccetur. (GalM.)

Das Operativverfahren iſt faſt überall daſſelbe. Du. Br. Ed. nehmen ſtatt des cauſtiſchen Kali's eine Auflöſung des kohlenſäuerlichen Ammoniums. (Mercurii, Acidi, sing. uncias duas, Aquae destillatae octo, Aquae Subcarbonatis Ammoniae q. s. [circiter sesquiunciam]; vel: Mercurii quatuor, Acidi quinque, Aquae quindecim, Aquae Subcarb. Amm. q. s.)

Stolze hat folgendes Verfahren vorgeſchlagen:

℞. Protonitr. Mercur. crystall. part. octo.
Acidi nitrici (1,250) partem unam.
Aquae dest. bull. partes octoginta.
Dissolutioni refrigeratae adde
Ammoniaci liq. (0,95) part. quatuor.
diluti
Aquae destillatae . partibus octo.

Agita, filtra et praecipitatum sicca. (GalF.)

℞. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati recenter parati . q. placet
Aquae destillatae quantum satis ut sit P. spec. = 0,01. Mixtis instilla inter continuam agitationem
Liquorem Ammonii caustici Aquae destillatae partibus octo dilutum quamdiu praecipitatum inde natum colore nigro apparet, evitando liquoris perf. neutralisationem. Sedimentum filtratione separatum Aqua dest. ablue et inter chartam bibulam leni calore loco umbroso sicca. (Bor4.)

LH. Protonitratis Mercurii uncias duas in Aquae destillatae libris duabus solvere et infundere sensim Potassam liquidam, donec nullum amplius oritur praecipitatum, quod lotum Aqua destillata siccetur.; — *T.* Nitratem Protoxydi Mercurii in Aqua dest solvere, liquidum a materia flava non dissoluta decanthare et infundere Ammonium caust., donec praecipitatum nigrum floccosum oriri cessaverit, filtro imponere, et Aqua comm. lavare, donec haec saporis expers evadat, oxydum deinde in loco umbroso vel vaporatorii ope siccare.

Nach Soubeiran iſt das, nach dem von den meiſten Pharmacopöen vorgeſchriebenen Verfahren erhaltene Hahnemann'ſche Queckſilber eine Miſchung von ſalpeterſäuerlichem Queckſilber mit einer verſchiedenen Quantität ſalpeterſauerem Ammoniumqueckſilberoxydul (protonitrate ammoniaco-mercuriel), welche von der ſtärkern oder geringern Säuerung des angewendeten Protonitrats abhängig iſt und wodurch das Product mehr oder weniger dunkelfarbig und auch mehr oder weniger in Salpeterſäure auflöslich wird, indem das ſalzſäuerliche Salz allein ſchwarz, das Doppelſalz im Gegentheil weiß iſt. Er ſchließt daher, daß man das Protonitrat in der möglichſt kleinſten Menge Säure auflöſen müſſe, indem man nämlich jedesmal auf das cryſtalliſirte ſalpeterſaure Salz von ſehr ſchwach geſäuertem Waſſer eine geringere Menge aufgießt, als zu ſeiner gänzlichen Auflöſung nöthig iſt und das Reiben fortſetzt, um die Flüſſigkeit vor dem Aufgießen gänzlich zu ſättigen. Dieſe Vorſichtsmaaßregeln ſind unter chemiſchem Geſichtspunct ſicherlich ſehr lobenswerth, aber in mediciniſcher Hinſicht gleichgültig. Den Arzt kümmert es wenig, ob das ſalpeterſäuerliche Queckſilber ſalpeterſaures Ammoniumqueckſilberoxydul enthält, um ſo mehr da die chemiſchen Eigenſchaften beider einander ſehr ähnlich ſind, und alle dieſe Präparate auf faſt gleiche Weiſe, d. h. nur in ſehr wenig verſchiedenen Graden, reizend und aufregend auf den Organismus wirken

Das Hahnemann'ſche Queckſilber wendet man zu einem Gran mit fünf bis zehen Gran Tragant- oder Süßholzſaftpulver an. — Gewöhnlich ſetzt man noch einen halben oder einen ganzen Gran Opium hinzu.

Nitras Hydrargyri ammoniato-nitricum. (*Gr.*)

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.
Aquae Ammoniae Carbonatis uncias sex.
Effervescentia finita adde
Mercurii . . . . uncias octo.

Dissolve, vapora et crystallisationi subjice.

Trochisci Hydrargri s. mercuriales (*Sw.*)

℞. Mercur. solub. Hahnem. unc. unam.
Olei ess. Aurantii guttas viginti.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Mucilag. Gummi Arab. . . q. s.
ut fiant trochisci decem granorum. — Gabe, ein Stück täglich zwei oder drei Mal.

Bolus ex Hydrargyro, Boli mercuriales. (*Sw.*)

℞. Mercurii soluh. Hahnem. gr. tria.
Extracti Liquiritiae . . . q. s.
Misce bene.

Pilulae mercuriales s. Hydrargyri s. ex Hydrargyro oxydulato nigro s. e Mercurio solubili Hahnemanni s. Hahnemanni. (RC. WW. *Ra. Sw. Sy. Va.*)

℞. Mercur. solub. Hahnem.
gr. quindecim.
Succi Liquiritiae pulv. semunciam.
Syrupi simplicis quantum sufficit ut fiant pilulae centum et quindecim. (WW)

LH. Oxydi drachmam unam, Extracti duas, fiat massa, in 72 pilulas dividenda; — RC. *Sw.* et *Sy.* Mercurii solubilis drachmam et Extracti Liquiritiae (vel Mellis RC.) q. s. ut fiant pilulae granorum quatuor (centum viginti RC.), Cinnamomo (pulvere Corticis Cassiae RC.) adspergendae.

℞. Mercur. solub. Hahnem.
gr. viginti.
Gummi Arabici,
Sacchari pulv..
sing. semidrachmam.
Fiant pilulae triginta. (*Ra. Va.* Hosp. St. Anton.)

Pilulae ex Hydrargyro diureticae s. mercuriales diureticae. (*Sw.*)

℞ Mercur. sol. Hahnem.
semidrachmam.
Conserv. Scillae
gr. viginti ad triginta.
Olei sulphurati . . guttas tres.
Adde triturando
Pulveris Scillae quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quatuor. — Bei sogenannten Schleimkrankheiten der Lunge, Wassersucht, hartnäckigem Catarrh, im Anfang der Phthisis. — Gabe, alle zwei Tage drei bis vier Stück, Abends bei'm Schlafengehen.

Mel mercuriale. (RC. *Sw.*)

℞. Mercur. sol. Hahnem. drachmam.
Mellis despum. unc. unam ad duas.
Tritura simul.

RC. Mercurii solubilis drachmas duas, Mellis unciam unam.

Syrupus ex Oxydulo Hydrargyri Hahnemanni s. Mercurio solubili Hahnemanni. (B*.)

℞. Mercurii sol. Hahnem. gr. viginti.
Gummi Arabici drachmam unam.
Mellis rosati . quantum sufficit.
Tere in mortario marmoreo ut intime misceantur et adde
Syrupi Althaeae . . uncias tres.
Gabe, einen Löffel Morgens und Abends.

Protonitras Mercurii, Nitras Protoxydi Mercurii, Calx Mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitras Hydrargyri.

§. I. Im festen Zustande.

An. D. Fer. His. Li. Wir. Wür. *Sw. T. Va. Vm.*

℞. Acidi nitrici 26° . quantum vis.
Infunde in vas, Aqua frigida vel Glacie circumdatum et immitte per plures vices
Mercurii sufficientem quantitatem donec crystalli in liquore appareant, quo per horas viginti quatuor seposito, crystalli collectae et ablutae siccentur. (An. D. Fer. His. Li.)

℞. Mercurii . . . . sesquiunciam.
Acidi nitrici . . unciam unam.
Mixta saepius per dies circiter quatuor agita, quo facto vaporatione spontanea quae prodierunt crystalli inter chartam premendo siccentur. (Wir.)

Wür. Digerere in phiala balneo arenae imposita Aquae fortis et Mercurii, sing. part. aeq. et liquorem tunc blando igne evaporare, donec massa alba et sicca remaneat.

℞. Mercurii . . . partem unam.
Acidi nitrici 28° . partes duas.
Majorem metalli partem caloris levis ope dissolve in acido; liquor tunc evaporatus seponatur ut in crystallos abeat. (Gal.)

Da man bei Befolgung dieses Verfahrens viel Deutonitrat erhalten würde, so hat Henry folgendes vorgeschlagen:

℞. Mercurii . . . partes ducentas.
Acidi nitrici (25°)
partes centum octoginta.
Stent in solutione, donec vapores nitrosi non amplius appareant; adde deinde
Aquae dest. calid. partes centum.
Post levem ebullitionem decantha liquorem, qui statim in crystallos est abiturus. (GalH.)

Ba. Phialam continentem Mercurii partes tres, Acidi nitrici et Aquae dest.,

sing. duas balneo arenae impositam, igne gradatim aucto calefacere, donec vapores aquosi non ultra evolvantur et liquorem deinde crystallisationi subjicere; — *T.* Mercurii libram, Acidi nitrici uncias sex et Aquae dest. vel pluvialis libras duas in retorta, subinde agitando, moderato calori exponere.

Vm. Mercurium in Acido nitrico Aquae bull. pondere triplo diluto coquere, providendo ut aliquid metalli non dissolutum remaneat, decanthare deinde et crystallisationi subjicere.

§. II. Im flüſſigen Zuſtande.

Liquor Hydrargyri nitrici s. Hydrargyri nitrici oxydulati, Nitras Hydrargyri s. Deutoxydi Hydrargyri liquidus s. Mercurii s. Oxyduli Hydrargyri liquidus, Liquor Nitratis Hydrargyri s. hydrargyrosi s. Bellostii, Protonitras Hydrargyri s. Mercurii liquidus s. solutus, Liquor Mercurii nitrosi frigore paratus, Aqua mercurialis s. mercurialis salina s. ad gangraenam, Mercurius nitrosus alior. (Ams. An. B°. Bor. Bor4. Br. D. Gal. GalM. Han. HassP. LH. O. Pal. Pm. RC. *Br. Fi. Gr. Pie. Ra. Sp. T.*)

℞. Mercurii . partes centum viginti.
Acidi nitrici 33°
partes centum quinquaginta.
Dissolve blando calore et solutioni infunde
Aquae destillatae partes nongentas.
Post aliquot dies cola et serva. (Gal. GalM.)

Han. duplicem agendi modum indicat: 1) Mercurii, Acidi nitrici, Aquae dest., sing. unciam unam in phialam introducere Aquae frigidae immergendam et illic relinquere, donec bullae non amplius exoriantur, solutionem hoc modo obtentam in lagena bene obturata super Mercurii metallici pauxillo servare et addere Acidi nitrici guttas aliquot, si pulveris flavescentis aliquantulum separari coeperit; 2) recipere Mercurii unciam unam et duas Acidi nitrici vel q. s. ad dissolvendum blandi caloris ope metallum; — RC. Mercurii q. vis, Acidi q. s.

An. et Br. Mercurii uncias duas dissolvere in Acidi sex et salis unciam unam liquefacere in Aqua dest. libris tribus; — *Sp.* Metallum dissolvere in Acidi nitrici pondere aequali et drachmam unam salis obtenti in Aquae unciis duabus; — O. dissolvere Metalli unciam in Acidi nitrici q. s. et addere Aquae q. s. ad obtinendas liquidi uncias quatuor; — Bor. et Pol. eodem modo procedere sed Aquae satis addere ad obtinendas uncias quinque; — Ams. calide in Acido dissolvere Mercurii quantum solvi potest et liquori addere Aquae calidae partes duodecim; — Pm. Hydrargyri puri, Acidi nitrici 36°, sing. unciam unam, solutioni adde Aquae destillatae libras duas cum dimidia; — LH. Mercurii uncias duas, Acidi 32° quatuor in Aquae destillatae sedecim solutas, dissolve blando calore, filtra etc.; — *Gr.* Mercurii unciam unam in Acido nitrico Aquae pondere quintuplo diluto dissolve, crystallos inter chartam bib. siccatas in Aqua redissolve et globulum mercurii in fundo lagenae relinque (Teſtmittel); — Bor4. Mercurii uncias quatuor, Acidi nitrici duas, Aquae dest. drachmis tribus dilutas, vas loco frigido et si necesse est, in aliud, Aqua frigida repletum positum separatur quamdiu crystalli enascuntur, quarum a liquore et Mercurio separatarum et inter chartam bibulam albam premendo absque calore siccatarum partibus octo inter terendum adde Acidi nitrici partem unam et tum Aquae dest. fervidae q. s. ut p. spec. solutionis sit = 1,100—1,110, quae filtrata super mercurio depurato servetur; — HassP. Mercurii, Acidi et Aquae dest., sing. unciam unam (si hujus liquoris pars una cum duabus Aquae destillatae miscetur, habes *Liquorem Mercurii nitrosi dilutum, frigore paratum:* ut reagens. HassP.); — B°. Li et *Pie.* dissolvere blandi caloris ope Mercurii drachmam in Acidi duabus et addere deinde Aquae fontanae uncias duodecim; — D. Dissolvere Salis crystall. drachmas duas in Aquae dest. uncia; — *Fi. T.* Salis unciam unam, Aquae dest. libras tres.

LH. ſetzt dieſen Liquor als *Aqua antivenerea et antipsorica* unter die Magiſtralformeln.

Dieſes Präparat war einige Zeit lang unter dem Namen *Remedium Ducis d'Antin* und *Remedium capucinorum*, zu zwei oder drei Tropfen in einem Glaſe lauwarmen Waſſers oder eines Bruſt- oder ſchweißtreibenden Tranks gegeben, berühmt, heutzutage iſt es faſt ungebräuchlich, man wendet es nur noch ſelten bei chroniſchen veneriſchen Geſchwüren an. Nach Bor4. 5 Tropfen. Das trockne Salz iſt in letztern Zeiten als ein ſehr wirkſames cathaereticum gegen dieſelben Uebel empfohlen worden.

Liquor mercurialis. (*Pie.*)

℞. Mercurii,

Acidi nitrici, sing. unciam unam.
Dissolve et adde
Aquae Plantaginis . libras duas.
— Rosarum,
Laccae, sing. . quantum sufficit.
In Waschungen und Bähungen bei alten und atonischen Geschwüren, Pusteln, Schwämmchen und Flechten, welche man von venerischem Gift abhängig glaubt.

Lotio mercurialis s. mercurialis Manry. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Mercurii . . . drachmas duas.
Acidi nitrici . . uncias quatuor.
Dissolve et adde
Aquae purae . . libras decem.
In Waschungen bei Krätze. — Gabe, eine halbe Unze Morgens und Abends. — Ein bequemes, wohlfeiles und die Wäsche nicht beschmutzendes Präparat. Man hat es auch bei prurigo formicans und gegen phthiriasis nützlich befunden. Man kann auf das Litre zwei Drachmen Kampher zusetzen, wodurch es weniger reizend wird.

Aqua grisea s. grysea Gohlii s. ad synoviam. (B*. Br. Hass. Pal. Sar. Wir. *Ca. Pid. Sp. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici, sing. unciam unam.
Dissolve blando calore metallum in acido et adde liquori decoctum praeparatum cum Aquae libris quinque ad quatuor redactis, in quibus coquatur
Radicis Chelidonii majoris,
— Aristolochiae rotundae,
Herbae Rutae,
— Scordii,
Petalor. Rosar. rubr., sing. uncia una.
Misce bene. (B*. Br. Pal. Sar. Wir.)
Sp. Dissolutioni Mercurii unciae unius in Acidi nitrici aequali quantitate addere Decoctum e Radicis Chelidonii semuncia, Aristolochiae rotundae, Solani nigri, Rutae et Rosarum pallentium, sing. uncia una cum Aquae libris decem ad octo redactis paratum.
℞. Mercurii . . . . unciam unam.
Acidi nitrici . . . uncias duas.
Dissolve leni calore et cuilibet liquidi semunciae adde Succum expressum vel Decoctum maxime saturatum e
Rad. Chelidonii majoris,
— Aristoloch. rotund., sing. libra una.
Misce sedulo. (Hass. *Ca. Pid.*)
℞. Protonitratis Mercurii liquidi concentrati . . . partem unam.
Succi Chelidonii majoris depurati partes duodecim.
Misce. (*Vm.*)
Dieses Wasser hat Aehnlichkeit mit den vorigen, ist aber schwächer. — Man wandte es ehedem sehr häufig in Waschungen bei venerischen Geschwüren an.

Syrupus Belleti mercurialis. (B*. GalH. *Au. Ca. Va.*)

℞. Protonitrat. Mercurii part. triginta.
Aquae leviter acidulat. part. ducentas.
Dissolve et liquori adde
Syrupi communis partes ter mille quibus magis concentratis adde deinde
Aetheris nitr. alcoh. partes decem.
Serva. (GalH.)
Va. Protonitrat. drachm. tres, Aq. levit. acid. decem, Syr. Sacch. libr. duas c. dimid., Aeth. nitr. drachmam: (etwas über 4½ Gr. Nitrat auf die Unze); — *Ca.* dissolvere, secundum *Bouillon-Lagrange*, Nitratis Mercurii sesquidrachmam in Aquae quam minima quantitate et liquorem miscere cum Syrupi comm. frigidi libra una et Aetheris nitr. rectif. semidrachma, in lagena, qua servatur, agitando; — B*. secundum *Virey* Acetatis Mercurii drachmam in Aquae dest. pauxillo solvere, addere Aetheris nitrici drachmas duas et tunc Syrupi Gummi, e Gummi uncia una et Syrupi comm. libra una parati libram unam; — *Au.* miscere Nitratis liquidi sesquidrachmam, Liquoris Hoffmanni semidrachmam et Syrupi Sacchari uncias sedecim.
Dieser Syrup ist von dem Belle t'schen sehr verschieden, welcher nur aus einem zukerhaltigen Salpeteräther ohne ein Atom Quecksilber bestand. Uebrigens zersetzt er sich leicht wie alle ätherischen Quecksilberpräparate, und ist daher unsicher. Eine auf der Stelle bereitete Mischung von einigen Tropfen Quecksilbersalpeterflüssigkeit in drei oder vier Unzen mit Aethersyrup versüßtem Wasser ersetzt ihn sehr gut.

Potio mercurialis. (*Va.* Hosp. Ital.)

℞. Syrupi Belleti,
Aquae destill., sing. semunciam.
Misce. — Des Morgens zu nehmen bei scrophulösen Uebeln.

Pilulae ex Hydrargyro nitrico s. Zelleri. (*Au. Sm.*)

℞. Protonitratis Mercurii gr. decem.
Succi Liquiritiae gr. quadraginta.
Misce ut fiant pilulae sexaginta. (*Sm.*)
Au. Nitratis crystallisati grana decem et Micae Panis grana centum nonaginta ut fiant pilulae granorum duorum.
Gegen Syphilis. — Gabe, ein bis zwei Stück in vier und zwanzig Stunden und allmälig bis auf sechs täglich gestiegen.

Potus mercurialis Belleti. (*B.*)

℞. Syrupi Belleti,
Aquae destillat., sing. semunciam
Morgens zu nehmen, bei Rhachitis und Scropheln.

Unguentum ad scabiem s. citrinum s. Hydrargyri citrinum s. Hydrargyri compositum s. Hydrargyri nitrati s. Nitratis Hydrargyri s. Nitratis hydrargyrici s. mercuriale citrinum s mercuriale citrinum Baumé s. Supernitratis Hydrargyri, Adeps Nitrate Hydrargyri medicatus, Balsamum mercuriale. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. O. Pol. Suec. *Br. C. Ca. Fi. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Mercurii,
Acidi nitrici, sing unciam unam.
Dissolve metallum in acido caloris balnei arenae ope; liquori adde
Olei Olivarum .. uncias quatuor.
Axungiae Porci . . uncias octo.
ut fiat unguentum. (*Sa. Sy.*)

Du. *Gr. Re.* et *Sw.* Mercurii unciam unam, Acidi duas, Olei libram et Axungiae uncias quatuor; — Am. Ed. RC. *C. Gr. Re.* Metalli partem unam, Acidi duas, Olei (Olivarum vel Napi RC.) novem et tres Axungiae (*Ung. Nitrat. Hydrarg. fortius*) — *Unguentum Nitratis Hydrargyri mitius* harum quinque (excepta RC.) pharmacopoearum triplum Olei et Axungiae continet; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Metalli unciam, Acidi fluidrachmas undecim, Olei fluiduncias quatuor et Axungiae uncias sex; — *Gr.* Mercurii unciam unam, Acidi nitrosi duas, solutis adhuc calidis adde Adipis suill. liquatae libram; vel: Adipis uncias sex, Ol. Oliv. quatuor, caet. ut antea; – 1 Dr. Pech oder Aq. Sacch. Sat auf 1 Unze des Ung. mitius dient gegen Hämorrh., prurigo pudendi et recti etc.

℞. Mercurii partes sexaginta quatuor.
Acidi nitr. (32°)
part. nonaginta sex.
Solutioni refrigeratae adde
Axungiae liquatae . partes mille per vices et sub continua trituratione infusas. (Gal.)

His. His3. Mercurii et Acidi, sing. partem unam et decem Axungiae; — A. Ams. Bor. Bor4. D. Fenn Ful. Ham. Han. Hass. HassP. Li. LP. O. Suec. *Br.* et *Pid.* Metalli unam, duas Acidi (vel q. requiritur Bor4.) et duodecim Axungiae; — An. et *Sp.* Metalli tres, Acidi quatuor, et Axungiae triginta duas; — *Vm.* Metalli partem unam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae partes quindecim; — Gen. Mercurii uncias duas, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libras duas; — Fer. *T.* Metalli unciam unam, Acidi q. s. ad dissolvendum et Axungiae libram; — *Fi.* Axungiae uncias octo, caeterum ut Fer.

℞. Protonitrat. Merc. liq.
part. unam.
Calefac et adde pedetentim
Axungiae Porci liq. partes quatuor.
Tere ad refrigerationem usque. (Pol.)
B. et Bel. Liquoris mercurialis partes tres et sedecim Axungiae.

Frisch besteht diese Salbe aus oxygenirter Salbe, aus salpetersaurem Queckſilberoxydul und aus sehr zertheiltem Queckſilber; es scheint aber, daß in dem Maaße, wie ſie älter wird, das salpetersaure Oxydul ganz zerſtört wird und ſich in essigsaures Queckſilber verwandelt.

Reizend, auflöſend, austrocknend, ſchweißtreibend, gegen Syphilis, psora; ſie wird bei Hautkrankheiten häufig angewendet. Im Allgemeinen sorgt man, ſie durch Zuſatz einer der bereits in ihr enthaltenen gleichen Menge Fett zu verdünnen

Linimentum Hydrargyri Nitratis. (*Re.*)

℞. Unguentum Nitratis Hydrargyri,
Olei Olivarum, sing.
drachmas duas.
Petrolei . . . . guttas viginti.
Misce. — Bei psorophthalmia u. ſ. w.; vortrefflich bei ſchmerzloſer Augenentzündung.

Marshall's cerate (*Gr. Re.*): Olei Palmae uncias (drachmas) quinque, Calomellis unciam unam, Nitratis Hydrargyri duas, Sacchari Saturni semunciam. — Ein gutes Reizmittel bei ſchmerzloſen Geſchüren.

Ointment (digestive) for horses (*Gr. Re.*) Ung. Resinae flav. uncias quatuor, Terebinth., Oxydi Merc. nitr., sing. unam, misce; vel: Ung. Merc. Nitrat. unc. quatuor, Ol Terebinth. unam.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum s. Duboisi. (*Ra. Va.* Mais. de Santé.)

℞. Protonitratis Mercurii drach. duas.
Ung. Cucumerum . semunciam.
Misce sedulo. — Bei leichten Flechten in Einreibungen auf die kranken Theile.

Unguentum s. Pomatum saturno-mercuriale. (*Au. Vm.*)

℞. Mercurii . . . partes quatuor.
Plumbi . . . partem dimidiam.
Soluta seorsim metalla quodque in

Acidi nitrici 34° . . . . q. s. misce cum
Ol. Amygd. dulc.
part. viginti quatuor.
Axung. Porci
part. quadraginta octo
primo solutionem mercurialem deinde plumbicam; tere bene et refrigerationis momento in modulos chartaceos infunde. (*Vm.*)

℞. Unguenti citrini drachmas duas.
— saturnini . drachmas sex.
Misce triturando. (*Au.*)
Von Armſtrong bei tinea favosa.

Cereoli mercuriales. (*Sw*.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias sex.
Olei Olivarum . unciam unam.
Liquatis adde
Protonitr. Merc. liq.
drachmas duas.
Misce sedulo ut fiant cereoli.

Pomatum s. Unguentum ad tineam. (*E.*)

℞. Ung. citrini . . . semunciam.
— Picis liquidae unciam unam.
Misce triturando.

Deutonitras Mercurii, Nitras Deutoxydi Mercurii. (B Bel. *T. Vm.*)

1) Im feſten Zuſtande.

℞. Oxydi rubri Mercurii quantum vis.
Acidi nitrici . quantum sufficit ad solvendum blandi caloris ope oxydum; liquidum deinde decantha et forti vaporationi subjice ut oriantur crystalli. (*Vm.*)

T. Mercurium rubrum cum Acidi nitrici diluti q. ad perf. solutionem s., coquere et addere per vices Acidum nitricum 36° B., donec solutio salis marini vel Acidum hydrochloricum non amplius ab illo turbetur; vel: conjungere statim Acidum nitricum dilutum cum Oxydo rubro.

2) Im flüſſigen Zuſtande.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydati, Mercurius nitrosus, Liquor Nitratis hydrargyrici.

℞. Oxydi rubri Mercurii partes tres.
Acidi nitrici puri, dimidio Aquae diluti . . . . . partes sex.
Solve leni calore, oxydum sensim acido addendo et liquorem serva. (Bel.)

B. Oxydi partes tres et quatuor Acidi, producto addere Aquae purae partes duodecim (*Aqua mercurialis*); — Bor4. Oxydi rubri unciam unam, Acidi nitrici q. s., Aquae dest. tantum ut pondus totius sit unciarum octo. P. sp. = 1,175—1,185; — *Vm.* conterere Oxydi rubri et Aquae, sing. partes tres, miscellam leviter calefacere, addere Acidi nitrici q. s. ad dissolutionem et liquidum post horas viginti quatuor decanthare.

Die Aqua mercurialis dieſer letztern Pharmacopöen unterſcheidet ſich demnach von der der vorhergehenden in Betreff der chemiſchen Zuſammenſetzung, aber die Einwirkung auf die lebenden Gewebe iſt ganz oder faſt dieſelbe.

Protonitras Ammoniaci et Mercurii. (*Sw. Sy.*)

℞. Acidi nitr. Aqua dil. libram unam.
Infunde ei sensim
Ammonii subcarb. liq. unc. septem.
Effervescentia cessatâ adde
Mercurii . . . . uncias octo.
Metallo balnei vaporis ope dissoluto liquor ad crystallisationis punctum usque evaporet.

Guttulae albae Wardii, Solutio Nitratis Hydrargyri ammoniacalis. (B*. *Gr. Re. Sw. Sy.*)

℞. Protonitratis Mercurii et Ammoniaci . . . . unciam unam.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Dissolve
Gr. Re. Mercurii uncias duodecim Spiritus Nitri libras duas, dissolve, adde Ammoniae praeparatae uncias quatuordecim, evapora et sal inde enatum in Aquae Rosarum libris tribus cum dimidia solvatur; vel: Mercurii uncias quatuor, Spiritus Nitri libram, Ammoniae pp. uncias septem, salis vaporatione obtenti libra in Aquae Rosarum octariis tribus cum dimidio solvatur.

Ein in England berühmtes Präparat. — Gabe, zwei oder drei Tropfen in einer Gerſten-, Grütze- oder Saſſaparillabkochung.

Emplastrum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae s. mercuriale. (RC.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Oxynitr. Hydr. et Ammon.
drach. duas ad tres.

Unguentum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae. (RC.)

℞. Oxynitratis Hydrarg. et Amm.
part. unam.
Adipis suillae . partes duodecim.

Unguentum Nitratis Mercurii et Ammoniae s. Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae compositum. (B*. RC.)

℞. Nitratis Mercurii et Ammoniae, Oxydi Zinci, sing. partem unam.
Axungiae Porci . partes quatuor.
Misce triturando.

Iodas s. Protoiodis s. Protoiodas Hydrargyri s. Mercurii. (B*. *Gr. Vm.*)

℞. Protonitratis Mercurii quantum vis.
Iodatis Potassae quantum sufficit.
Nitrato adde iodatum pro partiunculis sed celeriter; praecipitatum lotum sicca.

Deutoiodas Mercurii. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi . partes 12,7.
Iodatis Potassae . . partes 15,6.
Dissolutis seorsim, solutiones calefactas in lagena commisce et agita; decantha et praecipitatum lotum sicca.

Hydrochloras Mercurii et Ammoniae.

§. I. Im festen Zustand, aber im Wasser auflöslich und crystallisirbar.

Sal Alembroth s. sapientiae s. vitae s. scientiae. (An. Bel. Gal. *Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. part. aeq.
Sublima. (Gal.)

Nach Soubeiran erhält man auf diese Weise bloß eine sehr veränderliche Mischung von Sublimat und Salmiak. Er empfiehlt daher, mit Ferrarini, Gray, Tadei (*Fi. Gr. Re. T.*), gleiche Theile von beiden in Wasser aufzulösen, die Flüssigkeit abzudampfen und sie crystallisiren zu lassen, jedoch nicht zu vergessen, daß die Verbindung nicht sogleich stattfindet, und daß die anfangs sich bildenden Crystalle eine Mischung von sal Alembroth und einer größern oder geringern Menge Salmiak sind. Nach ihm besteht das sal Alembroth aus einem Atom hydrochlorsaurem Quecksilber und vier Atomen hydrochlorsaurem Ammoniak.

℞. Praecipitati albi . quantum vis.
Acidi hydrochlorici . . . q. s.
ad solvendum blandi caloris ope; vaporata leni igne ad locum frigidum sepone ut in crystallos abeant, quae cum Aquae frigidae pauxillo abluantur. (Am. Bel. *Vm.*)

Das letztere Präparat führt den Namen *Murias hydrargyro-ammoniacale acerrimum* und *Hydrargyrus muriatus ammoniacalis fortior.*

§. II. Im festen, aber im Wasser unauflöslichen Zustande.

Calx Hydrargyri alba, Hydrargyrus praecipitatus albus, Hydrargyrum praecipitatum album s. ammoniato-muriaticum s. bichloratum cum Oxydo et Ammonio muriatico s. oxydatum muriaticum ammoniatum s. muriaticum praecipitatum, Hydrochloretum Ammonii cum Oxydo hydrargyrico, Mercurius cosmeticus s. praecipitatus albus, Murias Mercurii s. Oxydi Hydrargyri ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyro-ammoniacale s. hydrargyro-ammoniacalis insolubilis s. Ammoniacae superhydrargyricus, Praecipitatus albus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus s. Hydrargyri ammoniatus s. ammoniatum s. praecipitatus, Lac mercuriale; weißer Präcipitat (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

1) ℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing. uncias octo.
Dissolve in
Aquae dest. bull. . libris octo.
Filtra liquorem et ei pedetentim infunde Natrum subcarb. liquidum (Natr. carb. crudum in Aq. dest. q. s. solutum), donec praecipitatum non amplius oriatur, quod Aqua frigidâ lotum in loco umbroso siccetur. (Bel. Bor. Bor4 Han. HassP. O. Pol. *Sw.*)

Reliquae pharmacopoeae, a quibus hic agendi modus indicatur, Kali subcarbonicum praescribunt; sed An. B. Fer. LP. Lus. Sax. Suec. *Fi.* et *T.* Sublimati et Salis Ammoniaci part. aeq.; — Ba. Salis unam et duas Sublimati; — Am. Lon. LonN. et *C.* Sublimati semilibram et Salis uncias quatuor (Liquoris Potassae Subcarbonatis semioctarium, Aquae dest. octarios quatuor Lon. LonN. *Gr. Re*); — *Vm.* Sublimati partem unam et Salis unam cum dimidia; — *Gr.* Sublimati et Salis, sing. uncias sex, Aquae congium dimidium, Liquoris Potassae Subcarbonatis semioctarium.

2) ℞. Sublimati corrosivi quantum vis.
Aquae calidae quantum sufficit ad dissolutionem; liquori infunde Ammoniacum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum siccetur. (*Sw. Vm.*)

3) ℞. Mercurii,
Acidi nitrici, sing. uncias octo.
Soluto metallo, adde
Aquae destillatae libras quatuor.
Liquori deinde infunde solutionem filtratam e
Salis Ammoniaci unciis duabus,
Kali subcarbonici . uncia una
in Aquae destillatae libris quatuor, donec nihil amplius praecipitetur; pulverem in filtro receptum bene ablue et sicca. (Hass.)

Ful. dissolvere Mercurii uncias sex in Acidi nitrici duodecim, liquori addere Aquae dest. uncias septuaginta duas, mixturae infundere dissolutionem Salis Ammoniaci unciarum duodecim in Aquae dest. unciis viginti quatuor et instillare deinde Kali subcarb. liq., donec non amplius oriatur praecipitatum.

℞. Nitratis Mercurii . uncias octo.
Dissolve in
Aquae destillatae . . . . q. s.
et filtra. Solutioni adde
Salis Ammon. in Aqua soluti uncias quatuor.
Liquori deinde sensim instilla
Solutionis Natri subcarb. aquos. q. s. vel tantum, donec non amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccetur. (D.)

℞. Liquoris e Mercurio dulci secundum methodum Scheelii praeparato decanthati quantum vis.
Infunde Ammonium liquidum, donec praecipitatum oriri cessaverit, quod Aqua frigida ablue. (Ams. Du. *C. Gr.*)

T. Loco sublimati corrosivi Sulphas Mercurii adhiberi potest, ad cujus solutionem Aqua, in qua Salis Ammoniaci pondus aequale solutum est, sumitur. (!)

Soubeiran ſieht den weißen Präcipitat als eine Miſchung von einem Atom Queckſilberdeutochlorür und drei Atomen Ammoniumqueckſilberoxydul (mercuriate d'ammon aque), das heißt, als eine Zuſammenſetzung an, in welcher das Queckſilberoxyd die Rolle einer Säure ſpielt. Gaibourt hatte es ſchon als eine Miſchung von Queckſilberdeutochlorür und von Ammonium mit dem Deutoxyd des Queckſilbers (ammoniure de deutoxide de mercure) angeſprochen.

§. III. Im flüſſigen Zuſtande.

Aqua mercurialis composita s. phagedaenica s. antivenerea, Liquor Muriatis hydrargyro-ammoniacalis s. Hydrargyri ammoniati, Mixtura s. Solutio mercurialis, Solutio Deutochlorureti Mercurii, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus, Liquor Mercurii s. ammoniaco-mercurialis. (A. B. Bor. Bor4. Gal. Han. LH. Lus. O. Pol. Suec. RC. *Au. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Aquae destillatae libras quatuor.
Dissolve et filtra. (A.)

Vm. Sublimati grana viginti sex, Salis decem et Aquae libras quatuor; — B. Sublimati, Salis, sing. drachmam et duas libras Aquae; — Lus. Sublimati scrupulum unum, Salis semiscrupulum et Aquae libram; — *Sw.* Sublimati, Salis, sing. drachmam et Aquae libras quatuor; — *Sy.* Sublimati grana sexaginta quatuor, Salis Ammoniaci drachmam et Aquae uncias quatuor; — *Au.* Sublimati grana sex, Salis duodecim et Aquae libram; — LH. Sublimati grana duodecim, Salis sex, Aquae destillatae libram unam; — RC. Sublimati grana octodecim, Salis Ammoniaci drachmam, Aquae dest. libram. (*Aqua phagedaenica s. Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati et Ammoniae fortior* RC. — Aquae vel Alcoholis diluti quantitate triplici sumta habes *Solutionem dilutiorem.*)

Solutio Muriatis Hydrargyri oxydati corrodens RC.: Sublimati drachmam unam, Salis Ammoniaci duas, Alcoholis diluti unciam.

℞. Sublimati corrosivi grana sedecim.
Aquae purae . uncias quatuor.
Dissolve et praecipita
Ammoniaci liquidi . . . q. s.
Redissolve praecipitatum
Acidi hydrochlorici . . . q. s.
ope et serva. (*Vm.*)

℞. Salis Alembroth cryst. gr. decem.
Aquae destillatae . uncias decem.
Dissolve et adde
Syrupi communis . uncias duas.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Sublimati . grana viginti quatuor.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Dissolve, filtra et liquori instilla
Ammonii liquidi quantum sufficit ad decompositionem completam. Adde
Acidi hydrochlorici quantum satis ad redissolvendum praecipitatum et tunc
Aquae . . . uncias octodecim.
Mellis rosati . . unciam unam.
Post horam unam cola. (*Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, singulorum grana viginti quatuor.
Aquae destillatae . libras duas.
Solutioni adde
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)
Bor4. Mel rosatum omittit.

Fenn. et Suec. Sublimati, Salis Ammon., sing. grana sex, Aquae calidae unciam, Aquae dest. novem ad diluendam solutionem et Syrupi communis duas.

Hierher gehört auch der *Liquor van Swietenii* von RC.: Sublimati grana sex, Salis Ammoniaci duodecim, Aquae dest. vel Alcoholis diluti libra.

Ehedem gab man den weißen Präcipitat

innerlich von einem bis zu drei Gran; heutzutage wendet man ihn bloß äußerlich an. Das Sal Alembroth, sowohl fest, als besonders flüssig, wird sehr allgemein gebraucht. Doch sollten sich die Practiker desselben, wegen der veränderlichen Zusammensetzung, nicht bedienen. Man hat zwar im Allgemeinen, wenn man den Salmiak mit dem Sublimat verbindet, keinen andern Zweck, als die Auflöslichkeit des letztern zu begünstigen; allein obgleich die gegenseitige Einwirkung beider Salze auf einander nicht auf der Stelle so vollständig einzutreten scheint, daß sich nicht wenigstens noch ein Theil Salmiak verflüchtigen könnte, so ist doch soviel sicher, daß sie nach einiger Zeit Statt hat, und daß dann der mit dieser Eigenthümlichkeit unbekannte Arzt etwas Anderes verschreibt, als was er zu geben die Absicht hatte. Dieß ist ohne Zweifel eine der Ursachen, warum die Urtheile über den Sublimat so verschieden ausgefallen sind. Soubeiran empfiehlt mit Recht, die Mischung aus beiden Salzen nicht zu lange in den Apotheken vorräthig zu halten, weil, man möge dieß auch für noch so vortheilhaft ausgeben, nothwendig nach einiger Zeit, wegen der Schwere, immer unzersetzter Sublimat sich findet, und zwar im Verhältniß immer stärker im Grunde, als an der Oberfläche der Flasche. Er ist daher der Meinung, daß man die Mischung erst in dem Augenblick, wo sie aufgelöst werden soll, vornehmen müsse, und giebt gleichen Verhältnißtheilen jedes Ingrediens den Vorzug, weil ein schwacher Ueberschuß von Salmiak nicht schaden könne.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex Hydrargyro muriatico s. Sublimato corrosivo. (DD. WW.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.
Aquae destillatae . uncias duas.
Dissolve in mortario vitreo et adde
Gummi Arab pulv. drachmas duas.
Aeußerlich angewendet.

Gargarisma antivenereum. (LH.)

℞. Radicis Althaeae . unciam unam.
Coque in Aquae sufficiente quantitate ut remaneat . sesquilibra.
Cola et dissolve
Sublimati corrosivi . grana duo.
Salis Ammoniaci . grana quatuor.
Mellis despumati unciam unam.

Injectio adstringens. (E.)

℞. Sublimati corrosivi . grana tria.
Salis Ammoniaci gr. unum vel duo.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Bei chronischer Gonorrhöe empfohlen.

Solutio Weikardi. (Br*. Ca.)

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. gr. quatuor.
Aquae destillatae . uncias duas.
Laudani liq. Sydenh.
gutt. triginta sex.
Olei ess. Cinnamomi gutt. unam.
Bei der Behandlung venerischer Krankheiten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen, Morgens und Abends, in Milch oder Gummiwasser.

Looch antisyphiliticum, Linctus antisyphiliticus. (Sw*.)

℞. Hydrochloratis Mercurii et Ammoniae . . . . semidrachmam.
Opii . . . . grana quatuor.
Sacchari . . scrupulos quatuor.
Trituratis simul adde
Mellis albi . . uncias quatuor.
Gabe, zwei Drachmen, zwei- oder dreimal täglich.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (Sp.)

℞. Cerussae . . . . unciam unam.
Lithargyri . . . . semunciam.
Aceti . . . . . uncias sex.
Coque ad oxydorum usque solutionem et liquori adde
Aluminis . . . . drachmas sex.
Sublimati corrosivi,
Salis Ammoniaci, sing. drachmam.
Aquae fontanae uncias duodecim.
— Rosarum . uncias quatuor.
Serva absque colando. — In einer Menge Hautkrankheiten empfohlen. — Verwerflich.

Syrupus antisyphiliticus s. depurativus Larreyi. (Br. Ca.)

℞. Rad Sassaparillae concis.
libras duas.
Aquae . . . . . libras decem.
Macerata per horas duodecim coque per duas et cola; residuum coquatur bis cum Aquae aequali quantitate et qualibet vice coletur; colaturas tres conjunctas sepone; praeterea recipe
Petal. sicc. Rosar. rubr.
semunciam.
Fol. Sennae mund. . uncias duas.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Succi Boraginis calide depurati
semilibram.
Infunde in balneo aquae, vase tecto, per horas 12, cola deinde cum expressione et sepone; interea decoctum sassaparillae ad libras sex evaporet, cui deinde addentur praeter infusum antea dictum

Sacchari albi,
Mellis albi, sing. . librae quatuor.
Syrupum Albuminibus Ovorum clarificatum bullientem cola per manicam et coquendo probe inspissatum refrigerare fac. Tunc recipe
Hujus Syrupi . libras duas c. dim.
Salis Ammoniaci,
Sublimati corrosivi,
Extracti Opii, sing. grana decem.
Liquoris Hoffmanni . . . q. s.
Dissolve opium in Aquae parva quantitate et syrupo adde solutionem; tritura sales cum Aetheris q. s. ad dissolvendum; adde sensim, continuè triturando, omnem syrupum et serva in lagenis bene obturatis.

Reizend, alterirend, gegen Syphilis und Flechten. — Gabe, eine Unze Morgens nüchtern, in einer Tasse Sassaparillabkochung.

Liquor muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis. (*Vm.*)

℞. Hydrochlorat. Mercur. et Ammon.,
— Cupri et Ammoniae,
singulorum sesquidrachmam.
Dissolutis seorsim in
Aquae . . . . . unciis tribus, solutiones admisce et filtra.

Aqua phagedaenica alba. (*Vm.*)

℞. Salis Alembroth cryst. scrup. duos.
Aquae Calcis uncias viginti octo.

Aqua phagedaenica alba composita. (*Vm.*)

℞. Aquae phagedaenicae albae
partes viginti quatuor.
Mellis rosati . . partem unam.
Misce bene.

Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. mercuriale album Werlhofii s. Hydrargyri album s. ad herpetes s. Hydrargyri praecipitati albi s. Submuriatis Hydrargyri ammoniati s. Calcis Hydrargyri albae s. Hydrargyri albi s. mundificans Zelleri s. Muriatis Hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (Am. Ams. B. Bor. BorC. Bor4. Br Du. Fer Ful. Ham. Hass. HassP. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Pol. Sax. Wir. *Br. C. Ca. Gr. Huf. Pid. Re. Sw. Sy. Vm.*)

℞ Sublimati corrosivi
drachmam dimidiam
Salis Ammoniaci scrupulum unum
Misce cum Aquae parva quantitate, adde
Axungiae Porci . unciam unam.
Tritura denuo per horae quadrantem et para unguentum. (LP.)

℞. Praecipitati albi . partem unam.
Axung. praep.
part. octo ad sedecim.
Misce triturando. (*Sw. Sy.*)

Vm. Praecipitati partem unam et quatuor Axungiae; — B. et *Huf.* Axungiae octo; — Bor4. Adipis novem; — Am. Ams. Lon. LonN. *C. Gr.* Axungiae duodecim; — *Re.* Praecipitati unciam unam, Ol. Oliv. drachmas duas, Axung. praep. unc. tres.

℞. Praecipitati albi . partem unam.
Cerati albi . . . . partes octo.
Contere. (Pol.)

Du. *Gr. Re.* Praecipitati partem unam cum dimidia et Cerati duodecim. (duas? *Re.*)

℞. Praecipitati albi . partem unam.
Unguenti rosati (s. pomadini HassP.)
partes octo.
Misce terendo. (Fer. Ful. Hass. HassP. His. His3. Sax. *Ca. Pid.*)

Br. Praecipitati partem unam et duodecim Adipis; — Pal. Wir. et *Sp.* Axungiae septem.

℞. Praecipitati albi . . partes tres.
Ung. rosati part. viginti quatuor.
Olei Lavandulae . partem unam.
Tritura simul (Lus.)

LH. Praecipitati albi drachmam unam, Olei Lavandulae scrupulum unum, Axungiae Porci unciam unam, Aquae Rosarum drachmam unam; — Bor. BorC. Br. et Han. Praecipitati partes sedecim, Axungiae centum viginti octo et Olei Citri unam

Reizend, als Schönheitsmittel betrachtet und gegen fast alle Hautkrankheiten gepriesen. — Man verschreibt diese Salbe mit einem Achtelgran Sublimat, zu einer halben und ganzen Drachme auf jede Einreibung.

Pomatum s. Unguentum e Mercurio praecipitato s. antiherpeticum. (*E. Gr. Ra.*)

℞. Praecipitati albi sesquidrachmam.
Camphorae . scrupulum unum.
Axungiae lotae . . uncias duas.
Misce triturando. (*Ra.*) — Besonders bei pustulösen Flechten, wenn die Entzündung gemindert ist.

℞. Unguenti simplicis . sesquiunciam.
Sulphuris praecip. drachmas duas.
Mercur. praecip. alb.
scrupulos duos.
Aquae Kali praep. . . . . q. s. ut fiat ung. (*Gr.*)

℞. Praecipitati albi grana quindecim.
Nitri . . . . . semidrachmam.
Flor. Sulphuris . drachmam unam.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce triturando. (*E.*)

Unguentum s. Pomatum contra s. ad tineam. (*Pie.*)

℞. Praecipitati albi . semidrachmam.
Bacc. Juniperi pulv. drach. unam.
Unguenti rosati . unciam unam.
Misce exacte cum Olei Lauri pauxillo.

Pomatum s. Unguentum Jadelotii. (*Ra.*)

℞. Praecipitati albi . drachmas duas.
Camphorae . . . . grana octo.
Tutiae praep. . grana quindecim.
Butyri recentis . drachmas duas.
— Cacao . . semidrachmam.
Contere bene. — Bei ſogenannter ſcrophulöſer Augenentzündung in Einreibungen auf den Rand der Augenlider, alle zwei oder drei Tage, Abends bei'm Schlafengehen.

Unguentum s. Pomatum Janini s. ophthalmicum Janini. (Fer. *Bo. Ca. Fi. T.*)

℞. Praecipitati albi drachmam unam.
Tutiae,
Boli Armenae, sing.
drachmas duas.
Axungiae c. Aqua Ros. lot.
semunciam.
Misce exacte.
Fi Praecipitati semidrachmam, Florum Zinci, Boli Armenae, sing. drachmam unam, Axungiae duas; — *T.* Boli Armenae vel rubrae, Carbonatis Zinci, sing. semunciam. Praecipitati drachmas duas, Axungiae purae unciam.
Gebrauch wie bei'm vorigen,

Unguentum antipsoricum. (Pal. Wir.)

℞. Terebinthinae cum Aqua Rosarum lotae uncias duas et dimidiam.
Dissolve in
Vitellis Ovorum . . . . no. 3.
Solutioni adde
Butyri recentis . . uncias sex.
Olei Lauri . . . unciam unam.
Styracis liquidae . . semunciam.
Praecipitati albi . drachmas duas.
Cerussae pulveratae unciam unam.
Misce sedulo. — Gabe, eine Drachme auf einmal, in Einreibungen. — Ein ſchlechtes Präparat.

Pilulae specificae s. Muriatis oxygenati Mercurii s. mercuriales ammoniacales. (Am. B*. Fenn. Gen. LP. Lus. Suec. WW. *Bo. Br. C. Fi. Sa. Sm. Sw. Vm.*)

℞. Sublimati corrosivi grana decem.
Arrowroot . . scrupulum unum.
Solut. Salis Ammoniaci . . q. s.
Fiat massa. (Am. *C.*)
Mit Unrecht nennt Am. dieſe Pillen *Pilulae Hydrargyri Oxymuriatis.* Die Formel ſelbſt iſt ſchlecht und muß verworfen werden.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing.
gr. quindecim.
Aquae destillatae calidae . q. s. ut sales solvantur. Solutioni adde
Pulv. Rad. Althaeae drachmas tres.
Mellis depurati . drachmas duas.
Fiat massa in centum viginti pilulas dividenda. (Lus. WW.) Jede Pille enthält einen Achtelgran Sublimat.
LP. Sublimati, Salis Ammoniaci, singulorum semidrachmam, Aquae destillatae quantum satis, Gummi Arabici drachmas decem, misce ut fiat massa, cujus e drachma quaque pilulae viginti octo formentur.

℞. Sublimati corrosivi,
Salis Ammon., sing. scrup. unum.
Dissolutis in Aqua calida adde
Sacchari albi pulv. . scrup. unum.
Micae Panis triticei drachmas duas.
Fiant pilulae centum sexaginta. (Fenn. Suec.) Sie enthalten dieſelbe Quantität Sublimat, wie die vorigen. — *Br.* führt ähnliche an unter dem Namen *Specificum Genevense.*

℞. Aquae destillatae drachmas duas.
Salis Ammoniaci quantum sufficit ad saturandam aquam. Adde
Sublimati corrosivi grana viginti.
Micae Panis . . quantum sufficit ut fiant pilulae octoginta. (*Sa.*) — Jede enthält einen Viertelgran Sublimat.

℞. Salis Ammoniaci sesquidrachmam.
Aquae destillatae . . semunciam.
In solutione dissolve
Sublimati corrosivi semidrachmam.
Fiant cum Micae Panis albi q. s. pilulae ducentae octoginta octo. (Gen. *Fi*)
B*. *Sa. Sm.* geben eine andere Formel, welche ſich nur durch die Gabe des Sublimats unterſcheidet, und nach welcher die Pillen einen halben Gran Sublimat enthalten. Sie führen den Namen *Pilulae antivenereae Swediaur.*

℞. Sublimati . . grana duodecim.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Syrupi Sassaparillae,
Pulv. Sassaparillae, sing. . q. s. ut fiant pilulae ducentae et quadraginta. (*Bo.*)
Jede enthält nur einen Zwanzigtheilgran Sublimat.

℞. Salis Alembroth drachmam unam.
Panis biscocti pulv. unciam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae centum viginti (*Sw**)
Jede enthält einen halben Gran Sublimat.
Vm. Sacchari scrupulum unum, Sa-

lis Alembroth duos, Micae Panis drachmas duas et Syrupi Sacchari q. s.

Die Gabe und Anwendungsweiſe ſind dieſelben, wie für die Pilulae majores Hoffmanni, welche ihnen vorzuziehen ſind.

Pilulae mercuriales Noltii. (*Vm.*)

℞. Salis Alembroth grana duodecim.
Opii . . . . . grana novem.
Succi Liquiritiae quantum sufficit ut fiat massa pilularis.

Pulvis escharoticus. (*Sm.*)

℞. Praecipitati albi . . grana sex.
Magnesiae subcarb. scrup. unum.
Sabinae pulv. . drachmam unam.
Ein wenig wirkſames cathaereticum.

Oxalas Hydrargyri s. Mercurii. (*B*. Br.)

℞. Solut. Nitratis Mercurii aquosae frigide parat. et Aqua dil. q. vis.
Infunde
Solut. Acidi oxal. concent. q. s. vel donec non amplius exoriatur praecipitatum, quod Aqua dest. ablutum in loco umbroso siccetur.

Anwendungsweiſe wie beim ſalzſauren Queckſilberoxydul. Man hat dieſes Salz nur wenig angewendet, jedoch iſt es gegen veneriſche Krankheiten verſucht worden.

Protoacetas Mercurii, Acetas Hydrargyri s. hydrargyrosus s. Mercurii s. Acetis Hydrargyri, Hydrargyrus acetatus, Hydrargyrum acetatum s. aceticum, Mercurius aceticus s. acetatus, Oxyacetas Mercurii, Sal Mercurii acetosus s. mercuriatus acetosus, Sperma Mercurii, Terra foliata Mercurii s. mercurialis. (Au. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Gal. Han. LP. Lus. Pal. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Mercurii . . . . libram unam
Acidi nitr. Aqua dil. libras duas.
Dissolve metallum balneï aquae ope in acido, et liquori deinde sensim adde Solut. Kali subcarb. aquos. q. s. ad praecipitandum omne oxydum, quod Aqua pura ablutum et leni calore siccatum dissolve in Aceti dest. q. s., liquorem filtra et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subjice. (B.)

Lus. et *Sp.* Oxydum Potassae causticae ope praecipitare; — LP. Mercurium e Solutione Mercurii nitrica per Carbonatem Potassae praecipitatum cum Aceto destillato coquere, filtrare et ad siccum evaporare.

Garot tractare cum Oxydo acetico in quatuor gradibus densitatis et bulliente Hydratem Protoxydi Mercurii obtentum decomponendo Sodae causticae ope Protonitratem a Deutonitrate liberum

℞. Mercurii,
Acidi nitr. Aqua dil., sing. uncias tres.
Cessatâ effervescentia digere super arena calida ut metallum solvatur; liquorem statim commisce cum
Aquae bullientis (partibus) libris octo in solutione tenentis
Acetatis Potassae . . uncias tres.
Trajice celerrime per telam duplicem et refrigeratione in crystallos concrescere fac. (Du. Fer. *Vm.*)

Fi. Mercurii, Acidi diluti ut antea, Kali acetici sesquiunciam, Aquae dest. calidae libram unam et uncias tres; solutioni mercurii in acido adde solutionem kali in aqua dest., praecipitatum cum Aqua frigida ablue, solve in Aquae dictae libris duabus, coque paullulum, et post horae quadrantis sepositionem, liquorem decantha, qui refrigeratus crystallos praebet; — *Gal.* Protonitratis Mercurii partem unam, Aquae dest. sex, et Acetatis Potassae liquidi q. s. ad praecipitationem liquoris perfectam; — Ed. *C. Gr. Re.* Mercurii uncias tres, Acidi nitrici Aqua diluti quatuor cum dimidia, Acetatis Potassae tres et Aquae bull. libras octo; — *Gr.* Mercurii libram in Spir. Nitr. diluti q. s. dissolvere. Aq Subcarb. Potassae ope praecipitare, praecipitatum lotum et siccatum in acet. puri q. s dissolvere, filtrare, ad pellic. evaporare et ad crystallisandum seponere. (1 Gr. früh und Abends und allmälig geſtiegen); — Bor. Acetatis Potassae liquidi uncias quinque, Aquae bull. libras quatuor ad dilutionem et Nitratis Mercurii liquidi uncias quatuor; — Bor4. Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati q. vis, Aquae partibus quatuor diluto admisce Liquorem Kali acetici, quamdiu praecipitatum crystallinum producitur, quod filtro separatum et Aqua frigida dest. ablutum loco umbroso sicca; — LP. Dissolutionis Mercurii nitricae unciam unam Aquae duabus dilutam infundere sensim alii Acetatis Potassae; — *T.* Solutioni aquosae Crystallorum Nitratis Protoxydi Mercurii infundere Liquorem Kali acetici donec praecipitatio cessaverit; — *Br.* Mercurii, Acidi nitrici tenuis, sing. semilibram et Acetatis Potassae uncias octo in Aquae dest. calidae libris duabus cum dimidia solutae.

Garot empfiehlt folgendes Verfahren,

welches am meiſten geeignet ſeyn ſoll, ein gleichförmiges Product zu geben:

℞. Protonitr. Mercur. cryst. part. septem.
Aquae destillatae partes sexaginta.
Acidi nitrici . . partem unam.
Dissolve sal in acido; praeterea solve
Acetatis Sodae cryst. part. quinque
in Aquae destillatae partibus sexaginta et solutiones commisce.

Außerdem giebt es noch zwei andere Verfahrungsweiſen:

℞. Mercurii dulcis,
Solut. Potassae caust., sing. uncias duas.
Tritura in mortario lapideo et adde
Aquae destillatae uncias quatuor.
Coque per horae quadrantem continue agitando; residuum Aqua dest. ablue, donec ab Argento nitrico non amplius turbetur; sicca deinde lenis caloris ope et coque cum
Aceti destillati unciis triginta sex per horae tres quadrantes; liquorem bullientem filtra et refrigeratione in crystallos concrescere fac. (Han. *Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri partes 9,75.
Mercurii . . . . partes novem.
Contere, subinde Aceti aliquantulum addendo, ad perf. extinct. usque; satura deinde cum Aceto dest. calido, filtra subito et crystallisationi subjice. (*Vm.*)

Dieſes Verfahren giebt ein Gemiſch des Proto- mit dem Deutonitrat.

Lotio s. Solutio Acetatis Mercurii. (B⁴ *Re.*)

℞. Proto-Acetatis Mercurii grana decem ad duodecim.
Aquae Rosarum uncias quinque.
Dissolve. — *Re.* Acetatis granum unum, Aq. Rosarum unciam unam. — Als Waſchmittel bei manchen Hautkrankheiten empfohlen.

Syrupus mercurialis. (*Vm.*)

℞. Protoacetatis Mercurii part. unam.
Alcoholis . minimum quod possit ad solvendum sal ope caloris; solutioni adde
Syr. Sacchari part. quadraginta octo.
Misce bene.

Linimentum hydrargyro-acetosum. (B⁴. *Vm.*)

℞. Protonitrat. Merc. partem unam.
Axungiae Porci . . . partes sex.
Olei Olivarum . . partes duas.
Sal cum axungiae pauxillo in pulverem tere, et si homogenea reddita est miscella, adde sensim quod restat axungiae et oleum. (*Vm.*)

B⁴. Salis scrupulos duos ad drachmam et Olei Olivarum unciam unam.

Von einigen Aerzten gegen Flechten angewendet.

Pilulae Acetatis Mercurii. (*Va.* Hosp. Angl.).

℞. Acetat. Hydrargyri,
Opii,
Camphorae, sing. . grana triginta.
Syrupi Papaveris . . . . q. s.
Fiant pil. no. 30, 1 bis 2 Stück täglich, bei Syphilis.

Drageae s. Pilulae Keyseri, Drageae antisyphiliticae Keyseri, Trochisci ex Acetate Mercurii. (*Ca. E. Gr. Re. Sy. T. Va. Vm.*)

℞. Mercurii . . . unciam unam.
Acidi nitrici . quantum sufficit ad metalli solutionem. Adde
Acetatis Potassae dissoluti . q. s. ut omnis mercurius praecipitetur; praecipitatum cum Manna vel Melle et Liquiritiae Pulvere contere, ut fiant trochisci. (*Sy.*)

℞. Acetatis Mercurii part. unam c. dimidia.
Amyli,
Gummi Arab., sing. part. dimid.
Sacchari albi . . partes septem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis (*Vm.*)

℞. Acetatis Mercurii,
Mannae electae,
Gummi Arab., sing. scrup. unum.
Aquae Rosarum quantum sufficit ut fiant pilulae viginti. (*E. Re.*)

Gr. Hydr. Acetat. uncias quatuor, Mannae triginta, Amyli duas, Mucil. G. Tragac. q. s. ut f. pil. pond. gran. sex.

℞. Acetatis Mercurii . uncias duas.
Sacchari . . . . . uncias sex.
Gummi Arabici . unciam unam.
Pulveris Althaeae,
— Amyli, sing. . semunciam.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s. ut fiant pilulae grani unius Saccharo conspergendae. (*Ca.*)

Va Acetatis, G. Arab., sing. semunciam, Sacchari uncias tres, Althaeae, Amyli, sing. pulv. drachmas duas, Mucil. G. Arab. q. s. (acetat. ½ gr. sing.); — *T.* Quantitates Acetatis, Mannae vel Mucilaginis et Sacchari non indicat sed monet pilulas, quarum quaeque 3 ad 4 grana Salis dicti continet, Pulvere Amyli esse conspergendas et tres ad quatuor pro die propinandas.

Gabe, zwei Stück Morgens und Abends,

allmälig bis auf fünf und zwanzig Stück und mehr auf die Gabe gestiegen. Sie waren lange in Ansehen, heutzutage aber nicht mehr: doch können sie von Nutzen seyn.

Deuto-Acetas Mercurii. (Fer. *Siw**.)

℞. Oxydi Mercurii rubri uncias duas.
Acidi acetici . . uncias septem vel q. s. ad oxydi dissolutionem modici caloris ope; liquor lente ad siccum evaporet.

Liquor hydrargyro-aceticus. (*Vm.*)

℞. Oxydi Mercurii rubri part. decem.
Acidi acet. concent. part. quinque c. dimidia.
Oxydo in lagenam immisso acidum infunde, agita et quum totum album est redditum, in balneo aquae tepido calefac ad perf. liquefactionem usque, massam crystallinam albam solve deinde in
Alcohol. rectif. partibus sexaginta.
Filtra et serva.

Tartras Mercurii, Tartras Protoxydi Mercurii, Hydrargyrum tartarisatum, Tartarus mercurialis, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarisatus. (B*. *Siw.*)

℞. Oxydi nigri Mercurii quantum vis.
Acidi tartarici quantum necesse est.
Coque simul ad perf. oxydi solutionem usque; evaporent deinde ad gradum necessarium ut liquor refrigeratione in crystallos concrescat.
Gabe, ein bis zwei Gran zweimal täglich.

Tartras Mercurii et Potassae. (B. Fer. Gal. *Ca. Fi. Sp. Siw. T. Vm.*)

℞. Solut. Mercurii in Acido nitrico saturatae et bull. . . . q. vis.
Guttatim instilla Solutionem Tartratis Potassae neutralis aquos. saturatam et bullientem, donec non amplius enascatur praecipitatum, quod, liquore decanthato, binis sequentibus vicibus Aquae frigidae pauxillo ablutum, in Aquae bull. q. s. solve et liquorem ut in crystallos concrescat, ad locum frigidum repone (B. Gal. *Siw. Vm.*)

T. Solutioni Crystallorum Nitratis Mercurii in Aquae dest. unciis tribus infundere Solutionem Tartratis Potassae aquosam, donec praecipitatum non amplius promoveatur, quod repetito Aqua frigida lotum siccetur.

℞. Oxydi Mercurii e Nitrate per Potassam praecip. et bene loti uncias duas.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Tritura simul per horas quatuor, tum coque cum
Aquae dest. unc. quadraginta octo.
Liquor ad cuticulam evaporatus in crystallos concrescat. (*Sp.*)

℞. Carbonatis Mercurii unc. unam.
Cremoris Tartari . . uncias sex.
Tere in mortario et pulveri infunde
Aquae bullientis . libras quatuor.
Solutio evaporata in crystallos concrescat. (Fer. *Fi. T.*)
Solutio nondum evaporata *Aquam s. Liquorem vegeto-mineralem de Pressavin* praebet.

Vm. Terere Oxydi Mercurii partes 10,25 et Cremoris Tartari 19,5; miscellae infundere Aquae bull. q. s. ad perf. solutionem, calefacere deinde per horae quadrantem ad ebullitionem usque, colare et crystallisationi subjicere. — Praeterea: 1) triturare simul Sublimati partes 12,7 et Tartratis Potassae neutralis 23, mixta terere cum Aquae frigidae q. s. ut hydrochloras potassae exacte separetur, residuum in Aqua bull. solvere, liquorem calefacere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) Solutionem saturatam Sublimati decomponere Tartratis Potassae et Sodae ope; 3) triturare simul Oxydi Mercurii partes 10,25 et Tartratis neutralis Potassae partes 23; potassam lotione liberatam separare, residuum dissolvere et liquorem crystallisationi subjicere.

℞. Mercurii unc. duodecim c. dimid.
Oxydi rubri Mercurii unciam unam et drachmas quinque c. dimid.
Cremoris Tartari unciam unam et drachmas duas cum dimidia.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat pasta, cui per longum tempus in mortario cineri calido imposito triturata adde Aquae bull. q. s. ad solutionem; liquor filtratus ad cuticulae apparitionem usque evaporet. (*Ca.*)

Siw. et Vm.* eundem agendi modum indicant sed *Siw*.*: Mercurii partes quinque c. dimid., Oxydi partes sex, Cremoris Tartari partes viginti septem; — *Vm.* Mercurii partes novem c. dimid., Oxydi partes decem cum quadrante, Cremoris Tartari partes novemdecim et dimid.; — *Vm.* praeterea: 1) terere simul Mercurii dulcis partes 22,2 et Tartratis Potassae 23, Aquam instillare, calefacere, Aqua bull. addita solvere, filtrare et crystallisationi subjicere; 2) triturare ad extinct. usque Sublimati partes 12,7, Mercurii 9,5 et addere deinde Cremoris Tartari partes 23; 3) Sulphatem paratum ex Oxydi rubri Mercurii 9,5 et Acidi sulphurici

concentrati 10, terere cum metalli 9,5, massam humectare cum Aquae decem, miscere eam cum Tartratis neutralis Potassae 23 totum in Aqua calida dissolvere et sal mercuriale crystallisatione separare.

Dieſes Doppelſalz bildet die Baſis des *Liquor vegeto-mineralis Pressavin*, welchen man bereitet, indem man Queckſilber in Salpeterſäure auflöſ't, es durch ein Alcali niederſchlägt, den Niederſchlag mit deſtillirtem Eſſig behandelt, ihn durch Zuſatz von cremor tartari wieder fällt und mit Waſſer warm auflöſ't. (*Vm.*) — *Gr. Re.* Praecipitati e Solutione Hydrargyri in Acido nitrico Carbonate Potassae addito obtenti, Cremoris Tart, sing. unciam unam, Aq. destillatae octarios duos (*Re.*), uncias quadraginta (*Gr.*) — 2 Drachmen oder Löffel mit zwei Pinten deſtillirtem Waſſer verdünnt, 2 Unzen täglich drei oder vier Mal, bei Syphilis.

Dieſes Salz iſt von dem vorhergehenden nur wenig verſchieden; es war einige Zeit berühmt und kann unter denſelben Umſtänden angewendet werden.

Syrupus Tartratis Mercurii. (*Bo. Pie.*)

℞. Stipit. Dulcamarae libr. duas c. dimidia.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et decocto adde
Sacchari . . . . libras decem.
Coque syrupum ad globulum usque et pro octario adde momento quo eo uti vis,
Liquor. de Pressavin unc. duodecim.
Misce exacte.

℞. Cortic's Mezerei . uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit
Decoctiori adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fac deinde ut antea. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich, auf zwei Mal.

Olco-Margaras Mercurii, *Sapo Hydrargyri s. Mercurii s. mercurialis.* (B*. LP. R. *Au. Bo. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Dissolve in Aquae partibus quatuordecim; liquori instilla Solut oncm Protonitratis Mercurii maxime dilutam, donec praecipit tum non amplius enascatur, calefac ut magma bene coëat, decantha liquidum et praecipitatum Aqua tepida ablutum commisce cum Aquae 30° R. partibus octo ac pedetentim adde Kali caust. liq. ad perf. solutionem usque; evaporet deinde, donec liquor digitis non amplius adhaereat.

LP. Saponis libram unam, Aquae quantum sufficit ad solutionem, Solutionis Nitratis uncias sex.

Aeußerlich zur Auflöſung von Bubonen. Auch hat man dieſes Präparat bei Rheumatismen und chroniſchen Exanthemen empfohlen.

Sapo mercurialis Chaussieri. (*Ca.*)

℞. Unguenti mercurialis (partes aequales) uncias tres cum dimidia.
Tritura in mortario vitreo sensim superfundendo
Natri caustici liquidi uncias tres donec miscella magnam acquisiverit tenacitatem; tum in modulos effusam sicca. — Wie das vorige gebraucht.

Unguentum Praecipitati viridis. (*Sw**.)

℞. Sublimati corrosivi partes duas.
Hydrochloratis Cupri part. unam.
Salibus seorsim in Aqua solutis, misce solutiones et iis infunde Solutionem Saponis albi; praecipitatum filtro receptum lavando edulcora. — Zum Verbinden veneriſcher Geſchwüre empfohlen. Es iſt eine ſeifenartige Verbindung des Queckſilbers mit Kupfer.

Mesembryanthemum.

Mesembryanthemum crystallinum, *L.*; Eiskraut, Eispflanze, Mittagsblume; Glaciale, Cristalline (*Gal.*); Ice plant, Diamont fig, Marigold (*Ang.*); Isplante (*D*); Hierba de la plata (*His.*); Yskruid (*Hel.*); Erba cristallina (*I.*); Agelada (*Lus.*); Isaert (*Suec.*).

An. B. Ba. Ful. *M. Gr.*

☉ (Icosandria Pentagynia, L.; Ficoideae, *J.*) Eine Pflanze des Archipels. (*Dill.* Elth. 231. t. 180. f. 221. *Plenck.* t. 397.)

Das Kraut, welches man anwendet, beſteht aus einem äſtigen Stängel mit kleinen, eirunden, wellenförmigen, entgegengeſetzten oder abwechſelnden Blättern, welche ſo wie erſterer, überall mit ſehr großen glänzenden Kryſtallblaſen bedeckt ſind. Es hat einen faden, etwas widerlichen Geſchmack.

Kühlend, auflöſend, bei convulſiviſchem Huſten und Dyſurie, ſo wie als ſpecifiſch harntreibendes Mittel geprieſen — Gabe, vom Saft, ein Löffel alle zwei Stunden.

Conserva Mesembryanthemi crystallini. (Ful.)

℞. Herb. Mesembryanthemi cryst. rec. contus. et cribrat. partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Misce triturando.

Digitized by Google

Linctus s. Looch Mesembryanthemi crystallini. (B*. *Au.*)

℞. Succi Herb. Mesembryanth. cryst., Syr. Musci albi querni, sing. unciam.

Misce. — Gabe, ein halber Löffel täglich sechs Mal, bei convulsivischem Husten der Kinder.

Syrupus Mesembryanthemi crystallini.

℞. Succi expr. Herb. rec. Mesembr., ebullitione depur. et despum. partem unam.
Sacchari part. unam cum dimidia.
Fiat syrupus.

Mespilus.

Zwei Arten dieser Pflanzengattung finden sich in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Mespilus Germanica*, *L.*; Mispelbaum; Néflier d'Allemagne (*Gal.*); Dutenmedlar (*Ang.*); Mispeltrae (*D.*); Mispero (*His.*); Mispelboom (*Bel.*); Misplik (*Pol.*); Nespereira (*Lus.*); Mespeltraed (*Suec.*).

Ams. Gal. His. His3. LP. Wir. *Be. M. Sp.*

Ein Baum (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, J.), welcher auf den Europäischen Gebirgen wächst. (*Blackw.* t. 154. *Plenck.* t. 893 *Bert.* Bild. V. 87. fig. 2. *Nouv. Duh.* IV. 38.)

Man wendet die Frucht und den Saamen an.

Die Frucht, Mispel (fructus Mespili) ist rundlich, platt gedrückt, fleischig, an der Spitze genabelt, und enthält mehrere einsaamige Fächer. Ihr Geschmack ist herbe und zusammenziehend, wird aber, wenn sie durch Liegen weich geworden und daher in einen der Fäulniß nahe stehenden Zustand (blossissement) gekommen sind, süß, weinig und sehr angenehm. — Der Saame ist knochig, sehr hart und länglich.

Die Frucht ist etwas adstringirend und der Saame gilt als harntreibend.

2) *Mespilus* (*Crataegus*) *Oxyacantha*, *Cand.*; Weißdorn; Aubepine, Epine blanche (*Gal.*); White hawthorn (*Ang.*); Hagetorn (*D.*); Espino majuolo (*His.*); Haagdorn (*Bel.*); Bianco spino (*I.*); Boldak (*Pol.*); Espinheiro alvar (*Lus.*); Hagtorn (*Suec.*)

Gal. His. His3. *Gr. Sp.*

Ein Strauch (Icosandria Digynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa gemein ist. (*Blackw.* t. 149. *Schk* t. 132. *Jacq.* Fl. Austr. III. t. 292. f. 2.)

Man wendet die Blüthen (flores Oxyacanthae s. Spinae albae) an; sie sind weiß, groß und in Sträuße vereinigt. Sie haben einen angenehmen Geruch, welcher durch Trocknen sich fast ganz verliert. Der Geschmack ist schwach styptisch.

Mit lauwarmem Wasser aufgegossen, werden sie bisweilen als Hausmittel gegen Husten gebraucht. Die Materia medica verliert an ihnen nichts.

Meum.

Ligusticum (Aethusa, Athamanta) *Meum*, *Ro.*; Bärwurz, Hundspetersilie, Herzwurzel, Mutterwurz, Bärenfenchel; Meum (*Gal.*); Common signel (*Ang.*); Keprnjk (*B.*); Biaerne dild (*D.*); Meo (*His. I.*); Beerwortel (*Bel.*); Olesnik (*Pol.*); Bjaern dill (*Suec.*).

An. Bel. Br. Fer. Gal His. His3. Pm. Wir. Wür. *Bc. Br. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 525. *Plenck.* t 201. *Hayne* VII. t. 12 *Zorn* Ic. pl. t. 499.).

Man wendet die Wurzel (radix Mei s. Mei athamantici s. Anethi s. Foeniculi ursini) an; sie ist sechs bis acht Zoll lang, fingersdick, runzlig, außen schwärzlichgrau, innen weiß. Sie hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, aber wenig gebraucht.

Millefolium.

Achillea Millefolium, *L.*; Schaafgarbe; Millefeuille commune (*Gal.*); Common milfoil (*Ang.*); Kjebrjeek (*B.*); Raellike, Harhaens, Jordhumble (*D.*); Millefolia, Milenrama (*His.*); Gemeene duizendblad (*Bel.*); Millefoglio (*I.*); Tysiacznik (*Pol.*); Milem rama, Millefolio, Millefolium (*Lus.*); Daellika (*Suec.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn Fer. Fnl. Gal Gen. Ham. Han. Hass HassP. His. His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Ptd. Re. Sp.* Z

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantheroae, *Cass.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 18. *Schk.* t. 255. *Plenck.* t. 631. Düss. off Pfl. I. t. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 29.)

Man wendet das Kraut und die blühenden Spitzen an.

Das Kraut (herba Millefolii s. Achillene vulgaris) besteht aus langen, behaarten, doppelt gefiederten, in viele linienförmige Fiedern getheilten Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften, etwas adstringirenden

Geſchmack — Die Spitzen (summitates vel flores Millefolii) bilden endſtändige, aus dichtſtehenden, weißen oder purpurrothen Blüthen zuſammengeſetzte Sträuße. Sie haben einen etwas unangenehmen, ſchwach gewürzhaften Geruch, und einen bittern, etwas ſcharfen, balſamiſchen Geſchmack.

Reizend, toniſch, krampfſtillend, Wundmittel, bei Hyſterie, Blähungs- und Hämorrhoidalcolik angewendet. Man giebt den ausgedrückten Saft zu einigen Unzen.

Species contra sputum sanguinis s. adstringentes. (Pal.)

℞. Millefolii floresc. uncias novem.
Herb. Tormentillae cum Radice,
— totius Pimpinellae albae,
— Plantaginis,
— Virgaureae,
Flor. Rosar. rubr., sing. sesquiunciam.

Concisa misce.

Succus Millefolii (Hass. *T.*)

℞. Herbae recentis Millefolii q. vis.

Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva.

Extractum Millefolii aquosum. (A. An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. O. Pal. Sax. Suec. Wir. *Gr. Pid. T. Vm.*)

℞. Fol. Millefolii rec. . . q. vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; sepone, decantha et prope ignem coagulatum iterum cola; tunc ad massae pilularis consist. evaporatum ab igne remove, faeculam antea repositam commisce et iterum ad aptam spissitud. vaporando consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii libram unam.
Aquae frigidae libras duodecim.

Macera per horas 48, subinde agitando; cola et colaturâ ad librarum duarum circiter remanent. consumtâ, liquorem refrigeratum cola et vaporando in balneo aquae ad consistent. requisitam consume. (Han.)

℞. Foliorum recentium Millefolii,
Aquae frigidae, sing. partem unam.

Macera per horas duodecim et adde
Aquae bullientis duplum pondus massae totius. Post refrigerationem colatum et Albumine clarificatum igni impone et liquorem, quum spissescere coeperit, per pannum trajectum, continuò agitando, probe consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per horas quatuor, tunc parumper coctum cola exprimendo et colaturam ad extracti spissit. consume. (Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Infunde per horas quatuor, tunc coque per quadrantem et cola fortiter exprimendo. Residuo cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores commisce, qui per horas 24 sepositi ad requisitam consist. evaporent. (Sax.)

℞. Herbae Millefolii libram unam.
Aquae communis . . libras sex.

Coque per horam, cola exprimendo et colaturam decanthatam post horarum 24 sepositionem blando igne consume. (Hass. *Pid.*)

Ba. Herbae partem unam, Aquae duodecim et quadrantem horae ebullitionis; — An. Herbae unam, Aquae decem et ebullitionem per horae quadrantem. — *Gr.* coquendo parat, sed quantitates non indicat.

℞. Herbae Millefolii partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo. Residuum cum Aquae partibus quatuor coctum itidem coletur: liquores tunc commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (Bor. D. Han. O.)

Bor4 Millefolii q. vis, Aquae ferv. decuplum, post 36 horarum sepositionem liquorem exprimendo separa; residuum cum Aquae ferv. quintuplo infunde et post refrigerationem exprime, liquores decanthando colandoque depurati et commixti primo leni calore ad tertiam partem, tunc in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — *T.* Summitatum sicc. libram unam, Aquae bull. octo, 24 horarum infusionem et evaporationem ad extracti consistent.; — A. Herbam florescentem pluribus sequentibus bullitionibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae consumere; — Suec. coquere eam parumper cum Aquae duplo, exprimere, residuum cum nova Aqua decoquere et liquores commixtos in balneo aquae inspissare; — HassP. ut extractum cardui benedicti.

Extractum Millefolii alcoholicum. (Ful. Pol. Wür.)

℞. Herbae Millefolii,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . libras novem.

Digere per horas duodecim, cola exprimendo; Alcohole destillando sepa-

rato, residuum ad requisitam consistentiam evaporet. (Pol.)

Pul. et Wür. Herbae libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies infusionis.

Syrupus Millefolii s. de Millefolio. (Gal.

℞. Fol. Millefolii rec. . semilibram.
Aquae bullientis . . libras tres.
Infunde per horas duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Tisana haemastatica. (*Pie.*)

℞. Caudae vulpinae,
Millefolii,
Fol. Plantaginis,
— Polygoni,
— Urticae, sing. manip. unum.
Aquae . . . . . octarios tres.
Tertiam partem coquendo consume.

Linctus s. Looch pectoralis. (Br.)

℞. Herbae Millefolii,
— Hederae terrestris, singularum unc. duas c. dimid.
— Hyssopi,
Stipit. Dulcamar., sing. unc. unam.
Aquae bullientis . . libras tres.
Post horas duodecim infusionis decoque lente ad dimidii remanentiam; exprime fortiter et adde
Mellis despumati . . libras tres.
Aceti . . . . . libram unam.
Decoque blando igne ad mellis consistentiam.

Mixtura Millefolii, Potio excitans. (*Au.*)

℞. Extracti Millefolii . semunciam.
Aquae Menthae pip. uncias octo.
Elaeosacchari Menthae semunciam.
Gabe, ein Löffel, vier Mal täglich.

Tinctura s. Essentia Millefolii. (Br. Ful. HassP. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Millefolii . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Digere per tres dies, cola exprimendo et colaturae infunde
Herbae Millefolii . uncias duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et filtra. (Br Pal. Wir.)

Ful. et Li. Herbae florescentis partem unam, Alcoholis octo et octo dies digestionis; — HassP. Herbae uncias quatuor, Spir. Vini rectif. libras duas, digere per dies sex; tincturae expressae et filtratae pondus sit unciarum viginti.

Reizend, ehedem gegen Hämorrhoiden, Mutterblutflüsse und Nierensteinschmerzen empfohlen. — Gabe, funfzig bis siebenzig Tropfen.

Oleum Millefolii aethereum, Aethereoleum Millefolii. (Br. Ful. Sax. Wir. *Gr. Re.*)

℞. Summit. floresc. Millef. part. unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillando elicitum oleum separetur. (Ful.)

Sax. Herbae partem unam et octo Aquae; — Br. et Wir. Herbae viginti quinque, Aquae septuaginta quinque, Salis communis tres et tres dies digestionis.

Gabe, funfzehen Tropfen bis eine halbe Drachme.

Aqua Millefolii. (Han. *Vm.*)

℞. Herbae Millef. floresc. libras duas.
Aquae purae . quantum sufficit.
Destillent librae duodecim. (Han.)

℞. Herb. floresc. Millefol. part. quinque.
Aquae Vitae partis quadrantem.
Aquae purae . partes sexaginta.
Destillent partes viginti. (*Vm.*)
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Spiritus aromaticus s. vulnerarius s. Millefolii s. Rorismarini compositus. (Fenn. Suec. *Gr. Vm.*)

℞. Summit. Millefolii sesquilibram.
— Rorismarini
— Thymi, sing. . semilibram.
Alcoholis,
Aquae, singulorum . libras octo.
Destillent librae octo. (Fenn.)

Gr. Alcoholis congios duos, ut abstrahatur congius unus, absque Aqua, caetera ut antea (*Aq. vulner. s. sclopet.*); — Suec. Rorismarini sesquilibram, Millefolii, Thymi, sing. libram unam et Aquae Vitae Frumenti purif. libras sedecim.

℞. Millefolii florescentis partes tres.
Artemisiae,
Matricariae,
Serpylli, singulorum partem unam.
Aquae Vitae . . partes sedecim.
— purae part. quadraginta octo.
Destillent partes sedecim. (*Vm.*)

Aqua pontificalis s. vulneraria Romana s. Succorum vegetabilium vulneraria, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus aromaticus s. vulnerarius acidus, Spiritus Millefolii s. Rorismarini acetatus. (B*. Fenn. His. His3. Suec. Wir. *Vm.*)

℞ Herb. Nummulariae,

Herb. Betonicae,
— Chaerophylli,
— Plantaginis,
— Aristoloch. Clemat., sing. unc. duas.
— Saniculae,
— Verbasci,
— Sedi majoris,
— Sedi minoris,
— Pervincae,
— Pimpinellae albae, singularum uncias tres.
Foliorum Quercus,
Summitatum Millef., sing. unc. duas.

Contunde, exprime fortiter succum, qui cum
Aceti . aequali suae quantitate,
Salis culinaris . . unciis quatuor destillet. Productum serva. (Wir.)

℞. Succi Millefolii,
— Betonicae,
— Origani,
— Pimpinellae albae,
— Sedi majoris,
— Saniculae,
— Verbenae, sing. uncias sex.
— Mari . . . . uncias tres.
Kali subcarbonici,
Salis culinaris, sing. uncias sex.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Aloës Socotrinae . unciam unam.
Aceti destillati . . libram unam.

Dissolve aloën in aceto, sal in succo betonicae, kali in succis verbenae et millefolii, cremorem in succo pimpinellae; liquores commixtos digere per tres dies et destillando ad siccum redige; productum cum residuo pulverato dilue et novam destillationem institue, quod tertio est repetendum. (His. His3.)

B*. Succorum Origani, Saniculae, Betonicae, Verbenae, Sedi majoris, Pimpinellae albae et Millefolii, sing. uncias sex, Succi Mari tres, Subcarbonatis, Salis marini, sing. sex, Cremoris Tartari quatuor, Aceti libram et Aloës sesquiunciam; post tres dies digestionis destillet tertia pars.

℞. Spir. Millefolii comp. partes duas.
Aceti . . . . . partem unam.
Misce. (Fenn. Suec. *Vm.*)

Reizend, als Auflöſungsmittel bei Quetſchungen und Ekchymoſen betrachtet, auch als adſtringirendes Mittel bei innern Blutflüſſen, und zur Verminderung der Schweiße Schwindſüchtiger gebraucht. — Gabe, vierzig Tropfen und mehr. — Man könnte ſtatt des Weineſſigs auch Alcohol nehmen.

Millepedes.

Millepedae, Oniscus Asellus, L, Kellerwurm, Kellereſel; Cloporte ordinaire (*Gal.*); Haters, Chesbug (*Ang.*); Skukketruld (*D.*); Galminha, Encarrucha, Milpies, Cochinilla (*His*); Pissebedden (*Bel.*); Centogambo, Millepiede, Porcelletto (*I.*); Stonog (*Pol.*); Centopea (*Lus.*); Graesugga (*Suec.*).

Ams. B. Ba. Bor. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. His3. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. *A. Fi. G. Gr. Re. Sp.*

Der gemeine Kellerwurm gehört in die Claſſe der Cruſtaceen (Isopoda, Oniscides; *Latr.*) und iſt allenthalben ſehr gemein (*Panz.* Faun. Germ. fasc. IX. 21.); er iſt aſchgrau, glatt, mit ſchwarzen und gelblichen Flecken.

Die Kellerwürmer gelten für eröffnend, ſchmelzend und harntreibend. Ehedem ſchätzte man ſie ſehr gegen Waſſerſucht und Aſthma. — Gabe des Pulvers, 1 Scrupel bis 1 Drachme, des ausgepreßten Saftes, eine halbe Unze Ful. verordnet in muris non sub trabibus collectos.

Millepedes praeparati s. Millepedae praeparatae. (His. *Fi. Re.*)

℞. Millepedum . . . quantum vis.
In bono Vino (albo) suffocatos ablue et in balneo vaporis i. e lenissimo calore exsicca, tunc denuo, tertio vel quarta vice cum novo Vino lava et sicca.

Conserva Millepedum. (B*. Ful. Li. Wir.)

℞. Millepedum vivent. libram unam.
Sacchari albi libras duas c. dim.
Contere. (B*. Li. Wir.)

Ful. Millepedum partem unam et duas Sacchari.

Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Jus Millepedum. (*Au.*)

℞. Millepedum . drachmam unam.
Aquae aromaticae . semunciam.
Jussis Carnis . . uncias novem.

Harntreibend.

Infusum Millepedum. (Sar.)

℞. Milleped. vivent. contus. drachmas sex.
Aquae purae . . . uncias tres.
Alcoholis . . . unciam unam.

Post macerationem per horam unam cola, fortiter exprimendo. — Harntreibend.

Syrupus Millepedum. (*Ca.*)

℞. Sacchari . . uncias duodecim.
Radicis Asparagi,

Radicis Liquiritiae,
Uvarum passarum,
Foliorum Parietariae,
Mannae, sing. . drachmas duas.
Fiat syrupus, tunc recipe
Succi Boraginis,
— Buglossi, sing. uncias duas.
Millepedum contus. sesquiunciam.
Commisce, filtra et pro unciis quatuor liquoris adde
Sacchari . . . . . semilibram.
Solve in balneo aquae et syrupum cum praecedente commisce.
Bei Huſten und Keuchhuſten empfohlen.

Vinum diureticum. (*Ca. Sm. Sp.*)

℞. Millepedum vivent. unciam unam.
Contunde et infunde sensim
Vini albi novi aciduli uncias sex.
Cola exprimendo (*Ca. Sm.*)
Sp. Millepedum, Sacchari, sing. unciam unam et quatuor Vini.

Liquor diureticus. (*Pic.*)

℞. Millepedes . . . no. 30 ad 40.
Baccas Alkekengi . no. 20 ad 30.
— Juniperi . . . . . no. 6.
Contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo
Vini albi sufficientem quantitatem.
Cola exprimendo.

Tinctura s. Essentia Millepedum. (Br.)

℞. Millepedum bene sicc. semunciam.
Spiritus Vini rectificati uncias sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo et filtra.

Momordica.

Zwei Arten dieſer Pflanzengattung finden ſich in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Momordica Balsamina, L.*; Balſamapfel, Wunderapfel; Balsamine, Pomme de merveille (*Gal.*); Balmappel (*Ang.*); Balsamaeple (*D.*); Momordica (*His. I.*); Balsam appel (*Bel.*); Balsamina (*Lus.*).
Br. Fer. Gal. LP. *Br. Gr. Sp. Va.*

4 (Monoecia Monadelphia, L.; Cucurbitaceae, J.) Eine Pflanze Oſtindien's. (*Blackw.* t. 539 a b. *Knorr.* del. I. t. B. 3 *Zorn* Ic pl. t. 45.)

Die Frucht (fructus Momordicae s. Pomum Hierosolymitanum) iſt beerenartig, faſt von der Größe eines Taubenei's, von pomeranzen- oder ſcharlachrother Farbe. Ehedem galt ſie als Wundmittel; heutzutage bedient man ſich ihrer nicht mehr. Die Wurzel zu 2 Scrupel genommen, purgirt, das Kraut iſt ein Wundmittel.

2) *Momordica Elaterium, L.*; Eſelsgurke, Eſelskürbis, Springgurke, Spritzgurke; Elaterium, Concombre sauvage (*Gal.*), Squirting concombre (*Ang.*); Strikawa aneb plana tykwice (B.); Cohombrillo amargo (*His.*); Ezelskomkommers (*Bel.*).

Br. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. His. His. Lon. LonN. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Re. Sa. Sp. Z.*

⊙ Eine Südeuropäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 108. *Plenck* t. 693. *Bull.* t. 81. *Schk.* t. 313. *Hayne* VIII. 45. *Zorn* Ic. pl. t. 144.)

Man wendet die Wurzel und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Cucumeris agrestis s. asinini s. Momordicae Elaterii) iſt zwei bis drei Zoll dick, einen Fuß lang, und hat einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen, brennenden Geſchmack. — Die Frucht (poma Elaterii) iſt eine eirundlängliche, grüne Beere, welche man halbreif abnimmt. Dieſe Frucht enthält, nach Paris, einen eigenthümlichen Stoff, das Elatin oder Elaterin (Elatinum, Elaterinum), in welchem die Wirkſamkeit liegt.

Ein ſehr heftiges draſtiſches Purgirmittel, welches ehedem bei chroniſcher Waſſerſucht gebraucht wurde, heutzutage aber nicht mehr angewendet wird.

Succus Elaterii. (His. His. Sar.)

℞. Fructuum Elaterii nondum penitus maturorum . . quantum vis.
Seminibus separatis, reliquum contunde in mortario lapideo, exprime succum, sepone, decantha et partem limpidam serva.

Elaterium s. Elaterium album, Extractum Elaterii, Succus spissatus Momordicae Elaterii, Inspissamentum Cucumeris agrestis s. Elaterii, Extractum Fructus Momordicae Elaterii. (Br. Du. Han. His. His. Lon. LonN. Sar. Wir. Wür. *Gr. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Fructuum Elaterii matur. q. vis.
Petiolis apicis cultri ope, seminum separandorum causa remotis, contunde pericarpia in mortario pistillo ligneo, Aquam pedetentim addendo; pulpam per cribrum trajice et blando igne vaporando ad extracti consist. consume. (Gal. Sar. Wir. Wür. *Sp. Sw. Vm.*)

Han. His. His. Lon. LonN. *Gr. Re.* Succum expressum seponere ut subsideat, liquidum supernatans rejicere et sedimentum leni calore consumere; — Du. *Gr.* hocce blando igne inter duo lintea siccare; — *Br.* praecipitationem digestionis in balneo aquae ope juvare; — *T.* ut extractum cichorii.

Ein heftiges, ehedem und in England

noch jetzt bei Waſſerſuchten ſehr gebräuchliches Purgirmittel. Man ſetzte es zu andern waſſertreibenden Mitteln.

Gabe, drei oder vier Gran.

Faecula Cucumeris agrestis. (Gen. *Vm.*)

℞. Fruct. virid. Elaterii . . q. vis.

Contunde pistilli lignei ope in mortario vitreo et exprime succum, residuum cum Aquae pauxillo contusum itidem exprime; mixtos liquores sepone, decantha, igni impone ut coagulet faecula, remove deinde, cola, faeculam bene lava et blando calore siccatam pulvera.

Pulvis Elaterii. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Extracti Elaterii . grana quatuor.
Tartratis Potassae
scrupulos quinque.
Zingiberis . . scrupulum unum.

Misce. (30 Gran enthalten 1 Gr. Elaterium.) 5 bis 20 Stück.

Pilulae hydragogae. (*Sa.*)

℞. Extracti Elaterii . grana decem.
— Gentianae . drachmas tres.

Fiant pilulae quatuor granorum.

Pilulae ex Elaterio s. Elaterii compositae s. hydragogae. (Suec. *Gr.*)

℞. Gummi Ammoniaci uncias duas.
Aloës Socotrinae,
G. Guttae, sing. . drachmas duas.
Extracti Elaterii semidrachmam.
Tincturae Absinthii
quantum sufficit.

Fiant pilulae sexcentae et quindecim.

Gr. Tincturam Gentianae et pilulas ponderis granorum duorum indicat.

Oleum Momordicae. (Br. Sar. Wir. Wür.)

℞. Fruct. matur. Elaterii
partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Digere per dies duos in halneo aquae et exprime; post refrigerationem maceratio repetatur. (Sar.)

Br. et Wir. digerere super cinere calido Fructuum partem unam, Olei Lini partem unam cum dimidia, coquere tunc lente per horam ad consumptionem humidi usque et demique digestionem atque coctionem cum novorum Fructuum aequali quantitate repetere; — Wür. coquere lente ad humidi usque consumptionem Fructuum maturorum partem unam in Olei Olivarum duabus.

Bei aufgeſprungenen Bruſtwarzen, Hämorrhoidalſchmerzen und Froſtbeulen empfohlen.

Oleum Conyzae (majoris) vel Momordicae compositum, Oleum Aregonis. (His. Hi: 8.)

℞. Foliorum Conyzae majoris,
— Laureolae,
— Momordicae (Cuc. agrest.),
— Calaminthae,
— Rorismarini,
— Majoranae,
— Thymi,
— Rutae,
— Lauri,
— Sabinae,
— Salviae, sing.
uncias quatuor.
Radicis Bryoniae,
— Ari,
— Momordicae (Cucum. sylv.),
sing. uncias duas.
Olei Olivarum . . libras decem.

Macera per dies quatuor, tunc coque lente ad humidi usque consumptionem et cola cum expressione.

Solutio Elaterii, Mixtura hydragoga. (*Au. E. Huf.*)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aetheris nitrici . . uncias duas.
Tincturae Scillae,
Oxymel. Colchici, sing.
semunciam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Gabe, ein Löffel vier oder fünf Mal täglich in etwas Waſſer. (*Au. E.*)

℞. Extracti Elaterii granum unum.
Aquae Petroselini . uncias sex.
Aetheris nitrici . drachmas duas.
Oxymellis scillitici,
Syrupi Rhamni, sing. semunciam.
Rooh Juniperi . unciam unam.
Tincturae arom. drachmam unam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei oder drei Stunden.

Elaterinum, der wirkſame Stoff des Elaterium, wird von Edinburger Aerzten in folgender Form angewendet:

℞. Elaterini . . . granum unum.
Alcoholis . . . unciam unam.
Acidi nitrici . . guttas quatuor.

Dissolve. — Gabe, 36 bis 48 Tropfen in einer halben Unze Zimmtwaſſer. (*Va.*)

Monarda.

Monarda punctata, L.; punctirte Monarde; Monarde ponctuée (*Gal.*); Montain balm (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

⊙ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in Nordamerica einheimiſche Pflanze. (*Pluk.* Alm. t. 24. fig. 1.)

Das Kraut, welches man anwendet, be-

ſteht aus einem filzigen. weißlichen Stängel mit ſchmalen, ſpitzigen und überall mit vielen glänzenden Haaren bedeckten Blättern.

Wahrſcheinlich wirkt es als Reizmittel.

Oleum Monardae aethereum, *Aethereoleum Monardae.* (Am. *C. Gr.*)

℞. Herbae Monardae . quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit ut herba obtegatur. Destillent.

Moringa.

Moringa oleifera, (*zeylanica*) *Lamk.*; gemeine Behennuß; *Ben oléifère* (*Gal.*)

Br. Gal. Ful. Li. Wir. *G. Gr. Sp.*

Ein Baum (Hexandria Monogynia, L.; Leguminosae, *J.*) Malabar's. (*Blackw.* t. 386. *Plenck* t. 318. *Descourt.* Fl. méd. d'Ant. t. 27. Fl. méd. III. 63.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Moringae s. Guilandinae Moringae, Hyperanthera Moringa) beſteht in Stücken von verſchiedener Dicke, von gelblicher Farbe, harzigem Bruche und gewürzhaftem Geruch und Geſchmack.

Man iſt noch nicht ganz ſicher, ob ſie wirklich von dieſer Pflanze kommt.

Ein faſt ungebräuchliches Wurmmittel.

Der Saame, Ben-Nuß (nux Ben s. Been s. Behn, Balanus myrepsica, Glans unguentaria'), iſt eine eiförmige Nuß mit drei häutigen Flügeln, welche unter einer harten, knorpeligen Rinde eine weißliche Mandel enthält.

Oleum Been s. balatinum. (Ful. Gal. Li. *Br. T.*)

℞. Nucum Been excort. . . q. vis.
Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e tela confecto inclusam exprime frigide et oleum cola. (Ful. Gal. *Be.*)

Li. saccum pastam continentem super Aqua bull. suspendere, ita ut aquoso vapore imbibatur et tunc prelo submittere.

Erweichend, die Haut röthend, krampfſtillend, wurmtreibend, aber wenig in Gebrauch.

Das *Oleum Guilandinae Bonducellae* wird gegen Convulſionen und Lähmung angewendet. (*Gr*)

Morphium.

Morphia, *Morphina*, *Morpheum*, *Morphinum*; Morphin, Morphium; Morphine (*Gal.*)

B*. Bor4. Fer. Gal. Pm. *Fi. Gr. Re. T.*

1) Sertürner's Methode.

℞. Extracti Opii partes quingentas.
Aquae . quantitatem sufficientem ut solutio frigida indicet 8° Ar. Infunde ei
Ammoniaci liquidi 22° . . q. s. vel satis ut parvus ejus sit excessus; praecipitatum quod enascitur gelatinosum separa, crystallos in fundo ortas filtro recipe et siccatas in Acido sulphurico 66* calido et antea Aquae octo partibus diluto solve, liquori infunde Ammonium, praecipitatum quod enascitur exsumendo et Alcohole 22° ablutum in Alcohole 36° bull. solvendo; solutionem colatam crystallisationi subjice. (Gal. *Re.*)

2) Hottot's Methode.

℞. Opii . . . . . quantum vis.
Macerationes plures perfice, liquores commixtos ad 2° Ar. usque inspissa, liquido tepido Ammoniacum (causticum) adde ita ut sit ejus parvus excessus, praecipitatum glutinosum inde formatum filtra, infunde frigidè Ammoniaci liquidi novam quantitatem in excessu et praecipitatum in panno e tela arctioris texturae confecto receptum et Alcohole 20° ablutum sicca, pulvera et Alcohole 36° bull., parva Carbonis animalis proportione mixto tracta. (GalH. *T.*)

3) Robiquet's Verfahren.

℞. Opii puri concisi partes trecentas
Aquae communis . partes mille.
Macera per dies quinque, cola et colaturae adde
Magnesiae calcinatae
partes quindecim.
Coque per sexagesimas decem, filtra, sedimentum Aqua frigida ablue, sicca et blandi caloris ope in Alcoholis 22° q. s. macera; quod restat, cum Alcohole frigido ejusdem gradus ablue, sedimentum per momenta aliquot in Alcohole 32° bull. tenens et liquore colato crystallos refrigeratione inde enatas in Alcohole 36° bull. solve et solutionem crystallisationi subjice. (B*. Fer. Gal. *Re. T.*)

Gr. Opii uncias tres, Aquae decem, Magnesiae calcinatae drachmam unam et grana duodecim vel potius Calcis vivae sesquidrachmam, caeterum ut antea; color Carbonis animalis ope extrahi potest. — Residuum, *Extractum Opii Morphina privatum.* (4 Gr. = 1 Gr. extr. op. aquos. oder ¼ Gr.

Morphin); — *Fi.* Opii libram unam, Aquae communis tres, Alcoholis dictorum trium graduum q. s. et Magnesiae purae grana decem, caeterum ut antea; — Pm. Opii libram unam, Aquae tres, macerationem per quatriduum, Magnesiae purae s. causticae drachmas quatuor et Alcoholem primum gradum 20 Ar. Baum. deinde grad. 36° et eundem procedendi modum, crystallos vero obtentas denuo alcohole solvere etc.

4) Verfahren Winkler's und Brande's.

℞. Opii . . . . . partes tres.
Aceti . . . . . partem unam.
Aquae destillatae . partes octo.

Post aliquot dies digestionis materiam separatam pluribus vicibus Aqua cum Aceto mixta ablue, liquoribus conjunctis Ammonium infunde, praecipitatum filtro receptum per aliquot dies cum Aethere alcoholisato tracta; a liquido supernatante morphinam a materiis simul cum ea praecipitatis separa, dissolve in Alcohole bull. 36° et liquorem refrigeratione in crystallos abire fac. (*Re.*)

5) ℞. Opii pulverati uncias quatuor.
Digere leni calore cum
Aquae destill.
unc. triginta duabus.
Acidi muriatici . . uncia una
mixtis per horas sex, saepius agitando, et decantha. Residuum ter simili modo digeratur. Liquoribus obtentis adde
Natri muriatici uncias sedecim.
Sale soluto et materiis sepositione perfecte praecipitatis, filtratis admisce
Liquorem Ammonii caustici
quamdiu praecipitatum efficitur et miscellam per biduum spone. Praecipitatum ope filtri separatum Aqua dest. frigida ablutum et siccatum digere cum
Spir. Vini alcohol. part. decem
quoties hic ab illo aliquid solvit. Tincturae ferventes filtratae sepositione et destillatione in crystallos redigantur; has Spiritu Vini rectificatissimo frigido ablutas leni calore in
Acidi muriat. Aquae dest. partibus quatuor diluti . . q. s.
solve. Liquor post refrigerationem in massam crystallinam abeat; hanc linteo inclusam exprime ut ab heterogeneis depuretur. Residuum solvatur in
Aquae dest. ferv. . . . q. s.
et liquorem refrigeratum cum
Liquore Ammonii caustico
ad perfectam morphii praecipitationem usque misce. Praecipitatum in
Spir. Vini alcohol. . . . q. s.
solutum lege artis in crystallos redige. (Bor4.)

Man wendet das Morphin nicht leicht an, weil es im Waſſer zu ſchwer auflöslich iſt.

Potio narcotica. (*B.*)

℞. Morphini . . . . semigranum.
Aquae destillatae . unciam unam.
Syr. Papaveris albi drach. unam.
Abends bei m Schlafengehen.

Injectio leniens. (*B.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
— Liliorum, sing. semunciam.
Morphini . . . . . grana duo.
Gegen Ohrſchmerzen, Schmerzen bei hitziger Blennorrhagie und Tenesmus bei Hämorrhoidalkolik.

℞. Olei Chamomillae,
— Papaveris, sing.
unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Morphini . . . . . grana duo.
Zur Stillung von Ohrenzwang.

Sulphas Morphini s. Morphinae, Morphina sulphurica. (Fer. GalH. *Gr. Ma. Re. T.*)

℞. Morphii puri . uncias quatuor.
Dissolve in Alcohole vel in Aqua destillata dilue et caute adde
Acidi sulph. Aquae pond. aeq. dil.
quant. sufficit
ad saturandum alcali. Filtra, lente vapora et crystallisationi subjice; — *Re.* Morphinae partes sex in Aq. dest. duodecim dissolvere, addere Acidi sulph. cum Aq. duplo diluti q. s. ad saturandum, vaporare etc. — *Gr.* Morphium in Oleo Vitrioli, magna Aq. dest. copia diluto solvere et evaporare. — Gabe, von einem Viertel- bis zu einem ganzen Gran in Potion oder in Pillen.

Syrupus Sulphatis Morphii s Morphinae. (Fer. GalF. *Gr. Ma. Re. Va*)

℞. Morphii sulphurici grana quatuor.
Dissolve in Aqua Acido sulphurico leviter acidulata et commisce cum
Syrupi communis tepidi libra una.
Kaffeelöffelweiſe.
Gr. Morph. Sulph. grana tria, Syrupi libram.

Pilulae deprimentes s. lenientes. (*B. Va*)

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Olei Olivarum . quantum sufficit ad solvendum; adde
Ipecacuanhae . . . grana tria.
Fabarum Sti. Ignatii grana duo.

Micae Panis,
Mellis, sing. . quantum sufficit.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Boli lenientes s. deprimentes. (*B.*)

℞. Morphii sulphurici . grana duo.
Olei Amygd. dulc. . . . q. s. ad solvendum sal; adde
Ferri sulphurici . grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis, sing. . quantum sufficit.
Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii sulphurici granum unum.
Ipecacuanhae . . . grana tria.
Olei Amygd. dulc. gutt. duodecim.
Extracti Aconiti . . grana sex.
Pulveris Liquiritiae,
Mellis, sing. . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Acetas Morphii s. Morphei s. Morphinae. (B*. Bor4. Fer. GalH. Pm. *Fi. Gr. Ma. Re. T*)

℞. Morphii . . . . quantum vis.
Dilue in Aqua destillata et adde
Acidi acetici 10° . quantum sufficit ad neutralisandum alcali. Solutio ad siccum evaporet (B*. Fel. GalH. *Gr. Ma.*)

Bor4. Morphii (sec. formulam Bor4.) q. vis, Aceti concentrati Aquae dest. quantitate aequali diluti q. s. ut liquor perfecte neuter appareat, qui filtratus leni igne ad siccum evaporet. Residuum in pulverem redactum caute serva; — *Fi. Re.* Morphii partes quatuor, Aquae dest. partes octo, Acidi acetici q. s.; evaporent primum ad syrupi consistent., tunc solis vel lenis evaporatorii caloris ope, donec in massam salinam abierint, quae pulveretur; — Pm. Morphii non omnino depurati quantum vis, Aquae destillatae pondus duplex, Acidum aceticum, donec liquor tincturam Laccae aliquantisper rubescentem reddat, liquorem igni subjicere; huic parum Carbonis animalis Aceto destillato primum bene abluti conjicere saepeque agitando per diem hoc modo detinere, tunc ut antea procedere; — *T.* Morphii grammata (danari *) sex Aquae dest. modicam quantitatem, et Aceti radicalis q. s. ad saturandum, caeterum ut antea.

Gabe, einen Viertel- bis ganzen Gran.

Hierher gehören eigentlich die unter Opium (§. Auszug durch Essigsäure) angegebenen Präparate, bei welchen mehr oder weniger unreines Morphin die Basis ausmacht.

Solutio Acetatis Morphii s. Morphii acetici. (*E.*)

℞. Acetatis Morphii grana sedecim.
Aquae . . . . . drachmas sex.
Acidi acetici . . drachmas duas.
Gabe, sechs bis vier und zwanzig Tropfen.

Guttae anodynae s. lenientes s. deprimentes, Solutio Acetatis Morphinae. (Fer. GalH. *Bo. Ca. E. Gr. Ma. Ra. Va.*)

℞. Morphii acetici . grana sedecim.
Acidi acetici . . guttas quatuor.
Aquae destillatae . unciam unam.
Alcoholis . . drachmam unam.
Gr. Acidi acetici guttas tres.
Gabe, sechs bis zwölf bis vier und zwanzig Tropfen, in einem lindernden Trank.

Battley's Liquor Opii sedativus. (*Gr. Re.*): e Solutione Opii in Acido acetico vel Morphina acetica maxime compositus et imitatus macerando in Acido tartarico faeces relictas post parationem tincturae opii.

Injectio Opii (*Re.*): Liq. Opii sedat. Battleyi guttas quadraginta, Aq. uncias quatuor, misce. — Schmerzstillend.

Bolus anticatarrhalis. (*Ca. Pie. Va.* Hosp. Monspel.)

℞. Butyri Cacao . drachmam unam.
Gummi Tragacanthae,
Croci,
Mel. Narbonn., sing.
semidrachmam.
Extracti Liquiritiae,
Bals. Sulph. anis., sing.
grana octodecim.
Extracti Hyoscyami albi
grana sex.
Morphii acetici . . grana duo.
Fiant boli triginta sex. — Gabe, ein Stück alle zwei oder drei Stunden.

Pilulae lenientes. (*B. Ca. Va.*)

℞. Morphii acetici . granum unum,
Conserv. Flor. Aurant.
grana sedecim.
Fiant pilulae octo. — Gabe, ein oder zwei Stück alle sechs Stunden bei Nervenschmerzen und Krebs. Man kann bis auf drei Gran essigsaures Morphium steigen, muß jedoch sorgfältig den Erfolg beobachten. (*Ca. Va.*)

℞. Morphii acetici . granum unum.
Digitalis purpureae . grana octo.
Micae Panis,
Mellis, sing. . quantum sufficit

*) Ein Danaro beträgt 21,57 Gran.

ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Morphii acetici . granum unum.
Sulph. Antimonii aur. grana duo.
Extracti Aconiti . grana quatuor.
Pulveris Liquiritiae,
Mellis, sing. . quantum sufficit.
ut fiant pilulae octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden. (*B.*)

Pilulae leviter emmenagogae deprimentes. (*B.*)

℞. Morphii acetici . granum unum.
Olei Olivarum . . guttas decem.
Solutioni adde
Ipecacuanhae . . . grana duo.
Extracti Hyoscyami grana quatuor.
Micae Panis,
Mellis, sing. . . quantum sufficit
ut fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Amenorrhoe von übermäßiger Sensibilität des Uterus.

Boli lenientes. (*B.*)

℞. Morphii acetici . granum unum.
Olei Olivarum . guttas decem.
Solutioni adde
Micae Panis,
Mellis, sing. . quantum sufficit.
Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Haustus sedans narcoticus, Potio leniens. (*B. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Infusi Chamomillae unc. quinque.
Extr. Lactucae viros. grana decem.
Guttas lenientes . . . viginti.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

Syrupus Morphinae Acetatis s. Morphii acetici. (Fer. GalF. GalH. *Bo. Cu. Gr. Ma. Re. Va.*)

℞. Syr. Sacchari clarif. libram unam.
Morphii acetici . grana quatuor.
Dissolve sal in Aquae Acidi acetici guttis aliquot acidulatae semidrachma, filtra et cum syrupo tepido commisce.
Gr. Morphii acetici grana tria.
Kaffeelöffelweise.

Julep leniens s. sedans.

℞. Syr. Morphii acet. unciam unam.
Infusi Hederae terrest.
uncias quatuor.
Misce.

Emulsio sedativa simplex. (*B. Va.*)

℞. Emuls. (Mucil.) Gummi Arab.
uncias octo.
Syr. Morphii acet. unciam unam.
Allmälig zu nehmen.

Citras Morphini, Morphium citricum, Solutio Citratis Morphinae, Guttae roseae. (*Ma. Par. Va.*)

℞. Morphii puri . . grana sedecim.
Acidi citrici crystall. grana octo.
Dissolve totum in
Aquae destillatae . . uncia una.
Colora solutionem cum
Tinct. Coccinell. alcoh.
drach. duabus.
Misce bene. (*Ma.*)

Dr. Porters Liquor s. Morphii s. Morphinae Citratis, Black drops (*C. Gr.*) Opii crudi uncias quatuor, Acidi citrici crystallisati duas, contere et adde Aquae bullientis uncias sedecim et liquorem post horas viginti quatuor macerationis filtra. (*Par.*)

Nutzen, der des essigsauren Morphins.

Liquor tartarisatus Morphinae simili modo cum Acido tartarico. — *Haden's Liquor Opii sedativus* (*Gr.*) Tinctura extracta e Tinctura Opii Acidi tartarici in Aqua dissoluti ope.

Solutio Hydrochloratis Morphinae. (Hosp. Angl. *Va.*)

℞. Hydrochlorat. Morphinae
grana decem.
Aquae destill.
drachmas quatuordecim.
Dissolve. — (100 Tr. enthalten einen Gran) 15 bis 25 Tropfen in einer Potion oder in etwas Zuckerwasser.

Morus.

Morus nigra, L.; Maulbeerbaum; Mûrier noir (*Gal.*); Mulberry tree (*Ang.*); Marusse (*B.*); Morbaertrae (*D.*); Moras (*His.*; Moerbezieboom (*Bel.*); Gelso (*I.*); Amoreira (*Lus.*); Mulbaerstraed (*Suec.*).

A. Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Han HassP. His. His8. HL. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

Ein Baum (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, J.), welcher ursprünglich in Persien einheimisch seyn soll und in Europa cultivirt wird. (*Blackw.* t. 126. *Plenck* t. 663. *Schk.* t. 290. *Nouv. Duh.* IV. t. 22.)

Man wendet die Früchte, Maulbeeren (bacacae Mori), mûres (*Gal.*), an. Es sind Beeren, aus vielen von dem fleischig und saftig gewordenen Kelche umgebenen und mit einander verwachsenen kleinen Achenien gebildet, wovon jedes einen Saamen enthält; sie sind eirund, länglich, ziemlich groß, schwärzlichpurpurroth und haben einen süßen Geschmack.

Sucous Mororum. (Br. Gal. His. His3. Pal. Sax. Suec. Wir.)

℞. Fructuum Mori matur. . q. vis.
Contritis inter manus, massam (per setaceum trajectam) ad locum frigidum sepone, donec liquor clarus supernatet et cola exprimendo. Succum depuratum in lagenis longicollibus, strato olei obtectum serva.

Roob Diamorum s. Mororum s. Succus Mororum inspissatus. (A. B*. Br. D. GalF. LH. Li. LP. Lus. Pal. Sar. Sax. Wir. *Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Fruct. Mori matur. . . q. vis.
Tritis in mortario lapideo, massam per dies duos in cavam sepone in vase fictili tecto, exprime deinde fortiter, ad locum frigidum sepone ut succus subsideat, qui per pannum colatus, sub continua agitatione ad mellis consistentiam usque evaporet. (B*. Lus.)

T. Succi Baccarum ad syrupi consist. evaporati libram unam et Sacchari albi uncias tres.

℞. Succi Moror. depur. part. quatuor.
Sacchari albi . . partem unam.
Coque ad mellis consistentiam. (Br. D. Li. Wir. *Sw.*)

Sar. Succi libras quinque et unam Mellis despumati, vel duas Succi et unam Sacchari; — *Gr* Succi quatuor, Mellis duas; — Pal. Sacchari unam et quinque Succi; — A. Succi novem; — Sax. Succi sedecim; — GalF. Sacchari duas; — LH Succi libras sex, Sacchari unam, cocta ad debitam consistentiam in lagenas vaporibus sulphureis repletas, ne fermentent, immitte; — LP. Succi libras quatuor, Mellis boni unam.

Beſonders äußerlich, als austrocknendes Mittel, bei Schwämmchen.

Mel Fructuum s. Baccarum Mororum. (His. His3.)

℞. Succi Moror. nigr libram unam.
Mellis . . . . . libras duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque ad syrupi spissi consist. et cola.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Syrupus Mororum s. de Moris s. Mori nigrae s. de Succo Mororum s. Succi Mori s. Mori. (Ams. Au. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Gal. Gen. Han. HassP. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. Wür. *C. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Mororum nigr. non penitus maturorum,
Sacchari albi, sing. . partes aeq.
Misce leviter agitando et supra ignem lenem colloca, coque parumper et per cribrum sericeum trajice. (Gal.)

Vm. Calefacere simul absque ebullitione Mororum rubrorum et Sacchari, sing. part. aeq., massam calidam supra cribrum effundere, leviter exprimere, colare per linteum et colaturae addere Sacchari q. s. ut syrupi consist. adipiscatur.

℞. Succi Mororum expr., colati et sepositione depur. uncias sedecim.
Sacchari albi libras duas c. dimid.
Fiat blando calore syrupus. (Ams. Bel.)

Br. D. Pal. Wir. et Wür. Succi uncias decem, Sacchari sedecim: — Au. Succi libras quatuor et sex Sacchari; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Pol. Succi uncias viginti et Sacchari libras tres; — *Sw.* Succi uncias sedecim et Sacchari libras tres; — Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Sacchari octarium et libras duas Succi; — Gen. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas cum dimidia; — *Gr.* Succi libras septem, Aquae unam, Coccinellae drachmam, Sacch. albi libras sedecim; praeterea: Fruct. congios octodecim, Succi libras triginta, Sacchari libras triginta quinque

Magnes sequentem agendi modum proposuit:

℞. Fruct. Mori nondum matur.,
Bacc. Rubi paene matur., sing. part. aeq.
Contunde leviter pistilli lignei ope in mortario marmoreo, immitte vasi apto argenteo cum Aquae dest. parte quinquagesima; coque per aliquot momenta, per crinium trajice absque expressione et per duos ad tres dies sepone ut subsideant; decantha, in lagenas Succi partem circiter decimam ponderis Moror. nigr. integrorum et bene matur. continentes, quas obturatas et Aquae immersas per horae quadrantem calefac et remotas serva. Tunc recipe
Succi hujus depurati ac filtrati libram unam.
Sacchari in massis libram unam et uncias decem.
Fiat leni calore solutio extemporanea.

Vm. solvere balnei aquae ope Sacchari partes tredecim in Succi saliti octo. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Moschus.

Biſam, Moſchus; Musc. (*Gal.*); Musk (*Ang.*); Mischk (*Ar. Duk Pe.*); Rutta urula (*Cy.*), Desmer (*D.*); Almizele

(*His.*); Kustowrie (*Hin.*); Muscus (*Bel.*); Moschio (*I.*); Dedes (*Ja.*); Almiscar (*Lus.*); Jebat (*Mal.*); Pizmo (*Pol.*); Casturi (*Sa. Tam. Tel.*); Desman, Mysk (*Sa.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RG. Sax. Suec. Wir. Würr. WW. *A Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.*

Ein ziemlich derber und körniger bräunlichschwarzer Stoff von bitterem gewürzhaften Geschmack und von sehr starkem Geruch, welcher von den Wänden einer vor der Vorhaut des Moschus moschiferus, L., eines wiederkäuenden Säugethieres Asiens (*Schreber* Säugth. CCXLII. A. B.), liegenden Tasche abgesondert wird. (Moschus in granis s. in vesica.)

Der Moschus enthält, nach Blondeau und Guibourt, Ammoniak, Stain, Stearin, Cholesterin, ein flüchtiges Oel, Gallerte, Eiweiß, eine unbestimmte Säure ꝛc. Er zersetzt salpetersaures Silber, schwefelsaures Eisen, Aetzsublimat, den Aufguß der gelben China.

Reizend, flüchtig, krampfstillend, besonders bei Hysterie, Epilepsie, Keuchhusten, Wasserscheu, Starrkrampf empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Pulvis Moschi opiatus. (*Au.*)

℞. Moschi . . grana triginta duo.
Opii . . . . . grana quatuor.
Sacchari . . drachmam unam.
Divide in partes duodecim. — Gabe, stündlich oder öfter ein Stück.

Pulvis aphrodisiacus. (*Pie.*)

℞. Cinnamomi . . . . semunciam.
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Piperis longi, sing. . drachmam.
Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias quatuor

Boli antispasmodici. (*Bo. Ca. E. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Moschi grana decem ad quindecim.
Conserv. Cort. Aurant semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Addere potes, si necesse, Camphorae grana octo. (*Sw.*)

Sa. Moschi semiscrupulum, Conservae dictae semidrachmam et Syrupum Sacchari.

℞. Moschi . . . . grana decem.
Cinnabaris . . . grana quinque
Conserv. Flor. Aurant. . . q. s.
Fiant unus vel duo boli. (*Ca. Sm.*)

℞. Moschi,
Nitri, sing. . . . . grana sex.
Camphorae . . grana quatuor.
Conservae Valerianae . . . q. s.
Fiant boli quatuor. (*Bo.*)

Pulvis Moschi. (Sar.)

℞. Moschi . . . . grana quatuor.
Sacchari Lactis . . grana octo.
Misce. — Auf eine Gabe.

Pulvis antispasmodicus s. Moschi compositus s. alexipharmacus Sinicus s. Sinensis s. antiπyssicus Tunchinensis s. Tunquinensis. (B*. GalH. Hass. LP R. Wir. Würr. *Au. Ca. Gr. Pid. Re. Sp. Vm.*)

℞. Moschi . . . . grana sedecim.
Cinnabaris . . grana duodecim.
Misce. (B* Wir.) — Die Chinesen nehmen diese Gabe in einem Löffel Branntwein als Mittel gegen die Wuth.

Sp. Moschi partem unam et duas Cinnabaris; — Piberit hat diese Formel auf folgende Weise verändert.

℞. Moschi . . . . grana sedecim.
Rad. Valerianae scrupulum unum.
Camphorae . . . . grana sex.
Fiat pulvis. (B*. GalH Hass. R. Wir. *Au. Ca. Gr. Pid. Re.*)

Vm. Moschi partes octo, Valerianae decem et Camphorae tres; — LP. Valerianae drachmam unam, Moschi scrupulum unum, Camphorae in Alcohole humefactae grana duodecim

℞. Moschi . . . drachmam unam.
Flor. Zinci grana viginti quatuor.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce triturando. (Würr.)

℞. Moschi . . . grana quindecim.
Camphorae . . grana quinque.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat bolus unus. (*E.*)

℞. Moschi,
Ammonii subcarb., sing. semiscrupulum.
Conservae Rosarum . . . q s.
Fiat bolus unus. (*E.*)

Emplastrum moschatum. (*Au.*)

℞. Cerae albae,
Cetacei, sing. . . . semunciam.
Camphorae . . semidrachmam.
Castorei,
Moschi, sing. scrupulum unum.
Olei Cajeput . . guttas decem.
Liquefiant. — Gegen Zahnschmerzen.

Pulvis antispasmodicus. (*Va.* Hosp. d'Allem.)

℞. Moschi . . grana triginta duo.
Opii . . . . . grana quatuor.
Sacchari . . drachmam unam.

Misce, divide in partes 12. — Alle Stunden 1 Stück.

Pilulae Moschi s. antispasmodicae s. excitantes antispasmodicae s. antihystericae s. emmenagogae s. ad putredinem nosocomialem. (B*. LH. *Au. B. Ra. Sm. Va.*)

℞. Moschi . . . . drachmas duas.
Florum Zinci . drachmam unam.
Fiant pilulae triginta. (*Ra.*) — Bei allen sogenannten nervösen Krankheiten anwendbar.

Va. Hosp. St. Ant. Pilulas triginta sex parare. (Acht bis zehen Stück täglich.)

℞. Moschi . . . . semigranum.
Asae foetidae . . . grana duo.
Fiat pilula una. (*Ra.*)

Au. Moschi drachmas duas et sex Asae ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe vierzig bis sechszig Stück täglich zwei Mal.

℞. Moschi . . . . granum unum.
Asae foetidae,
G. Ammoniaci, sing. . grana duo.
Pulveris Valerianae . grana octo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae duae. (*Ra.*)

℞. Moschi . . . grana quindecim.
Nitri,
Asae foetidae, sing. . scrup. duos.
Extracti Chinae,
— Catechu, sing. drach. duas.
Fiant pilulae granorum sex. (*Ra.*)

℞. Moschi . . . . . grana octo.
Ammon. subcarb. ol.
grana quinque.
Mucilag. Gummi Arabici q. s.
Fiat massa pilularis. (B*) — Nach White's Beispiel hat Lentin diese Pillen mit Erfolg gegen Sphacelus gebraucht. Dupuytren wendet die folgenden gegen Hospitalfäulniß an.

℞. Camphorae grana viginti quatuor
Moschi . . . . . grana octo.
Extracti Opii . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Ra.*)

℞. Moschi,
Ambrae gris., sing. scrup. unum.
Opii purificati . . . grana tria.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae viginti quatuor. (*Sm.*) — Gabe, sechs Stück täglich auf drei Mal

℞. Moschi . . . . semiscrupulum.
Camphorae . scrupulum unum.
G. Ammoniaci . scrupulos duos.
Opii purificati . grana quatuor.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sm.*) — Gabe, drei oder vier Stück täglich, bei Hysterie und Hypochondrie.

℞. Moschi . grana viginti quatuor.
Extr. Opii . . grana duodecim.
— Valerianae
gr vigiuti quatuor.
Fiant pilulae sedecim. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Moschi,
Camphorae, sing. granum unum.
Arnicae pulveratae grana quatuor.
Opii puri . . . . semigranum.
Fiat cum Syrupi communis sufficiente quantitate pilula. — Gabe, ein Stück, nach den Umständen zu wiederholen. (LH.)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Roob Juniperi . quantum sufficit.
Fiant pilulae novem. — Gabe, stündlich ein Stück. (*B.*)

℞. Moschi . . . . . grana octo.
Salis volat. C. C. grana quinque.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.
Fiat pilula una. (*Au.*)

℞. Extr. Myrrhae aquosi
drach. unam.
— Aloës aquosi semidrachmam.
Camphorae . . . grana decem.
Moschi . . . . grana viginti.
Balsami Peruviani quantum sufficit.
Fiant pilulae. (*Pie.*) — Barthez verordnete sie als emmenagogisch, zu vier und zwanzig Gran täglich, auf drei Mal, mit Rautenabkochung.

℞. Radicis Colombo semidrachmam.
Kali subcarb. . scrupulum unum.
Extracti Opii gummosi grana duo.
— Hyoscyami albi,
Ambrae griseae, sing. . grana sex.
Moschi . . . . grana quatuor.
Olei ess. Menthae . scrup. unum.
Syrupi Florum Aurantii . . q. s.
Fiant pilulae viginti quinque. (*Bo.*) — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden.

Tabellae aphrodisiacae s. vitae. (*B. Pie. Sm.*)

℞. Confect. Alchermes . drach. duas.
Ambrae griseae,
Moschi, sing. . drachmam unam.
Sacchari . . . . libram unam.
Fiant tabellae ponderis scrupuli unius. — Gabe, drei Stück täglich auf drei Mal. Diese Täfelchen können Gefahr bringen, besonders wenn sie außerdem Canthariden-pulver enthalten.

Globuli moschati. (Br. Ful. Li. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi . . . uncias sex.
Amyli . . . . drachmas duas.
Iridis Florentinae drachmam unam.
Moschi . . . . . grana duo.
Mucil. G. Tragacanth. . . q. s.
Fiant globuli diversae magnitudinis ab illa seminis pisi ad illam globuli

sclopetae usque. — Si massae Laccae pictoriae unciam dimidiam addas, habes *Globulos moschatos rubros.* (Wir.) Man gebrauchte sie ehedem als Stuhlzäpfchen.

Trochisci Galliae moschatae s. aliptae moschatae s. moschati. (Wir.)

℞. Ambrae griseae . drachmas tres.
Ligni Aloës . drachmas quinque.
Moschi . . . drachmam unam.
Sacchari albi . . unciam unam.
Mucil. G. Tragacanth. . . q. s.
ut fiant trochisci. — Man setzt sie Pulvern und andern Präparaten als Aroma hinzu.

℞. Storacis Calamita uncias quatuor.
Ladani,
Benzoës, sing. . unciam unam.
Ligni Aloës . . drachmas sex.
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Moschi . . . scrupulum unum.
Ambrae griseae drachmam unam.
Mucil. G. Tragac. c. Aq. Ros. par. quant. s.
Fiant trochisci. — Man wendet sie nur zu Räucherungen an; ehedem gab man sie auch gegen Asthma, bei Kindern zu einem, zwei oder drei Gran.

Trochisci Mogolici. (*Ca.*)

℞. Sacchari uncias tres cum dimidia.
Gummi Arabici . unciam unam.
Extr. Opii sicci drachmas septem.
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucis moschatae, sing. drachmas duas cum dimidia.
Moschi . . . . grana quinque.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant trochisci granorum sex. — Reizend, magenstärkend. — Gabe, zwei Stück Abends bei'm Schlafengehen.

Lapis de Goa. (Wir.)

℞. Corallii albi,
— rubri,
Bezoar orient., sing. unciam unam.
Margaritarum orientalium,
Hyacinthi praeparati,
Topazii,
Sapphiri,
Rubini, sing. . . . semunciam.
Smaragdi,
Moschi,
Ambrae gris., sing. drachmas duas.
Folia Auri . . . . . no. 40.
Gelatinae Cornu Cervi . . q. s.
ut fiat pasta, in globulos ovales formanda, qui siccati poliendo nitentes reddantur.

Dieses lächerliche Präparat kam aus Indien und wurde von den Jesuiten einige Zeit lang geheim gehalten; es sollte gegen Krämpfe und Epilepsie wirksam seyn. — Gabe, von einem halben bis zu einem ganzen Scrupel und bis zur halben Drachme.

Mixtura moschata s. Moschi s. stimulans antispasmodica, Julapium Moschi s. moschatum s. antihystericum, Potio s. Mistura antispasmodica. (Am. B°. Han. His. His3. LH. Lon. LonN. Lus. *Au. B. Br. C. Ca. E. Gr. Pie. Ra. Re. Sa. Sw. Va.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Sacchari . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias duas.
Misce. (*Ra.*)
Han Moschi grana duodecim, Sacchari drachmam et Aquae Rosarum uncias sex.

℞. Moschi . . . . scrupulos duos.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. . drachmam.
Tritura moschum cum saccharo, deinde cum gummi et aquam sensim adde. (Am. B°. Lus. *Br. C. E.*)
LH. Moschi grana tria, Sacchari albi, Gummi Arabici, singulorum semiscrupulum, Aquae Rosarum unciam unam; — Lon. LonN. *Gr Re. Va.* Moschi, Sacchari, Gummi Arabici, sing. drachmam et Aquae Rosarum uncias sex.

℞. Moschi . . . scrupulos duos.
G. Arab. in Aqua sol. drachmam.
Spir. Juniperi comp. unciam unam.
Syrupi Sacchari . drachmas tres.
Aq. Menthae virid. unc. quinque.
Misce. (*Sw.*)
Sa. Moschi scrupulos duos, Mucilaginis drachmam, Spir. Juniperi comp. semunciam, Syrupi drachmas tres et Aquae Pulegii uncias quinque.

℞. Camphorae . , semidrachmam.
Moschi . grana viginti quinque.
Sacchari albi,
Mucil. G. Tragac., sing. drachmam.
Aceti . . . . . semunciam.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Syrupi Limonum unciam unam.
Misce. (*Pie*)

℞. Moschi . . . . . grana sex.
Sacchari . . drachmam unam.
Contere et adde
Aquae Rosarum,
— Melissae, sing. uncias duas.
Syrupi Aetheris . unciam unam.
Misce bene. (*Pie*)

℞. Aquae Rosarum . . uncias sex.
— Cinnamomi hordeatae,
— Paeoniae compositae,

Syrupi Dianthi, sing. uncias duas.
Aquae Flor. Aurant. unciam unam.
Confect. Alchermes drach. unam.
Croci . . . scrupulum unum.
Moschi,
Ambrae griseae,
Ammonii subcarb., sing.
grana duo.
Essent. Caryophyllor. gutt. unam.
Misce. (*Ca. Pie.*)

℞. Florum Aurantii,
Caryophyllorum,
Croci, sing. . scrupulum unum.
Aquae . . . . . libram unam.
Infunde per horam unam et colaturae adde
Moschi,
Ambrae griseae, sing. grana duo.
Ammonii subcarb. granum unum.
Confect. Alchermes drachmas duas.
Syrupi Sacchari . sesquiunciam.
Misce bene. (*His. Hi3.*)

℞. Camphorae . . drachmas duas.
Moschi . . . scrupulum unum.
Salis volat. C. C. grana sedecim.
Syr. Cort. Auraut. unciam unam.
Aquae Citri . . . uncias tres.
Stündlich löffelweiſe zu nehmen. (*B.*)

℞. Aquae Menthae piperitae,
— Citri, sing. . uncias duas.
Moschi . . . . . grana octo.
Liquoris Hoffmanni,
Spir. C. C. succin., sing.
semidrachmam.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Moschi . . . scrupulum unum.
Gummi Arabici . semidrachmam.
Aquae Rosae . . unciam unam.
Aetheris sulphurici . drachmam.
Auf eine Gabe, nach Umſtänden. (*Gr.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Aquae Menthae pip. uncias tres.
Syr. Cort. Aurant. unciam unam.
Gabe, ſtündlich ein Kaffeelöffel. (*B. Va.*)

℞. Aquae Melissae,
— Cinnamomi, sing. unc. duas.
Camphorae . scrupulum unum.
Moschi,
Salis vol. C. C., sing.
grana quindecim.
Syrupi Narcotini unciam unam.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari albi . drachmas duas.
Mucilag. Gummi Arab.
semunciam.
Aq. Cinnamomi,
— Menthae pip., sing. unc. duas.
— aromaticae . drachmas duas.
Löffelweiſe zu nehmen. (*Au.*)

℞. Moschi . . . scrupulum unum.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae Rosarum . uncias octo.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Olei Cajeput . . guttas viginti.
Löffelweiſe zu nehmen. (*Au.*)

℞. Moschi . . . . . grana sex.
Sacchari . . drachmam unam.
Liq. Ammonii succ. gutt. sexaginta.
Laudani Sydenhami guttas viginti.
Aq. Flor. Sambuci uncias quinque.
Syrupi Amygdalarum unciam unam.
Stündlich löffelweiſe zu nehmen. (*Au.*)

Clyster s. Enema antispasmodicum. (*E. Pie. Sw.*)

℞. Moschi . . . grana duodecim.
Sacchari . . . scrupulos duos.
Gummi Arabici sesquiscrupulum.
Ammoniaci liquidi guttas triginta.
Aquae Seminis Lini uncias quatuor.
Misce. (*E.*)

℞. Infusi Valerianae uncias quatuor.
Moschi . . . drachmam unam.
Misce et adde, si necesse est, Tincturae sedativae guttas quadraginta ad sexaginta. (*Pie. Sw.*)

Oleum Moschi. (*T.*)

℞. Moschi . . . . . uncias duas.
Olei Olivarum . . libram unam.
Macera calore 25—30° Cent. in lagena vitrea, filtra leviter exprimendo, et sepositione in vase clauso clarificatum post dies aliquot decantha.

Tinctura Moschi vinosa. (B*.)

℞. Moschi pulverati unciam unam.
Vini Hispanici . . . uncias sex.
Tritura moschum cum una uncia vini ad dissolutionem usque, adde deinde liquoris quod restat et post macerationem per horas viginti quatuor in lagena bene obturata filtra.
Krampfſtillend.

Tinctura s. Essentia Moschi s. moschata. (Am. B*. Bor4. DD. Du. Gal. Han. HassP. RC. *C. Gr. Re. T.*)

℞. Moschi . . . . partem unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.
Post sex dies digestionis filtra. (DD. Gal.)

Am. B*. Du. *C. Gr. Re.* Moschi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarium unum et octo dies digestionis; — Han. Moschi drachmas duas et Spiritus rectif. uncias octo; — Bor4. Moschi drachmam, Spiritus Vini alcohol. uncias sex (tres et Aq. destill. tantidem *Dulk.*) et digestionem per octiduum (ad perf. moschi solut. *Dulk*); — HassP. Moschi drachmam, Spiritus Vini rectif. unciam, macera per septimanam; pondus tincturae filtratae unciam

unam aequet; — T. Moschi scrupulos quatuor, Alcoholis 30° B. uncias duas; — RC. Moschi drachmas duas, Alcoholis libram.

Gabe, dreißig bis ſechzig Tropfen täglich mehrmals.

Tinctura Moschi aetherea. (Gal.)

℞. Moschi . . . . drachmas duas.
Aetheris sulph. (46°) unc. unam.
Macera per duos dies et liquorem alio vasi infunde.

Eau de Maréchale (*Gr. Re.*): Moschi grana viginti, Ess. Bergam., Ol. Lavand, Ol. Caryophyll., sing. unciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Sassafr guttas quindecim, Ol. Origani guttas viginti, Spir. Vin. rect. octarios quatuor, misce; — *Gr.* praeterea: Ess. Viol. unciam, Ess. Bergam., Ess Caryoph., sing. drachmas duas, Aquae Flor. Aur. uncias octo absque moscho.

Eau de millefleurs (*Gr.*): Spir. rectif. octarios quatuor, Moschi grana decem, Ess. Limon. sesquiunciam, Ess. Ambr. gris. uncias duas, Ol. Caryoph., Ol. Lavand, sing. unciam; — *Re.* Moschi grana viginti vel Cystor. Mosch. drachmam, Aquae Angelicae octarios duos, Ess. Ambr. gris. guttas aliquot.

Potio antispasmodica (*Va.*): Tinct. Moschi guttas quindecim, Aq. dest ll. Paeoniae et Tiliae, sing. uncias duas, Syrupi Capilli Veneris unam. — Löffelweiſe ſtündlich.

Balsamum Lectorense s. de Leictour s. de Vinceguère s. de Condom. (*Sp.*)

℞. Camphorae,
Croci, singulorum drachmam unam.
Moschi,
Ambrae, sing. . semidrachmam
Petrolei albi,
Olei ess. Lavandulae,
— — Terebinthinae,
— — Baccarum Juniperi,
— — Caryophyll., sing. unciam.
— — Macidis,
— — Nucis mosch., sing drach. duas.
— — Benzoës . semunciam.
Infunde et oleum si requiritur, decantha.

Schmerzſtillend, nervenſtärkend, balſamiſch.

Pulvis sternutatorius albus, Oleosaccharum cephalicum. (Wir.)

℞. Sacchari albi . uncias duodecim.
Ambrae griseae,
Moschi, sing. . semiscrupulum.
Olei ess. Cinnamomi,
Olei ess. Caryophyll., sing. gutt. quindecim.
— — Anisi,
— — Rorismarini,
— — Lavandulae,
— — Majoranae, sing. semidrachmam.
— — Ligni Rhodii,
— — Succini, sing. scrup. unum.
Dissolve ambram in oleis et moschum in Olei Rosarum parva quantitate, tunc omnia cum saccharo commisce.

℞. Olei ess. Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Ligni Rhodii, sing. gutt. tres.
— — Cinnamomi,
— — Citri,
— — Foeniculi,
— — Lavand., sing. gutt. duas.
Moschi . . . . . grana tria.
Sacchari albi uncias tres c. dimid.
Misce exacte —

Als Nieſemittel, ſo wie bei krampfhaften Affectionen und Lähmungen der Zunge angewendet — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme

Aqua Angelica. (Angel. Water). (*Re.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum,
— Rosarum, sing. octarium unum.
— Myrti. . . semioctarium.
Spiritus Moschi destillati drachmas duas.
— Ambrae . unciam unam.
Misce conquassando. — Parfüm.

Mudar.

Madar, von Asclepias gigantea oder Calotropis Mudarii, *Browne* (Asclepiadeae), einer in Hindoſtan wachſenden Pflanze

Die eingedickte Milch wird gegen lepra angewendet (*Gr.*). — Die Rinde der Wurzel (Radix Mudarii), wirkt der Ipecacuanha ähnlich; in Hindoſtan iſt ſie ſchon lange gegen Hautkrankheiten, beſonders elephantiasis, lepra, Syphilis und Bandwurm in Gebrauch. Der Extractivſtoff oder das Mudarin (Mudarinum) bewirkt, zu 1 Gran auf 3 Mal genommen, ſchnelles und reichliches Erbrechen. (Notiz. d. Nat. u. Heilk. XXVI. S. 92.)

Mungos.

Ophiorrhiza Mungos, *L.*; Indiſche Schlangenwurz; Mungos (*Gal.*); Indian snake root (*Ang.*); Mendi, Wal eka-

weriya (*Cy.*); Slangerod (*D.*); Raiz de serpiente (*His.*); Ostindische Schlangenwortel (*Bel.*); Radice di serpe (*I.*); Kajo ular (*Jav.*); Colubrina (*Lus.*); Ormrot (*Suec.*).

Br. His. His3. Wir. *A. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, *J.*) Eine Indische Pflanze. (*Plenck.* Pl. med. t. 90.)

Man wendet die Wurzel (Radix Mungos s. Serpentum) an; sie ist einfach, gewunden, geringelt, hat eine runzlige, porose Rinde und keinen Geruch, aber einen sehr bittern Geschmack.

Ehemals betrachtete man sie als specificum gegen den Biß giftiger Thiere und demnach als ein Gegengift.

Von O. lanceolata wird die Wurzel auf gleiche Weise benutzt. (*Gr.*)

Muscari.

Muscari ambrosiacum; Muskatenhyacinth; Muscari odorant, Jacinthe musquée (*Gal.*); Muskeerende hyacinth (*Bel.*)

A. Fer.

4 (Hexandria Monogynia, L.; (Asphodeleae, *J.*) Eine in der Levante einheimische Pflanze. (*Kniph.* Bot. orig. cent. 10 t. 52.)

Die Wurzel, welche man anwendet, ist dick und bitter. Sie gilt für ein Brechmittel.

Myristica.

Myristica aromatica, Mur. (*M. officinalis, moschata*); Muskatbaum; Muscadier (*Gal.*).

Ein Baum (Dioecia Monadelphia, L.; Myristiceae;; *Cand.*) welcher auf den Molucken wächst. (*Blackw.* t 353 *Plenck.* t. 425. *Lam.* III t 832. 833. *Hayne* IX. 12. Fl. méd. VI. 242.)

Man wendet den Saamen und dessen Umschlag (arillus) an

Der Saame führt den Namen Nux moschata s. Myristica, Myristicae Nuclei, Myristicae moschatae Fructus nucleus; Muskatnuß; Noix muscade (*Gal.*); Nutmeg (*Ang.*); Jowzalteib (*Ar.*); Muskatowakulka (*B.*); Bu-wah-pa (*Ba.*); Jayaphala (*Be.*); Jatipullum, Sadikka (*Cy.*); Muskad (*D.*); Japhul (*Duk.*); Nuez de especia (*His.*); Jaephal, Jaiphul (*Hin.*); Moskaatnooten (*Bel.*); Noce moscada (*I.*); Wohpala (*Jav.*); Japhul (*Mah.*); Buahpala (*Mal.*); Noz moscada (*Lus.*); Jouz bewa (*Pe.*); Jatiphala (*Sa.*); Muskot (*Suec.*); Jadicai (*Tam.*); Jajikaia (*Tel.*); Gasori (*Tem.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.* Z.

Ein eirundlänglicher, etwas abgerundeter, mit einem röthlichen Fellchen bedeckter, weißlicher, an der Spitze mit braunen Puncten besprengter Kern, welcher ein weißes, öliges Fleisch besitzt. Er steckt in einer harten, dünnen, braunen oder schwärzlichen, zerbrechlichen, überall unregelmäßig gefurchten Schaale. Der Geruch ist sehr angenehm, der Geschmack brennend, gewürzhaft und etwas fettig.

Der Umschlag oder die zwischen der Nuß und der Schaale liegende Hülle

Macis s. Flores Macidis; Muskatenblüthen; Macis, Fleurs de muscade (*Gal.*); Mace (*Ang.*); Talzuffur (*Ar.*); Bunga pala (*Ba*); Foely (*Bel.*); Wassawasie (*Cy.*); Jawatrie (*Duk. Hin.*); Macias (*His.*); Kambang pala (*Ja.*); Bunga bua pala (*Mal.*); Bezbaz (*Pe.*); Flor de noamoscida (*Lus.*); Jatipatri (*Sa.*); Jadiputrie (*Tam.*); Japatri (*Tel.*).

Ams. An. B Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *A. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sa. Sp. Va.*

ist eine lappige, gleichsam netzartige, dünne, knorpelige, halbdurchsichtige, safrangelbe Haut von muskatähnlichem Geruch und Geschmack.

Ein kräftiges Reizmittel, welches aber mehr in der Küche als in der Medicin angewendet wird. — Gabe des Pulvers, zehen Gran bis ein Scrupel Die Muskatblüthen sind weit weniger wirksam als die Nuß.

Pulvis antihectico-scrophulosus s. ex Baccis Lauri compositus s. Nucum moschatarum compositus. (B*)

℞. Pulveris Nucis moschatae,
— Baccarum Lauri tostarum,
— Cornu Cervi calcinati,
singulorum unciam unam.
— Rad. Liquiritiae unc. tres.

Gabe, ein halber Kaffeelöffel, zweimal täglich, für Kinder von einem Jahre, zwei- und vierjährigen einen ganzen Löffel.

Bolus aromaticus. (*Sa.*)

℞. Nucis moschatae scrupulum unum.
Diascordii . . . scrupulos duos.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Misce bene.

Aqua Nucis moschatae. (*Gr.*)

℞. Nucis moschatae unciam unam.
Aquae . . . . . q. s.
Destillando congium abstrahe. — Bei anfangender Phthisis gebraucht.

Spiritus Nucis moschatae s. Myristicae s. Myristicae moschatae s. Myristicae aromaticae, Aqua Nucis moschatae spirituosa. (Ed. Du. Li. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Nucis moschatae . uncias duas.
Aquae Vitae libr. novem (congium).
Post duos dies (unum Lon.) macerationis adde
Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; destillent librae novem (congius). (Du. Ed. Lon. LonN. *C. Re.*)

Li. Nucis uncias duas, Alcoholis libras quatuor, Aquae tantidem et horas 24 macerationis; destillent librae quatuor.

Spiritus Nucis moschatae compositus. (*Vm.*)

℞. Nucis moschatae . partes duas.
Corticis Citri,
— Aurantii,
Melissae,
Menthae crisp., sing. part. unam.
Aquae Vitae part. sexaginta quatuor.
— purae partes centum nonaginta duas.
Destillent partes octoginta.

Tinctura Nucis moschatae (*Gr.*): Nucis mosch. sesquiunciam, Spir. tenuioris octarium: macera per dies quatuordecim; — *Essentia Nuc. mosch.* (*Gr.*): Olei Nucistae unciam dimid. ad unam, Spir. Vini octarium; (*Re.*): Nucis mosch. uncias tres, Spir. Vit. mens. quart dictam per dies quatuordecim macerare, subinde agitando et liquorem clarum defundendo.

Aqua aromatica spirituosa. (Ful.)

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Corticis Aurantii,
Zingiberis,
Kali subcarb., sing. unciam unam.
Aquae Vitae . . libras sex.
— purae . . . libras duas.
Post horas 24 digestionis destillent in balneo aquae librae quatuor.

Reizend, krampfstillend, blähungtreibend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Aqua nephritica (*Gr.*): Flor. Spinae alb. recent. libras quatuor, Nucis mosch. uncias tres, Vini albi congios duos, destill. octarii duodecim.

Syrupus Nucistae s. Nucum moschatarum. (Wir. *Gr.*)

℞. Nucis mosch. pulv. uncias duas.
Vini Burgundici . libram unam.
Digere in vase tecto per dies tres, cola exprimendo et in colatura solve
Sacchari albi . uncias sedecim.
Gr. Nucis mosch. drachmas tres, Vini albi libram, Sacchari sesquilibram.
Blähungtreibend, magenstärkend.

Syrupus Macidis. (*T.*)

Ut syrupus Cinnamomi paratur.

Tinctura s. Essentia Macidis s. Macis. (Br. Han. HassP. Pal. Sax. *Re. T.*)

℞. Macidis . . . . partem unam.
Spiritus Vini rectif. partes decem.
Digere blando calore per dies octo, cola exprimendo et filtra. (Sax.)
Br. Macidis partes tres et Spiritus sedecim; Han. Macidis uncias quinque et Spiritus libras duas; — HassP. *T.* Macidis uncias quatuor, Spiritus libras duas; — *Re.* ut essent. nucis mosch.

℞. Macidis . . . uncias quatuor.
Liquoris Kali subcarb. unc. duas.
Digere ad completam desiccationem usque, residuo infunde
Spiritus Vini rectificati libras duas.
Post sufficientem digestionem destillent in balneo arenae, pluribus vicibus cohobentur nec unquam ad siccum destillata; productum infunde supra
Macidis quantitatem arbitrariam.
Post aliquot tempus filtra. (Pal.)

Reizend, magenstärkend, auf den Uterus und gegen Kolik wirkend. — Gabe, dreißig Tropfen und mehr.

Oleum Nucistae s. Nucis moschatae, Oleum aethereo-pingue Nucleorum Myristicae moschatae, Oleum s. Balsamum Nucistae expressum, Oleum Macis in ollis s. Moschatae s. Myristicae Nuclei expressum, — Oleum Macis expressum verum, Butyrum Nucistae.

1) Wie man es im Handel findet: (Bor4. D. Du. HassP. Lon. LonN. O. Wir. *Gr. Re.*)

2) Eigens bereitet. (A. Ba. Bor. Br. D. Fer Ful Gal. Hass. His. HisS O. Pal. Sax. Wir. *Br. Gr. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae raspatae q. vis.
Tritura in mortario marmoreo calefacto ut fiat pasta mollis, quam sacco e crinibus confecto inter duas laminas stanneas calidas comprime; oleum de-

funde et per linteum trajice. (Fer. His. His3. *T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.
Contunde in mortario marmoreo leviter calefacto, tum sacco e crine confecto inclusam, vapori Aquae bull. expone, prelo submitte inter laminas stanneas calefactas et oleum super igne liqua. (Ba. Bor. Br. D. Ful. Hass. O. Pal. Wir. *Br. Pid. Sw.*)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.
Contunde lente in mortario, tere deinde supra lapidem calefactum, coque in Aqua, donec oleum supernatet, quod, refrigeratione concretum collige. (Gal.)

Gr. Oleum vel Butyrum in destillatione Olei aetherei supernatans colligere.

Reizend, magenstärkend, schmerzstillend, krampfwidrig, blähungtreibend. — Gabe, ein oder zwei Gran für Kinder, anderthalb Scrupel für Erwachsene.

Oleum Nucistae aethereum s. Nucis moschatae destillatum s. stillatitium, Aethereoleum Nucistae. (An. Br. Hass. His. His3. Pal. R. Sax. Wür. *Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.*)

℞. Nucis moschatae . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Post tres dies infusionis destillent et oleum separetur. (R. *Br.*)

Wür. Nucis partem unam, et quatuor Aquae; — *Vm.* Aquae octo; — An. Nucis tres et decem Aquae; — His His3. Nucis unam et quadraginta Aquae; — Sar. Nucis libram unam, Aquae octo et Salis uncias tres; — Br. Hass. Pal. et *Pid.* Nucis libram unam, Aquae octo et uncias duas Salis; — *T.* ut oleum coriandri.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Oleum Macidis aethereum s. destillatum s. stillatitium, Aethereoleum Macidis. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Macidis . . . . quantum vis.
Aquae purae . quantum sufficit.
Post sufficientem infusionem destillent. (R.)

Sax. et Wür. Macidis partem unam et quatuor Aquae; — D. et Ful. Aquae sex; — Bor. Han. et Pal. octo Aquae; — Ba. Aquae novem; — *Vm.* decem Aquae; — Pal. et Wir. Macidis libras duas, Aquae sedecim et Salis uncias quatuor; — Bor4 oleum venale; — HassP. Macidis, Salis, sing. libras duas, Aquae sedecim; post macerationem per horas duodecim destillentur; — *T.* ut oleum cinnamomi.

Gabe, vier bis zwölf Tropfen.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Macidis. (Br. HassP. Pal. Wir. *Gr. Re.*)

℞. Olei ess. Macidis guttas sedecim.
Sacchari albi . . unciam unam.
Tritura exacte.

Re. Olei guttas decem, Sacchari semunciam.

Balsamum Nucistae. (Br. Sax. Wir.)

℞. Ol. Nucis mosch. expr. drach. duas.
— ess. Nucis mosch. scrup. duos.
Commisce triturando.

Magenstärkend, kopf- und nervenstärkend.

Mixtura contra diarrhoeam s. antidiarrhoeica. (*Pie.*)

℞. Balsami Nucistae drachmam unam.
Theriacae . . . drachmas duas.
Olei essentialis Cumini guttas sex.

Auf die Nabelgegend, dem Magenpflaster ähnlich, aufzulegen.

Linimentum excitans. (B*.)

℞. Olei ess. Nucis moschatae
— — Caryophyll., sing. semidrachmam.
Spiritus Juniperi . uncias duas.

Sparadrap ad corpus conditum involvendum. (*Sp.*)

℞. Cerae alb. unc. centum viginti octo.
Liquatae et semirefrigeratae adde
Ol. Nucis mosch. expr. unc. octo.
— ess. Citri,
— — Neroli,
— — Lavandulae,
— — Thymi, sing. unc. quatuor.
Ambrae griseae grana quindecim.
Moschi . . . . . grana octo.
Zibethi . . . . grana quatuor.
Mixturam supra linteum extende.

Myrobalanus.

Myrobalani; Myrobalanen; Myrobalan. (*Gal.*)

Br. Gal. His. His3. Wir. *A. Br. G. Gr. M Re. Sp.*

Man nennt so vier verschiedene Arten von Früchten:

1) *Myrobalani bellíricae;* Bellirische Myrobalanen; Myrobolans bellirics (*Gal.*); Beleyluj (*Ar.*); Bullu (*Cy.*); Bulla (*Duk.*); Mirobolanos bellíricos (*His.*); Beheyra (*Hin.*); Beleyleh (*Pe.*); Bahira (*Sa.*); Tanikai (*Tam.*).

Es sind eirunde, fast kugelige, olivengroße, dunkelgraulichgelbe Steinfrüchte mit fünf undeutlichen Rippen, welche einen knochigen, dicken, fünfseitigen, unregelmäßi-

gen, am Grunde breiten und ſtumpfen, oben ſpitzigen Kern enthalten.

Sie kommen von Myrobalanus bellirica, *Gärtn.* (Decandria Monogynia, L.; Myrobalaneae, *J.*), einem Oſtindiſchen Baume. (*Roxb.* Corom. t. 198.)

2) *Myrobalani chebulae s. chebuli*; große ſchwarzbraune Myrobalanen; Myrobolans chebules (*Gal.*); Helelije kabuli (*Ar.*); Aralu (*Cy.*); Huldah (*Duk.*); Mirobolanos quebulos (*His.*); Har, Hara, Umbo-d'-her (*Hin.*); Helileh kelan (*Pe.*); Haritaka (*Sa.*); Kadukai (*Tam.*); Carakaia (*Tel.*).

Es ſind eirundlängliche, an beiden Enden dünnere, ſchwärzlichbraune, mit fünf Furchen, welche mit eben ſo viel Rippen abwechſeln, verſehene Steinfrüchte, welche unter einem harten, brüchigen, harzglänzenden Fleiſche einen knochigen, fünfſeitigen Kern und in demſelben einen eirunden, länglichen, ſpitzigen Saamen enthalten.

Myrobalani indicae s. indici s. nigrae; Indiſche Myrobalanen; Myrobolans indiques ou noirs (*Gal.*); Myrobolanos indicos (*His.*);
werden dieſe Früchte genannt, wenn ſie weniger vorgerückt, ſchon vor der vollkommenen Reife eintrocknen, und wahrſcheinlich von irgend einem Inſect geſtochen ſind. Sie ſind nußgroß, dunkelſchwarz, hart, derb und zeigen kaum eine Spur von Kern, an deſſen Stelle man eine kleine Höhle bemerkt. Ihr Geſchmack iſt bitter und abſtringirend.

Dieſe Früchte kommen von Myrobalanus Chebula, *Gärtn.*, einem Oſtindiſchen Baume. (*Gärtn.* de fruct. et sem. t. t. 97 *Lamk.* Enc. méth. t. 849. f. 4.)

3) *Myrobalani citrinae s. citrini s. flavae*; gelbe Myrobalanen; Myrobolans citrins (*Gal.*); Mirobolanos citrinos (*His.*)

Es ſind längliche, ei-, faſt birnförmige, blaßgelbe, ſehr verſchiedeneckige und zwiſchen den Ecken runzliche Steinfrüchte, gleichen inwendig den vorigen ſehr, ſind aber nur eine Spielart davon.

Sie kommen von Myrobalanus citrina, *Gärtn*, einem Baume Oſtindien's. (*Lamk.* Enc. méth t. 849.)

4) *Myrobalani emblicae*; aſchfarbene Myrobalanen; Myrobolans emblics (*Gal.*); Hac min-san, Cay-boung-ngot (*Co.*); Awusadanelli (*Cy.*); Aunla (*Duk.*); Mirobalonos emblicos (*His.*); Anola, Amlej, Aunwerd, Aongra (*Hin.*); Amleh (*Pe.*); Amalaka (*Sa.*); Nellie kai (*Tam.*); Wuscherikaia (*Tel.*).

Es ſind beerenförmige, dreiknöpfige, rundliche Kapſeln von der Größe eines großen Gallapfels, ſchwärzlichgrau, mit ſechs außen in Rippen erhobenen Klappen und welche inwendig ein breiiges Fleiſch mit weißlichen, eckigen Saamen enthalten. Sie beſitzen einen ſauern und abſtringirenden Geſchmack. Sie werden zum Gebrauch geröſtet. (His.)

Sie kommen von Phyllanthus Emblica (Monoecia Triandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*), einem Baume Malabar's. (*Rheede* Mal. I. 31. *Blackw.* t. 400. 401. *Plenck* t. 659.)

Alle dieſe Früchte ſind heutzutage nicht mehr in Gebrauch; ehedem wurden ſie den Purgirmitteln beigezählt. — Gabe des Pulvers, von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

Myrabalani quinque (*Gr.*). Mixtura e Myrobalanis quinque modo indicatis.

Myrrha.

Gummi Myrrhae, *Myrrha rubra*; *Σμύρνα*; Myrrhe, Myrrhengummi, Myrrhenſchleimharz; Myrrhe (*Gal.*); Myrrh (*Eng.*); Murr (*Ar.*); Madu (*Ba.*); Myrrcha (*B.*); Myrrho (*D.*); Hira bol (*Duk.*); Mirra (*His. I.*); Bol (*Hin.*); Madu (*Jav.*); Manisan lebah (*Mal.*); Mirra (*Lus.*); Myrrha (*Pol.*); Vola (*Sa.*); Myrra (*Suec.*); Valatipolum, Palendra bolum, Villey bolum (*Tam.*); Balintra bolum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD Dn. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par Pid. Pa. Re. Sp. T. Va.* Z.

In Körnern, deren Farbe vom Braungelben zum Rothen abwechſelt, halbdurchſichtig, leicht brechend, mit harzigem Bruche, von angenehmem Geruch und bitterm, etwas gewürzhaftem Geſchmack.

Es iſt der verdickte Saft, welcher auf Einſchnitte aus einer auf der Oſtküſte Africa's wachſenden Pflanze, welche nach Forskal eine Art Amyris (Amyris Kataf, *Forsk.*); nach Bruce eine Art Mimosa iſt, ausfließt.

Toniſch, aufregend. — Gabe des Pulvers, von zehn Gran bis zu einer Drachme.

Extractum Myrrhae gummosum s. absque Resina s aquosum. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal Pm. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Myrrhae electae . partem unam.
Aquae purae . . partes quatuor.
Digere in loco calido et vase tecto, tunc sepone ad locum frigidum per horas 24; decantha, cola et leni igne ad aptam consist. consume. (A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. O. Pol. Sax.)

Br. et *Vm.* Myrrhae partem unam et octo Aquae; — Fer. Ful. Hass. Li. Wür. et *Pid.* Aquae sex; — Gal. Sing. q. s.; — *Fi. T.* Myrrhae uncias sex, Aquae bull. libras tres, digestionem leni balnei vaporis calore, duorum dierum sepositionem, decanthationem et evaporationem ad extracti consist.; — Hass. Myrrhae partem unam, Aquae duodecim; — Pm. Myrrhae libram unam cum Aquae communis sex per duodecim horas, saepe miscendo, digerere, colare, filtrare, balneo maris ad syrupi consistentiam evaporare, tunc Glaciei libris duabus superaffundere et filtratione peracta denuo ad siccitatem usque evaporare.

℞. Myrrhae,
Limaturae Ligni, sing. part. unam.
Mixtas coque cum Aquae pondere earum aequali; submitte deinde prelo de Real et quod profluit, ad extracti consistentiam usque inspissa. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . quantum vis.
Pulveratam bis, cum Aquae partibus quatuor quoque vice, contere; emulsiones commisce et lente, agitando continuè, vaporando ad extracti consistentiam consume. (*Vm.*)

℞. Myrrhae electae . . semilibram.
Liq. Kali subcarb. unciam unam.
Misce bene cum spathula lignea et sepone in cavam per dies quatuordecim; tunc massae infunde Aquam calidam et agitatam sepone; liquorem decantha; residuo novam Aquam calidam infunde, donec non amplius coloretur; colaturae commixtae lente ad extracti consist. evaporent. (O. Pal. Sar. Wir.)
Gabe, vier bis zehn Gran täglich mehrmals

Extractum Myrrhae resinosum. (Sar.)

℞. Myrrhae electae . quantum vis.
Tracta cum Alcohole rectificato, tincturam cola, destilla alcoholem in aquae balneo et residuum ad extracti consistentiam consume.

Extractum Myrrhae graminatum s. compositum. (*Sw*.*)

℞. Myrrhae electae . uncias duas.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Pulverata cum Aquae q. s. in emulsionem redige et in hoc liquore solve
Extracti Graminis uncias quatuor.
Bei Lungenschwindsucht und Gebärmuttergeschwüren empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen in Wasser, zwei oder drei Mal täglich.

Saccharum Myrrhae s. myrrhatum, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Myrrhae. (B*. Ful. Li. Wür. *Au. Pid. Sp.*)

℞. Extr. Myrrhae gumm. part. unam.
Sacchari albi . partes quatuor.
Misce exacte. (Ful. Wür. *Pid.*)
B*. et *Sp.* Extracti partem unam et Sacchari albi octo; — Li. Extracti unam et Sacchari Lactis quatuor; — *Au.* Extracti unam et tres Sacchari Lactis.
Magenstärkend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Myrrhae s. e Myrrha compositus, Pulvis ad ulcera tendinum s. emmenagogus s. balsamicus. (Ams. B. Lus. *Au. Bo. Gr. Re. Sw. Va.*)

℞. Myrrhae,
Mastichis, sing. . partes aequales.
Misce ut fiat pulvis. (*Sw.*) — *Re.* Sarcocollam addit. Bei Knochenfraß und Entblößung der Sehnen. Eine gesunde chirurgische Praxis verwirft es.

℞. Myrrhae . . . . semunciam.
Opopanacis,
Sagapeni,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Olei Menthae,
— Rutae, sing. guttas quatuor.
Fiat pulvis. (Ams. B. *Va.*) — Diese Formel hat viel Aehnlichkeit mit der zu den trochisci myrrhae.

℞. Foliorum sicc. Rutae,
— Dictamni Cretici,
Myrrhae, sing. . . sesquiunciam.
Asae foetidae,
Sagapeni,
Castorei Russici,
Opopanacis, sing. . . . unciam.
Pulverata misce. (*Gr.* Lon. ante 1788.)

℞. Myrrhae,
Sabinae,
Rutae,
Castorei, singulorum unciam unam.
Pulverata misce. (Lus. *Re.*)

℞. Myrrhae . . . semidrachmam.
Olibani,
Mastichis, sing. drachmam unam.
Sarcocollae . . drachmas duas.
Colophonii . . . . semunciam.
Fiat pulvis. (*Bo.*)

℞. Myrrhae . . . grana duodecim.
Croci . . . . . grana tria.
Olei Caryophyllor. guttam unam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Boracis . . . grana quindecim.
Myrrhae,
Sabinae, singularum grana quinque.
Croci . . . . . grana tria.
Castorei . . . . . grana duo.
Olei Succini . . guttam unam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Myrrhae,
Sabinae,
Rutae,
Castorei Russici, sing. . unciam.
Pulverata misce. (*Gr.* Lon. post 1788.)

℞. Myrrhae . . . . . grana duo.
Florum Sulphuris grana quinque.
Sacchari albi . . grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (*Au.*)

℞. Extracti Myrrhae aquosi
sesquigranum.
— Opii . . semigranum.
Sacchari albi . . grana decem.
Alle zwei Stunden zu nehmen. (*Au*)

℞. Extr. Myrrhae aquosi
grana duo ad quatuor.
— Digitalis purpureae,
— Hyoscyami, sing semigranum.
Sacchari Lactis . grana decem.
Alle drei Stunden zu nehmen. (*Au*)

Diese Pulver werden äußerlich zur Stillung von Blutflüssen angewendet, innerlich als emmenagoga oder gegen chronische Brustleiden, besonders Schleimschwindsucht.

Sperniola Crollii. (Pal. Wir)

℞. Myrrhae electae,
Olibani, singulorum drachmas duas.
Croci . . . . semidrachmam.
Fiat pulvis subtilissimus, cui bis terve Aqua dest. Seminis Ranae adsperso et tunc siccato in fine adde
Camphorae . . drachmas tres.
Misce. (Wir.)

Pal. vicies vel tricies Aquâ Ranarum imbibere.

Adstringirend, gegen Blutflüsse zu gebrauchen.

Boli Myrrhae. (*Sa.*)

℞. Pulveris Myrrhae,
Conserv. Aurant, sing.
scrup. unum.
Salis Absinthii drachmas quinque.
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiat massa.

℞. Cetacei . . . scrupulos duos.
Myrrhae . . scrupulum unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce sedulò.

Pilulae balsamicae. (Ful. Ham. Li.)

℞. Extr. Rhei comp. scrup. quatuor.
— Myrrhae . scrupulos duos.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

℞. Extracti aquosi Myrrhae,
— — Pini,
— — Saponariae,
G. Hederae pulv., sing.
drachmas sex.
Misce. (Li.)

℞. Saponis Alicantini,
Extr. aquosi Myrrhae,
— — Pini, sing. semunciam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Ful.)
Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Pilulae gummi-resinosae. (RC.)

℞. Asae foetidae,
Myrrhae, singulorum partes octo.
Olei Succini . . partem unam.
Fiat cum syrupo simplici massa. — Gabe, zehen Gran bis zwei Scrupel bei Schlafengehen oder öfter. — Krampfstillend, emmenagogisch.

Pilulae balsamicae martiales. (Ham.)

℞. Massae Pilularum balsamicarum (Ham.) . . . drachmas tres.
Limat. Ferri porphyr. drachmam.
Fiant pilulae granorum duorum.

Pilulae stomachicae s. stomachicae Tronchini. (*Sm. Va.*)

℞. Myrrhae . . drachmas quatuor.
Extr. Centaurii min.
drachmas duas.
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Fiant pilulae ponderis trium granorum. — Gabe, acht bis zwölf Stück täglich, auf drei Mal.

Pilulae Myrrhae amarae cum Ammoniaco. (*Au.*)

℞. Myrrhae,
Gummi Ammoniaci,
Extr. Cardui benedicti,
— Absinthii, sing.
drachmas duas.
Acidi succinici drachmam unam.
Terebinthinae Ven. drachmas tres.
Pulveris Rhei . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs bis zwölf Stück alle drei Stunden oder zweimal täglich, bei Verstopfung und Hypochondrie.

Pilulae Myrrhae cum Arnica s. adstringentes. (*Au. Va.*)

℞. Extr. Myrrhae . drachmas duas.
— Flor. Arnicae drach. unam.
Acidi benzoici . scrupulos duos.
Balsami Copaivae scrupulum unum.
Succi Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs Stück alle zwei oder drei Stunden, bei chronischer Gonorrhöe.

Pilulae Myrrhae et Hyoscyami. (*Va.*)

℞. Extracti Myrrhae sesquidrachmam.
— Hyoscyami,
Scillae siccat., sing
semidrachmam.
Aquae . . . . . q. s.

ut fiant pil. no. 30. — Von Engliſchen Aerzten bei chroniſchen Lungencatarrhen, 2 oder 3 Stück täglich.

Pilulae stimulantes (*Gr.*): Myrrh. sesquidrachmam, Vitr. alb. grana decem, Confect. Rosae q. s. ut f. pil. no. 20. — 2 Stück täglich zwei Mal.

Pilulae roborantes. (*Pie*)

℞. Myrrhae . . drachmas quatuor.
Galbani,
Extracti Trifolii,
Catechu, sing. . drachmas duas.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Fiant pilulae granorum trium. — Tiſſot verordnete ſie gegen beginnende Rückenmarksſchwindſucht; er gab täglich ein und zwanzig Stück auf drei Mal und ließ dann drei Unzen einer Abkochung von zwei Unzen China, einer Unze Kaperwurzelrinde, zwei Drachmen Zimmt und einer halben Unze Eiſenfeile in zwei und einem halben Pfund Waſſer geben.

Electuarium s. Opiatum detergens s. dentifricium. (*Bo. Sp. Va.*)

℞. Myrrhae,
Olibani, sing. . drachmam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Misce. (*Bo. Va.*)
Addi potest Extracti Chinae drachma.
Bei erſchlafftem Zahnfleiſch. (*Va.*)
℞. Myrrhae,
Olibani, singulorum semunciam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Tere cum Vitello Ovi et adde
Pulveris Radicis Liquiritiae q. s.
Misce. (*Sp.*)
Am Ende von Peripneumonie zur Erleichterung des Auswurfs empfohlen. — Gabe, eine Drachme in einem Glaſe warmer Bruſttiſane.

Theriaca officinalis s. pauperum, Electuarium Diatessaron ad usum Artis veterinariae s. pro pecoribus, Theriaca diatessaron, Species diapentes. (Ams. Ful. Pm. Sar. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Radicis Gentianae,
— Aristolochiae rotundae,
Baccarum Lauri,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Mellis despum.
unc. viginti quatuor.
Misce sedulo. (Ams. Sar. *Sp. Vm.*)
Pm. Quatuor priorum ingredientium, singulorum uncias tres, Mellis despumati tepentis libras quatuor; — *Fi.* Quatuor priorum substantiarum et Summit. Centaurii min., sing. partes aeq. absque melle.
℞. Roob Juniperi . uncias quatuor.
Myrrhae in Vino Hisp. solutae,
Pulv. Rad. Angelicae,
— — Aristolochiae longae,
— — Inulae, sing.
uncias duas.
Syr. Corticum Aurantiorum,
— Papaveris albi, sing.
uncias octo.
Misce bene. (Ful.)
Magenſtärkend, ſchweißtreibend, blähungtreibend, die Menſtruation befördernd, giftwidrig. — Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Linimentum gingivale mundificans. (Ful.)

℞. Extracti Myrrhae aquosi,
Spiritus Salis dulc., sing.
drach. duas.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce.

Electuarium ad gingivas s. gingivale. (*Sp.*)

℞. Rad. Tormentillae
sesquidrachmam.
— Caryophyllatae . drachmam.
— Irid. Flor. . semidrachmam.
Herbae Salviae,
— Abrotani,
— Rutae,
Flor. Aquilegiae,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustior., sing. drachmam.
Semin. Cochleariae,
— Aquilegiae, sing.
sesquidrachmam.
Mumiae Aegyptiacae,
Myrrhae, sing. drachmam unam.
Mastichis,
Laccae, singulorum drachmas duas.
Sanguin. Dracon. sesquidrachmam.
Aluminis calcinati semidrachmam.
Mellis rosati . quantum sufficit.
Misce sedulò.
Electuarium gingivale s. dentifricium. (*Gr.*) Laccae in glob. drachmas duas, Aluminis scrup. quatuor, Irid. Flor., Bistort., Flor. Ros. rubr., Myrrh., sing. scrup. duos, Mellis q. s. — *Electuarium gingivale antiscorbuticum* (*Gr.*): G. Laccae in baculis, Myrrh., sing. drachmam, Mellis q. s.

Potassidum Myrrhae, Balsamum Myrrhae. (*Sw*. Vm.*)

℞. Myrrhae pulveratae partes octo.
Potassae caust. fusae part. unam.
Contere, adde sensim Aquae tantum ut totum possit colari, subsidere fac, decantha et lente ad consistentiam balsami consume. (*Vm.*)
Sw.* Lixivii Saponariorum uncias duas et Myrrhae unam.

Aeußerlich, bei Scropheln und Drüſenanſchwellungen

Balsamum vitae. (*Re.*)

℞. Extracti Liquiritiae drachmas duas.
Subcarbonatis Potassae drachmam.
Gummi Myrrhae,
Extracti Aloës pulv., sing. semidrachmam.
Croci . . . . . grana decem.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque ad uncias sex, exprime et adde
Tincturae Cardamomi comp. uncias duas.

Gabe, 1 bis 2 Dr. Laxirmittel.

Unguentum Myrrhae. (*Au. Va. Vm.*)

℞. Balsami Myrrhae partem unam.
Cerati prope ignem mollefacti partes octo.
Triturando commisce. (*Vm.*)

℞. Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Butyri recentis uncias tres (duas *Va.*)
Myrrhae,
Cetacei, singulorum drachmas duas.
Liquatis et colatis adde
Balsami Peruviani semidrachmam.
Misce. (*Au. Va.*)

Man hat dieſe Salbe empfohlen, um den Blatternarben die Empfindlichkeit zu benehmen.

Emplastrum sulphuratum s. Diasulphuris Rulandi (B*. Br. Ful. Pal. Wir. *Pid. Sp.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae flavae . . uncias quinque.
Liquatis lente adde
Pulveris Myrrhae . uncias decem.
Misce bene. (Gal.)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati,
Cerae flavae,
Colophonii, sing. . . uncias sex
Pulveris Myrrhae uncias octodecim.
Liqua et commisce. (B*. Pal. Wir.)

Sp. Balsami, Colophonii, sing. uncias sex, Cerae duas et novem Myrrhae; — *Pid.* Balsami uncias tres, Colophonii drachmas tres, Cerae semunciam et Myrrhae uncias quatuor.

Reizend, auflöſend, ſchmelzend.

Liquor s. Liquamen Myrrhae, Oleum Myrrhae s. Myrrhae per deliquium, Myrrha liquida, Tinctura Myrrhae aquosa, Solutio Myrrhae. (Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Hass. HassP. His. His3. Li. Lus. Pal. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. Sp. Sw.*)

℞. Ovum . . . . . no. 1.
In Aqua bulliente induratum transverse concide, et vitello exempto Myrrham pulveratam immitte, utrasque partes dimidias filo consue, in sacco e tela confecto inclusas in caram sepone et in vase supposito liquidum defluents excipe. (Br. His. His3. Pal. Wir. Wür. *Sp.*)

℞. Myrrhae pulveratae quantum vis.
Album. Ovi cocti pondus duplum.
Fiat terendo cum Aquae calidae pauxillo pasta, quae in sacco e tela confecto ad locum humidum ponatur etc. (*Fi.*) cuique unciae liquoris Spiritus vini uncia una addatur, ne putrefiat.

℞. Myrrhae . . . . partem unam.
Aquae destillatae partes quatuor.
Digere in balneo aquae et per linteum trajice. (Bor. Ham. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Han. Myrrhae partem unam et Aquae duas; — Bor4. Extr. Myrrhae unciam unam, Aquae dest. quinque; solve et liquorem post decanthationem cola; — HassP. Extracti partes tres, Aquae dest. ferv. octo.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.
Olei Cerae . . . . semunciam.
Terendo solve. (*Pid.*)

℞. Myrrhae . . . darchmas tres.
Hydromellis . . . semunciam.
Dissolve. (Lus.)

D. Myrrhae quantum fieri potest in Hydromelle solvere; — Ful. Myrrhae drachmas duas et Hydromellis semunciam.

℞. Extr. Myrrhae aquosi drach. duas.
Mellis . . . drachmam unam.
Aquae . . . . drachmas tres.
Tritura ad perfectam solutionem usque. (Fer. Hass. Li.)

Fi. Aquae unciam unam.

Balſamiſch, fäulnißwidrig, zum Verbinden mancher Geſchwüre

Mistura Myrrhae. (*Gr. Sprague.*)

℞. Myrrhae . . . sesquidrachmam.
Decocti Glycyrrhizae ferventis uncias quinque cum dimidia.
Tere simul et cola. — Gabe, eine Unze zwei oder drei Mal täglich mit subcarb. sod. oder ein Wenig Mineralſäure oder tinct. op. camphor.

Solutio s. Essentia Myrrhae alcalisata; Liquor Myrrhae alcalisatus. (*Sw.*)

℞. Myrrhae . . . . uncias duas.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Natri subcarb. drachmam unam.
Digere in balneo aquae per duos dies, saepius agitando et cola. — Gabe, eine Unze täglich mehrmals.

Liquor stimulans et vulnerarius. (*Sm*.)

℞. Calcis vivae . . . uncias duas.
Myrrhae . . . unciam unam.
Tere in mortario marmoreo, sensim addendo
Aquae . . . . . libras duas.
Digere per dies aliquot et decantha.
Zum Einſpritzen bei fiſtulöſen Geſchwüren.

Tinctura s. Essentia s. Solutio alcoholica Myrrhae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Myrrhae electae . partem unam.
Alcoholis 22° . partes quatuor.
Digere per tres dies (aliquot) et cola. (Gal.)

Ams. Myrrhae partem unam et Alcoholis (0,884) octo; — *Br.* Alcoholis (0,935) octo; — *Sw.* Alcoholis (0,935) sex; — Ba. Alcoholis (0,900) sex; — An. B. et Bel. Alcoholis (20°) octo; — A. Alcoholis (0,850) octo; — Pm. Myrrhae unam, Alcoholis 28° sex et sex dierum digestionem; — LH. Myrrhae uncias tres, Alcoholis 32° libras duas et duos dies digestionis; — LP. *Fi.* Myrrhae uncias duas et Alcoholis (30° *Fi.*) libram unam; — *Gr.* sec. Lon. 1745. Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) libras duas; — *T.* Myrrhae uncias quatuor, Alcoholis 25° B. libras duas; — Ful. HassP. et Lus. Myrrhae partem unam et octo Alcoholis; — Bor. Bor4. D. DD. Fen. Han. His3. O. Pal. R. Suec. Wür. et *Vm.* Alcoholis sex; — Hass. Sax. et *Pid.* Alcoholis quinque; — LonN. *Re.* Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectif. octarios tres; macera per dies quatuordecim.

℞. Myrrhae . . . . . uncias tres.
Alcoholis (0,835) . uncias viginti.
Aquae . . . . uncias decem.
Post octo dies digestionis filtra. (Am. Ed. His. RC. *Gr.*)

Du. Lon. 1788. *Gr.* Myrrhae uncias tres, Alcoholis (0,930) sesquioctarium et Spiritus rectif. (0,840) semioctarium; — Lon. Myrrhae uncias quatuor, Spiritus rectif. octarios duos, Aquae octarium unum, macera per dies quatuordecim; — *Gr.* sec. Lon. 1809. Myrrhae uncias tres, Spir. rectif. duodecim, Aquae semilibram; et sec. Lon. 1815 Myrrhae uncias duas, Spir. rectif. libras duas, Aquae libram unam.

℞. Myrrhae . . . . uncias tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Aquae destillatae . uncias tres.
Contere, sicca, pulvera et digere cum
Alcoholis . . . . libras duabus.
Post sex dies filtra. (Li.)
Reizend, emmenagogiſch, wurmtreibend. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen. — Man bedient ſich dieſer Tinctur auch bisweilen, um die Oberfläche atoniſcher Geſchwüre zu reizen, ſie war in dieſer Hinſicht jedoch mehr bei den Alten in Gebrauch.

Tinctura Myrrhae rubra. (*Gr.*)

℞. Myrrhae . . . . uncias duas.
Coccinellae . . . . semunciam.
Spiritus rectificati
uncias duodecim.
Digere et exprime. — Zur Bereitung des electuarium gingivale.

Tinctura Myrrhae composita. (*Re.*): Myrrhae libram, Aloës uncias octodecim, Spir. rectif. congium, Aquae octarios quatuor, macera per dies quatuordecim, saepius agitando. (Pharm. Veterin. Coll.) — *Gr.* Aloës, Myrrh., sing. unciam, Spirit. tenuioris libram; vel: Aloës, Myrrh., singulorum uncias duodecim, Spiritus ten. congios tres; vel: Myrrhae libram et uncias quatuor, Aloës Barbad. uncias quatuor, Spir. ten. congium; vel: Myrrh. libram et uncias duas, Aloës uncias sex, Spir. rectif. octarios septem, Aquae quinque. Austrocknend.

Linctus ad gingivas, Liquor ad ulcera faucium, Collutorium detergens. (DD. *Au. Sy.*)

℞. Essentiae Myrrhae partem unam.
Mellis crudi . . partes quatuor.
Misce. (DD.)

Sy. Tincturae Myrrhae unciam unam et Mellis cuprati semunciam.

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur. Colaturae adde
Tincturae Myrrhae drachmas duas.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce. (*Au.*)

℞. Aquae Salviae,
— Cochleariae,
Tinct. Myrrhae,
— Aurant. Fruct. virid., sing. drach. duas.
Aquae Rabelii . sesquidrachmam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Hudson's preservative for the teeth and gums. (*Gr. Re.*): Tinct. Myrrhae, Tinct. Cinch., Aq. Cinnam., sing. uncias tres, Aq. sclopet. unam, Pulv. G. Arab. semunciam.

Gargarisma detergens. (Fer. *Fi.*)

℞. Extracti Myrrhae . semunciam.
Decocti Chinae . . uncias octo.
Misce.

Lotio Myrrhae s. Myrrhae composita s. phagedaenica. (*E. Gr. Re.*)

℞. Tincturae Myrrhae,
Aquae Calcis, sing.
unciam unam vel duas.

Von Kirkland gegen luxurirendes Fleisch empfohlen, außerdem gegen scorbutische Geschwüre.

Re. Tinct. Myrrh., Mell. Rosarum, sing. drachmas duas, Aq. Calcis sesquiunciam.

Injectio detergens. (*Au. B. Va.*)

℞. Decocti Hordei . . libras duas.
Tinct. Myrrhae drachmam unam

Bei chronischem Schnupfen mit Ausfluß aus den Stirnhöhlen. (*B. Va.*)

℞. Aquae . . . . . uncias sex.
Collae Piscium . quantum sufficit ut fiat mucilago spissa. Adde
Liquoris Myrrhae drachmam unam.

Bei Blasengeschwüren empfohlen. (*Au.*)

℞. Plumbi acetici drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Solutioni adde
Liquoris Myrrhae . uncias duas.
Tincturae Opii . unciam unam.

Bei chronischen Gonorrhöen gebräuchlich. (*Au.*)

Tinctura s. Essentia s. Solutio s. Mixtura Myrrhae alcalisata, Tinctura Myrrhae simplex. (Br. Hass. Sar. Wir. *Gr. Pid.*)

℞. Myrrhae electae . . semilibram.
Kali subcarbonici . uncias octo.
Aquae fontanae . sesquilibram.

Post sex vel octo dies digestionis evaporent in balneo aquae ad mellis consistentiam; residuo infunde
Alcoholis . . . uncias viginti
Digere et filtra. (Br. Wir. *Pid.*)

Sa. Myrrhae uncias duas, Subcarbonatis liquidi semunciam et Alcoholis q. s. ut mixtura exsiccata trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur; — Hass. Myrrhae semilibram, Potassae liquidae q. s. et Alcoholis uncias viginti; — *Gr.* Myrrhae semunciam, Salis Tartari drachmas duas, loco humido serva et post hebdomadem adde Spir. rectif uncias octo.

Reizend, kräftiger als die einfache Tinctur. — Man wandte sie ehedem, aber, wegen der durch das Alcali verursachten Schmerzen, selten an.

Tinctura Myrrhae cum Aqua Rabelii. (*Gr. T.*)

℞. Myrrhae electae pulv. unc. unam.
Aquae Rabelii . uncias quatuor.

Digere agitando per dies quatuor et filtra. — Zu Einspritzungen, Waschungen ꝛc. bei Fistelgeschwüren.

Elixir Myrrhae s. Myrrhae compositum, Tinctura Sabinae composita. (Wir. *Gr. Re.*)

℞. Essentiae Myrrhae . uncias octo.
— Castorei . uncias sedecim.
Extracti Sabinae . unciam unam.

Post sufficientem digestionem filtra.

Re. Tinct. Myrrhae uncias sex, Tinct. Castorei tres, Ext. Sabinae semunciam.

Reizend, besonders bei Unregelmäßigkeiten in der Menstruation und Gebärmutterkrankheiten empfohlen. — Gabe, vierzig bis funfzig Tropfen.

Acetum Myrrhae. (Wür.)

℞. Myrrhae pulveratae unciam unam.
Aceti boni . . . . semilibram.

Digere per aliquot dies in loco blanda temperatura gaudente, tunc per horam in balneo aquae et cola.

Oleum Myrrhae. (Bor4. Wir.)

℞. Myrrhae electae . partem unam.
Arenae lotae part. unam. c. dim.

Destillent in cucurbita vitrea ex arena; oleum a liquore simul prodeunte separa et rectifica.

Bor4. Myrrhae libras duas, Aquae font. octuplum; fiat destillatio e vesica destillatoria, quamdiu oleum ab empyreumate liberum prodit; oleum limpidum collige.

Aqua Myrrhae. (Wir. *Sp.*)

℞. Myrrhae pulveratae uncias octo.
Aquae fontanae . . . libras sex.

Digere in loco calido per tres dies et lenta destillatione libras quatuor abstrahe.

Bei Brust- und Magenbeschwerden, so wie bei solchen von unregelmäßiger Menstruation empfohlen. — Gabe, eine Unze.

Myrtus.

Myrtus communis, L.; Myrthe, Myrte; Myrte commun (*Gal.*); Myrtle (*Ang.*); Arajan (*His.*); Myrtus (*Bel.*); Myrto, Mirto (*I.*); Murta (*Lus.*).

Br. Fer. Gal. His. His3. LP. Lus. Pm. Wir. *Be. Br. Gr M. Re. Sp.*

Ein Strauch (Icosandria Monogynia L.; Myrtene, J.) des südlichen Europas

(*Blachw.* t. 114. *Plenck* t. 874. *Zorn* Ic. pl. t. 169.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Myrti s. Baeticae sylvestris) sind eirund oder lanzettförmig, glatt, schön grün und überall mit halbdurchsichtigen Drüsenpuncten bestreut. Sie haben, besonders gerieben, einen angenehmen Geruch und einen bittern gewürzhaften, etwas styptischen Geschmack.

Die Früchte sind kugelige, dunkelblaue, fast schwärzliche Beeren von sehr starkem gewürzhaften Geruch und adstringirendem bittern Geschmack. Sie liefern ein steifes, wohlriechendes, adstringirendes Oel (Myrteum *Gr.*). *Oleum Myrti essentiale.* (*Gr. Re.*)

Adstringirend, aber wenig gebraucht.

Oleum Myrti s. myrtinum. (His. His3. Sar.)

℞. Bacc. Myrti contus. . libras duas.
Fol. Myrti concis. manipulos duos.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti . . . . . libram unam.

Coque ad humidi consumptionem et cola (Sar.)

℞. Fol. et Flor. Myrti partem unam.
Olei Olivarum . . . partes tres.

Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (His.)

Syrupus de Myrto, Syrupus Baccarum Myrti. (Gal. Pm. Sar)

℞. Florum Myrti . . unciam unam.
Aquae dest. Myrti . libras duas.

Digere in balneo aquae per horas duas, vase clauso; cola, filtra et colaturae adde

Sacchari albi . . . . duplum.

Solve in aquae balneo. (Gal.)

Sar. miscere Succi depurati et Syrupi communis, ad globum cocti, sing. part. aeq. et blando igne, spatula lignea continue agitando, syrupum parare.

Pm. Baccarum siccat. uncias octo, Aquae ferv. libras quatuor, infunde, post horae quadrantem cola et exprime, colaturae adde Sacchari albi libras quatuor; clarifica etc.

Essentia Myrti. (*Gr. Re.*) Myrti floresc. libram, Spir. rect. congium.

Myrtle water. (*Re.*): Fol. recent vel Ramor. Myrti libram macera in Aquae mollis congio uno per diem, adde Fermenti boni unciam unam vel maj. quant., stent per biduum, tunc infunde in retortam cum Salis marin. unc. duabus, omnem aquam abstrahe, adde Folia recent. vel Ramos et ut antea age, hoc modo ter vel quater repetendo.

Delescott's Myrtle Opiate. (*Re.*): Mellis boni librae duae cum Aq. Ros. semioctario in vase super leni igne per aliquot momenta bulliant et cum Pulvere e Myrrha (Myrto) et Bolo Armena in pastam mollem redigantur. Zahnlatwerge, mittelst einer Bürste anzuwenden.

Myxa.

Cordia Myxa, L.; schwarze Brustbeere, Sebestenbaum; Sebestier (*Gal.*); Lebuck (*Ar.*); Buhuarie (*Bel.*); Lolu (*Cy.*); Mochayet (*Eg.*); Lesura (*Hin.*); Kendal (*Jav.*); Bukam padaruka (*Sa.*); Vidi marum (*Tam.*); Nekra (*Tel.*).

Br. Gal. Pal. Wir. *A. Be. G. Gr. M. Sp.*

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, J.) Aegypten's. (*Rheede* Hort Mal. 4. t. 37. *Lam.* Ill. t. 96. f. 3. *Blackw.* t. 398. *Plenck* t. 116. Fl. méd. VI. 322)

Man wendet die Früchte, Sebesten, schwarze Brustbeeren (fructus Myxae s. Sebestenae) an; es sind glatte, eirunde, gespitzte, schwarze Steinfrüchte von der Gestalt und Größe einer kleinen Pflaume, welche ein röthliches, geruchloses, saftiges Fleisch von süßem und schleimigem Geschmack enthalten, welches einen tief gefurchten Kern umgiebt.

N.

Naphtha.

Oleum Petrae album; Naphtha; Naphthe (*Gal.*)

Br. D. Fer. Gal. Sax. Wir. *Fi. G. Gr.*

Ein flüssiges, durchsichtiges, weißes, schwach gelbliches, etwas fettig anzufühlendes Erdharz, welches viel leichter als Wasser, außerordentlich brennbar ist, einen starken, aber nicht unangenehmen Geruch verbreitet und, unter Ausstoßen eines sehr dicken Rauchs, mit bläulicher Flamme brennt. Es wird in Persien, Italien und anderwärts gefunden.

Reizend.

Narcissus.

Narcissus Pseudo-Narcissus, L.; ge-

meine Narciſſe; Narcisse sauvage ou des prés, Faux Narcisse (*Gal*); Common aſtodil narcissus (*Ang.*); Gaal narcisse (*D.*); Narcisso silvestre (*His.*); Geele narcis (*Bel.*); Narcisso giallo (*I.*); Paesklilja (*Suec.*).

Fer. Gal. *Gr. Re.*

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Narcisseae, J.) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Orfila* méd. lég. t. 2. *Bull.* t. 389. *Rèd.* Lil. vol. III. 158.)

Man wendet die Zwiebel und die Blüthen an.

Die Wurzel oder Zwiebel iſt klebrig und von etwas ſcharfem Geſchmack.

Die Blüthen ſind gelb.

Die Wurzel bewirkt Purgiren und Erbrechen. — Gabe, zwei Drachmen. — Die Blüthen ſind krampfſtillend; Gabe, vier und zwanzig Gran.

Extractum Narcissi pratensis. (Gal. *Sw. Vm.*)

℞. Flor. rec. Narcissi pratens. libram unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Infunde frigide per horas 12 et cola absque expressione; residuo eandem Aquae ferv. quantitatem infunde et itidem cola; liquoribus commixtis et Albumine clarificatis, colatura ad extracti consist. evaporet (*Vm.*)

Sw. digerere Florum siccat. partem unam in Aquae tepidae octo et colaturam clarificatam vaporando consumere; — Gal. Macerare Florum libram unam in Aquae quatuor per horas 24, operationem cum residuo et nova Aqua repetere et liquores commixtos in balneo aquae consumere.

Reizend, Ekel erregend, Auswurf befördernd und krampfſtillend; bei Keuchhuſten, convulſiviſchem Aſthma und Convulſionen empfohlen. — Gabe, vier bis zwanzig Gran, je nach dem Alter

Acetum Pseudo-Narcissi. (*Sw*. Vm.*)

℞. Flor. Narcissi prat. rec. partem unam.
Aceti albi . . . . partes octo.

Infunde blando calore per aliquot horas, cola absque expressione et filtra.

Zur Bereitung des oxymel narcissi angewendet.

Oxymel Narcissi pratensis. (*Sw*. Vm.*)

℞. Aceti Narcissi prat. partem unam.
Mellis albi . . partes quatuor.

Dissolve frigidè.

Etwas Brechen erregend, Auswurf befördernd, beruhigend, bei Keuchhuſten und convulſiviſchem Aſthma. — Gabe, ein oder zwei Kaffeelöffel, drei oder vier Mal täglich.

Oleum Narcissi aethereum. (*Gr.*)

Narcotina.

Narcotinum, Opianum; Narcotine; Narcotine. (Gall. *Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Residui Opii Aqua penitus extracti quantum vis.

Siccatum et grossiuscule pulveratum frigide cum Acido hydrochlorico (4°) vel Acido pyroacetico (4 vel 5°) infunde; cola exprimendo; liquori filtrato Ammoniacum in excessu infunde; praecipitatum cum Aqua frigida lotum digere in Alcohole bulliente (36); solutionem refrigerare fac et crystallos Carbonis animalis ope purifica.

Fi. sec Derosne Opium pluribus cum Aqua frig. macerationibus extrahere, quamdiu fluidum colorem praebet, liquores commixtos deinde ad extracti consistentiam consumere, aetherem infundere et decanthare; aetherem deinde destillatione separare etc.; — *Gr. T.* ut *Fi.* sed narcotinum e destillatione aetherea obtentum cum Aqua Acido hydrochlorico acidulata (Acido muriatico 4° B. vel Acido pyroligneso 4 vel 5° *Gr.*) tractare, acido ut saturetur Ammoniacum addere et praecipitatum in Alcohole solutum per Carbonem animalem filtrare, evaporandoque in crystallos cogere; — *Re.* Opium cum Acido sulph. digerere, tincturam filtrare et evaporare.

Betäubend, ſchwächend und giftig, nach Orfila, in hohen Gaben kräftig aufregend, nach Magendie, narkotiſch, nach Brera.

Injectio narcotica. (*Ca.*)

℞. Dec. Lactucae viros. libram unam.
Extr. Belladonnae sesquidrachmam.
Narcotinae . . . . grana sex.

Bei Neuralgien der Harnröhre und der Scheide empfohlen.

Boli e Narcotina. (*B.*)

℞. Narcotinae purae . . grana duo.
Olei Amygdalar. dulc. guttas sex.
Micae Panis,
Mellis, sing. . quantum sufficit.

Fiant boli octo. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Mixtura incitans et sedans, Potio leniens. (*B.*)

℞. Narcotinae purae drachm. unam
Aquae Citri . . . uncias tres.

Löffelweiſe zu nehmen.

Nardus.

Zwei Pflanzen ſind unter dieſem Namen in der Medicin gebräuchlich:

1) *Valeriana Celtica*, *L.*; Nardenbaldrian, Alpenbaldrian; Nard celtique (*Gal.*); Espicanardo celtico (*His.*).

A. Ams. An. Br. Fer. Gal. His. HisS. Pal. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Sp.*

♃ (Triandria Monogynia, L.; Valerianeae, J.) Eine auf den Alpen wachſende Pflanze. (*Plenck* t. 29. *Jacq.* Coll. t. I. p. 24.)

Die Wurzel (radix Valerianae Celticae s. Spicae Celticae s. alpinae s. Nardi Celticae) beſteht aus langen, mit dünnen gelblichen Schuppen bedeckten Fäſerchen. Sie hat einen ſtarken und angenehmen Geruch und einen ſcharfen, bittern, gewürzhaften Geſchmack.

Toniſch, magenſtärkend, harntreibend.

2) *Spica Nardus*; Nardenbartgras, Spiknardenmannsbart; Nard des Indes, Spica nard (*Gal.*); Spikenard (*Ang.*); Spike narde (*D.*); Nardo de Indias, Espica nardo (*His.*); Spikenard (*Bel.*); Spigo nardo, Nardo indiano (*I.*); Nardo indiano (*Lus.*); Spikenarde (*Suec.*); Sukku-naru-pilla (*Tam.*).

An. Br Fer. Gal. His. HisS. Wir. *A. Be. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

Man wendet unter dieſem Namen (Spica Indica s. Spica Nardus s. Nardus Indica) die untern, von den Rippen der Wurzelblätter umgebenen Enden der Stängel an, an denen meiſt noch ein Theil der Wurzel hängt, welche aus einem kleinen röthlichbraunen Köpfchen beſteht, woran viele knotige harte Fäden ſitzen. Der Geruch iſt angenehm; der Geſchmack bitter, ſcharf und gewürzhaft.

Sprengel leitet (nach *W. Jones* Asiat. research. IV. p. 109.) die Indiſche Narde von Viola Jatamarensis (Valeriana Jatamensis *Gr.*) her, welcher Meinung Guibourt beitritt. Sehr allgemein glaubt man auch, ſie komme von Andropogon Nardus, L., ♃ (Polygamia Monoecia, L.; Gramineae, J.), einer Pflanze Oſtindien's (*Rumph.* Amb. 4. 22. t 6.). Auch Ainslie bezieht ſie, nach Rottler, auf dieſe, aber mit, wie es ſcheint, gegründetem Zweifel. Reizend, nervenſtärkend.

Pulvis Nardi Celticae compositus. (Wür.)

℞. Nardi Celticae . . semunciam.
Zinci sulphurici scrupulum unum.
Fiat pulvis.

Essentia Spicae Indicae. (Wir.)

℞. Nardi Indicae . . sesquiunciam.
Alcoholis uncias sex vel septem.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo et filtra.

Reizend, als Gegengift betrachtet, Blähungen, Harn und Menſtruation treibend. — Gabe, vierzig bis ſechszig Tropfen.

Oleum Andropogonis Nardi aethereum von *Gr.* angeführt.

Nasturtium.

Wir führen unter dieſer Benennung an:

1) *Tropaeolum majus*, *L.*; Indianiſche Kreſſe, Capucinerkreſſe; Capucine, Cresson des Indes, Cresson du Mexique (*Gal.*); Indian cress (*Ang.*); Indiansk karse (*D.*); Capuchinos (*His.*); Spaensche kers (*Bel.*); Capucino (*I.*); Mastracco da Paro (*Lus.*); Indianisk kresse (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

⊙ (Octandria Monogynia, L.; Tropaeoleae, *Cand.*) Eine Südamericaniſche Pflanze. (*Curt.* Bot. Mag. t. 23. Fl. méd. II. 96.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba Nasturtii Indici s. Cardami majoris) beſteht aus einem walzigen, glatten Stängel mit abwechſelnden, ebenen, rundlichen, in fünf oberflächliche Lappen getheilten, ſchildförmigen, langgeſtielten Blättern. — Die fünfblättrigen Blüthen ſind orangegelb oder ponceauroth.

Geſchmack und Geruch ſind ſtark und dem der Kreſſe ähnlich.

Reizend, als antiſcorbutiſch betrachtet.

2) *Thlaspi sativum*, *Cand.*; Gartenkreſſe, Sommerkreſſe; Cresson Alénois, Cresson des jardins (*Gal.*); Common cress (*Ang.*); Hauskerse (*D.*); Nastuerco (*His.*); Tuinkers (*Bel.*); Crescione (*I.*); Nasturoga, Nastruço (*Lus.*); Traegardskress (*Suec.*).

An. B. Br. Gal GalM. Gen. His. HiS. LP. *Be. G. Gr. M. Pid Sp.*

⊙ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 23. *Plenck* t. 514. *Hayne* VI. t. 11. *Zorn* Ic. pl. t. 16.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an

Das Kraut (herba Nasturtii hortensis) beſteht aus einem äſtigen Stängel mit abwechſelnden, geſtielten, langgeſtreckten, glatten, vielſpaltigen Blättern. — Die Saamen ſind länglich, glatt und braun.

Die Pflanze riecht, wenn man ſie reibt, ſchwach, aber angenehm; der Geſchmack iſt etwas bitter und ſcharf.

Reizend, antiſcorbutiſch.

3) *Sisymbrium Nasturtium*, *L.*; Waſſerkreſſe, Brunnenkreſſe; Cresson de fon

taine (*Gal.*); Common watercress (*Ang.*); Kiericha wodnj neb potocnj (*B.*); Wandkarse (*D.*); Berro (*His.*); Waterkres (*Bel.*); Nasturzio, Crescione, Agretto (*I.*); Rzezucha (*Pol.*); Agriões (*Lus.*); Kiaellkrassa (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. His. His3. LH. Li. LP. Lus. R. RC. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. T. Va.* Z.

♂ oder 4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 690. *Blackw.* t. 260. *Plenck* t. 525. *Hayne* V. t. 32. Düss. oft. Pfl. VI. t. 6. Fl. méd. III. 138.)

Das Kraut (herba Nasturtii aquatici) besteht aus einem röhrigen, glatten, walzigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, unpaarig gefiederten, grünen, saftigen, glatten, aus fünf bis sechs sitzenden, ganzen, rundlichen oder eirunden Blättchen, wovon das am Ende befindliche am längsten und fast lanzettförmig ist, zusammengesetzten Blättern. Es hat einen starken, beißenden Geruch und einen etwas scharfen und bittern Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

4) *Spilanthus oleraceus*, *L.*; falsche Fleckblume; Cresson de Para (*Gal.*); Spear leav'd spilanthus (*Ang.*).

Fer. Gal. *Fi. G. Gr. Va.*

⊙ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine Pflanze Südamerica's. (*Jacq.* Hort. Vind. t. 135.)

Man wendet das Kraut (herba Spilanthi) an; es besteht aus saftigen Stängeln mit fast herzförmigen, gestielten und gezähnten Blättern. Es hat einen scharfen und brennenden Geschmack und reizt die Speichelabsonderung.

Reizend, antiscorbutisch.

5) *Cardamine pratensis*, *L.*; Wasserkresse, Wiesenkresse; Cresson des prés (*Gal.*); Cuckow flower (*Ang.*); Engekasse, Vildkasse, Giogeblomster (*D.*); Koekkebloem (*Bel.*)

Br. D. Du. Ed. Gal. Gen. His. His3. Lon. LonN. Wir. Wür. *Be. C. G. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 223. *Plenck* t. 517. *Hayne* V. t. 30. *Zorn* Ic. pl. t. 51.)

Die Blüthen (flores Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuculi) sind sehr groß, etwas purpurroth, geruchlos und bilden einen schlaffen, am Ende des Stängels stehenden Strauß. Man nimmt nur die stumpfen, eirunden, länglichen, mit schmalen Nägeln versehenen, weißen oder purpurroth geaderten Blätter. Ihr Geschmack ist scharf, bitter und dem der gemeinen Kresse ähnlich.

Reizend, antiscorbutisch; sollen auch bei Epilepsie und Hysterie nützlich seyn.

Conserva Nasturtii. (Ful. R. Sax. *Fi. T.*)

℞. Fol. recent. Nasturtii part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contunde folia et cum saccharo exacte misce. (Ful. R.)

Sax. *Fi.* Foliorum contus. partem unam et Sacchari tres; — *T.* Folia cum Sacchari albi pondere aequali contundere, per crinium trajicere et commiscere cum Sacchari libris duabus in Aquae parte dimidia soluti et ad aptam consist. evaporati.

Conserva antiscorbutica. (*Sa.*)

℞. Conserv. Nasturt. aquat. uncias quinque.
Salis polychresti Glaseri drachmam.
Misce.

Aqua Nasturtii aquatici. (Pal. Sar.)

℞. Herb. Nasturt. aq. contus. part. unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent trientes duo. (Sar.)

Pal. Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars.

Spiritus Nasturtii aquatici. (Sar.)

℞. Nasturtii aquatici,
Succi Nasturtii,
Aquae fontanae, sing. libras sex.
Alcoholis . . . . libras duas.
Destillet dimidia pars; producto adde
Herbae rec. Nasturtii libras tres.
Destillent in balneo aquae.

Succus Nasturtii aquatici. (Hass. Sar. Wür *T.*)

℞. Herbae rec. Nasturtii aq. q. vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, succum sepone, decantha et in lagenis serva. (Hass. Sar.)

Wür. cuique librae Succi addit Alcoholis drachmam unam.

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Extractum Nasturtii. (Sar. *Fi.*)

℞. Herb. rec. contus. Nasturtii libras octo.

Macera per tres dies in alembico, abstrahe deinde destillationis in balneo aquae ope uncias circiter duas; residuo Aquae triplum infunde; post sex horas digestionis decoque ad tertiae

partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consist. evaporato et nonnisi tepido aquam destillatam adde.

Fi. ut extractum cichorii.

Syrupus de Nasturtio. (Gal. *Fi.*)

℞. Succi Nasturtii aq. colati libram.
Sacchari albi . . . libras duas.

Fiat in balneo aquae, vase tecto, syrupus, qui post refrigerationem colatur. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus celotyrbicus Foresti. (Wir. *Sp.*)

℞. Succi Nasturtii aquatici,
— Beccabungae, sing. semilibr.
— Fumariae,
— Lupuli, sing. . uncias tres.
Misce et coque cum
Sacchari albi . unciis sedecim.
Syrupo adde
Aquae Nasturtii vel Cochleariae unciam unam ad duas.

Tinctura Spilanthi, Elixir odontalgicum et antiscorbuticum. (Buhi. *Va.*)

℞. Fol. rec. contus. Spilanthi unc. quatuor (manipulum *Va.*)
Alcoholis (33°) . libram unam.
Digere per dies duodecim et filtra.

Reizend, antiscorbutisch. — Gabe einen halben Löffel in einem Aufguß der saponaria oder dulcamara.

Elixir antiscorbuticum (LP.)

℞. Extracti Taraxaci,
— Gentianae, sing. sesquidrachmam.
Succi Nasturtii expressi uncias sedecim.
Solutioni adde sensim
Acidi sulphurici drachmam unam.
Alcoholis . . . . uncias tres.

Misce et post horarum viginti quatuor sepositionem decantha. — Eröffnend, auflösend, gegen Obstructionen und Schwäche der Unterleibseingeweide, und scorbutische Beschaffenheit der Säfte. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen in schicklichem Vehikel.

Nerium.

Nerium Oleander, L.; Rosenlorbeer; Laurier rose (*Gal.*); Common rosebay (*Ang.*).

Fer. Gal. *Gr. Re.*

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, J.), welcher angeblich im Orient zu Hause und im südlichen Europa naturalisirt ist. (*Blackw.* Herb. t. 531. *Plenck* t. 128.)

Man wendet die Blätter (folia Nerii s. Rhododaphnis s Rosaginis) an; sie sind lang, lanzettig, spitzig, steif, lebrig und sehr dunkelgrün. Sie haben einen etwas bittern Geschmack.

Man hält sie für narkotisch; getrocknet sind sie ein heftiges Niesmittel. — Den Aufguß hat man bei Flechten; das Pulver, mit Fett gemischt, gegen Krätze angewendet.

Nicotiana.

Man wendet in der Medicin zwei Arten dieser Pflanzengattung an:

1) *Nicotiana Tabacum, L.*; Toback, Tabak; Tabac ordinaire (*Gal.*); Tabak (*D. Suec.*); Tobacco (*Ang.*); Bujjerbhang (*Ar.*); Tambacco (*Ba. Jap.*); Petmne (*B.*); Youly (*Caramb.*); Saugyen (*C.*); Dunkola (*Cy.*); Tumbaku (*Duk. Hin.*); Tabaco (*His.*); Tabaco, Herva santa (*Lus.*); Tabak (*Bel. Pol.*); Nicoziana, Erba di s. Croce, Tabacco (*I.*); Tambracu (*Mal.*); Quauryetl (*Men.*); Dhumrapatra (*Su*); Poghei elleg (*Tam.*); Tamer (*Tart.*); Poghako (*Tel.*).

A Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LouN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T. Va.* Z.

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae J.) Eine ursprünglich in Südamerica einheimische Pflanze. (*Bull.* t. 285. *Blackw.* t. 146. *Plenck* t. 99. *Big.* Am. med. Bot. t. 40. *Bert.* Bild. 1. 35. Fl. méd. VI. 326).

Man wendet die Blätter (herba s. folia Tabaci s. Nicotianae, Petum) an; sie sind sehr groß, sitzend, am Grunde etwas herablaufend, eirundlanzettig, spitzig, ganz und fast glatt, frisch grün, getrocknet gelbbraun. Der Geruch ist stark und unangenehm; der Geschmack scharf, widerlich und betäubend.

Sie enthalten, nach Vauquelin, einen eigenthümlichen crystallinischen Stoff, Nicotianin oder Nicotin (*Nicotianinum, Nicotinum, Nicotianina*), welchen Hermbstädt für sich darzustellen gelungen ist.

2) *Nicotiana rustica, L.*; Bauerntabak; Tabac rustique (*Gal.*).

Gal. *Gr.*

☉ Eine ursprünglich in America wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 437. *Bert.* Bild. 1. 35.)

Man wendet die Blätter (folia Nicotianae rusticae s. minoris) an; sie sind eirund, ganz, stumpf und etwas herzförmig.

Auch sie enthalten Nicotianin.

Heftig reizend, in hohen Gaben giftig, Brechen, blutige Stühle, Nervenzufälle, wie Schwindel und Schlafsucht, beschleunigten Puls, Schweiß- und Urinabsonderung ꝛc erregend. Sie werden, wie bekannt, als Nies- und Kaumittel, außerdem aber bei chronischen Catarrhen und Wassersucht angewendet. In Klystir dienen sie gegen Ascariden und um die Thätigkeit im Dickdarm aufzuregen, was besonders in Fällen von Scheintod und Schlagfluß von Nutzen ist; auch werden sie äußerlich gegen Kopfgrind und Krätze angewendet. — Gabe des Pulvers, von einem halben bis zu fünf Gran.

Pulvis sternutatorius (Hass. *Pid.*)

℞. Foliorum Nicotianae,
— Majoranae,
Flor. Lavandulae, sing. unc. unam.
Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis cephalicus. (*Bo.*)

℞. Nicotianae raspatae semunciam.
Pulveris Majoranae,
— Convallariae majalis,
— Mari, sing. semidrachmam.
— Hippocastani drachmam.
Misce.

Pilulae Nicotianae. (Suec. *Au. Vm.*)

℞. Extr. Nicotianae drachmam unam.
— Liquiritiae . unciam unam.
Aceti scillitici . quantum sufficit.
Fiant pilulae centum octoginta (Suec.)

Vm. loco extracti Radicis Liquiritiae aequalem extracto nicotianae quantitatem praescribit.

℞. Extracti Nicotianae partem unam.
— Liquiritiae,
Succi Liquiritiae, sing. partes tres.
Pulveris Liquiritiae partes duas.
Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Pulv. Fol. Nicotianae Virginicae,
Conserv. Rosarum, sing. drachmam.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

Fiant pilulae sexaginta (*Au.*) — Gabe, ein bis drei Stück, zwei oder drei Mal täglich. — Diese Pillen gelten für harntreibend und als gegen Wassersucht nützlich.

Extractum Tabaci s. Nicotianae. (Fenn. Ful. HassP. Sax. Suec. Wür. *Vm.*)

℞. Fol. rec. Nicotianae . . q. vis.
Contunde in mortario lapideo; exprime succum, qui statim in balneo aquae ad consist. requisitam evaporet. (Wür.)

HassP. ut extractum calendulae, hyoscyami etc.

℞. Fol. rec. Nicotianae . . q. vis.
Contunde in mortario et exprime succum; vaporando consume absque despumatione, donec quarta Pulveris Foliorum sicc. Nicotianae pars sufficiat ad extracti consist. ei praebendam. (Fenn.)

℞. Foliorum Nicotianae,
Aquae frigidae, sing. partem unam.
Macera per horas 12 et adde
Aquae bullientis . . . duplum ponderis totius massae; post refrigerationem cola, Albuminis ope clarifica, igni impone et quum liquor spissescere coeperit, per pannum cola atque, continuè agitando, probe consume. (Sax. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.
Aquae communis . partes duas.
Coque parumper blando igne et cola exprimendo; residuum cum nova Aqua coctum itidem cola; liquores commixtos in balneo aquae ad aptam consist. vaporando consume. (Suec.)

Ful coquere Nicotianae libram unam in octo Aquae et exprimere, massam in Aqua frigida macerare, iterum exprimere et colaturas commixtas evaporare.

Gabe, drei bis sechs Gran.

Extractum Nicotianae mitigatum. (Br. Han. Li. Wir. *Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae quantum vis.
Pluribus in Aqua frigida infusionibus principium acre penitus extrahe; residuo Aquae bull. pondus duplum infunde, post refrigerationem exprime et Albumine clarificatum ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

Br Li. et *Vm.* infundere et tunc coquere Foliorum ab acrimonia liberatorum libram unam in Aquae libris decem ad dimidium consumtis.

Reizend, bei Asthma empfohlen. — Gabe, ein Gran, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum Tabaci s. Nicotianae. (*Sw. Va.*)

℞. Foliorum siccatorum Nicotianae drachmas duas ad quatuor.
Aquae bullientis . libram unam.
Coque per aliquot momenta, digere deinde per horam unam et cola.

In Klystir, bei Ileus, hartnäckiger Verstopfung und Ascariden. — Von Justamond auch in Waschungen bei tinea empfohlen, wo es aber mit vieler Vorsicht angewendet werden muß, indem es sonst Ekel und Erbrechen hervorbringt.

Va. Foliorum uncias duas, Aquae libras duas. — Aeußerlich in Fomentationen bei Krätze.

Aqua antipsorica. (For. *Fl.*)

℞. Fol. siccat. Nicotianae libr. duas.
Aquae . . . libras quindecim.
Coque per horam unam et adde
Natri subcarbonici uncias quatuor.
Post horas viginti quatuor cola. — Gabe, vier Unzen auf jede Einreibung.

Infusum Tabaci s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Lon. LonN. RC. *C. Fi. Gr. Re. T. Va.*)

℞. Fol. Nicotianae drachmam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Macera in vase leviter tecto per horam unam et cola. (Am. Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re.*)

T. Foliorum drachmam, Aquae bull. libram; — *Re.* Fol. libram, Aq. bull. cong. infundere per horas 24; — addi potest hujus infusi libris duabus Solutio Sublimati drahmae unius in Acidi mur. drachma una. (Pharm. Veter. College.)

℞. Fol. Nicotianae . drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde in balneo aquae per horas quatuor, cola exprimendo et adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (B*. RC.)

Reizend, bei Asthma und Bruſtwaſſerſucht gerühmt; in Klyſtir bei eingeklemmten Brüchen, aber nicht ſicher. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Fowler (*Va.*): Nicotianae Virgin. unciam, digere in balneo aquae per horam unam cum Aquae bull. libra, cola cum expreſsione et colaturae unc. quatuordecim adde Alcoholis uncias duas. — Bei Asthma und Dysurie, Erwachſenen zu ſechzig bis hundert Tropfen. — *Marryat*: Nicotianae uncias duas, infunde cum Aquae font. unciis sedecim, colaturae adde Potassae liquidae drachmam. — Gegen Kopfgrind; man läßt die Haare abſchneiden und wäſcht die Geſchwüre mit dieſem Waſſer, während man zu gleicher Zeit Morgens und Abends den Kopf mit einer Salbe aus einer Unze Baſilicumſalbe und einer bis zwei Drachmen mercurius dulcis einreibt.

Syrupus Nicotianae s. de Nicotiana. (B*. Br. Ful. Li. Wir. *Bo. Pie. Sp.*)

℞. Succi Fol. Nicotianae libras duas.
Hydromellis simplicis sesquilibram.
Oxymellis simplicis uncias quatuor.
Digere per dies duos vel tres in balneo aquae vel loco modice calido; liquorem clarum decantha, sepone per horas 24 et post depurationem adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Wir.)

Br. eundem agendi modum sed Decoctum e Fol. Nicotianae unciis sex in Aquae font. libris sex ad duas redigendis.

B*. et *Sp.* Succi Nicotianae uncias quadraginta octo, Oxymellis quatuor, Hydromellis duodecim et Sacchari quadraginta octo; — *B.* et *Pie.* Succi uncias tres, Oxymellis quatuor, Hydromellis unam et duas Sacchari.

℞. Fol. siccat Nicotianae semunciam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque per horam et decoctum rejice; residuo adde
Radicis Liquiritiae unciam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Coque per aliquot tempus ad consumptionem partis quartae circiter usque, cola exprimendo et colaturae adde
Mellis despumati . uncias octo.
Coque ad consist. syrupi. (Ful. Li.)

Clyster s. Enema irritans s. Nicotianae s. Tabaci s. tabacinus. (B*. GalM. LH. RC. *E. Fi. Gr. Ra. Va.*)

℞. Fol. Nicotianae drachmam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut unciae octo colaturae obtineantur. (B*. *E.*)

RC. Foliorum semunciam, Aquae bull. uncias decem, infunde per horae quadrantem et cola; — *Gr. Re.* Foliorum scrupulos duos, Aquae ferventis uncias tredecim (duodecim *Re.*); — anfangs die eine und nach einer halben Stunde die andere Hälfte.

℞. Fol Nicotianae . unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque leviter et colaturae adde
Tartari stibiati grana duodecim.
Dissolve. (GalM. *Ra. Va.* Hôt. D.)

LH Foliorum drachmas tres, Aquae semilibram, Tartari stibiati grana quatuor.

℞. Fol. sicc. Nicot. sesquidrachmam.
Magnesiae sulph. drachmas duas.
Aquae communis quantum satis.
Coque leviter per horae quadrantem, colaturae unciarum octo sal adde. (*Fi.*)

Lotio Nicotianae, Fomentatio exitans s. Tabaci, Aqua Nicotianae. (*Au. Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.
Aquae . . . . libram unam.
Coque et cola. — Marryat und Niemann rühmen dieſe Flüſſigkeit in Waſchungen gegen Kopfgrind.

Guttulae diureticae. (Ham.)

℞. Fol. Nicotianae drachmam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut infusionis uncia una obtineatur; colaturae adde

Aq. Cinnamomi vin. . semunciam.

Cataplasma vomitivum s. Cataplasma s. Epithema Nicotianae. (RC. *E. Va.*)

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*E. Va.*)

RC. Foliorum Nicotianae unciam, Acidi acetici impuri, vel Aquae ferv. q. s. ut fiat cataplasma.

Man wendet es auf die Magengegend an, wenn man ein Brechmittel durch den Mund nicht beibringen kann, außerdem bei Flechten.

Vinum Tabaci s. Nicotianae s. Nicotianae Tabaci. (Am. B*. Ed. LP. Lus. RC. *Au. C. Gr. Re. Sw. Va. Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae partem unam.
Vini albi Hisp. partes duodecim.

Post octo dies macerationis filtra. (Am. B*. Ed. Lus. RC. *Au. E. Gr. Sw. Va.*)

Vm. Nicotianae drachmas duas et Vini uncias triginta; — *Re.* Folior. unciam, Vin. Hisp. octarium; — LP. Foliorum unciam unam, Vini albi decem, Alcoholis duas, macerationem per quatriduum. (12 Tr. bis ½ Dr.)

Ein kräftiges, bei Wassersuchten empfohlenes Reizmittel. — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen (eine halbe bis anderthalb Drachmen RC.) in einem schicklichen Vehikel.

Tinctura Nicotianae. (*Au. Huf.*)

℞. Foliorum Nicotianae uncias duas.
Alcoholis . . libram unam.

Post tres dies infusionis cola. (*Huf.*)

Au. Nicotianae Virgin. unciam et Aquae Vitae libram.

Harntreibend, bei Wassersucht. — Gabe, funfzig bis neunzig Tropfen dreimal täglich.

Clyster stimulans. (LP.)

℞. Decocti Specierum stimulantium libram unam.
Vini Nicotianae . . semunciam.
Scillae pulveratae drachmam unam.

Misce. — Bei Hirnerschütterungen, eingeklemmten Brüchen.

Tinctura Tabaci. (*Gr.*)

℞. Folior. Nicot. concis. sesquidrachmam.
Camphor. pulv. drachmam unam.
Spiritus rectificati,
Aquae dest, sing. uncias quatuor.

Digere per dies octo et cola. — Schmerzstillend, besonders äußerlich bei schmerzhaften Affectionen und Entzündungen des Auges.

Mixtura Nicotianae diuretica, Potio diuretica. (*Au.*)

℞. Oxymellis colchitici,
Oxymellis scillitici,
Tincturae Nicotianae,
Aetheris nitrici, sing. . part. aeq.

Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich viermal, bei Wassersucht.

Acetum Nicotianae. (Wür.)

℞. Fol. siccat. Nicotianae unc. unam.
Caryophyllos . . . . . no. 6.
Aceti . . . . . libram unam.

Digere per dies quatuor, blando calore, et cola.

Oxymel Tabaci s. Nicotianae. (Wür.)

℞. Aceti Nicotianae . partem unam.
Mellis albi . . . partes duas.

Coque leni igne, ad syrupi consist.

Oleum Nicotianae. (Gal. Wir. *Fi. T.*)

℞. Fol. rec. Nicotianae . libr. unam.
Olei Olivarum . uncias sedecim.

Coque ad consumptionem humidi usque et exprime. (Wir.)

Gal. digerere super cinere calido per horas 24 Nicotianae libram unam in Olei Olivarum duabus et exprimere; operationem denuo cum novis Foliis repetere, leviter coquere et exprimere; — *Fi. T.* item cum Foliorum recentium unciis duodecim, Olei Olivarum libris quatuor.

Reizend, bei Krätze, Frostbeulen, Lähmungen und unschmerzhaften Geschwülsten gerühmt.

Linimentum Tabaci s. Nicotianae. (Am. *C.*)

℞. Foliorum Nicotianae unciam unam.
Axungiae Porci . libram unam.

Coque, donec folia conteri possint et cola cum expressione.

Unguentum Nicotianae s. Tabaci s. antiscrophulosum. (Br. LP. Sar. Wir. Wür. *Au. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae libras tres.
Succi Nicotianae . uncias novem.
Axungiae Porci . . sesquilibram.

Post horas 12 macerationis coque lente ad humidi consumpt, cola exprimendo et adde
Resinae Pini . . . uncias tres.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Pulv. Aristoloch. rotund. unc. tres.

Misce. (Br. Sar. Wir. Wür. *Pie. Sp.*)

Au. Succi Nicotianae uncias tres, Cerae flavae tantidem, Resinae Pini sesquiunciam, Terebinthinae unciam unam et Olei Myrrhae q. s.

℞. Olei empyr. Nicotian. part. unam.
Colophonii . . . . partes duas.
Faec. virid. Nicotianae part. quatuor.

Axungiae Porci partes duodecim.
Dissolve blando igne faeculam in axungia, adde colophonium et refrigerationis momento oleum affunde. (*Vm.*)

℞. Foliorum Nicotianae concisorum,
Axungiae Porci, singulorum
libram unam.
Vapora blando igne ad humiditatis dissipationem, et cola cum expressione. (LP.)

℞. Faec. virid. Nicotianae part. unam.
Axungiae Porci . partes quinque.
Dissolve. (*Vm.*)

Bei Scropheln, Krätze, Kopfgrind und atoniſchen Geſchwüren empfohlen.

Unguentum mundificans Poterii s. depurans. (*Sp.*)

℞. Fol. Nicotianae . manipulos sex.
Butyri . uncias viginti quatuor.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Post octo dies insolationis exprime et colatur.e adde
Pulveris Gummi Ammoniaci,
— Galbani, sing. uncias duas.
Antimonii crudi,
Cinnabaris, sing. . drachmas tres.
Myrrhae,
Olibani, sing. . drachmas duas.
Zur Behandlung von Fiſtelgeſchwüren empfohlen.

Ceratum tabacinum s. Nicotianae. (B*. *Va.*)

℞. Succi Nicotianae,
Cerae flavae, sing. . uncias tres.
Resinae Pini . . sesquiunciam.
Olei Myrrhae (Olivar. *Va.*) q. s.
Von Conſbruch bei Flechten ohne begleitende Entzündung und Schmerzen empfohlen.

Emplastrum Tabaci s. de Nicotiana. (*Sp.*)

℞ Fol. Nicotianae . uncias quatuor.
Olei Olivarum uncias duodecim.
Vini rubri . . uncias quinque.
Coque ad humidi consumptionem usque, exprime et adde
Cerae flavae,
Colophonii, sing. uncias duodecim.
Liquefactis adde
Pulveris Tacamahacae,
— Elemi,
— Myrrhae,
— Aloës, sing. . unc. unam.
Olei ess. Nicotianae uncias duas.
Nach Triller bewirkt dieſes Pflaſter, auf den Unterleib gelegt, Stuhlausleerungen.

Unguentum antipsoricum cum Nicotiana. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Pulv. Sulphuris,
Pulv. Nicotianae, sing. unc. duas.
— Hellebori albi . unc. unam.
— Mari,
— Nerii, sing. . semunciam.
— Salis communis
drachmas quinque.
Unguenti rosati . libram unam.
Misce exacte. (Fer. *Fi.*)

T. Omnium horum duplicem quantitatem indicat.

Nigella.

In den Pharmacopöen werden drei Pflanzen dieſer Gattung angeführt:

1) *Nigella arvensis, L.*; Feldſchwarzkümmel; Nigelle des champs (*Gal.*).
G. Gr.
⊙ (Polyandria Pentagynia, L.; Ranunculaceae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VI. t. 17. *Blackw.* Herb. t. 126.)

Man wendet den Saamen an, welcher ſchwarz, ſcharf und gewürzhaft iſt.

2) *Nigella Damascena, L.*; Kapucinerkraut. Damascener Schwarzkümmel; Nigelle de Damas, Barbiche, Barbe de capucin (*Gal.*).
Fer. *Br.*
⊙ Eine Pflanze des ſüdlichen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 558.)

Der Saame, welchen man anwendet, iſt klein, eckig, ſchwarz und hat einen ſtarken, gewürzhaften Geruch.

3) *Nigella sativa, L.*; zahmer Schwarzkümmel, ſchwarzer Koriander; Nigelle des jardins, faux cumin (*Gal.*); Small garden fennel flower, Devil in a bush (*Ang.*); Schunez (*Ar.*); Czerny neb zahradnj kmjn (*B.*); Kaluduru (*Cy.*); Kolunjen (*Duk.*); Hangernes kornrose (*D.*); Kala Jira (*Hin.*); Neguilla sativa (*His.*); Veldrigelle (*Bel.*); Nigella romana (*I.*); Nigella ordinaria (*Lus.*); Siah danah (*Pe.*); Kr schna-jiraka (*Sa.*); Swart kummin (*Suec.*); Carin Siragum (*Tam.*); Nulla gilakara (*Te.*).
Br. Fer. Gal. His. His3. Li. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. Gr. M. Re. Sp. Z.*
⊙ Eine in der Levante einheimiſche, im ſüdlichen Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 558. *Plenck* t. 49. *Hayne* VI. t. 16. *Bert.* Bild. II. 83. fig. 2. *Zorn.* Ic. pl. t. 119.)

Man wendet den Saamen (semen Nigellae s. Melanthii s. Cumini nigri) an; er iſt klein, eirund oder länglich, faſt dreieckig, an einem Ende ſtumpf, etwas zuſammengedrückt, ſchräg gerunzelt, auswendig ſchwarz, inwendig grünlichweiß. Er hat einen ſtarken und unangenehmen Geruch und einen ſcharfen, gewürzhaften Geſchmack.

Schwach reizend, mehr in der Küche als in der Medicin gebraucht.

Nostoc.

Nostochium commune, Vaucher; Tremella Nostoc, L.; gemeiner Nostoc, Kukuksspeichel; Nostoc commun, Crachat de lune, Salive de coucou (*Gal.*), Star shoot (*Ang.*).

Br. *Gr.*

Eine Alge, welche in feuchtem Wetter auf der Erde wächst, und gar keine Wurzel besitzt. (*Oed.* Fl Dan. t. 885. f. 2)

Sie besteht aus einem, anfangs kugeligen, dann unregelmäßigen, gefalteten, welligen, lappigen, blasigen, gallertartigen, zitternden Laube von olivengrünlicher Farbe, welches beim Eintrocknen schwarz wird.

Erweichend. Verleidet, in den Branntwein gethan, das Branntweintrinken.

Nux Barbadensis.

Jatropha Curcas, L.; großer Wunderbaum, Barbadosnußbaum; Pignon des Barbades, Médicinier, Grand haricot de Pérou (*Gal.*); Angular leav'd physic nut (*Ang.*); Mara harulu (*Can.*); Rata endaru (*Cy.*); Bagherenda (*Hin.*); Dscharrak pagger (*Ja.*); Kanana ke rundum, Nepala (*Sa.*); Caat amunak (*Tam*); Nepala, Adivie amida (*Tel.*).

Br. Gal. *A. G. Gr. M.*

Ein Strauch (Monoecia Monadelphia *L.*; Euphorbiaceae, *J.*) Brasilien's, Surinam's und Jamaica's. (*Plenck* t. 691. *Desc.* Fl. Ant. II. 141.)

Man wendet den Saamen, Purgirnuß (semen Ricini majoris, Ficus infernalis, Nux cathartica Americana s. Barbadensis) an; er ist eirund, etwas gedrückt, so groß wie eine Haselnuß, schwärzlich und runzelig. Der Geschmack ist scharf und brennend.

Purgirend.

Mehrere Arten Jatropha liefern wirksame Oele, so J. multifida das Pinhoën-Oel, Brechen und Purgiren verursachend; J. glauca, ein Oel, welches äußerlich gegen Rheumatismen und Lähmung dient ꝛc.

Oleum Ricini Americani s. cicinum s. Jatrophae Curcadis. (*Gr. Sw*.)

℞. Semin. Ricini Americanae q. vis. Contunde in mortario; pastam sacco e tela confecto inclusam exprime.

Drastisch, Brechen erregend, bei Ileus, Würmern und hartnäckigen Hämorrhoiden empfohlen; äußerlich gegen chronische Rheumatismen. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Nux vomica.

Brechnuß, Krähenaugen; Noix vomique (*Gal.*); Palsou nut, vomiting nut (*Ang.*); Khanek-ulkeb (*Ar.*); Matsin (*C.*); Kodakaddurnatta (*Cy.*); Braeknaede (*D.*); Kuchla (*Duk. Hin.*); Nuez vomica (*His.*); Breeknoeten (*Bel*); Fungo di Levante, Noce vomica (*I.*); Noz vomica (*Lus.*); Culaka, Cutaka, Vescha mustibijum (*Sa.*); Recefkaka (*Suec.*); Yettie cottay (*Tam.*); Muscadi, Mustighenza (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham Han Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. LP. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sp.*

Ein platter, rundlicher, knopfförmiger Saame, von fast einem halben Zoll im Durchmesser auf eine bis zwei Linien Dicke, grau, an der Oberfläche etwas wollig, in der Mitte genabelt, von gleichsam hornartiger Beschaffenheit und ohne Geruch. Der Geschmack ist bitter, scharf und etwas widerlich.

Er kommt von Strychnos Nux vomica, L.; gemeines Krähenauge; Vomiquier (*Gal.*), einem Baume (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*) Ostindien's (*Blackw.* t. 395. *Plenck* t. 117. *Lam.* Ill. t. 119. *Hayne* I. t. 17. *Bert.* Bild. I. 84 fig. 1. Fl. méd. V. 249.)

Nach Pelletier und Caventou enthält er Strychnin und Igasursäure. Auch findet man Brucin darin.

Eins der kräftigsten Reizmittel, in etwas beträchtlicher Gabe ein Gift, welches krampfhafte und tetanische Contractionen hervorruft. Man wendet es bei Lähmung an. — Gabe des Pulvers, vier bis funfzehen Gran.

Pulvis Nucis vomicae. (*Au.*)

℞ Nucis vomicae . . grana tria.
Gummi Arabici,
Sacchari alb., sing. • semiscrup. (gr. xij)

Hufeland empfiehlt dieses Pulver bei Ruhr. — Man verschreibt täglich drei Stück.

Pilulae nervosum et musculare systema vellicantes s. stimulantes. (*B. E.*)

℞. Nucis vomicae . semidrachmam.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Fiant pilulae decem. — Gabe, ein Stück zwei oder drei Mal täglich. (*E.*)

℞. Nucis vomic. gran unum ad sex.
Sacchari albi . semiscrupulum.
Roob Sambuci quantum sufficit.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. (*B*)

Bei Lähmungen, Epilepsie, Veitstanz, Hypochondrie, Hysterie, Melancholie.

Extractum Nucis vomicae aquosum (An. B. Ba. Bor4. Hass. Sax. Wir. *Sw.*)

℞. Nucis vomicae raspatae libram unam.
Aquae bullientis . . libras octo.
Digere per horas 24, tum coque per horae quadrantem et cola; residuum per quadrantem horae coquatur cum Aquae libris quatuor, quo colato, liquores commixti et post sepositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (An.)

B*. Ba. Hass. Sax. Wir. et *Sw.* fere eundem modum agendi, nimirum coquere Nucem vomicam in Aqua nova, donec nullum amplius accipiat amaritiem, et decocta conjuncta evaporare; — Bor4. ut extractum cascarillae.

Reizend, giftig, bei Lähmung empfohlen. — Gabe. zwei bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich und mit Vorsicht gestiegen.

Extractum Nucis vomicae alcoholicum. (Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HasP. LH. Sax. *Ca Gr. Ma. Pic. Re. Vm.*)

℞. Nucis vomicae rasp. part. unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.
Calefac in vase tecto per horas 24 et cola exprimendo; residuum digere cum
Alcoholis (12°) . partibus tribus.
Cola exprimendo; liquoribus commixtis, quarta pars in balneo aquae destillet; quod remanet ad extracti consistentiam evaporet. (Fer. Gal. *Re*)

℞. Nucis vomicae raspatae quantum vis.
Alcoholis (22°) quantum sufficit.
Digere, Alcoholem novum subinde sumendo donec neque colorem neque saporem accipiat; tincturas commixtas et filtratas destillatione ad (quartam vel ad) quintam partem redige et quod remanet in balneo aquae consume. (Bel. Gal. Han. HassP. LH. Sax. *Pic. Vm.*)

LH. Alcoholem 36° adhibet; — Bor4. destillatione ad quartam partem redigere et tunc ad consist. extracti spissioris balnei vaporis ope consumere; — *Gr.* Nucem raspatam in Alcohole 40° B. in loco frigido digerere, exprimere et ad extracti consistentiam evaporare. *Extractum siccum Gr.* Tincturam cum Alcohole 36° B. paratam et filtratam lento calore in laminis leviter excavatis evaporare

℞ Nucis vomicae raspatae quantum vis.
Alcoholis, temperaturae quam maxime fieri potest, frigida penitus extracta, tinctura lente ad extracti consistentiam evaporet. (*Ca. Ma.*)

Reizend, giftig, bei Lähmungen jeder Gattung empfohlen. — Man giebt es in Pillen, deren jede einen Gran Extract enthält, indem man mit einer oder zwei anfängt und damit jeden Tag bis zum gewünschten Erfolg steigt. Auf diese Weise hat man die Gabe bis auf vier und zwanzig und dreißig Gran täglich erhöht, bis man tetanische Wirkungen erhielt; aber vier bis sechs Gran sind in den meisten Fällen ausreichend. Dieß gilt von dem mit vierziggradigem Alcohol bereiteten Extract; das mit schwächerem Alcohol bereitete ist schwächer und enthält viele gummöse Theile.

Extractum Nucis vomicae siccum. (*Ma. Va.*)

℞. Tinct. Nucis vom. alcoh. . q. vis.
Filtra et in patinis evapora.
Man muß es so gesättigt als möglich und mit sechsunddreißiggradigem Alcohol bereitet nehmen. — Gabe. ein bis zehen Gran allmälig.

Pilulae anthelminticae. (B*.)

℞. Gummi Ammoniaci,
Saponis Veneti,
Resinae Jalappae, sing.
scrup. unum.
Extr. Nucis vom. alcoh.
semiscrupulum.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, zwölf Stück in der Woche.

Pilulae excitantes s. irritantes. (LH. *Bo.*)

℞. Extracti Nucis vomicae resinosi,
Conserv. Tiliae, sing. . semidrach.
Fiant pilulae granorum duorum. — Bei Lähmung empfohlen — Gabe, Morgens nüchtern, ein Stück und alle Wochen um ein Stück gestiegen.

℞. Extracti Nucis vomicae alcoholici
grana duo.
Liquiritiae pulveratae grana sex.
Fiant cum Syrupi communis q. s. pilulae duae aeq. — Gabe, anfangs 1 bis 2 Stück 1 oder 2 Mal und nach und nach gestiegen. (LH.)

Riemann hat mit Erfolg bei sogenannter spasmodischer Cardialgie eingranige Pillen gegeben, welche aus einem Theil Brechnußextract und fünf Theilen Extrakasand bestanden.

Emulsio cum Nuce vomica, Solutio Extracti Nucis vomicae. (B*. *Au.*)

℞. Extr. Nucis vomicae grana decem.
Mucilag. G. Arab. unciam unam.
Aquae fontanae . . uncias sex.
Von Hufeland bei Ruhr gerühmt. — Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. — Man kann eine Unze Althee- oder Mandelsyrup zusetzen.

Decoctum Cucumerum cum Extracto Nucis vomicae. (*Au.*)

℞. Extr. Nucis vom. semidrachmam.
Decocti Cucumerum . uncias sex.
Ol. Lini c. Vitello Ovi contriti unciam.
Mellis . . . . . semunciam.

Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. — Von Händel als ein vortreffliches Mittel in allen Stadien des Trippers empfohlen.

Alcohol Nucis vomicae, Tinctura Strychnos s. Nucis vomicae Nucum vomicarum. (B°. Du. Fer. Gal. Li. Sax. *Bo. E. Fi. Gr. Huf. Ma. Pie. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Nucis vom. rasp. . partem unam.
Alcoholis Aqua diluti partes octo.

Infunde frigide per tres dies, tunc digere in balneo aquae per horas sex; cola exprimendo et filtra. (B°. *Vm.*)

Sw. Nucis vomicae sesquiunciam et Alcoholis (0,935) libras duas; — Sax. Nucis vomicae partem unam et quinque Spiritus rect.; — B°. secundum *Wiel*, quatuor Spiritus rectificati; — Gal. Li. quatuor Alcoholis (22°); — *Huf.* sex Alcoholis; — *T.* Nucis vomicae uncias duas, Alcoholis (36°) libras duas; digere per octo vel decem dies calore 25 ad 30° C.; — *Re.* Rasurae uncias duas, Spir. rectif. octo, macera per dies septem et exprime.

℞. Extr. sicci (Resinae) Nucis vom. grana tria.
Alcoholis (36°) . unciam unam.

Dissolve. (Fer. GalF. *Bo. E. Fi. Gr. Ma. Pie.*)

Va. Extracti grana quatuor.

Diese Tinctur, welche anfangs unter dem Namen *Guttae uterinae Reginae Hispanicae* bekannt war, ist ein sehr kräftiges Reizmittel. Man giebt die von Van Mons zu vierzig bis achtzig Tropfen, die von Magendie ebenfalls tropfenweise in irgend einem Trank. Die Indicationen sind dieselben für das alcoholische Extract. Man bedient sich derselben auch äußerlich in Einreibungen, bei Lähmungen und Atrophie einzelner Theile.

Guttae amarae, Gouttes amères. (*Ca. Gr.*)

℞. Spiritus Absinthii . libras duas.
Nucis Vomicae (vel Fabae St. Ignat. *Gr.*) . . . libram unam.
Kali subcarbonici liq. semunciam.
Fuliginis puri . drachmam unam.

Post dies quatuordecim infusionis in balneo aquae exprime et filtra. — Gabe, einen bis höchstens acht Tropfen in einem Glase eines bittern Aufgusses, gegen Windcolik.

Nymphaea.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Nymphaea alba, L.*; weiße Seerose, Seeblume, Wasserlilie, Wasserrose, Haarwurz; Nénuphar blanc (*Gal.*); White waterlily (*Ang.*); Seeblomster (*D.*); Nenufar blanco (*His.*); Witte plompen (*Bel.*); Nenufaro bianco (*I.*); Wodna lilia (*Pol.*); Nymphaea branca (*Lus.*); Sjaeblad (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. Gen. His. His3. Wir. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Nymphaeaceae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze (Fl. Dan. t. 602. *Blackw.* t. 498, 499. f. 2. *Plenck* t. 429. *Hayne* IV. t. 35. *Schk.* t. 142. Fl. méd. V. 247.)

Man wendet die Wurzel und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Nymphaeae albae s. Nenupharis s. Nenufaris) ist sehr lang, walzig, dick, knotig, fleischig, außen braun, innen gelblichweiß. Ihr Gewebe ist schwammig, der Geschmack bitterlich und etwas styptisch. — Die Blüthen haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert. Sie enthalten viel geschmackloſen Schleim

Die Wurzel enthält viel Satzmehl und ist sehr nährend, ungeachtet sie nach dem Glauben des großen Haufens kühlende Eigenschaften besitzen soll. Die Blüthen zählte man ehedem zu den schmerzstillenden und beruhigenden Mitteln.

2) *Nymphaea lutea, L.*; gelbe Seeblume: Nénuphar jaune (*Gal.*).

Gal. *Gr. Re.*

♃ Eine Pflanze Europa's (*Hayne* IV. t. 56. *Blackw.* Herb. t. 491.)

Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen. Die Blüthen sind gelb.

Species Diamargaritae frigidae. (Wir.)

℞. Margaritar. orient. drachmas sex.
Coralli albi,
— rubri,
Florum Boraginis,
— Nymphaeae albae,
— Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Ligni Aloës,
— Santali albi,
— — citrini,
singulorum drachmas duas.

Fiat pulvis. — Man empfahl es ehedem bei Schwindsucht und in der Convа-

lescenz von sogenannten bösartigen Fiebern. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Species de Gemmis frigidae. (Wir.)

℞. Eboris philosophice praeparati unciam unam.
Margarit. orient. praep. drach. sex.
Corallii albi,
— rubri, sing. . semunciam.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Granati,
Santali albi
— citrini,
— rubri, sing. drachmas tres.
Flor. Boraginis,
— Buglossi,
— Nymphaeae, sing. drach. duas.
— Rosarum . drachmas tres.
Misce ut fiat pulvis, cui adde
Folia Auri . . . . . no. 20.

Ehedem bei Schwindsucht zur Verminderung der Nachtschweiße empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Conserva Nymphaeae. (Sar.)

℞. Petal. Nymphaeae contus. et c. Sacchari pauxillo in pulpam redact. . . . . partem unam.
Sacchari clarificati . partes tres.
Ebulliant.

Aqua Nymphaeae. (Gal. Pal. Sar.)

℞. Florum Nymphaeae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post horas sex infusionis destillet dimidia pars.

Infusum Florum Nymphaeae. (Sar.)

℞. Flor rec. Nymphaeae . lib. duas.
Aquae bullientis . . libras octo.
Digere per octo horas et cola leviter exprimendo; operationem bis cum novis Floribus repete.

Syrupus (Florum) Nymphaeae s. de Floribus Nymphaeae albae. (Gal. His. HisS.)

℞. Petal. rec. Nymphaeae albae libram.
Aquae bullientis . libras quatuor.
Infunde per horas quatuor et cola leviter exprimendo; colaturae adde
Sacchari albi . . . . libras sex.
Fiat syrupus. (His. HisS.)

Gal infundere per horas 12 Petalorum libras quatuor in Aquae octo, colare et leviter exprimere, liquorem per aliquot horas reponere, tunc decanthare, addere Sacchari albi duplum et balnei aquae calore syrupum parare.

Potio antispasmodica. (Pie.)

℞. Emulsionis levis uncias quatuor.
Syrupi Nymphaeae . semunciam.
— Succini . drachmas duas.

O.

Oesypus.

Wollfett; Suint (*Gal.*); Yelk of wool (*Ang.*); Hisopo humedo (*His. Gr.*)

Ein öhlig-extractiver Stoff von üblem Geruch, welcher in der Schaafwolle steckt.

Das Wollfett enthält, nach Vauquelin, einen fetten thierischen Stoff und kohlensauren Kalk mit etwas essigsaurem und salzsaurem Kali.

Es kommt mit zu einigen Pflastern. — Die Spanische Pharmacopöe läßt es durch Kochen mit einer hinlänglichen Menge Wasser reinigen, so daß man eine dicke Flüssigkeit erhält, welche man durch ein Seidensieb seiht und dann bis zur Consistenz eines weichen Extracts abdampft. (Oesypus praeparatus.)

Olea.

Olivarum s. Olivae Oleum, Oleum fixum Fructus Olivae Europaeae; Baumöl, Olivenöl; Huile d'olive (*Gal.*); Oil of olive (*Ang.*); Bomolie (*D.*); Aceyte comun (*His.*): Olyfoly (*Bel.*); Azeito (*Lus.*); Bomolja (*Suec.*).

A. Am. Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. WW. *B. C. Gr. M. Par. Re. Sa. Sp. T.*

Ein fettes, flüssiges, fast weißes, gelbliches oder grünliches, geruchloses und sehr süß schmeckendes Oel. Es ist das leichteste aller fetten Oele und wird als Nahrungsgegenstand am meisten geschätzt. Die grüne Farbe desselben kommt vom Chlorophyll, die gelbliche, von einem vegetabilischen Stoffe, dessen Farbe erst sichtbar wird, wenn er der Luft ausgesetzt ist, und sein Geruch rührt von einem andern eigenthümlichen Stoffe her.

Man erhält es durch Auspreſſen, Abkochung oder Gährung der Früchte des Oelbaums, Olea Europaea, L., eines Baums (Diandria Monogynia, L ; Jasmineae, J) des ſüdlichen Europa's (*Blackw. t.* 199 u. 213. *Plenck* t. 11 Dict. d. Sc. nat. cah. 6. *Bert.* Bild. I. 27. f. 1 *Zorn.* Ic. pl t. 869.), welcher aus Kleinaſien ſeinen Urſprung herzuleiten ſcheint. Das Oleum maturum s. completum (*Gr.*) iſt das beſte. Das Oleum omphacinum wird durch Auspreſſen des nach dem Auspreſſen des Oels erhaltenen Rückſtandes oder Kuchens oder von unreifen Oliven gewonnen.

Potio oleosa. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Olei Olivarum . . semunciam.
Auf eine einzige Gabe.

Va. Olei Oliv. opt. uncias duas, Solutionis Gummi Arab quinque, Syr. Capill. Ven. duas. — Löffelweiſe gegen Huſten.

Emulsio oleosa. (WW. *Va.*)

℞. Olei Olivarum . unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Subige et adde
Aquae . . . . uncias septem.
Misce bene.

Clysma oleosum. (*R. Sw. Va.*)

℞. Decocti emollientis uncias novem.
Olei Olivarum . . uncias tres
Mellis . . . . unciam unam.
Addi potest Natri sulphurici vel Salis communis semuncia. (*Sw. Va.*)

℞. Decocti Hordei,
Olei Olivarum, sing. unc. quatuor.
Misce. (*B.*)

Clysma emolliens. (*Va.* Hosp. Mat.): Fol. Malvae, Betae cyclae, sing. uncias duas, Aquae libras duas, coque, cola et adde Olei Oliv. uncias tres; misce.

Unguentum labiale (*Re.*): Olei Olivarum boni uncias octo cum Radicis Alcannae partis fibrosae (bloomy) unciis duabus in lagena amplo collo instructa et obturata solis calori expone, donec colorem kermesinum acceperit, cola oleum in ollulam cum Cerae albae, Sevi ovilli recentis, sing. unciis tribus, liqua totum blando igne, a quo removendo adde Olei Rhodii vel Lavandulae guttas quadraginta.

Oleum lateritium s. Laterum s. de Lateribus s. philosophorum s. Olivarum empyreumaticum s. empyreumaticum commune. (Br. His8. Pal. Sar. Wir. *Gr. Re. T.*)

℞. Laterum contusorum quantum vis.
Oleo Olivarum bene impraegnatos in cucurbita vitrea in arenae balneo collocata destilla, igne gradatim aucto; oleum a phlegmate simul transeunte separa et nova destillatione cum cinere rectifica; — His3. Laterum pulveratorum, Olei Olivarum, singulorum libras tres in retortam immissa igne reverbarii destilla et oleum a phlegma separa.

Reizend, ehedem für auflöſend, ſchmelzend und fäulnißwidrig gehalten. Man bediente ſich deſſelben auch zur Reinigung von Geſchwüren

Oleum viride. (*Gr. Re.*) Fol. Lauri, Rutae, Majoran., Absinth. mar., Chamomill., sing. recent. uncias tres, Olei Olivarum libras (octarios) duas, coque donec brunneum colorem adipiscantur, exprime oleum et sepone ut subsideat.

Oleae Gummi

s. Resina s. Balsamum, Gummi Olivae; Oelbaumharz; Gomme d'Olivier (*Gal.*).

Gal. *Fi. Gr.*

In gelblichen Maſſen von etwas ſcharfem Geſchmack und Vanillegeruch

Ein Balſam, welcher in heißen Ländern aus verſchiedenen wilden Oelbäumen ausfließt.

Er beſteht, nach Pelletier, aus Harz, etwas Benzoëſäure und einem beſondern Stoff Olivile genannt.

Wird als abſtringirend und reinigend betrachtet.

Oleum Palmae

s. Palmae sebaceum s. Cocois butyraceae; Palmöl; Huile de palme (*Gal.*).

Ams. Br. Ed. Gal. Suec. *Be. Gr. M. Sp.*

Ein ſteifes butterartiges, goldgelbes Oel von einem Veilchengeruch und einem ſehr ſüßen Geſchmack.

Es kömmt von Cocos butyracea, L., Butterbaum, Cocotier du Brésil, einem Baume Südamerica's und Africa's (*Pis.* Ind. res. nat. et med. p. 215), oder, nach Jacquin, von Elaïs Guineensis. (*Jacq.* Stirp. Am. 360. t. 257. *Bert.* Bild. II. 51. f. 2.)

Es zeichnet ſich durch nichts vor andern fetten Oelen aus und man macht faſt keinen Gebrauch davon.

Digitized by Google

Olibanum.

Thus, *Thus verum*, *Gummi Olibani*; *Λίβανος*; Weihrauch; Oliban, Encens (*Gal.*); Incense (*Ang.*); Luban (*Ar. Mal.*); Kadidlo (*B.*); Virok (*D.*); Avul cundur (*Duk.*); Inciensa (*His.*); Kundir zuchir (*Hin.*); Wierook (*Bel.*); Incenso, Olibano, Cedro fenicio (*I.*); Incenso (*Lus.*); Kadzidlo biale (*Pol.*); Wirach (*Suec.*); Lubaniya (*Syr.*); Paringhi sambrani (*Tam.*)

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Va. Z.*

Ein Gummiharz in länglichen, unregelmäßigen, erbsengroßen und mehr gesonderten, oder aneinanderklebenden oder je zwei und zwei zusammenhängenden Tropfen (Thus s. Olibanum in guttis, Juniperi Lyciae gummi-resina), in welchem letztern Falle man es Thus masculum, Encens mâle oder Thus foemineum, Encens femelle genannt hat, indem man den Vergleich von der Aehnlichkeit seiner Form mit Brustwarzen oder Testikeln hernahm. Die durchsichtigen Tropfen, von welchen die pulverige Kruste (Manna Thuris) abgerieben ist, nennt man Manna Thuris crystallina. Es ist trocken, brüchig, halbdurchsichtig, blaßgelb und außen mit einem mehligen Staub überzogen. Im Munde wird es weich und klebt an den Zähnen. Der Geruch ist balsamisch, besonders wenn man es verbrennt; der Geschmack etwas brennend und bitter. Die schönsten Stücke nennt man Olibanum electum (Encens choisi, *Gal.*), die unreinern Olibanum in sortis (Oliban en sorte, *Gal.*).

Man kennt die Pflanze, von welcher der Weihrauch kömmt, noch nicht genau. Juniperus Lycia, Phoenicea und thurifera sind es wahrscheinlich nicht, obgleich viele Schriftsteller ihn davon herleiten. Colebrooke meint, er komme von Libanus thurifera, einem auf den Gebirgen Indien's wachsenden Baume (Decandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, *J.*) oder von Boswellia serrata. Andere halten die Pflanze für eine Art Amyris. (A. Kataf, *Forsk.*) Die Gandah birosa, eine Art Olibanum, kommt von Boswellia serrata (*Gr.*); das Thus in massis oder braune Olibanum von Boswellia glabra durch Einschnitte. Auch Canarium balsamiferum liefert eine Art Weihrauch.

Reizend, als harntreibend und Wundmittel angesehen. — Gabe, eine halbe Drachme. — Häufiger wendet man ihn in Räucherungen an als innerlich.

Pulvis Olibani compositus. (B^a.)

℞ Pulv. Olibani,
— Cort. Aurant., sing. gr. decem.
— Cort. Quercus gr. quinque.
Misce. — Heberden rühmte es bei weißem Fluß. — Gabe, alle drei Stunden zugleich mit einer Abkochung von Eichenrinde als Getränk und als Einspritzung. Wahrscheinlich wirkt hier mehr die Eichenrinde.

Species fumales pro suffimento, *Fumigatio aromatica.* (Ful. *Va.*)

℞. Olibani,
Baccar. Juniperi, sing. unc. quatuor.
Succini,
Cascarillae, sing. . unciam unam.
Florum Tanaceti . uncias duas.
Bei sogenannten kalten Rheumatismen.
Va. Olibani, Mastichis, Succini, sing. drachmas tres, Styracis Calamita duas, Benzoës, Laudani, sing. unam; misce. —

Pulvis pro suffimento. (RC.)

℞. Olibani,
Succini, singulorum partes tres.
Florum Lavandulae partem unam.
Misce.

Pilulae balsamicae. (*Au. Sa.*)

℞. Extracti Cascarillae drachmas duas.
Succi Liquiritiae,
Olibani, sing. drachmas quinque.
Croci . . . scrupulos quatuor.
Balsami Peruv. scrupulum unum.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Au.*)

℞. Olibani,
Gummi Arabici,
Succi Liquirit., sing. drach. duas.
Balsami Peruviani quant. sufficit.
Fiant pilulae quatuor. (*Sa.*)
Gabe, vier bis acht Stück, täglich zwei Mal, bei sogenanntem asthenischen Blutspeien. — Von Reil empfohlen.

Haustus ex Olibano, *Potio excitans*, *Mistura Olibani composita.* (*Au. Gr. Sw.*)

℞. Olibani,
Sacchari albi, sing. semidrachmam.
Aquae . . . drachmas decem.
Tinct. Cort. Aurant. drach. duas.
Misce. (*Sw.*)

℞. Olibani . . . semidrachmam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Aquae alexit. simpl. sesquiunciam.
— spirit Piperis Jamaic.,
Syrupi balsam., sing. drach. duas.

Misce. (*Sw.*)
Zweimal täglich bei weißem Fluß.

℞. Olibani . . . drachmas duas.
Copaivae . . sesquidrachmam.
Mucilaginis Acaciae sesquiunciam.
Mellis despumati . unciam unam.
Aquae Cinnamomi uncias quinque.
Tincturae Cantharidis
drachmas duas.

Misce. — ½ bis 1½ Unzen zwei bis drei Mal täglich, bei Tripper, weißem Fluß ꝛc. (*Gr.* sec. *Sprague.*)

Ononis.

Resta bovis; Arrête-boeuf (*Gal.*).
In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Ononis arvensis, L.*, Ackerhauhechel; Bugrane des champs (*Gal.*).
An. Br. Gal. Wür.
♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*All.* Flor. Pedem. I. p. 317. t. 41. fig. 1.)
Die Wurzel hat viel Aehnlichkeit mit der der folgenden Art.

2) *Ononis spinosa, L.*; stachelige Hauhechel, Ochsenbrechhauhechel, Ochsenbrechwurzel; Bugrane épineuse (*Gal.*); Thorne'd rest harrow (*Ang.*); Ossenbrecke (*Bel.*); Anonide, Arresta bove, Barbonaccia, Bonaga (*I.*); Wilzyny (*Pol.*).

A. Ams. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His8. Li. Pal. Sax. Wir. *Br. Fi. G. Gr. M. Sp.*

Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Blackw* t. 301. f. 1. *Plenck* t. 553. Diss. off. Pfl. VII. t. 19. *Zorn* Ic. pl. t. 132.)

Man wendet die Wurzel (radix Ononidis s. Anonidis s. Restae bovis) an; sie ist kleinen Fingers dick und stärker, rund, sehr klebrig, außen dunkelbraun, inwendig weißlich, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Beide Wurzeln werden als harntreibend angesehen.

Aqua Ononidis. (Sar.)

℞. Herb. rec. Ononid. contus.
part. unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent trientes duo.

Apozema aperiens et tonicum. (*Bo. Pie.*)

℞. Radicis Ononidis unciam unam.
— Eryngii . . . semunciam.
Cascarillae,
Fol. Cichorii,
— Taraxaci, sing.
semimanipulum
Aquae . . . quantum sufficit ut coquendo colaturae vitrum unum obtineatur, cui adde
Natri sulphurici drachmam unam.
Salis Ammoniaci grana quindecim.
Syr. Cichorii comp. . unc. unam.
Tartari chalybaeati scrup. unum.
Misce bene. (*Bo.*)

Pie. Tartarum chalybaeatum et sal ammoniacum omittit.

Bei viertägigem Fieber, Morgens nüchtern, zehen bis zwölf Tage hintereinander.

Onosma.

Onosma echioides, L.; natterköpfige Lotwurzel; Orcanette jaune (*Gal.*); Smalt yellow alcanet (*Ang.*); Wolowy gazyk cerweny (*B.*).

Gal. *Br. Gr. Re.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Boragineae, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Jacq.* Aust. t. 295. *Schk.* t. 31. *Plenck* t. 81.)

Man wendet die Wurzel an, deren Rinde einen gelbfärbenden Stoff enthält. — Adstringirend.

Wir bringen hier zwei unter Alcanna (s. Anchusa tinctoria) übergangene Präparate bei:

Unguentum rubrum potabile. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Alcannae libram unam.
Vini rubri . . . . semilibram.
Post aliquot dies frigidae macerationis adde
Butyri recentis . . . libras sex.
Coque ad humidi consumptionem usque et cola cum expressione.

Unguentum rubrum ad labia oris, Ceratum labiale. (Wir. *T.*)

℞. Radicis Alcannae . sesquiunciam.
Cerae albae . . . drachmas sex.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.
Vini rubri . . . . uncias tres.

Radicem concisam in vino macera, adde oleum et coque lente ad humidi consumptionem usque, in fine ceram addendo; exprime et massam Aquae Rosarum infunde; post refrigerationem liqua blando igne, adde Olei Cinnamomi guttas decem et in capsulas chartaceas infunde.

T. Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Olei Olivarum uncias quatuor, Radicis Alcannae frustum, per aliquot tempus in balneo aquae relinquere et mixturae jam concrescenti addere Olei de Cedro guttas aliquot.

Ophioglossum.

Ophioglossum vulgatum, L.; Schlangenzunge; Ophioglosse. Langue de serpent (*Gal.*); Adders tongue (*Ang.*); Slangetunge (*D.*); Lingua de sierpe (*His.*); Natertong (*Bel.*); Lingua di serpente (*Lus.*); Laeke tunga (*Suec.*).

Gal. Wir. *Gr. Sp.*

⊙ oder ♃ (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Pflanze, welche man in ganz Europa antrifft. (*Blackw.* t. 16. *Moris.* III. t. 5. f. 1. *Oed.* Fl. Dan. t. 147.)

Man wendet das Kraut (herba Ophioglossi s. Echioglossi s Linguae serpentariae) an; es besteht aus umfassendem, eirunden, stumpfen, ganzen, glatten, rippenlosen Laub und hat keinen Geruch, aber einen schleimigen und süßlichen Geschmack.

Ehedem hielt man es für ein Wundmittel.

Gr. Re. führt außerdem noch Oph. Osmunda, Osmunda regalis, Filix florida und das Extract derselben (Extractum Osmundae regalis) als Mittel gegen Englische Krankheit; so wie Oph. Lunaria, Osmunda Lunaria, als abstringirend an.

Opium.

Opium thebaicum, *Succus thebaicus*, *Meconium*, *Papaeri s somniferi Succus inspissatus*; Mohnsaft; Opium (*Gal.*); Opium (*Ang. Pol.*); Ufium (*Ar Mal.*); Hapium (*Ba.*); Abim (*Cy.*); Afim (*Duk.*); Opio (*His. I. Lus*); Ufim (*Hin*); Turk heulzap (*Bel.*); Apium (*Ja.*); Carappa (*Mal.*); Schirik, Huskasch (*Pe.*); Apagnum (*Sa.*); Apini (*Tam. Tel.*); Madjun (*Tu.*).

A. Am Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. I.H. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. Gr. M. Par. Pid. Re. Sc. Sp. T. Va.*

Ein fester verhärteter Saft, welcher zum Theil auf Einschnitte aus den noch nicht reifen Kapseln des Mohns (Papaver somniferum und officinale) (*Hayne* VI. 40. *Blackw.* t. 482. 483. *Plenck* t. 417. Düss. off. Pfl. VII. t. 24. X. t. 3. *Lamk.* III. t. 451. *Bert.* Bild. I. 99. f. 1.) ausfließt, zum Theil aber auch durch Auspressen der zerstampften Pflanze gewonnen wird.

Man unterscheidet im Handel besonders zwei Sorten Opium, das Türkische und das Indische; das Englische, welches neuerdings mit in Anwendung gekommen ist, kommt dem Ansehen nach dem Indischen fast gleich, ist aber heller, die Wirkung soll der des Türkischen gleich seyn. Das erstere besteht in runden, gleichartigen, trocknen, derben, schweren, undurchsichtigen, dunkelbraunen (röthlichbraunen) Kuchen von glänzendem Bruche, welche einen ekelerregenden, bittern scharfen, etwas brennenden Geschmack und einen unangenehmen, ganz eigenthümlichen Geruch besitzen. Das zweite ist bei weitem nicht so consistent, bisweilen auch flüssig wie Pech und stets zähe. Es hat eine weit dunklere Farbe, einen ekelhafteren, weniger bittern Geschmack und einen etwas brenzlichen Geruch.

Es ist weit weniger geschätzt und weniger theuer als das andere.

Ungeachtet man sich seit einigen Jahren viel mit Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des Opiums beschäftigt hat, so scheint es doch, als sey man noch zu keinem vollständigen Resultate gekommen; wenigstens bleiben wohl noch manche Bestandtheile darin zu entdecken, deren Gegenwart man bis jetzt nur vermuthet. Die wichtigsten der bis jetzt bekannten sind die Narcotine, Narcotin, auch Opian genannt, und ein organisches Alkali, welches Serturner entdeckte, die Morphine oder das Morphin, Morphium, welches sich darin mit einer ebenfalls eigenthümlichen Säure, der Mekonsäure, Mohnsäure, vorfindet.

Man hat viel über die Wirkung des Opiums gestritten; Manche halten es für ein kräftiges Reizmittel, Andere für ein unmittelbar beruhigendes, nie reizendes Mittel. Das Wahre ist, daß es in einer bestimmten Gabe, welche für jedes Individuum verschieden ist, eine reizende Wirkung hervorbringt; in stärkerer Gabe aber beruhigend wirkt, geschehe dieß nun durch einfache Revulsion oder durch unmittelbare Einwirkung auf das Nervensystem, was noch ein Räthsel ist; und daß es in noch höherer Gabe endlich Vergiftung zu Wege bringt. Die Perser, Türken, Chinesen, Syrier, Malaien welche große Mengen davon auf einmal verzehren, empfinden davon ähnliche Wirkungen, als die Liebhaber geistiger Getränke in unsern Gegenden.

Da das Opium oft mit fremden Stoffen verunreinigt ist, so schreiben mehrere Pharmacopöen (Ams. An. Du. Gal. Lon. *Sw.*) eine Reinigung desselben vor. Einige (Ams. An. Gal. Lon.) lassen es in kochendem Wasser erweichen, den Brei durch Leinwand drücken und es dann bis zur erforderlichen Consistenz abdampfen. Die übrigen (Du. *Sw.*) lassen es in Weingeist auflösen, die Flüssigkeit filtriren, destilliren, um den Alcohol zu trennen, und sie dann gehörig abdampfen. *Fi.* u *T.* lassen, außer dem letztangegebenen Verfahren, noch den Satz mit Regenwasser digeriren ꝛc. Das auf diese Weise gereinigte Opium führt den

Namen *Opium depuratum s. colatum*, *Extractum Opii siccum*, *Extractum thebaicum*, *Opium purificatum*, *Laudanum opiatum*. Ehedem nannte man es rohes Opium (*Opium brutum s. crudum*), Opium brut ou cru (*Gal.*). — *Opium purificatum molle* Lon. *Gr.*, Opium in Waſſer geweicht zur Pillenconſiſtenz; *Op. pur. durum*, im Waſſerbad getrocknet, um es pulvern zu können *Re.* nimmt rectificirten Weingeiſt dazu (octar. 12. Op. libr. 1.).

§. I. Präparate, welche nur einen Theil der Beſtandtheile des Opiums mit oder ohne das zu ihrer Ausziehung bereitete Menſtruum enthalten.

A. Auszug durch Deſtillation.

Aqua Opii. (B*. Bor4. Sax. *Sw*. Vm.*)

℞. Opii crudi . . . partem unam.
Aquae communis . partes decem.
Destillet liquidi pars dimidia (B*. Sax)

Bor4. Opii puri unciam, Aquae font. q. s. ut destillando unciae sex obtineantur; — *Sw*.* destillare partes sex mixturae ex Opii parte una et duodecim Aquae; — *Vm.* Opium in Aquae partibus sex dissolvere et liquorem ad siccum usque destillare.

Soll nach manchen Schriftſtellern mit mächtigen narcotiſchen Kräften begabt ſeyn, beſitzt aber wahrſcheinlich nicht viel Arzneikräfte. — Gabe, zwei bis ſechs Drachmen mit Zuckerſyrup.

B. Auszug durch Eſſigſäure.

Guttae nigrae (Common black drops). (*Gr*)

℞. Opii . . . . . uncias octo.
Aceti destillati . . libras duas.
Infunde. — Milder als die tinct. opii.

Acetum Opii s. opiaceum, *Tinctura Opii acetosa.* (*Vm.*)

℞. Opii concisi . . partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Macera per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido. Adde deinde
Aceti albi . . . . partes sex.
Stent in maceratione frigida per plures dies; tum colata cum expressione filtrentur.

Acetum Opii, *Guttae nigrae*, *Essentia nigra anglica*, *Black drops.* (Am. B*. GalF. *C. Gr. Pal. Re. Vm.*)

℞. Opii . . . . . semilibram.
Aceti Vini . . . octarios tres.
Nucis mosch. contus. sesquiunciam.
Croci . . . . . semunciam.
Coque ad aptam consist. et adde
Sacchari albi . . uncias quatuor.
Fermenti Cerevisiae unciam unam.
Stent in digestione per septem septimanas, tunc aëri exponentur, donec syrupus sit perfectus, qui colatus in lagenas infundatur addito Sacchari pauxillo. (Am. B*. GalF. *C. Gr. Re.*)

Gr. Opii uncias octo, Succi Malorum sylv. octarios tres, Nucis mosch. sesquiunciam, Croci drachm. duas, coque ad mollitiem, adde Sacch. uncias quatuor, Fermenti cochlearia maxima duo, igni appropinqua per hebdomades sex vel octo, et tunc aëri expone usque syrupi consist. acquisiverit, decantha, filtra et parvis lagenis immitte, cuilibet earum Sacchari pauxillum adjiciendo. 1 Tropfen ſoll 4 Tropfen tinct. op. gleich ſeyn (*Braithwaite's genuine black drop.*) *Vm.* miscere Opii partes sex, Sacchari albi tres, Nucis mosch. unam cum dimidia, Croci unam et Aceti Pomorum quadraginta octo, addere Fermenti Cerevisiae partem unam, infundere in vas planum et tectum et mixturam actioni aëris sicci relinquere, donec liquor supernatans syrupi consist. acquisiverit, tum decanthatum servare.

Dieſes bei den Engländern unter dem Namen *black drops* oder *quaker's black drops* ſehr berühmte Präparat verdankt ſeine Wirkung wahrſcheinlich dem während der Operation gebildeten eſſigſauren Morphin.

Man findet ſchon etwas Aehnliches in dem Formular der Republik Genua (1791) unter dem Namen *Aethiops vegetabilis* (*Opium torrefactum*, *Pulvis stagnaticus. Fi.*). ℞. Opii q. vis; crucibulo vitreato immittatur; sub agitatione adspergatur pluries Vinum album; refrigefactum et pulveratum comburatur simulque denuo humectetur Vino; ad dimidium pondus redacto addatur Acetum acerrimum, dein siccatur massa. — Es mußte etwas Morphin frei werden, welches ſich endlich mit der Eſſigſäure verband.

Extractum Opii acetosum. (*Pie.*)

℞. Opii concisi . . unciam unam.
Aceti destillati . octarium unum.
Digere per horas 28 ex arenae balneo, subinde agitando; decanthata et filtrata ad massae pilularis consist. evaporent.

Quercetan's opium (*Gr.*): Opium in Aceto Vini solut., filtrat. et ad extracti consist. vaporatum.

Opium prepared with vinegar (*Gr.*),

Opium in Aceto Vini solut. filtratum et ab Acido destillationis ope liberatum. *Magisterium Opii Ludovici* (*Gr.*): Dissolve Opium in Aceto, cola, adde Aq. Subcarb. Potassae quamdiu praecipitatum oritur, filtra et praecip. sicca.

Laudanum de Lalouette. (*Pic.*)

℞. Extracti Opii acetosi drachmas sex.
Vini Hispanici . uncias decem
Aquae Vitae . . . uncias duas.

Eine Drachme der Auflöſung enthält vier Gran Extract.

Laudanum nepentes Quercetani s. opiatum. (*Fi. T.*)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Aceti . . . . . libras duas.

Digere et cola pluries ad extractionem usque; liquores commixtos ad extracti consistentiam consume. Tunc recipe

Extracti hujus . . uncias duas.
— Croci . . unciam unam.
Ocul. Cancri praep. drach. duas.
Boli albae porph. drachmam unam.

Fiat pasta, quae evaporatorii vel aëris ope evaporet. (*T.*)

Fi. Oculorum Cancri drachmas sex.

Mixtura Sylvii. (*Pic.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Aceti destillati . . semunciam.
Aquae Plantaginis . uncias sex.
Syrupi Papav. albi unciam unam.

Bei Blutſpeien mit Krämpfen empfohlen. — Löffelweiſe.

Collutorium antiodontalgicum. (*Pic.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Opii puri . . . . grana duo.
Aquae Salviae destillatae,
Aceti, singulorum . uncias duas.

Post unam horam digestionis in balneo aquae cola. — Von Mayr vorgeſchlagen.

Topicum leniens s. sedativum. (*Bo.*)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Petal. Rhoeados, sing. unc. unam.
Opii in Aceti q. s. soluti grana sex.

Contunde simul ut fiat pasta. — Gegen heftigen Kopfſchmerz auf den Kopf zu ſchlagen.

Nepenthes opiatum, Pilulae anodynae, Common night pills. (*Gr.* Lon. 1688.)

℞. Extr. Opii cum Aceto dest. et tunc c. Spir. ten. parati
unciam unam
— Croci Spir. ten. parat.
sesquidrachmam.
Castorei . . . drachmam unam.
Tinct. Specier. Diambr. sine odorat. (cum Spec. drach. quatuor et Spir. rect. q. s.)
Olei Nucis mosch. guttas decem.

Evapora ad massam pilularem.

C. Auszug durch Wein.

Tinctura Opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina s. thebaica Marabelli, Vinum cum Alcohole opiatum. (Ams. Bel. D. Han. Hass. Li. Pm. Suec. *Pid. Sw. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Vini Hispanici partes duodecim.

Post tres dies filtra. (D.)

Vm. Vinum Maderanum et infusionem per mensem; — Hass. *Pid.* et *Sw.* Opii partem unam, Vini Hispanici octo et digestionem blando calore per unum vel duos dies; — Suec. Opii partem unam, Vini albi sex et octo dies frigidae macerationis.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Vini Malacensis . . partes octo.
Aquae Vitae (0,907) partes duas.

Post duos dies digestionis cola. (Ams. Bel. Han.)

Li. Pm. Opii uncias duas, Aquae Vitae quatuor et Vini albi libram unam.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . grana decem.
Vini rubri . . . unciam unam.

Misce.

Fomentatio leniens. (*Pic.*)

℞. Opii concisi . . unciam unam.
Vini rubri vel albi sesquioctarium.

Coquendo dimidium consume. — Bei gichtiſchen Schmerzen, Rheumatiſmen und Koliken von Nutzen. — Man tränkt Stücke Flanell damit.

Extractum Opii vinosum, Laudanum opiatum. (Gal. Hass. *Pid. T. Vm.*)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.
Vini albi . . quantum sufficit.

Digere in balneo aquae, cola fortiter exprimendo, sepone, decantha et balnei aquae ope ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

Hass. et *Pid.* Vini duodecuplum Opii pondus indicant.

℞. Opii in frustula minora concisi
partem unam.
Vini Maderani . . . partes sex.

Macera frigide per plures dies et cola exprimendo; macerationem residui repete cum aequali quantitate novi Vini et colaturas commixtas blando calore, continuè agitando, consume. (*Vm.*)

T. Opii uncias quatuor, Vini albi generosi libras duas, post dies duos digestionis loco tepido filtra per telam cum expressione, faeces digere cum dimidia Vini antea adhibiti parte; liquores commixti et sepositione clarificati ad extracti consistentiam evaporent.

Dieſes Extract enthält mehr Narcotin und Harz, als das wäſſerige Extract, außerdem aber auch noch alle Elemente des Weins, den Alkohol ausgenommen, wodurch es noch ſchlechter wird; denn da die Quantität dieſer Steffe je nach der Weinſorte verſchieden und ſtets unbekannt iſt, ſo kann man nicht genau wiſſen, wie viel Opium jedesmal in einer beſtimmten Doſis Extract enthalten iſt.

Syrupus opiatus s. Opii vinosus. (Bor. Pol. *Sw. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Vini Maderani partes duodecim.
Infunde per dies duos, blando calore, cola fortiter exprimendo et adde
Sacchari albi . . partes viginti.
Solve blandi caloris ope et commisce cum
Syr. comm.
partib. centum sexaginta.
Serva. (*Vm.*)

℞. Extr. Opii grana viginti quinque.
Vini Malacensis . unciam unam.
Dissolve et adde
Syr. Liquirit. unc. viginti quatuor.
Serva. (Bor.)
Pol. loco syrupi liquiritiae illum Althaeae, et *Sw.* Syrupum Sacchari.

Tinctura vinosa Opii et aromatica s. thebaica, Vinum Opii, Vinum aromaticum opiaceum, Vinum aromo-opiaceum. (Am. Ed. Lon. *Br. C. Gr. Re.*)

℞. Extracti Opii . . unciam unam.
Cinnamomi contusi,
Caryophyll. contus., sing.
drach. unam.
Vini albi Hispanici uncias sedecim.
Macera per octo dies et cola. (Ed. Lon. *C. Gr. Re.*)
Am. Opii uncias duas; — Br. *Gr* Opii uncias duas, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. drachmam (duas *Gr.*) et Vini libram.

℞ Extracti Opii pulv. uncias duas.
Aquae Cinnamomi uncias decem.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Digere, subinde agitando, per sex dies et filtra. (*Br.*)

Laudanum liquidum s. crocatum s. compositum, Tinctua Opii vinosa cronata. Ful. R. Sax.)

℞. Opii pulverati . partem unam.
Croci . . . partem dimidiam.
Vini Hispanici . partes novem.
Stent in maceratione per tres dies, leni calore et colentur. Eine Drachme enthält ungefähr zehen Gran Opium.

Vinum Opii crocatum, Elixir Papaveris, Essentia Papaveris. (Fenn. Suec. *Vm.*)

℞. Opii,
Croci, sing. . drachmas quinque.
Succi Liquiritiae . sesquiunciam.
Vini Maderani . . uncias triginta.
Digere frigidè, decantha et filtra. (*Vm.*)
Fenn. Opii, Croci, sing. scrup. quinque, Succi Liquiritiae semunciam et Vini Hispanici uncias decem: — Suec. Succi Liquiritiae, Croci, Opii, sing. scrup. quinque et Vini uncias decem.

Laudanum liquidum Sydenhami s. compositum, Tinctura Laudanum s. anodyna s. Opii crocata s. vinosa Opii Sydenhami, Vinum Opii aromaticum s. crocato-opiatum s. Opii s. cum Opio compositum s. paregoricum. (Ams B. Bor. Bor4. D. Fer. Gal Han. HassP. His. His8. LH. Li. Pal. Pm. Sar. *Ca. Fi. Gr. Sw. T. Vm.*)

℞. Opii . . . . . unciam unam.
Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi . . drachmam unam.
Vini Malacensis . uncias novem.
Post tres dies digestionis cola. (Li.) — Eine Drachme enthält ungefähr zehen Gran Opium.

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Croci . . . . . unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Vini Hispanici . . libram unam.
Post aliquot dies digestionis exprime et filtra. (Fer. *Fi.*)

℞. Opii concisi . . . uncias duas.
Croci . . . . . unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum, sing. drachmam.
Vini Malacensis . libram unam.
Digere leni calore per dies tres, octo vel quatuordecim, subinde agitando; cola fortiter exprimendo et filtra. (Ams. B. Ba. Br. Gal. His. His8 Pal. Pm. Sax. Wir *Ca. Gr. Sp. Sw.*)

D. Croci semunciam; — LH. Croci semunciam, Vini albi uncias quatuordecim et Alcoholis duas; — HassP. Croci drachmas sex et Vinum Hispanicum; — Bor. Han. et Pal. Opii uncias quatuor, Croci sesquiunciam, Caryophyllorum, Cinnamomi (Cassiae cin-

uamomeae), sing. drachmas duas, Vini Malacensis libras duas; — Bor4. Vini uncias triginta octo. Pond. sp. 1,045 — 1,055

Sar. Opii semunciam, Croci drachmas duas, Cinnamomi semidrachmam, Caryophyllorum tantidem et Vini Maderani uncias quatuor cum dimidia.

Letztere Formel enthält demnach etwas mehr Opium, als die übrigen, von denen zwanzig Tropfen, d. h. fünfzehen Gran, einen Gran Opium enthalten.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum, sing. part. unam.
Croci . . . . . partes octo.
Vini Maderani partes centum nonaginta duas.

Infunde per horas 24 in balneo aquae tepido, cola exprimendo, in colatura infunde frigide et absque agitatione.

Opii . . . . . partes sedecim.

Post dies decem vel quatuordecim decantha et filtra. (*Vm.*)

℞. Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi pulverati,
Caryophyllorum, sing. drachmam.
Vini Hispanici . . uncias octo.

Digere, subinde agitando, per tres dies: in colatura dissolve

Opii depurati . . unciam unam.

Post horas viginti quatuor digestionis filtra. Residuo aromatico infunde

Vini Hispanici . uncias quatuor.

Post sufficientem digestionem fortiter exprime; in colatura digere residuum operationis et post filtrationem utrumque vinum commisce. (An. Bel.)

℞. Opii puri . . . uncias quatuor

Digere evaporatorii calore per tres dies in Alcoholis diluti 20° B. unciis viginti; interea digere

Croci . . . . . sesquiunciam.
Cinnamomi . . . . semunciam in
Alcoholis 20° B. . unciis decem.

Digere totum per tres dies, filtra per linteum exprimendo, deinde per chartam etc. (*T.*)

Es ist Jedermann bekannt, welchen Ruf dieser Opiumwein genossen hat und noch genießt Merkwürdig sind Sydenham's eigene Worte darüber: Hanc nostram praeparationem Laudani officinarum solido anteferendam virtutibus quidem non obcenseo, sed formam saltem commodiorem et majorem dosis certitudinem eidem antepono. Keiner der andern Erfinder neuer Präparate hat die Bescheidenheit dieses Englischen Arztes.

Cataplasma anodynum. (*Ca. Va.* Hôt D.)

℞. Farinae Seminis Lini,
Farinae Hordei, sing. libram unam.
Decocti Capitum Papaveris q. s.

Coque ad requisitam consistentiam et cataplasmati infunde

Laudani liquidi Sydenhami drachmam unam vel duas.

Va. Laudani drachmam, Cataplasmatis emollientis libram.

Bei Entzündungen mit heftigen Schmerzen.

Cataplasma ad cancrum. (Ful. *Vm.*)

℞. Pulpae Carotae Radicum flavarum partes viginti quatuor.
Faeculae Cicutae virid. siccatae part. quatuor.
Laudani liq. Sydenh. partem unam.

Contere in mortario. (*Vm.*)

℞. Roob Dauci . . . libram unam.
Pulveris Cicutae . uncias duas.
Laudani liq. Sydenh. drach. tres.

Commisce bene. (Ful.)

Als Verbesserungsmittel des Geruchs und um die Schmerzen bei offenem Krebs zu stillen, gepriesen.

Clyster sedativum. (*Sy.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quadraginta ad sexaginta.
Olei Olivar. vel Lini unc. quatuor.

Misce agitando.

Linimentum narcoticum s. anodynum s. opiaceum. (*ParC. Ra. Va.* Hosp Ven.)

℞. Laudani liq. Sydenh. partem unam.
Olei Olivarum . . partes octo.

Commisce. (*Ra. Va.*)

LH. Laudani partem unam, Olei Amygdalarum octo; — *Va.* Hosp. Inf. Laudani partem unam, Ol. Oliv. sedecim; — Hosp. St. Ant pro laudano Opium; — *ParC.* Laudani partem unam et Olei Amygdalarum dulcium sedecim.

Ceratum opiaceum. (*Ra. Va.* Hosp. Inf.)

℞. Laudani liq. Sydenh. unciam unam.
Cerati Galeni . . libram unam.

Misce terendo.

Unguentum s. Pomatum opiaceum. (*Sm.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami drachmas duas ad quatuor.
Cerati Galeni . . uncias duas.
Farinae Tritici . quantum sufficit ut spissa reddatur miscella.

Man bringt diese Salbe mittelst feiner Leinwand auf Brandflecken. — Ein sehr starker wässeriger Aufguß des Opiums würde vorzuziehen seyn.

Linimentum narcoticum. (*Ra. Va.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami part. 1.
Balsami tranquilli
part. 32 (64 *Va.*)
Commisce bene.

℞. Laudani liquidi . partem unam.
Balsami tranquilli partes quatuor.
— Fioravanti . . partes octo.
Misce exacte. (*Ra. Va.*)

Linimentum sedans, Pomatum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liq. Sydenh.
drach. quatuor.
Unguenti populei . uncias duas.
Vitellos. Ovorum rec. . . no. 2.
Tritura simul. (*Sm.*)

℞. Unguenti populei . semunciam.
Opii crudi in Vino albo dissoluti
grana quindecim.
Concharum praep. semidrachmam.
Vitellum Ovi . . . . . unius.
Olei Liliorum . quantum sufficit.
Misce bene. (*Pie.*)
Beſonders zur Stillung von Hämorrhoidalſchmerzen empfohlen.

Unguentum antiophthalmicum. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liq. Sydenh.
drachmam unam.
Albumina Ovorum rec. . no. 2.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis, sing. . . q. s.
Subige bene.

Linimentum opiato-camphoratum s. opiaceum camphoratum s. leniens. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Laudani liq. Sydenh. semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.
Linimentum opiaceum (Char. *Va.*): Laudani drachmas duas, Acetatis Plumbi liquidi quatuor, Ol. Amygd. dulc. uncias duas (Camphorae?)

Linimentum anodynum. (Ful. *Ca. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Camphorae, sing. . partem unam.
Unguenti Althaeae partes sedecim.
Misce triturando.

Linimentum antispasmodicum. (Ham.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Tinct. Cantharid., sing.
drachm. duas.
Camphorae . . drachmam unam.
Olei Hyoscyami . unciam unam.

Linimentum opiaceum s. opiaceum et saponatum s. opiato-saponaceum. (Ful. *Ra. Va.* Hôt. D)

℞. Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam ad duas.
Saponis albi . . . semunciam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Commisce. (*Ra. Va.*)

℞. Balsami Saponis . uncias duas.
Laudani liquidi drachmam unam.
Misce triturando. (Ful)
Beruhigend, lindernd und auflöſend.

Pilulae lenientes s. sedantes et bechicae. (*Pie.*)

℞. Laudani liq. Sydenh. gutt. viginti.
G. Ammoniaci . scrupulum unum.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei Stück und mehr.

Pilulae narcoticae. (*Pie.*)

℞. Sacchari crystallis, unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Piperis,
Laudani liq. Sydenh., sing.
drachmam.
Coriandri . . . scrupulos duos.
Croci . . . . semidrachmam.
Moschi . . . . semiscrupulum.
Syrupi Capitum Papaveris . q. s.
Dieſe Pillen gelten als beruhigend und ſchweißtreibend. — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Julapium leniens s. sedativum. (*Bo. Pie. Ra.*)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Aquae . . . . . unciam unam.
Syrupi . . . . drachmas duas.
Auf eine einzige Gabe. (*Ra.*)

℞. Julapii gummosi uncias quatuor.
Laudani liquidi . semidrachmam.
Misce benè. (*Ra.*)

℞. Syrupi Limonum . unciam unam.
Laudani
gutt. quindecim ad viginti.
Tincturae Ipecacuanhae aquosae
cochlear majus unum vel duo.
Aquae Flor. Aurant. uncias duas.
Misce sedulo. (*Bo. Pie.*)

Clyster sedativum. (*Sy.*)

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.
Adde sensim continue triturando,
Aquae bullientis . . semilibram.
Coque leviter et colaturae adde
Laudani Sydenh. drachmam unam.

Injectio leniens s. emolliens s. narcotica s. deprimens. (LH. *Ra. Re.*)

℞. Laudani Sydenh. drachmam unam.
Decocti Seminis Lini libram unam.
Commisce.
LH. Specier. emoll. unciam, Aq. q.

s. ut coquendo libra una supersit, colaturae adde Laudani drachmam; — *Re.* Infus. Semin. Lini uncias quinque, Vini Op. gutt. triginta.

Mixtura anodyna, Haustus anodynus. Bo. Pie. Sm.)

℞. Laudani Sydenh. scrup. duos.
Aquae Cinnam simpl. uncias sex.
Misce. (*Pie. Sm.*)

℞. Laudani liquidi drachmam unam.
Aquae Cinnam. hord. uncias sex.
Syrupi Capit. Papav. unciam unam.
Misce. (*Bo.*)

Barthez verschrieb diese Mixtur bei sogenanntem krampfhaftem Magenschmerz. — Gabe, ein Eßlöffel, vor der Mahlzeit zu nehmen.

℞. Laudani liquidi guttas octodecim.
Pulveris relaxantis . grana tria.
Aquae fontanae . unciam unam.
Syrupi Limonum drachmam unam.
Misce sedulo. (Gen.)

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. semidrachmam.
Aquae Menthae pip . uncias sex.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Löffelweise.

Potio paregorica. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Aquae Rhoeados . unciam unam.
Syrupi Capit. Papaveris sesquiunciam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Haustus tonicus adstringens, Potio tonica adstringens. (B.)

℞. Radicis Colombo drachmas duas.
Aquae bullientis quantum sufficit ad infusionem unciarum octo, quarum colaturae adde
Laudani Sydenh semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Bei Verdauungsbeschwerden allmälig zu nehmen.

℞. Cascarillae,
Colombo, sing. . drachmas duas.
Aquae bullientis quantum sufficit ad unciarum septem infusionem; colaturae adde
Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph. sing. guttas viginti.
Bei chronischer Diarrhöe allmälig zu nehmen.

Potio antihaemorrhagica. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. gutt quindecim
Tinct. Cinnamomi drachmas quatuor ad unciam unam.
Syr. Consolidae maj. uncias duas.
Aquae communis uncias quatuor.
Gegen Mutterblutflüsse von Atonie. — Gabe, einen Löffel alle Viertel-, alle zwei oder alle Stunden, je nach der Beschaffenheit des Falls.

Potio hypnotica. (Pie.)

℞. Laudani Sydenh. . gutt. quinque.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Aquae Flor. Tiliae.
— — Aurant., sing. unc. duas.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Aqua aromatica cum Opio, Potio leniens. (Au. Pie.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Syr. Capit. Papav. unciam unam.
Aquae Lactucae . sesquiunciam.
— Flor Aurant. . semunciam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*Pie.*)

℞. Aquae Cinnamomi unciam unam.
— Melissae . . uncias duas.
Tincturae Castorei guttas viginti.
Laudani Sydenh. . guttas decem.
Syrupi Opii . . . semunciam.
Löffelweise. — Pressavin rühmte diesen Trank besonders bei Mutterkolik. (*Au.*)

Potio carminativa. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. guttas decem.
Aquae Cinnam. simpl. unciam unam.
Emulsionis simplicis uncias sex.
Von de Haen bei Windkolik empfohlen. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstunden.

Looch s. Linctus leniens. (Ra. Hosp. Ven. Va.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim ad triginta.
Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
Looch simplicis uncias quinque.
Löffelweise in größern oder geringern Zwischenräumen und nöthigenfalls auf einmal.

Looch contra tussim. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. semidrachmam.
Olei Amygdal. dulc. unciam unam.
Vitelli Ovi . . drachmas duas.
Tritura in mortario vitreo et mixtis adde
Syrupi Althaeae . . uncias tres.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis, Potio pectoralis. (B.)

℞. Emulsionis gummosae uncias sex.
Laudani . . guttas quindecim.
Syrupi Papaveris,

Syrupi Althaeae, sing.
unciam unam.
Allmälig bei convulsivischem Husten zu nehmen.

Emulsio narcotica (*Pie.*)

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum . . . . unciam unam.
Tere sensim affundendo
Aquae fontanae . . uncias sex.
Emulsioni adde
Syr. Papaveris
drach. quatuor ad sex.
Laudani gutt. decem ad duodecim.
Abends zu nehmen.

Potio antiperiodica. (*Au. Pie.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph., sing.
gutt. duodecim.
Aquae Flor. Aurantiorum,
— — Tiliae, sing.
semunciam,
Dieser Trank soll, vor dem Anfall des Wechselfiebers gegeben, diesen gewöhnlich verhüten. (*Pie.*)

℞. Laudani . . . guttas quindecim.
Tinct. Ipecacuanh.
gutt. quadraginta.
Liq. Ammonii acet. . semunciam.
Aquae Rosarum . unciam unam.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel. — Whytt rühmte diese Potion bei periodischen Kopfschmerzen von Gastricismus oder Unterdrückung eines Blutflusses

Mixtura antilethargica. (*Ca. Pie.*)

℞. Laudani . . . semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas sex.
Aquae Menthae pip. . uncias sex.
Viertelstündlich kaffeelöffelweise.

Mixtura opiato-aetherea. (*Au*)

℞. Laudani . . . . guttas viginti.
Liquoris Hoffmanni drach. unam.
Aquae Menthae . uncias quatuor.
Gabe, ein Löffel alle fünf bis sechs Minuten bis zum Aufhören des Krampfes, bei eingeklemmtem Bruche. — Von Van Gescher empfohlen.

Mixtura sedativa. (*Sw*.*)

℞. Laudani liquidi . semidrachmam
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Aquae Menthae pip. . uncias sex
— Bryoniae comp. uncias duas.
Syrupi Papaveris . unciam unam.
Gabe, ein halber bis ein Löffel alle Stunden.

Potio leniens s. deprimens. (*Ra.*)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph., sing.
gutt. quindecim.
Aquae Flor. Aurant. uncias tres.
Infusi Flor Tiliae unc. quinque.
Syrupi Capilli Veneris
uncias duas.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura opiato-antidysenterica, Potio antidysenterica. (*Au.*)

℞. Aquae Menthae pip. uncias tres.
Aetheris sulphurici guttas sedecim.
Laudani liquidi . guttas triginta.
Olei ess. Chamomillae guttas sex.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Extr. Cascarillae scrupulum unum.
Catechu . . . . . grana sex.
Pulv. Cinnamomi semidrachmam.
Gabe, alle Stunden ein Löffel. — Von Bucking gerühmt.

Collyrium opiaceum. (*Va.* Hosp. Infant.)

℞. Laud. liq. Sydenh.,
Croci, sing. . drachmam unam.
Decocti Sem. Lini bull.
uncias quatuor.
Infunde et cola. Bei sehr schmerzhaften Augenentzündungen.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Opii s. sedativa s. Opii simplex s. thebaica s. alcoholica s. Extracti Opii s. officinalis Opii spirituosa, Laudanum liquidum, Alcohol opiatus s. cum Opio. (Am. An. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. LH. Lon. LonN. Lus. RC. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. Vm. T.*)

℞. Opii puri . . . unciam unam.
Alcoholis (15°) . . uncias octo.
Triturata in mortario marmoreo digere per horas 24, subinde agitando; decantha liquorem limpidum et sedimento superfunde Alcoholis (15°) uncias quatuor; post duos dies digestionis cola et colaturas mixtas filtra. (An.)
RC. Opii unciam, Alcoholis diluti libram, solve terendo et digere per dies septem; — *Re.* Opii uncias duas cum dimid, Spir. ten. octarios duos, macera per dies 14 et exprime. (Pharm. Veter. College.)
℞. Extracti Opii aquosi partem unam.
Alcoholis (22°) partes duodecim.
Dissolve in lagena bene obturata et cola. (*Gal.*)
GalM. Opii partem unam et Alcoholis undecim; — D. et DD. Alcoholis quadraginta octo; — *Br.* et *Vm.*

octo Alcoholis; — LH. Opii drachmas decem, Alcoholis 22° uncias sedecim; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Opii uncias duas cum dimidia et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Am Ed. *Br. C. Gr.* et *Sw.* Opii unciam et Alcoholis (0,985) libram; — Du. Opii drachmas decem et Alcoholis (0,930) octarium; — Lon. 1788. *Gr.* Opii drachmas decem, Alcoholis libras duas; — *Fi.* Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis 25° uncias sedecim; — *T.* Extracti sicci unciam, Alcoholis diluti 22° B. libram.

℞. Opii purificati drachmam unam.
Alcoholis . . . . libram unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Disso've et filtra. (Lus.)

BorC. Opii semunciam, Alcoholis et Aquae, sing. uncias tres; — Fer. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis uncias decem et Aquae sex; — Bor4. Opii uncias quatuor, Spiritus Vini rectif., Aquae dest, sing. uncias novemdecim, digere, donec opium quantum fieri potest, solutum sit; tum quantum ponderis evaporatione amiserit, Spiritum Vini rectificatum addendo re-titue, exprime et post subsidentiam filtra. P. spec. = 0,955—0,965.

Der Opiumgehalt dieſer Tinctur iſt je nach den verſchiedenen Formeln ſehr verſchieden; nach der von Gal. enthalten vier und zwanzig Tropfen, welche = zwölf Gran. einen Gran Opium.

Extractum Opii alcoholicum s. gummo-resinosum. (An. B. Fer. GalM. LH. LP. Lus.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.
Alcoholis (25°) . quantum sufficit ad d:ssolutionum succi; filtra liquorem et Aquae dest. q. s. affundendo praecipita; denuo filtrata blando igne ad extracti consistent. evaporent. (An.)

℞. Opii . . . . . libram unam.
Alcoholis . . . quantum sufficit ad dissolvendum; digere in vase clauso, leni igne, subinde agitando; filtra et tincturam destillationi subjice, donec extracti consistentiam acceperit. (Lus.)

℞. Opii crudi . . . . uncias duas.
Alcoholis . . . uncias quatuor
Digere, blando calore, per duos dies, cola exprimendo et filtra; residuum cum Aquae unciis quatuor tritum cola itidem exprimendo; filtra et liquores commixtos vaporatione ad extracti consistentiam consume. (B)

LH. Opii libram unam, Alcoholis 80° tres blando calore per aliquot horas digerere, residuum pluribus vicibus cum Aqua coquere et fortiter exprimendo colare, tincturam et solutiones inspissare et extracta conjuncta in balneo vaporis ad massae pilularis consistentiam evaporare; — LP. residuum primum in paratione extracti resinosi (vide sequens praeparatum) obtentum cum Aquae libris tribus per aliquot horas coquere, colare cum forti expressione et evaporare.

℞. Opii concisi . . partem unam.
Aquae purae . . . partes duas.
Stent per horas 12 in infusione, in vase clauso, subinde agitata et fortiter expressa colentur; residuum infunde in Aquae parte una, tunc in Alcoholis (12°) parte una, sepone, cola et liquores commixtos in balneo aquae ad extracti consist. usque consume. (Fer. GalM.)

Simili modo *Powel's Opium purificatum.* (*Gr.*) extrahitur, coquendo Opium in Aqua usque nihil amplius extrahitur, residuum digerendo in Spiritu Vini, solutiones mixtas ad propriam consistentiam evaporando.

Dieſes Extract wird heutzutage faſt nicht mehr angewendet; es enthält mehr Narcotin und Harz als das mit kaltem Waſſer bereitete.

Extractum Opii resinosum. (LH. LP.)

℞. Opii . . . . . libras duas.
Alcoholis 40° . . . libras sex.
Digere blando calore per 24 horas, cola et residuum cum novo Alcohole pluribus vicibus digere ad extractionem totius coloris usque, tincturae conjunctae in balneo mariae ad extracti consistentiam evaporent.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chretien.) (*Bo Pie.*)

℞. Opii . grana quadraginta octo.
Aquae Vitae (20°) uncias quatuor.
Macera per tres vel quatuor dies.

Bei Mangel oder beſchwerlicher monatlicher Reinigung, ſogenannter krampfhafter Strangurie, Hyſterie, nervöſer Kolik, rheumatiſchen Schmerzen, Cardialgie und Wechſelfiebern empfohlen In Einreibungen zu einer Unze täglich zwei oder drei Mal. Man wendet ſie bald trüb bald filtrirt an.

Laudanum opiatum Rousseau s. Rousseavii, Solutio Opii alcoholisata, Guttae s. Laudanum Abbatis Rousseau, Vinum opiatum per fermentationem praeparatum s. fermentatione paratum. (An. Gal. *Ca. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Mellis albi . . uncias duodecim.
Aquae calidae . . . libras tres.
Melle liquato, liquorem ad locum

calidum repone; simulac fermentare coepit, adde

Opii electi . . . uncias quatuor antea dissoluti in

Aquae . . . unciis duodecim.

Stent fermentationi subjecta per mensem temperat. 24° R., cola deinde et filtra liquorem, qui ad uncias decem evaporet; cola denuo, adde Alcoholis (20°) uncias quatuor cum dimidia et serva. (Gal. *Ca. Gr. Rc.*)

T. Aquae calidae libras duas, Mellis optimi uncias sex, Fermenti Cerevisiae scrupulos duos, Extracti Opii uncias duas in Aquae calidae unciis sex soluti; post triginta vel quadraginta dierum fermentationem evaporent ad uncias sex, quas colatas misce exacte cum Alcoholis 34° B. unciis duabus.

℞. Extracti Opii . . partem unam.
Aq. Vitae hydromellat. part. octo
Misce et post nonnullos dies sepositionis filtra. (*Vm.*)

Das Rousseau'sche Laudanum ist concentrirter als das Sydenham'sche. Zwanzig Tropfen oder zwei und zwanzig Gran enthalten drei Gran Opium und sieben Tropfen beinahe einen Gran. Man kann auf dasselbe das anwenden, was weiter unten von Deyeux's und Langelot's Opiumextracten gesagt wird. Doch muß man die Formel von Van Mons ausnehmen, welche ganz als einfache Opiumtinctur zu betrachten ist; sie hat den Fehler, daß sie einen Alcohol von unbestimmter und unendlich veränderlicher Stärke vorschreibt. Man muß sie daher verwerfen, und es wäre klug, dieß mit den eigentlich sogenannten Rousseau'schen Tropfen ebenfalls zu thun.

Cataplasma sedans s. sedativum. (*Sw.*)

℞. Cataplasmatis emollientis . q. s.
Tinct. Opii
unciam unam vel duas.
Commisce bene.

Injectio sedativa s. sedans. (*Sw.*)

℞. Tinct. Opii . guttas quinquaginta.
Aquae destillatae uncias quatuor.

In gewissen Fällen von chronischem Tripper empfohlen.

Solutio hypnotica s. sedativa. (*Sw.*)

℞. Extr. Opii aquosi . drach. unam.
Aquae destill. drachmas quatuor.
Alcoholis . . . semidrachmam.
Misce triturando. — Vier oder fünf Tropfen enthalten einen Gran Opium — Mit Unrecht setzt Swediaur dieses Präparat den schwarzen Tropfen der Engländer an die Seite; diese enthalten, wie aus der Zusammensetzung zu ersehen ist, essigsaures Morphium.

Clyster s. Enema opiatum s. anodynum s. sedativum. (RC. *E. Gr. Sa. Sw.*)

℞. Tincturae Opii guttas quadraginta.
Infusi Seminum Lini uncias sex.
Addentur si necesse est, Olei Olivarum unciae duae. (*Sa.*)

E. Tincturae drachmam unam et Infusionis Seminum Lini uncias sex; — *Gr.* Tincturae drachmam unam, Infusi Lini uncias octo; — RC. Clysteris Amyli (RC.) vel Infusi Seminum Lini sine Glyzyrrhiza uncias quatuor, Tincturae Opii guttas quinquaginta.

℞. Amyli. . . . sesquidrachmam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Dissolve et adde
Tincturae Opii drachmam unam.
Misce. (*Sw.*)

Gr. Mucilaginis Amyli uncias sex, Tincturae Opii drachmam unam, misce.

Gargarisma opiaceum. (GalM. *Au.*)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Dec. Rad. Althaeae part. ducentas.
Misce. (GalM.)

Au. Tincturae drachmam unam et Aquae uncias decem. — Vogel hat dieses Gurgelwasser bei Bräune gerühmt.

Clyster antispasmodicum, Enema Opii. (*Gr. Sw.*)

℞. Tinct. Opii gutt. quinque ad decem.
Infusi Valerianae . . uncias tres.
Für Kinder.

℞. Infusi Lini . . . uncias octo.
Tincturae Opii drachmam unam.
Bei Steinschmerzen. (*Gr.*)

Syrupus Opii alcoholicus. (Suec.)

℞. Tincturae Opii . guttas sedecim.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce exacte.

Collutorium opiatum s. opiaceum. (GalM. *Va.*)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Syrupi Mellis . . partes viginti.

Collyrium anodynum. (Gal.)

℞. Laudani Rousseau . guttas sex.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aquae Rosarum . . uncias duas.

Linimentum opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . partes quatuor.
Olei Olivarum . partes triginta.

Linimentum excitans. (*E.*)

℞. Olei Succini rectif. drach. duas.
— Olivarum . . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.

Aquae Vitae . . . uncias duas.
Man macht damit bei Keuchhuſten Einreibungen zwiſchen den Schultern.

Unguentum emolliens et sedans. (B.)

℞. Linimenti e Cetaceo uncias duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Morgens und Abends auf Hämorrhoidalgeſchwülſte einzureiben.

Fomentatio leniens s. sedans. (B*.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Olei Succini rectificati partes duas.
Bei Geſichtsſchmerz in Einreibungen nützlich befunden.

Mistura diaphoretica. (*Gr.*)

℞. Misturae Camphorae sesquiunciam.
Liquoris Ammoniae Acetatis semunciam.
— Antimonii tartarizati guttas viginti.
Tincturae Opii . guttas decem.
Auf eine Gabe.

Potio sedans s. leniens. (*B. E.*)

℞. Tincturae Opii guttas quindecim ad viginti quinque.
Syrupi Papaveris drachmas duas.
Spir. Cinnamomi drachmam unam.
Aquae . . . . . sesquiunciam.
Misce. (*E.*)

℞. Liquoris Hoffmanni drachmas tres.
Tincturae Opii guttas octoginta.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Gabe, ſtündlich einen Löffel. (*E.*)

℞. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Sacchari,
Gummi Arab., sing. sesquidrachmam
Tincturae Opii guttas sexaginta.
Aquae Cinnamomi . uncias duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll. (*E.*)

℞. Infusi Rosarum . . uncias sex.
Tincturae Opii . guttas viginti.
Syrupi Cort. Aurant. . unc. unam.
Auf viermal, alle drei Stunden zu nehmen, bei ſogenanntem paſſiven Blutſpeien mit Huſten. (B.)

Potio absorbens, Mistura Carbonatis Calcis composita. (RC. *E.*)

℞. Cretae praeparatae drachmas tres.
Sacchari,
G. Arab., sing. sesquidrachmam.
Tincturae Opii . guttas sexaginta
— Kino . . drachmas duas.
Aquae Menthae . . uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, bei Diarrhöe.

RC. Carbonatis praeparatae, Gummi Arabici Sacchari, sing. drachmas duas, Vini Ipecacuanhae sesquidrachmam, Tincturae Opii drachmam, Tincturae aromaticae sesquiunciam, Aquae fontanae vel Menthae crispae uncias octo. — Bei Sodbrennen, Diarrhöe und Ruhr.

Bateman's pectoral drops. (*Gr.*)

℞. Seminum Foeniculi libras duas et uncias octo.
— Anisi . . . libram unam.
Spiritus tenuioris congios quatuor.
Aquae . . . . . q. s.
Destillando congios decem abstrahe et adde
Opii uncias septem et drachmas quatuor
Camphorae . . . . uncias sex.
Kali praep. . . . unciam unam.
Corallii rubri . uncias quatuor.
Praeterea: Castor. Nov. Angl. uncias duas, Opii, Olei Anisi, sing. unciam et drachmas quatuor, Camph. uncias octo, Sem. Foenic. duas, Tinct Antim. quatuor, Spir. ten. octarios decem, adde Rad. Valer. et Coccin. pulv.; vel: Opii, Camph., sing. libram, Cast., Ol. Anis., Sant. rub., sing. unc. quatuor, Molasses libras decem, Spir. rect. cong. quinque, Aquae quatuor; vel: Opii, Camph., sing. drachmas decem, Coccin. unam, Kali praep. scrup quatuor, Ol. Foenic. drachmam (vel Semin. unc. tres.), Spir. ten. octar. quatuordecim, Aquae octarios duos; vel: Cast. unciam, Ol. Anis. drachmam, Camph. drachmas quinque, Coccin. sesquidrachm., Opii drachm. sex, Spir. ten. congium; vel: Rad. Glycyrrh., Sem. Anis., sing. lib. duas, Aq. cong. quinque, coque ad tres, exprime, adde Sacch. ust. libram, Opii sesquiunciam, Cast. Nov. Angl., Rad. Val., sing. drachmas decem, Camph. uncias duas, Spir. rectif. cong. duos, digere, exprime et adde priori.

Dalby's carminative. (*Gr. Re.*): Tinct. Op. unc. quatuor c. dimid., Tinct. As. foet. drachm. duas c. dimid., Ol. Carv. drachm. unam, Ol. Menth. pip. duas, Tinct. Cast. drachm. sex c. dimid., Spir. rect. drachm. (unc.?) sex; misce et drachmae cuique adde Carbon. Magnes. drachmam, Syr. simpl. drach. undecim; — vel: (*Re.*) Carb. Magn. scrup. duos, Ol. Menth. pip. guttam unam, Ol. Nuc. mosch. duas, Ol. Anis. tres, Tinct. Cast. triginta, Tinct. As. foet. quindecim, Tinct. Op. quinque, Spir. Puleg. quindecim, Tinct. Cardam. comp. triginta, Aqu. Menth. pip. uncias duas, misce.

Haustus s. Mixtura s. Potio adstringens. (B.)

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad obtinendas decocti uncias octo. Colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Tincturae Opii . guttas viginti.
Allmälig zu nehmen, bei Diarrhöe mit Atonie.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad obtinendas decocti uncias octo, quarum colaturae addantur
Tincturae Opii . scrupulus unus.
Alcoholis . . . . . uncia una.
Aquae Cinnamomi . . semuncia.
Allmälig, in Fällen, wo Atonie mit Torpor verbunden zu seyn scheint.

℞. Seminum Cannabis unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae libra una obtineatur, cui adde
Extracti Arnicae drachmam unam.
Catechu . . scrupulum unum.
Syr. Corticum Aurantiorum,
— Althaeae, sing. unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei Blutharnen und andern, wahrscheinlich passiven Blutflüssen.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Ligni Quassiae . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut uncias octo colaturae obtineas, quibus post semihoram ebullitionis addantur
Extracti Gentianae drachma una.
Tincturae Opii . . semidrachma.
Gabe, vier Löffel, alle zwei Stunden, bei vermuthlich atonischer Ruhr und Diarrhöe.

Tinctura Opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica s. alcoholica aromatica, Alcohol cum Opio aromaticum s. Opii dilutum, Laudanum liquidum. (Ba. Bor. Fenn. Ful. Gen. HassP. LP. Pol. Sax. Suec. Wür. *Fi. Sw. T.*)

℞. Opii minutim concisi part. unam.
Aquae Cinnamomi simplicis,
Alcoholis, sing. . . partes tres.
Post solutionem cola. (Bor. HassP. Pol. Sax.) — Jede Drachme dieser Tinctur enthält zehen Gran Opium.

Fen Gen. et LP. Opii part. unam, Aquae Cinnamomi quinque et quinque Alcoholis; — Ba. Opii unam, Aquae Cinnamomi duas et quatuor Alcoholis; — Suec. Opii unam, Aquae Cinnamomi quatuor et sex Alcoholis; — *T.* Opii puri unciam, Aquae Cinnamomi quinque, Alcoholis diluti 24° B. tres, digere per septimanam et filtra.

Sw. duas formulas indicat, nimirum: Opii drachmam unam, Alcoholis uncias decem et Aquae Cinnamomi uncias viginti; et: Opii uncias duas, Aquae Cinnamomi decem et sex Alcoholis. — Die erstere enthält einen Gran Opium auf die halbe Unze Tinctur; die andere, welche auch *Fi.* anführt, etwa vier auf die halbe Drachme.

℞. Opii purificati . semidrachmam.
Alcoholis concent. uncias decem.
Aq. Flor. Chamomill. unc. viginti. (Wür.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Aq. Flor. Chamomill. partes sex.
— Cinnam. vin. . partes duas.
Post tres dies digestionis filtra.

Laudanum. (Lon. 1720. *Gr.*): Extracti Opii e Spir. ten. part. unciam, Extr. Croci sesquidrachmam, Castorei drachmam, Tinct. Spec. Diambrae sine odoratis (Spec. drach. quatuor, Spir. rect. q. s.) Ol. Nucis mosch. guttas decem.

Mixtura opiacea. (*Sa.*)

℞. Opii crudi . . . granum unum.
Aquae aromat. cujuslibet unciam.
Solutioni adde
Aquae Cinnam. vin. uncias duas.

Essentia anodyna officinalis (Pal. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae Cinnam. vin. uncias novem.
Post sufficientem digestionem filtra.
— Gabe, fünf, zehen, funfzehen und zwanzig Tropfen. — Ein Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura Opii Eccardi, Tinctura thebaica Bambergi, Vinum Opii. (B*. Ham. Han. LonN. O. *Ca. Gr. Re. Vm.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Aquae Cinnamomi . uncias octo.
— Vitae . . uncias quatuor.
Stent loco calido in digestione per sex dies, tum cum expressione colata filtrentur.

Eine Drachme enthält zehen Gran Opium, was auf zehen Tropfen einen Gran beträgt.

Hierher gehört auch das *Vinum Opii* von LonN. *Gr. Re.* Extracti Opii unciam, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. drachmam, Spiritus ten. uncias sex, Aquae dest. uncias decem; macera per dies octo et cola.

Ford's laudanum. (*Gr. Re.*): Opii unciam, Cinnam. Caryoph., sing. drach-

mam, Spir. rectif., Aq. sing. uncias octo.

Mixtura sedans et aromatica. (*Sw.*)

℞. Aq. Menthae pip. uncias quinque.
Alcoh. Nucis mosch. unciam unam.
Electuarii arom. . drachmas duas.
Tincturae Opii aromaticae
drachmam unam ad duas.
Sacchari albi . . drachmas tres.

Bei Cardialgie. — Gabe, alle halbe oder ganze Stunden drei Löffel.

Potio sedans s. hypnotica. (*Sw.*)

℞. Tinct. Opii arom. guttas viginti.
Aq. Menthae crisp. unciam unam.
— Flor aurant. drachmas duas.

Bei'm Schlafengehen zu geben.

Potio opiacea. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Tincturae Opii . guttas viginti.
Aquae Menthae pip.
drachmas quinque.
Aquae . . . . . uncias tres
Misce. — Löffelweise alle Stunden.

Vel: Tincturae drachmam, Aquae Menthae uncias sex. ½ — 1½ Drachmen täglich zwei oder drei Mal.

Mixtura anticathartica. (*Sw.*)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Syrupi Papaveris . sesquiunciam.
Aq. Chamomillae Rom. uncias sex.
— Cinnamomi . unciam unam.
Tinct. Opii arom. . scrup. unum.

Gabe, alle Viertelstunden einen Löffel.

Tinctura vinosa Opii anticolica s. alcoholica Opii composita anticolica ex Palacios. (His. His3.)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Rad. Zedoariae . unciam unam.
— Carlinae,
— Galangae, sing. semunciam.
— Calami,
Corticis siccati Aurantiorum,
— — Citri,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Flor. Chamomillae, sing.
drachmas duas.
Macidis . . . drachmam unam.
Caryophyllorum,
Bacc. Lauri,
— Junip., sing. semidrachmam.
Alcoholis (Vini albi optimi His3.)
libras tres.

Post dies octo macerationis filtra. — Gabe zwei Scrupel.

Haustus opiatus. (RC.)

℞. Tincturae Opii
guttas viginti quinque,
Aquae fontanae . unciam unam.
Syrupi simplicis . drachmas duas.

Addendo Vini stibiati guttas triginta, *Haustum opiato-stibiatum* habes.

Essentia anodyna Ludovici. (Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi unciam unam.
Aquae apoplect. spirit. uncias octo.

Gabe, sieben bis zwölf und funfzehen Tropfen. — Eine Drachme enthält sechs und einen halben Gran Opium.

Tinctura alcoholica Opii s. paregorica s. Opii crocea, Elixir paregoricum. (His. His3.)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Croci . . . . . semunciam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Alcoholis,
Aquae, sing. . uncias duodecim.

Digere per dies octo et filtra. — Diese Tinctur hat viel Aehnlichkeit mit dem Sydenham'schen Laudanum. — Ein Scrupel enthält zwei Gran Opium.

Tinctura antispasmodica Christiani (Chrestien). (*Bo.*)

℞. Opii crudi . drachmam unam.
Camphorae . drachmas quatuor.
Aquae Vitae . . libram unam.

Macera per tres vel quatuor dies et tunc filtra. — Aeußerlich bei rheumatischen Beschwerden, Wechselfiebern mit rheumatischen Schmerzen complicirt, bei retentio urinae, Amenorrhoe ꝛc. gerühmt. — Im letzteren Falle macht man Einreibungen auf die Schenkelfläche.

Tinctura Opii camphorata, Elixir paregoricum Ph. Dub. (RC.)

℞. Opii,
Camphorae,
Olei dest. Anisi, sing. drachmam.
Alcoholis diluti . . libras duas.

Digere per quatriduum. — Eine halbe Unze enthält ungefähr einen Gran Opium. — Gabe, dreißig Tropfen bis eine und zwei Drachmen. — Mit der dreifachen Quantität Tinct. Scillae als ein vortreffliches Mittel bei Husten und Catarrh empfohlen.

Linimentum sedativum camphoratum. (*Sw.*)

℞. Tinct. Opii arom.
drach. unam vel duas.
Camphorae . drachmam unam.
Linimenti saponacei sesquiunciam.

In Einreibungen und Bähungen auf den Unterleib, bei Kolik.

Linimentum anodynum. (*Au. Sa.*)

℞. Linimenti saponacei uncias duas.

Tincturae Opii ℥ . semunciam. Misce. (*Sa.*)

Au. Linimenti et Tincturae, singulorum partes aequales.

In denſelben Fällen wie das vorige. — Lind will durch Einreibungen mehrmals das Wechſelfieber geheilt haben.

Linimentum Opii s. camphoratum opiaceum. (GalM. *Gr.*)

℞. Tincturae Opii . . partes duas.
Camphorae . . partem unam.
Olei Olivarum partes quindecim.

Gr. Linimenti Camphorae comp. drachmas novem, Tincturae Cantharidum unam, Tincturae Opii duas.

Clyster Camphorae pro equis (*Gr.*): Camphorae drachmas tres ad quatuor, Olei Olivar. unciam, Kali praepar. drachmam, contere et adde Tincturae Opii unciam, Aquae calidae octarios duos. Urintreibend. (Veterin.)

Ford's Balsam of Horehound (*Gr. Re.*): Marrubii, Liquirit, sing. libras tres et uncias octo, Aquae q. s. ut post infus. octarii sex exprimantur, adde Aquae Vitae octarios duodecim, Camphorae unciam unam et drachmas duas, Opii puri, Benzoës, sing. unciam unam, Squill. sicc. uncias duas, Olei Anisi unam, Mellis libras tres et uncias octo; — *Re.* Marrub., Liquirit. sing. part. aeq. in Aq. infus. colat. et octariis novem addere Spir. pond. duplum, liquori huic addere Op. puri drachmas septem, Squill. sicc. unciam, Benzoës drach. sex, Camphorae novem, Anisi octo, Mellis libram et tres quadrantes, digere et exprime.

Squires Elixir (*C. Gr. Re.*): Opii uncias quatuor, Camph., Coccin., sing. unam, Foenic. dulc. drachmas duas, Tinct. Serpent. octarium, Spir. Anisi congios duos, Aquae octarios duos, Auri musiv. uncias sex (*C. Gr.*); vel: Liquiritiae libram, Kali praep. uncias quatuor, Coccin. unam, Aquae octarios duodecim, coque ad congium, adde Tinct. Opii uncias duodecim, Camph. unam, Spir rectif. octarios quatuor, Aur. musiv. uncias duodecim (*C. Gr.*); vel: Opii unciam et drachmas quatuor, Camph. unciam unam, Coccin., Kali praep, sing. drachmam, Sacch. usti uncias duas, Tinct. Serp. octarium, Spir. Anisi congios duos, Aur. musiv. uncias octo; — *Re.* Opii drachmas viginti, Camph. unciam, Subcarb. Pot., Coccin, sing. drachmam, Sacch. ust. uncias duas, Tinct Serpent. octarium, Spir. Anis. congios duos, Sulph. Stanni uncias octo.

Tinctura antispasmodica Dumasii. (*Pie.*)

℞. Opii . . . grana quadraginta.
Camphorae,
Succini, sing. . semidrachmam.
Alcoholis . . . . uncias sex.

In Einreibungen auf die Wirbelſäule, die Ober- und Unterſchenkel.

Tinctura Opii ammoniacalis s. anodyna volatilis s. alcoholica Opii ammoniacalis et camphorata s. antispasmodica camphorata, Elixir paregoricum, Spiritus ammoniacatus. (Lus. *Au. Sw*. Vm.*)

℞. Camphorae Alcohole humectatae partem unam.
Opii pulverati . partes duas.
Alcoholis ammoniacalis . . partes viginti quatuor.

Post plures dies macerationis filtra. (*Sw*. Vm.*)

Lus. Opii drachmam, Camphorae scrupulos duos, Tincturae arom. ammoniac. uncias quatuor et Alcohol's libram.

℞. Aquae Vitae . . unciam unam.
Alcohol's ammoniac. semunciam.
Opii . . . . . scrupulos duos.
Camphorae . scrupulum unum.

Post tres dies digestionis cola. (*Au.*)

Bei Hyſterie und convulſiviſchen Krankheiten empfohlen. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen in einem ſyrupartigen Vehikel. — Vicat empfahl dieſe Tinctur bei Kopfſchmerz, Zahnſchmerz und Migräne; man reibt ſie in die Hände ein und hält dieſe vor die Naſe.

Laudanum liquidum Warneri, Tinctura Opii ammoniacata. (D *Vm.*)

℞. Opii puri,
Saponis Alicant., sing. drach. sex.
Nucis moschatae drachmam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Croci . . . grana quadraginta.
Alcoholis Ammoniac. unc. novem.

Digere per dies decem, subinde agitando, et tunc decantha. (D.) — Eine Drachme enthält fünf und einen halben Gran Opium.

℞. Opii . . . . . sesquiunciam.
Nucis moschatae drachmas duas.
Croci . . . . scrupulos duos.
Alcoholis ammon. unc. octodecim.

Macera et adde deinde
Saponis albi . . sesquiunciam.
Camphorae . . . semunciam.

Liquor filtratur prout eo uti proposuisti. (*Vm.*)

Linimentum Saponis compositum s. camphoratum s. anodynum s. anodynum opiatum s. spirituosum anodynum, Bal-

samum anodynum s. arthriticum s. thebaicum, Linimentum s. Tinctura Saponis et Opii, Tinctura alcoholica Opii saponacea, Bates's anodyne Balsam. (Am. B*. Ed. Gen. His. His3. LP. Wür. *Au. C. Gr. Pie. Ra. Re. Sp. Vm*)

℞. Saponis raspati uncias quatuor.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere per tres dies, cola et adde
Opii . . . . . unciam unam.
Camphorae . . . uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Agita bene. (B*. Ed. *C. Gr. Re.*)

Am. Saponis uncias duodecim, Olei Rorismarini drachmas duas et Alcoholis octarios octo; — *Gr.* Saponis albi unc. duodecim, Op. crud. tres, Camph. unam et drachmas quatuor, Ol. Rorism. drachmas tres, Spir. rect. congium.

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Saponis albi Hisp. uncias quinque.
Alcoholis uncias viginti quatuor.
Digere per tres dies, in colatura dissolve
Camphorae . . . uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Serva. (*Sp*)

Wür. Opii drachmas duas, Saponis unciam, Camphorae drachmas tres, Olei ess. semidrachmam et Alcoholis uncias novem; — LP. Opii semunciam, Saponis albi rasi uncias tres, Camphorae unam, Alcoholis sesquilibram, Olei Lavandulae drachmas duas; — Gen. Opii unciam unam, Saponis quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et Alcoholis sesquilibram; — *Au.* Opii drachmam, Saponis unciam, Camphorae semidrachmam, Olei Rorismarini drachmam et Alcoholis q. s. ad omnia solvenda.

℞. Opii . . . . . semunciam.
Camphorae . . . drachmas sex.
Saponis albi semunciam (unciam unam His3.).
Croci . . . drachmam unam.
Alcoholis . . . . sesquilibram.
Digere per septem dies et cola. (His. His3. *Pie.*)

Gr. Sapon. Cast., Camph., sing. uncias sex, Opii drachmas quatuor, Croci unam, Spir. rect. uncias octodecim.

℞. Croci . . . . partem unam
Alcoholis partes quadraginta duas.
Digere in balneo aquae tepido et adde
Opii concisi . . . partes duas.
Post sufficientem digestionem adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Solutione peracta exprime fortiter et filtra. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . . unciam unam.
Spirit. Rorismar. unc. viginti quatuor.
Post aliquot dies macerationis cola exprimendo, filtra et in colatura dissolve
Camphorae . . drachmas tres.
Saponis e Medulla praep. unc. sex.
Post sepositionem decantha. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Saponis albi sicci . semunciam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Digere per tres dies, cola et adde
Camphorae . . drachmas duas.
Agita bene. (*Ra.*)

℞. Tincturae Opii . unciam unam.
Opodeldoc . . . uncias duas.
Misce bene agitando. (*Re.*)

Gabe, dreißig, vierzig oder funfzig Tropfen in Wein. — In Einreibungen äußerlich, bei Gichtſchmerzen. — Dieſer Balſam unterſcheidet ſich von dem Opodeldoc nur durch das in ihm enthaltene Opium.

Jackson's bathing spirits. (*Re.*) Linimentum Saponis compositum cum Essentiis.

Balsamum somniferum. (Wir.)

℞. Unguenti populei,
Olei Myristic. expr., sing. unciam.
Opii in Alcohole dissoluti drachmam.
Olei Ligni Rhodii guttas sedecim.
Misce bene.

Tinctura Opii benzoica s. Camphorae composita s. Opii camphorata s. Opii camphorata cum Acido benzoico s. Opii ammoniacalis camphorata s. sedativa camphorata, Elixir paregoricum, Tinctura alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata, Elixir asthmaticum s. antiasthmaticum. (Am. B*. Bor. Bor4. D. Du. Ed. GalF. Han. LH. Li. Lon LonN. LP. Sax. Suec. *Bo. Br. C. Ca. Gr. Pie. Re. Sw. Vm.*)

℞. Opii duri pulverati,
Acidi benzoici, sing. drach. unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Digere per dies quatuordecim et filtra. (GalF. Lon. LonN. *C. Pie. Re.*)

Gr. Opii unciam, Camphorae drachmas quinque, Olei Anisi unciam, Alcoholis congium.

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. drach. unam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,935) libr. duas c. dim.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed.)

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. . drachmam.

Camphorae . . scrupulos duos.
Olei essent. Anisi drachmam (dimid. *Gr. Re.*)
Alcoholis (0,830) (Spirit. rectif.) octarios (libras) duos

Digere per dies septem (quatuordecim) et filtra. (B*. Du. Li. *Bo. Br. Gr. Pic. Re. Sw.*)

LH Alcoholis 22° libras duas et digestionem per triduum, caeterum ut antea; — Bor. Bor4. Han. quatuor priorum sing. drachmam, digere per tres dies (Bor4.); — D. Suec. et *Vm.* Olei Anisi semidrachmam; — *Ca.* Opii, Acidi benzoici sing. drachmam, Camphorae grana viginti sex, Olei Anisi scrupulos duos et Alcoholis (24°) uncias viginti tres.

LP. Opii, Acidi benzoici, sing. drachmam, Camphorae scrupulos duos, Alcoholis libram, Ammoniaci liquidi uncias tres, Olei Anisi semidrachmam, macerationem per quatriduum; — *Gr.* Opii, Flor. Benz., sing. uncias duodecim, G. Benzoës sex, Camphorae unam, Ol. Anisi drachm. duodecim, Spir. tenuior. congios tres; vel: Extr. Opii uncias duas et drachmas duas, Camph., Flor. Benz., sing. unciam unam et drachmas quatuor, Ol. Anisi unc. sex, Spir rectif. congios duos, Aquae octarios decem; vel: Gummi Opii unciam unam, G. Benzoës octo, Camphorae unam, Ol. Anisi drachmas quatuor, Spir. rect. octar. duodecim, Aquae duos; vel formulam postremam sed Spiritum tenuiorem; vel absque Oleo Anisi.

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Camphorae,
Olei ess. Anisi, sing partem dimid.
Alcoholis . partes nonaginta sex.
Post sufficientem digestionem cola. (Sax.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Olei ess. Anisi, sing. . drachmam.
Extracti Liquiritiae . semunciam.
Mellis despumati . uncias duas.
Camphorae . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,980) . octarios duos.
Stent in digestione per dies decem, tunc colentur. (Am. B*. *C.*)

Beſonders bei Aſthma empfohlen. — Gabe, Erwachſenen zwanzig bis hundert, Kindern fün bis zwanzig Tropfen.

Tinctura Benzoatis Ammoniae composita, *Alcohol cum Benzoate Ammoniae compositum*, *Tinctura Opii ammoniata*, *Tinctura alcoholica Opii et Benzoatis Ammoniae*, *Elixir paregoricum* (Edinburgens.) (Am. An. Bel. Ed. GalF. GalH. RC. *C. Ca. Gr. Pie. Re. Vm.*)

℞. Opii . . . . . drachmas duas.
Croci,
Acidi benzoici, sing. drach tres.
Olei essent. Anisi semidrachmam.
Alcohol. ammoniacal. unc. sedecim.
Post septem dies digestionis filtra. (Ed. GalF. GalH. RC. *C. Ca. Gr. Pie. Re.*)

Am. Opii, Acidi benzoici, Olei Anisi, sing. drachmam, Extracti Liquiritiae semunciam, Mellis despumati uncias duas, Camphorae scrupulos duos et Aquae Vitae octarios duos.

℞. Croci . . . . . drachmas sex.
Alcohol. ammon. unc. triginta duas.
Infunde frigide per duos dies et adde
Opii concisi . . . semunciam.
Infunde denuo per aliquot dies et adde
Acidi benzoici . drachmas sex.
Olei ess. Anisi . drachmam unam.
Exprime et filtra. (*Vm*)

℞. Croci . . . drachmas quinque.
Tinct. arom. ammon. unc. quatuor.
Post dies duos digestionis cola et in colatura solve
Acidi benzoici scrupulos quinque.
Opii depurati . drachmas duas.
Stent in digestione per duos dies, tunc colentur et filtrentur; residuo infunde
Tinct. arom. ammon. . unc. duas.
Digere per horas 24, cola et in colatura solve quod in filtro remansit. Post aliquot horas 24 filtra. Colaturis commixtis adde
Olei ess. Anisi guttas triginta duas.
Serva. (An. Bel.)

℞ Opii sicci . . . drachmas duas.
Acidi benzoici . . semunciam.
Alcohol. ammoniacal. libram unam.
Post quinque dies digestionis filtra. (*Ca. Pie.*)

Beſonders bei Aſthma und Keuchhuſten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in einem paſſenden Trank.

Elixir sudoriferum s. sudoriferum Lettsomi, *Tinctura Opii benzoica composita.* (*Au*)

℞. Ipecacuanhae,
Bals. Tolutani, sing. semunciam.
Acidi benzoici,
Opii,
Croci, singulorum drachmas duas.
Camphorae . scrupulos quatuor.
Olei ess. Anisi drachmam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola. — Gabe, fünf bis dreißig Tropfen, allmälig geſtiegen, beim Keuchhuſten.

Epithema antiarthriticum. (*Bo.*)

℞. Aq. Regin. Hungar. uncias octo.
Spir. Salis Ammoniaci semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Opii . . . . . semidrachmam.
Saponis Veneti . sesquiunciam.
Misce. — Man wendet es warm, mittelst feiner Leinwand an und erneuert es alle Stunden.

Tinctura antispasmodica. (LH.)

℞. Tincturae Opii camphoratae
guttas duodecim.
Aquae Menthae piperitae
uncias duas.
Gabe, auf zwei Mal.

Tinctura stibiata. (*Au.*)

℞. Liquoris Ammonii succinici,
Elixir paregor., sing. drach. duas.
Laudani liquidi Sydenhami,
Vini stibiati, sing. drachmam unam.
Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, alle zwei Stunden, bei'm Keuchhusten. — Von Jahn gepriesen.

Elixir antiasthmaticum Lemort. (*Vm.*)

℞. Acidi benzoici,
Opii, singulorum drachmam unam.
Kali subcarbonici unciam unam.
Mellis Narbonnensis,
Liquirit. rasae, sing. unc. quatuor.
Olei ess. Anisi . semidrachmam.
Camphorae . . scrupulos duos.
Aquae Vitae unc. triginta quatuor.
Digere in aqua vitae primò crocum, deinde opium, liquiritiam, adde sal et cola post aliquot dies, et exprime; in colatura dissolve sensim acidum, oleum, camphoram et mel; post subsidentiam cola per pannum et supra sedimentum rectifica donec liquor perfecte limpidus sit redditus.

Linimentum sedans aethereum. (*Sw*.*)

℞. Tinct. Opii aromat. drachmas sex.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. — Bei Ischurie und krampfhaften oder rheumatischen Schmerzen empfohlen.

Mixtura sedans. (*Sw.*)

℞. Aquae . . . . . uncias sex.
Tincturae Opii aromaticae,
Aetheris sulph., sing. drach. sex.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Gabe, stündlich oder alle zwei Stunden einen Eßlöffel.

Mixtura acida anodyna, Guttae anodynae acidae. (Ful. Ham.)

℞. Tincturae Opii . scrupulos duos.
Acidi sulphurici scrupulum unum.
Aquae destillatae . uncias sex.
Syrupi Violarum . unciam unam.
Misce. (Ful.)

℞. Essent. Aurantiorum semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Tincturae Opii . semidrachmam.
Misce bene. (Ham.)
Nutzen und Gabe wie bei'm vorhergehenden.

Embrocatio Opii composita (*Re.*): Tinct. Opii, Spirit. Aeth. sulph., Spir. Camph., sing. uncias duas, misce. Bei Rheumatismen, ischias etc.

Linimentum Opii (*Re.*): Opodeldoc sesquiunciam, Tinct. Opii semunciam, misce. Bei Quetschungen und rheumatischen Schmerzen.

Tinctura foetida pyro-oleosa s. vermifuga. (*Au.*)

℞. Asae foetidae . drachmam unam.
Opii,
Salis volat. C. C., sing.
drachmas duas.
Tincturae Castorei . uncias duas.
Rosenstein empfiehlt diese Tinctur gegen Kopfgrind. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in Wein oder Branntwein.

Tinctura Opii, Laudanum liquidum tartarizatum. (*Gr.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Croci . . . . . unciam unam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës, sing. . drachmam.
Tincturae Salis Tartari libras duas.
Digere, exprime et ad dimidium evapora.

E. Auszug durch Wasser.

Infusum Opii aquosum. (*B*. Ra.*)

℞. Opii electi . . . unciam unam.
Aquae destillatae . uncias octo
Alcoholis (86°) . . semunciam.
Infunde opium in aqua per duos vel tres dies temperatura communi et a radiis solis tutum; filtra, adde alcoholem et serva in lagunculis bene obturatis.
Chaussier gebraucht diesen Aufguß statt des laudanum liquidum Sydenhami. — Gabe, innerlich sechszehn bis vier und zwanzig oder dreißig Tropfen in einem Tranke; äußerlich funfzig bis achtzig Tropfen in zwei Unzen Malvenblüthaufguß.

Collyrium Opii. (*Gr.*)

℞. Opii . . . . . grana decem.
Camphorae . . . . grana sex.

Aquae ferventis uncias duodecim. Coletur. — Bei ſehr ſchmerzhafter Augenentzündung.

Extractum Opii s. Opii gummosum s. aquosum s. Aqua paratum s. thebaicum, Laudanum opiatum s. simplex, Opium colatum s. depuratum s. gummosum. (A. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Opii concisi . . partem unam.
Aquae frigidae . partes quatuor.

Digere in evaporatorio per dies duos, vas subinde agitando; cola, sepone per duos dies, filtra ut pellicula removeatur odoris virosi, et lentissimo igne dimidium consume; sepone deinde per duos dies in evaporatorium, filtra iterum ut pellicula eodem modo semoveatur, cola et ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

℞. Opii concisi . . . semilibram.
Aquae frigidae . . octarios tres.

Macera opium in aquae pauxillo ut mollescat; adde sensim aquam reliquam, tritura totum ut bene commisceantur, tunc sepone et colata ad extracti consistentiam consume. (Lon.)

LonN. *Re.* Opii uncias sedecim, Aquae congium; — *Gr.* Opii uncias sex cum Aquae libris octo sensim additis conterere, postquam subsederint exprimere et ad propriam consist evaporare.

℞. Opii grossiuscule pulv. . q. vis.

Tritura cum Aquae frigidae pauxillo, donec haec fusca sit reddita; sepone deinde et decantha; operationem repete donec aqua colorem accipere desiit; liquores commixti in balneo aquae ad extracti consist. evaporent. (Fer. Ful. Li.)

℞. Opii crudi . . . quantum vis.

Malaxa sub Aquae tenuissimo filo donec nihil amplius dissolvatur et cola; Albumine clarificatum ignis vehementis ope vapora et quum liquor spissescere incipit, cola iterum et denique ad extracti consist. requisitam consume. (Bel.)

Josse (*Gr.*) fere eodem modo agere suasit, clarificationem tamen albuminis ope non monet.

℞. Opii in frusta minora concisi partem unam.
Aquae frigidae . . partes tres.

Macera per tres dies absque agitatione et decantha; residuo infunde Aquae partes duas et post aliquot tempus decantha; quae operatio adhuc semel repetatur; liquores commixtos cola, Albumine clarificatos levi bullitione evapora et praecipitatum prout formatum decantha. (*Vm.*)

Pm. Opii in taleolas scissi, exsiccati et grossiuscule pulv. uncias sex cum Aquae dest. libris quinque per horas 24 infundere, colare cum expressione, opio affundere Aquae dest. libras tres et post horas 24 colare, liquores balneo maris ad syrupi consist. evaporare, liquorem adhuc ferventem Glaciei libris tribus superaffundere et, dissolutione absoluta, liquorem filtratum balnei maris ope ad extractum redigere.

℞. Opii concisi . . . quantum vis.
Aquae frigidae quantum sufficit.

Macera per horas 12, tunc digere leni calore per tempus aequale et cola; cum residuo eodem modo age, donec aqua non amplius coloretur; liquores commixti in balneo aquae ad electuarii spissi consist. evaporent; quo in Aqua frigida dissoluto, liquorem sepone, cola et denique ad extracti consist. consume. (Suec.)

℞. Opii concisi . . uncias quatuor.
Aquae comm. cum Succi Citri semilibra acidulatae libras quatuor.

Post solutionem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (Br. Pal. Wir. *Gr.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis . libram unam.

Dissolve, liquorem calidum cola, ad de Aquae frigidae libram unam, per dies duos aëri expone, filtra, tunc vaporando, primum leni igne tunc in balneo aquae, ad extracti consist. usque consume. (*Br. Fi.*)

T. Opii uncias sex, Aquae bullientis libras tres et Aquae frigidae tantidem.

℞. Opii grossiuscule pulv. part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, liquorem decantha et cola, qui tunc in balneo aquae ad aptam consistentiam evaporet. (A. Bor. D. Han. His. Lus. O. Pal. Sax. *Sa. Sp. Sw.*)

His3. Opii uncias quatuor terere, per vices addendo Aquae frigidae q. s., in mortario marmoreo, digerere loco calido ad perf. extractivae partis dissolutionem et liquorem colatum in balneo aquae ad siccitatem evaporare; — LH. Digerere per horas aliquot Opii libram unam cum Aquae tribus, colare forte cum expressione et in balneo vaporis ad debitam consist. evaporare; Bor4. ad massae pilularis consist. evaporare et tunc leni calore exsiccare, ut pulverari queat; — GalM. infusione ad finem

perducta liquorem per horas 24 sepositum filtrare, ebullitione dimidium consumere, iterum seponere et post novam colationem, evaporationem in balneo aquae perficere; — Bu. digerere per horas 24, cum residuo eandem operationem repetere, Aquae novae partem quartam sumendo et colaturas commixtas consumere; — HassP. Opii uncias quatuor, Aquae dest. libram in olla murrhina ad opii solutionem tenere saepius agitando, colare, residuum Aqua dest. abluere, colare, et sepositione clarificatum ad electuarii consist. evaporare, massam remanentem in Aquae frigidae partibus tribus solvere et fluidum filtratum in balneo aquae ad siccum evaporare.

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis octarium unum.

Tritura per sexagesimas decem, sepone parumper et decantha liquorem; residuum denuo bis cum eadem Aquae quantitate per idem tempus tritura; liquores commixtos per duos dies in vase aperto aëri expone, cola et lente ad extracti consistentiam consume. (Du. *C. Gr.*)

Cornette (*Gr.*) Extractum Opii commune in Aqua redissolvere, solutionem exprimere, nova vaporatione in extracti consistentiam redigere et hoc aliquoties repetere; — *Accarie* (*Gr.*) Opium cum Pulvere Carbonum per aliquot dies in Aqua digerere, liquorem expressum Albuminis ope clarificare et in balneo aquae ad extracti spissitudinem evaporare; — *Homberg* et *Baume* (*Gr.*) Omnes partes solubiles repetita coctione Opii librarum quatuor in Aquae congiis tribus vel quatuor, donec nihil amplius prodit, extrahere, decocta mixta ad sesquicongii remanentiam consumere et per duos, tres vel sex menses coquere, subinde Aquam novam addendo, decoctum exprimere et ad massae pilularum consistentiam evaporare.

Das heutzutage allgemein angenommene Verfahren hat mit dem von Gal. Aehnlichkeit; es besteht darin, daß man das Opium, je nach seiner Consistenz, zerschnitten oder geraspelt in kaltem Wasser einweicht, bis es aufgelöst ist, die Flüssigkeiten durchseiht, sie bis zur Hälfte abdampft, erkalten läßt, und, um das Harz zu trennen, welches sich zum Theil als Sediment scheidet, filtrirt, die klargewordene Flüssigkeit abdampft, sie, nachdem sie erkaltet ist, wieder filtrirt und das bis zur Honigdicke abgedampfte Extract endlich mit kaltem destillirten Wasser verdünnt und es wiederum bis zur Pillenmasse abdampft.

Das so gewonnene Extract enthält meconsaures Morphium, eine kleine Menge Narcotin, färbenden Stoff, etwas Harz, Schleimharz und Satzmehl. — Gabe, einen halben bis drei Gran

Glaser's prepared opium (*Gr.*): Opium in rore majali digestum, filtratum et evaporatum.

Sal essentiale s. Extractum siccum Opii. (Gal.)

℞. Opii concisi . . . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.

Macera per horas 24, subinde agitando, et cola; residuum itidem maceratum cum Aquae partibus octo coletur. Colaturis mixtis et in balneo aquae ad syrupi consist. evaporatis, hujus supremi lineas circiter duas patinis infunde et tunc in furno vel balneo aquae ad siccum usque consume et squamas separa.

Extractum Opii aquosum Narcotina privatum. (Fer. GalF. *Gr. Re. T.*)

℞. Extracti Opii gummosi . q. vis.
Aquae pauxillo dilutum cum Aethere depurato in lagenam immitte et mixturam saepius agita; post certum tempus decantha, novum Aetherem affunde, donec quod decanthatur vaporando sedimentum non amplius relinquit, extractum deinde ad massae pilularis consistentiam consume.

Dieß ist das Verfahren Alph. Leroy's, welches Robiquet wieder in Erinnerung gebracht hat. Dublanc erklärt es für unzureichend, und schlägt dafür folgendes vor:

℞. Extracti Opii aquosi frigide parati
partes trecentas.
Aquae destillatae
partes centum quinquaginta.

Dissolv.; solutioni in retortam immissae superfunde

Aetheris puri . partes bis mille.

Destilla, lente calefaciendo, Aetheris partes circiter ducentas; apparatu depromto aetherem supernatantem decantha; extractum adhuc calidum cum Aethere dest. ablutum et vaporatione concentratum in Aqua dest dissolve et denuo ad aptam consist. evapora.

So bereitet, enthält das Opiumextract kein Atom Narcotin.

Gr. Aquam Lotionum Opii fere ad siccum evaporare, Aetheris ope narcotinam ejus dissolvere, decanthare et ad extracti consist. inspissare.

Extractum Opii Diestii. (Gal.)

℞. Opii . . . . . libram unam.
Aquae communis libras quatuor.

Coque leviter per horam dimidiam et cola; residuum bis coquatur cum Aquae aequali quantitate et decocta tria conjuncta colentur; mixturam in cucurbitam stanneam, balneo arenae lampadis ope calefacto impone, ita ut per sex mensium spatium lente coquatur, subinde Aquae dest. pauxillum addendo et in alia vasa transmittendo ut sedimentum separetur; post sex menses refrigeratum et per pannum colatum evaporet in balneo aquae ad consist. massae pilularis.

Dieſes Verfahren iſt mit Recht verlaſſen worden, da es vor den andern ſchneller zum Ziele führenden keinen wirklichen Nutzen voraus hat.

Extractum Opii per fermentationem. (Gal. *Ca. T.*)

℞. Opii concisi . . . quantum vis.
Aquae,
Fermenti Cerevisiae, sing. q. s.
Fermentationi in temperatura apta expone et liquorem, simulac clarus est, Aqua dilue; filtra, tunc coque donec omnis odor virosus evanuerit et denique ad extracti spissi consist. consume.

T. Fermenti uncias duas, Aquae libras tres, Opii uncias sex, post fermentationem Aquae novae tantidem etc.

Dieſes Verfahren, welches von Deyeux herrührt, iſt nicht genau, da die Veränderungen, welche hier mit dem Opium vorgehen, mehr oder weniger groß ſeyn müſſen, je nachdem die Gährung mehr oder weniger vollſtändig erfolgt iſt. Uebrigens hat man ſich noch gar nicht darum bekümmert, worin ſie eigentlich beſtehen.

Neumann's Opium (*Gr.*): Opium in Aqua macerare, sedulo despumando, colare et addendo Sacchari pauxillum loco frigido fermentationi subjicere, saepius agitando, per menses aliquot, colare et ad pilular. consist. vaporare.

Neumann's liquid laudanum (*Gr.*): Opium cum Aqua fermentatum neque ad mellis consist. evaporatum.

Extractum Opii cydoniatum s. Opium praeparatum Langelotti. (*Gr. Sp.*)

℞. Opii electi . . uncias duodecim.
Dissolve in mixtura e
Succi Cydoniorum,
Aquae font., sing. unciis sexaginta.
Stent in digestione per dies aliquot in loco calido, tunc colentur; colaturae adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Massam fermentationi subjice per plures menses, subinde spatulae ligneae ope agitando; postquam omnis fermentationis actio desiit, cola per linteum et ad extracti consist. consume.

Gr. Opii libram, Succi decem, Kali praep. unciam, Sacch. quatuor, post fermentationem per tempus al quot filtra et ad mellis consist. vapora, digere cum Spir. Vini, filtra et spiritum destill. abstrahe.

Laudanum liquidum cydoniatum (*Gr.*): Opii uncias quatuor, Croci duas, Succi Cydon. libras duas c. dimid., Fermenti cochlearia quatuor, fermentent donec opium et crocus separata sint, exprime, filtra, liquori adde Cinnam. uncias duas, Caryophyll., Liq. Aloës, Santali flavi, sing drachmam, digere per dies quatuordecim, filtra et ad dimid. evapora. — Narkotiſch und ſchmerzſtillend; 10—30 Tropfen.

Man kann von dieſem Extract, und mit noch größerem Rechte, das ſagen, was von dem vorigen galt. Es enthält ſehr wahrſcheinlich eſſigſaures Morphin.

Laudanum opiatum, *Extractum Opii crocatum.* (Br. His. His3. Pal. Sar. Wir.)

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.
— Croci,
Opobalsami, sing. semidrachmam.
Misce bene. (Pal. Wir.)
Br. Pulverem Croci.

℞. Extracti Opii aquosi uncias duas.
Croci . . . . unciam unam.
Matris Perlarum praeparatae,
Hyacinthi praeparati,
Corall. praep., sing.
sesquidrachmam.
Terrae sigillatae drachmam unam.
Bezoar . . . scrupulos quatuor.
Rasurae Cornu Cervi scrup. duos.

Pulverata Aquae pauxilli ope in pastam redige, de qua trochisci formentur. (His. His3.)

℞. Extracti Opii,
— Croci, sing. unciam unam.
Pulveris Succini albi drachmas sex.
— Castorei . drachmas tres.
Extractis cum Alcoholis pauxillo dilutis pulveres admisce. (Sar.)

Extractum anodynum. (Wir.)

℞. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
— Cardui bened.
drach. quinque.
— Calami,
— Angelicae, sing.
unciam unam.
Olei ess. Caryophyll. guttas decem.
Misce bene. — Jede Drachme enthält ſieben und einen halben Gran Opium.

Laudanum antihystericum. (Wir.)

℞. Extracti Opii . . . semunciam.
— Castorei drachmam unam.
— Croci . scrupulum unum.
Olei ess. Macidis,
— — Menthae,
— — Rutae, sing. guttas sex.
Misce ut fiat massa pilularis. — Man hat dieſes Präparat bei hyſteriſcher Kolik, um die Krämpfe zu ſtillen, empfohlen. — Gabe, einen bis zwei Gran.

Laudanum diureticum s. urinarium s. urinarium Micheli, Extractum Opii glyzyrrhizatum. (His. His3. Wir. *Fi.*)

℞. Extr. Opii aquosi drachmas duas.
Succi Liquiritiae . sesquiunciam.
Trochiscorum Alkekengi,
Terebinth. Venet., sing. semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Croci . . . scrupulos quatuor.
Gummi Tragacanthae,
Mastichis, sing. . semidrachmam.
Extractum opii et succum liquiritiae in mortario cum Aquae pauxillo diluta in massam melleam redige et iis admisce triturando terebinthinam; adde deinde trochiscos, mastichem, gummi, camphoram et crocum pulverata; fiat massa in trochiscos dividenda.

His3. Extr. Opii semunciam, Extr. Liquiritiae uncias tres, Camphorae drachmas duas, Croci scrupulos octo, Baccarum Alkekengi, Terebinthinae Venetae, sing. unciam unam, Tragacanthae, Mastichis, sing. drachmam unam; — *Fi.* Gummi Tragacanthae, Mastichis, sing. semunciam, caeterum ut antea.

Man hat dieſes Präparat bei Nierencolik, Iſchurie und Strangurie empfohlen. — Dreizehn Gran enthalten einen Gran Opium.

Laudanum opiatum cydoniatum, Extractum Opii cydoniatum. (Pal. Wir. *Bo. Gr.*)

℞. Opii concisi . . . semilibram.
Succi Cydonior. rec. expr. libras sex.
Digere blando calore, decantha, filtra et liquori evaporato adde
Olei ess. Cinnamomi,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis, sing. semiscrupulum.
Misce bene. (Pal. Wir. *Gr.*)
℞. Opii crudi pulv. uncias quatuor.
Succi Cydonior. rec. expr. libr. quatuor.
Post tres septimanas digestionis adde
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. unciam unam.
Calefac leviter, tum in digestione relinque per dies septem et adde
Croci . . . . . unciam unam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Post horas 24 filtra; evaporata in halneo aquae ad tertiae partis remanentiam serva. (*Bo.*)

Dieſes Präparat, welches heutzutage nicht mehr gehalten werden darf, unterſcheidet ſich von dem wäſſerigen Opiumextract durch die mit dem Quittenſaft hineinkommenden Unreinigkeiten und durch den Zuſatz der Gewürze. Ehedem zählte man es zu den ſchwach adſtringirenden Krampfmitteln und hielt es für nützlich bei Erbrechen, Durchfall, Schluchzen, beſonders um die Schmerzen zu ſtillen. — Gabe, Erwachſenen einen Gran, Kindern ein Zehntheil, Zwölftheil oder ein Zwanzigtheil Gran. Dieſes gilt beſonders von dem Präparat der zweiten Formel, da das der erſteren auf zehen Tropfen einen Gran Opium enthält.

Pilulae sedativae s. hypnoticae. (LH. *Ra. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Extracti Opii aquosi . q. placet.
Fiat pilulae grani unius. — Gabe, eine oder mehrere, je nach der Indication.
℞. Extracti Opii aquosi granum unum.
Liquiritiae pulveratae grana tria.
Fiat cum Syrupi communis quantitate sufficiente pilula (LH.)
℞. Extracti Opii . . . grana tria.
Camphorae . . . . grana sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae sex. (*Ra. Sy. Vm.*)
℞. Extracti Opii . . granum unum.
Camphorae . . . . grana sex.
Nitri . . . . . grana quatuor.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat pilula una. (*Ra.*)

Pilulae pectorales opiaceae. (Ful.)

℞. Succi Liquiritiae . sesquiunciam.
Extracti Opii . . . semunciam.
Syrupi Capitum Papaveris q. s.
Gabe, zwei bis ſechs Gran.

Pilulae balsamicae cum Opio. (*Au.*)

℞. Extracti Opii . semidrachmam.
Bals. Peruviani sesquidrachmam.
Myrrhae . . . drachmas tres.
Fiant pilulae grani unius. — Gabe, ſtündlich zwei oder drei Stück mit tinctura opii abwechſelnd. — Von Marcus empfohlen.

Balsamum Liquiritiae (*Re.*): E Liquiritia, Opio et Balsamo Tolutano.

Bolus ad diarrhoeam. (*Sm.*)

℞. Opii gummosi . granum unum.

Pimentae,
Cassiae ligneae,
Croci, singulorum grana quatuor.
Conservae Cynorrhodi . . q. s.

Tabellae Opii. (*Vm.*)

℞. Extr Opii frigide par. part. unam.
Sacchari albi
part. sexaginta quatuor.
Saccharum blando calore fusum cum extracto commisce ut fiat massa in tabellas sex granorum dividenda.

Morsuli pectorales. (Fer.)

℞. Mucilaginis Lichenis Islandici,
— G. Arab., sing. libr. unam.
Sacchari . . . . . libras duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.
Fiant morsuli granorum viginti quatuor. — Gabe, zehen Stück täglich.

Pulvis anodynus. (Ham. Wir. *Ca. Pie.*)

℞. Extracti Opii . . . grana duo.
Specier. Diatragacanth. unc. duas.
Misce bene. (*Pie.*)
℞. Extr. Opii aquosi drach. unam.
Corall. rubri praep. drachmas duas.
Misce. (Wir.)
℞. Opii,
Ligni Santali rub., sing.
scrup. unum.
Corall. rubri praep.
scrup. quatuor.
Misce. (Wir.)

Cataplasma cum Opio s. anodynum. (*Au.*)

℞. Farin. Semin. Lini unc. quatuor
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat cataplasma, cui adde
Opii . . . . . semidrachmam.

Linimentum opiaceum. (*Ra.*)

℞. Infusi Opii aquosi drach. quatuor.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Subige bene.

Clyster sedans (*Sy.*) hat viel Aehnlichkeit mit diesem Liniment: Extracti Opii aquosi grana duo vel tria, Olei Olivarum vel Lini uncias quatuor.

Sw. Linimentum sedativum: Extracti Opii drachmam unam triturare primò cum Aquae calidae pauxillo, deinde cum Cerati ordinarii drachmis tribus ad octo.

Auch gehört hierher das folgende: *Unguentum sedativum.* (*Sw.*)

℞. Extracti Opii drachmam unam.
Tritura cum Aquae bullientis pauxillo et adde deinde, continue terendo,
Axungiae in mortario calido liquatae
unciam unam.

Alle drei Präparate dienen zur Beseitigung von örtlichen Schmerzen.

Linimentum anodynum (*Va* Char): Extr. Opii gummos. drachmas tres, Ungt. Althaeae unciam unam, Bals. tranquilli, Olei Amygd. dulc., -ing. duas. In Einreibungen auf schmerzhafte Stellen.

Collyrium opiaceum. (*Ra. Va.* Hosp. Infant.)

℞. Extr. Opii gummosi
semidrachmam.
Aquae . . . . . libram unam.
Dissolve.
Ra. praeterea: Extracti grana duo et Aquae uncias quatuor.
Sicher muß die Kraft dieses Augenwassers je nach den Indicationen verschieden seyn.

Fomentatio narcotica, Solutio sedativa. (*Ra. Sw. Va.* Hôt. D.)

℞. Extr. Opii
drachm. duas ad quatuor.
Aquae calidae . . libram unam.
Contere. — In Bähungen bei pruriginösen Hautkrankheiten.
Va. Opii brut. drachmas duas, Aquae libram.

Gargarisma sedativum. (*Sw. Va*)

℞. Extr. Opii drachm. unam ad duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Misce triturando et adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Bei schmerzhaften Zungen- und Halsgeschwüren, bei rheumatischen Zahn- oder Ohrenschmerzen und sogenanntem nervösen Kopfweh von Nutzen

Enema Opii. (Du. *Re.*)

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Aquae tepidae . . uncias duas.
Misce.

Lotio Opii. (*Gr. Re.*)

℞. Opii mollis (Extracti?)
drachmas duas.
Tere et adde sensim
Aquae dest. bullientis . octarium.
Lindernd und schmerzstillend.

Clyster opiaceum. (*Sp. Sw.*)

℞. Seminis Lini contusi unciam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horam unam infusionis cola et in colatura solve
Extracti Opii . . . grana duo.

Injectio sedativa. (*Ca.*)

℞. Extracti Opii . . grana sedecim.
Infusi Seminis Lini libram unum.

Syrupus Extracti Opii s. Meconii s. Diacodium s. Opii s. de Opio s. opiatus s. thebaicus s. sedativus s. hypnoticus. (An. Du. Fer. Gal. GalM. His. His3. LH. LP. *C. Gr. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Extr. Opii c. Aqua frigida parat. drachmas tres et grana sexaginta.
Aquae . . . . . uncias duas.
Dissolve et adde
Syrupi Sacchari libras novem et uncias novem cum dimidia.
Misce, coque per momenta aliquot et per pannum cola. (Gal.)

GalM. Extracti partem unam, Aquae quatuor et Syrupi sexcentas; — An. Opii puri in Aquae pauxillo soluti unciam unam et Syrupi bullientis quindecim, misce; — His. His3 Extracti scrupulum unum, Aquae uncias tres et Syrupi libram unam ad consist. requisitam coquere; — Du. *C.* Extracti grana octodecim, Aquae calidae uncias octo et Sacchari uncias viginti novem in solutione solvendas; — LH. Extracti grana viginti quatuor. Syrupi libram unam (*Syrupus Diacodion vel e Meconio*); — Fer. Extracti drachmas tres, Sacchari libras quatuor et Aquae libras duas cum dimidia; — *T.* Extracti semidrachmam, Aquae drachmas duas, Sacchari clarificati uncias novemdecim, calefac ad ebullitionem usque et absque despumatione syrupum adhuc bullientem per telam linteam filtra; — *Gr. Re.* Extr. Op. aquosi grana octodecim, Aq. bull. uncias octo, Sacchari q. s.; vel *Gr.*: Extr. Opii drachmas quatuor, Sacch. albi libras decem, Aq. sex; — vel: Extr. grana sedecim, Syr. simpl. libram; vel: Tinct. Opii guttas viginti quinque, Syr. simpl. unciam.

℞. Extr. Opii frigide par. part. unam.
Syrupi Sacchari partes quadringentas octoginta.
Commisce sensim, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope. (*Vm.*)

℞. Opii minutim concisi sesquiunciam.
Aquae . . . uncias octodecim.
Macera frigide ad perf. solutionem usque, cola et partibus octo colaturae adde
Sacchari albi partes quindecim.
Solve in balneo aquae. (*Sw*.*); — LP. Syrupi communis libram unam, Opii puri in Aqua fervida soluti grana sex — *Gr.* Opii uncias duas et drachmas quatuor, Aq. libras viginti, Sacchari viginti quatuor, coque ad justam consist.

Gabe, von zwei bis vier Drachmen, zwei- oder mehrmals täglich.

Injectio Lactis opiata s. anodyna s. opiacea. (His His3.)

℞. Lactis recens obtenti uncias sex.
Syrupi Opii . . unciam unam.
Commisce.

Potio narcotica. (*ParC.*)

℞. Syrupi Opii . . . semunciam.
Aquae Tiliae . . . uncias tres.
— Flor. Aurant. unciam unam.
Misce.

Syrupus Opii emulsivus. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Opii . . . . . partes duas.
Tritura ut fiat cum
Aquae comm. part. quadraginta sex
emulsio. Sepone et in liquore de anthato, blando igne, solve
Sacchari albi partes ducentas triginta sex.

Clyster leniens s. opiatum s. anodynum. (LH. LP. *E. Fi.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Mucilag. Gummi Arab. semunciam.
Lactis tepidi . . . uncias sex.

LP. Decocti Althaeae uncias octo, Opii puri grana tria, Olei Amygdalarum semunciam; — LH. Decocti Althaeae Radicis (semuncia) libram, Amyli drachmas sex, Opii grana tria; — *Fi.* Opii granum, Gummi Arabici pulv. drachmam, Lactis vaccini uncias septem.

Enema Amyli cum Opio. (*Re.*)

℞. Amyl. drachmam unam vel duas.
Opii pulverati grana duo ad quatuor.
Bene trituratis et mixtis adde sensim
Aquae frigidae . . uncias duas.
Adde denique
Aquae bull. unc. quatuor ad sex

Bei Schmerzen von Krebs des Mastdarms, Fiſtel, Strictur ꝛc. (*Re.*)

Gargarisma leniens. (LP.)

℞. Aquae Florum Sambuci libram unam.
Gelatinae Gummi Lebbec unciam unam.
Syrupi de Meconio sesquiunciam.

Bei Aphthen oder Salivation.

Clyster anodynum s. opiatum pro equis. (*Gr.*)

℞. Opii . drachmam unam ad duas, vel Tinct. Op. unciam vel sesquiunciam.
Decocti Hordei octarios duos ad tres (Veterin.)

℞. Opii drachmam ad sesquidrachm.
Aquae calidae . . . uncias octo.
Dissolve et adde circiter
Decocti Amyli . octarios duos.

Haustus opiatus, Potio leniens. (*Au.*)

℞. Opii . . , . . granum unum.
Aquae . . . . unciam unam.
Dissolve. — Auf einmal, für einen Erwachſenen.

℞. Aquae purae . . . semunciam.
— aromaticae,
Syrupi Opii, sing. drachmas duas.
Tincturae Opii . . guttas decem.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Pomatum s. Unguentum leniens s. sedativum. (*Pie.*)

℞. Axungiae . . . . uncias tres.
Syrupi Opii . . . unciam unam.
Essentiae Rosarum guttas quatuor.
Bei Entzündungen der Schleimhaut im Munde paſſend.

Syrupus pectoralis. (*Ca.*)

℞. Sennae,
Radicis Liquiritiae, sing. uncias novem et drachmas tres.
Chinae electae uncias sex et drachmas sex.
Anisi viridis . . uncias quinque.
Florum Sambuci . uncias tres et drachmam unam.
Summit. Centaurii min. sesquiunciam.
Ipecacuanhae drachmas quinque.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque per longum tempus et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Extracti Opii gummosi drachmas quatuor cum dimidia
Gabe, einen halben Kaffeelöffel bis einen Eßlöffel, in einer halben Taſſe Theethee.

Syrupus pectoralis Maloeti. (GalH. *Bo. Ca. Pie.*)

℞. Jujubarum,
Dactylorum,
Passular. min., sing. unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque, sub finem addendo
Capilli Ven. Canad. drachm. quatuor.
Liquiritiae . . . drachmas duas.
Cola leviter exprimendo et adde
Sacchari crudi albi . libras duas.
Fiat syrupus, cui adde
Extr. Opii c. Aquae panxillo diluti grana sex.
Coque leviter et cola. — Gabe, eine Unze in einer Taſſe Bruſtthee.

Injectio leniens. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Capitum Papaveris . . . no. 2.
Stipit. Solani nigri . drach. unam.
Aquae communis . libram unam.
Coque et colaturae adde
Extr. Opii grana decem ad viginti.

Mixtura ad dysenteriam. (*Sw*.*)

℞. Opii . . . grana duo ad tria.
Syrupi Papaveris . unciam unam.
Aquae Chamomill. Rom. unc. sex.
Gabe, einen halben bis einen Löffel alle Viertelſtunden.

Collyrium narcoticum. (*Ca.*)

℞. Infusi Fol. Hyoscyami semilibram.
Extracti Belladonnae grana octo.
— Opii . . grana quatuor.

Potio febrifuga. (Bo.)

℞. Aquae destillatae Menthae,
— Florum Aurantiorum,
— Valerianae, sing. unc. duas.
Tincturae Castorei,
— Succini,
— Asae foetidae, singularum guttas viginti quinque.
Theriacae . . drachmam unam.
Opii gummosi . . sesquigranum.
Ammoniaci liq guttas duodecim.
Syrupi Cort. Aurant. unc. unam.
In zwei gleichen Doſen, am Tage des Anfalls, die eine vor, die andre eine Stunde nach demſelben zu nehmen. Man will damit Wechſelfieber geheilt haben, die der China widerſtanden hatten.

Guttae vitae, Salmon's drops of life. (*Gr.*): Opii uncias quatuor, Aquae libras octo, dissolve, coque per triduum, exprime, ad libras duas vapora, recipe tunc Croci unciam, Cast. Ross. sesquiunciam, Coccinell., Serpent. Virgin, sing. semunciam., Nuc. mosch., Zedoar., sing drachmas duas, Camph. drachmam, Tinct. Antim. diaph r. libram, digere per tres vel quatuor dies, adde solutionem opii, digere per biduum et decantha; — zu 10 bis 40 Tropfen. — Tinct. Castorei uncias octo, Vini Antim. Aq., sing. libram, Opii, Croci, sing. semunciam, Cocci drachmas duas.

Digitized by Google

Syrupus Opii succinatus s. Karabe. (An. GalH. *Ca.*)

℞. Syrupi Opii . . . libram unam.
Acidi succinici in Aqua dissoluti
scrupulum unum.
Misce exacte. (An.)
Ca. Acidi scrupulos duos.
℞. Syrupi Opii . . . libram unam.
Spiritus Succini . scrupulos duos.
Misce. (GalH.)
Gabe, eine halbe bis eine Unze in einer Potion.

Pomatum s. Unguentum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale. (*Pie.*)

℞. Extracti Opii in Aquae pauxillo
dissoluti . . . semidrachmam.
Cochlearum calcinat. drach. unam.
Unguenti populei uncias quatuor.
Cum Vitello Ovi unius subige.

Linimentum anodynum. (*Ra.*)

℞. Extr. Opii gummos.
drachmas tres.
Unguenti Althaeae unciam unam.
Balsami tranquilli,
Olei Amygd. dulc., sing.
uncias duas.
Diese Salbe wurde von Boyer angewendet.

Mixtura sedativa. (*Sw.*)

℞. Aquae Flor. Aurant. . uncias sex.
Extracti Opii . . . grana tria.
Aetheris sulph. drachmam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Löffelweise alle Stunden oder zwei Stunden.

Aqua antispasmodica. (LH.)

℞. Aquae Menthae piperitae
uncias duas.
Spiritus Melissae compositi
semunciam.
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Syrupi Opii . . unciam unam.
Misce. — Gabe, eine halbe Unze.

Tisana antispasmodica. (LH.)

℞. Herbae Melissae,
— Menthae piperitae,
Florum Liliae, singulorum
drachmam unam
Aquae fervidae . . libram unam.
Cola et refrigerato adde
Syrupi Opii . . unciam unam.
Gabe, vier Unzen, nach Vorschrift zu wiederholen.

Collyrium Opii cum Camphora s. Opii s. anodynum s. leniens s. sedans. (Ful. LH. *E. Gr. Re. Va. Vm.*)

℞. Extracti Opii mollis grana decem.
Camphorae . . . . grana sex.
Aquae dest. fervidae
uncias duodecim.
Misce et solve. (*Gr. Re.*)

℞. Mucilag. Cydonior. unciam unam.
Extracti Opii aquosi granum unum.
Camphorae cum gutta una Olei
tritae . . . . . grana duo.
Aquae Rosarum . . uncias duas.
Extractum et camphoram mixta cum mucilaginis parte una in emulsionem redige, cui alternatim adde mucilaginem et aquam rosarum. (Ful. *Va. Vm.*)

E. Opii granum unum, Camphorae quinque et Mucilaginis Gummi Arabici unciam unam; — LH. Mucilag. Gummi Arab. unciam unam, Aquae dest. quatuor, Opii puri, Camphorae, sing. grana duo.

Looch compositum s. Linctus compositus. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Looch albi . . uncias quatuor.
Extracti Opii . . granum unum.
— Chinae . grana quatuor.
Camphorae . . . . grana sex.
Bei Bronchitis mit heftigem Husten und vieler Schleimabsonderung.

§. II. Präparate, welche das Opium unzerfällt, roh oder gereinigt enthalten.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums gar nicht oder wenigstens nicht merklich, durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis opiatus s. thebaicus s. Cretae s. e Creta compositus cum Opio s. Cornu s. Cornu Cervi usti cum Opio s. anodynus s. temperans. (Bor. DD. Ed. Gen. Han. LH. Lon. LonN. Suec. WW. *Br. C. E. Gr. Re. Va. Vm.*)

℞. Opii puri . . . partem unam.
Sacchari pulverati partes viginti.
Misce. (DD. WW.)
Gen. Opii partem unam et Sacchari viginti tres.
LH. G. Arabici drachmam unam, divide in tres chartas et cuique adde Opii puri semigranum. — Gabe, ein Stück, drei Mal.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Pulveris gummosi partes novem.
Misce exacte. (Bor. Han.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Pulveratis adde
Pulveris gummosi partes duodecim.
Misce. (Suec.)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Cornu Cervi calcin. partes novem.
Pulvera. (*Br. Gr.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* Opii partem unam, Cornu Cervi usti octo et unam Coccionellae.

℞. Opii . . . . . partem unam.
Calcariae subcarb. praep.
part. novem.
Contere. (Ed. *Gr.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Pulv. Cretae comp.
part. triginta novem.
Misce bene. (Lon. LonN. *C. Gr. Re. Vm.*)

Gr. praeterea: Pulveris Cretae comp. uncias novem, Opii sesquidrachmam; — *Va.* Cretae uncias duas, Cinnam. unam, Tormentill., Gummi Arabici, sing. drachmas sex, Pip. longi unam, Opii grana triginta quatuor.

℞. Cretae praep. . sesquidrachmam.
Cinnamomi . drachmam unam.
Piperis longi . . . grana octo.
Opii . . . . . grana sex.
Fiant doses duodecim. (*E.*)

Pulvis antacidus. (*Gr. Re.*): Pulveris Calcariae cum Opio grana viginti, Pulv. Catechu vel Kino grana quindecim; misce. Auf eine Gabe bei Diarrhöe von Säuren.

Pilulae opiatae s. thebaicae s. Opii s. ex Opio s. anodynae, Nepenthes opiatum. (Am. BorC. DD. Ed. Fer. Han. WW. *Au. Br. O. E. Gr. Re. Sa. Va. Vm.*)

℞. Pulv. Opii . . . grana decem.
— Succi Liquirit.
drachmam unam.
Fiant pilulae octoginta, quarum quatuor opii granum unum continent. (WW.)

DD. Opii grana decem et Succi Liquiritiae scrupulum; — BorC. et *Au.* Opii grana decem et Succi scrupulos quatuor; — Han. *Br. Gr.* Opii partem unam et quatuor Extracti Liquiritiae; — *Sa.* Opii unam et tres Extracti Liquiritiae; — Fer. Opii unam et sex Extracti.

℞. Opii . . . . . partes quatuor.
Solve frigide in
Aquae . . . . partibus novem.
Solutioni colatae adde
Micae Panis albi partes duodecim.
Sepone per aliquot tempus, tunc cola exprimendo et adde
Amyli . . . . . partes tres.
Sacchari . . . . partem unam.
Fiant pilulae. (*Vm.*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Extracti Liquiritiae partes septem
Mollefactis singulo separatim in Alcohole tenui adde
Pulv. Piperis Jamaic.
part. quinque (duas *Re. Va.*)
Fiant pilulae granorum quinque. (Ed. *Br. Re. Va.*)

Gr. Opii unciam unam, Extracti octo, Pip Jamaic. unam.

℞. Opii . . . . drachmam unam.
Saponis . . . grana duodecim.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiant pilulae sexaginta. (Am. *C. E.*)

Pilulae narcoticae. (*Gr.*)

℞. Opii . . . . . grana quatuor.
Extracti Hyoscyami,
— Conii, sing.
grana quindecim.
Misce fiant pil. no. 6. — 1 Stück jede Nacht.

Conditum s. Opiatum antiepilepticum. (*Sw.*)

℞. Opii . . . . . semidrachmam.
Valerianae . . . sesquiunciam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s Pomatum opiatum s. opiaceum s. anodynum opiatum, Ceratum opiatum. (B. LP. *Ca. E. Gr. Pic. Ra. Va.* Hosp. Char. *Vm.*)

℞. Opii crudi pulv.
drachm. unam ad duas.
Cerati simplicis . uncias quatuor.
Contere. (*Ra. Va.*)

Vm. Opii partem unam et octodecim Cerati; — *Gr.* Opii pulv. drachmam, Ung. cetacei uncias tres.

℞. Olei Olivar. uncias duas c. dimid.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Liquatis simul adde
Opii crudi . . . . grana duo.
Misce bene. (*B.*)

LP. Olei uncias decem, Cerae flavae quatuor, Opii puri unam.

℞. Opii crudi . . . grana viginti.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Subige et adde
Cerati Galeni . . . uncias duas.
Misce triturando. (*Ca. Pic.*)

℞. Opii . . . . . grana quinque.
Rhei . . . . . grana decem.
Cerati simplicis . sesquiunciam.
Misce triturando. (*E.*)

Diese Salbe dient zum Verbinden von Wunden oder zum Einreiben auf Geschwülste, Excoriationen, Pusteln, welche heftige Schmerzen verursachen.

Unguentum opiatum. (*T.*)

℞. Opii crudi subtilissime pulverati
unciam unam.

Axungiae praeparatae
uncias decem.

Agita in mortario marmoreo ad extinctionem opii usque.

Unguentum sedativo-narcoticum s. narcoticum. (*B.*)

℞ Opii . . . . drachmam unam.
Succi gastrici vitulini . . q. s.

Digere leni calore per horas 24 et adde Axungiae Porci q. s. ut fiat ung. molle.

In Einreibungen auf die Oberbauchgegend, zu einer halben bis ganzen Drachme täglich, gegen Leibſchmerzen, Cardialgie, Krampfkolik, Hyſterie und Hypochondrie.

Unguentum anodynum s. antispasmodicum. (Gen. *Pie.*)

℞. Olei Olivar. unc. tres et sesquidrachmam.
Cerae drachmas sex cum dimidia.
Opii crudi bene divisi unc. unam.

Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coquatur in Aquae unciis quatuor ad duas redactis; tunc decoctum cum cerato opiaceo commisce. (Pie.)

Gen. Opii drachmam unam, Olei decem et Cerae flavae semunciam.

Bei nervöſen ſogenannten aſtheniſchen Affectionen empfohlen.

Unguentum s. Pomatum leniens. (*Sm.*)

℞. Olei Rosarum,
Axungiae Porci,
Cerae flavae, sing. . uncias duas.

Leni igne liquatis adde
Opii depurati . drachmam unam.

Tronchin verband ſchmerzhafte Anſchwellungen der Brüſte damit und ließ es alle zwölf Stunden erneuern.

Suppositorium opiatum s. sedativum s. leniens s. anodynum s. narcoticum. (*E. Gr. Re. Va.*)

℞. Opii . . . . . grana duo.
Saponis albi . . grana quatuor.

Va. Opii grana duo, Sapon. medic. drachmam; — *Re.* Opii sesquiscrupulum, Saponis drachmam; vel: Op. grana duo ad quatuor, Extr. Hyoscyami grana decem vel viginti; bei Reizung der Harnwerkzeuge, bei Uterinaffectionen in die Vagina.

Man bringt es in den Maſtdarm, wenn man kein Klyſtir geben kann, bei Nierenentzündung, Ruhr ꝛc.

Emplastrum Opii. (Ed. Ful. Li. Lon. LonN *Gr. Re.*)

℞. Emplastri Meliloti partes sedecim.
Lente liquatis, antequam refrigerata sint, adde
Opii crudi pulverati partem unam.
Misce bene. (Li.)

Ful. Opii partem unam et Emplastri viginti quatuor.

℞ Opii pulverati . . semunciam.

Triturando commisce cum mixtura liquefacta e
Resinae Burgundicae (Thuris *Gr.*)
unciis tribus.
Empl. Diachyli gumm. libra una.
Misce sedulo. (Ed. Lon. *Gr. Re.*)

Lon. Aquae octarium (uncias octo *Gr.*) addere et coquendo ad emplastri consist. redigere.

Schmerzſtillend, bei Rheumatismen und örtlichen Schmerzen.

Unguentum opiatum, Linimentum Opii cum Felle vitulino. (B*. *Au.*)

℞. Opii pulverati . drachmas duas.
Digere calide per dies duos cum
Fellis vitulini . . unciis duabus.
Adde deinde
Axungiae Porci . . uncias duas.
Olei Bergamottae guttas decem.

Von Brera als ein ſehr gutes Linderungsmittel empfohlen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums durch Zuſatz reizender Subſtanzen mehr oder weniger verändert, bisweilen ſelbſt ganz verſteckt iſt.

Trochisci bechici opiati s. opiacei. (Am. Wür. *C.*)

℞. Opii,
Bals. Peruv., sing. . drach. unam.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Massae Trochiscorum bechicorum nigrorum . . uncias septem.

Opio cum balsamo et saccharo triturati adde massam in Aqua calida mollefactam et trochiscos granorum decem ad quindecim forma. (Wür.)

Am. et *C.* Opii drachmas duas, Tinct. Balsami Tolutani semunciam, Syrupi Balsami Tolut. uncias octo, Extracti Liquiritiae, Gummi Arab., sing. uncias quinque ut fiant trochisci granorum decem.

Pilulae antiemeticae. (*Pie.*)

℞. Opii purificati . grana quatuor.
Radicis Colombo
scrupulos quatuor.
Olei ess. Menthae pip.
guttas decem.
Syrupi Caryophyll. rubr. . q. s.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, ſechs Stück täglich, auf drei Mal.

Digitized by Google

Pulvis Nitri thebaicus s. sedativus s. antispasmodicus Rosensteinii. (B. Ful. Li. Suec. *Sp. Va*)

℞. Opii . . . . . partem unam.
Nitri . . . . partes quindecim.
Sacchari part. quadraginta quinque.
Misce simul. (Ful.)

B*. et Suec. Opii partem unam, Nitri undecim et Sacchari quadraginta octo; — *Sa.* Opii unam, Nitri decem et Sacchari quadraginta octo; — Li. *Va.* Opii unam, Nitri duodecim et Sacchari quadraginta octo.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Opii puri . . . grana quatuor.
Magnesiae stibiatae . drach. duas.
Divide in partes octo. — Bei Rheumatismus empfohlen.

Pulvis sudorificus Wardii, Ward's sweating powders (*Re.*): Ex Opio et Rad. Helleb. alb.

Pulvis antidysentericus. (*Vm.*)

℞. Opii,
Tartari stibiati, sing. part. unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. . partes octo.
Misce. — Dieſes und das vorhergehende Pulver haben, hinſichtlich der Wirkung, Aehnlichkeit mit dem folgenden.

Pulvis adstringens. (*B.*)

℞. Opii,
Ipecacuanhae, sing. granum unum.
Cascarillae . . . grana decem.
Drei oder vier Mal täglich, bei rebelliſcher Diarrhöe von Atonie.

Pilulae e Storace s. Styrace. (Br. Du. Gen. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Gr. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Storacis Calamita . semunciam
Succi Liquiritiae . drachmas tres.
Olibani,
Benzoës,
Mastichis,
Extracti Opii, sing.
drachmas duas.
Croci . . . . drachmam unam.
Essentiae Succini quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

Sar. Storacis semunciam, Succi Liquiritiae drachmas duas, Olibani, Benzoës, Myrrhae, Extracti Opii, sing. unam, Croci scrupulos duos et Syrupi Papaveris q. s.; — *Vm.* Benzoës, Myrrhae, Olibani, Opii, Croci, sing. partem unam, Succi Liquiritiae partem unam cum dimidia, Storacis partes duas et Syrupi Scchari q. s.

℞. Storacis Calamita . uncias duas.
Extracti Liquiritiae,
Croci, sing. . . . drachmas sex.
Opii . . . . drachmas quinque.
Balsami Peruviani quant. sufficit.
Fiat massa pilularis. (Wür.)

℞. Storacis,
Croci,
Extr. Liquirit., sing.
unciam unam.
— Opii . drachmas quinque.
Tincturae Myrrhae . . . q. s.
Fiat massa pilularis. (*Sw.*)

℞. Storacis . . . drachmas duas.
Succi Liquiritiae . drachmas tres.
Opii . . . . drachmam unam.
Vini Hispanici . quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Suec.)

Du. *Gr. Re* Storacis drachmas tres, Croci et Opii, Mellis (*Re.*), sing. drachmam unam; — Lon. post. 1745, *Gr.* Styracis colati uncias duas, Croci drach. unam, Opii colati quinque.

℞. Storacis,
Olibani,
Myrrhae, sing. . . semunciam.
Opii,
Croci,
Extr. Liquirit., sing
drachm. unam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.
Fias massa pilularis. (Gen.)

Gr. Croci drachmam, reliquorum, sing. semunciam, Syrupi q. s.
Reizend, Bruſtmittel. — Gabe, vier bis zwölf Gran.

Pulvis alexiterius s. anodynus s. diaphoreticus s. diapnoicus s. sudorificus s. sudorificus Doveri s. Doweri, Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae opiatus s. thebaicus s. Ipecacuanhae et Opii s. compositus s. Ipecacuanhae cum Opio. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bo14. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *B. Br. C. Ca. E. Fi. Gr. Pie. Re. Sa. Sp Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Pulveris Opii purif. part. unam.
— Ipecacuanhae . partes duas.
— Sacchari albi part. septem.
Misce bene. (Fer. GalM.)

A. D. et WW. Opii et Ipecacuanhae, sing. partem unam et octo Sacchari; — DD. Opii et Ipecacuanhae, sing. unam et viginti Sacchari; — *Pie.* Opii unam, Ipecacuanhae duas et Sacchari octodecim.

℞. Opii purificati,
Ipecacuanhae, sing. partem unam.

Kali sulphurici . . partes octo. Pulverata seorsim commisce. (Am. Ba. Bor. BorC. Du. Ed. Fenn. Ham. HassP. LH. Lon. LonN. Lus. O. Pol. RC. Suec. Wir. *Br. C. Gr. Re.*)

Ams. B. Bel. Li. R. Sax. et. Wür. Opii, Ipecacuanhae, sing. partem unam et Kali sulphurici novem; — B. Opii Ipecacuanhae, sing. unam et decem Kali sulphurici; — Bor4. Opii, Ipecacuanhae, sing. unam, Kali sulphurici sedecim.

℞. Nitri,
Kali sulph., sing. . partes quatuor. Pulverata et mixta in crucibulum immitte et liqua, massam fluidam in mortarium ferreum infunde et fere refrigeratae adde
Pulv. Opii,
— Ipecacuanhae, sing. partem unam.
Fiat pulvis subtilissimus. (Gen. *Ca. Gr. Re. Sa. Sw. Sy.*)

Ham. et *E.* Salium cujusque partes octo et duorum reliquarum, sing. partem unam; — *Vm.* Nitri, Sulphatis, Ipecacuanhae, sing. quatuor et unam Opii; — An. Salium, sing. quatuor, Ipecacuanhae duas et unam Opii; — His. HisS. Sulphatis quatuor, Nitri sex, Ipecacuanhae et Opii unam.

℞. Kali sulphurici,
Nitri, singulorum partes quatuor. Massae liquatae et refrigeratae adde
Pulv. Extracti Opii,
— Ipecacuanhae,
— Liquiritiae, sing. partem unam.
Fiat pulvis. (Gal. *Sp. Fi. Gr. T.*)

Sw. Sulphatis partes quatuor, Nitri tres et Pulverum, singulorum unam.

Letztere Formel ist die von Dover gegebene.

℞. Opii purificati,
Ipecacuanhae, sing. scrupulum unum.
Pulveris Valerianae drachmas tres.
Misce bene triturando. (LP.)

Das Dover'sche Pulver, meist Ekel und Brechen erregend, wirkt schweißtreibend wenn der Kranke sich gut bedeckt und warmes Getränk zu sich nimmt. Die Gabe, welche, abgesehen von individuellen und andern zufälligen Umständen, je nach der relativen Menge des Opiums, sehr verschieden ist, beträgt gemeiniglich zehen Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (*B.*)

℞. Pulveris Doweri,
— Jamesii, sing. grana quatuor.

Alle vier Stunden bei rheumatischen, syphilitischen und hartnäckigen Gichtschmerzen.

Boli sedativi s. diaphoretici. (*B. Sw.*)

℞. Pulveris Doweri grana viginti ad viginti quinque.
Syrupi Zingiberis quantum sufficit.
Morgens zu nehmen. (*Sw.*)

B. Pulveris Doweri grana sedecim et Roob Sambuci q. s. ut fiant boli quatuor; vel: Pulveris grana duodecim et Extracti Aconiti sex ut fiant boli sex. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Pulvis anodynus. (Ham.)

℞. Magnesiae . . drachmam unam.
Florum Zinci . . grana sedecim.
Pulveris Ipecacuanhae,
Opii puri, sing. . drachmas duas.
Misce sedulo. — Dieses Pulver hat viel Aehnlichkeit mit dem Dower'schen.

Pilulae Opii et Ipecacuanhae. (Hosp. Angl. *Va.*)

℞. Opii pulverati,
Ipecacuanhae pulv., sing. granum unum.
Conservae Cynorrhodont. . q. s. ut f. pil. no. 2.

Mixtura antiotodynica. (*Pie.*)

℞. Opii . . grana tria ad quatuor.
Croci . . . . semiscrupulum.
Myrrhae . . . semidrachmam.
Succi Malvae . . . semunciam.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Pie. praeterea: Camphorae et Opii, sing. grana duo; Olei Caryophyll. rubr. sesquiunciam.

Beide Mixturen werden lauwarm in das Ohr eingespritzt.

Mixtura antiodontalgica. (*Sa.*)

℞. Opii puri . . . . semigranum.
Olei ess. Caryophyll. guttas decem.
Liquoris Hoffm. sesquidrachmam.

Gebrauch wie bei den vorhergehenden.

Unguentum anodynum s. ad haemorrhoides. (Ful. Wür. *Fi.*)

℞. Opii,
Croci, sing. . scrupulum unum.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Unguenti populei,
— nutriti, sing. unciam unam.
Misce bene. (Ful.)

Fi. Ung. nutriti, Ung. populei, sing. uncias sex, Opii pulv. drachmas duas, Croci scrupulos duos, Olei Ovorum quatuor; — Wür. Cerati Saturni uncias tres, Unguenti populei tantidem, Opii, Croci, sing. drachmam et Vitellos Ovorum no. 3.

Beſonders bei Hämorrhoidalſchmerzen empfohlen.

Pilulae Opii s. Opii saponaceae s. Saponis cum Opio s. Saponis compositae. (Am. Lon. LonN. Wür. *C. Gr. Re. Va.*)

℞. Opii pulverati . . . semunciam.
Saponis duri . . . uncias duas.
Fiat massa pilularis. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Am et *C.* Opii drachmam et Saponis Alicantini grana duodecim ut fiant pilulae sexaginta; — *Gr.* Opii colati semunciam, Saponis albi uncias quatuor, Essent. Limonis drachmam; — *Va.* Saponem amygdalinum et pilulas no. septuaginta duas. (½ Gr. op. sing.)

℞. Opii purificati,
Pulv. Rad. Liquiritiae,
— — Hellebori albi,
— — — nigri, sing. semunciam.
Saponis Starkeyani . . . q. s. ut fiat massa pilularis. (Wür.)

Boli vel Globuli anodyni. (*Gr. Re.*)

℞. Opii, semidrachmam ad unam.
Saponis Castil. drachmas tres (duas ad quat. *Gr.*).
Zingib. pulv. drachmam unam ad duas.
Semin. Anisi pulv. semunciam ad unam.
Olei Carvi . . semidrachmam.
Molasses (Syrupi *Gr.*) . q. s. ut fiat bolus. Bei Colik, Bauchgrimmen. (Art. Veterin.)

Cataplasma antispasmodicum (*Ca. Pic.*)

℞. Cataplasmatis Farinae Seminis Lini in Decocto Capitum Papaveris et Croci decocti uncias quatuor.
Consperge
Pulveris Opii crudi grana viginti.
— Camphorae . semidrachma.

Emplastrum antispasmodicum. (*Au. E. Sa.*)

℞. Emplastri Cumini,
Cerae flavae, sing. unciam unam.
Opii,
Camphorae, sing. drachmas duas.
Commisce bene. (*Sa.*)

℞. Opii,
Camphorae, sing. semidrachmam.
Empl. Lithargyri drachmas duas.
Misce. (*E.*)

℞. Opii,
Camphorae,
Saponis albi, sing. drachmam unam.
Tincturae thebaicae . . . q. s. ut fiat massa mollis. (*E.*)

℞. Opii,
Extr. Hyoscyami, sing. drachm. duas.
— Cicutae . . . semunciam.
Misce. (*Au.*)

℞. Opii,
Salis volatilis Cornu Cervi,
Camphorae, sing. semidrachmam.
Petrolei . . . drachmas duas.
Empl. de Galbano crocati unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Balsamum antiodontalgicum. (Pal. Wir. *Au. Pic. Sm. Sp. Vm.*)

℞. Opii,
Camphorae, sing. scrupulos duos.
Dissolutis in Alcoholis pauxillo adde
Olei ess. Caryophyll. drach. unam.
— — Guajaci drachmas duas.
— Nucis mosch. expressi drachm. sex
Misce bene. (Pal. Wir. *Ca. Pic. Sp. Vm.*)

℞ Opii,
Camphorae, sing. scrupulum unum.
Olei Cajeput . drachmam unam.
— Nucis mosch. drachmas tres.
Misce sedulo. (*Sm.*)

Man bringt ein wenig von dieſem Balſam in die Höhle des cariöſen Zahns.

Hierher gehört auch die *Sotirelia parva*, von Br. und *Sp.* nach Minderer, wozu die Formel folgende iſt:

℞. Opii,
Specier. Diambrae, sing. drachmam.
Camphorae,
Croci, sing. . . grana duodecim.
Olei Caryophyll. guttas triginta.
— Nucis mosch. drachmas duas.
Fiat opiatum spissum — Man bringt ein Kügelchen davon in den ſchadhaften Zahn.

℞. Opii . . . . . semidrachmam.
Extracti Belladonnae,
Camphorae, singulorum grana sex.
Olei Cajeput.
Tinct. Cantharid, sing. gutt. octo.
Olei Hyoscyami drachmam unam.
Man bringt ein wenig davon in den ſchadhaften Zahn. (*Au.*)

℞. Pulveris Mastichis,
— Sandaracae, sing. drachmas duas.
Sanguinis Draconis grana decem.
Opii . . . . . grana duo.
Olei Rorismarini . guttas octo.
Spiritus Cochleariae . . . q. s.

Man bringt etwas davon auf das ſchmerzhafte Zahnfleiſch. (*Au.*)

Hill's Balsam of honey. (*Gr.*): Bals. Tolut. opt. uncias duas, Styracis drachmas duas, Opii puri semunciam, Mellis opt. uncias octo, Spir. rectif. octarios duos. — Bruſtmittel bei Huſten ꝛc.

Pilulae Opii camphoratae s. anodynae. (*Re. Va.* Hôt. D.): Opii puri drachmam, Camphorae drachmas duas, Syr. simpl. q. s. ut fiant pil. 60. — Bei chorda und priapismus 1 oder 2 Stück Nachts; *Va.* Extr. grana tria, Camphorae sex Syr. Sacch. q. s. ut f. pil. no. 6. 1 — 3 Stück täglich bei Schmerz und dadurch verurſachter Schlafloſigkeit.

Pilulae Opii compositae s. antimoniatae. (*Re. Va.*): Op. pur., Camph., sing. drachmam, Antim. tart. grana quindecim, Syr. simp. q. s. ut f. pil. 60. Diaphoretiſch, lindernd und ſchmerzſtillend; — *Va.* Op. grana duo, Tart. stib. unum, Theriacae q. s. ut f. pil. no. 4. 1 — 2 Stück täglich.

Pilulae lenientes. (*Va.* Hôt. D.): Extr. Opii, Kermetis min., sing. grana duo, Nitri quatuor, f. pil. no. 8. 2 — 4 Stück täglich bei manchen Rheumatismen.

Pilulae antispasmodicae. (Ful.)

℞. Opii,
Castorei, sing. . grana quindecim.
Camphorae . . semidrachmam.
Extracti Valerianae,
— Vulvariae, sing. drach. duas.
Tincturae Millefolii . . . q. s.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Boli antispasmodici. (*Pie.*)

℞ Opii . . . granum dimidium.
Camphorae . . . . grana tria.
Nitri . . . . . grana decem.
Conservae Rosarum . . . q. s.

Auf einmal.

Trochisci Chaussieri. (*Ca.*)

℞. Opii . . . . . grana sex.
Camphorae grana viginti unum.
Sacchari . . . . drachmas tres.
Mucilaginis . . quantum sufficit ut fiant trochisci quinquaginta. — Bei Croup und Kehlkopfſchwindſucht empfohlen. — Gabe, fünf bis ſechs Stück täglich.

Trochisci Chaussieri. (*Ca. Sw*.*)

℞. Opii . . . . scrupulum unum.
Camphorae . drachmam unam.
Sacchari . . . drachmas novem.
G Tragacanthae semidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat massa centum quinquaginta trochiscorum.

Gabe, vier bis ſechs Stück täglich.

Pulvis antispasmodicus. (*Sw*.*)

℞. Opii . . . . . semiscrupulum.
Camphorae . . scrupulos duos.
Ammonii subcarb. scrup. quatuor.
Amyli . . . . grana quindecim.

Divide in partes octodecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Münzenwaſſer.

Balsamum ad cancrum. (*Bo.*)

℞. Opii . . grana viginti quatuor.
Plumbi acet. cryst. uncias quatuor.
Camphorae . drachmam unam.
Essent. Terebinth. uncias duodeim.

Digere per duos dies et filtra.

Ceratum anodynum. (LH.)

℞. Cerati simplicis (LH.) uncias duas.
Opii . . . . . semidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.

Unguentum Renal. (Pal.)

℞. Opii . . . . scrupulum unum.
Camphorae . . semiscrupulum.
Olei Scorpionum,
Succi Citri, sing. . . semunciam.
Unguenti populei . sesquiunciam.

Misce. — Bei Steincolik empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Br. *Sp.*)

℞. Emplastri Saponis,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.

Liqua et massae semirefrigeratae adde
Olei Tartari foet. drach. quinque.
Opii pulverati . . semunciam.
Camphorae . . drachmas tres,

in
Olei Sem. Hyoscyami
drachmis quinque

solutas. — Bei Gelenkkrankheiten empfohlen.

Pilulae orientales. (*Ca.*)

℞. Opii purificati,
Croci,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Cardamomi minoris, sing.
part. aequales.
Syrupi Florum Aurantii . . q. s.

ut fiant pilulae trium granorum. — Gabe, Abends zwei oder drei Stück.

Pilulae tonicae et hypnoticae. (*Pie.*)

℞. Opii,
Olibani,
Storacis,
Myrrhae,

Succi Liquirit., sing. scrup. duos.
Amyli . . . . drachmas duas.
Gummi Tragacanthae,
— Arabici, sing. . semunciam.

Gabe, ein halber Scrupel bis eine halbe Drachme.

Pilulae ad tussim Schroederi. (*Fi.*)

℞. Opii depurati,
Croci orientalis,
Myrrhae, sing. scrupulum unum.
Olibani,
Succi Liquirit., sing. . drachmam.

Pulverata cum Syrupo Papaveris albi in massam redige. — Gabe, sechs bis zwölf Gran.

Massa pilularis Cynoglossi, Pilulae Radicis Cynoglossi opiatae s. de Cynoglosso s. Opii compositae, Catapotia ad catarrhos, Pilulae Extracti Opii s. lenientes Mesues. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. Han. His. His3. LH. Pal. Pm. Sar. Wir. *Ca. Pie. Sp. Vm*)

1) Ohne Bibergeil.

℞. Cort. sicc. Rad. Cynoglossi unciam unam.
Seminum Hyoscyami albi,
Opii, singulorum drachmas duas.
Olibani . . . . drachmas sex.
Croci . . . . drachmam unam.
Balsami Peruviani nigri . q. s.

Misce opium, seorsim pulveratum, cum reliquis substantiis, simul pulveratis et adde sensim balsamum ut fiat massa. (Sar.)

℞. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii purif., sing. semunciam.
Myrrhae . . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Storacis Calamita,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Croci . . . sesquidrachmam.
Syrupi Violarum quantum sufficit ut fiat massa pilularis, cujus drachma quaeque opii et hyoscyami, sing. grana octo continet. (*Sp.*)

B*. Br. Pal. et Wir. eandem formulam indicant, sed B*. Myrrhae et Olibani, sing. drachmas duas; — Pm. Cynoglossi, Cinnamomi, Hyoscyami albi, Opii singulorum semunciam, Myrrhae, Olibani, singulorum drachmas sex, Styracis, Caryophyllorum, singulorum drachmas duas, Syrupi Violarum quantum satis; — Br. Pal. et Wir. Succi Cynoglossi et Syrupi Violarum quantitatem aequalem.

℞. Pulv. Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
Pulv. Opii, sing. unciam unam.
— Myrrhae,
— Olibani, sing. sesquiunciam.
— Storacis Calamita,
— Caryophyllorum,
— Cinnamomi, sing. semunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Han.)

2) Mit Bibergeil.

℞. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
Cort. Rad. Cynoglossi uncias duas.
Croci . . . drachmas quinque.
Castorei . . . . drachmas sex.
Syrupi Sacchari drachmas novem.

Fiat massa, cujus quisque scrupulus opii grana duo continet. (His. His3.)

Dieß ist die einzige Formel, welche das Schierlingskraut wegläßt.

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami,
Extr. Opii vinosi, sing. part. quatuor.
Castorei,
Croci, sing. part. unam c. dimid.
Olibani . . . partes quinque.
Myrrhae . . . . . partes sex.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Myrrhae . . . . sesquiunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami nigri,
Opii, singulorum . unciam unam.
Castorei,
Croci, singulorum drachmas tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (Bel.)

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami albi,
Opii purificati, sing. semunciam.
Myrrhae . . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Croci,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Syrupi Violarum,
— Cynoglossi, sing. . . q. s. ut fiat massa pilularis. (Br. Pal. Wir.)

Gal. GalM. *Ca* et *Pie.* eandem indicant formulam, sed loco opii purificati Extractum vinosum et loco syruporum dictorum illum Opii, praeterea Croci et Castorei semidrachmam et pondus pilularum granorum quatuor adhibent; — LH. eandem formulam, sed loco opii Extractum Opii aquosum, Croci, Castorei, singulorum sesquidrachmam et syruporum loco idem Syrupum Opii.

℞. Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Cort. Rad. Cynoglossi semunciam.
Croci,

Castorei, sing. . sesquidrachmam.
Pulverata seorsim commisce, adde
Semin. Hyosc. nigri contus.
semunciam.
et cola totum per cribrum. tum recipe
Opii depurati . . . semunciam.
Aquae destillatae drachmas duas.
Solve blando calore in mortario marmoreo, addendo
Syrupi Opii . . unciam unam.
Admisce pulveres et adde praeterea Syrupi Opii q. s. ut fiat massa bene subigenda. (An.)

Fi. läßt die radix cynoglossi ganz weg, da sie durch Trocknen das narkotische Princip verliere, und substituirt ihr die capita Papaveris auf folgende Weise:

℞. Opii puri,
Capitum Papaveris albi,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi, sing. unciam dimid.
Gummi Myrrhae drachmas sex.
Olibani in lacrymis drach. quinque
Storacis in lacrymis,
Caryophyllorum, sing. drach. duas.
Syrupi Succi Violarum . . q. s. ut fiat massa pilularis.

Diese berühmten Pillen sind als Beruhigungsmittel bei Catarrhen, Blutspeien und Harnstrenge sehr in Gebrauch.

Pilulae ad sputum sanguinis Deckers. (*Fi.*)

℞. Pilul. de Cynoglosso (*Fi.*)
drach. duas.
Laudani Nep. Quercetani, gr. sex.
Croci orientalis scrupulos duos.
Succi Liquiritiae unciam dimidiam.

Succum liquiritiae in aqua destillata calida solutum cum reliquis conjunge, ut fiat massa, in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Gabe, eine bis drei täglich.

Emplastrum contra colicam s. ad tormina ventris. (*Sw.*)

℞. Empl. Diachyli simpl. uncias duas.
Galbani . . . . unciam unam.
Olei ess. Carvi . drachmas duas.
Liquatis adde
Opii . . . . drachmam unam.

Bei Windcolik, Diarrhöe und Ruhr empfohlen.

Emplastrum anodynum. (*Sp.*)

℞. Empl. Diapompholigos unc. unam.
Fuliginis . . scrupulos quatuor.
Opii pulverati drachmam unam.
Ammonii subcarb. scrupulos duos.
Malaxa cum Olei Solani q. s. —

Decker empfahl es bei Krebs.

Emplastrum odontalgicum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastichis, sing. . unciam unam.
Opii . . . . . drachmas duas.
Misce triturando cum
Terebinth. Venet.
drachmis duabus.

Bei Zahn-, Kopfschmerzen und catarrhalischen Ausflüssen empfohlen. Man streicht es mittelst eines erwärmten Spatels auf Taffet und bringt es so auf die Wangen und die Schläfe.

Hierher auch das *Emplastrum ad tempora* B:.

℞. Resinae Anime,
— Carannae,
— Elemi,
Mastichis,
Storacis Calamita,
Succini, sing. . drachmas duas.
Terebinthinae . drachmas tres.
Opii crudi,
Bals. Peruviani, sing.
drach. unam.
Olei Caryophyllorum,
— Succini, sing. . guttas tres.
Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Opii siccati . . unciam unam.
Mastichis,
Sandaracae, singulorum drachmas duas et grana septem.
Sanguinis Draconis semidrachmam.
Pulverata seorsim et commixta humecta cum Olei Rorismarini guttis octo, contunde deinde totum in mortario marmoreo, sensim affundendo Spiritus Cochleariae q. s. ut massa mollis obtineatur.

Auch gehören hierher noch das *Emplastrum cephalicum*, *Emplastrum opiatum*, B. Bel. Bor. Bor4. Han. O Sax. *Sp. Vm.*, deren Zusammensetzung sehr verschieden ist:

℞. Elemi,
Mastichis,
Olibani, sing. . uncias quatuor.
Benzoës . . . . uncias duas.
Terebinthinae . . . uncias sex.
Liquatis in balneo aquae adde
Balsami Peruviani . semunciam.
Opii pulverati . unciam unam.
Misce bene. (B. Bel. Han. O. Sax.)

Bor. Balsamum Peruvianum omittit; — *Vm.* Balsami Peruviani partem unam, Opii duas, Benzoës quatuor, Elemi, Mastichis, Olibani, Terebinthinae, sing. octo; — Bor4. Terebinthinae drachmas tres, Elemi, Olei Olivarum Provincialis, sing. unam, liquatis adde Mastiches, Olibani, sing. pulv. duas,

Benzoës unam, massae homogeneae adde Opii pulv. dimidiam.

℞. Tacamahacae,
Styracis liquidae,
Mastichis,
Carannae, singulorum partes octo.
Balsami Peruviani partes quatuor.
Opii,
Olei Succini rectificati,
singulorum partem unam.

Pulveribus carannae, mastichis et tacamahacae in mortario calefacto mixtis adde subigendo styracem et balsamum, tunc opium et oleum. (*Vm.*)

Vm. praeterea: Opii partem unam, Balsami Peruviani duas, Benzoës, Terebinthinae, sing. tantidem, Elemi, Olibani et Tacamahacae, sing. quatuor; — *Sp.* Tacamahacae, Carannae, Storacis Calamita, Mastichis, sing. unciam unam, Terebinthinae drachmas duas, Opii scrupulos quatuor, Balsami Peruviani semunciam et Olei Succini drachmam.

Unguentum hypnoticum. (Wir.)

℞. Unguenti alabastrini,
— rosati, sing. semunciam.
— populei . uncias duas.
Olei Hyoscyami . . semunciam.
— Juglandis . sesquidrachmam.
Opii in Aqua Ros. sol.
drach. unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Cerae albae . . . semunciam.

Ehedem auf die Schläfe und die Handwurzeln, auf Leinwand geſtrichen, aufgelegt.

Emplastrum regale. (Wir.)

℞. Cerae flavae . . . sesquilibram.
Resinae Pini . . . sem libram.

Liquatis blando igne, liquorem cola et massae paullo refrigeratae adde
Pulv. Tacamahacae,
— Elemi,
— Olibani,
— Sang Draconis, sing unciam.

Adde deinde
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asae foetidae,
Resinae Hederae, sing. unc. unam.
Extracti Opii,
— Croci, sing. drachmas duas.

Solve totum in Aceto Vini, cola exprimendo; calefac ad mellis consistentiam usque et adde, continuè agitando,
Terebinthinae Venetae libram unam.
Gummi Tragacanthae unc as decem.
Castorei . . . . . semunciam.
Ammonii subcarb. sesquiunciam.

Ehedem beſonders bei Oedem empfohlen.

Pulvis Succini s. e Succino compositus, Trochisci Succini s. de Karabe s. de Carabe. (Wir. *Gr. Re.*)

℞. Opii,
Croci,
Myrrhae, singulorum drachmam unam et grana quindecim.
Cornu Cervi usti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
Mastichis,
Laccae,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Balaustiorum,
Semin. Papav. nigri, sing.
drach. duas.
Succini . . . . drachmas sex.

Mucilaginis Psyllii quantum sufficit ut fiat massa in trochiscos dividenda. — Mesue empfahl dieſe Trochiſken bei Blutflüſſen, beſonders bei Blutſpeien und Mutterblutfluß, eben ſo bei Durchfall und übermäßigem Hämorrhoidalfluß. Jede Drachme enthält drei Gran Opium. Jetzt ſind ſie in Vergeſſenheit gekommen.

Gr. Re. Succini praep., Gummi Arab., sing. drachmas decem, Succi Hypocist., Balaust., Terrae Japon., sing. quinque, Olibani semunciam, Opii colati drachmam.

Pilulae antidysentericae. (Lus.)

℞. Opii,
Extracti Catechu,
— Bistortae,
— Angelicae,
— Contrayervae,
— Calami,
— Tormentillae,
— Zedoariae,
— Millefolii,
— Scordii,
— Corticis Granati,
— Rosarum rubrarum,
— Balaustiorum,
— Croci,
— Myrrhae,
— Rhei, sing. drachmas duas.
Olei Nucis mosch. drachmas tres.
— Macidis . drachmam unam.
Bals. Peruv. drach. tres c. dimid.
Olei Juniperi . drachmas duas.

Fiat massa pilularis — Gabe, vier bis acht Gran, drei bis vier Mal täglich, für Erwachſene.

Electuarium mithridaticum, Mithridatium, Confectio s. Antidotus mithrida-

tica Damocratis; Mithridate. (Pal. Sar. Wir. *Re. Sp.*)

℞. Myrrhae electae,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Olibani,
Semin. Thlaspi, sing. unc. decem.
— Dauci . . uncias septem.
— Foeniculi,
— Anisi,
— Petroselini, . singulorum uncias quinque.
— Seselios,
— Hyperici, sing. unc. duas c. dim.
Herb. Schoenanthi . uncias octo.
— Pulegii,
— Scordii, sing. . unc. septem.
Rad. Costi Arabici,
— Gentianae, sing. . unc. octo.
— Calami,
— Asari,
— Valerianae, sing. . unc. tres.
— Mei . unc. duas c. dimid.
Storacis,
Piperis longi, sing. . uncias octo.
— albi . . uncias septem.
Castorei uncias duas cum dimidia.
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Malabathri, singulorum uncias octo.
Carpobalsami . . uncias septem.
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi minoris,
Petal. Rosar. rubr., sing. unc. quinque.
Trochiscor. Cypheos unc. septem.
Pulveratis et mixtis adde
Galbani,
Opopanacis, singulorum uncias octo.
Bdellii . . . . uncias quinque.
Sagapeni . . . . uncias tres.
Dilue in
Vini Hisp. unciis quadraginta octo.
Commisce cum
Mellis unciis octingentis sexaginta antea tritis cum
Opobalsami,
Terebinthinae, sing. . unciis octo.
Misce exacte. (*Sp.*) — Dieſe Formel iſt aus Galen entlehnt.

Re. Cinnamomi uncias tres, Nardi Ind., Zingib., Croci, Seminum Thlaspi, Olibani, Terebinth. Chiae, sing. drachmas decem, Zedoariae, Macidis, Pip. longi, Succi Hypocist., Storacis, Opopanacis, Galbani, Opobals., Castor., sing. unciam, Scordii, Cubebar., Pip. alb., Sem. Dauci, Bdellii, sing. drachm. septem, Nardi Celt, Gent., Dictamni Cret., Rosar. rubr., Petroselini, Cardamomi. Foenic., G. Arab., Opii colat. in Vino dissol., sing. drachm. quinque, Calami arom., Valerianae, Sagapen., Anisi, sing. drachm. tres, Catechu, Hyperici, Scinci sing. uncias duas c. dimid., siccata et pulverata cum Mellis pondere triplo electuarium para.

℞. Rad. Aristolochiae rotundae,
— Valerianae, singularum uncias quatuor cum dimidia.
— Calami . uncias quinque et drachmas tres.
— Gentianae uncias septem cum dimidia.
— Mei uncias tres et drachmas sex.
— Zingiberis . unc. quindecim.
Herbae Dictamni Cretici uncias septem cum dimidia.
— Polii montani,
— Scordii Cretici, sing. unc. decem c. dimid.
Malabathri (Foliorum Indorum) uncias duodecim.
Flor. Hyperici unc. tres c. dimid.
— Stoech. Arab. unc. duodecim.
— Rosarum rubrarum,
Nardi Celticae, singulorum uncias septem cum dimidia.
— Indicae . uncias quindecim.
Schoenanthi . uncias tredecim.
Sem. Thlaspios uncias quindecim.
— Seseleos . uncias duodecim.
— Dauci Cretici uncias decem cum dimidia.
— Petroselini Macedonici,
— Foeniculi, singulorum uncias septem cum dimidia.
— Anisi . unc. quatuor c. dim.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Piperis longi . uncias duodecim.
— albi,
Carpobalsami, singulorum uncias decem cum dimidia.
Cardamomi minoris uncias septem cum dimidia.
Croci . . . uncias quindecim.
Cinnamomi unc. quindecim c. dimid.
Costi Arabicae uncias duodecim.
Cassiae ligneae unc. decem c. dim.
Trochisc. Agarici unc. quindecim.
Castorei . . . uncias duodecim.
Scinci marini unc. tres c. dimid.
Myrrhae electae uncias sedecim.
Olibani . . . uncias quindecim.
Bdellii uncias decem cum dimidia.
Gummi Arab. unc. septem c dim.
Pulverata misce et cribra; tunc in
Vini boni libris octo dissolve
Galbani,

Opopanacis, sing. unc. duodecim.
Sagapeni . unc. quatuor c. dim.
Succi Hypocistidis uncias duodecim.
— Acaciae . uncias quatuor.
Opii electi . unc. septem c. dim.
Solutionem misce cum
Mellis despumati
libris centum et sedecim.
Pulverem sensim, agitando continuè, admisce. Miscellae deinde infunde
Storacis in granis uncias duodecim dissolutas in
Terebinthinae claræ
unciis quatuordecim.
Adde denique
Opobalsami uncias duodecim.
Agita demuo per horas aliquot et in vase amplo fermentationi subjice. (Wir.)

Gr. Cinnam. drach. quatuordecim, Myrrh., Agarici, Nardi Ind., Zingib., Croci, Sem. Thlaspios, Thuris, Terebinth. Chiae, sing. decem, Junci odorati, Costi (vel Zedoar.), Fol. Malabathri (vel Macis), Stoechat., Pip. longi, Sem. Seselios, Succi Hypocist., Styrac. colat., Opopanacis, Galbani colat., Opobals. (vel Ol. Nuc. mosch. expr.), Castor. Russ., sing. unciam, Polii, Scordii, Carpobals., (vel Cubebar.), Pip. albi, Sem. Dauci Cret., Bdellii, sing. drachmas septem, Nardi Celt., Rad. Gent., Fol. Dictamni Cret., Ros. rubr., Sem. Petrosel. Macedon., Cardamom. min., Foenic. dulc., G. Arab., Opii colati (in Vino soluti), sing. quinque, Rad. Calami aromat., Valerian. sylv., Sem. Anisi, Sagapeni, sing. tres, Mei Athamant., Hyperici, Acaciae (vel Terrae Japon.), Ventrium Scincor., sing. duas c. dimid., Mellis pondus Specier. praemonit. triplum.

Bei der folgenden Formel sind die Ingredienzen der Latwerge eben so classificirt wie bei'm Theriak.

1. Classe. Anisi . drach. duas c. dim.
Zingiberis drachmas decem.
Macidis,
Caryophyll., sing.
semunciam.
Gentianae drachmas quinque.
Pondus totius est unc. tres et sesquidrachma.
2. Classe. Scordii Cret. drach. septem.
Nardi Celticae,
Seminum Petroselini, singulorum drachmas quinque.
Piperis longi unciam unam.
Pondus totum uncias tres et drachmam unam aequat.
3. Classe. Polii montani drach. septem.
Sem. Foenic.
drach. quinque.
Valerianae drachmas duas cum dimidia.
Pondus totum unc. unam et drachmas sex c. dimidia aequat.
4. Classe. Cinnamomi drachmas decem.
Zedoariae,
Seseleos, sing. unc. unam.
Rosar. rubr. drach. quinque.
Pondus totum uncias tres et septem drachmas aequat.
5. Classe. Dictamni Cret.
drach. quinque.
Cassiae lignеae,
Cubebarum,
Piperis albi, singulorum
drachmas septem.
Sem. Thlaspios
drach. decem.
Pondus totius quatuor uncias cum dimidia aequat.
6. Classe. Sem. Dauci drach. septem.
Cardamomi minoris
drachmas quinque.
Calami,
Aristolochiae rotundae,
Angelicae,
Hyperici, singulorum drachmas duas cum dimidia.
Pondus totum uncias duas et drachmas sex cum dimidia aequat.

Quaque harum sex miscellarum seorsim pulverata, pulvera seorsim quamque substantiarum sequentium:

Myrrhae,
Olibani,
Agarici,
Croci, sing.
drachmas decem.
Castorei . unciam unam.
Bdellii . drachmas septem.
Scinci marini concisi drachmas duas cum dimidia.
Recipe tunc
Nardi Indicae,
Schoenanthi, sing.
drachmas decem.
Stoechadis Arab.
unc. unam.
Minutim concisa imbibe Mucilagine G. Tragacanthae, tunc sicca et pulvera. Praeterea pulvera
Trochiscorum Cypheos
drachmas septem
vel eorum ingred. proportionem aequalem. Dissolve deinde
Opii,
Gummi Arabici, singulorum
drachmas quinque.
Succi Hypocist. unc. unam.
— Acaciae drachmas duas
cum dimidia
in Vini Cretici q. s.; adde
Mellis despumati triplum

ponderis totius, cum Terebinthinae clarae uncia una triti. Commisce sensim pulveres et adde denique

Storacis . . unciam unam,

in Oleo Nucis moschatae et Vino dissoluti, et fermentationi subjice. (Pal.)

℞. Castorei,
Croci,
Olei Nucis moschatae,
Succini,
Terebinthinae Cypriae,
Galbani,
Myrrhae,
Gummi Arab., sing. sesquiunciam.
Calami aromatici,
Costi Arabici,
Aristolochiae rotundae,
Valerianae,
Zedoariae, sing. unciam unam.
Foliorum Dictamni Cretici,
— Marrubii albi,
— Rutae,
— Serpylli,
— Pulegii,
Florum Junci odorati,
— Chamomillae,
— Polii montani,
— Stoechadis Arabicae,
— Tanaceti,
Seminum Ammi,
— Dauci,
— Cardamomi minoris,
Cubebarum, sing. drach. decem.
Opii electi . . . drachmas sex.
Mellis albi . . . triplum totius.
Vini Maderani quantum sufficit.

Opium in vino dissolutum melli calefacto adde, mixturae oleum nucis mosch. cum terebinthina liquatum tepidum infunde; pulveres cribri ope commisce et denique croco pulverato vino diluto addito, massam fermentationi subjice. (Sar.)

Die Erfindung dieſes Präparats ſchreibt man dem Mithridat, König in Pontus, zu; Pompejus brachte das Recept mit nach Rom und Damocrates beſang es. Es wurde gleich anfangs als giftwidrig, magenſtärkend, ſtärkend, ſchmerzſtillend, mit Einem Worte, als eine Panacee betrachtet. Alle neue Pharmacopöen laſſen es weg. Nach der Formel von Wir. enthält jede Unze drei Gran Opium und vier Gran Safran.

Julapium mithridaticum. (*Sa.*)

℞. Mithridatici . . drachmas duas.
Julapii communis absque saccharo uncias quinque.

Misce.

Theriaca, Electuarium theriacale, Electuarium theriacale magnum s. Opii s. Opii compositum s. aromatico-opiatum s. opiatum s. thebaicum, Theriaca Andromachi, Theriaca Andromachi reformata a Baumé, Confectio Opii, Electuarium opiatum polypharmacon, Philonium Londinense. (Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. Va. Vm.*)

Der Name dieſes Präparats rührt von Nicander her; Andromachus verfertigte es auf Befehl Nero's nach dem ſchon lange vor ihm bekannten Mithridat. Die Formel dazu iſt, nach Galen, folgende:

℞. Rad. Iridis Florentinae,
— Liquirit., sing. unc. duodecim.
— Costi Arabici,
— Rhapontici,
— Quinquefolii majoris, sing. uncias sex.
— Mei,
— Rhei,
— Gentianae, sing. unc. quatuor.
— Aristolochiae uncias duas.
Herbae Scordii uncias duodecim.
— Schoenanthi,
— Marrubii,
— Dictamni Cretici,
— Calaminth., sing. unc. sex.
— Pulegii,
— Ivae,
— Chamaedryos,
Malabathri, sing. uncias quatuor.
Flor. Rosar. rubr. unc. duodecim.
— Stoechadis . . uncias sex.
— Hyperici . uncias quatuor.
— Centaurii min., unc. duas.
Croci . . . . . uncias sex.
Carpobalsami . uncias quatuor.
Cinnamomi . uncias duodecim.
Cassiae ligneae,
Nardi Indicae, sing. uncias sex.
— Celticae . uncias quatuor.
Piperis longi uncias viginti quatuor.
— nigri,
Zingiberis, singulorum uncias sex.
Cardamomi . . uncias quatuor.
Agarici,
Sem. Napi, sing. unc. duodecim.
— Petroselini Maced. unc. sex.
— Anisi,
— Foeniculi,
— Nasturtii,
— Seseleos,
— Thlaspios,
— Amomi,
— Ammi, sing. unc. quatuor.

Sem. Dauci . . . uncias duas.
Opii . . uncias viginti quatuor.
Opobalsami . uncias duodecim.
Myrrhae,
Olibani,
Terebinthinae, sing. uncias sex.
Storacis,
Gummi Arabici,
Sagapeni, sing. . uncias quatuor.
Asphalti,
Opopanacis,
Galbani, singulorum uncias duas.
Succi Acaciae,
— Hypocist., sing. unc. quatuor.
Castorei . . . . uncias duas.
Terrae Lemniae,
Vitrioli calcin., sing. unc. quatuor.
Trochisc. Scillae unc. quadraginta octo.
— Viperarum,
— Hedychroi, sing. unc. viginti quatuor.

Tritura balsama, resinas et gummiresinas in Vini q. s. ut puls spissa obtineatur, quam cum Mellis boni unciis nongentis et sexaginta exacte commisce. (*Sp.*)

Eine andere, noch längere Formel:

1. Classe. Radicis Iridis Illyricae,
Summitatum Scordii Cretici,
Seminum Napi, singulorum sesquiunciam.
— Anisi,
— Seseleos,
Polii Cret., sing. semunciam.
Zedoariae elect. drach. sex.

Pondus totius semilibram et drachmas sex aequat

2. Classe. Radicis Gentianae,
Herbae Chamaedryos,
Sem. Foeniculi Cretici,
— Amomi, sing. semunciam.
Radicis Quinquefolii majoris,
Summitatum Marrubii,
Calaminthae montanae, singularum drachmas sex.

Pondus totius uncias quatuor et drachmas duas aequat.

3. Classe. Radicis Mei vel Angelicae,
— Valerianae,
Nardi Celticae,
Herbae Ivae,
Sem. Thlaspios, sing. semunciam.
Aristoloch. long. drach. duas.
Dictamni Cret. drach. sex.

Pondus totum uncias tres cum dimidia aequat.

4. Classe. Rosarum rubr. sesquiunciam.
Florum Hyperici semunciam.
— Centaurii minoris,
Seminum Dauci Cretici, singulorum drachmas duas.
— Petroselini Macedonici . . drachmas sex.
Trochisc. Viperae unc. tres.
— Scillae . unc. sex.

Pondus totum uncias duodecim et drachmas duas aequat.

5. Classe. Seminum Ammi,
Calami aromatici, sing. semunciam.
Cinnamomi . sesquiunciam.
Cassiae ligneae,
Rhei, sing. . drachmas sex.
Piperis longi . uncias tres.

Pondus totum uncias septem aequat.

6. Classe. Zingiberis albi,
Piperis nigri,
— albi, sing. drach. sex.
Malabathri,
Cubebarum,
Cardamomi, sing. semunciam.

Pondus totius uncias tres et drachmas sex aequat.

Quâque harum miscellarum seorsim pulveratâ, pulverentur
Myrrhae,
Olibani,
Croci orient., sing. drach. sex.
Trochisc. Agarici sesquiuncia.
Castorei,
Bituminis Jud., sing. drach. duae.
Terrae Lemniae,
Chalcitis usti, sing. semuncia.

Minutim concisa imbibantur Mucilagine Gummi Tragacanthae, et siccata pulverentur
Schoenanthi,
Nardi Indicae,
Stoechadis Arabicae, sing. drachmae sex.

Pulverata seorsim commisce cum
Trochiscorum Hedychroi unciis tribus.

Dissolve in Vino Cretico
Gummi Arabici,
Sagapeni, sing. semunciam.
Opopanacis,
Galbani, sing. drachmas duas et solutionem spissam per cribrum sericeum cola. Denique recipe
Terebinthinae Cypricae drachmas sex.
Storacis Calamita drachmas quatuor.

Quo facto omnes sex classes pulve-

rum, pulveres trochiscorum hedychroi et variarum substantiarum seorsim contusarum, exceptis terra lemnia, croco et chalcite, commisceantur. Immitte deinde in lebetem magnum

Mellis despum. et tepidi unc. sex, quas pistilli lignei magni ope in parietibus vasis ita extende ut obtegantur; infunde deinde in lebetem terebinthinam prope ignem fusam cum mellis et Vini Cretici parva quantitate, tunc solutionem gummatum, itidem cum ejusdem Vini pauxillo dilutam et leviter calefactam. Adde deinde

Succi Acaciae . . . semunciam.
— Liquiritiae . sesquiunciam.
— Hypocistidis . semunciam.

Opii Aceti ope purif. uncias tres dissoluta seorsim in Vino Cretico. Misce bene triturando, adde Mellis despum. calidi libras aliquot et adjice lente pulverem, cribri arcte texti ope, subinde mel affundendo et continue agitando, ne grumae formentur; infunde deinde terram lemniam et chalcitem in Vino dilutas cum Olei Nucis mosch. pauxillo, tunc crocum itidem dilutum. Post agitationem mixturam immitte in vas, cujus nonnisi trientes duos vel quadrantes tres impleat, ut fermentationi subjectum volumine augeri posset; agita primum quotidie per hebdomadem, tunc quolibet mense per annum unum, et tunc eo uti incipe. (Pal.)

Man findet dieſelbe Formel bei His. His8., jedoch ohne Angabe der Bereitung und ohne Claſſification der Ingredienzen: Trochisc. scillit. libras quadraginta octo, Viperin., Hedychroi, Pip. longi, Opii electi, sing. viginti quatuor, Rosar. rubr. exungul., Iridis Florent., Succi Glycyrrhizae, Seminis Buniadis, Scordii, Opobalsami s. Bals. veri, Cinnamomi, Agarici, sing. duodecim, Myrrhae, Rad. Costi, Croci, Cassiae lig., Nardi, Schoenanthi, Thuris, Pip. albi, nigri, Dictamni Cret., Prassii albi, Rad. Rhapontici, Stoechados Arab., Petroselini Maced., Calaminthae mont., Terebinthinae opt., Zingib., Penthaphylli, sing. sex, Polii mont., Chamaepithyos, Storacis Calamitae, Mei athamant., Amomi racemosi, Acori veri, Nardi Celt., Carbonatis Aluminae, Rad. Valerianae, Chamaedryos, Malabathri, Sulphatis Ferri albi, Rad. Gentianae, Sem. Anisi, Foeniculi, Ammi, Succi Hypocyst., Acaciae, Carpobalsami, Gummi Arab., Cardamomi min., Seselios Massiliensis, Thlaspios, Hyperici, Sagapeni, sing. quatuor, Rad. Aristolochiae tenuis, Dauci Cret., Bituminis Jud., Opoponacis, Galbani, Centaurii min., Castorei, sing. duas, Mellis optimi triplum, Vini optimi q. s.

℞. Rad. Fraxinellae,
— Scillae praep., sing. libras duas.
— Iridis Florent. libram unam.
— Quinquefolii . uncias sex.
— Calami,
— Valerianae, sing. unc. quinque.
— Rhei,
— Zingib. albi, sing. unc. sex.
— Angelicae,
— Gentianae, sing. unc. quatuor.
— Aristoloch. long. uncias duas.
— Asari . scrupulos sedecim.
Herbae Scordii Cret. libr. unam.
— Dictamni Cretici uncias sex.
— Chamaedryos unc. quatuor.
— Marrubii albi,
— Calaminthae montanae, sing. uncias sex.
— Polii Cretici,
— Ivae, sing. uncias quatuor.
— Centaurii min. uncias duas.
— Majoranae,
— Mari, sing. scrup. sedecim.
Malabathri . . uncias quinque.
Flor. Rosarum rubr. libram unam.
— Stoechadis Arab. uncias sex.
— Hyperici . uncias quatuor.
Seminum Napi . libram unam.
— Cardamomi . uncias octo.
— Petrosel. Maced. unc. sex.
— Anisi,
— Foeniculi Cretici,
— Ammi,
— Seselios,
— Thlaspios, sing. unc. quatuor.
— Dauci Cretici uncias duas.
Schoenanthi . . uncias septem.
Nardi Indicae . . uncias octo.
— Celticae . uncias quatuor.
Piperis longi . . . libras duas.
— albi,
— nigri, sing. . . uncias sex.
Cardamomi minoris,
Carpobalsami vel Cubebarum singulorum uncias quatuor.
Cinnamomi . . . uncias octo.
Costi Arabici . . uncias septem.
Ligni Aloës vel Xylobalsami unciam unam.
— Aspalati scrupulos sedecim.
Trochiscor. Agarici libram unam.
Myrrhae electae . uncias octo.
Olibani electi . . . uncias sex.
Mastichis . . . scrupulos octo.
Gummi Arabici uncias quatuor.
Bituminis Judaici . uncias duas.
Terrae Lemniae uncias quatuor.

Castorei . . . . uncias duas.
Viperarum Italicarum libras duas.
Pulveratis simul omnibus his substantiis, schoenantho et nardo indica minutim concisis et cum gummi arabico in Aqua dissoluto contusis, et lente desiccatis. pulvis cum priori commisceatur. Pulveri rosarum rubrarum reposito et in vino diluto adde
Chalcitis vel Vitrioli ad alborem usque calcinati uncias quatuor.
Croci Austriaci pulv. uncias octo.
Praeterea in Vini Maderani q. s.
Opii . . . . . libras duas.
Succi Liquiritiae . libram unam.
— Hypocistidis,
— Acaciae,
Sagapeni, sing. . uncias quatuor.
Galbani . . . . uncias duas.
Solutionibus colatis adde
Mell. desp. libr. centum sexaginta.
Pultem vinosam cum rosis, croco et chalcite paratam adde et tunc pulverem cribri ope admisce. Adde
Storacis in granis uncias quatuor, solutae in
Terebinthinae clarae unciis sex,
Opobalsami, vel hoc deficiente,
Olei Nucis moschatae
unciis tredecim.
Dissolutas agita per horam ut mixtura fiat perfecta et in vase magno, pluries per mensem agitando, fermentationi subjice. (Br. Wir.)

Außer dieſen beiden Claſſificationen der Ingredienzen, von denen die eine auf die Gleichheit des Gewichts, die andere auf die Aehnlichkeit des Urſprungs gegründet iſt, findet man noch bei Gal. eine, auf Aehnlichkeit der Natur und der Eigenſchaften gegründete, welche dreizehn Abtheilungen begreift, nämlich:

1. Claſſe. Scharfe Subſtanzen.

Pulpae Scillae praep. uncias tres, drach. quatuor et grana sexaginta.
Radic's Asari grana octoginta octo.
Agarici albi,
Semin. Napi sylvest., sing.
sesquiunciam.
— Thlaspios . . semunciam.

2. Claſſe. Bittere Subſtanzen.

Myrrhae . . . . unciam unam.
Summit. Centaurii min.
drach. duas.
Radicis Gentianae . semunciam.
— Rhei . . . drachmas sex.
Herbae Scordii . sesquiunciam.
— Chamaedryos,
— Ivae,
Summit. Hyperici, sing.
semunciam.

3. Claſſe. Abſtringirende Subſtanzen.

Petal. Rosar. rubr. sesquiunciam.
Radicis Quinquefolii drachmas sex.
Succi Hypocistidis,
Succi Acaciae,
Chalcitis calcin. sing. semunciam.

4 Claſſe. Ausländiſche Gewürze.

Cinnamomi unc duas c. dimidia.
Cassiae ligneae . unciam unam.
Zingiberis . . . drachmas sex.
Piperis longi . . . uncias tres.
— nigri . . . . uncias sex.
Amomi racemosi unciam unam.
Cardamomi . . . . semunciam.
Malabathri . . . drachmas sex.
Schoenanthi drach. quatuordecim.
Nardi Indicae . . unciam unam.
— Celticae. . . semunciam.
Costi Arabici . drachmas septem.
Acori veri . drachmas quinque.
Ligni Aloës grana octoginta octo.

5. Claſſe. Inländiſche Gewürze.

Croci . . . . . unciam unam.
Corticis siccati Citri,
Calamintae montanae,
Dictamni Cretici,
Stoechad's Arabicae,
Marrubii albi, sing. drachmas sex.
Polii montani . . . semunciam.
Mari,
Majoranae, sing. grana octoginta octo.
Iridis Florentinae . sesquiunciam.

6. Claſſe. Gewürze aus Doldenpflanzen.

Seminum Petroselini Macedonici,
— Ammi,
— Foeniculi,
— Anisi,
— Seselios,
Radicis Mei, sing. . semunciam.
Semin. Dauci Cret.
drachmas duas.

7. Claſſe. Harze und Balſame.

Xylobalsami . drachmam unam.
Carpobalsami . . . semunciam.
Opobalsami drachmas quindecim.
Olibani,
Terebinth. Chiae, sing.
drachmas sex.
Mastichis grana viginti quatuor.
Bituminis Judaici drachmas duas.
Storacis Calamita . semunciam.

8. Claſſe Uebelriechende Subſtanzen.

Rad. Valerianae majoris
drachm. quinque.

Rad. Aristolochiae tenuis,
Galbani,
Opopanacis, sing. . drachm. duas.
Sagapeni . . . . semunciam.
Castorei . . . drachmas duas.

9. Classe. Giftige Subſtanz.

Opii . . . . . uncias tres.

10. Classe. Wirkungsloſe Erde.

Terrae Lemniae drachm. quatuor.

11. Classe. Schleimharz, Satzmehl ꝛc.

G. Senegalensis . drach. quatuor.
Micae Panis triticei drachmas quinque et grana quinquaginta.
Farinae Orobi uncias duas, drachmas tres et grana quindecim.
Carnis Viperarum . uncias duas. drach. duas et grana viginti.

12. Classe. Süße Subſtanzen.

Succi Liquiritiae .. sesquiunciam.
Mellis Narbonn. lib. decem cum dimidia.

13. Classe.

Vini Hispan. lib. duas c. dimidia.

Vinum in tres partes divide in cujus una mel, in altera opium et in tertia denique gummata et succi solvantur; liquores tres seorsim colatos commisce, adde colcothar, deinde balsama et denique pulveres et massam per annum in vase clauso fermentationi subjice. (Gal.)

Das Opium bildet ungefähr den acht und achtzigſten Theil der Geſammtmaſſe, und etwas weniger, als ein Gran auf die Drachme beträgt.

℞. Aristolochiae longae,
Bituminis Judaici,
Castorei,
Galbani,
Opopanacis,
Centaurii minoris,
Semin. Dauci sylv., sing. partem unam.
Amomi racemosi,
Carpobalsami,
Corticis Citri,
Gummi Arabici,
Foliorum Chamaedryos,
— Ivae,
— Malabathri,
— Pulegii montani,
Florum Hyperici,
Nardi Celticae,
Calami,
Radicis Gentianae,
— Mei,
— Valerianae,
Sagapeni,
Seminum Ammi,
Seminum Anisi,
— Cardamomi minoris,
— Foeniculi,
— Seselios,
— Thlaspios,
Storacis Calamita,
Succi Acaciae,
— Hypocistidis,
Ferri sulph. ad alborem calcin.,
Terrae Lemniae, sing. part. duas.
Calamintae montanae,
Cassiae ligneae,
Costi Arabici,
Dictamni Cretici,
Foliorum Marrubii,
Zingiberis,
Myrrhae,
Nardi Indicae,
Olibani,
Piperis nigri,
Radicis Quinquefolii,
— Rhapontici,
Croci,
Seminum Petroselini Macedonici,
Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Terebinthinae, sing. . partes tres.
Agarici,
Balsami Meccaënsis,
Cinnamomi,
Foliorum Scordii,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Iridis Florentinae,
Scillae,
Seminum Erucae,
Succi Liquirit., sing. . partes sex.
Seminum Orobi . partes novem.
Specier. Trochisc. Hedychroi,
Opii,
Piperis longi, sing. part. duodecim.
Mellis albi partes sexcentas septuaginta duas.
Vini Malacensis quantum sufficit.

Dissolve opium, succos acaciae, hypocistidis et liquiritiae in vini quantitate necessaria; galbanum, opopanacem et sagapenum primo sola deinde cum gummi vini ope in mucilaginem redacto et tunc cum opobalsamo et terebinthina in emulsionem redige; reliquas substantias pulveratas et cribratas exacte commisce, adde mel et emulsionem et cum vini q. s. electuarium forma. (*Vm.*)

Gr. Trochisc. Scill. semilibram, Pip. long., Op. colat., Viper. sicc., sing. unc. tres, Cinnam., Opobals. (vel Ol. Nuc. mosch. express.), sing. duas, Agarici, Irid. Flor., Herb. Scord., Flor. Ros. rubr., Sem. Napi, Extr. Glycyrrh, sing. sesquiunciam, Nardi Ind., Croci, Amomi, Myrrh, Costi (vel Zedoar.),

Junci odorat., sing. unam, Rad. Pentaphyll., Rhei, Zingib., Fol. Malabath. (vel Macis), Dictam. Cret., Marrub., Calaminth., Stoech., Pip. nig., Sem. Petroselin. Maced., Olibani, Terebinth. Chiae, Rad. Valer. sylv., sing. drachm. sex, Rad. Gent., Nardi Celt., Mei athamant., Fol. Polii, Hyperic., Chamaepit., Summit. et Sem. Chamaedryos, Carpobals. (vel. Cubebar.), Sem. Anisi, Foenic. dulc, Cardam. min., Ammeos, Seselios, Thlaspios, Succi Hypocist., Acaciae (vel Catechu), Gummi Arab., Styrac. colat., Sagapen. col., Terr. Lemn. (vel Boli Armen. vel Gall.), Vitriol. virid. calcin, sing. semunciam, Rad. Aristoloch. ten. (vel long.), Summit. Centaur. min., Semin. Dauci Cret., Opopan., Galb. col., Castor. Russ., Bitum. Judaic. (vel Succin. alb.), Rad. Calam. arom., sing. drachm. duas, Mellis specier. harum pond. triplum. — Praeterea: Pip. longi, Cass. lign., sing. uncias duas, Croci, Zingib., G. Thuris, Semin Anisi, Cardamom. min., G. Storac., Sal. Mart., G. Myrrh., Cubeb., Sem. Foenic. dulc., Boli Arm., sing. unc. unam, Fol. Scord., Castor., Calam. arom., singulorum unciam et drachm. quatuor, Succ. Hispan. unc. tres, G. Arab. quatuor, Opopon., Galb., sing. drach. quatuor, Mellis libras sex; — vel: Opii drachmas duas, Pimentae uncias quatuor, Rhei unam, Zingib. duas, Gentian., Anis., Foenic. dulc., sing. octo, Vitr. virid. calcin. drachm. quatuor, Ol. Lauri unam, Mellis q. s. — vel: Extr. Baccar. Junip. unc. quatuor, Myrrh. in Vino Hisp. solut., Rad. Angelic., Helen., Aristoloch. rot., sing. duas, Syr. Cort. Aur. et Papav. alb., sing. octo.

℞. Pulp. Scillae praep. sesquilibram
Terebinthinae Cypricae,
Olei Nucis moschatae,
Succi Liquiritiae,
Opii,
Viperae sicc., singulorum uncias novem.
Cinnamomi,
Myrrhae, singulorum uncias octo.
Balaustiorum,
Benzoës electi,
Croci,
Gummi Arabici,
Olibani, . singulorum uncias sex.
Angelicae,
Dictamni albi,
Costi Arabicae,
Contrayervae,
Serpentariae Virginicae,
Iridis Florentinae,
Gentianae,
Valerianae,
Calaminthae montanae,
Ivae,
Polii montani,
Scordii, sing. . uncias quinque.
Baccarum Lauri,
Cardamomi minoris,
Semin. Citri,
— Petroselini Macedonici,
— Seselios, sing. unc. quatuor.
Vitrioli vir. ad albor. calcinati drachmas decem.
Nardi Indicae,
Castorei, singulorum uncias duas.
Mellis albi . . . triplum totius.
Vini Maderani quantum sufficit.

Pulvera quae possunt et pulverem per cribrum trajice; opio in vino soluto, solutionem cola et eam sensim cum oleo nucis moschatae et terebinthina simul liquatis melli blando igne liquato infunde et tunc pulverem admisce. (Sar.)

℞. Scillae pulveratae,
Iridis,
Scordii, singulorum uncias sex.
Radicis Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Myrrhae in lacrymis,
Radicis Gentianae,
Amomi,
Opii, singulorum . uncias novem.
Spicae Nardi,
Calami, singulorum sesquilibram.
Croci uncias duas et drachmas duas.
Rad. Valerianae unc. tres et drach. sex.
Piperis longi unc. quatuor c dim.
Cinnamomi . . . sesquiunciam.
Seminum Anisi . . uncias octo.
Castorei.
Galbani, sing. . drachmas tres.
Bituminis Judaici . uncias tres.
Storacis in lacrymis,
Sagapeni, sing. . drachmas sex.
Vitrioli Ferri ad siccum calcinati uncias duas.
Mellis despum. libr. quinquaginta.

Mellis adhuc calidi parti unae duas specierum pulveratarum, continue agitando, ad perfectam conjunctionem usque admisce et deinde opium in vino dissolutum adde et sic porro. (*Fi.*)

℞. Rad. Scillae siccatae part. quatuordecim.
— Iridis Florent. . partes sex.
— Zingiberis part. viginti duas.
— Gentianae partes undecim.
— Calami part. viginti quatuor.
— Valerianae,
— Rhapontici, sing. part. tres.

Cinnamomi partes quatuordecim.
Dictamni Cretici partes octodecim.
Scordii . . . . . partes octo.
Petal. Rosar. rubr. part. duodecim.
Croci . . . . partes quatuor.
Semin. Anisi part. quatuordecim.
Gummi Senegalensis partes viginti.
Olibani . . . . . partes tres.
Terebinthinae . . . partes sex.
Galbani . . . partes quatuor.
Balsami Peruviani liquidi,
Opii purificati,
Succi Liquiritiae, sing. partes sex.
Agarici albi partes quatuordecim.
Ferri sulphurici . . partes tres.
Castorei . . . . partem unam.
Mellis Narbonnensis partes sexcentas quinquaginta sex.
Vini Hispanici partes centum quinquaginta octo.

Pulverata solida misce, vinum in tres partes divide, in quarum prima mel blando calore liqua, in secunda balsamum et terebinthinam, in tertia opium dilue; liquores ambos postremos misce et cum Syrupo Mellis per panum colato commixtis adde sensim, continue agitando, pulverem. (GalM.)

℞. Scillae siccatae uncias quatuor.
Iridis Florentinae . semunciam.
Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Nardi Indicae,
Stoechadis Arabicae,
Croci,
Myrrhae,
Gentianae,
Calami,
Mei,
Valerianae,
Nardi Celticae,
Amomi racemosi, sing. drach. sex.
Piperis longi . . . uncias tres.
Scordii . . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . . . unciam unam.
Schoenanthi . sesquidrachmam.
Foeniculi . . . . sesquiunciam.
Opii . . . drachmas undecim.
Castorei . . . drachmas duas.
Storacis . . . . . semunciam.
Balsami Meccaënsis uncias duas.
Sagapeni . . . . . semunciam.
Galbani . . . . drachmas duas.
Vini Hispanici . quantum sufficit.
Mellis albi . . . libras quatuor.

Dissolve opium in vino et mel in hujus liquoris libra una; reliquas substantias pulvera; balsamum, sagapenum et galbanum in balneo aquae liquata dilue in vino mellito et opiato, et admisce pulveres (An.)

Pm. eadem fere ingredientia, eadem tamen differentia ut a Zingibere usque ad Amomum scrupuli sex, Schoenanthi, Foeniculi, sing. sesquiunciam, Opii, Castorei, Galbani totidem scrupuli quam antea drachmae, Mellis vero libras quinque cum dimidia indicentur.

℞. Rad. Zingiberis,
— Iridis Florentinae,
— Nardi Indicae,
— — Celticae,
— Calami,
— Gentianae, sing. drachm. sex.
— Valerianae . unciam unam.
— Scillae . . . uncias tres.
Fol. Dictamni Cret. drachmas sex.
— Calaminthae,
— Marrubii,
— Scordii, sing. . uncias tres.
Semin. Anisi,
— Foeniculi, sing. unc. unam.
— Cardamomi min. drach. sex.
Piperis longi,
Succi Liquiritiae,
Cinnamomi,
Bituminis Judaici,
Opii, singulorum . uncias duas.
Storacis in granis,
Sagapeni,
Galbani, sing. . drachmas tres.
Castorei . . . sesquidrachmam.

Pulvera omnes has substantias et in sartagine stannea lente liqua
Terebinthinae Cypricae uncias sex.

Adde sensim Mellis despumati tepidi q. s. ut uncia quaeque pulveris duas cum dimidia, qui gradatim addendus est, contineat, tunc adde mixturam tepidam dies duos antea praeparatam cum
Gummi Arabici,
Vitrioli viridis in Aqua soluti,
Rosarum rubrarum,
Gallarum, sing. . . sesquiuncia.
Vini Hispanici . . . unciis sex.

Agita electuarium per dies circiter sex. (*Br.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Contrayervae,
— Gentianae,
Foliorum Scordii,
Florum Chamomillae,
Cinnamomi electi,
Piperis,
Baccarum Juniperi,
Corticis Aurantii,
Seminum Anisi,
Myrrhae, sing. . . libram unam.
Chinae . . . . libras quatuor.
Croci,
Ferri sulphurici ad alborem calcinati, singulorum libram unam.
Opii . . . . . libras duas.
Mellis Sambuci . . . libras sex.

Mellis electi
libras quadraginta octo.
Melli cum Vini generosi q. s. despumato adde mel sambuci, crocum et vitriolum, tunc opium in vino dissolutum et denique reliqua pulverata. (His. His3.) — Jede Drachme enthält zwei Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . uncias sex.
— Serpentariae Virginicae,
— Valerianae,
— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae), singulorum uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum . unciam unam.
Mellis despumati . . libras sex.
Melli leviter calefacto adde opium in Vini Malacensis q. s. solutum et tunc reliqua pulverata (B*. Bor. GalF. Han. HassP. O. Pol.) — Jede Unze enthält ungefähr fünf Gran Opium.
Bor4. Crocum omittit.

℞. Serpentariae Virginicae,
Contrayervae, sing. uncias sex.
Angelicae,
Valerianae,
Calami aromatici,
Gentianae,
Zedoariae, sing. . uncias quatuor.
Cardamomi,
Myrrhae,
Macidis, singulorum uncias duas.
Opii in Vino Hispanico dissoluti drachmas novemdecim.
Roob Sambuci uncias octoginta.
— Juniperi uncias quadraginta.
Syrupi Sacchari . . libras duas.
Misce bene. (R.)

℞. Rad. Angelicae . . uncias sex.
— Serpentariae Virg., uncias quatuor.
— Scillae,
— Valerianae majoris,
Cinnamomi, sing. . uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum unciam unam.
Mellis despumati . . libras sex.
Melli parumper calefacto adde opium in Vino Hispanico dissolutum et tunc reliquas substantias pulveratas. (D.) — Jede Unze enthält etwa fünf Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . uncias octo.
— Gentianae . . uncias sex.
Radicis Valerianae . uncias tres.
— Zedoariae,
Cardamomi min., sing. unc duas.
Croci,
Succi Liquiritiae,
Myrrhae,
Opii, singulorum unciam unam.
Mellis uncias septuaginta quinque.
Dissolve succum, myrrham et opium in Vino Hispanico, solutionem cum melle calefac et adde, agitando continue, pulveres. (Fer. Suec. *Gr. Sw.*)

℞. Rad. Angelicae . . partes sex.
— Serpentariae Virg. part. quatuor.
— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum, sing. part. unam.
Commisce intime cum
Mellis despumati partibus duodecim et quo momento praescribitur, unciae cuique adde
Tincturae thebaicae semidrachmam.
Misce bene. (Sax.)

℞. Opii sicci et pulv. partem unam.
Vini generosi . partes quatuor.
Macera per duos dies in vase clauso, tunc adde
Mellis desp. part. septuaginta duas.
Misce bene et adde, continue agitando, pulverem ex
Myrrhae,
Croci,
Protosulphat. Ferri, sing. parte una.
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Rad. Valerianae,
— Zingib., sing. partib. duabus.
— Angelicae,
— Gentianae, sing. partib. sex.
Serva. (Ba.)

℞. Pulveris aromatici (Fabae Pichurim, Cardamomi minoris, Cinnamomi, singulorum pars una) uncias sex.
— Serpentar. Virg , uncias tres.
Opii in Vino dissoluti drachmas tres.
Mellis despumati quantum sufficit.
Misce bene. (Lus.)
LH. Pulveris aromatici (LH.) sesquiunciam, Opii in Vino dissoluti drachmas tres, Rob Sambuci uncias septem cum dimidia, Mellis quantum sufficit.

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Zingiberis, sing. . uncias duas.
Rad. Serpentar Virg. . unc. tres.
Opii in Vino Hisp. sol. drach. tres.

Digitized by Google

Mellis despumati pondus pulverum triplum. Misce. (Wir.)

℞. Opii pulverati . drachmas sex.
Piperis longi . . unciam unam.
Zingiberis . . . . uncias duas.
Carvi . . . . . uncias tres.
Syrupi Sacchari octarium unum.

Tritura opium cum syrupo calido et admisce pulveres. (B⁹. Lon. *Gr. Va.*)

LonN. *Gr. Re.* Tragacanthae contritae drachmas duas addunt.

Gr. Opii puri duri drachm. sex, Pip. longi, Zingib., Semin. Carvi, sing. uncias duas, Syr. Papav. albi ad mellis consist. decoct. uncias viginti et drachmas duas (*Confectio opiata*); Piper album et Opium colatum sumendo, immutata tamen quantitate, *Philonium Londinense* obtinetur.

℞. Pulveris aromatici (e Cinnamomi part. duabus, Cardamomi min., Zingib., Pip. longi, sing. una.) uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii puri in Vino Hispanico dissoluti . . . . . drachmas tres.

Mellis despumati pondus pulverum triplum. Misce. (Gen.)

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Cardamomi min. et Zing., sing. part. aeq.) uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii in Vino Hisp. sol. semunciam.
Syrupi Zingiberis . libram unam.

Misce bene. (Ed *C.*)

B. et Bel. eandem formulam, sed loco syrupi Mel despumatum indicant.

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Nucis mosch., Cardamomi min. et Zingib., sing. part. aeq.) uncias sex.
Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii in Vino Hisp. sol. drach. tres.
Mellis despum. unc. viginti octo.

Melle et opio commixtis adde pulveres. (Ams.)

℞. Roob Sambuci . . uncias sex.
Opii puri in Vino soluti drachmas tres.
Pulveris aromatici,
Extracti Liquiritiae, singulorum sesquiunciam.

Mellis despumati quantum sufficit ut fiat electuarium mediae consist.

Der Theriak stand lange Zeit als eins der wichtigsten Arzneimittel in Ansehen, und wurde daher jedesmal unter besondern Feierlichkeiten und unter Aufsicht der Behörden bereitet. Heutzutage hat jeder Apotheker das Recht, ihn zu verfertigen, doch wird der mit Opium bereitete nur verabfolgt, wenn er von einem Arzte verordnet ist; im Gegentheil giebt der Apotheker nur eine analoge, aber ohne Opium bereitete Mischung.

Gabe, von einem Scrupel bis zu zwei und drei Drachmen, allein oder in Wein.

Extractum theriacale. (Sa.)

℞ Theriacae . . . quantum vis.
Alcoholis . . . quantum sufficit ut theriaca digitorum trium crassitiem tegatur; digere per dies tres, decantha alcoholem, exprime, liquores ambos commisce et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Nach Guilbert entzieht der Alcohol dem Theriak flüchtiges Oel, Harz, Terpentin, Balsam und ein grünes Oel. Diese Analyse ist offenbar sehr unvollständig.

Aqua theriacalis simplex. (Fer. *Pr.*)

℞. Theriacae . . . unciam unam.
Dilue in
Aquae purae . . libris quatuor.

Destillando leni calore libras tres liquidi abstrahe. (*Br.*)

Fer. Theriacae unciam et Succi Omphacii libras quatuor; destillent librae tres.

Gilt als giftwidrig, magenstärkend, Blähungen und Würmer treibend; besonders bei Wurmkrankheiten der Kinder, löffelweise, allein oder mit andern Zusammensetzungen.

Aqua theriacalis Romana s. Scordii composita s. theriacalis frigida. (Pal. Sar.)

℞. Theriacae Andromachi semilibram.
Succi Galegae,
— Acetosae,
— Scordii,
— Citri, singulorum libras sex.

Post horas 24 digestionis destillent. (Pal.)

Sar. Aquae Scordii libras quatuor, Succi Acetosae duas, Succi Galegae tantidem, Succi Limonum unam cum dimidia et Theriacae uncias quatuor cum dimidia.

Gebrauch wie bei'm vorigen.

Aqua theriacalis composita. (Wir. *Fi. T.*)

℞. Theriacae Andromachi semilibram.
Rad. Angelicae,
— Valerianae,
— Carlinae,
— Imperatoriae,
— Zedoariae, sing. unc. unam.
Herbae Scordii,
— Rutae, sing. . sesquiunciam.
Corticis recentis Citri uncias duas.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Aquae purae . . libras decem.

Destillando libras sex elice. — Dieses Wasser unterscheidet sich von dem zu-

sammengesetzten Angelikgeist nur durch die Abwesenheit des Alcohol.

℞. Foliorum recentium Rutae,
Dictamni Cretici,
Scordii,
Corticum recentium Aurantii,
Limonum,
Radicum Contrayervae,
Zedoariae,
Calami,
Galangae, singulorum semunciam.
Alcoholis 36° B. libras quatuor cum
Aquae pluvialis vel destillatae pondere aequali diluti.
Theriacae uncias octo in Succi Limonum pondere aequali dilutae.

Post horas 24 vel 30 macerationis in balneo aquae salito libras 6 destillando abstrahe. (*T*) — Gabe, eine Drachme bis halbe Unze in einem passenden Vehikel als blähungs-, wurmtreibend ꝛc.

Fl. Rutae, Dictamni, Scordii, Rad. Angelicae, Imperatoriae, sing. unciam unam, Contrayervae, Zedoariae, sing. semunciam, Cort. rec. Citri unam, Bacc. Juniperi quatuor, Alcoholis 25° libras duas, Succi Limonum unam, Aquae communis octo, Theriacae uncias quatuor. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spiritus theriacalis. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Theriacae Androm. unc quatuor.
Vini albi . . . uncias sexaginta.

Post sufficientem digestionem destillent unciae triginta. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Alcoholis concentr. uncias decem.
Theriacae Andr. . uncias quinque.
Myrrhae rubrae unc. duas c. dim.
Croci . . . . . semunciam.

Post septem dies digestionis destillent in balneo aquae; adde, si necesse est, Camphorae drachmas duas. (Pal.)

Dieses Präparat unterscheidet sich von dem zusammengesetzten Angelikgeist fast gar nicht.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (Br Sar. Wir. *Gr. Re. Vm.*)

℞. Theriacae . . . partem unam.
Aquae Vitae . . . partes tres.

Post aliquot dies infusionis filtra. (*Vm.*)

Sar. Theriacae partem unam et sex Aquae Vitae.

℞. Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
Radicis Angelicae,
— Calami,
— Serpentariae Virginicae,
Nardi Indicae, sing. . drach. tres.
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Caryophyll., sing. . sesquidrach.
Opii,
Croci, sing. . drachmam unam.
Aquae Vitae . . libram unam.

Infunde frigide per plures dies et filtra. (Br. Wir. *Vm.*)

Gr. Re. Electuarii mithridatici, Theriacae, sing. partem unam, Acidi acetici, Spiritus Vini rect., sing. quatuor; — *Gr.* Aquae theriacalis congios duos, Syrupi Croci libras quatuor.

Reizend, magenstärkend. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen. Eine Unze dieser Tinctur enthält fast fünf Gran Opium.

Emplastrum stomachicum. (*Sw.*)

℞. Theriacae Andr. unc. unam ad duas.
Olei Nucis mosch. drachmas duas.

Mixta supra pellem extende, cujus margo emplastro adhaesivo oblitus est.

Bei Magenkrampf und sogenannter Krampfcolik empfohlen.

Scutum stomachicum s. antispasmodicum. (*Pie. Sw.*)

℞. Theriacae . . . . uncias duas
Pulveris Mais, sing. . . . q. s.
Opii . . . . . grana tria.
Camphorae . . . . grana duo.

Misce. (*Pie.*) — Fouquet empfahl es bei Colik, chronischem Erbrechen und krampfhaften Magenbeschwerden

℞. Theriacae . . . uncias duas.
Nucis mosch. pulv. drachmas duas.

Misce. — Gleich dem vorhergehenden Magenpflaster angewendet. (*Sw.*)

Emplastrum antihaemorrhoidale. (*Pie. Sm.*)

℞. Opii . . . . . grana decem.
Theriacae . . . drachmas duas.

Misce. (*Pie.*)

Sw. Theriacae drachmas sex et Opii grana quatuor ad sex.

Man wendet dieses Pflaster auf den Nabel an; Valsalva soll es mit dem glücklichsten Erfolg gegen übermäßigen Hämorrhoidalfluß benutzt haben.

Topicum antispasmodicum et tonicum. (*Pie.*)

℞. Theriacae . . . drachmas duas.
Opii,
Camphorae, singulorum grana sex.

Auf die Oberbauchgegend anzuwenden.

Cataplasma Fermenti Panis theriacale s. theriacale s. ad singultum. (His. His3. *Sw.*)

℞. Fermenti Panis . . uncias tres.
Theriacae . . . . semunciam.
Pulv. Juniperi,
— Rosarum rubrarum,

Pulv. Foliorum Menthae,
singulorum drachmas duas.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
— Macidis, sing. drach. unam.
Aceti rosati . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (His. His3.)

℞. Theriacae . . . . uncias duas.
Anisi viridis pulv. drachmas duas.
Olei Caryophyllorum guttas octo.
Aquae Vitae camphoratae . q. s. ad diluendum et cataplasmatis consistentiam praebendum. (*Sm.*)

Das erſtere dieſer beiden Cataplasmen wurde als Mittel gegen Schluchzen auf den Magen anzuwenden empfohlen. Das zweite rühmte Zimmermann gegen clavus hystericus.

Opiatum dysentericum. (*Sp.*)

℞. Theriacae Andromachi,
Diascordii, singulorum uncias duas.
Pulv. Gummi Arab. . semunciam.
Boli Armenae . . . uncias tres.
Misce sedulo.
Addendo Balsami Locatelli uncias duas, *Opiatum dysentericum balsamicum* obtinetur.

Das erſtere iſt bei einfacher, das letztere bei geſchwüriger Ruhr empfohlen worden.

Electuarium adstringens. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Theriacae,
Diascordii, sing. . unciam unam.
Aquae dest. Angelicae,
— — Valerianae,
— — Menthae, sing. drachmam.
G. Tragacanthae semidrachmam.
Syrupi Chinii sulphurici . q. s.

Adſtringirend, von Bally bei Ruhr und chroniſcher Diarrhöe geprieſen. — Gabe, eine Drachme zwei oder drei Mal täglich, in Auflöſung oder mit einem Löffel Waſſer oder Bordeauxwein verdünnt. (*Ca. Pie.*)

℞. Balsami Locatelli,
Conservae Rosarum,
Theriacae,
Seminum frigid., sing. unc. unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle vier Stunden, in einem Glaſe Schaafgarbenthee. (*Bo.*)

Mixtura theriacalis. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Theriacae . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Löffelweiſe.

Potio cordialis. (*Bo. Ra.*)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Infusi Melissae . uncias septem.
Tinct. Cinnamomi drachmas duas.
Syrupi Dianthi . unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Aquae Artemisiae,
— Matricariae,
— Flor. Aurant., sing unc. duas.
Cinnamomi hord. semunc.
Theriacae,
Confect. hyacinthinae,
— Alkermes, sing. scrupulum.
Trochisc. Myrrhae grana viginti quinque.
Macidis pulverati grana quindecim.
Elixir Proprietatis guttas triginta.
Misce bene. (*Bo.*)
Löffelweiſe.

Potio tonica. (*Pie.*)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Aquae Florum Aurantiorum,
— vel Vini, sing. . unc. unam.

Auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (*Pie.*)

℞. Theriacae . . drachmam unam.
Syr. Capit. Papav. drachmas sex.
Liquoris Hoffmanni,
Tinct. Succini, sing. guttas viginti.
Aquae Florum Aurantiorum,
— Matricariae,
— Rutae, sing. . uncias duas.
Löffelweiſe.

Tryphera magna. (*Sp.*)

℞. Opii . . . . . uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangae,
Nardi Indicae,
Zingiberis,
Costi Arabici,
Storacis,
Calami,
Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae,
— nostratis,
Peucedani,
Mandragorae,
Lavandulae,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Opii,
Foeniculi,
Petroselini Macedonici,
Dauci,
Basilici, singulorum unciam unam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Pulverata cum melle intime commisce.

Eine ſchmerzſtillende, von Galen angezeigte Latwerge, welche ſich nur wenig vom Theriak unterſcheidet.

Orvietantum. (Wir.)

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— — rotundae,
— Angelicae,
— Bistortae,
— Carlinae,
— Contrayervae,
— Fraxinellae,
— Gentianae,
— Imperatoriae,
— Quinquefolii,
— Serpentariae Virginicae,
— Tormentillae,
— Valerianae,
— Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
— Pulegii,
— Rutae,
— Sabinae,
— Scordii,
— Scabiosae,
Florum Hyperici,
Cort. Aurantiorum,
— Citri,
— Cinnamomi, sing unciam unam.
Viperae siccatae . . uncias duas.
Pulverata commisce cum
Roob Juniperi,
Mellis desp., sing. libris tribus.
Bene mixtis adde
Theriacae Andromachi,
Mithridatici, sing. . uncias duas.
Olei essentialis Rutae,
— Succini albi,
— Caryophyllorum,
— Juniperi, sing. scrup. unum.

Diese Latwerge soll von Gieron Ferrante aus Orvieto, wovon sie den Namen führt, erfunden worden seyn. Sie enthält fast gar kein Opium und verdankt ihre Wirkung lediglich der Menge reizender Substanzen, welche in ihr enthalten sind. — Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer halben Unze.

Pulvis s. Species Diascordii s. e Scordio cum Opio. (Sar. *Gr.*)

℞. Fol. siccat. Scordii sesquiunciam.
Petal. Rosar. rubr. unciam unam.
Boli Armenae . . uncias duas.
Cassiae ligneae,
Foliorum Dictamni Cretici,
Galbani,
Storacis Calamita, sing. semunciam.
Radicis Bistortae,
— Gentianae,
Gummi Arab. sing. . drachmas quinque.
Opii . . . . . drachmas duas.

Fiat pulvis, qui per cribrum trajiciatur.

Gr. Speciebus e Scordio sine Opio (vide Teucrium Scord.) Opii colati drachmas tres addere jubet.

Diascordium (vigoratum) s. Electuarium Diascordium s. e Scordio s. Scordii s. Scordii opiatum s. opiatum Fracastorii s. Mimosae Catechu compositum s. compositum Catechu, Confectio Japonica s. Diascordii, Conditum catechucicum, Electuarium Scordii opiaceum. (Ams. An. B. Bel. Br. Du. Ed. Fer. Gal. GalF. GalH. GalM. Gen. His. His3. Li. LP. Lus. Pal. Pm. Sar. Suec. Wir. *Au. Br. C. Ca. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne Catechu.

℞. Radicis Bistortae,
— Tormentillae,
— Gentianae,
Herb Dictamni Cret., sing. semunciam.
Herbae Scordii . unciam unam.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Cinnamomi,
Cassiae ligneae, sing. semunciam.
Piperis longi,
Zingiberis, sing. . drachmas duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici,
Galbani,
Storacis, singulorum semunciam.
Boli Armenae . . sesquiunciam.
Terrae Lemniae unciam dimidiam.
Conserv. Rosar. rubr. libr. unam.
Mellis despumati uncias triginta.

Dissolve opium, gummi arabicum et galbanum in Vini albi unciis tribus, commisce bene cum melle, adde reliqua pulverata et denique conservam rosarum. (Br. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

Pm. Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Seminum Acetosae, sing. drachmas sex, Cinnamomi, Cassiae ligneae, sing. drachmas duas, Succi Scordii condensati, Fol. Scordii sicc., sing. semunciam, Galbani, Gummi Arabici, Dictamni Cretici, sing. drachmas duas, Opii sesquidrachmam, Boli Armenae drachmas sex, Pip. longi, Zingib. sing. unam, Conservae Rosar. rubr. uncias sex, Mellis quindecim, Ichthyocollae semunciam, Aquae q. s.; ex ichthyocolla cum Aquae q. s. gelatinae libras duas, cum radicibus tribus prioribus et seminibus acetosae contusis coquendo per ½ horam in Aquae libris tribus decoctum para, cui cum expressione colato mel adjunge, despuma et iterum cola; in hujus liquoris trajecti parte succum scordii et conservam solve addendo postremo

gelatinam et liquoris residuum, mixta balneo maris ad uncias viginti octo evapora et, vase ab igne remoto, mellito reliquas species pulveratas admisce. (*Iβ-jj.*)

℞. Foliorum Scordii . uncias duas,
— Dictamni Cretici,
Gemmarum Rosarum,
Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae, sing. semunciam.
— Zingiberis . drachmas duas.
Seminum Acetosae sesquidrachmam.
Piperis longi . . drachmas duas.
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Pulpae Cassiae,
Storacis Calamita,
Galbani, singulorum semunciam.
Extracti Opii . . drachmas duas.
Boli Armenae . . uncias duas.
Mellis despumati,
Vini Hispanici, sing. . . q. s.

Radices, folia et semina concisa et contusa cum reliquis maceratis, solutis et bolo porphyrisata commisceantur. ((*T.*)

Fi. Boli Armenae sesquiunciam, Herbae Scordii unciam, Storacis in lacrymis drachmas quatuor cum dimidia, Galbani, Gummi Arab., Cinnamomi, Cassiae ligneae, Rad. Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Fol. Dictamni Cret., Terrae sigill. rubrae, sing. semunciam, Zingib., Pip. longi, sing. drachmas duas, Opii, Semin. Acetosae, sing. sesquidrachmam, Conservae Rosarum libram, Mellis despumati triplum pondus specierum. — Innerlich eine halbe Drachme.

℞. Foliorum Scordii . sesquiunciam.
Rosarum rubrarum,
Radicis Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
Seminum Berberidis,
Cassiae ligneae,
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Storacis Calamita,
Galbani,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Zingiberis,
Piperis longi,
Extr. Opii vin., sing. drachm. duas.
Boli orientalis praep uncias duas.
Vini Hisp. libram circiter dimid.
Mellis rosati cocti . libras duas.

Dissolve galbanum in vini parva quantitate et mel in eo quod restat liquoris hujus, tunc adde pedetentim pulveres. (Gal. *Ca.*)

℞. Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentill, sing. part. duas.
— Zingiberis . partem unam.
Cinnamomi . . partes quatuor.
Herb. Dictamni Cret. partes duas.
Fol. siccat. Scordii . partes sex.
Petal. Rosar. rubr. . partes tres.
Piperis longi . . partem unam.
Seminum Berberidis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Bals. Peruv. liq., sing. partes duas.
Opii purificati . partem unam.
Boli Armenae . . . partes octo.
Vini Hispanici . partes triginta,
Mellis partes centum viginti quinque.

Fiat electuarium. (GalM.)

℞. Zingiberis,
Gentianae,
Tormentillae,
Dictamni Cretici,
Mastichis,
Boli Armenae, sing. drach. unam.
Opii . . . . . drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Foliorum Scordii,
Petal. Rosar. rubr., sing. drachmas sex.
Mellis Rosarum unc. viginti quatuor.

Pulveres cum melle commisce. (His. His8.)

℞. Zingiberis,
Opii,
Piperis longi, sing. partem unam.
Gentianae,
Storacis Calamita, sing. part. duas.
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Gummi Arabici,
Rosarum rubrarum,
Scordii,
Tormentillae, sing. part. quatuor.
Boli Armenae . . partes octo.
Mellis albi partes centum viginti.

Tere opium cum Vino Hispanico ut fiat puls liquida, cum qua storacem cum gummi tritum in emulsionem contere; adde deinde mellis pauxillum, tunc pulveres commixtos et denique mel reliquum; calefac parumper et agita ad refrigerationem usque. (*Vm.*)

Gr. Specier. e Scordio c. Opio libram unam, Syr. Papav. alb. tres.

℞. Gentianae drach. septem c. dim.
Cinnamomi . drachmas septem.
Opii crudi . . . drachmas tres.
Vini albi . . . . . uncias sex.

Post aliquot dies digestionis cola, leviter exprimendo, et colaturae adde
Pulveris Herbae Scordii uncias tres.
Mellis despumati . uncias viginti.
Misce bene. (Li.)

LP. Herb. Scordii uncias sex, Rad. Gentianae drachmas quindecim, Pulv. arom. drachmas quatuordecim, Opii in Vino dissoluti drachmas sex, Mellis despumati uncias quadraginta.

2) Mit Catechu.

℞. Cinnamomi,
Piperis longi, sing. . semunciam.
Catechu . . . uncias quatuor
Herbae Scordii,
Radicis Tormentillae,
Gentianae, singularum uncias duas.
Pulverata misce et adde
Opii in Vino diluti drach. quinque.
Mellis puri libras duas c. dimidia.
Vini Hispanici . quantum sufficit ut fiat electuarium. (*Br.*)

℞. Catechu . . . . . uncias tres.
Radicis Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrach.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
vel pulverum pondus triplum. (Gen.)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Gummi Arab., sing. unciam unam.
Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrach.
Mellis rosati uncias viginti octo.
Misce opium cum melle et adde reliquas substantias pulveratas (Ams.)

℞. Herbae Scordii . . uncias tres,
Catechu,
Fabae Pichurim,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Opii . . . . sesquidrachmam.
Mellis . . . uncias viginti octo.
Tritura opium cum Vino Hispanico, adde mel paullo calidum et admisce reliquas substantias pulveratas et mixtas. (GalF. Suec.)

℞. Catechu . . . uncias quatuor.
Kino . . . . . uncias tres.
Cinnamomi.
Nucis mosch., sing. unciam unam.
Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrachm.
Syr. Rosar. rubr. ad mellis consist. usque cocti libr. duas cum quadrante.
Misce. (An. B. Bel. Du. Ed. GalH. Lus. *C. Ca. Sw.*)

LH. Katechu uncias duas, Kino vel Sanguinis Draconis sesquiunciam, Pulveris arom. (LH.) unciam unam, Opii in Vini generosi q. s. soluti grana quinquaginta sex, Syrupi communis melleae consistentiae q. s.

℞. Catechu . . . . . uncias tres.
Radicis Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Opii . . . . . semidrachmam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Fiat electuarium. (*Au.*)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu, singulorum uncias tres.
Cinnamomi,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Opii . . . . . drachmas duas.
Mellis . . . uncias viginti octo.
Vini Hispanici . quantum sufficit.
Misce. (Fer.)

Nur das letztere Präparat führt den Namen Confectio Japonica, die übrigen werden Diascordium correctum genannt, das erste ausgenommen, welches vom Erfinder selbst ist.

Das Diascordium gilt als schweißtreibend, giftwidrig, schmerzstillend und styptisch. Man verordnet es besonders bei Diarrhöe und Ruhr, zu einer, zwei und drei Drachmen. Die Wirkung ist mehr von den adstringirenden Substanzen als von dem darin enthaltenen Opium abhängig.

Electuarium adstringens. (*Sa.*)

℞. Diascordii,
Sanguin. Dracon., sing.
drachmas sex.
Aluminis,
Catechu,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat electuarium.

Electuarium antidysentericum s. stimulans. (LP.)

℞. Corticis Simarubae drachmas sex.
Catechu . . . drachmas duas.
Ipecacuanhae . . grana viginti.
Opii in Vino soluti
grana viginti quatuor.
Syrupi Chinae . quantum satis ut fiat electuarium — Gabe, eine Drachme und nach und nach mehr auf zwei oder drei Mal täglich, bei Ruhr, Diarrhöe, Schwäche des Darmcanals ꝛc.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Diascordii . . . partem unam.
Vini rubri partes viginti quinque.
Dissolve.

Clysma sedans et adstringens. (*B.*)

℞. Infusi Chamomillae uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Diascordii . . drachmam unam.
Misce. — Bei paſſiven Bauchflüſſen, vergeblichem Würgen, Magenſchmerz und Krampfkolik.

Pilulae antiemeticae. (*Pie.*)

℞. Pulv. Menthae . drachmas duas.
— Absinthii . scrupulos duos.
— Balaustiorum scrup. unum.
Olei ess. Cinnamomi guttas duas.
Diascordii . drachmam unam.
Syrupi Cydoniorum . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. — Gabe, ſechs Stück täglich, auf drei Mal.

Julapium sistens s. adstringens, Mixtura sistens s. Opii adstringens Sylvii s. ad vomitum sanguinis. (His. HisS. *Sa.*)

℞. Confect. Japonicae (Ed.)
drachm. tres.
Tinct. thebaic. guttas quadraginta.
Sacchari albi . . . semunciam.
Aquae alexiteriae uncias quatuor.
— Cinnam. spirit. . unc. duas.
Misce. (*Sa.*)
Die beiden folgenden Formeln gehören ebenfalls hierher, obgleich ſie nur die einzelnen Beſtandtheile der confectio japonica getrennt enthalten
℞. Syr. Capitum Papav. unc. unam.
Aquae Rhoeados . uncias septem.
Catechu . . . sesquidrachmam.
Laudani liq. Sydenh.
guttas viginti.
Misce. (*Sa.*)
℞. Aquae dest. unc. duas c dimidia.
Aceti destillati . . semunciam.
Opii puri . . . . . grana duo.
Solutioni adde
Pulv. Corallii rubri
semidrachmam.
— Catechu . semiscrupulum.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce sedulo. (His. HisS.)

Theriaca coelestis Hoffmanni. (Br. *Sp.*)

℞. Extr. Rad. Angelicae,
— — Aristolochiae rotundae,
— — Contrayervae,
— — Inulae,
— — Gentianae,
— — Tormentillae,
— — Valerianae,
— — Vincetoxici,
— — Viperinae,
— — Zedoariae,
Fol. Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
Fol. Scordii, sing. drachmas tres.
Extracti Opii . . unciam unam.
Resinae Cascarillae,
— Ladani, sing. drach. unam.
Storacis Calamita drachmas tres.
Myrrhae . . . . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis, sing. drachmas tres.
Resinae Guajaci,
Croci, sing. . drachmam unam.
Castorei . . . semidrachmam.
Pulveris Viperae,
Salis volat. Cornu Cervi,
— — Succini, sing.
sesquidrachmam.
Camphorae,
Ambrae griseae, sing.
scrup. unum.
Balsami Peruviani liq.
drachmas tres.
Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Cort. Citri,
— — Baccarum Juniperi,
— — Succini rectificati, sing.
guttas duodecim.
— — Cardamomi,
— — Cinnamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,
Olei ess. Nucis mosch., sing.
scrupulos duos.
Pulvera substantias pulverandas, resinas et balsama in mortario balnei aquae ope calefacto contunde, adde extracta, pulveri salia volatilia admisce et denique olea essentialia affunde. (Br.)
℞. Myrrhae electae . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,
Opopanacis, sing. scrupulos duos.
Storacis . . . . drachmas tres.
Extr. Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
— Tormentillae,
— Contrayervae,
— Angelicae, singulorum
semunciam.
— Opii . . . drachmas sex.
— Croci,
— Vincetoxici,
— Valerianae,
— Gentianae,
— Aristolochiae rotundae, sing.
drachmas tres.
Resinae Ligni Aloës,
— Guajaci,
— Ladani, sing. drachm. unam.
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris,
Succini praeparati,

Pulv. Viperae, sing. . semunciam.
Salis ess. Succini,
— — Cornu Cervi, sing. sesquidrachmam.
Olei essentialis Cinnamomi,
— — Zedoariae,
— — Cardamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,
— — Caryophyllorum,
— — Baccarum Juniperi,
— — Citri, sing guttas duodecim.
— expressi Nucis moschatae,
Balsami Peruv., sing. drach. tres.
Camphorae,
Ambrae griseae, sing. scrupulum unum.
Misce. (*Sp.*)

Unterscheidet sich von dem Theriak, mit dem es Aehnlichkeit hat, besonders durch den Mangel des Zuckers und durch die Gegenwart von Salzen, welche auf das Opium einzuwirken vermögen; es enthält ungefähr 4 Gran Opium auf die Drachme. — Man hat es vornehmlich als schmerzstillend und fäulnißwidrig gerühmt. — Gabe, zwei bis vierundzwanzig Gran in Pillen.

Electuarium (*Seminis*) *Hyoscyami opiatum*, *Philonium Romanum*. (His. His3. Pal. Wir. *Fi. Gr. Sp.*)

℞. Piperis albi . drachmas quinque.
Opii drachmas duas cum dimidia.
Cassiae ligneae sesquidrachmam.
Semin. Hyosc. albi drach. quinque.
— Apii . . drachmam unam.
— Petroselini Macedonici,
— Foeniculi,
— Dauci Cretici, singulorum grana quadraginta quinque.
Croci . . . scrupulum unum.
Nardi Indicae,
Pyrethri,
Zedoariae, sing. grana quindecim.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Euphorbii,
Myrrhae,
Castorei, sing. drachmam unam.
Mellis uncias octo et drachmas quatuor cum dimidia.
Misce. (Pal. Wir.)

Gr. ut antea, sed Croci sesquidrachmam et omisso euphorbio loco mellis Syrupi Papav. alb. q. s.

℞. Radicis Pyrethri,
— Zedoariae,
— Doronici,
Balaustiorum, sing. unciam unam.
Piperis longi,
Sem. Hyosc. albi, sing. unc. viginti.
Opii . . . . uncias decem.
Euphorbii,
Castorei,
Margaritarum, sing. unciam unam.
Croci . . . . uncias quinque.
Mellis . . . . uncias triginta.
Misce (*Sp.*)

℞. Piperis albi.
Sem. Hyosc. albi, sing. drach. viginti.
Opii . . . drachmas decem.
Croci orientalis drachmas quinque.
Castorei,
Spicae Nardi,
Rad. Pyrethri, sing. drach. unam.
Mellis depur. libr. duas c. dimid.
Misce. (*Fi.*)

℞. Seminum Hyoscyami,
— Anisi,
— Foeniculi,
Myrrhae,
Castorei, sing. . drachmas sex.
Opii . . . drachmas quinque.
Cinnamomi . . unciam unam.
Croci . . . . drachmas duas.
Flor. Chamomillae drach. tres.
Mellis despumati . libras duas.
Misce bene. (His. His3.)

Jede Drachme enthält über anderthalb Gran Opium und vier Gran Bilsenkrautsaamen. — Beruhigend, schmerzstillend, schlafbringend, ehedem besonders bei Windcolik, heftigem Husten und Convulsionen empfohlen. — Gabe, eine halbe bis eine Drachme. — Man wendete es auch in Klystir an.

Electuarium Requies Nicolai. (Pal. Wir. *Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Flor. Rosarum rubrarum,
— Violarum, sing. drach. duas.
Opii,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris albi,
— Scariolae,
— Lactucae,
— Portulacae,
— Psyllii,
Corticis Radicis Mandragorae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. sesquidrachmam.
Sacchari crystall. drach. unam.
Ligni Santali albi,
— — rubri,
Spodii,
Gummi Tragacanthae, singulorum scrupulos duos et grana quinque.
Sacchari . . . . uncias decem.
Commisce cum Aqua Rosarum. (Pal.)

℞. Flor. Rosarum rubrarum,
— Violar., sing. . drach. sex.
Sem. Hyoscyami albi,
— Papaveris albi,

Sem. Lactucae,
— Psyllii, sing. . semunciam.
Corticis Radicis Mandragorae,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depur., sing. drachmas tres.
Santali albi,
— rubri,
Gummi Tragacanthae,
Spodii, singulorum drachmas duas.
Sacchari albi . . uncias viginti.

Dissolve opium in Vini albi unciis tribus, adde pulveres, et admisce saccharum in Aquae Rosarum unciis decem dissolutum. (Wir.)

℞. Radicis Mandragorae,
Florum Rosarum,
— Violarum,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris,
— Endiviae,
— Lactucae,
— Portulacae,
— Psyllii,
Opii,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . sesquiunciam.
Santali albi,
— rubri,
Spodii,
G. Tragacanth., sing. drach. sex.
Sacchari crystallis, unciam unam.
Julapii ros. uncias viginti quatuor.

Misce. (*Sp.*)

℞. Gummi Arabici,
Opii, singulorum drachmas duas.
Zingiberis,
Nucis mosch., sing. drachmas tres.
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Rosarum rubr.
drach. quatuordecim.
Sem. Papav. albi rec.
drach. octodecim.
Mellis albi uncias quatuordecim.

Misce pulveres gummi arabici et semin. papaveris cum opio, contere totum cum melle et reliquos pulveres commixtos adde. (*Vm.*)

℞. Mellis albi partes triginta duas.
— despumati,
Seminum Anisi,
Calcis subcarb., sing. partes octo.
Opii . . . . . partem unam.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. part. viginti quinque.

Opio cum subcarbonate in pulverem trito adde pulveres reliquorum ingredientium cum nuce moschata triturato rum, tunc admisce primo mel despumatum, deinde mel crudum.

℞. Cinnamomi . . drachmas tres.
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris albi,
— Endiviae,
— Portulacae,
— Lactucae,
— Psyllii,
Corticis Radicis Mandragorae,
Zingiberis,
Nucis moschatae,
Florum Violarum,
— Rosarum,
Opii, singulorum sesquidrachmam.
Santali albi,
— rubri,
Eboris calcinati,
G. Tragac., sing. scrup. duos c. dim.

Contundendo laevigandoque etc. pulverata cum Mellis despumati sufficiente quantitate fiant electuarium, cui in fine opium in Vino Hispanico solutum admisceatur. (*Fi.*)

T. Santali albi, rubri, sing. scrupulos decem, Rad. Mandragorae, Sem. Hyoscyami albi vel nigri, Papaveris albi, Portulacae, Psyllii, Lactucae, Endiviae, Zingib., sing. drachmas sex, G. Tragacanthae scrupulos decem, Flor. Violarum, Petal. Rosarum rubr., Nucis mosch., sing drachmas sex, Cinnamomi sesquiunciam, Extr. Opii drachmas sex, Eboris calcin. scrupulos decem, Mellis despum., Vini Hisp., sing. q. s.

Merkwürdig iſt es, daß man dieſer Latwerge nie eine andere als eine beruhigende und ſchlafmachende Wirkung zugeſchrieben hat. Sie genoß ehedem einen ſehr großen Ruf, iſt aber heutzutage faſt außer Gebrauch. Man gab ſie beſonders Kindern zum Brechen, auch wandte man ſie auf die Schläfe an. — Gabe, von einer halben Drache bis zu zwei und einer halben Unze. — Jede Unze enthält, nach der Formel von Wir., fünf Gran Opium.

Opopanax.

Gummi Panacis, Pastinacae Opoponacis Gummi-Resina; Heilwurzgummi, Opopanaxharz, Panaxgummi, Opopanaxgummi; Opopanax (*Gal.*); Panaxgummi (*D.*); Opoponaco (*His. I. Lus.*);

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Gen. Han. His. His8. Li. Lou. LouN. LP. Lus. O Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va.* Z.

Ein Gummiharz in unregelmäßigen Stücken, ſelten in Tropfen, außen von röthlichgelber, innen von ſchmutzigweißer, mit Roth und Gelb vermiſchter Farbe und von un-

durchsichtiger, trockner und zerreiblicher Beschaffenheit. Es hat einen sehr starken, gewürzhaften, aber nicht sehr angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden Geschmack.

Es ist der eingetrocknete Milchsaft, welcher nach Einschnitten aus der Wurzel von Pastinaca Opopanax, ♂, einer Pflanze (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae. J.) des südlichen Europa's und des Orients ausfließt. (*Plenck* t. 228. *Gouan* Ill. t. 13. 14.) Nur die im Orient wachsende Pflanze liefert es, von woher es durch Syrien kommt. *Gr.* leitet es von Daucus gummifer her. Das Englische kommt von Ligusticum Cornubiense.

Es enthält, nach Pelletier, Harz, Schleimharz und etwas Satzmehl.

Reizend. Reinigung (Hiss) wie G. Ammoniacum. – Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Fomentum detergens. (*E.*)

℞. Rad. Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Irid. Florent., sing.
semunciam.
Opopanacis,
Sagapeni, sing. drachmas duas.
Guajaci . . scrupulos quatuor.
Caryophyllorum drachmas duas.
Camphorae . . . drachmas tres.
Aquae vitae . . uncias decem.

Post horas viginti quatuor infusionis cola. – Austrocknend, bei unreinen syphilitischen Geschwüren empfohlen.

Emulsio anthelmintica. (*Bo.*)

℞. Opopanacis,
Saponis Veneti, sing. drach. unam.
Vitelli Ovorum . drachmas duas.
Syrupi Artemisiae sesquiunciam.
Aqua dest. Foeniculi uncias tres.

Gabe, alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Opuntia.

Cactus Opuntia, L.; gemeine Indianische Feige; Figuier d'Inde (*Gal.*); Common indian fig (*Ang.*); Indianisk fige (*D.*); Higos de pela (*His.*); Gewoone vygplant (*Bel.*); Fico d'India (*I.*); Indiansk ficon (*Suec.*).

Gal. Gen. *M.*

♃ (Icosandria Monogynia. L.; Ficoides, J.) Eine Americanische Pflanze, welche im südlichen Europa wächst. (*Knorr*, Del. I. t. f. a.)

Man wendet die Stängel, uneigentlich Blätter (folia Opuntiae) genannt, an; sie sind platt, von verschiedener Gestalt und Größe, obgleich meist eirund, fingersdick, saftig und geruchlos. Sie haben einen wässerigen und schleimigen Geschmack.

Origanum.

Die Pharmacopöen führen an:

1) *Origanum Creticum, L.*; Cretischer, Spanischer Dosten, Spanischer Hopfen, Candischer Majoran; Origan de Crète (*Gal.*); Majoram of Candia (*Ang.*); Ouregao de Creta (*Lus.*); Spanskhumle (*Succ.*).

Ams. An. Bor. Bor4. Br Fenn. Gal. GalM. Han. Hass. LH. O. Sax. Suec. Wir. *Be. G. M. Pid. Sp.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine auf Creta und im südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* VIII. 7. *Dod.* Pempt. 284.)

Man wendet die Spitzen (spicae s. herba Origani Cretici) an; sie bestehen aus den röthlichen, behaarten, ästigen Stängeln mit rundlichen, sitzenden, glatten Blättern und purpurrothen, kurze lockere Aehren bildenden Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, blähungtreibend. Man wendet sie in Aufguß und äußerlich in Kräutersäckchen an.

2) *Origanum Dictamnus, L*; Cretischer Diptam: (Dictame de Crète (*Gal.*); Dittamus of Candia (*Ang.*); Bucklutulgezal (*Ar.*); Dittamo Cretico (*I.*); Kretsky dyptam (*B.*).

An. Br. Fer. GalM. His. His8. Pm. Wür. *A. Be. Fi. G. Gr. Re. Sp.* Z.)

Ein kleiner Strauch, welcher auf Candia wächst. (*Blackw.* t. 462. *Plenck* t. 497. *Hayne* VIII. t. 6. *Zorn* Ic. pl. t. 542.)

Man wendet das Kraut (herba s. folia Dictamni Cretici) an; es besteht aus einem ästigen, röthlichen, behaarten Stängel, an welchem unten eirunde, rundliche, gestielte, filzige, weißliche und oben rundliche, sitzende, glatte, oft röthliche, mit vielen Drüsenpuncten bestreute Blätter sitzen. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, etwas bittern Geschmack.

Reizend, ehedem für Menstruation befördernd gehalten.

3) *Origanum Majorana, L*; Ἀμάραξον; Mayran, Majoran; Marjolaine (*Gal.*); Sweet marjoran (*Ang.*); Mirzunjusch (*Ar.*); Maryanka (*B.*); Merian, Mairan (*D.*); Murwa (*Duk.*); Zatarhendie, Zatarhindie (*Eg.*); Mejorana (*His.*); Mariolein (*Bel.*); Maggiorena (*I.*); Majeran (*Pol.*); Mangerona (*Lus.*); Mejram (*Suec.*); Marru (*Tam.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va.*

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 81)

Man wendet die Spitzen (herba et flores Majoranae s. Amaraci s. Sampsuchi) an; sie bestehen aus einem vierkantigen Stängel mit eirunden, filzigen, weißlichen Blättern und weißen, in kurzen, rundlichen Aehren, von denen drei oder vier genähert ein Köpfchen bilden, zusammenstehenden Blüthen. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen, etwas bittern Geschmack.

Reizend, Niesmittel

4) *Origanum vulgare, L.*; Wohlgemuth, gemeine Doste, Dost, Dostenkraut; Origan commun (*Gal.*); Wild marjoram (*Ang.*); Dobra mysl (*B.*); Vild mairan, tost (*D.*); Oregano (*His.*); Wilde majolyn (*Bel.*); Origano, Erba da Acciughe, Maggiorana sylvestre (*I.*); Lebiotka (*Pol.*); Ouregao, Oregão (*Lus.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ Eine Europäische Pflanze (*Bull.* t. 193. *Blackw.* t. 280. *Pleuck* t. 495. *Hayne* VIII. 8. *Zorn* Ic. pl. t. 57.)

Man wendet die Spitzen (herba et flores Origani vulgaris s. Cunilae bulbulae) an; sie bestehen aus einem etwas viereckigen, behaarten, bloß am obern Theile ästigen Stängel mit eirunden, gestielten, unten etwas behaarten Blättern und purpurrothen Blüthen, welche kurze, einen rispigen Strauß zusammensetzende Aehren bilden. Es hat einen gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden, beißenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend und blähungtreibend. In Aufguß, äußerlich in Kräutersäckchen.

Infusum Origani. (GalM.)

℞. Summitatum siccatarum Origani, Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.
Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur.

Oleum Origani aethereum, Aethereoleum Origani. (A. Am. An. Bor. Bor4. Br. D. Du Han. Lon. LonN. O. Pal. Sar. Sax. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Re. Sw.*)

℞. Summit. floresc. Origani q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (Am. Du. Lon. LonN. R. *C. Gr.*).

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; — D. Aquae sex; — Bor. Han. O. Sax. et *Fi.* octo Aquae; — A. Aquae duodecim; — An. Herbae sex et Aquae viginti.

℞. Summit. Origani
part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Summitatum Origani quantum vis.
Aquae destillatae Origani . q. s.
Destillent. (Wür)

Bor4. Oleum Origani Cretici vonale indicat.

Aqua Origani. (A. Pal.)

℞. Summit. Origani partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Destillent partes quatuor. (A.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae.

Oleum Dictamni aethereum, Aethereoleum Dictamni. (*Sw. T.*)

℞. Foliorum Dictamni partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillent.

T. ut oleum majoranae aethereum.

Syrupus de Dictamno. (Gal. *Fi.*)

℞. Summit. sicc. Dictamni Cret.
unc. unam.
Aquae dest. Dictamni libras duas.
Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto; cola et filtra. Liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Dissolve in balneo aquae.

Conserva Majoranae. (Sar. Wir.)

℞. Herb. Majoranae contus.
part. unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Commisce. (Wir.)

Sar. Herbae contusae et Sacchari, singulorum partes aequales.

Aqua Majoranae. (Ams. B. Pal. Sar. Sax. WW. *Gr.*)

℞. Herbae Majoranae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia destillatio supra novam herbam instituatur. (Pal. Sar.)

Ams. et B. Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem;

WW. Herbae partem unam et sex Aquae; — Sax. Aquae quindecim; de-

stillent trientes duo; — *Gr.* Herbae recentis libras octo, Aquae q. s.; destillet congius.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Oleum Majoranae aethereum, *Aethereoleum Majoranae.* (Ba. Bor. Bor4 Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Gr. Sw. T.*)

℞. Herb. floresc. Majoranae q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillando elicitum oleum separetur. (Ed.)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Aquae quatuor; — D. Aquae sex; — Bor. Bor4 Han. HassP O. Pol. et Sax. octo Aquae; — Ba. Aquae novem. — *T.* ut oleum florum aurantii.

℞. Herb. Majoranae
partes viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis communis . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Majoranae . quantum vis.
Aquae destill. Majoranae . q. s.
Destillent. (Wür.)

Balsamum Majoranae. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei ess. Majoranae drach. unam.
Olei Nucis mosch.
drachmas duas c. dimidia.
Misce. (Wir.)

Sp. Oleorum, sing. partes aequales.

Butyrum s. Unguentum Majoranae. (Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Pid. Sp. Vm.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,
Butyri recentis, sing. . part. aeq.
Contrita coque lente ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Hass. Sax. *Pid Sp.*)

Bor. Han. et O. Herbae partem unam et duas Axungiae Porci: — Bor4. Adipem suillum loco butyri; — HassP. Herbae et Axungiae, sing. libram unam.

℞. Herbae recentis Majoranae,
Butyri recentis, sing. libr. unam.
Coque ad consumptionem humidi, cola et adde
Olei ess. Majoranae gutt. triginta.
Misce bene. (Br. D. Pal. Wir.)

℞. Butyri recentis . . partes tres.
Herb. rec. Majoranae part. unam.
Post horas duodecim digestionis super cinere calido cola exprimendo, lava cum Aqua tepida, liqua, decantha et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

℞. Butyri recentis . unciam unam.
Aquae destill. Majoranae
drach. duas.
Contere, liqua super igne, decantha, butyrum et tere cum
Olei ess. Majoranae guttis octo.
Misce sedulo. (Ful.)

℞. Butyri recentis drachmam unam.
Olei ess. Majoranae guttas duas.
Contere. (Li.)

Pal. Axungiae Porci semunciam et Olei Majoranae guttas decem

Erweichend, auflösend, blähungtreibend. — In Einreibungen auf den Unterleib und sonst.

Oleum Majoranae infusum. (Br. Wir. Wür. *T.*)

℞. Herbae recentis Majoranae,
Olei Olivarum, sing. . libr. unam.
Macera per aliquot dies, tunc coque igne lenissimo usque ad humidi consumptionem et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Wür. Herbae partem unam et duas Olei; — *T.* ut oleum lavandulae.

Pommade divine (*Gr. Re.*): Sevi ovilli libras quatuor, Cerae albae unam, Ess. Cort. Limon. t Bergamotae, sing. sesquiunciam, Olei Origani et Lavand., sing. drachmas quatuor. Haarpommade.

Orleana.

Orleana Terra, *Urucu*, *Pigmentum Urucu*; Orleans; Rocou (*Gal.*)

Br. Wir. *Be. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein Färbeteig in drei bis vier Pfund schweren Boden (Orleana in foliis s. rotulis s. baculis) oder Kugeln (O. in ovulis), außen von brauner, innen rother Farbe, weicher Beschaffenheit, thierischem Geruch und adstringirendem Geschmack.

Es ist diese Substanz der rothe Ueberzug, welcher die reifen Früchte des Orleanbaumes, Bixa Orellana, L., (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, *J.*) eines mittelmäßigen Baumes in Südamerica (*Desc. Fl. Ant. I. 4. Hayne IX. t. 34.*) bedeckt.

Orobanche.

Orobanche Virginiana; Virginische Sommerwurz; Orobanche de Virginie (*Gal.*); Virginian broom-rape, Beechdrops, Cancer-root (*Ang.*).

C.

Eine Schmarotzerpflanze (Didynamia Angiospermia, L; Orobancheae, *J.*) Nordamerica's. (Morris. p. 12. t. 16. f. 9.)

Man hat sie innerlich bei Ruhr und äu-

ßerlich bei rebelliſchen Geſchwüren angewendet. Sie iſt abſtringirend und beſitzt zu gleicher Zeit eine außerordentlich widerliche Bitterkeit.

Or. major (*Gr.*).

O r y z a.

Oryza sativa, *L.*; Reis; Riz (*Gal.*); Rice (*Ang.*); Aruz (*Ar.*); Pruisch (*Arm.*); Men-ho (*C.*); Lua (*Co.*); Riis (*D.*); Chawl (*Duk. Hin.*); Arroze (*His.*); Ryst (*Bel.*); Riso (*I.*); Motsj, Gome, Ko (*J.*); Riskesa (*Ma.*); Tandul (*Mah.*); Bras (*Mal.*); Barinje (*Pe.*); Ryz (*Pol.*); Arroz (*Lus.*); Vrihi (*Sa.*); Ris (*Suec*); Dugu (*Ta.*); Arisi (*Tam.*); Bium (*Tel.*).

Ams. An. B. Br. Fer. Ful. Gal. GalM. Hass. HassP. His. HisZ. LH. Li. LP. Pm. R. RC. Wir. *A. Be. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va.*

⊙ (Hexandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Aethiopien einheimiſche Pflanze, welche heutzutage in allen warmen Ländern gebaut wird. (*Plenck* t. 278. Fl. méd. VI. 299.)

Man wendet den Saamen (semen s. grana Oryzae) an; wir erhalten ihn ohne Oberhaut; er iſt länglich, ſtumpf, gefurcht, weiß, trocken, hart, zerreiblich, geruchlos und von mehligem Geſchmack.

Er enthält, nach Braconnot, viel Satzmehl mit etwas thieriſchem Stoff und ſehr wenig nicht cryſtalliſirbarem Zucker, Schleimharz, Oel und verſchiedene Salze.

Er beſitzt ſehr nährende Eigenſchaften wird, mit vielem Waſſer verdünnt, etwas erweichend und lindernd, iſt aber mit Unrecht als ſtyptiſches Mittel angeſehen worden.

Decoctum s. Ptisana s. Tisana s. Aqua Oryzae. (B*. Gal. GalM. *Gr. ParC. Ra. Sm. T.*)

℞. Oryzae lotae . . semunciam.
Aquae communis libras duas et uncias octo.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde
Syr. Althaeae vel Capilli Veneris unciam.
Misce. (Gal.)

B*. Coquere Oryzae uncias duas cum Aquae libris duabus ad sedecim unciarum reman.; — *Gr.* Oryzae uncias duas, Aquae octarios duos ad unum decoquere; vel: Oryzae semunciam, Aquae q. s. ut coquendo octarii tres obtineantur; — *T.* Oryzae uncias duas, Aquae libras quatuor coquendo ad dimidium redigere; — *Ra.* Oryzae semunciam cum Aquae libris tribus ad tertiae partis remanentiam.

℞. Oryzae lotae . . . uncias duas.
Aquae . . . . . octarios tres.
Coquendo tertiam partem consume, sub finem addendo
Butyri recentis . unciam unam.
Sacchari vel Salis pro arbitrio, quantum requiritur.
Misce. (*Sm.*)

℞. Oryzae mund. et lotae unc. unam.
Coque, usque dirupta sit, in
Aquae . . quantitate sufficiente ut colaturae octarius (litre) obtineatur, cui sub finem adde
Cort. Aurant. amari mundati drachm. duas.
Stent in infusione per horae quadrantem et tunc colentur. (GalM.)

℞. Oryzae . . . . unciam unam.
Aquae octarios duos cum dimidio.
Decoque ad octariorum duorum remanentiam, sub finem addendo
Liquiritiae . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (*ParC.*)

Erweichend, aber nicht abſtringirend; bei Durchfall und Ruhr empfohlen. — Man kann noch Milch, eine Abkochung von Catechu, Quittenſyrup oder ſonſt einen ſäuerlichen Syrup, Aqua Rabelii ꝛc. hinzuſetzen. Es iſt gut, wenn man damit auf vielfache Art Veränderungen vorzunehmen weiß, da dieſe Abkochung ſo häufig gebraucht wird.

Cremor Oryzae. (*Gr. Re.*)

℞. Oryzae . cochlearia tria majora.
Aquae octarios duos ad unum, adde Amygdal. dulc. no. 10, amaras no. 5, fiat cum Saccharo et Aquae Cinnamomi vel Florum Aurantiorum pauxillo emulsio. — Morgens warm zu trinken.

Decoctum pectorale. (*Sp.*)

℞. Oryzae mundatae . unciam unam.
Aquae fontanae uncias centum viginti octo.
Coque, donec oryza sit dirupta, tunc infunde in decocto
Rad. Liquiritiae,
— Althaeae, sing. semunciam.
Herbae Capilli Veneris Canadensis,
Flor. Farfarae, sing. drach. duas.
— Rhoeados drachmam unam.
Post horae quadrantem decantha.

Potus Oryzae citratus, Decoctum Oryzae acidulatum. (*Au. Va.*)

℞. Oryzae pulveratae unciam unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque parumper et adde colaturae
Sacchari Hordei . . semunciam.
Succi Citri . . . unciam unam.

Osmazoma.

Extractum Carnis; Osmazom; Osmazome (*Gal.*).

Ca. Vm.

℞. Carnis bubulae . partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Carnem in frustula minora concisam per horas duodecim aëris sicci torrenti expone, tunc digere cum alcohole in loco calido; post horam unam vas refrigeret et deinde liquor filtretur; alcohole destillatione abstracto residuum per pannum laneum (Flanell) trajice et ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

℞. Musculorum adipe privat. q. vis.

Concisis in pastam tenuissimam, huic pedetentim Aquam frigidam infunde et bene malaxa; liquorem deinde per linteum cola, calefac, coquentem despuma, filtra et ad extracti consistentiam usque consume. (*Ca.*)

Reizend, von angenehmem Geschmack, zur Wiederherstellung des Appetits bei Reconvalescenten. Gabe, eine Drachme.

Ova.

Ova gallinacea; Hühnereier; Oeufs de poule (*Gal.*); Eggs of hen (*Ang.*); Bayzah (*Ar.*); Biju (*Cy.*); Anda (*Duk.*); Huevo (*His.*); Hoenderey (*Bel.*); Ovo di gallina (*I.*); Tukim (*Pe.*); Kurze jaia (*Pol.*); Anda (*Sa.*); Haenraegg *Suec.*); (Koray mutay (*Tam.*); Guddu (*Tel.*).

A. Ams. An Ba. Bor. BorC. Bor4. D. DD. Penn. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. His HisS. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp.*)

Das Eiweiß (Albumen Ovi) und der Eidotter (Vitellus Ovi) sind nährend und werden zur Abklärung von Flüssigkeiten gebraucht. Das erstere für sich allein getrocknet, dient als Prüfungsmittel. Beide zusammengeschlagen und getrocknet geben das Poudre clarifiante (*Gr.*) zur Abklärung der Weine und des Zuckerrohrsafts.

Oleum e Vitellis Ovorum s. Ovorum expressum. (Au. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. HisS. Li. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Gr. Pid. Re. T. Vm.*)

℞. Vitellor. Ovorum recent. q. vis.

In sartaginem immissos balnei aquae ope ad dimidium redige, donec inter digitos pressi oleum facile emittant, tunc sacco e tela arctioris texturae confecto, inter duas lamnas ferreas tepefactas exprime et per chartam emporeticam balnei aquae calore, filtra.

HisS. *Gr.* Vitellos radula comminutos vel in frusta duo vel tria diffracta in vase ferreo igne moderato assare donec ex flavo rubescant et pinguedinem exsudent, tunc statim in sacculo linteo exceptos proelo calido exprimere.

Fi. Ova cocta et dura triturare, in vase cupreo stanno obducto ad humidi consumptionem usque calefacere et tunc exprimere; — *Chaussier* Vitellos duros cum Alcohole diluere, in vase tecto calefacere, filtrare, alcoholem destillare et oleum ab aqua separare. (GalH. *Vm.*). — Das auf letztere Weise erhaltene Oel hat, nach Henry, immer den Geruch des Alcohols und ist, nach Van Mons, noch mehr dem Ranzigwerden unterworfen, als das andere.

Erweichend, lindernd, bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Frostbeulen, wunden Brustwarzen und aufgesprungenen Lippen empfohlen.

Clysma sedans et emolliens. (BorC. DD. *B. Pie.*)

℞. Furfuris bene loti . manip. dimid.
Aquae purae . . . libras duas.
Decoque ad dimid. et colat. adde
Vitellos Ovorum . no. 3 vel 4.
Misce. (*Pie.*)

℞. Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Olei Rosarum,
— Chamomillae, sing. unc. tres.
Misce. (*B.*)

℞. Vitelli Ovorum . . semunciam.
Olei Olivarum . drachmas duas.
Misce. (BorC. DD.)

Unguentum s. Pomatum contra strumam. (*Sm.*)

℞. Axungiae . . . . unciam unam.
Liquatae leni igne adde
Ovum recens absque testa no. 1.
Subige bene.

Alphonse Leroy wendet es drei oder vier Monate lang auf Kröpfe an und soll sie bisweilen damit zertheilt haben.

Linimentum Vitelli Ovi.

℞. Vitellorum Ovi . . quantum vis.
Olei Olivarum . . . . . q. s.
ut fiat linimentum. — Bei einfachen Wunden sehr empfohlen.

Emplastrum flavum. (O.)

℞. Vitellos Ovorum coct. et siccator. no. 6.
Cerae flavae,
Axung. Porci, sing. uncias quatuor.
Misce exacte.

Mixtura analeptica. (*Sm.*)

℞. Cremoris Lactis . . uncias sex.
Vitellos Ovorum rec. . . no. 2.

Sacchari drachm. quatuor ad unciam.
Aquae Cinnam. hordeat. drachm. sex.
Contere. — Eßlöffelweiſe, bei Erſchlaffung und Schwäche nach zu häufig gepflogenem Umgang mit Weibern und Onanie.

Mixtura ad aphthas s. antiaphthosa. (*Sm.*)

℞. Cremoris Lactis,
Aquae Rosarum, sing. unc. unam.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Syrupi Papav. albi drach. quatuor.
Misce. — Löffelweiſe, in 24 Stunden zu verbrauchen.

Solutio Albuminis. (*Gr.*)

℞. Albuminis vorum expressi uncm i.
Aquae . . . . . uncias decem.

℞. Albuminis Ovi siccati . unciam.
Aquae . . . uncias viginti
Teſtmittel auf Gerbeſtoff.

Alcohol cum Albumine s. albuminosum. (*Vm.*)

℞. Albumina Ovorum rec. . no. 4.
Subige in vase porcellaneo, sensim addendo
Alcoholis . . . . uncias duas.

Cataplasma Albuminis s. aluminosum. (RC. *Re.*)

℞. Aluminis . . drachmam unam.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Agitentur fortiter, ut in coagulum coëant. — Bei aſtheniſcher Augenentzündung, Froſtbeulen.

Albumen aluminosum, Coagulum aluminosum officinale (*Fi.*)

℞. Aluminis . . drachmam unam.
Albumen Ovi recentis . . no. 1.
Aquae Florum Sambuci vel Rosarum . . . . . unciam unam.

Linimentum Albuminis Ovi. (RC.)

℞. Albuminis Ovi recentis,
Alcoholis, vel
— diluti camphorati, vel
Balsami Peruviani partes aequales
Conquassando misce. — Bei'm Aufliegen.

Oxygenium.

Gas Oxygenium, Aër purus s. dephlogisticatus s. vitalis; Oxygengas, Lebensluft; Oxygène (*Gal.*)

B*. Fer. Han. HassP. *Br. Fi. Sw. T. Vm.*

℞. Oxydi nigri Mangani quantum vis.
Ad ruborem usque calefac sensim in retorta fictili cum apparatu pneumatico-chemico communicante; priores gasis, quod evolvitur, partes effugere sinendo, serius prodeuntes in lagenas vitreas excipe, quas sub aqua occlusas et obturaculis piceis munitas in loco frigido serva. (B. Fer. Han. HassP. *Gr. Sw. Vm.*)

℞. Peroxydi Manganesii partes tres.
Acidi sulph. concent. partes duas.
Misce frigide in mortario vitreo; calcina mixturam ad ruborem usque, gas quod evolvitur, excipe et cum Aqua Calcis pulsatum serva. (*Sw*. Vm.*)

℞. Nitri pulverati . . quantum vis.
Calefac in retorta, donec hujus fundus ad ruborem excanduit; gas evolutum excipe, partes priores penitus negligendo. (*Br.*)

Van Mons behauptet, der mit Seeſalz vermiſchte Salpeter gebe ſchneller Oxygen, als wenn er ſich allein befinde.

℞. Peroxydi Manganesii partem unam.
Chloratis Potassae . partes duas.
Contere, calefac prope flammam spiritu vini alitam et gas, quod evolvitur, excipe. (*Vm.*)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hydrargyri rubro vel Kali muriatico oxygenato extricare jubet; — *T.* itidem praeterea et alias substantias indicat.

Aqua oxygenata. (*Br.*)

℞. Aquae . . . . . quantum vis.
Machinae compressoriae ope quantum fieri potest, gase oxygenio satura.

Ein leichtes Reizmittel, welches man bei Appetitloſigkeit, Mangel der Reinigung, ſogenannten aſtheniſchen Waſſerſuchten, Magenkrämpfen und Hyſterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Flaſchen in vier und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen iſt das Verhältniß des in einem auf dieſe Weiſe bereiteten Waſſer enthaltenen Oxygens die Hälfte des Volums dieſes letztern.

Das ſo bereitete oxygenirte Waſſer unterſcheidet ſich bedeutend von dem, was Thenard mittelſt eines eben ſo weitläufigen als beſchwerlichen und zu ſehr in's Kleinliche gehenden Verfahrens erhalten hat und welchem er den Namen *Deutoxydum Hydrogenii* beilegt. Letzteres, ſo concentrirt als möglich, giebt das vierhundert und fünfundſiebenzigfache Volum Gas unter einem Drucke von m,076 und bei einer Temperatur von 14°. Auffallend iſt es, daß es noch keinem Arzte eingefallen iſt, in der Therapie ſowohl innerlich, als beſonders äußerlich davon Anwendung zu machen, indem er durch Zuſatz einer grö-

ßern oder geringern Menge Waſſer den Grad der Stärke deſſelben veränderte In dieſem Bezug darf man die wichtige Beobachtung Thenard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thieriſchen Organe und Gewebe ſämmtlich das oxygenirte Waſſer zerſetzen, nach Art der meiſten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundſtoffen abzugeben und ohne die kleinſte Menge Oxygen zu abſorbiren; ohne demnach die geringſte Veränderung zu erfahren, es ſey denn, daß das Peroxyd zu ſtark wäre. Sollte ſich dieß mit den lebenden Geweben ebenſo verhalten? Die Sache verdient eine Unterſuchung, und ſollte dieß auch nur ſeyn, um zu ſehen, ob es mit Thenard's Behauptung ſeine Richtigkeit habe oder nicht, daß die Eigenſchaft der thieriſchen Gewebe, ebenſo wie Platin, Gold und Silber, das Oxygen des oxygenirten Waſſers zu entbinden, wahrſcheinlich einer und derſelben Kraft zuzuſchreiben ſey, dieſemnach auch der Gedanke nicht unvernünftig ſey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten gehen und daß man auf dieſe Weiſe begreifen könne, wie ein Organ, ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüſſigkeit einwirken und ſie in neue Producte umändern könne.

P.

Paeonia.

Paeonia officinalis, L.; Päonie, Pfingſtroſe, Gichtroſe; Pivoine (*Gal.*); Peony (*Ang.*); Peonia (*His.*); Piwoniec (*Pol.*).

Ams An. Bor. Bor4. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. His3. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va.*

4 (Polyandria Digynia, L.; Papaveraceae, *J.*) Eine Pflanze des ſüdlichen Europa's. (*Blackw.* t. 65. 245. *Plenck* t. 432. *Hayne* V. t. 26. Düss. off. Pfl. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Paeoniae) iſt dick, lang, knollig und fleiſchig.

Friſch hat ſie einen unangenehmen und virdſen Geruch, welcher ſich nach dem Trockenwerden faſt ganz verliert. Der Geſchmack iſt bitter, ſüßlich, etwas ſcharf und ſchwach adſtringirend; die Schärfe verliert ſich durch Trocknen.

Die Blüthen (flores Rosae benedictae s. regiae) ſind roth. Friſch haben ſie einen unangenehmen Geruch und einen ſchleimigen, etwas bittern Geſchmack.

Der Saame iſt geruchlos und faſt ohne Geſchmack.

Conserva Paeoniae. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petalorum Paeoniae partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Pal. Wir.)

Sar. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo terere et pulpam in Sacchari clarif. part. tribus leviter coquere.

Faecula Paeoniae. (Wir. *T.*)

℞. Radicis recentis Paeoniae q. vis.
Raspa et pulpam in sacco e tela confecto inclusam prelo submitte; succo Aquae pauxillum adde, sepone, partem limpidam decantha, sedimentum aëris ope siccatum pulvera.

Aqua Paeoniae. (Gal. Pal. Sar. *T.*)

℞. Florum Paeoniae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal Sar.)

Gal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — *T.* ut aquam florum aurantii.

Extractum Paeoniae. (Fer. Wir.)

℞. Rad. Paeoniae concis.
libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.
Infunde per tres dies, tunc coque parumper; cola exprimendo et liquorem ad extracti consist. usque consume. (Wir.)

Fer. Coquere Radicis recentis libram unam in Aquae tribus, decoctum Albuminis ope clarificare et vaporando consumere.

Infusum Petalorum Paeoniae. (His. His3)

℞. Petal. recent. Paeoniae libras sex.
Aquae bullientis libras duodecim.
Infunde per horas octo, cola exprimendo et colaturam post aliquot tempus decantha.

Syrupus (Radicis) Paeoniae. (His. His3. Pal. Wir.)

℞. Rad. Paeoniae contus. uncias duas.
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Clarifica ut fiat syrupus. (His. His3.)

℞. Flor. rec. Paeoniae
libr. tres c. dimid.

Aquae font. bull. libras quatuor. Infunde per horas 24, cola exprimendo et in colat. unciis octodecim solve Sacchari albi uncias triginta duas. Serva. (Pal. Wir.)

Gabe, zwei bis drei Drachmen in einem Tranke.

Decoctum Carnis s. Jusculum antispasmodicum. (Bo.)

℞. Carnis vitellinae macrae unc. sex.
Rad. Valerianae,
— Paeoniae, sing. drach. unam.
Fol. Cichorii,
— Lactucae, sing. manip. dimid.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque et colaturae refrigeratae adde
Pulv. Fol. Aurant. semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas decem.

Auf einmal, Morgens nüchtern.

Jusculum antiepilepticum. (Bo.)

℞. Carnis vervecinae uncias quatuor.
Rad. Cichorii,
— Fragariae, sing. semunciam.
Fol. Cichorii,
— Boraginis,
— Lactucae,
— Agrimoniae, sing. semimanip.
— Melissae . pugillum unum.
Semin. Papav. albi semidrachmam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et colaturae adde
Rad. Paeoniae pulv.
scrupulos duos.

Morgens nüchtern zu nehmen.

Aqua Paeoniae composita s. epileptica. (*Gr*) Flor. Convall. libr. unam, Spir. ten. cong. duos c. dimid., Fl. Tiliae semilib, Flor. Paeon. unc. quatuor, Rad. Paeon. mar unc. duas c dimid., Radd. Dictam. albi, Aristoloch. long., sing. semidrach., Fol. Visci, Rut., sing. manip. duos, Sem. Paeon. decort. drachm. decem, Sem. Rut. drachm. quatuor c. dimid., Castor. Russ., Cubeb., Macis, sing. drachm. duas, Cinnam. sesquiunc., Flor. Rorism. pugill. sex, Flor. Stoech. Arab., Lavand., sing. pug. quatuor, Flor. Betonicae, Tunicae, Paralyseos, sing. pug. octo, Succi Ceras, nigr. libr. quatuor, destillent congii quatuor.

Species contra apoplexiam. (Pal. Wir.)

℞. Succini praeparati,
Cornu Cervi philos. praep.,
Ligni Aloës,
Rad. Paeoniae, sing. semunciam.
Corticis Citri . drachmam unam.
Sacchari perlati . . uncias tres.
Olei ess. Cinnamomi
guttas sedecim.

Fiat pulvis. *Completae* appellantur si addis
Ambrae griseae . semiscrupulum.
Moschi . . . . grana quinque.

Dieſes Pulver wurde ehedem bei Kopfſchmerzen, Schwindel, Schlagfluß und Epilepſie gerühmt. — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis contra tussim infantum s. anticatarrhalis. (Pal.)

℞. Rad. Paeoniae . . semunciam.
— Iridis Flor. . drachmas sex.
— Serpent. Virg. drach. duas.
Croci . . . drachmam unam.
Sacchari crystallis. unciam unam.

Fiat pulvis. — Gabe, eine Meſſerſpitze voll.

Pulvis epilepticus s. Marchionis s. antiepilepticus s. Paeoniae compositus s. de gutteta s. ad guttetam s. cephalicus s. de Carignan. (Bor4. Br. GalF. GalH. His. His3. Pal. Wir. *Ca. Dulk. Pie. Sp.*)

℞. Radicis Paeoniae,
Ammonii subcarb., sing.
part. unam.
Cornu Cervi praeparati,
Radicis Fraxinellae,
Visci querni, sing. . partes duas.
Succini praeparati partes quatuor.

Pulvera. (GalF. GalH. *Ca.*) — Dieß iſt der *Pulvis principis de Carignan* (princesse de C.). — Gabe, achtzehen Gran im erſten, ſechs und dreißig im zweiten, acht und vierzig im dritten, eine Drachme im vierten Jahre und darüber, bei convulſiviſchen Krankheiten.

℞. Radicis Paeoniae,
— Fraxinellae,
Visci querni, sing. . semunciam.
Seminum Atriplicis drachmas duas.
— Paeoniae,
Ungulae Alces, sing. semunciam.
Cranii humani praep. unc. unam.
Corallii rubri praeparati,
Hyacinthi praep., sing. semunciam.
Folia Auri . . . . . no. 50.

Tritura exacte. (Wir.) — Gabe, einen halben Scrupel bis halbe Drachme.

℞. Visci albi pulverati uncias duas.
Radicis Paeoniae,
Conchar. praep., sing. unc. unam.

Misceantur. Si requiritur, addere licet Auri foliati quantum libet. (Bor4)

℞. Radicis Paeoniae . sesquiunciam.
— Contrayervae,
Visci querni, sing. drachmas sex.
Rasurae Eboris,
— Cornu Cervi,
— Ungulae Alces,
Cranii humani praeparati,
Corallii rubri porphyrisati,

Hyacinthi praeparati,
Bezoar occid., sing.
sesquidrachmam.
Fiat pulvis subtilissimus. (His. His3.)

℞. Visci querni,
Radicis Fraxinellae,
— Paeoniae,
Semin. Paeoniae, sing. unc. unam.
— Atriplicis,
Corallii rubri praep., sing. semunc.
Ungulae Alces . unciam unam
Fiat pulvis subtilissimus. (*Sp.*)

℞. Visci querni,
Radicis Valerianae,
Magnesiae, singulorum semunciam.
Seminum Paeoniae,
— Polygoni,
Corall. rub. praep., sing.
drach. duas.
Fiat pulvis (*Pie.*) — Diese vier Formeln geben das Pulver, welches besonders *Pulvis ad guttetam* genannt wird

℞. Radicis Paeoniae . uncias tres.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Cornu Cervi,
Eboris usti,
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. praep. drachmas sex.
Folia Auri . . . . . no. 20.
Fiat pulvis. (Wir. *Sp.*)

Br. Paeoniae uncias tres, Visci, Cornu Cervi, Magnesiae, Eboris calcinati, Corallii rubri et albi, Nacrae Perlarum, sing. drachmas sex et Folia Auri no. 10.

Diese Formel giebt den *Pulvis epilepticus Marchionis*, *Pulvis Marchionis*. — Gabe, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

℞. Succi praeparati,
Nacrae Perlarum praeparatae,
Smaragdi praep., sing. semunciam.
Ligni Aloës,
Rad Paeoniae, sing. scrup. duos.
Unicornu marini,
Visci querni, sing. sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati uncias duas.
Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis cephalicus albus.* — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

℞. Radicis Paeoniae . semunciam.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Eboris calcinati,
— Cornu Cervi,
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. praep., sing.
drachmam,
Fiat pulvis. (Pal.) — *Pulvis epilepticus albus.*

℞. Radicis Paeoniae,
Semin. Paeoniae, sing. . semunc.
Unicornu marini,
Margarit. orient., sing. drach. duas.
Quinque Lapidum pretios., sing.
grana quadraginta quinque.
Castorei,
Visci,
Ungulae Alces,
Corallii rubri, sing. drachmas duas.
Cranii hum. praep
sesquidrachmam.
Pulveris Viperae drachmam unam.
Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epilepticus Cellarii.* — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme

℞. Radicis Paeoniae drachmas decem.
— Fraxinellae,
Visci querni, sing. drach. quinque.
Ligni Aloës,
Semin. Paeoniae, sing drach. tres.
Corallii rubri,
Nacrae Perlarum, sing semunciam.
Ungulae Alces . drachmas tres.
Succini albi,
Unicornu marini, sing.
drach. duas.
Carbonis Tiliae . sesquiunciam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.) — *Pulvis epilepticus niger.* — Gabe, von fünf Gran bis zu einem halben Scrupel bei Kindern; eine halbe Drachme bei Erwachsenen.

Dulk. Rad. Paeoniae unciam unam, Rad Dictamni, Visci albi, sing. dimidiam, Sem Paeoniae, Conchar praep., sing. duas, Succini praep. drachmas duas, Terrae sigill rubr. semunciam, Pulv. Carbon. uncias tres, Auri fol. q. s.

℞. Rad. Paeoniae,
— Gentianae, sing. unc. duas.
Herbae Betonicae,
— Chamaedryos,
— Quinquefolii majoris,
Florum Paeoniae,
— Convallariae,
— Violarum,
— Tiliae, sing. unciam unam.
Seminum Coriandri,
— Paeoniae,
Visci querni, sing. . semunciam.
Ras. Ungulae Alces uncias duas.
— — Asini drach. quinque.
— Cornu Cervi,
Cornu Cervi absque igne praeparati, singulorum unciam unam,
Cranii humani . drachmas sex.
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. orient, sing.
semunciam.

Digitized by Google

Folia Auri . . . . . no. 24.
Fiat pulvis. (Wir.) — *Pulvis epilepticus Holsaticus.* — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Opiatum antiepilepticum. (*Bo.*)

℞. Croci . . . . . semunciam.
Sennae mundatae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Seminum Paeoniae,
Salis Ammoniaci,
Jalapae,
Scammonii,
Hellebori nigri,
Acidi succin., sing. drach. unam.
Cinnamomi . . scrupulos duos.
Castorei . . scrupulum unum.
Conservae Paeoniae . . . q. s.

Gabe, anderthalb Drachmen, Morgens nüchtern. — Gewiß ist, daß die Päonie in diesem purgirenden Mischmasch eine höchst unbedeutende Rolle spielt.

Electuarium anthelminticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Ferri sulphurici,
Helminthochorti, sing. drach duas.
Rad. Valerianae sylvestris,
— Paeoniae, sing. . semunciam.
Folior. Aurantii . drach. quinque.
Aloës . . . drachmam unam.
Syrupi Paeoniae quantum sufficit.

Gabe, alle Morgen nüchtern eine Drachme bei Epilepsie mit Wurmcomplication. — Es gilt von diesem Präparat dasselbe, was von dem vorhergehenden gesagt wurde.

Panax.

Panax Quinquefolium, *L.*; fünfblättrige Kraftwurzel, Ginseng; Ginseng (*Gal.*); Yansam (*C.*); Garantogues (*Am.*); Ginseng, Ginzang (*J.*); Jin chen (*Ch.*); Garent oguen (*Ir.*); Nindsin, Usindsom (*Ja.*); Orkhoda (*Ma.*); Ginsao (*Lus.*); Orhota (*Ta.*).

Br. Fer. Gal. Wir. *A. Br. C. G. Gr. M.*

♃ (Polygamia Dioecia, L.; Araliaceae, J.) Eine Pflanze der Chinesischen Tartarei und Canada's (*Bigel.* Am. med. Bot. II. t. 9. *Woodw.* Med. bot. t. 99. *Sims.* Bot Mag t 1383. Dict d. Sc. nat. Cah. VI. Fl. méd. IV. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Ginseng) an; sie ist spindelförmig, fingerdick, zwei bis drei Zoll lang, außen röthlich und inwendig gelblich. Ueber ihrem Halse sitzt ein knotiges und gedrehtes Gewebe, auf welchem man die Spuren der alten eingegangenen Stängel sieht. Ihre Substanz ist halbdurchsichtig, derb und gleichsam hornartig. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist zuckerig, etwas bitter und schwach gewürzhaft.

Sie enthält viel Satzmehl und Schleimharz.

Die Völker Asien's betrachten sie ohne Grund als ein mächtiges aphrodisiacum.

Morsuli Ginseng. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Sacchari . . . . libras decem.
Varillae . . . . uncias decem.
Rad. Ginseng pulv. uncias quinque.
Tinct. Cantharid. drach. quinque.
Olei Cinnamomi . guttam unam.
Essentiae Ambrae guttas decem.
Mucilaginis . quantum sufficit.

Fiant morsuli granorum viginti quatuor ad triginta. — Gabe, vier oder fünf Stück täglich. — Diese Pastillen können schwere Zufälle hervorbringen, ohne selbst nur für den Augenblick Vermögen hervorzurufen, welche ohnmächtigen Wünschen nicht mehr entsprechen.

Panicum.

Panicum miliaceum, *L.*; Hirse; Millet (*Gal.*); Millet (*Ang.*); Hirse (*D.*); Hajo (*His.*); Geerst (*Bel.*); Miglio (*I.*); Proso (*Pol.*); Milho (*Lus.*).

Gal. His. His3. LP. *M. Gr. Re.*

☉ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine Pflanze, deren Vaterland man nicht kennt und welche in mehrern Gegenden Europa's gebaut wird. (*Zorn* Ic. pl. t. 349.)

Man wendet den Saamen (semen Milii s. Milii esculenti) an; er ist klein und rundlich, und enthält unter einer dünnen, rindigen, gelben, glänzenden, zweiklappigen Schaale ein weiße, mehlige Substanz.

Panis.

Mica Panis. albi etc.; Brodt, Semmel; Pain (*Gal.*).

Bor4.

Ptisana ex Pane. (B*. *Va.*)

℞. Panis tritici . . . uncias octo.
Aquae . . uncias triginta duas.

Coque per horam, colaturae adde Aquae evaporatae quantitatem aequalem.

Va. Micae Panis albi tosti q. s., Aq. bull. libr. duas. — Tassenweise, erweichend und schwach nährend.

Das mit geröfteter Roggenbrodtrinde bereitete Brodtwasser giebt ein angenehmeres, leicht adstringirendes Getränk.

Glasweise bei Reizungen der Nahrungswege.

Panada Anglorum. (*Au.*)

℞. Panis secalini tosti . uncias sex.

Cinnamomi . . semidrachmam.
Cortic. Citri recent. drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.
Coque et cola. — Colaturae addere potes Vitellum Ovi vel Aromata.

Decoctum album s. album Sydenhami s. Cornu Cervi compositum s. Sydenhami s. Cornu Cervi Elaphi compositum s Cornu Cervi cum Mica Panis. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. HassP. His. His3. LH. LP. Sar. Sax. *Ca. ParC. Pie. Ra. Re. Sp. Va. Vm.*)

℞. Cornu Cervi raspati uncias duas.
Micae Panis albi uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras sex.
Coquendo parte tertia consumpta, cola absque expressione. (Sar.)

℞. Cornu Cervi,
Micae Panis albi, sing.
drach. duas.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Sacchari albi . . quantum vis
Solve. (B*.)

℞. Rasurae Cornu Cervi uncias duas.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque et sub finem adde
Micae Panis albi . uncias duas.
Coquendo continua ad librarum duarum usque colaturam, cui adde
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Dissolve. (An. Bel.)

℞. Rasurae Cornu Cervi semunciam.
Micae Panis albi unciam unam.
Aquae communis . libras tres.
Coquendo tertiam partem consume et colaturae adde
Syrupi Cydoniorum uncias duas.
Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp. Char.)

℞. Cornu Cervi raspati,
Micae Panis albi, singul.
part. dimid.
Aquae . . . partes triginta sex.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde
Gummi Arabici partem quartam.
Dissolve. (Sax.)

Han. Cornu Cervi raspati, Micae Panis, sing. semunciam, Aquae libras tres coquendo ad duas consumendas et Gummi Arabici in colatura solvendi drachmas duas.

℞. Rasurae Cornu Cervi,
Micae Panis albi, sing. semunciam.
Aquae fontanae uncias triginta sex.
Coque ad remanentiam colaturae unciarum viginti quatuor, cui adde
Gummi Arabici sesquidrachmam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Dissolve. (HassP. *Sp.*)

Br. coquere Cornu Cervi raspati, Micae Panis, sing. semunciam, Gummi Arab. sesquidrachmam in Aquae libris tribus ad duas coctione consumendis et in colatura dissolvere Sacchari drachmas duas; — LH. Rasurae, Micae, sing. semunciam cum Aquae libris duabus ad unam decoquere, colare et in eo solvere G. Arab. drachmam, addere Syrupi communis unciam; — LP. Rasurae uncias duas, Aquae libras tres, coque ad duas et in colatura dissolve G. Arab. drachmas duas, Sacchari uncias duas (micam ob facilem acescentiam omittit).

℞. Micae Panis albi partem unam.
Coque per horam dimidiam cum
Aquae . . sufficiente quantitate ut colaturae uncias sexaginta quatuor obtineas, cui in fine adde
Gummi Arabici partem dimidiam.
Cornu Cervi usti partem quartam.
Sacchari . . partem dimidiam.
Cola per pannum; post refrigerationem decantha et adde
Aquae Cinnamomi part. dimidiam.
Misce bene. (*Vm.*)

Gal. *ParC. Re. Va.* Coquere Cornu Cervi calcinati drachmas duas cum Micae Panis sex (tribus *Re.*) et Sacchari uncia una, omnia in mortario contusa, in Aquae libris duabus (octario *Re.*) per octo sexagesimas; liquorem bullientem per pannum amplioris texturae leviter exprimendo colare et addere Aquae Florum Aurantiorum semunciam vel Aquae Cinnamomi drachmas duas; — GalM. Coquere per octo sexagesimas Micae Panis drachmas sex, Cornu Cervi vel Ossium aliorum ad alborem usque calcinatorum duas in Aquae q. s. ut colaturae octarius (litre) obtineatur, colare bullientem levis expressionis ope et addere Aquam essentialem Citri et Syrupum simplicem; — His. Hi 3. leviter coquere Cornu Cervi calcinati semunciam, Micae Panis uncias duas cum Aquae libris sex; colare et colaturae addere Syrupi communis uncias quatuor et si vis, Aquae Florum Aurantiorum vel Cinnamomi vinosae (hordeatae) drachmas duas; — *Ra.* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Aquae libras duas, Syrupi unciam et Tincturae Cinnamomi drachmam; — *Ca.* et *Pie.* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Sacchari uncias tres, Aquae bullientis libras duas et Aquae Cinnamomi semunciam.

Erweichend, lindernd, vortheilhaft bei chronischen Reizungen des Ernährungscanals, besonders bei hartnäckiger Diarrhöe angewendet. — Glasweise, stündlich. —

Man ſetzt oft mit Nutzen 10 bis 20 Tropfen laudanum hinzu.

Gelatina Panis s. e Pane. (B*. GalH. Pm. *Fi. Gr. Re. Vm.*)

℞. Micae Panis semisicc. unc. quatuor.
Aquae destillatae . . libras duas.
Coque fortiter, cola per cribrum et adde
Sacchari albi . . libram unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Misce. (GalH.)

Gr. Panis biscocti albi uncias quatuor, Aquae octarios quatuor, coque ad dimidium, exprime, vapora ad octarium, adde Sacchari albi libram, Vini rubri uncias quatuor, Aquae Cinnamomi unciam; — *Re.* Pulv. Pan. biscoct. uncias duas, Aquae quartmens. ad octarii rem., trajice, adde Sacch. unc. octo, Vini Portens. vitra duo, Ess. Limon. vel Tinct. Cardam. comp. (Biscuit jelly.)

℞. Panis biscocti albi partes quatuor.
Aquae . partes viginti quatuor.
Coque per horam dimidiam, cola per pannum, evaporando ad viginti quatuor partium remanentium consume et adde
Aquae Cinnamomi partem unam.
Succi Citri . . . . partes duas.
Sacchari albi . partes quatuor.
Vini Rhenani . . . partes sex.
Misce. (B*. *Vm.*)

Pm. *Fi.* Panis (triticei) biscocti uncias sex, Aquae libras decem, coque per horam, cola et ad uncias novem consume, tunc adde Vini Hisp. uncias duas, Aquae Cinnamomi lacteae drachmas duas, Succi Limonum rec. semunciam, Sacchari pulv. sesquiunciam.

Cataplasma de Mica s. Medulla Panis s. Panis s. emolliens. (B*. Fer. Ful. Gal. Pm. RC. *Be. Br. Fi. Gr. Re. Sp. T.*)

℞. Micae Panis vetusti rasae uncias quatuor.
Lactis vaccini vel Decocti Althaeae sesquilibram.
Coque ad consist. requisitam. (Gal.)

Br. Micae Panis uncias decem et quindecim Lactis absque coctione miscere; — *B.* simul coquere Lactis libras quatuor et unam Panis; — RC. Micarum Panis veterum q. vis, Aquae fontanae vel Lactis q. s.; — Pm. Medullae Panis triticei rasae libram unam, Aquae fontis q. s., coque in sartagine ad libras tres; — *Re.* sec. *Abernethy* Medullam cum Aquae bullientis q. s. impraegnare et seponere ut tumescat; — *Fi.* Micae uncias tres, Lactis libram; — *T.* Micae partem unam, Lactis quatuor (addendo Malvae sicc. q requiritur, habes *Cataplasma Panis, Lactis et Malvae (T.)* cujus libras cuique scrupuli duo vel tres Croci addi possunt, quo majorem vim resolventem accipiat); — *Gr.* Micae, Farin. Lini, sing. partes aeq., Lactis ferv. q. s.

℞. Micae Panis . . uncias sedecim.
Pulv. Flor. Meliloti,
— — Sambuci, sing. drach. duas.
Lactis . uncias quadraginta octo.
Coque sufficienter. (*Sp.*)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Butyri recentis . . uncias duas.
Lactis vaccini . . uncias octo.
Coque simul. (B*. Ful.)

Man muß das Brodt, bevor man es in der Milch kocht, mit etwas Waſſer kochen, um die in ihm enthaltene Eſſigſäure auszutreiben.

℞. Micae Panis . uncias quindecim.
Lactis . . . . . uncias viginti.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Micam in aqua mollefactam cola per crinium et cum lacte coque. (Fer.)

Cataplasma acetatum. (RC.)

℞. Micarum Panis vel Farinae cujuslibet . . . . . quantum vis.
Aceti . . . . . quantum satis ut fiat cataplasma. — Bei Ekchymoſen, Excoriationen, Verbrennungen, ſcrophulöſen Knochengeſchwülſten ꝛc.

Spiritus Panis. (Wir.)

℞. Panis triticei biscocti quantum vis.
Destillet lente ex arena in cucurbita vitrea, igne gradatim aucto, spiritum ab oleo supernatante separa et rectifica.

Gr. Spiritum Panis secalini acidum e Pane secal. desillatione et rectificatione paratum indicat.

Aqua Panis. (Wir. *Sp.*)

℞. Crustae Panis teneris et adhuc calidi . . . uncias quatuor.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. semunciam.
Vini albi . uncias nonaginta sex.
Destillet dimidia pars. — Ein angenehmes Magenmittel. — Gabe, eine halbe Unze.

Papaver.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Papaver Rhoeas, L.*; Klatſchroſe, Klapproſe; Coquelicot (*Gal.*); Red poppy (*Ang.*); Plany neb wlej mak (*B.*); Klapperose (*D.*); Amapola (*His.*); Klap-

perroos (*Bel.*); Rosolaccio (*I.*); Papoleira (*Lus.*); Kornros (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. DD. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. Li. Lon. LonN. O. Pol. Sax. Wir. Wür. WW. *B. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va. Z.*

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 2. *Plenck* t. 418. *Hayne* VI. 38. *Curt.* Fl. Lond. III. t. 32. Düss. off. Pfl. VIII. t. 4. Fl. méd. III. 134.)

Man wendet die Blüthen (Flores s. Petala Papaveris erratici s. Papav. Rhoeadis s. ruhri s. Rhoeadis s. Rhoeados) an; sie bestehen aus eirunden, ganzrandigen, rothen Blättern. Frisch haben sie einen widerlichen, nach dem Trocknen gar keinen Geruch. Ihr Geschmack ist schleimig und etwas bitter.

Sie enthalten, nach Riffard, einen fetten gelben Stoff, einen rothen Färbestoff, Schleimharz und Pflanzenfaser.

Man betrachtet sie als beruhigend und etwas narkotisch, aber sie sind fast nur erweichend und lindernd. Sie dienen bei nicht sehr heftigen Lungencatarrhen, weniger jedoch durch sich selbst, als vielmehr durch das Wasser, welches zum Aufgießen angewendet wurde.

3) *Papaver somniferum*, (*album et nigrum*), *L.*; Mohn; Pavot blanc (*Gal.*); Poppy (*Ang.*); Khuschkhasch (*Ar. Duk.*); Bily mak (*B.*); Ying-suh (*C.*); Gaysagussa (*Can.*); Abin atta (*Cy.*); Valmue (*D.*); Adormidera (*His.*); Post (*Hin. Sa.*); Tamme heul (*Bel.*); Papavero (*I.*); Kes (*J.*); Dormideira (*Lus.*); Kuknar (*Pe.*); Mak bialy (*Pol.*); Wallmo (*Suec*); Casa Casa (*Tam.*); Cassa Cassa (*Tel.*)

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va. Z.*

Eine ursprünglich im Orient einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze. (*Lam.* III. t. 451. *Blackw.* t. 482. 483. *Plenck* t. 417. *Bull.* Herb. t. 57 Düss. off. Pfl. VII. t. 24. X. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 371. *Bert.* Bild. I. 99. f. 1.)

Man wendet die Blüthen, die Frucht und den Saamen an

Die Früchte, Mohnköpfe (capita s. capitula s. capsulae Papaveris s. Papaveris albi) sind kugelige oder eiförmige Kapseln, welche von der in zehen und mehr strahlig auseinandergehende Lappen getheilten Narbe, unter der eben so viele Löcher liegen, gekrönt wird. Der Geruch ist bei der frischen Frucht betäubend, bei der trocknen aber gar nicht mehr zu bemerken. Der Geschmack ist bitter und scharf.

Diese Kapseln haben eine beruhigende und narkotische Wirkung. Sie liefern im Orient das Opium; in Europa findet man in ihnen zwar auch alle Bestandtheile desselben, jedoch in einem sehr verschiedenen Verhältniß, über welches die Chemiker, die sich mit dieser Untersuchung beschäftigt haben, noch getheilter Meinung sind.

Der Saame (semen Papaveris albi s. nigri s. coerulei) ist sehr klein, nierförmig, etwas runzelig, graulich oder bläulichweiß oder schwärzlich. Das durch Auspressen daraus gewonnene Mohnöl (huile d'oeillette) ist mild und sehr wohlschmeckend.

Conserva Rhoeadis. (Pal. Wir. *Ca. T.*)

℞. Flor. Rhoeadis rec. part. unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere. (Pal. Wir.)

℞. Fol. sicc. Rhoeados pulv. part. unam.
Sacchari pulverati partes quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Misce triturando. (*Ca.*)

T. Petalorum pulv. uncias tres, Aquae Rhoeados q. s., stent per horas 8 vel 10 in vase clauso, donec pulvis mollis fiat, adde Solutionem Sacchari albi librarum duarum in Aquae Rhoeados unciis octo in balneo aquae, tunc conjunctis adde Sacchari albi subtiliss. pulv. uncias octo etc.

Aqua Papaveris erratici s. Rhoeados. (Gal. Pal. Sar. *T.*)

℞. Florum Rhoeados partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post sufficientem macerationem destillent partes duae. (Gal. Sar. *T.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Extractum Papaveris erratici s. Rhoeadis. (Br. Fer. Sar. *Pid. Vm.*)

℞. Capitum Rhoeadis ante decidentiam petalor. decerpt. libram unam.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque per horam et exprime succum, qui ad extracti consist. evaporet. (*Pid.*)

Br. tres dies digestionis in Aquae fervidae libris tribus et tunc levem ebullitionem indicat.

℞. Flor. Rhoeados recent. . q. vis.
Contusos in mortario macera per horas 12 in Aquae calidae pondere du-

plo, cola per crinium, parumper spatulae ligneae ope exprimendo, clarifica liquorem Albuminis ope et ad extracti consistent. consume. (Fer. *Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rhoeados contusorum . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillatione in aquae balneo Aquae uncias circiter duas abstrahe, residuo Aquae triplum infunde et post horas sex digestionis coquendo trientes duos consume; liquorem clarifica, cola et ad electuarii consist. consume, cui nonnisi tepido Aquam destill. affunde. (Sar.)

Bei heftigem Huſten, hartnäckiger Diarrhöe, Lungenſchwindſucht und in Fällen empfohlen, wo ein gelindes paregoricum angezeigt iſt. — Gabe, von zehen Gran bis zu einem Scrupel für einen Erwachſenen.

Infusum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Sar. *Ra. Vo.* Char.)

℞. Florum Rhoeados drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde. — Erweichend, als gelind narkotiſch betrachtet und in dieſer Eigenſchaft bei Nervenſchmerzen angewendet. — Glasweiſe.

Syrupus (Florum) Papaveris Rhoeados s. erratici s. rubri s. Rhoeados s. Rhoeadis s. de Papavere erratico (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Gal. Gen Ham. HassP His. His3. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pol. Wir. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Petal. Rhoeados recent
libr. quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo.
Infunde per horas 12 in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Fiat caloris balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Ams. Florum libram unam, Aquae bull. quatuor, horas duodecim macerationis et ebullitionem usque ad dimidii consumpt., solutionem Sacchari librae unius in colatura depurata et coctionem ad consist. requisitam; — B. Bel. Bor. Han. O. et Pol. Florum libram unam, Aquae bull. duas, horas duodecim infusionis et Sacchari libras tres; — Bor4. Florum uncias duas, Aquae libras duas, digestionem per noctem et parationem syrupi cum colatura unciarum viginti et Sacchari albissimi libris tribus; — HassP. Florum uncias tres, Aquae ferv. libras duas et uncias quatuor, ad colaturam unciarum viginti Sacchari libras tres ut fiat syrupus; — D. Florum sesquilibram, Aquae bull. libras tres, infusionis horas 12, coctionem ad dimidii remanent. et parationem syrupi additis Sacchari libris tribus; — Du. et *C* Florum libram unam, Aquae bull. uncias viginti, horas 12 infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — His. His3. Florum libram unam, Aquae duas, 8 horas infusionis et libras quatuor Sacchari; — Lon. LonN *Gr. Re.* Florum libram, Aquae octarium et uncias duas, horas 12 infusionis et Sacchari libras duas cum dimidia; — *Gr.* praeterea: Florum libras quatuordecim, Aquae quadraginta octo, Sacchari nonaginta unam; — Pal. Florum sesquilibram, Aquae bull. libras tres, infusionis horas 24 et tres libras Sacchari; — Br. et Wir. Florum libras duas, Aquae tres, 24 horas infusionis et Sacchari libras quinque et uncias quatuor; — Gen. Florum uncias tres, Aquae bull. libras tres, decoctionem, macerationem per horas 12 et Sacchari libras sex; — Li. Florum sicc. libram unam, Aquae bull. quinque, horas 12 digestionis, coctionem colaturae ad dimidii remanent. et Sacchari libras tres; — *Fi.* Florum libram unam, Aquae bull., Sacchari albi, sing tres et infusionem per horas 24; — *T.* Florum libras duas, Aquae bull. octo, digestionem 12 horarum in loco tepido, additionem librarum quindecim Sacchari et parationem syrupi in balneo aquae bulliente.

An. *Sw.* et *Vm.* petala in mortario marmoreo contundendo in pulpam redigere; — An. et *Vm.* Florum partem unam et Aquae bull. unam cum dimidia et horas 12 infusionis; — *Sw.* Florum partem unam, Aquae tres et horas 24 infusionis; — *Vm.* Sacchari partes duas pro tribus colaturae; — An. in colatura dissolvere Sacchari uncias octo et *Sw.* partes quatuor praescribit.

Infusum bechicum. (*Sm. Va.*)

℞. Florum Rhoeados . uncias duas.
Infunde
Acidi sulph. tenuis
gutt. quindecim.
Adde
Sacchari albi . . . uncias duas.
Infunde totum in
Decocti Hordei perlati libra una.

Va. Sacchari unciam unam, reliqua ut antea.

In vierundzwanzig Stunden, zu zwei oder drei Löffel auf einmal zu verbrauchen, beſonders bei den Anfällen des Huſtens.

Morsuli Rhoeados. (Fer. *T.*).

℞. Infusi Rhoeados . . libras sex.
Sacchari . . . libras quatuor.
Clarificata coque ad aptam consist., in laminam marmoream effunde et in tabellas concide.

T. Decocti Papaveris clarificati libram unam, Sacchari albi duas.

Acetum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Wir.)

℞. Florum Rhoeados . semilibram.
Aceti rubri . . . . libras tres.
Macera soli exponendo per dies aliquot et cola exprimendo.

Tinctura Papaveris Rhoeados s. erratici. (Pal.)

℞. Conserv. Flor. Rhoeados unc. unam.
Flor. Rhoeados cum Acidi sulphurici q. s. adspers. manip. tres.
Aquae destillatae Succi Florum Rhoeados . . uncias triginta.
Digere per horas viginti quatuor, exprime fortiter et adde
Syrupi Succi Florum Rhoeados cum pauxillo Acidi sulphurici impraegnatorum . . . uncias octo.
Schwach reizend, ehedem häufig bei sogenannten bösartigen Fiebern zu einem Löffel in einem Trank oder Julep angewendet.

Tinctura Florum Papaveris s. Papaveris. (Br. Sax. Wir. *Gr.*)

℞. Florum Papaveris albi semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Aquae Flor. Papav. uncias quatuor.
Digere per hor. 24, exprime et filtra.
Beruhigend. — Gabe, eine halbe bis eine Unze. (Br. Wir.)
Sax. Florum sesquiunciam, Acidi semunciam, Aquae bull. uncias duodecim et horas 12 macerationis.
Gr. Herbae cum Floribus in umbra sicc. et pulv. uncias quatuor, Spirit. tenuioris octarium, digere per septimanam et exprime.
Tinctura (Capsularum Papaveris (Re.); Caps. pulv. Papav. alb. uncias quatuor, Spir. ten. octarium; digere per dies quatuordecim et filtra.

Oleum (Seminis) Papaveris albi s. somniferi. (A. Ba. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. HassP. His. HisS. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Seminum Papaveris quantum vis.
Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope, et in saccum e tela confectum (cannabinum) inclusa frigide exprime.
Bor. HassP. prelum in Aqua bulliente calefacere; — Br. Pal. et Wir. Semina antequam exprimuntur, parumper torrere. — Bor4. oleum venale indicat.
Schmerzstillend und schlafbefördernd.

Pulvis pectoralis. (*Pie.*)

℞. Semin. Papav. albi drachm. quinque.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae,
Amyli, sing. . . sesquidrachmam.
Seminum Portulacae,
— Althaeae,
— Gossypii,
— Malvae,
Quatuor Seminum frigidorum,
Cort. Cydonior., sing. drachm. duas cum dimid.
Tutiae praeparatae,
Succini,
Pulveris Liquiritiae,
Sacchari, sing. . sesquidrachmam.
Gabe, zwei Drachmen in Mohn- oder Brustbeersyrup.

Electuarium incrassans. (*Bo.*)

℞. Conservae Rosarum unciam unam.
Syrupi Violarum . . uncias duas.
Semin. Papav. albi drachmas tres.
Olei Nucis moschatae grana sex.
Bei hartnäckigem Husten. — Gabe, ein Kaffeelöffel alle zwei Stunden.

Emulsio temperans. (*Pie.*)

℞. Quatuor Semin. frigidorum unciam unam.
Semin. Papav. albi . uncias duas.
Tere, addendo sensim
Aquae Liliorum,
— Rosarum, sing. uncias tres.
In colatura dilue
Syrupi Limonum,
— Nymphaeae, sing. unciam unam.

Species anodynae. (Ful. LH. LP. Pal. Wür. *Sw.*)

℞. Capitum Papaveris libram unam.
Radicis Althaeae,
Seminis Lini, sing. . semilibram.
Concisa et contusa misce. (Ful.)
Zum Klystir.
℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Florum Chamomillae,
Fol. Verbasci, sing. . uncias tres.
Concisa misce. (Ful.) — Zur Bähung.
℞. Capitum Papaveris drachmas duas.
Foliorum Menthae piperitae,

Flor. Chamomillae, sing.
manip. dimid.
Concisa misce. (*Sw.*)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Flor. Sambuci, sing. unciam unam.
Croci . . . . drachmas duas.
Capit. Papav. albi uncias quatuor.
Concisa misce. (Wür.)

LP. Hyoscyami, Sambuci, singularum unciam unam, Capitum Papaveris albi tres, Croci drachmas tres; — LH. Fol. Hyoscyami, Flor. Sambuci, Capit. Papaveris, sing. part. aeq.

℞. Capit. Papav. albi c. Seminibus concis. et contus.,
Semin. Anethi, sing. uncias duas.
Herbae Hyoscyami,
— Cynoglossi,
Solani nigri,
Fol. Chamomill., sing.
manipulos duos.
Concisa et contusa misce. (Pal.) — Zum Bähen.

Species pro fotu laterali s. ad pleuresiam. (Pal.)

℞. Radicis Althaeae,
Capit. Papav. contus. c. Granis,
sing. unc. duas.
Seminum Lini,
— Foenu graeci,
— Cumini,
Baccar. Lauri, sing. unc. unam.
Herb. Malvae,
— Matricariae, sing.
manip. tres.
Florum Chamomillae manip. duos.

Aqua Papaveris alba (*Gr.*): E Floribus. — Narkotisch.

Extractum Papaveris albi s. Capitum Papaveris somniferi. (Br. Han. Lon. LonN. *C. Gr. Re. Vm.*)

℞. Capitum Papaveris a seminibus liberatorum . . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Decoque ad dimidii remanent., cola bene exprimendo et in balneo aquae ad mellis spissi consist. consume.

Narkotisch, schmerzstillend, schlafmachend. — Gabe, ein bis zwei Gran, ein oder zwei Mal täglich.

Decoctum Papaveris s. Capitum Papaveris. (Br. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

℞. Capit. Papav. contusorum
unc. quatuor.
Aquae communis octarios quatuor.
Coque per horae quadrantem et cola.

In Bähungen, besonders bei mit Schmerzen verbundenen Abscessen und Excoriationen. Man muß sich jedoch erinnern, daß alle sogenannte narcotica auf der Epidermis beraubte Stellen angewendet, sehr häufig die Schmerzen vermehren, statt sie zu mildern.

Clyster anodynum, Papaveris, leniens (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.). Decocta de 1) Capitum Papaveris semuncia et Aquae libra; 2) Capitum Papaveris drachmis tribus et libra Aquae (Hosp. Inf.); 3) denique ex uno Capite Papaveris et duabus libris Decocti emollientis s. Lini (H. de la Mat.)

Enema anodynum. (*Re.*): Decocti Capit. Papaveris uncias duodecim, Decocti Chamomillae octo, misce. — Bei Peritonealirritation ꝛc.

Fomentatio leniens ejusd. paratur coquendo Capita duo Papaveris in Aquae et Decocti emollientis, sing. libris duabus.

Lotio sedativa (*Sw.*). Decoctum Capitum Papaveris semilibrae in Aquae libris duabus ad unam libram colaturae redigendis, cui interdum addi possunt Sublimati corrosivi grana viginti vel Plumbi subacetici liquidi drachma una ad tres.

Fomentatio anodyna. (Pal. *Sa.*)

℞. Specierum anodyn. (Pal.)
semilibram?
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et cola (Pal.)

℞. Capitum Papaveris . uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coque ad librae unius colaturae remanentiam et adde
Aceti . . . . . unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)

Fomentatio antipleuretica. (Pal.)

℞. Specierum ad pleuresiam (Pal.)
semilibram. (?)
Lactis vaccini vel Aquae lib. octo.
Decoque ad dimidii remanentiam et cola. — Erweichend, auflösend, schmerzstillend. — Bei Pleuresie empfohlen, wenn die Entzündung nicht zu heftig ist.

Cataplasma anodynum. (LH.)

℞. Farinae Seminis Lini uncias tres.
Decocti Papaveris et Solani q. s.
Fiat blando igne cataplasma.

Gargarisma leniens s. sedans. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Capita Pavaveris . . . . no. 2.
Seminis Lini . drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Colaturae adde
Syrupi Mellis . drachmas duas.

Injectio emolliens s. emolliens et anodyna. (*Ca. Va.*)

℞. Decocti Capit. Papav. . libram.
Emulsionis comm. unc. quinque.
Albuminis Ovi rec. drach. unam.
Bei hitziger Blennorrhagie empfohlen.

Potio leniens. (*Sm.*)

℞. Seminis Lini . . drachmas duas.
Caput Papaveris . . . . no. 1.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque per horae quadrantem ad unciarum octo colaturam et adde
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Eßlöffelweiſe in vier und zwanzig Stunden, bei Diarrhöen mit vielem Schmerz.

Jusculum pectorale. (*Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Pulli gallinacei macri part. dimid.
Rad. Napi in frusta concis. no. 1.
Aquae . . . . octarium unum.
Coquendo partem quartam consume, in fine addendo
Capitum Papaveris scrupulos duos ad drachmam unam.
Colaturae adde
Sacchari crystallis, uncias quatuor.
Va. Aquae libras duas, Capit. Papav. drachmam, reliqua ut antea.
Gabe, Morgens und Abends zwei Gläſer.

Liquor ad nephritidem calculosam. (*Ca. Sw.*)

℞. Capit. Papaveris unc. quatuor ad octo.
Aquae bullientis . . libras duas.
Coque ad unciarum octo remanentiam, exprime et adde
Nitri depurati . . unciam unam.

Lotio anodyna. (*Sm.*)

℞. Capitum Papaveris unciam unam
Aquae . . . . . octarios duos.
Coque ad dimidii remanentiam et colaturae refrigeratae adde
Ammoniaci liquidi unc. unam ad duas.

Syrupus (*capsularum*) *Papaveris s. Papaveris albi s. Papaveris somniferi s. de Meconio s. Meconii s. de Papavere albo s. Diacodion s. de Capitibus Papaveris s. Diacodii s. Diacodium liquidum Montani.* (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass HassP His. Hi3 Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Sar. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*).

℞. Capit. Papav. albi absque seminib. et grossiuscule contusorum partes tres.
Aquae fervidae partes quindecim.
Infunde calore 30 ad 40° per horas 12, exprime fortiter et parti uni colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duas.
Solve. (Ba.)
Li. Papaveris libram unam, Aquae bull. quinque, infusionis horas 12 et pro libris duabus colaturae Sacchari libras quinque.
℞. Capit. Papav. c. Seminibus uncias octo.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)
Sp. Sacchari libras quatuor; — Gen. Papaveris libram unam, Aquae sedecim et quatuor Sacchari; — Fer. Papaveris libram unam, octo Aquae et quatuor Sacchari.
℞. Capit. Papav. albi matur. et sicc., absque semin., concis. et contus. libram unam.
Aquae bullientis . . libras octo.
Digere per horas 12, tunc in balneo aquae ad consumpt. dimidii usque evapora; liquorem sepone et adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)
Du. infundere Capitum non matur. sicc. absque seminibus libram unam in Aquae bull. tribus per horas 12, colare cum expressione, liquidum leni calore ad libram unam consumere, colare per pannum, seponere per horas 6, decanthare et addere Sacchari pulv. uncias viginti novem (q. s. *Gr.*).
℞. Capitum Papaveris albi fere sicc. absque seminibus, concis. et contusorum . . . libram unam.
Aquae bullientis . libras triginta,
Digesta per horas 12 coque et ad librarum liquidi octo remanentiam, cola exprimendo, ad dimidium consume, sepone ut subsideant et adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Fiat coquendo syrupus. (Bel.)
Hass. *Pid.* Macerare per horas 24 Papaveris libram unam in Aquae octo, coquere deinde, pro unciis novenis colaturae addere Sacchari uncias sedecim et semel ebullire; — HassP. Capitum semilibram, Aquae ferv. libras quatuor macerare per horas 24, probe digesta fortiter exprimere et novenis unciis colaturae addere Sacchari albi uncias sedecim etc.; — Wür. Papaveris uncias octo, Aquae libras duode-

cim, 12 horas macerationis, consumpt. ad partem tertiam, colare, ad dimidium evaporare et addere Sacchari libras duas cum dimidia; — *Vm.* Macerare Papaveris partem unam in Aquae quatuor per horas 6, addere Aquae octo, coquendo ad sex redigere, et syrupum cum Sacchari partibus sex parare; — *Sw.* Macerare per horas 12 Papaveris libras duas in Aquae triginta, trientes duos consumere, colare cum expressione, colaturam ad dimidium evaporare, colare et syrupum parare cum Sacchari libris quatuor; — Ams. Macerare per horas 12 Papaveris libram unam in Aquae bull. viginti quatuor, dodrantem consumere, colare cum expressione, ad dimidium evaporare, denuo colare, sepositione depurare et cum Sacchari libris tribus syrupum parare; — His. His3. Macerare per horas 12 Papaveris uncias sedecim in Aquae tepidae libris viginti, trientes duos consumere, colare, addere Sacchari libras quatuor cum Aquae q. s., Albuminis ope clarificare et ad syrupi consist. coquendo inspissare; — Ed. *Gr.* Infundere per horas 12 Papaveris partem unam in Aquae quindecim, trientes duos consumere, colare, ad dimidium usque evaporare et cum Sacchari partibus duabus syrupum parare; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Macerare per horas 24 Papaveris uncias quatuordecim in Aquae octariis viginti, coctione in balneo aquae ad sedecim redigere, colare exprimendo, ad octariorum duorum remanentiam denuo consumere, liquorem bullientem colare, seponere per horas 12, decanthare, denuo ad octarium unum evaporare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare; — *Gr.* praeterea: Capitum libras quinque et uncias quatuor, Aquae q. s., Sacchari libras triginta quinque; vel: Capitum libras duodecim, Sacchari quadruplum; — B. Infundere per horas 24 Papaveris libram unam in Aquae triginta et ad octo redacta colare, iterum pro dimidio consumere, reponere, decanthare et cum Sacchari albi libris tribus syrupum parare; — Lus. Macerare per horas 12 Papaveris libras duas in Aquae viginti quatuor, coquendo trientes duos consumere, colare, iterum ad dimid. evaporare et cum quatuor libris Sacchari syrupum parare; — Sar. Infundere per horas 24 Papaveris libram unam in octo Aquae, tunc coquere, colare exprimendo et colaturae unciis novem Sacchari sedecim addendo syrupum parare; — Gen. Digerere per horas 24 Papaveris libras duas in octo Aquae, coquendo dimidium consumere et cum libris quatuor Sacchari syrupum parare; — *C.* Macerare per horas 12 Papaveris partem unam in Aquae quindecim, coquendo quadrantes tres consumere, colare exprimendo, denuo ad dimid. evaporare et addere Sacchari partes duas; — Ful. Macerare Papaveris libram unam in Aquae quatuor, coquendo ad dimid. redigere et addere Sacchari ad plumam cocti libras duas; — *T.* Capitum uncias sex, Aquae calidae circa 60° C. libras quatuor; infunde per horas 12, cola; residuum per aequale tempus infunde cum Aquae bull. libris duabus; liquoribus commixtis et ad dimid. evaporatis adde Sacchari albi libras duas vel Syrupi Sacchari libras tres ut fiat evaporando syrupus.

Pm. Capsular. a seminibus liberat. uncias quatuor, Aquae comm. libras sex, infusionem et brevem coctionem deinde dissolutionem Sacchari albi librarum quatuor in colatura expressa, clarificationem etc.

℞. Capit. Papav. contus. absque seminibus . . . . libras duas.
Aquae pluvialis . . libras viginti.
Macera per horas 24, sensim ad ebullitionem usque calorem augendo; cola, sedimentum denuo coque per horae quadrantem cum
Aquae . . . . . libris decem.
Cola, fortiter exprimendo; liquoribus commixtis et ad dimid. evaporatis adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Clarifica et ad aptam consist. coque. (An.)

Fi. Capitum libram unam macerare cum Aquae pluvialis libris octo per horas 12, tunc per horam dimidiam coquere, solvere in colatura Sacchari libras quatuor et clarificata ad syrupi consist. decoquere.

℞. Capit. Papav. siccorum unc. quatuordecim.
Radicis Liquiritiae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras octo.
Macera per noctem, coquendo dimidium consume, cola fortiter exprimendo, adde
Sacchari albi . . libras quatuor et coquendo syrupum para. (D.)

O Papaveris uncias sedecim, Liquiritiae unam, Aquae libras octo, 12 horas macerationis, consumptionem partis dimidiae et Sacchari libras quatuor.

℞. Capitum Papaveris concisorum absque seminibus uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras octo.

Decoque ad librarum trium remanentiam et adde sub finem
Rad. Liquiritiae rasae uncias duas.
Cola fortiter exprimendo et liquori adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Clarifica et ad syrupi consist. coque. (A.)

℞. Capitum Papaveris non maturorum cum Seminibus . uncias duas.
Siliquae dulcis unc. duas c. dimid.
Aquae fontanae . sesquilibram.
Coque leni igne ad unciarum decem liquidi remanentiam, sub finem addendo
Liquiritiae rec. minutim concis. sesquiunciam.
In colatura solve
Sacchari albi . uncias sedecim.
Despuma et cola. (Han. Pal. Wir. *Sp.*)

Bor4. Capitum, Siliquarum dulcium absque seminibus, sing. concis. uncias tres, Liquiritiae uncias duas, coquere cum Aquae comm. libris decem ad duarum c. dimid. remanent. et colaturae addere Sacchari albissimi libras duas.

Syrupus Diacodium s. Papaveris crocatum. (Wir.)

℞. Syrupi Diacodium simplicis unciam unam.
Crocci pulverati grana quindecim.

Syrupus Papaveris anisatus. (*Vm.*)

℞. Olei Anisi . . drachmam unam.
Mucilag. G. Arab. sesquidrachm.
Fiat emulsio, cum qua commisce
Syr. Papav. albi unc. sexaginta quatuor.

Syrupus pectoralis anglicus. (*Ca.*)

℞. Dactylorum . . . libras duas.
Jujubarum . . . libram unam.
Radicis Liquiritiae . semilibram.
— Althaeae,
Capilli Veneris Canadensis,
Capit. Papav. albi, sing. unc. quatuor.
Coque, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Evaporent ad syrupi consist. usque.
Cochrane's cough medicine (*Re.*); E Decocto Capitum expresso a seminibus liberatorum et denuo cum Aceto et Saccharo brunneo ad syrupi consistent. cocto, addita Acidi sulphurici q. s. ad acorem gratum.

Potio anodyna, leniens, hypnotica, gummosa opiacea, Julep narcoticum, anodynum s. pectorale, Mistura anodyna pro infantibus. (Gal. *Gr. Pie. Ra. Re. Va.* Hosp. Char.)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Syr. Diacodii s. Opii semunciam.
Misce. (*Ra. Va.*)

℞. Aquae Cichorii uncias tres vel quatuor.
Syr. Diacod. drachmas quatuor ad sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Infusi Tiliae,
— bechici, sing., uncias duas.
Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
Syrupi Diacodii . . semunciam.
Misce. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Syr. Diacod unciam unam, Aq. Flor. Aurant. drachmas duas, Solut. G. Arab, Infus. bechic., sing. unciam unam, Infus. Tiliae duas, Syr. simpl. semunciam.

℞. Aquae Flor. Aurant. semunciam.
— Lactucae . . uncias tres.
Syrupi Diacodii . drachmas duas.
Misce. (Gal. *Re.*)

℞. Aquae Florum Aurantii,
— Lilior., sing. sesquiunciam.
Syrupi Diacodii,
— Boraginis, sing. semunciam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Aquae Flor. Aurant. . unc. unam.
— Melissae . . uncias tres.
Syrupi Sacchari,
— Diacodii, sing. unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Syrupi Diacodii unciam dimid. ad unam.

℞. Aquae Rhoeados,
— Farfarae,
— Nymphaeae, sing. unc. duas.
Oculor. Cancror. praeparat. grana viginti.
Syrupi Diacodii . drachmas sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae, sing. unc tres.
Syrupi Diacodii . . uncias duas.
Misce. (*Pie.*)
Löffelweise.

℞. Testarum praeparatarum drachmas duas.
Syrupi Papaveris albi unciam unam.
Spiritus Ammoniae foetidi sesquidrachmam.
Olei Anethi . . . . guttas tres.
Aquae destillatae , uncias tres.
Gabe, 1 bis 2 Drachmen alle 4 Stunden. (*Gr.*)

Gargarisma leniens. (*Ra. Va.* M. de Santé.)
Decocti Amyli . . uncias octo.

Syrupi Diacodii . unciam unam.

Mixtura pectoralis. (*Sa.*)

℞. Syrupi Diacodii . uncias duas.
Olei Amygd. dulcium
uncias quatuordecim.

Linctus opiatus. (*Gr.*): Syrupi Papaveris uncias duas, Mucilag. Acaciae ver., Confect. Rosar. canin., sing. unam, Acidi sulph. dilut. drach. duas.

Enema ad diarrhoeam. (*Va.*)

℞. Syrupi Diacodii
drachmas duas ad quatuor.
Decocti Amyli . . uncias octo.
Misce. — Bei colliquativen Diarrhöen u. ſ. w. der Kinder.

Emulsio bechica. (*Sa. Sm.*)

℞. Seminum Melonum uncias tres.
Aquae Hordei . quantum sufficit ut fiat emulsionis libra una; colaturae adde
Syrupi Diacodii . unciam unam.
Misce bene. (*Sa.*)
℞. Olei Olivar. cochlearia 2 majora.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Syrupi Diacodii unc. dim ad unc.
Aquae . . . . . uncias sex.
Fiat emulsio. (*Sm.*)

Parietaria.

Parietaria officinalis, L.; Wandkraut, Glaskraut; Parietaire (*Gal.*); Pellitory of the wall (*Ang.*); Den a noc, Sklenna bylina (*B.*); Murkurt (*D.*); Parietaria (*His. Lus.*); Parietaria, Erba vitriola (*I.*); Glaskruid (*Bel.*); Noc i dzien (*Pol.*); Vaeggaert (*Suec.*).

Ams. An. Br. Fer. Gal. GalM. Gen. His. HisS. LH. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ (Polygamia Monoecia, L.; Urticeae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* V. t. 12. *Bull.* t. 199 *Zorn* Ic. pl. t. 121.)

Man wendet das Kraut (herba Parietariae s. Helxines) an; es beſteht aus einem rundlichen, röthlichen Stängel mit eirundlanzettigen, geſtielten, oben glatten, unten ſchwach behaarten Blättern.

Gelind, harntreibend und expectorirend.

Succus Parietariae. (*T.*)

Ex herba recenti, contundendo in pultem redacta.

Decoctum Parietariae. (*Ra. Va.* Hot. D.)

℞. Fol. Parietariae . unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Va. Herb. manipulum.

Ein ſchwaches diureticum, welches man ſelten allein anwendet.

Aqua Parietariae. (Gal.)

℞. Herbae recentis Parietariae
partes quinquies mille.
Aquae partes duodecies mille et quingentas.
Destillent partes decies circiter mille; productum infunde
Herbae recentis Parietariae
partibus quinquies mille.
Aquae . partibus decies mille.
Destillent partes decies mille. — Et pro tertio repeti potest.

Enema Parietariae. (Hosp. Char. *Va.*)

℞. Fol. Pariet. sicc. semidrachmam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque, cola et adde
Nitrat. vel Acetat. Potass.
drachmam.
Bei Waſſerſuchten.

Paris.

Paris quadrifolia, L.; Einbeere, Wolfsbeere, Fuchstraube; Parisette (*Gal.*); Oneberry (*Ang.*); Etbaer (*D.*); Ubas de zorro (*His.*); Wolfsbezie (*Bel.*); Uva di volpo (*I.*); Wronie oko (*Pol.*); Parisetta (*Lus.*); Trollbaer (*Suec.*).

Gen. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Octandria Tetragynia, L; Asparagineae, *J.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 10.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Paridis s. Solani quadrifolii) iſt fleiſchig, etwas knotig und mit einigen Faſern verſehen. Sie hat einen ekelhaften Geruch und Geſchmack. Sie erregt, zu dreißig bis funfzig Gran genommen, Erbrechen. Die Alten verordneten ſie gegen Kolik. — Das Kraut beſteht aus einem langen, dünnen, glatten, unten blattloſen, oben mit vier eirundſpitzigen, wirtelförmig ſtehenden Blättern beſetzten Stängel. Der Geruch iſt ſehr unangenehm, der Geſchmack ſüßlich. Die Wirkung iſt purgirend, nach Andern narkotiſch und zu 2 Scrupel brechenerregend. Außerdem hat man es als ſchmerzſtillend, ſchweißtreibend und giftwidrig betrachtet. Es iſt beſonders bei Manie, Krämpfen, Keuchhuſten, Vergiftung mit Krähenaugen ꝛc. angewendet worden. — Die Früchte (Uvae versae s. vulpinae) ſind dunkelpurpurrothe oder ſchwarzbraune, glänzende, kirſchgroße Beeren. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen Geſchmack. In den Magen gebracht bewirken ſie wahre Vergiftungszufälle.

Paronychia.

Paronychia argentea, Lmk.; glänzende Knorpelblume; Paronique argentée (*Gal.*); Nevadella (*His.*).

His. His8.

⊙ (Pentandria Monogynia, L.: Paronychiae, *A St. Hil.*) Eine Pflanze des südlichen Frankreich's.

Man wendet das blühende Kraut (herba Sanguinariae minoris) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, spitzigen, fast glatten Blättern, kürzern aber am Grunde breiten Nebenblättern und kleinen endständigen, von großen Deckblättern geschützten Blüthenköpfen.

Paspalum.

Paspalum (*Panicum*) *Dactylum, Lmk.*; fingerförmiges Hirsegras; Pied-de-poule, Paspale (*Gal.*); Creeping panic gras (*Ang.*); Grama (*His.*); Gevingerd panik (*Bel.*); Grama digitade (*Lus.*).

Fer. Gal. Gen. His. His3.

2l (Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Schrad.* Fl. Germ. I. p. 165. t. 3. f. 9.)

Die Ausläufer, welche man gewöhnlich anwendet und fälschlich als Wurzeln betrachtet, sind sehr lang, rabenfederdick, walzig und knotig. Sie enthalten unter einer harten, gelben, glänzenden Oberhaut eine weiße Substanz von mehligem, zuckerartigem Geschmack.

Pastinaca.

Pastinaca sativa, L.; Pastinak; Panais (*Gal.*); Garden parsnip (*Ang.*); Passtenak (*B.*); Pastinak (*D.*); Pastinaca (*His. I Lus.*); Pinsternakel (*Bel.*); Pasternak (*Pol.*); Palsternacka (*Suec.*).

An. B. Fer. Gal. Suec. Wir. *Be. Br. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 379. *Schk.* t. 76. *Plenck* t. 227. *Hayne* VII. 76. *Zorn* Ic. pl. t. 563.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Pastinacae s. Pastinacae hortensis) ist daumenstark und dicker, fleischig, weißlich oder gelblich. Sie hat einen etwas gewürzhaften und zuckerigen Geschmack. — Der Saame ist eirund, elliptisch, fast flach, mit einem kleinen häutigen Rand umgeben, gestreift, von etwas gewürzhaftem und zuckerigem Geschmack.

Reizend, ehedem als harntreibend betrachtet.

Perfoliata.

Bupleurum rotundifolium, L. (*perfoliatum?*); Durchwachs; Perce feuille (*Gal.*); Thorough wax (*Ang.*); Giennenvaext (*D.*); Perfoliata (*His.*); Doorwas (*Bel.*); Perforata (*I.*); Obiezy swiat (*Pol.*); Perfolhada (*Lus.*); Genomvaxt (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Gr. M. Sp.*

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VII. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 376.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Perfoliatae) besteht aus großen, eirunden, rundlichen, meist durchwachsenen oder auch bloß umfassenden, geruch- und geschmacklosen Blättern. — Der Saame ist klein, schwarz, hart und von scharfem, bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Persica.

Persica vulgaris, Cand.; *Amygdalus Persica, L.*; Pfirsichbaum, Pfirschenbaum; Pêcher (*Gal.*); Peachtree (*Ang.*); Khowkh (*Ar*); Breskew (*B.*); Persiketrae (*D.*); Prisco (*His.*); Persigboom (*Bel.*); Persico, Pesco (*I.*); Schuftalu (*Pe.*); Broskwina drzewo (*Pol.*); Pecegueira (*Lus.*); Persiketraed (*Succ.*).

A. An. Be. Br. Fer Gal. Gen. His. His3. Wir. Wür. *A. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher ursprünglich in Persien einheimisch ist. (*Duham.* Arb. fruit. II. t. 1 — 14; 20 — 32. *Blackw.* t. 101. *Plenck* t. 556. *Hayne* IV. 38. *Zorn* Ic. pl. t. 282.)

Man wendet die Blätter, die Blüthen und den Saamen an.

Die Blätter (folia Persicorum) sind einfach, lang, lanzettförmig, spitzig und an den Rändern fein gezähnt. Sie haben den Geruch und Geschmack der bittern Mandeln. Ihre Wirkung ist schwach abführend. Die Blüthen sind röthlich oder rosenroth und besitzen dieselbe Eigenschaft, wie die Blätter. — Der Saame ist ein holziger, sehr harter, auf der Oberfläche rissiger Kern, dessen bittere Mandel ein süßes Oel und Hydrocyansäure enthält. — Aus dem Saft der Früchte und dem halben Gewicht Zucker wird durch Kochen zu einer dicken Consistenz eine Marmalada bereitet. (*Re.*)

Conserva Florum Persicorum. (Sar. *Fi. T.*)

℞. Florum Persicae recentium contusorum . . . . partem unam.

Sacchari ad glob. cocti part. duas. Commisce bene.

T. Florum uncias sex cum duabus Sacchari in pulpam redigere, hanc per crinium trajectam cum Sacchari albi ad glob. cocti libris quatuor commiscere et evaporatorii ope vel soli exposita ita evaporare ut levis crusta in superficie oriatur; — *Fi.* Florum libram unam cum Sacchari unciis duabus in pastam redigere et hanc cum Sacchari ad glob. cocti tanta quantitate coquere ut omne saccharum libras tres aequet.

Succus ex Floribus Persicorum. (Sar. *Fi.*)

℞. Florum Persicae recentium a calicibus liberatorum quantum vis.

Adspersos cum Aquae pauxillo in saccum include, exprime fortiter et succum filtra. Si eum servare in animo est, sepone ut subsideat, tunc partem limpidam, addito Alcoholis pauxillo, sub strato olei in lagenis serva.

Fi. Flores cum parte ponderis quarta Aquae in vase cupreo stanno obducto lenissimo calore calefacere, spatulae ligneae ope agitare ut flores molles fiant et prelo subjicere.

Infusum Foliorum Amygdali Persicae. (*Re.*)

℞. Folior. Persic. siccor. semunciam.
Aquae bullientis . . octarium.

Infunde per horas tres. — 1 Dr. bis 3 Unzen drei Mal täglich bei Irritation der Harnwege.

Infusum Persicorum s. Florum Persicae s. Mali Persici. (His. His3. Sar.)

℞. Florum Persicae . . libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.

Infunde per horas octo, cola leviter exprimendo et operationem novies supra novas flores repete. (Sar.)

℞. Florum Persicae . libram unam.
Aquae bullientis . . libras duas.

Infunde per horas octo et cola exprimendo. (His. His3.)

Decoctum Foliorum Amygdali Persicae. (*Au. Sw.*)

℞. Folior. sicc. Persicae unc. unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Decoque ad sesquilibrae colaturae remanentiam. — Bei Blutharnen, Dysurie und Nierenentzündung empfohlen. — Gabe, täglich ein Pfund.

Syrupus Foliorum Persicae. (*Vm.*)

℞. Folior. rec. Persicae . . q. vis.

Contunde absque aqua et exprime succum, in cujus ebullitione coagulati partibus colaturae quinque solve

Sacchari albi . . partes novem.

Syrupus Persicorum s. Persicae Florum s. de Amygdali Persicae Floribus s. Amygdali Persicae s. e Floribus Malorum Persicorum. (An. Br. Fer. Gal. Gen. Pal. Pm. Sar. Wir. Wür. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Flor rec. Persicae libr. quatuor.
Aquae bullientis libras duodecim.

Infunde per horas 12 super cinere calido, in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone, decantha et adde

Sacchari albi libras septemdecim.

Coque ad syrupi consistentiam. (Gal).

Gr. Florum libram unam in Aquae calidae tribus per diem macerare, exprimere et hoc quater repetere, colare et liquoris octariis tribus additis Sacchari libris duabus cum dimid., ad Syrupi consist. coquendo redigere; — Br. Pal. et Wir. macerare per horas 12 Florum libram unam in Aquae bull. libra una, exprimere deindo et in unciis novem colaturae depuratae Sacchari albi uncias sedecim solvendo, syrupum parare; — Fer. *Fi.* Macerare per horas 12 Florum partes duas in tribus Aquae bull. et colaturae addere Sacchari partes duas; — *Sa.* Coquere ad consist. aptam mixturam e partibus aequalibus Infusi Florum Persicae et Syrupi communis; — *T.* Flores cum Aquae bull. duplo pondere per horas 24 macerare, filtrare fortiter exprimendo, et hoc semel vel bis repetere, tunc sepositione et decanthatione clarificata cum Sacchari pondere duplo in balneo aquae bulliente commiscere; vel secund. *Boullay*: Florum libras quatuor cum duodecim Aquae destillare et in parte dimidia, destillatione obtenta in balneo aquae et in retorta obturata Sacchari libras novem et in decocto in vase residuo, cum expressione filtrato, decanthato aequalem Sacchari copiam solvere, syrupos commiscere, agitare bene et mitis balnei aquae caloris ope intime commiscere.

℞. Flor. Persicae rec. . partes duas.

Contundendo in pastam redige, cui infunde in vase tegendo

Aquae fervidae . partes quatuor.

Post refrigerationem cola exprimendo, et in colaturae partibus quatuor solve

Sacchari albi . . partes septem.

Despuma. (*Vm.*)

℞. Florum Persicae recentium,
Sacchari albi, sing. libras quatuor.

Contunde et in balneo maris detine,

usque succus limpidus exeat; praelo tunc exprime, succum filtra et admisce.

Sacchari pulv. duplicem succi quantitatem.

Quod post expressionem remanet, infunde in Aquae ferv. libris duabus, liquorem frigefactum cum expressione cola, cum residuo Saccharo clarifica et in syrupum coctum cum primo syrupo commisce. (Pm.)

℞. Florum Persicae . uncias octo.
Gemmarum Persicae uncias duas.
Aquae bullientis uncias sedecim.

Infunde in balneo aquae per horas 24, vase tecto; filtra et in colaturae unciis quinque solve

Sacchari albi . . . uncias octo.

Cola (An.)

℞. Sacchari albi . libras quatuor.
Aquae fontanae quantum sufficit.

Coque ad syrupi spissi consistentiam, quem adhuc calidum

Flor. rec. Persicae libris duabus infunde, et per tres dies, vase tecto, macerata, leviter coque et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

Emulsio externa e Nucleis Persicae s. leniens. (Wir.)

℞. Nucleorum Persicae unciam unam.
Semin. Cannabis,
— Papaveris, sing. semunciam.
Aquae Meliloti,
— Nymphaeae, sing. unc. quatuor.

Emulsioni adde

Aquae Vitae camphor. semunciam.

Man legt es bei Kopfschmerz mittelst Compressen auf die Stirn und die Schläfe.

Persicaria.

Unter diesem Namen finden sich:

1) *Polygonum Persicaria, L.*; gemeiner Knöterich; Persicaire douce (*Gal.*); Spotted persicaria, Butter burr (*Ang.*); Loppegraes (*D.*); Persicaria monchada (*His.*); Persenkruid (*Bel.*); Pessigueira *Lus.*); Raeknesva (*Suec*).

Gal. His. His3. *Gr. Re. Sp.*

☉ (Octandria Trigynia, L.; Polygoneae, *J.*) Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* V. t. 23. *Oed.* Fl. Dan. t. 702.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae minoris) an; es besteht aus einem runden, röhrigen, röthlichen, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, lanzettförmigen Blättern. Der Geschmack ist schwach sauer und etwas salzig.

Wurde ehedem für ein Wundmittel gehalten.

2) *Polygonum Hydropiper, L.*; Bitterknöterich, Wasserpfefferknöterich; Persicaire poivrée, brûlante, âcre, Poivre d'eau, Piment brûlant (*Gal.*).

Gal. Gen. *Be. Gr. M. Sp.*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 119. *Bull.* t. 127. *Plenck* t. 308. *Schk.* t. 108. *Hayne* V. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae urentis s. Hydropiperis s. Mercurius terrestris) an; es besteht aus einem glatten, runden, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden lanzettförmigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich scharfen, brennenden, pfefferartigen Geschmack.

Frisch auf die Haut gelegt wirkt es rothmachend.

Species pro infuso diuretico s. diureticae. (*Au.*)

℞. Foliorum Persicariae minoris,
Rad. Junci sylvest., sing. semunciam.
Foliorum Petroselini,
Herbae Hyssopi,
Cinnamomi,
Corticis Aurantiorum,
Anisi, sing. . . drachmam unam.

Concisa et contusa misce.

Aqua Hydropiperis. (*Gr.*): E Herba. 1 bis 1½ Pfund, den Tag über, bei nephritischen Fällen sehr wirksam.

Petasites.

Tussilago Petasites, L.; Pestilenzwurzel, Pestwurzmännlein, Neunkraftroßhuf; Petasite (*Gal.*); Butterbur (*Ang.*); Demesyl Wetssj konske kopyto (*B.*); Storbladet hestihoc (*D.*); Petasites, Lombrerera (*His.*); Poddeblad (*Bel.*); Petasite (*I.*); Lipieznik (*Pol.*); Pestilenzrot (*Suec.*).

Ba. Br. Gal. His. His3. Li. Wir. *Bo. Br. Gr. M. Pid. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine im nördlichen Europa an feuchten Orten gemeine Pflanze. (*Hayne* II. t. 17. 18. Diiss. off. Pfl. III. t. 7. *Zorn* Ic. pl t. 58.)

Man wendet die Wurzel (radix Petasitidis s. Petasitidis majoris s. vulgaris s. rubentis) an; sie ist ästig, faserig, fingersdick, außen braun, inwendig gelb oder roth. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen bittern, widerlichen Geschmack.

Petroleum.

Oleum Petrae, Asphaltum, Bitumen Petroleum; Steinöl, Bergöl; Petrole (*Gal.*); Petrol, Rock-oil, Barbadoes

tar (*Ang.*); Neft, Kuffer aliehud (*Ar.*); Muttie ka tail (*Duk.*); Petroleo (*His.*); Mitti tel (*Hin.*); Petroleo, Olio di Sasso, Nafta impura (*I.*); Kesosonoabra (*Jap.*); Minnia tanna (*Mal.*); Oley skalny (*Pol.*); Bumie tylum (*Sa. Te.*); Bergolja (*Suec.*); Ippu (*Sumat.*); Muntylum (*Tam.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Ein flüſſiges Erdharz von oft öliger Conſiſtenz, ſchwärzlichbrauner, bisweilen röthlichbrauner, auch weißer, dem Talg ähnlicher Farbe, faſt undurchſichtig, leichter als Waſſer, ſalbenartig anzufühlen, ſehr leicht entzündlich, unter Entwickelung eines dicken ſchwarzen Rauchs verbrennend, von ſehr ſtarkem Geruch und ſcharfem Geſchmack. Es tropft von Felſen und quillt an mehrern Orten in Aſien aus der Erde hervor. Der ſogenannte Barbadoestheer (Petroleum Barbadense, Pisseleon Indicum, Bitumen Petroleum), dunkel, ſehr dick und halbflüſſig, wird auf Trinidad und an andern Orten gefunden. Durch Deſtillation deſſelben im Sandbad erhält man das Oleum Petrolei Barbadensis. (*Gr.*)

Reizend, krampfſtillend, harntreibend, wurmwidrig. — Gabe, zehen bis funfzehen Tropfen auf Zucker.

Oleum volatile s. Naphtha Petrolei, Petroleum rectificatum. (Bor4. Wür. *Fi. Sw.*)

℞. Petrolei . . . . . libras duas.
Aquae . . . . libras quatuor.

Destillent blando igne, quamdiu oleum limpidum transit.

Bor4. Petroleum cum Aquae fontanae octuplo destillare jubet, ita ut tertia pars prioris remaneat; — *Fi.* Petrolei partem unam, Aquae communis partes decem.

Reizend, auflöſend, beſonders äußerlich bei Gelenkſchmerzen, Ekchymoſen und Lähmung.

Oleum Petrolei Barbadensis (*Gr.*): Destillatione Petrolei Barbadensis.

Petroleum sulphuratum, Balsamum Sulphuris Barbadense. (*Gr. Re.*).

℞. Petrolei . . . . partes quatuor.
Sulphuris . . . partem unam.

Reizmittel, zum Reinigen fauliger Geſchwüre.

Gr. Petrolei uncias sedecim, Florum Sulphuris tres.

Linimentum Petrolei. (*Sa. Sw.*)

℞. Petrolei,
Alcoholis rectif., sing. unc unam.

Misce bene. (*Sa. Sw.*)

℞. Essentiae Saponis drachmas octo.
Petrolei . . . sesquidrachmam.

Misce. (*Sa.*)

In Einreibungen gegen Froſtbeulen.

Mixtura anthelmintica. (B*. *Au.*)

℞. Petrolei . . . . . semunciam.
Tinct. Asae foet. . drachmas sex.

Misce. — Gabe, vierzig Tropfen, täglich drei Mal. — Von Schwarz gegen Bandwurm empfohlen.

Peucedanum.

Peucedanum officinale, *L.*; Saufenchel, Schwefelwurzel, Haarſtrang; Peucédan, Fenouil de porc, Queue de pourceau (*Gal.*); Common sulphur wort (*Ang.*); Svinekenkel (*D.*); Peucedan (*His. I. Lus*); Hairstreng (*Bel.*); Wieprzniek (*Pol.*); Svinfinkel (*Suec.*).

Br. Gal. His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des nördlichen Europa's. (*Gmel.* Fl. Sibir. I. t. 41. *Hayne* VII. t. 4.)

Man wendet die Wurzel (radix Peucedani s. Feniculi porcini) an; ſie iſt dick, lang, rund, faſerig, außen ſchwärzlich, innen weiß. Sie hat einen narkotiſchen Geruch und einen ſcharfen, bittern und ſchleimigen Geſchmack. — Das Gummi (Gummi Peucedani) iſt eröffnend und harntreibend.

Reizend, gegen Hyſterie wirkſam.

Extractum Peucedani. (Sar.)

℞. Radicis Peucedani libram unam.
Vini albi generosi
libras quinque ad sex.

Post tres dies digestionis in arenae balneo cola, fortiter exprimendo, tunc coque residuum cum novi Vini q. s. ad dimid.; liquores commixti ad extracti consist. usque evaporent.

Syrupus de Peucedano. (Sar.)

℞. Extr. Rad. Peucedani,
— — Liquirit., sing.
unc. unam.
— Fol. Veronicae,
— — Tussilag., sing.
drach. tres.
Mellis albi colati . uncias duas.
Aquae dest. Rad. Peucedani q. s.

Misce igne blandissimo ut fiat syrupus.

Oleum Peucedani aethereum, Aethereoleum Peucedani. (Sar.)

℞. Rad. Peucedani
part. viginti quinque.

Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent; oleum producto supernatans collige.

Phellandrium.

Phellandrium aquaticum, L.; Waſſerfenchel, Peerſaat, Pferdeſaamen; Phellandre aquatique (*Gal.*); Fike leaved water hemlock (*Ang.*); Vandfennikel (*D.*); Waterkervel (*Bel.*); Fellandrio aquatico, Finocchio aquatico (*I.*); Koper wodny, Kruszykamien ziele (*Pol.*); Staekra (*Suec.*)

A An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. O. Pol. R. Sax. Suec Wir. Wiir. WW. *Be. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* I. 40. *Blackw.* t. 570. *Plenck* t. 210. *Bull.* t. 147. *Oed.* Fl. Dan. t. 1154.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Phellandrii s Foeniculi aquatici) beſteht aus einem walzigen, röhrigen, geſtreiften, äſtigen Stängel mit dreifach geſiederten, glatten Blättern, deren Blättchen in lange, ſchmale, linienförmige Läppchen getheilt ſind. — Der Saame iſt eirund, länglich, auf einer Seite eben, auf der andern geſtreift, von den Kelchreſten und den Griffeln gekrönt, bräunlich oder grünlichgelb.

Der Geruch iſt unangenehm, ſtark, durchdringend, der Geſchmack gewürzhaft und etwas bitter.

Narkotiſch, aufregend, harntreibend. — Gabe, vom Pulver der Saamen, zehen bis zwanzig Gran täglich drei Mal.

Pulvis ex Phellandrio aquatico gummatus. (B)

℞. Semin. Phellandrii . scrup. unum.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Scropheln und ſcrophulöſer Schwindſucht.

Pulvis ad catarrhum s. anticatarrhalis. (Au. Sm.)

℞. Semin. Phellandrii drach. unam.
Salep,
Gummi Arab., sing. unciam unam.
Sacchari Lactis . uncias duas.
Misce. — Gabe, ein Kaffeelöffel in einem Glaſe Zuckerwaſſer, drei oder vier Mal täglich, bei chroniſchen Catarrhen. (*Sm.*)

Au. Phellandrii grana quinque, Gummi octo. Nitri sex et decem Sacchari — Gabe, dreimal täglich zu wiederholen.

Emulsio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (Vm.)

℞. Semin. Phellandrii . unc. unam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Contere, sensim affundendo
Aquae . . . . uncias novem.
Cola, desideant, tum decantha et adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Tinctura Phellandrii. (B. Au.)*

℞. Seminum Phellandrii semunciam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Digere per horas 24 et adde
Vini Muscat dicti . uncias sex.
Digerendo per duos dies continua.
Au. eand. formulam absque vino.

Gabe, zehen bis ſechszig Tropfen, bei Lungenſchwindſucht. — Von Martius als ein ſehr wirkſames Mittel betrachtet.

Decoctum pectorale in phthisi. (B.)

℞. Dulcamarae . . drachmas duas.
Semin. Phellandrii . drach. unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad decocti uncias octo obtinendas, quarum colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Morgens, auf zwei Mal zu nehmen.

Pilulae in bronchitide lenta. (B.)

℞. Semin. Phellandrii . scrup. tres.
Mercurii dulcis . grana quatuor.
Fiant pilulae quindecim — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden bei chroniſchem Catarrh.

Phoenix.

Phoenix dactylifera, L.; Dattelpalme; Dattier (*Gal.*)

Ba. Br. Fer. Gal. HassP. His. His3. LP. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Dioecia Triandria, L.; Palmae, *J.*) Oſtindien's, des nördlichen Africa's und des ſüdlichen Europa's. (*Blackw.* t. 202. *Delile* Egypt. t. 62. Dict. d. Sc. nat. VII. *Lamk.* Ill. t. 893. Fl. méd. III. 148. *Bert.* Bild. II. 43. f 2.)

Man wendet die Früchte, Datteln (Dactyli, Palmulae), Dattes (*Gal.*); Date (*Ang.*); Datte (*B.*); Dadel (*Bel.*); Tamara (*Lus.*) an. Es ſind eirunde, etwas längliche, gelbliche Steinfrüchte, welche unter einer dünnen, glatten Oberhaut ein ſaftiges Fleiſch und von dieſem umhüllt, einen faſt holzigen Saamen oder Kern enthalten, welcher auf der einen Seite mit einer Längsfurche bezeichnet iſt.

Erweichend, Bruſtmittel.

Pulpa, Conserva Dactylorum. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Dactylorum . . . quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Coque ut fructus molles reddantur et nucleis semotis, pulpam per crinium trajice, adde aquam decoctionis et totum blando calore ad aptam consistentiam consume.

Fi. ut conservam prunorum, quam vide.

Pasta Dactylorum s. de Dactylis. (Gal. *Gr. Re. T.*)

℞ Dactylor. enucleat. sesquilibram.
In frustula minora concisos coque in
Aquae purae . . . libris decem per horam, donec facillime inter digitos conteri possint et cola decoctum. Dissolve
Gummi Senegal. (Arab. *Re.*) libras sex
in Aquae libris viginti et solutionem cola; commisce eam cum altero liquore et adde
Sacchari albi . libras quinque.
Albumina in Aquae pauxillo diluta no. 5.
Coque, despumando et tunc ad tertiam partem consume; cola per linteum et vaporando ad syrupi spissi consistentiam redige, cui adde
Aquae Flor. Aurant. unc. novem.
Evaporent ad extracti mollis consist. et in modulos ferreos oleo obductos infunde ut balnei vaporis ope siccentur.

T. Dactylorum libram unam et loco aquae flor. aurant. Tincturae Citri et Aquae Citri, singularum drachmas tres adhibet.

Phosphorus.

Phosphorus urinae, Phosphorus Kunckelii; Phosphorus; Phosphore (*Gal.*).

1) Wie er im Handel vorkömmt.

Am. B Ba. Bel Bor4. Fenn. HassP. Sar. Suec. *C.*

2) Gereinigter.

B. Bel.

℞. Phosphori venalis . quantum vis.
In saccum e tela confectum in Aquam frigidem immersum ingere, hanc pedetentim calefac et simulac phosphorus mollis est factus eum leviter premendo per telam trajice; tunc penitus liqua in Aqua frigida et in tubos vitreos effunde, quos in Aquam puram in fundo lagenae chartâ nigrâ tectae immerge.

3) Bereitung im Ganzen.

A. An. Ba. Bor. Br. D. Ful. Gal. Han. Hass. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Br Sw. Vm.*

A. Gewinnung des Phosphors aus Urin. (*Phosphorus Urinae.*)

Br. Ful. Wir. Wür. *Gr.*

Gr. Ex urina putrida et in olla ferrea destillationi subjecta; residuum tritum retortis fictilibus immissum destillationi aestu vehementi in Aqua subjiciatur.

℞. Salis Ammon. pulv. . libras duas.
Minii . . . . . libras quatuor.
Destillent in cucurbita vitrea, serva productum, caput mortuum repone et hujus libras tres in ollam ferream ingere continentem
Urinae per sex septimanas putredini relict. et ad mellis consist. inspiss. . . . . libras decem.
Carbonis pulverati . semilibram.
Agita mixturam, donec in pulverem nigrum, nullum urinae odorem emittentem redacta sit; imple eâ tres quadrantes cucurbitae fictilis vernice obductae, et adaptato recipiente aliquanto supra dimidium capacitatis Aqua repleto, destilla, ignem sensim augendo; phosphorum guttatim in aquam destillantem collige. (Br. Wür.)

Gr. Solutionem Sacchari Saturni in urinam infunde, pulvis praecipitatus albus cum Carbonis Pulvere misceatur et vehementi aestu in Aqua destillentur.

℞. Salis urinae ex urina ad mellis consist inspiss. crystallisatione obtenti . . . . partes octo.
Carbonis pulverati partem unam.
Destillent ut antea. (Ful. Wir.) —
Dieses Verfahren wird nicht mehr angewendet

B. Gewinnung desselben aus Knochen.

A An. Ba. Bor. D. Fer. Gal. Han. Hass. O. Pal. Sax. *Br. Re. Sw Vm.*

℞. Ossium Mammalium ad alborem calcin. et pulv. part. duodecim.
Dilue in cupa lignea Aquae ea quantitate ut puls spissa obtineatur, cui sensim adde
Acidi sulph. (66°) partes decem, baculi ope agitando. Magmati novam Aquam infunde ut fiat puls liquida, quam per horas 24 sepositam cum Aqua bull. supra telam arcte textam tene, donec liquidum saporis expers transeat; aquâ in lebete cupreo evaporatâ praecipitatum lava et aquam lotionis cum priore commisce; tunc toto ad syrupi consist. evaporato adde Carbonis pulv. partem quartam et calefac ad ruborem fere in pelvi ferrea ita ut perfecte siccetur; hac mixtura retortam arenaceam pro tribus quadrantibus repletam

in fornicem tectum galea instructum colloca, cujus collo vas cupreum est adaptatum in tubum extensum, qui obturaculum subereum penetrans in lagenam vitream ad dimidium fere Aqua repletam immergit; destilla leni igne ita ut retorta post horam demum rubescat; phosphorum qui in recipientem transit collige et sub Aqua fervida 45° per pellem rupicaprae cola.

Parari potest quoque e Solutione Phosphatis Sodae part. quatuor Solutionis Acetatis Plumbi partis unius ope phosphatem plumbi destillando. (*Re.*)

Eins der kräftigsten Reizmittel, ein sehr gefährliches Gift, und ein Aphrodisiacum, wie behauptet wird, welches nur mit der äußersten Vorsicht angewendet werden darf und, als inneres Arzneimittel wenigstens, besser aus der Materia medica ganz ausgestrichen würde. — Gabe, einen viertel bis einen ganzen Gran täglich.

Phosphorus pulveratus. (Han.)

℞. Phosphori . . drachmam unam.
In lagenam unciarum trium capacem immisso superfunde
Aquae . . . . . uncia una.
Calefac lagenam in Aquam bull. immergendo. Simulac phosphorus liquefactus est, lagenam fortiter agita. Pulverem filtro impositum sicca.

Emulsio phosphorata. (B⁺. *Au. T*)

℞. Phosphori grana duo ad quatuor.
Olei Amygd. dulc. unciam unam.
Digere et dissolve, tunc cum
Amygdalis dulc. excortic. . no 3,
Gummi Arabici . . . semuncia,
Aquae comm.
unc. tribus vel quatuor,
Syrupi Althaeae . . . semuncia emulsionem para. — Gabe, einen halben oder ganzen Löffel, je nach der Menge des Phosphors.

Linctus Phosphori. (*T.*)

℞. Phosphori sub Aqua fusi gr. duo.
Cum Saccharo, Vitello Ovi et Olei Amygdalarum dulcium modica quantitate looch para. — Wird wie die Emulsion angewendet.

Potio phosphorata. (B⁺. *Au. E.*)

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Mucilag. G. Arab. . . . . q. s.
Aquae fontanae . . semilibram
Fiat emulsio, cui adde
Syrupi Amygdalarum unc. unam.
Liquoris anod. Hoffm.
gutt. triginta.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

℞. Essent. Terebinth. semidrachmam.
Olei Olivarum . drachmas tres.
Phosphori . . . . grana duo.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aq. arom. cujuslib. unc. quatuor.
Syrupi Cinnamomi unciam unam.
Misce. (*Au.*)

℞. Phosphori . . granum unum.
Olei animal. Dipp. drach. unam.
— ess. Caryophyll. scrup. unum.
Gabe, zwei bis drei Tropfen, Morgens und Abends, bei paralytischer Amaurose, Gesichtsschmerz und chronischem Rheumatismus. (*Au.*)

Alcohol phosphoratus. (*Br.*)

℞. Alcoholis . . . . uncias octo.
Phosphori minut. concisi gr. octo.
Contere in mortario vitreo, donec alcohol saporem suavem perdiderit, et decantha.

Aether phosphoratus.

1) Mit aether phosphoricus.

Aether phosphoro-phosphoricus, Phosphorus liquidus. (*Sw⁺. Vm.*)

℞. Phosphori . . . partem unam.
Aetheris phosph. (60°)
part. sexaginta.
Agita fortiter ad dissolutionem perfectam usque. (*Vm.*)

℞. Phosphori . . grana quatuor.
Olei ess. Caryophyll. gutt. sedecim.
Aetheris phosphorici semunciam.
Dissolve blando calore, in vase clauso. (*Sw⁺.*)

℞. Phosphori . . scrupulum unum.
Ammonii subcarb. semiscrupulum.
Contere in mortario cum aethere phosphorico humectato, mixturae in lagenam immissae infunde
Aetheris phosph. unc. duas c. dimid.
Agita ad perf. solutionem usque. (*Sw⁺.*)

2) Mit Aether sulphuricus.

Aether sulphuricus phosphoratus, Naphtha Vitrioli phosphorata. (An. B⁺. Bor4. D. Gal. Han. *Au. Br. Ca. Pie. Re. T*)

A. Formel von Bouttaz oder Pelletier.

℞. Aetheris rectificati uncias quatuor.
Phosphori puri grana viginti octo.
Dissolve. (An. *Ca.*)

Gal. *Re.* Phosphori drachmas duas c. dimid. et Aetheris libram; — B⁺. Phosphori grana quatuor et Aetheris semunciam; — Bor4. Phosphori grana sex, Aetheris unciam; — *Br.* Phosphori grana octo et Aetheris uncias octo; — D. et Han. Phosphori grana sedecim et Aetheris uncias duas; — *Au.* Phosphori grana duo et Aetheris drachmas duas;

— *T.* Phosphori scrupulum, Aetheris uncias quatuor.

B. Formel von Flittner.

℞. Phosphori grana viginti quatuor.
Olei ess. Caryophyll. drach. tres.
Solutioni adde
Aetheris sulph. drach. viginti et unam.
Misce bene. (B*.)

Pic. Phosphori grana tria, Olei Caryophyllorum guttas duodecim et Aetheris semunciam.

C. Formel von Loebenstein-Loebel.

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Olei Menthae piperitae scrupulum unum ad semidrachmam.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici . semunciam.
Misce sedulo. (B*.)

℞. Phosphori . . . . grana tria.
Aetheris sulphurici semunciam.
Olei ess. Valerianae guttas decem.
Misce bene (*Au.*)

Eine Unze reiner Aether löst sechs Gran Phosphor auf.

Gabe, zwei bis vier Tropfen auf Zucker, in vierundzwanzig Stunden und täglich um zwei oder drei Tropfen gestiegen

Tinctura Salis Tartari phosphorata. (*Vm.*)

℞. Tinct. Salis Tartari . . q. vis.
Calefac leviter in balneo arenae et immitte in frustulis parvis
Phosphori . . quantum sufficit donec hic non amplius dissolvatur: sepone per aliquot tempus et decantha.

Mixtura Chinae phosphorata, Potio excitans (*Au.*)

℞. Aquae Cinnamomi . uncias tres.
Extracti Chinae . . semunciam.
Phosphori in Aethere sulphurico soluti . . . . . grana tria.
Syrupi Cort. Aurant. uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Linimentum phosphoratum. (Fer. *Ca.*)

℞. Phosphori concisi grana triginta.
Olei Amygdal. dulc. libram unam.
Dissolve leni calore et post refrigerationem cola. (*Ca.*)

Fer. Phosphori grana duodecim et Olei uncias quatuor.

Bei rebellischen Rheumatismen, Lähmung und Atrophie. — Gabe, eine halbe bis eine Unze auf jede Einreibung.

Linimentum phosphoratum camphoratum. (B*. Han. *Au. Ca. Vm.*)

℞. Phosphori . . . grana decem.
Camphorae . . scrupulos duos.
Olei Amygdal. dulc. unciam unam.
Dissolve (B*. Han.)

Vm. Phosphori scrupulum unum, Camphorae quatuor et Olei Amygd. dulc. unciam; — *Au.* Phosphori grana tria, Camphorae sex et Olei Amygd. dulc. drachmas duas.

℞. Phosphori . . . . grana sex.
Olei Amygd. dulc. unciam unam.
Contere exacte, digere in balneo aquae et adde
Camphorae,
Ammoniaci liq., sing. grana decem.
Misce. (Ham. *Au.*)

℞. Essentiae Terebinth. uncias duas.
Camphorae . . drachmas duas.
Ammonii carb. pyro-oleosi drachmam.
Saponis medicinalis uncias duas.
Phosphori in Olei Caryophyll. gutt. 12 – 15 soluti granum unum.
Misce sedulo. (B*. *Au.*)

Unguentum s. Pomatum phosphoratum. (Gal. *Ca. T.*)

℞. Phosphori purissimi partes viginti.
Axungiae Porci . partes mille.
Aquae . . . . partes centum.
Coque ad dissolutionem phosphori usque et donec aqua penitus evaporata sit; filtra per chartam griseam et adde, si vis, Olei essentialis Lavandulae partem unam. (Gal. *Ca.*)

T. Phosphori grana decem, Axungiae uncias viginti, Aquae dest. duas et aliquot guttas Olei Spicae vel Bergamottae.

Oleum phosphoricum s. phosphoratum. (Bor4. *T.*)

℞. Phosphori in globulos parvos divisi et bene sicc. scrup. quatuor.
Ingere in mortarium porphyreum cum duplo vel triplo Vitri contusi et puri vel Arenae lotae et siccatae, infunde sensim Olei Olivarum calidi 50 60° C. libras duas, tritura per momenta aliquot, sepone in amplo vase, ut subsideat et decantha. — Aeußerlich zu zwei oder drei Scrupel bis eine halbe Unze, bei chronischen Rheumatismen eingerieben.

Bor4. Phosphori grana duodecim in phialam immitte, Olei Amygdalarum recenter parati unciam unam continentem, quam in aquam calidam immerge, donec phosphorus liquatus sit. Tum vas agitetur, donec phosphorus solutus appareat. Oleum refrigeratum a phosphoro forsan secreto caute decantha.

Oleum phosphoratum. (*Au.*)

℞. Phosphori . . . . grana duo.

Olei Hyoscyami infusi semunciam.
Extracti Chamomillae,
Aquae Menthae pip. uncias duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Oleum phosphoratum s. phosphoratum aromaticum. (*Ma. Va.*) Nach Lescot:

℞. Phosphori . . . unciam unam.
Olei Olivarum . libram unam.
Repositis temperatura communi in loco obscuro per dies quatuordecim Oleum ess. Bergamottae adde.

Va. Phosph. drachmam, Ol. Amygd. dulc. uncias duas; solutione perfecta decantha et adde Ol. Bergam. q. s.

Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in vierundzwanzig Stunden in einem Trank. (*Ma.*)

Phytolacca.

Phytolacca decandra, L.; Americanische, gemeine Kermesbeere; Phytolaque à dix étamines, Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Herbe de la laque, Méchoacan du Canada (*Gal.*); American pokeweed, Garget, American night shade (*Ang.*); Fitolacca, Herba Camin (*His.*); Tienmannige lackplant (*Bel.*); Pianta lacca (*I.*).

Am. Br. Gal. His. HisS. R. Wir. *C. Gr. M. Sp.*

♃ (Decandria Digynia, L.; Atriplicеae, J.) Eine in Nordamerica einheimische, im südlichen Europa gebaute Pflanze. (*Blackw* t. 515. *Bigel.* Am. med bot. I. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 164)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Phytolaccae s. Solani racemosi) ist dick, fleischig und in mehrere dicke Fasern getheilt. — Das Kraut besteht aus einem walzigen, ästigen Stängel und vier bis fünf Zoll und mehr langen, abwechselnden, glatten, eirunden, lanzettigen, kurzgestielten Blättern. Es hat einen sehr scharfen Geschmack.

Nach Hayward kann die Wurzel, zu einem Scrupel, die Ipecacuanha sehr gut ersetzen. Das Extract der Blätter ist äußerlich bei offenem Krebs gerühmt worden. Den Aufguß hat man bei Rheumatismen und Hämorrhoiden empfohlen.

Unguentum Radicis Phytolaccae. (B*.)

℞. Rad. Phytolaccae pulv. unc. unam
ad duas
Axungiae Porci . libram unam.
Misce. — Hayward rühmt diese Salbe bei scabies und hartnäckiger tinea. Sie erregt oft Hitze und Röthe der Haut; man muß alsdann Waschungen anwenden und die Einreibungen weglassen

Pila marina.

Sphaera marina, Sphaera thalassia, Halogonium rotundum; Seeballen, Meerkugeln; Pelote de mer (*Gal.*).

Wir. *Sp.*

Mit diesem Namen bezeichnet man leichte, rundliche, platte oder längliche, geruch- und geschmacklose Massen, in denen man Binsen, Haare, und oft Ueberreste von Muschelschaalen unterscheidet und die man an den Küsten des Oceans und des Baltischen Meeres findet.

Man hält sie mit Spielmann für Knäuel von Wurzeln der Zostera marina, L. ♃ (Monoecia Monandria, L.; Aroideae, J.), einer in den genannten Meeren sehr häufigen Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 15.)

Cavola will in der Asche der Zostera Jod gefunden haben, woraus sich erklären ließe, wie man diese Seeballen unter die Mittel gegen den Kropf hat zählen können.

Pimpinella.

Unter diesem Namen werden angewendet:

1) *Pimpinella Saxifraga, L.*; Pimpinell, Bibernell, Roßbibernelle, Steinbibernelle, Bockspeterlein; Boucage à feuilles de pimprenelle (*Gal.*); Small burnett saxifrage (*Ang.*); Bedznjk (*B.*); Steen brekke, Qvaeseurt, Biergroed, Pimpinelle (*D.*); Pimpinella blanca (*His.*); Kleine Bevernell (*Bel.*); Pimpinella bianca (*I.*); Budrznyniec (*Pol.*); Pimpinella branca (*Lus.*); Backrot (*Suec.*).

A. Ams. An. Bor. BorC. Bot. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. WW. *Bc. Gr. M. Pid. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t. 395. *Hayne* VII. 20. *Blackw.* t. 472 *Plenck* t. 221. Düss. off. Pfl. X. t. 17.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae albae s. nostratis s. umbelliferae s hircinae s. Tragoselini) an; sie ist lang, walzig, fast spindelförmig, etwas faserig, ringförmig gestreift, außen gelblichgrau, inwendig weiß. Sie hat einen starken, bockartigen, Niesen erregenden Geruch und einen bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

2) *Pimpinella magna, L.*; schwarze Bibernell, Blauwurzel; Boucage elévé (*Gal.*).

Gal. Wir. *Bc. M. Sp.*

♃ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t. 396. *Blackw.* t. 472. *Hayne* VII. t. 21.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae nigrae s. Tragoselini majoris s. Dauci cyanopi) an; sie ist lang, fingersdick, am Ende ästig, außen fast schwarz, innen bläulich. Sie hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch, und einen scharfen, brennenden, aromatischen Geschmack

Beide Pflanzen haben dieselben Eigenschaften: sie sind reizend, schweißtreibend und schmelzend — Gabe des Pulvers, zehen bis zwanzig Gran.

3) *Poterium Sanguisorba, L.*; Bibernelle; Pimprenelle commune (*Gal.*); Small burnet (*Ang.*); Pimpinelle (*D.*); Pimpinella (*His. I. Lus.*); Pimpernelle (*Bel.*); Pimpernella (*Suec*).

Br. Fer. Gal. His. His3. LP. Wir. Wür. *Be. Br. Gr. M. Re.*

♃ (Monoecia Polyandria, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Hayne* VIII. t. 23.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Pimpinellae s. P. minoris s. hortensis s. rubrae s. Italicae s. Sanguisorbae) ist dick, langgestreckt, röthlich und in mehrere Fasern getheilt. — Das Kraut besteht aus einem kantigen, wenig ästigen Stängel, welcher besonders unten gefiederte Blätter mit schwach behaarten Stielen trägt, deren eilf bis einundzwanzig Blättchen rundlich oder eirund, glatt und sehr tief gezähnt sind. Der Geruch ist schwach und gewürzhaft, der Geschmack adstringirend und schwach bitter.

4) *Sanguisorba officinalis, L.*; Blutkraut, Blutwurzel, Wiesenknopf; Pimprenelle des prés, Sanguisorbe (*Gal.*); Great burnet (*Ang.*); Pimpinelle (*D.*); Pimpinella (*His.*); Bloed kruid (*Bel.*); Pimpinella maggiore (*I.*); Sanguisorba (*Lus.*); Blodaert (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *M*

♃ (Tetrandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Sanguisorbae s. Pimpinellae Italicae) an; sie ist ästig, außen röthlich braungelb, innen gelblichweiß, geruchlos und stoptisch.

Ehedem hielt man sie für ein Wundmittel.

Infusum Pimpinellae. (BorC.)

℞. Rad. Pimpinellae alb. sesquiunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per horae quadrantem in vase tecto et cola.

Extractum Pimpinellae albae. (Bor. Bor4. Pal. Pol. Wir.)

℞. Rad. Pimpinellae albae libram.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per tres dies, tunc coque leviter, cola exprimendo et liquorem probe inspissa. (Pal.)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.
Digere per horas 12, cola exprimendo, alcoholem destillando extrahe et quod restat, ad extracti consist. inspissa. (Pol.)

Bor. et Sax. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae.

℞. Rad. Pimpinellae albae libram.
Alcoholis libras quinque ad sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo; digere, tunc coque parumper residuum cum Aquae libris tribus; clarifica decoctum Albuminis ope, liquores commisce et alcohole destillatione separato, quod remansit ad extracti consist. consume. (Wir.)

Bor4. Pimpinellae lib. unam cum Spiritus Vini rect. lib. quinque per horas 36 ad 48 digerere, exprimere, filtrare et seponere, residuo infundere Aquae comm. ferv. lib decem et per 36 ad 48 horas seponere, exprimere, liquori modico calore ad tertiam partem reducto et refrigerato Spiritum Vini rectif. admiscere, quamdiu inde turbatur, seponere deinde, decanthare, Spiritum Vini elicere, et residuum in balneo vaporis ad extracti absinthii spissitudinem evaporare.

Aqua Pimpinellae. (Gr.)

E Radice paratur destillationis ope.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae. (A. B*. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Sw.*)

℞. Rad. Pimpinellae alb. concis. unc. quinque.
Spir. Vini rectif. vel rectificatiss. libr. duas.
Post sufficientem extractionem exprime et filtra. (B*. Bor. Bor4. Han. O. Pol.)

A. et Suec. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,910) libram; — Br. D. Pal. et Wir. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — *Sw.* Radicis duas cum dimidia et sex Alcoholis; — Ful. Li. et Sax. Radicis unam et quatuor Alcoholis; — HassP. Radicis uncias quatuor, Spiritus rectif. libras duas.

Reizend, schweißtreibend, giftwidrig, harntreibend, einschneidend, reinigend und besonders bei catharrhalischen Halsleiden empfohlen — Gabe dreißig bis vierzig Tropfen und noch weit mehr.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae kalica. (Hass. *Pid.*)

℞. Rad. Pimpinellae alb. unc. tres.
Kali subcarbonici drachmam unam.
Spiritus Vini rectif. libram unam.
Post sufficientem digestionem exprime et filtra.

Reizend, schweißtreibend, harntreibend und einschneidend. — Gabe, zwanzig bis sechzig Tropfen.

Tinctura Pimpinellae composita, Mixtura resolvens. (*Sw.*)

℞. Tinct. Pimpinellae albae,
— Antimonii alcalis., sing. unc. quatuor.
Digere per aliquot dies, saepius agitando; cola et adde colaturae
Tinct. Succini aeth. uncias duas
Saponis medicinalis unciam unam.
Dissolve.

Reizend, bei chronischen Catarrhen, Nierenentzündung von Steinen, Gelenkrheumatismen, Podagra und manchen Hautkrankheiten gepriesen. — Gabe, von zwanzig Tropfen bis zu einer Drachme, zwei oder drei Mal täglich, in einem passenden Vehikel.

Oleum Pimpinellae, a *Gr.* indicatum.

Species pro Decocto vulnerario s. vulnerariae. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Rad. Pimpinellae,
— Ari macul., sing. unc. unam.
Herbae Saniculae,
— Pyrolae,
— Hederae terrestris,
— Veronicae,
Summit. Centaurii min., sing. semunciam.
Concisa misce. (Wir.)

℞. Herbae Alchemillae,
— Agrimoniae,
— Bugulae,
— Consolidae majoris,
— Bupleuri,
— Pimpinellae albae,
— Plantaginis,
— Pulmonariae arboreae,
— Virgaureae,
— Urticae, sing. unc. unam.
Rad. Consolidae majoris,
— Rhapontici,
— Tormentillae, sing. lib. unam.
Concisa misce. (Pal.)

℞. Rad Inulae,
— Consolidae majoris,
Rad. Tormentillae,
— Vincetoxici, sing. semunciam.
— Liquiritiae . drachmas sex.
Herbae Alchemillae,
— Saniculae,
— Plantaginis,
— Auriculae muris,
— Hyperici,
— Agrimoniae,
— Pimpinellae,
— Bugulae,
— Virgaureae,
Flor. Bellidis min., sing. semunciam.
Seminum Foeniculi drachmas sex.
Concisa et contusa misce. (Wir. *Sp.*)

Pinus.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Pinus Pinea, L.*; Pinienbaum; Pin a pignons (*Gal.*); Cultivated pinetree (*Ang.*); Domacy borowice (*B.*); Spansk syrt (*D.*); Pino alvar (*His.*); Tamme pynboom (*Bel.*); Pino sativo (*I.*); Pinheiro manso (*Lus.*); Spansk tall (*Suec.*).

Br. Fer. Gal. Wir. *Br. G. Gr. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.) des südlichen Europa's. (Nouv. Duh. V. t. 72. bis fig. 3. et t. 75. *Blackw.* t. 189 *Plenck* t. 679. Dict. d. Sc. nat. Cah. VII.)

Man wendet die Saamen, Piniennüsse (nuces s. nuclei Pineae s. Pini s. Pineoli); Pignons doux (*Gal.*) an; es sind holzige, bald harte und schwer zerbrechliche, bald weiche und leicht zu zerbrechende Köpfe, welche eine längliche, platte, an einem Ende dickere, ungefähr einen halben Zoll lange, und mit einem dünnen braunen Fellchen bedeckte Mandel enthalten, welche einen angenehmen Geschmack besitzt.

Sie kann die süßen Mandeln sehr gut ersetzen.

2) *Pinus sylvestris, L.*; gemeine Fichte, Kiefer; Pin sauvage (*Gal.*); Wild pine (*Ang.*); Lesnj borowice (*B.*); Furs (*D.*); Pino (*His. I.*); Pyn (*Bel.*); Sosna parowa (*Pol.*); Pinheiro (*Lus.*); Tall, Furu (*Suec.*).

A. An. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. *Be. G. Gr M. Re. Sp.* Z.

Ein Baum, welcher in einem großen Theile, besonders des nördlichen und gebirgigen Europa's gemein ist. (Nouv. Duh. V. t. 66. *Blackw.* t. 190. *Plenck* s. 677. *Schk.* t 380.)

Man wendet die Sprossen oder jungen Triebe (turiones s. strobili s. coni Pini)

an, welche im Frühjahre am Ende der Zweige hervorkommen. Sie bestehen gewöhnlich aus fünf bis sechs seitlichen, um die Basis einer dickern, sechs Linien bis einen Zoll langen Endknospe herum sitzenden Knospen, welche mit röthlichen Schuppen bekleidet sind und von Harz strotzen. Sie haben einen angenehmen, harzigen Geruch und einen bittern, schwach gewürzhaften Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

Species Turionum Pini compositae s. antiscorbuticae. (RC.)

℞. Turionum Pini
Herbae Millefolii,
— Fumariae,
— Trifolii fibrini,
Rasurae Ligni Juniperi,
Radicis Calami, singulorum
partes aequales.
Misce.

Decoctum Turionum Pini. (B*. RC.)

℞. Turionum Pini . manipulos tres.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Coque per horae quadrantem in vase tecto; liquori refrigerato adde Vini albi aequalem quantitatem et post horas 24 exprime. — Gabe, zwei Unzen und mehr.

RC. Specierum compositarum semunciam, Aquae purae sesquilibram coquere ad colaturam librae unius, cui, si libet, addes Acidi tartarici semidrachmam vel Acidi sulphurici drachmam unam vel Roob Oxycocci vel Syrupi Molasses vel Oxymellis simplicis vel Succi Citri unciam unam. — Ein Pfund und mehr täglich.

Emulsio Nucleorum Pineae. (Gal.)

℞. Nucleorum Pineae,
Sacchari albi, sing. unciam unam.

Contunde diu in mortario marmoreo, Aquam sensim affundendo, ut fiat pasta mollis, quam dilue in
Aquae fervidae (40° R.) libra una.
Cola exprimendo et adde
Aquae Flor. Aurant. . semunciam.

Oleum Nucleorum Pineorum s. Nucis Pini. (His3. *Gr.*)

℞. Nucleor. Pineor. non rancid.
libras sex.

In mortario lapideo tere pistillo ligneo, per setaceum trajice et sacculo cannabino immissos, torculari subjice.

Alcohol dilutum antiscorbuticum. (RC.)

℞. Extracti amari
Extr. Turionum Pini (vol. 1. p. 2.), sing. semunciam.
Alcoholis diluti . . semilibram.

Cerevisia e Turionibus Pini alba. (*Gr. Re.*)

Aquae congios decem, Sacchari libras sex, Essentiae Pini uncias quatuor, Fermenti etc. — *Cerevisia fusca* ut illa, sed loco sacchari Molasses adhibetur. (*Spruce beer.*)

Spruce beer powders (*Gr. Re.*): Sacchari albi scrupulos quatuor, Carbonat. Sodae gr. viginti sex, Essent. Pini gr. decem; — Acidi tart. vel citrici semidrachmam, dissolve in vitris separatis, misce; sogleich zu nehmen.

Essentia Pini (*sylvestris*) (*Re.*): Est Extractum Pini e Decocto ad spissitudinem certam evaporato.

Tinctura Pini (*Gr.*): Essentiae Pini sylv. uncias duas, Spir. Turion. Pini libram unam. — Reizend, antiseptisch.

P i p e r.

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen in Erwähnung:

1) *Piper nigrum, L.*; Pfeffer; Poivre commun (*Gal.*); Pepper (*Ang.*); Filfil uswud (*Ar.*); Czerny pepr (*B.*); Micha (*Ba.*); Hu-tseaou (*C.*); Gammiris (*Cy.*); Peper (*Bel. D.*); Kali mirchie (*Duk.*); Pimienta (*His.*); Miritch, Golmirch (*Hin.*); Pepe (*I.*), Maricha (*Ja.*); Kaly mirchingay (*Mah.*); Lada (*Mal.*); Sahan (*Palembang*); Filfil siah (*Pe.*); Pieprz (*Pol.*); Pimenta preta (*Lus.*); Perez (*R.*); Maricha (*Sa.*); Peppar (*Suec.*); Mellaghu (*Tam.*); Mirialu (*Tel.*).

A. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid Re. Sp. Va. Z.*

Ein Strauch (Diandria Trigynia, L.; Piperaceae, J.) Ostindien's (*Blackw.* t. 348. *Plenck* t. 25. Fl. méd. V. 276.)

Man wendet die Früchte (baccae Piperis (nigri et albi) s. Piper) an; es sind rundliche harte Beeren von einem gewürzhaften, beißenden Geruch und einem scharfen, brennenden, beißenden, anhaltenden Geschmack. Weißer Pfeffer, Piper album, Poivre blanc (*Gal.*), nennt man sie, wenn das äußere Fellchen abgezogen ist, im Gegentheil, schwarzer Pfeffer, Piper nigrum, Poivre noir (*Gal.*). Im letztern Falle sind sie außen schwarz oder braun, und bloß innen weiß.

Ihre Schärfe verdanken sie, nach Oerstedt, einem crystallisirbaren eigenthümlichen Stoffe, dem Piperin, Piperinum, Pipera, Pipérin (*Gal.*), welcher mit den Harzen Verwandtschaft hat.

2) *Capsicum annuum*, *L.*, Spanischer Pfeffer; Piment annuel, Poivre de Guinée ou d'Inde ou d'Espagne, Corail des jardins (*Gal.*); Guinea pepper (*Ang.*): Spansk peber (*D.*); Pimienta de Indias (*His.*); Jaarlykse spaansche peper (*Bel.*); Peperone (*I.*); Pieprz yca (*Pol.*); Pimentao da India (*Lus.*); Spansk peppar (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Hass. HassP. Lon. LonN. Pol. RC. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Re Sp. Va.*

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, *J.*) Eine Pflanze Indien's, von woher sie nach America und Europa verpflanzt worden ist. (*Rheede* Malab. II. t. 35. *Blackw.* t. 129. *Plenck* t. 107. *Schk.* t. 47.)

Man wendet die Früchte (Capsicum, fructus s. baccae Capsici s. Piperis Indici, Piper Indicum s. Turcicum s. Hispanicum) an; es sind trockne, sehr glatte, längliche, hell- oder gelblichrothe, blasige, zweifächerige Beeren von sehr verschiedener Gestalt, in denen sehr viele platte Saamen enthalten sind. Sie haben keinen Geruch, aber einen sehr bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

Ihre Schärfe wird von einem eigenthümlichen Alcaloid, dem Capsicin (Capsina, Capsinium, Capsicinum), hergeleitet.

Reizend, jedoch mehr in der Küche, denn als Arzneimittel angewendet.

Ainslie (*Gr.*) gedenkt dieser Art gar nicht, sondern führt das Capsicum frutescens (*Rumph.* Amb. 5. t. 88. fig. 3), Filfil achmar (*Ar.*); Tabia (*Ka.*); Meneschena (*Can.*); Gasmiris (*Cy.*); Lal mirchie (*Hin.*); Lombok (*Ja.*); Tambhudda mirchingay (*Mah.*); Lada mira (*Mal.*); Fulfili surkh (*Pe.*); Brahn maricha (*Sa.*); Mollaghai (*Tam.*); Merapakaia (*Tel.*), ebenfalls aus Ostindien, an. Diese Pflanze hat dieselben Eigenschaften, wie die vorhergehende.

3) *Myrtus Pimenta*, *L.*; Neue Würze Jamaicanischer Pfeffer, Englisches Gewürz, Allerleigewürz, Amömlein, Nelkenpfeffer, Wunderpfeffer; Poivre de la Jamaique, Piment des Anglois, Toute-épice (*Gal.*); Pimenta, allspice (*Ang.*); Pimienta de Tabasco, Malaguetta (*His.*); Pepe garofanato (*I.*); Pimenta (*Lus.*); Jamaica pepper (*Bel.*); Angielski ziele (*Pol.*); Krydd pepper (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hs. His3. Lon. LonN. LP. O. Pm. Pol. Sax Suec. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pi. Re Sp. Va.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*) der Antillen und Ostindien's (*Blackw.* t 253. *Plenck.* t. 375. *Desc* Fl. Ant. 215.)

Man wendet die Früchte oder Beeren (Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasci s. caryophyllatum s. odoratum, Baccae Pimentae s. Pimento) an, welche man vor dem Reifwerden trocknen läßt; sie sind runzlich, etwas größer als die Körner vom schwarzen Pfeffer, kugelich oder länglich, genabelt und dunkelbraun. Sie haben einen gewürzhaften Geruch und Geschmack wie von Pfeffer, Zimmt und Nelken.

4) *Piper longum*, *L.*, langer Pfeffer; Loivre long (*Gal.*); Pepe lungo officinale (*I.*)

An. Br. Du. Ed. Fer. GalM. His. His3. Lon. LonN. RC. Wir. *Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va.*

Ein rankender Strauch (Diandria Trigynia, L.; Urticeae, *J.*) Ostindien's. *Blackw.* Herb. t. 356. 348. *Plenck* t. 26.)

Die Frucht (Piper longum, Fructus vel Baccae Piperis longi) ist eine, einige Zoll lange, walzige, graulichte, außen chagrinartige Aehre von der Dicke einer Federspule, welche innen in mehrere kleine Fächer getheilt ist, deren jedes einen rundlichen Saamen enthält. Der Bruch ist schwärzlich und an den Rändern harzig, innen graulich und faserig; der Geschmack ist scharf, brennend und etwas bitter.

Sie enthält, nach Dulong, dieselben Bestandtheile, als der schwarze Pfeffer.

Gr. führt außer diesen noch an: P. Siriboa, Blätter wie die des P. Betel; P. reticulatum, Saft als antidotum von Agaricus- und Jatropha-Arten; P. umbellatum, Kraut in Syrup gegen Husten und Schnupfen (colds); P. Amalago, zu Bädern und Räuchungen; P. carpapiga, Blätter bei Dyspepsie; P. angustifolium, Abkochung gegen vener. Krankheit; P. peltatum, Früchte, äußerlich bei Anschwellung und Wassersucht; P. crystallinum (Peperomia crystallina) statt des Anis zu gebrauchen.

Extractum Piperis nigri. (*Gr. Re.*)

E. Decocto (℔j in Aq. 0,550 *Re.*) vaporationis ope paratur.

Vinum Cayennense. (*Gr. Re.*)

Piperis Cayennens. unciam, Vini

Hisp. albi octarium macera per dies 14 et exprime. Mehr in der Küche.

Essentia Piperis, Tinctura Piperis s. Piperis nigri. (*Br. Gr.*)

℞. Piperis nigri . . partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Post sufficientem extractionem filtra.

Gr. Piperis unciam unam, Spir. rectif. duodecim.

Reizend.

Tinctura s. Essentia Capsici s. Capsici annui. (Am. B*. Bor. Bor4. Han. Lon. LonN. *C. E. Gr. Re. Vm*)

℞. Piperis Indici . . unciam unam.
Alcoholis (0,930)
octarios (libras) duos.

Digere per dies quatuordecim et filtra. (Am. Lon. LonN. *C. E. Gr. Re.*)

B*. *Re.* Capsici semunciam et Alcoholis libram (semioct. *Re.*); — Bor. Bor4. et Han. Capsici uncias duas et Alcoholis libram; digestionem per triduum Bor4. — *Vm.* Capsici partem unam et Aquae Vitae decem; — *Gr.* Capsici unciam, Aquae Vitae octarium, macera per dies quatuordecim et exprime. (*Ess. of Cayenne pepper with brandy.*); — *Va.* Capsici partem unam Alcoholis triginta novem.

Reizend. — Gabe, eine bis drei Drachmen. — Man wendet diese Tinctur bisweilen in Gurgelwasser, mit der doppelten Menge Wasser verdünnt, an.

Tinctura Capsici et Cantharidum (Am. B*. *C. Re.*)

℞. Cantharidum . drachmas decem.
Piperis Cayennensis . drachmam.
Aquae Vitae . . octarium unum.

Digere per dies decem et filtra.

Ein in hohem Grade reizendes Mittel, welches man besonders bei brandigen Uebeln empfohlen hat, und welches man auch innerlich zu zehen Tropfen in Gummiauflösung oder Eibischabkochung geben könnte.

The Devil's elixir (*Gr.*): Capsular. Capsici contus. semunciam, Zingiberis sesquiunciam, Cantharid. drachmas duas cum dimidia, Croci sesquiunciam, Caryophyll. semunciam, Spirit. ten. libras tres cum dimidia. ½ bis 3 Drachmen, bei Impotenz in Mixturen.

Tinctura Pimentae. (*Gr.*)

℞. Piperis Jamaicensis . uncias octo.
Spiritus tenuioris . octarios tres.

Eine halbe Pinte mit einer Pinte Wasser verdünnt, bei Kolik der Pferde. (Veter.)

Essentia stomachica polychresta Gundelsheimeri, Tinctura stomachica. (Wir. *Sp.*)

℞. Piperis Hispanici unciam unam.
— nigri,
— albi,
— longi, sing. drachmas duas.
Liquoris Kali acetici,
Alcoholis ammoniac., sing.
uncias sex.

Digere et filtra. (*Sp.*)

Wir. Cardamomi minoris drachmas decem addit.

Reizend, als auflösend bei Cachexien und Wassersuchten gerühmt. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen.

Rymer's cardiac tincture. (*Gr. Re.*): Capsicum, Camph., Cardam. min., Rheum, Aloes, Castor., Spir. ten. cum Ol. Vitr. gutt. aliquot.

Tinctura stomachica acuta Ernstingii. (B*.)

℞. Piperis Hispanici unciam unam.
— nigri,
— albi,
— longi,
Granorum Paradisi,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Radicis Calami,
Polii Cretici, sing. . semunciam.
Liquoris Kali acetici uncias duas
Alcoholis . . . uncias viginti.

Digere in loco calido per dies aliquot. — Diese Tinctur unterscheidet sich wenig von der vorhergehenden.

Tinctura Pimentae sulphurica, Tinctura Piperis Jamaicensis aetherea. (*Sw.*).

℞. Piperis Jamaicensis . uncias tres.
Alcoholis . . uncias quindecim.

Post quatuordecim dies infusionis cola et colaturae sensim adde

Acidi sulphurici uncias quindecim.

Reizend, bei Blennorrhöe und Krankheiten von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zehen Tropfen zweimal täglich, in einem passenden Vehikel.

Acetum Piperis nigri et albi. (*Gr.*): Piperis unciam, Aceti octarium macerare per dies quatuordecim et exprimere. — Mehr in der Küche gebraucht.

Acetum Piperis Jamaicensis. (*Vm.*)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
Aceti albi . . . . partes octo.

Infunde frig. per septimanam et filtra.

Acetum Capsici spirituosum. (*Sw*. Va.*)

℞. Capsici rec. et maturi unc. duas.
Aceti albi,
Aquae Vitae, sing. unc. duodecim.

Post aliquot dies filtra. — Reizend, fäulnißwidrig, bei bösartiger Bräune in Gurgelwasser mit Chinaabkochung, bei Wassersucht und Cacherien empfohlen. — Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich mehrmals in irgend einem aromatischen Wasser.

Aqua Piperis nigri. (*Vm.*)

℞. Piperis nigri contusi partem unam.
Aquae . . . partes quindecim.
Destillent partes quinque.

Aqua Pimentae s. Pimento s. Myrti Pimentae s Piperis Jamaicensis. (B. Bel. Du. Ed. Lon. LonN. *Gr. Re. Sw. Vm.*).

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Post horas viginti quatuor destillent octarii sedecim. (B. Bel. Du. *Sw.*)

Vm. Piperis libram unam et octodecim Aquae; destillent librae sex; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Pimentae semilibram, Aquae q. s.; macera per horas 24, tum destillet congius.

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent partes decem, producto adde Aquae Vitae uncias quinque.

Spiritus Pimentae, Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis vinosa s. Myrti Pimentae s. Pimento. (Bel. Du. Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. *C. Gr. Re. Sw.*)

℞. Piperis Jamaicensis . uncias tres.
Kali subcarbonici drachmas sex.
Vini Rhenani . . . libras tres.
Post aliquot dies destillent librae duae (Ful.)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Vini generosi . . . partes octo.
Macera per duos dies et destilla. (Wür.)

℞. Piperis Jamaic. partem dimidiam
Alcoholis 20° . . . partes octo.
Post sufficientem macerationem destillet spiritus 19° indicans. (Bel.)

℞. Piperis Jamaicensis . semilibram.
Aquae Vitae . . . libras novem.
— purae . . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae novem. (Ed. *C.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* Piperis uncias duas, Aquae Vitae congium et Aquae q. s.; destillet congius; — Du. *Gr.* Piperis uncias tres, Aquae Vitae congium et Aquae q. s.; destillet congius; — *Sw.* Piperis partem unam, Aquae Vitae quatuor et tres Aquae; destillent partes quatuor; — Gen. Piperis unciam unam, Aquae Vitae tres et Aquae q. s.; destillent librae tres. — *Gr.* Pimentae uncias octo, Aquae Vitae congium.

Clove Cordial (*Re.*): Destillando Caryophyll. libras quatuor et Pimentae semilibram cum Spiritus congiis sedecim.

Tinctura arom. flava, Usquebaugh flavum (*Gr.*): Pimento, Anisi, Carvi, sing. uncias tres, Macid., Caryophyll, Nuc. mosch., sing. duas, Coriand., Angelic., sing. octo, Croci, Orellan., sing. duas, Sacch. sex, Spir. rectif. cong. sex; — *Usq. viride* loco croci et orell. sap green sumatur.

Oleum Piperis nigri s. piperinum. (*Fi.*)

In paratione Piperini obtinetur, vide Piperinum.

Oleum Pimentae aethereum s. Fructus Myrti Pimentae, Aethereoleum Pimentae s. Piperis Jamaicensis. (Am. Br. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Pal. Sax. Suec. Wür *C. Gr. Re. T.*)

℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillent. (Am. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. Suec. *C.*)

Sax. Piperis partem unam et quatuor Aquae; — *T.* Piperis partem unam, Aquae duplum; destillent dimidia pars vel duae partes quintae liquidi adhibiti et cohobentur, donec quantitas requisita obtenta fuerit

℞. Piperis Jamaicensis libram unam.
Aquae . . . . libras sedecim.
Salis culinaris . . uncias duas.
Post quinque ad sex dies destillent. (Br. Pal.)

℞. Piperis Jamaicensis quantum vis.
Aquae Piperis Jamaicensis . q. s.
Macera per hor. 12, tum destillent. (Wür.)

Piper nigrum tritum reductum (*Gr.*): Pip. nigri libram unam, Integument. Semin. Sinapis nigrae sex.

Pulvis aromaticus. (RC.)

℞. Seminum Cardamomi,
Radicis Zingiberis,
— Calami,
Piperis longi, vel
— nigri, sing. partes aequales.
Pulverata misce. — Bei Verdauungsbeschwerden ꝛc. — Gabe, zehen Gran bis ein Scrupel und mehr.

Pulvis febrifugus. (B*.)

℞. Piperis Hispanici . . grana sex.
Baccarum Lauri scrupulos duos.
Fiat pulvis in tres partes dividendus. — Man nimmt das erste Pulver bei Ein-

tritt der Kälte, das andere den folgenden Tag um dieſelbe Stunde und das dritte den dritten Tag. — Bergius rühmt es.

Pilulae stimulantes. (B*. *E. Va.*)

℞. Capsici . . . drachmam unam.
Farinae secalis . grana quinque.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei ſchwarzem Erbrechen und gelbem Fieber. (B*.)

℞. Capsici . . . drachmam unam.
Micae Panis,
Aquae, sing. . quantum sufficit.
Fiant pilulae decem (duodecim, *Va.*) Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich. (*E.*)

Boli febrifugi. (*B. Va.*)

℞. Piperini . . scrupulum unum.
Micae Panis . quantum sufficit.
Fiant boli sex (duodecim *Va.*). — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. — Dieſe Biſſen haben oft keine Wirkung, wie Brera anführt.

Trochisci excitantes. (*Pie.*)

℞. Piperis longi,
Nucis mosch., sing. semidrachm.
Seminum Staphydis agriae,
Rad. Pyrethri, sing.
scrupulos duos.
Sinapis,
Origani, sing. scrupulum unum.
Mellis sufficientem quantitatem.

Gargarisma excitans piperitum s. Capsici annui (B*. *Au. Gr. Re. Va.*)

℞. Piperis Cayennensis semunciam.
Magnesiae subcarb. drach. unam.
Aquae bullientis,
Aceti dest., sing.
unc. octo (tres, *Au. Va.*)
Dieſe Formel iſt von Headly. — Currie wendete einen Aufguß von einem Gran in zwei Unzen Waſſer an; Adair die mit Waſſer verdünnte Tinctur des Cayennepfeffers.

℞. Capsici pulverati . . drachmam.
Salis communis . . . scrupulum.
Aceti . . . drachmas quatuor.
Aquae ferventis unc. unam (quatuor. *Re.*)
Bei geſchwüriger Bräune und Scharlach. (*Gr. Re.*)

Gargarisma stimulans. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Tincturae Capsici . semunciam.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce. — Bei chroniſcher Bräune.

Pulvis ocyticus s. partum accelerans. (*Pie.*)

℞. Semin. Lavand. . semidrachmam.
— Plantaginis,
— Endiviae, sing. scrup. duos.
Piperis . . . scrupulum unum.
Man giebt dieſes Pulver in vier Unzen Endivien- und ebenſoviel Geisblattwaſſer, um die Niederkunft zu erleichtern; auch dient es in Einreibungen auf den Kopf, zur Tödtung des Ungeziefers.

Electuarium stomachicum s. stomachicum alterans s. piperinum. (*Sa. Sw. Va.*)

℞. Piperis nigri,
Conserv. Aurant., sing.
unc. unam.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Misce. (*Su.*)

℞. Radicis Calami,
— Galangae,
Piperis nigri, sing. unciam unam.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Misce. (*Sw.*) — Addi potest Oxydi Ferri nigri semuncia.
Bei Verdauungsbeſchwerden oder gichtiſcher Cardialgie und Windcolik empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Electuarium s. Opiatum antihaemorrhoidale s. anticachecticum. (*Ca. Sw.*).

℞. Radicis Inulae,
Foeniculi, sing. . . uncias tres.
Piperis nigri . . unciam unam.
Sacchari albi,
Mellis, sing. . . . uncias duas.
Misce. — Gabe, eine bis zwei Drachmen zwei oder drei Mal täglich bei Hämorrhoidalkacherie, Verdauungsbeſchwerden und Darmverſchleimung.

Unguentum Piperis nigri, Epithema rubefaciens. (B*. Du. *Bo. C. Ca. Gr. Re.*)

℞. Pip. nigri pulv.
unc. (drachm. *Re.*) quatuor.
Axungiae praep. . libram unam.
Contere bene. (Du. *C. Gr. Re.*)

℞. Salis culinaris,
Piperis nigri, sing. libram unam.
Fuliginis cribrati . . semilibram.
Sinapis pulverati . . semunciam.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Axungiae Porci . . libras duas.
Fiat unguentum. (*Bo.*)

℞. Saponis albi raspati
uncias sex et drachmas duas.
Olibani . . drachmas quinque.
Piperis nigri,
Salis comm., sing. drachmas tres.
Alcoholis . . . . uncias septem.
Digere ad solutionem saponis usque,

tunc coque per sexagesimas aliquot, spatulae ope agitando et supra linteum extende. (B°. *Ca.*)

Alle dieſe Salben wirken hautröthend und mehr oder weniger epiſpaſtiſch.

Cataplasma antipleureticum s. rubefaciens. (Gal. *Bo. Ca. E. Pie. Re.*)

℞. Piperis longi,
Zingiberis, sing. . . semunciam.
Albuminis Ovi . . . . . q. s.
Misce sedulo. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Farinae Hordei leviter tostae uncias quatuor.
Aceti fortis . . unciam unam.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Aquae . . . quantum sufficit.
Supra stupas extende et consterne mixturam e
Pulveris Piperis nigri,
— Foeniculi, sing. semuncia.
Sogleich anzuwenden. (Gal. *Ca. Re.*)

℞. Farinae Sinapis . . semilibram.
Piperis nigri,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat pasta mollis. (*E.*)

℞. Pulv. Piperis Cayennensis,
— Cinnamom.,
— Caryophyll., sing. semunciam.
Farinae,
Vini, singulorum quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*E.*)

Emplastrum piperitum s. stimulans, Dropax antiparalyticum. (*Au.*)

℞. Picis . . . . . uncias duas.
Galbani,
Piperis nigri, sing. drachmas tres.
Olei Baccarum Lauri . . q. s.
Plenck empfahl es bei Lähmung.

Infusum Capsici s. Piperis Cayennensis. (*E. Re.*)

℞. Piperis Cayenn. sesquidrachmam.
Aquae bullientis octarium dimid.
Löffelweiſe zu nehmen.

Re. Piperis Cayenn. grana quatuor, Aquae frigidae uncias quatuor, infundere per horas tres et filtrare, praeterea cum Aq. dest. eadem quantitate per horas duas in vase clauso infundere et filtrare.

Infusum Piperis vinosum. (*Va.*)

℞. Piperis nigri . drachmam unam.
Vini albi . . . libram unam.
Infunde. — 3—6 Löffel täglich als Magen- und allgemeines Reizmittel.

Piperinum. (*Fi. Gr. Va.*)

℞. Piperis nigri contusi . libras duas.
Alcoholis 35° . libras quinque.
Immitte piper cum alcoholis libris tribus in alembicum cupreum stanno obductum, quem post horas 12 sepositionis in balneum Aquae immersum ad ebullitionem usque calefac; tunc ab igne remotum et refrigeratum cola; residuo reliquas duas alcoholis libras infunde, itidem agendo; infusiones conjunctae filtrentur, tunc duo trientes destillent; residuum in vas vitreum infusum, per aliquot dies tectum relinquatur, quo facto piperinum crystallisatum subsidet, et filtrando per chartam separetur; crystallis in filtro residuis infunde Alcoholem purum frigidumque, post duos dies filtra, denuo Alcoholem infunde piperino ut album obtineatur. Fluida haec cum priori commixta destillationi in vase vitreo subjiciantur ad pelliculae densae apparitionem; infunde itidem in vas vitreum, ut per aliquot dierum lapsum novum piperinum praecipitatur pari modo cum Alcohole infundendum, eductum quod obtinuisti intra chartam emporeticam sicca; in fluido superstite *Oleum acre* remanet.

Gr. Re. Piperis nigri libras duas in Alcoholis 36° B. libris tribus digere, simulac refrigefacta, coque, decantha et affunde Alcoholis libras tres, tincturis commixtis adde Aquae destillatae libras duas et Acidi muriatici uncias tres, materiam unginosam separa et piperinum filtro et parietibus vasis adhaerens collige (*Re.* Solutionem muriaticam vaporatione concentrare et Potassa pura decomponere); vel: Piper nigrum cum Alcohole tamdiu digere, quam aliquid excipitur, tincturas vapora, materiam unginosam Aqua bulliente ablue et in Alcohole dissolve, quo sponte vaporato crystallos piperini obtinebis.

Gabe, zwei bis zwölf Gran. — Das ſcharfe Oel zuweilen von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pistacia.

Pistacia (*Pistachia*) *vera*, *L.*; Piſtazienbaum; Pistachier commun (*Gal.*); Pistachia tree (*Ang.*); Pistacy, Klokoeka (*B.*); Pistaceira (*His.*); Pistache boom (*Bel.*); Pistacchio (*I.*); Fastuca (*Sic.*).

Ba. Br. Fer. Gal. Gen. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, *J.*), welcher urſprünglich in Aſien einheimiſch, aber im ſüdlichen Europa angepflanzt iſt. (*Lamk.* Ill. t. 811. fig. 1. 2. *Plenck* t. 708. Dict. d. Sc. nat. Cah. 4. *Blackw.* Herb. t. 461.)

Man wendet die Saamen, Piſtacien, Syriſche Nüßchen, Pimpernüßchen, Pistaciae, Pistaches (*Gal.*), an: ſie ſind eiförmig, länglich, röthlich, äußerlich runzelig und enthalten einen öligen, hellgrünen, angenehm ſchmeckenden Kern.

Oleum Pistaciarum. (Gal. Sar. *Gr.*)

℞. Pistaciarum mundat. . . q. vis.
Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e tela confecto inclusam frigide exprime.

Emulsio Pistaciarum. (Gal.)

℞. Pistaciarum,
Sacchari albi, sing. unciam unam.
Contunde diu, sensim Aquam affundendo, dilue pastam in
Aquae calidae . . . libra una.
Cola exprimendo et adde
Aquae Flor. Aurant. . semunciam.

Pix liquida.

Pix liquida nigra, Pissa, Pix Cedria, Cedria, Resina Pini empyreumatica liquida, Terebinthina empyreumatica; Theer, flüſſiges Pech; Goudron, Poix liquide (*Gal.*); Tar (*Ang.*); Tioere (*D.*); Teer (*Bel.*); Tjaera (*Suec.*)

Am. Ams. B. Bel. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. RC. Sax. Suec. Wir. *Be. C. Fi. G. Gr. Par. Re. Sp.*

Eine ſchwärzlichbraune, zähe, fadenziehende, halbdurchſichtige Flüſſigkeit, welche die Conſiſtenz eines dicken Syrups, einen harzigen, brenzlichen Geruch und einen bittern harzigen Geſchmack beſitzt und den Speichel roſenfarbig braun färbt.

Man erhält ſie durch langſame, trockene, unterwärtsgehende Deſtillation von Holzſpänen verſchiedener Zapfenbäume, Pinus sylvestris, palustris und maritima. — Das *Oleum cadinum* (von Juniperus Oxycedrus) dient bisweilen als Theer. (*Gr.*)

Es iſt ein Gemiſch von halbverbranntem Harz, empyreumatiſchem Oel und Eſſigſäure.

Der Theer iſt ein ſehr kräftiges Reizmittel, welches mit zu mehreren Arzneimitteln kömmt. Man hat ihn ſelbſt allein, in Milch oder Bier, oder in Geſtalt von Pillen, bei veralteter und hartnäckiger Krätze nehmen laſſen. Die Engländer haben vor Kurzem den Dampf davon bei der Behandlung der Lungenſchwindſucht empfohlen. Um ihn in Pillenform zu bringen, ſetzt man Schierlingspulver hinzu und man erhält ſo eine Maſſe, welche man in dreigranige Pillen theilt, von denen der Kranke anfangs nur eine nimmt, aber dann täglich ſteigt, bis er auf vier und zwanzig Stück auf einmal gekommen iſt.

Oleum Pini s. Taedae (*Gr. Re.*) deſtillatione Picis liquidae.

Aqua picea s. Picis s. Picis liquidae s. Taedae, Infusum Picis liquidum s. Picis empyreumaticae liquidae, Potio picea. (An. B*. Ba. Br. Du. Ful. Gal. Li. Pm. R. Sax. Suec. Wir. *C. Ca. Fi. Gr. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Picis liquidae . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Agita bene mixturam et post sepositionem per horae quadrantem ad duos dies decantha liquidum supernatans. (Br. Du. Sax. Suec. *C. Gr. Re. Sa. Sp. Sw. Sy.*)

B*. Picis liquidae partem unam et Aquae quinque; — Ba. Aquae sex (formula *Berkeleyi*); — Ful. Li. Wir. *Re.* octo Aquae; — *Fi.* Aquae sex; sepositionem per dies quatuor, subinde agitando; — Gal. Picis liquidae quinque et sedecim Aquae; — *Ca.* et *Ra.* Picis liquidae partem unam, Aquae quadraginta octo et infusionem per septimanam.

℞. Picis liquidae . partem unam.
Aquae partes sexaginta quatuor.
Commisce triturando, vas deinde tectum calori lenissimo expone per diem unum et filtra. (*Vm.*)

Pm. Picis navalis libram unam, Aquae pluvialis libras viginti, infunde supra cineres calidos per diem, quandoque agitando et filtra.

℞. Aquae . . . . uncias viginti.
Tinct. Picis liquid. scrup. unum.
Instilla tincturam, guttas tres vel quatuor singula vice, in aquam, vas semper vivide agitando. (*Vm.*)

Van Mons führt die Bereitungsart dieſer Tinctur nicht an; es iſt jedoch bekannt, daß der Theer in Alcohol auflöslich iſt. Wahrſcheinlich enthält die letztere Formel eine größere Menge empyreumatiſches Oel, als die vorhergehenden, in denen nur wenig enthalten iſt, welches mittelſt der Eſſigſäure ſich darin aufgelöſ't befindet.

Früher galt dieſes Mittel, nach des Biſchof's Berkeley Anſicht, für eine Panacee, heutzutage iſt es faſt vergeſſen. Es ſollte gegen Scorbut, Blattern, Catarrh, Würmer nützlich, reinigend, alterirend, ſchweiß- und harntreibend ſeyn. Es reizt den Magen ſehr heftig. — Gabe, für Kinder zwei bis drei Unzen, für Erwachſene ungefähr ſechszehen Unzen. — Man kann, um es angenehmer zu machen, Zucker mit einigen Tropfen Muskatnußöl oder ſelbſt Schwefeläther hinzuſetzen.

Lotio Picis (*Re.*): Acidi picei rectif.

unciam, Aquae dest. octarium. — Bei tinea, Hautausſchlägen, Sommerſproſſen.

Unguentum Picis s. e Pice s Picis liquidae. (Am. DD. Du. Ed. Lon. LonN. RC. Suec. *C. Gr. Re. Sa.*)

℞. Picis liquidae,
Axung. Porci praep., sing. libr. unam.
Liquata per linteum cola. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Du. loco axungiae Sebum vervecinum; — Am. Ed. *C. Gr.* Ceram flavam adhibent prope ignem liquatam cum Pice miscendam (*Gr.* Picis liq. libras quinque, Cerae flavae duas).

℞. Farinae Secalis . libram unam.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Coque ad pastae consistentiam et adde
Resinae Pini,
Picis liquidae, sing. . semilibram.
Stet mixtura super igne continue agitata, donec satis sit spissa. (Suec.)

℞. Picis liquidae . uncias quatuor.
Butyri saliti rancidi uncias duas.
Kali subcarbonici unciam unam.
Misce triturando. (DD.)

℞. Picis liquidae . . libram unam.
Sulphuris . . . uncias quatuor.
Commisce unum post alterum cum
Cerae flavae fusae . uncia una.
Misce bene. (RC. *Sa.*)

Alle dieſe Salben ſind bei Hautkrankheiten und beſonders bei Kopfgrind angewendet worden.

Tar liniment (*Re.*): Olei Pini et Olei Oliv. vel Cetacei, sing. part. aequales. (Veter. Coll. Pharm.)

Linimentum Bituminis (*camphoratum*) (*Re.*): Picis liq. Barbadensis unciam, Camph. cum Alcoholis pauxillo tritae semunciam, misce. — Bei Anſchwellung der Gelenkbänder (*Forster*), sec. *Kirkland* loco camph. Solutio Ammoniae adhiberi potest.

Unguentum pro porrigine (*Gr.*); Ungt. Picis, Ungt. Hydrarg. nitr. mit., Ungt. cetacei, sing. part. aeq.

Linimentum farinaceum cum Pice. (*Au.*)

℞. Farinae Secalis . partes quatuor.
Gentianae pulv. . partem unam.
Picis liquidae . quantum sufficit.

Bei Scirrhus, mit Guajacabkochung innerlich, gerühmt.

Emplastrum Picis liquidae. (Han. Sax. *Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . partes sex.
Colophonii . . . . partes tres.
Liqua et adde
Picis liquidae . . partem unam.
Cola mixturam et ad perfectam refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

Han. et Sax. Cerae partes octo, Resinae Pini unam et sedecim Picis liquidae.

Pilulae Picis. (Am. B*. RC. Sar. *C.*)

℞. Picis liquidae . . quantum vis.
Radicis Inulae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum sex. (Am. B*. *C.*)

℞. Picis liquidae,
Bals. Peruviani, sing. semunciam.
Pulv. Liquiritiae . unciam unam.
— Iridis Flor. . drachmas tres.
Fiat massa pilularis. (Sar.)

Gabe, eine halbe Drachme, täglich zwei Mal. — Man hat ſie bisweilen bei Lungenſchwindſucht angewendet.

℞. Picis liquidae . . quantum vis.
Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

Gabe, vier, ſechs zwei- oder dreimal täglich, bei Scorbut und Hautkrankheiten. (RC.)

Thrush mixture (*Re.*): Picis liq. uncias quatuor, Acidi sulph. sesquidrachmam. (Pharm. Veterin. Coll.)

Plantago.

Unter dieſem Namen findet man:

1) *Plantago Psyllium, L.*; Flohſaame; Herbe aux puces commune (*Gal.*); Clammy plantain, Fleaseed (*Ang.*); Chmelik blessnjk (*B.*); Psilleurt (*D.*); Zaragatena (*His.*); Vlookruid (*Bel.*); Pulicaria (*I.*); Pulgueira, Zaragatoa (*Lus.*); Loppfraegraes (*Suec.*).

Ams. An B. Ba. Bor. Br. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. His. His3. LP. O. R. Wir. *Br. Gr. M. Sp.* Z.

☉ (Tetrandria Monogynia, L.; Plantagineae, *J.*) Eine Pflanze Aegypten's und des gemäßigten Europa's. (*Hayne* V. t. 17. *Zorn* Ic. pl. t. 115.)

Man wendet den Saamen (semen Psyllii s. Pulicariae s Plantaginis arenariae) an; er iſt klein, langgeſtreckt, dunkelbraun, glänzend, glatt, weich anzufühlen, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, geruchlos und von ſchleimigem, bitterem und ſcharfem Geſchmack.

Erweichend.

2) *Plantago Cynops, L.*; ſtrauchartiger Wegerich; Herbe aux puces vivace (*Gal.*).

Ba. Bel. Bor4.

♃ Eine Pflanze Aegypten's und des ſüdlichen Europa's. (*Bull.* t. 363. *Waldst.* et Kit. Pl. Hung. t. 51. *Hayne* V. t. 16.)

Der Saame kann ganz wie der von voriger Art angewandt werden.

Erweichend.

3) *Plantago major*, *L.*; großer Wegerich, Wegtritt; Plantain commun, Grand Plantain (*Gal.*); Great plantain (*Ang.*); Vejbred (*D.*); Llanten major (*His.*); Groote wegblad (*Bel.*); Piantaggine maggiore (*I.*); Kanasch (*Pers.*); Labka (*Pol.*); Tanchagem major (*Lus.*); Popuschnik (*R.*); Grodblad (*Succ.*).

Ams. Au. B. Bor4 Br. Fer. Gal. Gen. His. His3. Li. Wir. *Bc. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

Eine in Europa überall wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t. 13. Dict. d. Sc. nat. Cah. V. Fl. med. V. 275.)

Man wendet die Wurzel und die Blätter an.

Die Wurzel (radix Plantaginis majoris s. lat foliae s Arnoglossi s. Septinerviae) besteht aus einem harten, dicken, fast holzigen, unten mit walzigen Fasern besetzten Ausläufer. — Die Blätter sind eirund, groß, stumpf, ledrig, an den Rändern buchtig, glänzend und fast geruchlos. Sie haben einen krautartigen, etwas bittern und schwach adstringirenden Geschmack.

4) *Plantago lanceolata*, *L.*; spitzer Wegerich; Plantain lanceolé, petit Plantain (*Gal.*); Ribwort (*Ang.*); Spids vejbred (*D.*); Smalblaadige weegbree (*Bel.*); Spets groblad (*Succ.*).

Fer. Gal. Wir. *Gr. Re. Sp.*

♃ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Hayne* V. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Plantaginis lanceolatae s angustifoliae s. quinquenerviae minoris) ist süßlich und schwach adstringirend. — Das Kraut besteht aus einem Büschel lanzettförmiger, fünfrippiger Blätter.

5) *Plantago media*, *L.*; mittlerer Wegerich; Plantain moyen (*Gal.*); Hoary plantain (*Ang.*); Gitrocel prostredni neb ssiroky (*B.*); Llanten medio (*His.*); Middelbaare wegbree (*Bel.*); Piantaggine media (*I.*); Tanchagem mediana (*Lus.*); Stosskaemper (*Succ.*)

Fer. Gal. Wür. *Gr. Re. Z.*

♃ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t. 14. *Oed.* Fl. Dan. t. 581.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel ist schwach adstringirend. — Das Kraut besteht aus lanzettigen Blättern und hat einen styptischen Geschmack.

Die drei letztern Pflanzen sind schwach adstringirend.

Gr. führt noch außerdem an: Pl. coronopus, Cornu cervinum, Wurzeln und Blätter mit Seesalz als Breiumschlag auf die Handgelenke bei kalten Fiebern; Abkochung der Blätter bei Augenübeln; Pl. albicana, Holostium, Wundkraut, bei hernia.

6) *Alisma Plantago*, *L.*; Froschlöffel, Froschwegerich, Wasserwegerich; Plantain d'eau (*Gal.*); Great water plantain (*Ang.*); Vard vegbreed (*D.*); Llantin aquatica (*His.*); Groote water wegbree (*Bel.*); Piantaggine acquatica (*I.*); Badkawodna (*Pol.*); Stoeckra (*Succ.*).

Br. *Gr. Re.*

Eine Pflanze (Hexandria Pologynia, L.; Alismaceae, J.), welche in ganz Europa an den Ufern von Wasser wächst. (Fl. Dan. 561. *Plenck* t. 292. *Schk.* t. 102. *Zorn* Ic. pl. t. 213.)

Man wendete ehedem das Kraut (herba Plantaginis aquaticae) an; es besteht aus eirunden, langspitzigen, nervigen, glatten, ganzen Blättern von einem wässerigen, etwas scharfen Geschmack. Sie bewirken Röthung der Haut; Haller hat sie aber demungeachtet bei Hämorrhoiden empfohlen. — Die knollige Wurzel wurde vor einigen Jahren, in Rußland besonders, gegen die Hundswuth gepriesen. Man wendete das Pulver auf Butterbrod und zwar von einer einzigen großen Wurzel, oder von mehreren, wenn sie klein waren, an. Jedoch ist das Mittel wieder in Vergessenheit gekommen.

Mucilago Psyllii. (Gal. Sar. *T.*)

℞. Seminum Psyllii drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.
Digere per horas 24 super cinere calido, subinde agitando, et per linteum exprimendo cola. (Gal.)

Sar. Macerare per horas 12, tunc coquere Seminum partem unam in Aquae decem et exprimere; — *T.* ut mucilaginem seminum cydoniorum.

Conserva Plantaginis. (Wür.)

℞. Herb. Plantaginis rec. contus. part. unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Fiat pasta homogenea.

Succus Plantaginis. (Sar. Wür.)

℞. Herbae Plartaginis rec. . q. vis.
Contunde in mortario lapideo Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, sepone succus ut subsideat, decantha et in lagenis, cuique librae liquidi Alcoholis drachmam unam addendo, serva.

Sar. in balneo aquae clarificare jubet. — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus Plantaginis s. Plantaginis majoris. (His. His3. Wir.)

℞. Succi expressi Plantaginis,
Sacchari albi, sing. libras quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.

Clarifica et ad syrupi consist. coque. (His. His3.)

℞. Succi Plantaginis depur. et lenta evaporatione ad dimid redacti unc. novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Fiat syrupus. (Wir.)

Aqua Plantaginis. (Gal. Sar. *Fi. T.*)

℞. Herb. rec. Plantaginis partes 5 000.
Aquae partes 12,500
Destillent circiter partes decies mille; infunde productum duplo Herbae recentis, adde Aquae partes mille et destillando denuo partes decies mille abstrahe. Operationem tertio repetere potes. (Gal.)

Sar. Herbae partem unam et duas Aquae; destillent trientes duo; — *Fi.* Aquae sedecim; destillent sex; — *T.* ut aquam florum aurantiorum.

Man ſetzt dieſes Waſſer zu auflöſenden Augenwaſſern, es iſt aber ganz ohne Wirkung.

Extractum Plantaginis. (Sar. Wir. Wür.)

℞. Folior. rec. Plantaginis . q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae consume. (Wür.)

℞. Folior. Plantaginis libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Sar. Wir.)

Fomentatio adstringens. (*Sw.*)

℞. Fol. Plantaginis manipulos duos.
Petal. Rosarum rub. pugill. unum.
Aquae semisextarios (demi-setiers) quinque.
Decoque ad octarii remanentiam sub finem Calcem vivam volumine ovi gallinae addendo; ab igne remotum repone, decantha et adde
Aquae Vitae . . uncias quatuor.

Aqua Calcis vulneraria s. vulneraria. (Sar.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Saniculae,
— Hyperici,
— Pyrolae, sing. manip. unum.
Calcis vivae . . . libras duas.
Calcem pulveratam supra herbas concisas conjice et per plures dies macera. Infunde deinde
Aquae purae . . libras decem.
Post decem horas macerationis decantha et infunde denuo
Aquae Plantaginis libras decem.
Macera per horas duodecim et ambos liquores commisce. (Sar.)

Platinum.

Platina; Platina; Or blanc (*Gal.*). Han. His. His3.

Ein Metall, welches faſt eben ſo weiß als Silber, ſehr glänzend, ſehr ſtreckbar und leicht zu hämmern, ſehr zäh, faſt unſchmelzbar iſt und an der Luft ſich nicht verändert. Die ſpecifiſche Schwere deſſelben iſt 20,98.

Chloruretum s. Murias Platinae, Chloruretum Platini et Sodii, Nitromurias s. Hydrochloras Platini. (B*. *Gr.*)

℞. Platinae . . . quantum vis.
Aquae regiae , quantum sufficit ad solvendum metallum; solutio evaporata crystallisationi subjiciatur.

Bei veneriſchen Krankheiten empfohlen. — Gabe, ein Viertel- bis ein Gran, in Einreibungen auf das Zahnfleiſch.

Gr. Platini unciam, Aquae regiae q. s.; crystallos solve in Aqua et adde Solutionem Salis decrepit. drach. duarum in Aqua, evapora et crystallisationi subjice. — 2 Gran in das Zahnfleiſch einzureiben.

℞. Platini subtil. granulati unciam unam.
Acidi nitrici . . unciam unam.
— muriatici . . uncias tres.
Reactione finita acidum defunde novum addendo, quod ad perfectam platini solutionem usque repete; evaporatione in crystallos cogo.

Solutio Nitromuriatis Platini, Liquor Platini muriatici. (*Gr.*) Nitromurias Aqua solutus; reagens; — Hass P. Platini laminati concisi q. s. cum Aq. regiae q. s. neutralisare, liquorem cum Aquae dest. decuplo diluere et ad ebullitionem calefacto Sal Ammon. pulv. addere, quamdiu praecipitatum flavum oritur, quod elotum et siccatum in crucibulo excandescat; residuum griseum metallicum in Aqua regia iterum solvere et acido salis superfluo evaporato, liquorem cum Aquae dest. quadruplo diluere ac per chartam bibulam filtratum servare in vitro nigro colore obducto. — Reagens.

Oxydum Platinae. (B*.)

℞. Solut. aquos. Platinae mur. q. vis.
Sodae purae . . . . . q. s. vel donec nullum amplius oriatur praecipitatum, quod lotum siccetur.

Je nach der Gabe, Brechen oder Purgiren erregend.

Plumbum.

Saturnus; Μολυβδος; Blei; Plomb (*Gal.*); Lead (*Ang.*); Zobeil Anuk (*Ar*); Hin-yen (*C.*); Blye (*D.*); Schisch (*Duk.*); Plomo (*His.*); Sisa (*Hin.*); Bly (*Bel.*); Piombo (*I.*); Tamaetam (*Mal.*); Surb (*Pe.*); Olow (*Pol.*); Chumbo (*Lus.*); Swinez (*R.*); Sisaka (*Sa.*); Bly (*Suec.*); Eium (*Tam.*); Schischum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lus. O. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. C. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Ein derbes, bläulichweißes, weiches, glänzendes, nicht klingendes Metall, welches sich mit dem Nagel ritzen, hämmern, jedoch mehr zu Blech schlagen, als zu Draht ziehen läßt, einige Zähigkeit besitzt, gerieben einen merklichen Geruch verbreitet, bei 322,22° C. schmelzbar ist und sich in einer höheren Temperatur verflüchtigt. Die spec. Schwere ist, nach Brisson, 11,3523.

Sulphuretum Plumbi nativum, Galena, Gr.

Sulphuretum Plumbi, Oxydum Plumbi-sulphuratum, Plumbum s. Aes ustum. (Ams. Fer. His. His3. Sar. *Fi T.*)

℞. Plumbi . . . . quantum vis.
Liquato in cochleari ferreo Sulphur pulveratum per cochlearia adde, donec penitus in pulverem nigrum sit conversum, quod porphyrisatum serva. (Ams. His. His3. *T.*)

Fer. Sar. *Fi. T.* Laminarum Plumbi et Sulphuris in ollam fictilem strata immittere, hanc igni vehementi exponere et tunc residuum lavare et porphyrisare.

Der Name Aes ustum, womit Ams. und Sar. dieses Präparat bezeichnen, ist unrichtig, und kömmt nur dem Protoxyde zu.

Emplastrum Plumbi nigrum. (His.)

℞. Plumbi sulphurici,
Lithargyri, sing. . uncias duas.
Cerussae,
Antimonii crudi, sing. unc. unam.
Olei Rosarum . . . libras tres.
Cerae albae . . uncias novem.
Liqua ceram in oleo, adde substantias metallicas bene porphyrisatas, coque parumper et agita massam ad refrigerationem usque.

Chloruretum Plumbi, Murias s. Submurias Plumbi, Oxymurias Plumbi. (*Sp. Vm.*)

℞. Plumbi Subacet. liq. part. unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Mixtis adde Sal commune in sex partibus Aquae dissolutum tamdiu donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum bene lotum sicca.

Besonders als Schönheitsmittel empfohlen, wobei jedoch Vorsicht nöthig ist.

Lac Plumbi. (*Vm.*)

℞. Salis communis partem dimidiam.
Dissolve in Aquae quam minima quantitate; solutioni adde sensim
Extracti Saturni . partem unam.
Praecipitatum collectum et bene lotum misce cum
Emulsionis comm. part. duodecim.
Schönheitsmittel.

Plumbum hydrocyanicum. (*Dulk.*) Paratur miscendo Saccharum plumbic. depurat. solut. cum Lixivio Sanguinis, ut pulvis in Aqua insolubilis praecipitetur.

Plumbum phosphoricum, Saturnus phosphoratus (*Dulk.*): Oxydi Plumbi muriat. recenter praecipitati q. vis, Aq. dest ferv. q. s; solve et adde Natrum phosphoric. in Aq. destill. solutum ut praecipitatum provocetur, quod Aqua bulliente ablutum filtri ope separa et in loco umbroso siccatum serva.

Protoxydum Plumbi.

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Lithrargyrum, Lithargyrium, Lithargyrus, Oxydum Plumbi fusum s. semifusum s. semivitreum, Oxydum plumbicum semivitreum; Bleiglätte; Litharge, Oxide de plomb demi-vitreux (*Gal.*); Litharge (*Ang.*); Snel verglued (*D.*); Murdar sang (*Duk. Hin. Pe.*); Lithargirio, Almartago (*His.*); Lootglans (*Bel.*); Lithargirio, Piombo semivitreo (*I.*); Gleyta (*Pol.*); Silfwerglitt (*Suec.*).

A Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed Fenn Fer. Ful. Gal. GalM. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va.*

In kleinen, fett anzufühlenden Blättchen, welche durch Crystallisation des geschmolzenen und langsam erkalteten Protoxyds entstehen. Je nachdem die Farbe weiß oder gelb ist, nennt man sie Silberglätte, *Lithargyrus Lithargyrus Argenti*; Litharge d'argent (*Gal.*), oder Goldglätte, *Lithargyrius, Lithargyrus Auri*; Litharge d'or (*Gal.*).

Br. Fi. Re. beschreiben das im Handel zur Bereitung der Bleiglätte angewendete Verfahren.

§. II. Im Ganzen bereitet.

1) *Oxydulum Plumbi, Aes ustum, Oxydes Plumbi nigrum, Plumbum ustum, Oxydum Plumbi griseum s. plumbosum, Protoxydum Plumbi, Cinis Plumbi, Suboxydum Plumbi, Cinis Plombi*; Bleiasche. (B. Bel. Br. Fenn. Ful. Han. HassP. Pal. Sax. Wir. *Gr. Sp.* Z.)

℞. Plumbi . . . . quantum vis.

In fusione tene in patina fictili vel ferrea, saepius agitando, et stratum griseum, quo tegitur, quoties apparet, separa; simulac totum metallum in oxydum conversum est, pulvera, cribra, porphyrisa et cum multa Aqua ablue.

Ueber das Aes ustum von Ams. und Sar. s. Sulphuretum Plumbi.

2) *Cerussa citrina, Ochra plumbaria factitia*; gelbes Bleioxyd; Oxide jaune de plomb, Massicot, Ceruse jaune (*Gal.*).

Wir. *Fi. Gr. Vm.*

℞. Cerussae purae . quantum vis.

In crucibulum Hassiacum, latere tectum immitte, quod ita calefiat ut totum acidum carbonicum expellatur sed ne oxydum liberum liquet; post refrigerationem cum Aqua contere ut fiant trochisci.

Wir. Cerussam citrinam venalem? recipere jubet; — *Fi.* in paratione lithargyri indicat; — *Gr.* calcinando Plumbum ustum, donec colorem flavum receperit.

Das gelbe Bleioxyd ist eine Mischung von vielem Protoxyd und etwas metallischem Blei.

Pulvis erysipelatodes s. ad erysipelas. (Br. HassP. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Farinae (triticeae) . uncias sex.
Aeris usti (Oxyduli Plumbi),
Boli rubrae, sing. . uncias duas.
Mastichis,
Olibani,
Cerussae, sing. . unciam unam.
Fiat pulvis subtilissimus.

Injectio saturnina. (*Sw.*)

℞. Oxyduli Plumbi . grana viginti.
Sulphatis Zinci . . grana sex.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Von Clarc bei selbst hitziger Gonorrhöe gerühmt.

Deutoxydum Plumbi, Deutoxydum Plumbi rubrum, Oxydum Plumbi rubrum, Minium, Superoxydum plumbosum, Tritoxydum Plumbi, Plumbum oxydatum rubrum; Mennige; Deutoxide de plomb, Oxide rouge de plomb (*Gal.*); Red lead (*Ang.*); Isreny (*Ar.*); Yuentan (*C.*); Maennie (*D.*); Sendur (*Duk.*); Minio (*His. I.*); Sindur (*Hin.*); Menie (*Bel.*); Temamera (*Mal.*); Minia (*Lus.*); Sindura (*Sa.*); Maenja (*Suec.*); Segapu senduerum, Jum sindurum (*Tam.*); Yerra sindurum (*Tol.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. Li O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. T. Vn.*

Ein sehr feines, sehr schweres und rothes Pulver.

Br. Fi. T. beschreiben das bei der Bereitung der käuflichen Mennige angewendete Verfahren.

Errhinum adstringens. (*Pie.*)

℞. Aloës,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Calcis vivae . drachmam unam.
Minii . . . . semidrachmam.
Aluminis . . scrupulos quatuor.
Corticis Granati
Balaustiorum, sing. drachmas duas.
Olei Myrti,
Aquae Rosar., sing. unc. duas c. dim.
— Plantaginis quantum sufficit.

Gegen Geschwüre in der Nase.

Unguentum s. Ceratum Minii s. Ceratum rubrum. (*Fi. Vm.*)

℞. Cerae albae . . partem unam.
Liqua et adde
Olei . . . . . partes duas.
Mixtis adde
Minii c. Olei pauxillo triti part. dim.

Fi. Minii uncias sex, Cerae albae duas et Olei Olivarum libram.

Emplastrum rubrum s. defensivum rubrum Wepferi. (Wir.)

℞. Butyri recentis,
Olei Lini, singulorum uncias sex.
Cort. vir. Sambuci unc. quatuor.

Coque lente ad humidi consumpt.; cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae,
Minii, singulorum . uncias sex.

Bei alten Geschwüren und selbst offenem Krebs, zur Stillung der Schmerzen.

Emplastrum equinum (*Re.*): Picis Burgund. uncias quatuor, Picis nigrae liquidae Barbad. duas, Cerae tres, Minii quatuor, liqua et misce agitando donec refriguerit. Nimis spisso Oleum vel Axungiam, interdum Sanguinem Draconis vel Bolum Armenam adde. (White's Pferdepflaster bei Lahmheit und Windgallen.)

Emplastrum de Minia s. e Minio

(*Gr. Re.*): Minii uncias novem, Olei Ros. sesquilibram, Acidi acetici uncias sex; — *Gr.* praeterea: Minii libras duas c. dimid., Ol. Olivarum quatuor.

Emplastrum e Minio fuscum (*Gr.*): Ol. Oliv. libras viginti quatuor, Minii quatuordecim, Resinae nigrae duas; vel: Empl. Minii rubrum coquatur usque fuscum evaserit.

Ceratum rubrum camphoratum. (Br. Pal. Wir.)

℞. Cerae flavae,
Sevi cervini, sing. . semilibram.
Liquefiant; massae fere refrigeratae adde tunc
Minii cum Olei Rosarum semilibra triti uncias sex.
Adde denique
Camphorae . . sesquidrachmam.

Unguentum Minii camphoratum. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei Rosarum cocti sesquilibram.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae . . . . sesquiunciam.
Tutiae,
Camphorae, sing. drachmas tres.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua ceram leni igne, adde oleum, tunc reliqua pulverata, deinde Aceti dest. uncias tres et tandem camphoram cum Alcohole tritam. (Wir.)

℞. Ung. Lithargyri uncias quindecim.
Camphorae . . scrupulos duos.
Tritura simul et adde
Minii . . . . . sesquiunciam.
Tutiae . . . . drachmas duas.
Misce bene. (*Sp.*)

Dieſe Salbe, ſo wie das vorhergehende Cerat gelten als austrocknend und ſchmerzſtillend. Man hat ſie beſonders bei Verbrennungen empfohlen.

Emplastrum detergens rubrum. (Han. Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Resinae Pini . . unciam unam.
Olei Rosarum . uncias quatuor.
Calcis vivae in Aqua Rosarum lotae et tunc siccatae,
Laterum contusorum,
Boli Armenae, sing. drach. decem.
Minii . . . . . semunciam.
Camphorae in Oleo dissolutae drachmas duas.

Cerae et resinae in oleo liquatis adde calcem, lateres, bolum et minium, tunc massae semirefrigeratae camphoram. (Pal. Wir.)

℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini, sing. uncias sex.
Cetacei . . . . . semunciam.
Liquatis simul, adde massae semirefrigeratae
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae,
Camphorae in Olei unciis tribus dissolutae, singularum uncias sex.
Misce bene. (Han.)

℞. Minii . . . . . partes duas.
Cerussae . . . partes quatuor.
Contere et adde
Sevi vervecini . . . partes octo.
Olei Olivarum . . partes sex.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Commisce et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

Emplastrum ad fonticulos, Sparadrap rubrum, Sparadrapum pro fonticulis. (Pal. *Gr. Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . . partes sex.
Liqua et adde miscendo
Minii cum Sebi pauxillo triti partem unam.
Fascias e tela confectas in mixtura fusa humecta. (*Vm.*)

Pal. Cerae flavae uncias sex, Sebi cervini duas, Terebinthinae unam cum dimidia, Olei Liliorum alborum tantidem et Minii uncias quatuor; — *Gr.* Cerae flavae semilibram, Minii, Terebinthinae Opiae, sing. uncias quatuor, Cinnabaris, Iridis Florentinae, sing. unam, Moschi grana quatuor.

Emplastrum resolvens. (*Ca. Pie.*)

℞. Emplastri Diapalmae unc. quatuor.
Axungiae Porci,
Cerae albae, sing. . uncias duas.
Liqua et adde
Minii . . . . . uncias duas.

Emplastrum fundans s. resolvens. (*Ca.*)

℞. Olei Olivar. . unc. viginti octo.
Minii . . . . . libram unam.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae,
Magnetis pulv., sing. sesquiunciam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis, sing. . drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.

Ceratum s. Emplastrum Mercantini s. Minii gummoso-resinosum. (*Li.*)

℞. Minii . . . . . libram unam.
Olei communis . . libras tres.

Colophonii . . unciam unam.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Myrrhae,
Olibani,
Galbani,
Mastichis,
Aluminis usti, sing. drachmas tres.
Camphorae . drachmas quinque.

Minio cum camphora leni caloris ope nutrito massae si colorem obscure flavum accipit, ceram et colophonium adde ut solvantur, tunc ab igne remotis, simulac condensari coeperunt, adde gummi et alumen pulverata et in fine camphoram in Alcoholis pauxillo solutam ut fiant magdaleones etc.

Tritoxydum Plumbi, Superoxydum vel Peroxydum Plumbi, Oxydum Plumbi puliceum; Tritoxide, Suroxide ou Peroxide de plomb, Oxide puce de plomb. (*Vm.*)

℞. Minii . . . . . partem unam.
Acidi nitrici . . . partes tres.

Acidum cum Aquae aequali pondere dilue et oxydo pulverato infunde, bene agitando; liquorem calefac, decantha et pulverem lotum sicca.

Unguentum puliceum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Plumbi pulicei part. unam.
Cerati simplicis . . partes octo.

Tritura simul in mortario vitreo.

Sub-proto-carbonas Plumbi, Oxycarbonas Plumbi, Oxydum Plumbi carbonatum per Acidum acetosum, Oxydum Plumbi album, Cerussa alba Norica s. Hollandica s. vera, Subcarbonas Plumbi, Carbonas Plumbi s. Plumbi albus s. plumbicum s. plumbicus, Subacetas Plumbi, Subcarbonas Plumbi s. Protoxydi Plumbi, Album Argenti s. Plumbi, Album de Krems, Creta plumbica s. Plumbi, Plumbum spathicum, Mephitis Plumbi, Album Cerussae, Oxydum Plumbi album; Bleiweiß, Schieferweiß; Sous-proto-carbonate de plomb, Sous-carbonate de protoxyde de plomb, Sous-carbonate de plomb, Blanc d'argent ou de plomb, Blanc de Krems, Craie de plomb, Plomb spathique, Méphite de plomb, Blanc de céruse, Oxide de plomb blanc (*Gal.*); White lead, white cride of lead, Cerusse (*Ang.*); Asfidaj (*Ar.*); Bleghvidt (*D.*); Suffidah (*Duk. Pe.*); Albayalde (*His.*); Tootwit (*Bel.*); Cerussa, Biacca, Bianco di piombo (*I.*); Bleywas (*Pol.*); Blywhitt, Kiferwhitt (*Suec.*); Vullay, Muthu vullay (*Tam.*); Sibaydu (*Tel.*).

§. I. Wie man es im Handel findet.

Cerussa; Bleiweiß; Céruse (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn Fer. Gal. Gen Ham Han. Hass. HassP. His. HisS. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Ein weißes und sehr schweres Pulver. — *Fi.* führt die Bereitungsart des käuflichen an.

Carbonas Plumbi albus praeparatus, Cerussae laevigatio. (HisS.) In pulverem subtilissimum redactum Aqua fontana dilue, post brevissimam subsidentiam aquam turbidam decantha et rejice, quod repetes donec nova addita Aqua statim clarefiat et nulla carbonatis calcis particula adhaereat, tunc aqua decantata, pulverem in umbra sicca.

Vm. giebt folgendes Reinigungsverfahren:

℞. Cerussae . . . . quantum vis.

Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo solutionem tenuem Acetatis plumbici. Post aliquot tempus decantha et aliam solutionem adde et ita continua, donec aqua defluens per unam guttam Hydrosulphatis Potassae, sicut et ea, quae nondum lotioni inservit, praecipitetur. Residuum deinde multa Aqua lotum in trochiscos forma.

§. II. Im Ganzen bereitet.

Br. Ful. Wir. *Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.*

℞. Laminar. Plumbi tenuium q. vis.

Numerum certum earum in vase Acetum Vini bonum continente suspende, quo lente calefacto, evaporet; crustam albam, qua laminae teguntur, subinde separa, operationem continuando, donec omnes laminae sint adhibitae. (*Br. Pid. T. Vm.*)

Gr. Acetum Cerevisiae vel Acidum pyrolignosum adhibet.

℞. Acetatis Plumbi neutri
partes octodecim.
Natri subcarb. dilapsi part. quinque.

Dissolve sales quemque seorsim in Aquae excessu et solutiones commisce, fortiter agitando; post subsidentiam decantha et praecipitatum lotum in trochiscos forma. (*Vm.*)

Br. Ful. et Wir. Kali subcarbonicum indicant, productum *Magisterium Saturni* nominantes.

Man kann auch einen Strom kohlensaures Gas durch eine Auflösung des kohlensäuerlichen Blei's gehen lassen, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Thénard

hat dieſes Verfahren angezeigt und auch Clichy befolgt es. (Du. Ed. *Gr. Re.*)

Trochisci Carbonatis Plumbi albi camphorati s. e Cerussa s. Rhazis s. albi s. albi Rhasis s. carbonati Plumbi camphorati, Pulvis e Cerussa s. e Plumbo s. Cerussa compositus, Sief album. (Ams. Br. His. His3. Lus. Pal. Sar. Wir. *Ca. Gr. Pid. Pie. Re. Sp. Sw.*)

℞. Cerussae . . drachmas quinque.
G. Tragacanthae . drachmas tres.
Misce triturando. (*Sw.*)

Lus. Cerussae partes duas et unam Gummi.

℞. Cerussae . . . . sesquiunciam.
Gummi Arabici,
Amyli, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . . semidrachmam.
Pulvera seorsim et misce ut fiant cum Aquae q. s. trochisci. — Addunturi, si requiritur, cuilibet drachmae Opii grana tria. (His. His3.)

℞. Cerussae uncias (drachmas *Gr.*) quinque.
Sarcocollae . . . sesquiunciam.
Gummi Tragacanthae semunciam.
Misce ut fiat pulvis. (*Gr. Sp.*) — Addi potest Opii pars vigesima octava.

Re. Sing. partes aequales.

℞. Cerussae . . . . drachmas sex.
G. Arabici,
— Tragacanth., sing. semunciam.
Sarcocollae . . drachmas tres.
Fiant pulvis. (Br. Wür.) — Addendo pro scrupulo Opii granum dimidium, habes *Sief cum Opio*

℞. Cerussae c. Aqua Ros. lotae drach. decem.
Amyli . . . . . semunciam.
G. Arabici,
— Tragacanth., sing. drachmas duas.
Camphorae Alcoholis pauxilli ope pulveratae . . semidrachmam.
Fiat pulvis tenerrimus. (Ams.)

℞. Cerussae c. Aqua Ros. lot. drachm. decem.
Sarcocollae . . drachmas tres.
Amyli . . . . drachmas duas.
G. Arabici,
— Tragacanthae, sing. drachmam unam.
Opii . . . . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Ca. loco opii Camphorae semidrachmam.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Amyli . . . . . semunciam.
Ichthyocollae . . drachmas tres.
Fiat pulvis. (*Pid.*) — Cuique drachmae Opii granum unum vel duo addi possunt.

In Roſenwaſſer verdünnt, ehedem gegen Augenentzündungen, Verbrennungen und andre von äußern Urſachen herrührende Entzündungen geprieſen.

Pulvis Plumbi compositus. (*Sw.*)

℞. Pulv. Cerussae . unciam unam.
— Cort. Quercus libram unam.
Misce bene — Zum Einſtreuen auf ſcrophulöſe Geſchwüre empfohlen.

Globuli ad erysipelas. (*Sp.*)

℞. Cerussae,
Cretae, sing. . . unciam unam.
Boli albae . . . . uncias duas.
Aquae Vitae camphor. . . q. s. ut fiat pasta in globulos redigenda.

Plenck bedeckte eryſipelatöſe Stellen mit Papier, welches mit einer ſolchen Kugel tüchtig abgerieben war.

Linimentum antiophthalmicum. (*Pie.*)

℞. Cerussae . . . uncias quatuor.
Amyli . . . . drachmas tres.
Gummi Arabici drachmam unam.
— Tragacanthae in Aqua Rosarum dissoluti . sesquiunciam.
Unterſcheidet ſich von einigen Formeln zum Sief album nur durch ſeine Flüſſigkeit.

Unguentum ad prosopalgiam s. dolorem faciei s. contra neuralgiam facialem. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Cerussae . . . . unciam unam.
Opii . . . . drachmam unam.
Axungiae . . . . . semunciam.
Balsami tranquilli quantum sufficit.
Von Fouquier empfohlen.

Unguentum adstringens (for grease in horses.) (*Gr. Re.*): Axungiae porcinae unc. quatuor, Cerussae unam.

Ceratum Cerussae s. de Cerussa, Unguentum album s. album simplex s. Subacetatis Plumbi s. Oxydi Plumbi albi s. Carbonatis Plumbi albi s. Oxydi Plumbi albi per Acidum acetosum s. Carbonatis plumbici s. Oxydi Plumbi Carbonatis s. Subcarbonatis Plumbi s. Cerussae s. cum Subcarbonate Protoxydi Plumbi s. cum Cerussa s. Unguentum album Rhasis s. de Tornamira. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal Han. Hass. HassP. His. His3 Li. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Ca Fi. Gr. Pid. Pie. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerussae pulveratae partem unam.
Axung. Porci, sing. part. unam c. dimid.

Misce triturando. (An. Br. D. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. Pal. Suec. Wir. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp*)

Sax. Cerussae partes tres et duas Axungiae; — LP. Cerussae uncias octo, Axungiae libram unam.

℞. Axungiae Porci . . partes duas.
Sebi vervecini . . partem unam.
Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes duas.
Tritura bene. (Ba. Bor. Han. O. Pol.)

Fer. Olei Olivarum libras duas, Sebi vervecini duas cum dimidia et Cerussae duas.

℞. Olei Olivarum . . partes tres.
Cerae albae . . partem unam.
Liquatis adde
Cerussae . . . partem unam.
Tere ad refrigerationem usque. (*Ca. Pie.*)

Lus. et Wür. Olei partes quatuor, Cerae et Cerussae, sing. unam; — Pm. Olei libram unam, Cerae albae uncias tres, Cerussae pulveratae uncias sex, cerussam cum olei unciis tribus contritam cum cera altera olei parte lento igne fusa commisce; — *Sw.* Olei tredecim, Cerae duas cum dimidia et decem Cerussae vel: Olei tres, Cerae unam et Cerussae unam cum dimidia; — *Vm.* terere Cerussae partes duodecim cum Olei pauxillo et mixturae fere refrigeratae addere Cerae albae partes quinque et Olei Olivarum octodecim; — *Fi.* Axungiae libras duas, Cerussae unam, Cerae albae uncias quatuor.

℞. Cerae albae . . . . partes tres.
Olei rosati . . partes duodecim.
Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes quatuor.
Agita ad refrigerationem usque (Sar.)

His. His3. Cerae partes quatuor, Olei rosati octodecim et duodecim Cerussae; — *Gr.* sec. Lon. ante 1745. Olei uncias novem, Cerussae tres, Cerae duas.

℞. Cerati albi . . . . partes sex.
Cerussae pulveratae partem unam.
Commisce. (Am. Du. *C. Gr. Re.*)

Ed. *Gr.* Cerati partes quinque et tres (unam *Gr. Re.*) Cerussae.

℞. Unguenti simplicis . partes tres.
Liqua leni igne et adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Continue agita. (Ams.)

Bor4. Cerussae unam cum dimidia.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Blando igne mollefacto adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Misce bene. (B. Bel.)

Besonders zum Verbinden verbrannter Stellen.

Unguentum album camphoratum. (B. Bel. Bor4. Br. D. Ful. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. Ca. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Ung. albi Rhazis
part. viginti quatuor.
Camphorae c. Olei Amygd. dulc.
pauxillo tritae . partem unam.
Misce triturando. (B. Bel. Bor4. Br. HassP. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Br.*)

Li. Camphorae partem trigesimam; — *Sp.* partem trigesimam secundam; — D. quadragesimam; — Ful quadragesimam octavam; — *Gr.* sec. Lon. ante 1745. quinquagesimam sextam; — *Ca.* et *Sw.* sexagesimam sextam; — Sar. et Wür. septuagesimam secundam; — *Vm.* nonagesimam sextam; — *Fi.* Unguenti Cerussae libram, Camphorae scrupulos quatuor

Unguentum adstringens (*Gr.*): Axungiae porc. unc. quatuor, Ol. Rorism. drachmas duas, Cerussae pulv. sesquidrachmam.

Unguentum ad ambustiones s. combustiones. (*Sw.*)

℞. Ung. albi camphorati,
— Althaeae, sing. quantum vis.
Commisce.

Sparadrap album. (*Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . . partes sex.
Liquatis admisce
Cerussae cum Sebi pauxillo tritae
partem unam.
Fascias e tela confectas in massa liquida humecta.

Sparadrap exsiccans. (*Ca. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . partem unam.
Medullae bovill.
part. unam c. dimidia.
Cerae flavae . . . partes duas.
Sebi . . . . . partes tres.
Liquatis simul adde
Pulv. Calaminae . partem unam.
— Cerussae
part. unam c. dimidia.
In mixtura fascias e tela confectas humecta. (*Vm.*)

Ca. Olei uncias sex, Cerae quatuor, Cerussae et Calaminae, sing. unam cum dimidia.

Unguentum ad combustiones. (Pal. Wir.)

℞. Camphorae . . . unciam unam.
Olei rosati . . . . uncias tres.
Cerussae . . . . . uncias sex.
Pulveris Olibani . uncias duas.

Albumina Ovorum . . . no. 7.
Misce triturando in mortario plumbeo. (Pal.)

℞. Corticis medii Sambuci,
— Tiliae, sing. . sesquiunciam.
Succi Plantaginis . uncias duas.
— Sedi majoris unciam unam.
Olei Lini . . . . . uncias sex.
Sebi cervini . . unciam unam.
Coque leni igne ad humidi consumptionem, cola oleum et in mortario plumbeo tere cum
Cerussae c. Aquae Ros. lot. uncia una,
Sacchari . . drachmis duabus,
Olei Ovorum . . . . semuncia.
Fiat unguentum. (Wir.)

Unguentum exsiccans. (*Sw.*)

℞. Olei Olivarum . . libram unam.
Cerae albae . . . semilibram.
Mixtis et liquatis adde
Calaminae . . . . semilibram.
Cerussae . . . . uncias novem.
Lithargyri . . . . uncias tres.
Misce usque refrixerint.

Unguentum de Liquiritia. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Pulpae Radicis Liquiritiae recentis,
Butyri rec., sing. uncias sedecim.
Coque ad consumptionem humidi, cola exprimendo et colaturae adde
Pompholicis . . drachmas sex.
Cerussae . . . . uncias tres.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae scrupulos duos.

Bei Excoriationen und aufgesprungenen Bruſtwarzen.

Unguentum antihaemorrhoidale. (Pal.)

℞. Amyli,
Cerussae,
Lithargyri,
Aeris usti (Oxyduli Plumbi),
G. Tragacanth., sing. drachmas sex.
Opii,
Camphorae, sing. scrupulos quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Mucilaginis Seminum Psyllii,
Olei Rosarum,
— Verbasci, sing. semilibram.
Cerae flavae . . . uncias tres.
Liqua ceram in oleis, adde camphoram, pulveres et denique albumina.

Unguentum Plumbi compositum. (*Sw.*)

℞. Cerussae . . . . unciam unam.
Lithargyri . . . drachmas duas.
Boli Armenae . . unciam unam
Tritura cum
Mellis rosati . . . . semuncia.
Axungiae Porci . . . . . q. s. ut fiat unguentum.

Dieſe Salbe, welche lange geheim gehalten wurde, diente zum Verbinden phagedäniſcher, ſcrophulöſer und krebsartiger Geſchwüre, beſonders des penis. Die heftigen Schmerzen, welche ihre Anwendung in den erſten Stunden erregt, beweiſen hinlänglich, daß ſie reizende Eigenſchaften beſitzt. Man ſetzt bisweilen zwei Drachmen Eiſentritoxyd hinzu, wo ſie dann mit dem emplastrum defensivum rubrum, vorzüglich mit dem nach der Formel von His. bereiteten, viel Aehnlichkeit hat.

Le Mort's ointment (*Gr.*): Axung. Porci libr. septem, Terebinth. Venet. unam, Litharg., Ceruss., sing. tantidem, Alumin. uncias sex, Sublimati corr. libr. unam, Cinnabaris unciam.

Aqua ophthalmica. (*Sa.*)

℞. Trochisc. alb. Rhazis drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce bene.

Injectio Plumbi Carbonatis. (*Rc.*)

℞. Plumbi Carbonatis drachmam unam.
Pulv. Tragac. comp. drachmas duas.
Opii pulverati . . scrupulum.
Aquae bullientis . . . octarium.
Misce. — Im erſten Stadium der Gonorrhöe.

Unguentum adstringens. (*Pic.*)

℞. Succi Plantaginis,
— Bursae Pastoris,
— Verbasci, sing. uncias duas.
Coque leviter et adde
Pulv. Sanguin. Draconis unciam unam.
— Boli Armenae,
— Terrae sigillatae,
— Rad. Bistortae, sing. sesquidrachmam.
Cerussae . . . scrupulos duos.

Subprotosulphas Plumbi.

Man bereitet dieſes Salz nie eigens, ſondern es bildet ſich nebenbei, wenn man Bleiextract mit einem ſelenithaltigen Waſſer verdünnt. Außerdem bildet es die Baſis von folgenden Präparaten.

Lac Virginis s. virginale. (Br. Wir. *Rc.*)

℞. Lithargyri pulverati semilibram.
Aceti destillati . . sesquilibram.
Coque ad tertiae partis liquidi consumptionem et colaturae adde

Aluminis crudi . . uncias quatuor dissoluti in

Aquae communis . libris duabus.

Liquorem lactescentem exinde prod euntem serva. — *Re.* Acetatis Plumbi uncias tres, Alumin. quatuor, Aq. Rosarum duodecim.

Ein gefährliches Schönheitsmittel.

Protonitras Plumbi.

Ist nur als einer der Bestandtheile des folgenden Präparats angezeigt:

Balsamum Plumbi. (Vm.)

℞. Plumbi . . . . partem unam.

Acidi nitrici c. Aqua diluti q. s. ad solvendum metallum. Solutionem adhuc calidam, continue agitando, infunde in

Axung. Porci liq. part. sedecim.

In modulos chartaceos effusum post refrigerationem in tabellas concide.

Nitras Plumbi (Gr.): Lithargyrum vel Cerussa in Acido nitrico pond. sp. 1, 3. solut. et in crystallos redact. — Zur Bereitung der salpetrigen Säure.

Subprotoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas superplumbicus aquosus, Aqua Lithargyri acetati s. Lithargyrii Acetatis, Decoctum saturninum, Liquor Acetatis Plumbi (basici) s. Plumbi acetici basici s. Plumbi Subacetatis s. Subacetatis Lithargyri, Solutio Plumbi in Acido acetoso, Subacetas Plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum Saturni, Extractum Saturni liquidum s. Goulardi, Subacetas Protoxydi Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas Plumbi cum excessu baseos, Acetum Plumbi s. Saturni concentratum s. saturninum s. plumbicum s. Lithargyri; Bleiextract, flüssiges essigsaures Blei; Sous-proto-acétate de plomb, Sous acétate de protoxide de plomb, Sousacétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Acétate de plomb, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne (*Gal.*). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han Hass. HassP. His His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sa. Sp. Sw. T Vm.*)

℞. Acetat. Plumbi cryst

part. quinque.

Aquae destillatae . partes novem.

Dissolve sal in Aqua blandi caloris ope; solutioni adde

Lithargyri pulverati partem unam.

Coque, spathulae ope agitando, donec liquor 30° ar. indicet; refrigeratum cola et in lagena bene clausa serva. (Gal. GalM.)

LH. Salis libras sex, Lithargyri duas, Aq. dest. viginti quinque; — *T.* Sacchari Saturni uncias tres, Lithargyri unam et Aquae dest. vel pluvialis decem; — Sax. Salis partem unam, Aquae viginti ad viginti quinque et Lithargyri unam c. dimid coquere simul donec liquor syrupo violarum viridem colorem praebeat et lagena Aquae unciae unius capax liquoris sesquiunciam contineat; — B*. et Han. coquere Lithargyri partes quinque et octo Salis in Aquae quadraginta ad viginti quatuor, ita ut pondus specificum liquidi sit 1,420.

Vm. calefacere simul Lithargyri partes septingentas cum dimidia, Salis octoginta quatuor cum dimidia et Aquae duas cum dimidia, donec liquor 48 vel 28° indicet; — Ba. Coquere Oxydi partem unam et tres Salis in Aquae novem, donec liquor pondus 1,360 vel 1,365 habeat; — Bor4 Plumbi acetici depurati uncias sex cum Lithargyri laevigati tribus exacte miscere et addendo Aquae dest. uncias viginti et unam in lagenula vitrea, reponere subinde agitando, donec color ruber sedimenti plane evanuerit et tunc filtrare; — RC. Acetatis Plumbi cryst. semilibram in Aquae dest. libris duabus solvere.

℞. Lithargyri . . . partem unam.

Aceti . . . . . partes quatuor.

Digere per horas 24 in retorta vitrea, subinde agitando, tunc lente per horas 3 vel 4 calefac, i. e. donec charta exploratoria rubefacta non amplius coloretur; post refrigerationem liquorem serva, cujus pondus sit 1,250 i. e. Acetum Plumbi, vel ita evapora ut unciae duae drachmaeque duae ad implendum volumen Aquae unciae unius requirantur. (B. Bel. Fer.)

HassP. Lithargyri uncias quatuor cum Aceti Vini libris tribus coquere, donec charta explor. coerulea, Aceto rubefacta a liquore alkali instar afficiatur et sesquilibra circiter supersit; pond. spec. 1,2500 = 34° B.; — *T.* Lithargyri libras duas in Aceti octo per horas duas vel tres, agitando, leni calore digerere, per momenta aliquot coquere, post horas 12 sepositionis decanthare et filtrare. Inspissando praeparatum hoc et antea dictum ad mellis vel extracti consist., habes *Extractum Saturni*; — *Vm.* In balneo arenae dissolvere Lithargyri partes viginti unam cum dimidia in Aceti concentrati sex et solutionem ad 29 vel 48° usque eva-

porare; — *Br*. coquere Lithargyri libras duas et Aceti boni libras octo cum dimidia in lebete plumbeo ad mellis usque consist.; addere deinde Aquae purae libras novem, ebullitionem adhuc per horae quadrantem continuare et ad 27° evaporare; — *Br.* Dissolvere Lithargyri partem unam in Aceti dest. quatuor et liquorem filtratum servare; — Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* coquere simul Lithargyri libras duas et Aceti octarios octo ad liquoris octariorum sex remanentiam; — Du. coquere Lithargyri libram unam in Aceti octariis octo ad sex redigendis; — LH. Coquere excessum Lithargyri in Acido acetico, liquorem filtrare et ad 30° evaporare; — LP. Lithargyri libras quinque cum Aceti optimi quadraginta coquere, usque ad saturationem aceti, liquorem filtrare et ad consist. syrupi evaporare; — Li. Coquere Lithargyri libram unam in Aceti sex, donec et liquoris drachmae decem volumen unciae unius Aquae impleant et uncia una ejusdem liquoris uncias duas Aquae (quoad volumen) aequet; — Fenn. et Suec. coquere Lithargyri partem unam in Aceti sex, donec liquor 1,14 pondere par sit; — Ams. Digerere Lithargyri partem unam in quatuor Aceti, et solutionem filtrare vel eam vaporando ad mellis consist. consumere; — An. Coquere Lithargyri libram unam in octo unciis Aceti, donec solutio 27° indicet; — *Fi.* Lithargyri uncias novem cum Aceti fortis libris sex ad trium remanentiam evaporare; — Lus. Coquere Lithargyri uncias quatuor in Aceti libris duabus ad unius librae cum dimidia liquoris remanentiam; — Pm. Lithargyri uncias sex, Aceti dest libras tres digerere, filtrare et liquorem ad 12° ar. evaporare (*Acetum Saturni*); — Lithargyri libras duas, Aceti dest. octo, leni calore dissolvere, liquorem filtratum ad 30° ar. vaporare (*Subacetas Protoxydi Plumbi liquidus densior, Extractum Saturni*); — Pol. Sar. Wir. et *Sa.* coquere Lithargyri partem unam in Aceti quatuor per horam et solutionem filtrare; — Gen. Wür. et *Sp.* Coquere Lithargyri partem unam in tribus Aceti ad dimidiae partis liquidi consumpt.; — O. Lithargyri partem unam coquere in Aceti quinque ad hujus perf. usque saturationem et liquorem ita obtentum evaporare ita ut drachmae sex sufficiant ad volumen unciae unius Aquae implendum; — Br. Coquere Lithargyri libram unam in Aceti quatuor ad duarum remaneat. et colaturam ad unciarum novem remanent. consumere; — His. HisS. et Sar. digerere Lithargyri partem unam per aliquot dies in Aceti quatuor et liquorem deinde filtrare; — Ful. Coquere simul Lithargyri partem unam et duas Aceti concentrati.

Sp. praeterea coquere Minii partem unam et Aceti octodecim, donec solutio consistentiam mellis acceperit; — Bor. coquere simul Minii partem unam et novem Aceti dest., et liquorem evaporando ad partem tertiam consumere; — D. coquere Minii partem unam in Aceti quatuor et liquorem ad dimidium solum consumere vel residuum pro quarta parte evaporare.

R. et Sax. Cerussae partem unam et Aceti boni octo coquendo ad dimidium consumere; — Hass. et *Pid.* Cerussae partem unam et octo Aceti vel per horam unam solum coquere, vel deinde ad mellis consist. evaporare; — R. vel Minium vel Cerussam; — *Pid.* Minium vel Cerussam vel Lithargyrum, pro arbitrio.

Fi. Acetum s. Tincturam Saturni e Cerussae unciis octo et Aceti dest. quadraginta absque calore, agitando parare et *Extractum Saturni* inspissando acetum hoc ad mellem consist

Um dieſe zahlreichen Verſchiedenheiten zu beurtheilen, muß man ſich erinnern, daß bei dem eſſigſäuerlichen Blei dreimal ſo viel Oxyd auf dieſelbe Menge Säure kommt, als bei dem neutralen eſſigſauren Blei.

In Bezug auf die Bleiglätte, welche der Mennige und dem Bleiweiß vorzuziehen iſt, bemerkt Thénard, daß man ſie vorher calciniren müſſe, ehe man ſie mit dem neutralen eſſigſauren Blei in Berührung bringt, um das kohlenſaure Blei zu zerſtören, welches immer in größerer oder geringerer Menge darin enthalten iſt, und welches das letztere nicht auflöſen würde.

Viele Pharmacopöen ſchreiben flüſſiges eſſigſaures Blei von zwei verſchiedenen Graden der Dichtigkeit vor; das am meiſten mit Waſſer verdünnte führt den Namen *Acetum Plumbi s. Lithargyri s. Saturni s. Lithargyrites s. saturninum*; das ſtärkere nennt man *Extractum Saturni s. Plumbi s. Goulardi, Balsamum Saturni, Acetum Plumbi concentratum.* Der Stärkegrad dieſes letztern variirt im Allgemeinen zwiſchen 27 und 30° R. Das des Pariſer Codex und der Spitäler muß 30° anzeigen.

Einige Pharmacopöen (A. BorC.) nennen unrichtig Bleiextract oder Bleieſſig die Auflöſung des neutralen eſſigſauren Blei's in Waſſer.

Die mediciniſchen Eigenſchaften dieſes

Salzes und die Mittel, mit denen es sich nicht verträgt, sind dieselben, wie bei dem folgenden Salze.

§. I. Präparate, bei denen wässerige Flüssigkeiten das Excipiens des Salzes bilden.

Collyrium Plumbi Acetatis s. plumbatum s. adstringens s. antiphlogisticum s. Goulardi s. resolvens, Aqua saturnina s. plumbica s. ophthalmica. (Am. Bor. Bor4. Ful. Ham. *C. Gr. Huf. ParC. Ra. Re. Sw. Va.*)

℞. Extracti Saturni . . semunciam.
Aquae destillatae . libras duas.
Misce. (Bor. Bor4.)

Am. et *C.* Extracti Saturni scrupulum unum et Aquae semioctarium; — *ParC.* Extracti guttas duas et Aquae uncias quatuor; — *Ra. Va.* Char. Extracti guttas decem et Aquae uncias quatuor.

℞. Extracti Saturni . guttas decem.
Decocti Malvae . . uncias duas.
Misce bene. (Ham.)

℞. Mucilag. Cydonior. unciam unam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Extracti Saturni guttas duodecim.
Misce. (Ful.)

Huf. Extracti Saturni guttas duas, Aquae Rosarum unciam et Mucilag. Sem. Cydoniorum semidrachmam.

℞. Florum Meliloti semidrachmam.
Aquae . . . . . libram unam.
Infunde et colaturae adde
Extracti Saturni drachmam unam.
Misce. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

Va. Hosp. Inf. Extracti semidrachmam, Infusi Florum Sambuci libram.

℞. Extracti Saturni . guttas octo.
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Misce. (*Sw.*)

Gr. Extracti guttas decem (ad triginta *Re.*), Aquae Rosarum uncias sex (Aq. dest. uncias septem *Re.*) (*Collyrium Goulardi*); praeterea: Liquoris Plumbi Subacetatis semunciam, Aquae Rosarum uncias duas, Aquae destillatae semilibram; misce Aquae tepidae part. aeq. tempore utendo; vel: Extracti Saturni guttas decem, Spiritus Camphorae viginti, Aquae Rosarum uncias octo.

Collutorium saturninum. (GalM.)

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.

Injectio resolvens. (*Va.* Hosp. Ven.)

℞. Extracti Saturni
drachm. duas ad quatuor.
Aquae destillatae . libram unam.
Misce. — Zur Beschränkung des Ausflusses bei chron. Blennorrhagie.

Injectio ad leucorrhoeam s. adstringens. (*Au. Ca. Sw. Sy.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Aceti destillati . . . semilibram.
Aquae Rosarum . sesquilibram.

Von Young bei Leukorrhöe empfohlen. (*Ca. Sw. Sy.*)

℞. Extracti Saturni . gutt. 9 ad 18.
Aquae . . . . . uncias novem.
Opii . . . . . gr 12 ad 24.

Von Girtanner bei sehr schmerzhafter Gonorrhöe empfohlen. (*Au.*)

Injectio oleosa (*Re.*): Ol. Amygd. boni uncias quatuor, Solutionis Plumbi Subacetatis guttas triginta, misce. Bei inflamm. urethrae, vorher zu wärmen.

Injectio sedans s. sedativa. (*Ca. Sw. Sy.*)

℞. Extr. Opii aquosi
drach. unam ad tres.
Aquae calidae . libram unam.
Solutioni adde
Extr. Saturni drach. unam ad tres.
Misce. (*Ca. Sw.*)

Sy. Extracti Opii drachmam, Aquae Rosarum libras duas et Extracti Saturni guttas sexaginta; vel: Opii drachmas tres, Aquae dest. uncias duodecim et Extracti Saturni unciam unam ad tres.

Von Hamilton, besonders bei Gonorrhöe, gepriesen.

Collyrium saturninum opiatum. (Am. WW. *C. E.*)

℞. Extracti Saturni . guttas duas.
Aquae Rosarum . unciam unam.
Extr. Opii aquosi granum unum.
Misce. (WW.)

℞. Extracti Saturni scrupulum unum.
Aquae . . octarium dimidium.
Tincturae Opii . unciam unam.
Misce. (Am. *C.*)

℞. Extracti Saturni guttas duodecim.
Vini Opii . guttas quadraginta.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Misce. (*E.*)

Lotio adstringens, Aqua exsiccans. (*E. Sa.*)

℞. Extracti Saturni drachmam unam.
Spiritus Camphorae drachmas tres.
Aquae . . . . octarium unum.
Misce. (*E.*)

℞. Aquae Calcis . . sesquiunciam.
— sclopetariae . semunciam.
Extracti Saturni semidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

Lotio antiphlogistica. (Gr.)

℞. Liquoris Plumbi Subacetatis drachmas sex.
— Ammoniae Acetatis uncias quatuor.
Aquae purae . . . libras duas.
Misce.

Gargarisma adstringens. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Extracti Saturni semidrachmam.
Decocti Hordei . libram unam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Cataplasma saturninum s. repercutiens s. resolvens. (GalM. LH. RC. *Ra. Sp. Sy.*)

℞. Farinarum resolventium q. vis.
Aquae vegeto-min. . octuplum.
Coque ad consistentiam pultis. (*Sp.*)
LH. Micae uncias quatuor, Aquae vegeto mineralis quantum satis; — RC. Micae Panis vel Farinae q. vis, Solutionis Acetatis Plumbi fortioris q. s.
℞. Aquae fervidae . libram unam.
Micae Panis . quantum sufficit.
Extr. Saturni unc. unam ad duas.
Misce et adde
Axungiae Porci . unciam unam.
Warm anzuwenden. (*Sy.*)
℞. Cataplasmatis emoll. unc. quatuor.
Extracti Saturni . unciam unam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Misce exacte. (*Ra.*)

§. II. Präparate, in denen dem Bleiextract alcoholische Flüssigkeiten zum Vehikel dienen.

Gargarisma stypticum. (*Pic.*)

℞. Extracti Saturni . uncias duas.
Aluminis . . . unciam unam.
Aceti . . . vitrum dimidium.
Vini albi . . . octarium unum.

Aqua cum Subacetate Protoxydi Plumbi s. Saturni s. saturnina s. Acetatis Plumbi s. Plumbi acetosi s. Lithargyri s. Lithargyri acetati composita s. Acetatis superplumbici s. Goulardi s. vegeto- s. vegetabili-mineralis Goulardi s. Subacetatis plumbici, Acetas Plumbi dilutum alcoholisatum, Solutio Subacetatis s. Acetatis plumbici, Subacetas Plumbi dilutus, Liquor Plumbi Acetatis s. Subacetatis dilutus s. Subacetatis Lithargyri compositus, Tinctura plumbosa, Acetas Plumbi liquidus cum Alcohole; Goulard's Bleiwasser. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Bo. Br. C. Fi. Gr. ParC. Pie. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Extr. Saturni (30°) . part. unam.
Dilue in
Aquae dest. partib. quadraginta octo.
Liquori adde
Alcoholis (22°) . partes quatuor.
Serva. (Bor4. Fenn. Gal. GalM. *Bo. Fi. ParC. Pie. Sp. T.*)

Ams. B. D. Fer. Ful. Han. Hass. LH. LP. R Suec. *Br.* et *Pid.* Extracti partem unam, Alcoholis duas et Aquae quadraginta octo; — Lus. Extracti unam, octo Alcoholis et Aquae quadraginta octo; — *Vm.* Extracti unam, Alcoholis unam et Aquae triginta duas; — Wür. Extracti unam, Alcoholis tantidem et Aquae triginta sex; — HassP. Extracti unam, Aquae comm. viginti quatuor et Spiritus Vini rectif. unam; — Du. Lon. LonN. *C. Gr. Re. Sa.* et *Sw.* Extracti et Alcoholis, sing. unam et Aquae nonaginta sex (centum viginti octo) *White wash, Preventive, Royal Preventive Gr. Re.*); — His. His3 Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae nonaginta sex; — Br. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae centum viginti octo; — Bel. Extracti sex, Alcoholis sedecim et Aquae centum nonaginta duo; — RC. Extracti scrupulos quatuor, Alcoholis diluti, Acidi acetici diluti vel impuri, sing. drachmam, Aquae dest. vel font. libram unam.

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Aquae dest. partes quadraginta octo.
Misce bene. (Han. Li. O. Pm. Pol.)

Ra. Va. Char. Extracti partem unam et octo Aquae; — Sax. Extracti unam et duodecim Aquae; — Ba. Extracti unam et Aquae viginti quatuor.

Das Goulard'sche Wasser wird zu Bähungen und zum Befeuchten von Breiumschlägen angewendet.

Cataplasma Goulardi (Gr.): Extr. Saturni sesquidrachmam, Spir. Vini rectif. uncias duas, Aquae duodecim, Micae Panis, q. s. — Bei Entzündungen.

LH. Aquam saturninam ut *repercutientem* indicat.

Lotio s. Solutio Plumbi Subacetatis. (Re.)

℞. Oxydi Plumbi semivitrei,
Lithargyri, sing. unc. triginta sex.
Aceti . . . . . congium.
Coque ad octarios sex et exprime. (Ph. Vet. Coll.)

℞. Solutionis praeced.,

Spiritus rectif., sing. drachmas duas.
Aquae . . . . . octarium.
Misce. — Als Augenwaſſer zwei Pinten. (id.)

Fomentatio refrigerans, Lotio saturnina s. plumbata s. Goulardi, Lotio s. Fomentatio resolvens. (Ful. Ham. *Ca. Gr. Pie. Sw. Sy.*)

℞. Aquae vegeto-min. sesquilibram.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Misce. (Ham.)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae, sing. unciam unam.
— Rosarum . . libras tres.
Misce. (*Ca. Pie.*)

Gr. Extracti Saturni unciam, Spiritus Vini rect. drachmas duas, Aquae Rosae libram; — praeterea: Extracti uncias duas, Aceti destillati quatuor, Spiritus Vini rectificati semunciam, Aquae Rosae libram; — *Sw.* Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis quatuor et Aquae libras duas; — *Sy.* Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis unciam et Aquae libras duas.
Gewiß nur eine Abänderung des Goulard'ſchen Waſſers. Man kann nöthigenfalls drei oder vier Drachmen Aqua Vitae camphorata zuſetzen.

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae, sing. . semunciam.
— Plantaginis . libram unam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Aquae vegeto-miner. libras duas.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Acidi sulphurici . unciam unam.
Misce. (Ful.)

Mistura refrigerans. (*Gr.*)

℞. Extracti Saturni drachmam unam.
Aceti . . . . . uncias duas.
Spiritus Vini rectif. drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Waſchmittel.

Liquor ad perniones. (*Sw.*)

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Spir. Rorismarini partes quatuor.
Misce.

Fomentatio resolvens. (Ful.)

℞. Salis Ammoniaci . semunciam.
Aquae communis uncias duodecim.
Solutioni adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Extracti Saturni drachmas duas.

Collyrium saturninum. (*Au. Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camph, sing. guttas sex.
Mucilag. G. Tragacanth. semunciam.
Aquae Plantaginis . uncias sex.
Misce. (*Ca.*)

℞. Aquae Goulardi,
— Rosarum, sing. uncias duas.
Opii . . . . . grana octo.
Misce. (*Au.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Infusi Sambuci . . uncias sex.
Aquae Vitae camph. drach. unam.
Misce. (*Au.*)

Aqua roborans. (*Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camph., sing. drach. duas.
Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae Chamomillae semilibram.
Selle empfahl dieſes Augenwaſſer bei ſogenannter aſtheniſcher Augenentzündung.

Fomentum saturninum cum Opio, Fomentatio adstringens. (*Au.*)

℞. Aquae . . . . uncias decem.
Extracti Opii . . grana decem.
— Saturni . semidrachmam.
Aquae Vitae camph. guttas viginti.
Vogel empfiehlt es bei eingeklemmten Brüchen.

Royal preventive (*Re.*): Aqua Sacchari Saturni.

§. III. Präparate, in denen fette Körper das Excipiens des Bleiextracts bilden.

Cereoli saturnini s. plumbici s. albi, Candelae chirurgicae s. resolventes s. mitigantes, Cerei medicati, Cereoli communes s. Acetatis Plumbi. (Bor. Bor4. Br. Fer. Ful. HassP. Pol. R. Sax. Suec. *Br. Fi. Gr. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Liqua leni igne et adde
Extracti Saturni . unciam unam.
Misce, continue agitando, massam ab igne remotam in cereolos redige. (Bor. Br. Ful. Pol. R. Sax *Br. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

Bor4. HassP. Cerae flavae uncias sex, Aceti plumbici drachmas duas.

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Cetacei . . . . drachmas tres.
Extracti Saturni drachmas duas.
Cerae et cetaceo fusis extractum adde. (Suec.)

Gr. loco extracti saturni Cerussae Acetatis drachmas quinque.

Balsamum universale s. saturninum, Butyrum Saturni, Ceratum Saturni s.

Saturni Goulardi s. Lithargyrii s. Plumbi Superacetatis s. Lithargyri acetati s. Plumbi s. Plumbi compositum s. e Plumbo, Linimentum plumbatum s. sedativum, Pomatum Saturni, Unguentum Acetatis Plumbi s. Plumbi acetatum s. Acetatis superplumbici s. Lithargyri s. de Lithargyro s. nutritum s. triphar·macum s. saturninum s. plumbicum s. Subacetatis Plumbi s. plumbici s. Oxydi Plumbi acetatum s. Acetatis Plumbi tenuis, Ceratum Acetatis plumbici, Sapo antiphlogisticus et resolvens, Pomatum s. Unguentum antiherpeticum; Bleicerat, Bleisalbe. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4 Br. D. DD. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. WW. *Br. Ca. Fi. Gr. Pid. Pic. Re. Sm. Sp. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . partes duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ams.)

His His8. et *Sw.* Olei et Extracti, sing part. aeq.; — Ful. Li. et *Pid.* Olei partem unam cum dimidia et unam Extracti; — *Pic.* Olei partes octo et unam Extracti; — LH. Olei Amygdalarum dulcium unciam unam, Vitellum Ovi no. 1., Acetatis Plumbi liquidi drachmam unam

℞. Axungiae Porci . partes quatuor.
Extracti Saturni . partem unam.
Contere. (Sax.)

℞. Olei Olivarum,
Axungiae Porci,
Extr. Saturni, sing. part. unam.
Misce in mortario vitreo, bene triturando. (Bel.)

℞. Olei Rosarum cocti partem unam.
Extracti Saturni . partes duas.
Tritura simul. (Wir.)

℞. Lithargyri puri . partem unam.
Aceti . . . . . partes duas.
Olei Rosarum cocti partes quatuor.
Tere lithargyrum in mortario plumbeo, addendo interdum acidi pauxillum, interdum olei parvam copiam, donec omnia bene sint commixta. (Br.)

Gr. Lithargyri semilibram, Aceti uncias quinque, Olei rosati libram.

℞. Lithargyri,
Cerussae, singulorum uncias tres.
Aceti . . . . . uncias octo.
Olei . . . . . sesquilibram.
Tritura lithargyrum et cerussam modo cum Aceti, modo cum Olei pauxillo, donec liquida sint penitus consumpta (Sar.)

Wir. Lithargyri partem dimidiam, Cerussae unam cum dimidia, Aceti dimidiam et unam Olei Rosarum cocti; — Pal. Lithargyri duas, Cerussae dimidiam, Aceti unam et Olei Rosarum duas cum dimidia; — *Fi.* Olei Olivarum, Cerussae, sing. libram, lente coquere, addere Aceti calidi albi libram et tunc Cerae albae et Emplastri Diachyli simpl., sing. uncias sex. (*Ceratum Cerussae.*)

℞. Lithargyri pulverati libram unam.
Olei Olivarum . . libras tres.
Aceti albi . . uncias sedecim.
Coque lithargyrum cum olei libra una, addendo sensim Aquam, donec massa cerati consist. acceperit, quod deinde cum oleo quod restat et aceto contere. (His. His8.)

Sp. Lithargyri partes sedecim, Olei octodecim et Aceti tres; — *Re.* Lithargyri semilibram, Acidi acetici uncias quinque, Ol. Oliv. libram; — *Sm.* Olei partem unam, Aceti, Lithargyri, sing. duas, coquendo ad dimidium redigere.

℞. Olei Olivarum . partes quatuor.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et massae refrigescere coeptae sensim adde, continue agitando,
Extracti Saturni . partem unam.
Misce bene. (O. *Br.*)

D. Ful. Li. et *Vm.* Extracti partem unam, Cerae duas et sex Olei; — Wür. Extracti unam, Cerae unam cum dimidia et quatuor Olei; — *Sy.* Extracti unam, Cerae sex et sedecim Olei; — *Sw.* Extracti unam, Cerae tantidem et tres Olei; — *Sp.* Extracti unam, Cerae sex et Olei viginti quatuor; vel: Extracti quatuor, Cerae octo et Olei octodecim; vel: Extracti dimidiam, Cerae novem et octo Olei; — Fenn. et Suec. Extracti et Cerae, sing. quatuor et novem Olei; — Hass. Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et duodecim Olei; — R. Extracti quatuor, Cerae quinque et novem Olei; — Lus. et *Br.* Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et novem Olei; — *Fi.* Olei libras duas, Cerae unam, Aceti (Extracti) Saturni uncias novem.

℞. Axungiae Porci . partem unam.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (A.)

BorC. Extracti partes duas, Cerae unam et tres Axungiae.

℞. Olei Nuc. Jugland. part. duodecim.
Cerae flavae . . partes quatuor.
Liqua blando igne et adde sensim
Aquae fontanae partes duodecim.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce exacte. (D. *Pid.*)

Pol. et *Vm.* Extracti partem unam, Aquae duas, unam Cerae et quatuor Olei; — Bor. Extracti partem unam, Aquae Rosar. duas, Cerae duas et octo Olei; — Wir. Extracti unam, Aquae viginti quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Han. et O. Extracti unam, Aquae Rosar. quatuor, duas Cerae et octo Olei; — Han. Extracti, Aquae, sing. duas cum dimidia, Cerae tantidem et octo Olei; — Sax. Extracti dimidiam, Aquae tres cum dimidia, unam Cerae et quatuor Olei; — HassP. Olei Olivarum libras duas, Cerae albae uncias sex, Aceti Lithargyri tres, Aquae Ros. sex.

℞. Cerae,
Sebi vervecini, sing. partes duas.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua blando igne et mixturae paullo refrigeratae adde
Extracti Saturni . partem unam.
Tritura bene simul. (*Pid.*)

℞. Cerati part. centum viginti quinque.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce sedulo in mortario (Gal. GalM.).

Ca. et *Pie.* Extracti partem unam et Cerati nonaginta sex; — B. et Ed. Extracti unam et viginti Cerati; — Du. Extracti unam et octodecim Cerati; — *Re.* Solut. Subacetat. Plumbi semidrachmam, Cerati unciam; — Ba. Extracti unam et Cerati decem; — An. DD et *Sw.* Extracti unam et Cerati octo; — WW. Extracti unam et quatuor Cerati; — Fer. Olei Olivarum libras duas, Cerae albae uncias tres et sex Extracti Saturni; — Bor4. Unguenti simpl. libras tres, Aceti plumbici uncias tres.

Alle dieſe unter dem Namen von Cerat, Liniment, Salbe und ſelbſt Pflaſter gebräuchlichen Zuſammenſetzungen ſind bloß hinſichtlich des Dichtigkeitgrads von einander verſchieden. Sie gelten für beruhigend, lindernd, auflöſend, ſchmelzend und die Vernarbung befördernd. Sehr und vielleicht zu häufig macht man von ihnen in der chirurgiſchen Praxis Gebrauch, obgleich ſie jetzt weniger benutzt werden, als in der Zeit, wo das Verbinden der Wunden faſt einzig in der Anwendung von Salben und Pflaſtern beſtand.

Unguentum s. Linimentum tripharmacum (*Gr.*): Empl. comm. uncias quatuor, Ol. Oliv. duas, Aceti unam, coque.

Unguentum Plumbi compositum (*Re.*): Emplastri Plumbi semilibram, Adipis praep. uncias quatuor, Olei Oliv., Ung. cerei, sing. sex, Aceti quatuor, Solut. Subacetat. Plumbi duas, misce s. a

Emplastrum caeruleum (*Re.*): Ol. Oliv. drachm. sex, Cerae flavae, Ung. nutriti, sing. quatuor, Smalti tres, misce ut fiat ung.

Unguentum ad varices ani s. antihaemorrhoidale. (Ham. *Fi. Re. Sw.*)

℞. Unguenti Cetacei . partes octo.
Extracti Saturni . partem unam.
Contere. (*Sw.*)

℞. Unguenti Linariae,
Mucilag. Sem. Cydon., sing. part. duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ham.)

℞. Submuriatis Hydrargyri drachmas duas.
Solut. Subacetat. Plumbi,
— Acetat. Morphin., sing. semidrachmam
Picis liq. Barbad. drachmas duas.
Axungiae rec. . . . . unciam.
Misce. (*Re.*)

Ointment for grease in horses (*Gr. Re.*): Axungiae Porci uncias quatuor, Olei Palmae duas, Ol. Olivarum unam, Solut. Acetat. Plumbi sesquiunciam.

Unguentum ad combustiones. (Ful.)

℞. Ung. Plumbi subacet. unc. unam.
— Basilici,
— balsamici, sing. drach. unam.
Misce.

Ceratum exsiccans s. neutrale Kirklandi. (*Ca. Gr. Pie. Re.*)

℞. Cretae praeparatae,
Aceti dest., sing. uncias quatuor.
Cessatâ effervescentiâ adde
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Emplastri simplicis semilibram.
Liqua leni igne et massae semirefrigeratae admisce
Extr. Saturni unc. quatuordecim.
Misce sedulo.

Re. Empl. Diach. uncias quatuor, Olei Oliv. duas, liqua et adde Calcis praep. uncias duas, et fere refrigerato Aceti dest. tantidem, Subacetat. Plumbi pulv. sesquidrachmam; — *Gr.* Olei, Cretae et Aceti dest., sing. uncias quatuor, Diachyl. octo, Sacch. Sat. drachmas tres.

Unguentum Subacetatis Plumbi opiatum s. opiatum s. opiaceum, Linimentum Plumbi Acetatis compositum s. resolvens opiaceum (*Ra. Re. Va.* Char.)

℞. Extracti Saturni . . semunciam.
Laudani liq. Sydenh. drach. duas.
Olei albi . . . . uncias duas.
Subige bene.

Re. Solut. Acetatis Plumbi unciam

unam, Olei Olivar. duas, Tinct. Opii drachmas duas, misce.

Unguentum Subacetatis Plumbi camphoratum, Ceratum Plumbi compositum s. Goulardi s. Lithargyri acetati, Balsamum Saturni Goulardi, Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Goulardi. (A. Ams. Br. Ful. Lon. LonN. Lus. Wür. *C. Gr. Pie. Re. Sp. Sm.*)

Praeparatur, Unguento simplici fere refrigerato addendo Camphorae cum Olei pauxillo tritae partem trigesimam tertiam (Ams.); quinquagesimam quartam (Wür.); septuagesimam sextam (Ful.); centesimam sexagesimam octavam (Br.); ducentesimam decimam (*Sp*.); ducentesimam quadragesimam (*Pie. Sp.*); ducentesimam quadragesimam octavam (Am. Lus. *C.*); octingentesimam quadragesimam. (*Sp.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* Extracti Saturni uncias duas cum dimidia, Cerae flavae quatuor, Olei Olivarum novem et Camphorae semidrachmam; — *Gr.* praeterea Extracti Saturni semunciam, reliqua ut antea (*Ung. Plumbi comp.*)

Unguentum Plumbi compositum (*Gr.*): Ung. Cerae unciam, Merc. praecip. rubri, Extract Sat., sing. drach. unam, Extr. Opii drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Sm.*)

℞. Cerati Saturni,
Unguenti populei, sing. unciam.
Camphorae pulv. drachmas duas.
Zum Verbinden friſcher Flechten.

Ceratum coeruleum (Pharm. Leyd. *Re.*): Lithargyri cum Aceto et Aqua Rosarum alterne et gradatim ad alborem usque triti uncias quatuor, Cerae flavae tantidem, Olei Oliv. semioctarium, liqua et totum cum Smalti unciis tribus commisce.

Linimentum antihystericum. (*Sm.*)

℞. Olei rosati . . . . uncias duas.
Ung. populei drachmas quatuor.
Camphorae . . drachmas duas.
Extracti Saturni drachmam unam.
In Einreibungen auf den Unterleib alle Viertelſtunden.

Sparadrap s. Pellis Goulardi. (*Pie. Sp. Vm.*)

℞. Olei Olivarum unc. quatuordecim.
Cerae flavae unc. viginti quatuor.
Liquatis adde
Extracti Saturni . unciam unam.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae semidrachmam.
Mixturae immerge linteum mediocris teneritatis et superficiem deinde laeviga. (*Vm.*)

Pie. Cerae libras duodecim, Olei tres, Extracti uncias octo et Camphorae drachmas duas; — *Sp.* Cerae uncias nonagınta sex, Olei viginti octo, Extracti quatuor et Camphorae drachmam unam.

Bei atoniſchen Geſchwüren der Beine und bei rheumatiſchen Schmerzen gerühmt.

Unguentum Saturni saponaccum s. Subacetatis Plumbi saponaceum, Unguentum s. Pomatum Goulardi. (Br. Ful. Lus. *Fi. Pie.*)

℞. Saponis communis uncias octo.
Aquae fontanae . octarios duos.
Dissolve blando igne, continue agitando; adde deinde
Extracti Saturni . uncias duas.
Camphorae . drachmam unam.
Misce bene. (Br. *Pie.*)

Fi. Saponis Alicant. sesquilibram, Extr. Saturni Goulardi uncias duas, Camphorae drachmam, Aquae libras quinque.

℞. Unguenti nutriti . uncias octo.
Saponis albi . . uncias quatuor.
Coque lente ad consumptionem humidi usque et adde
Camphorae . drachmam unam.
Misce bene. (Ful.)

Lus. addere Unguento Subacetatis simplici (Lus.) Saponis raspati uncias tres.

Soll ſtärker auflöſend und ſchmelzend ſeyn, als die einfache. Man hat ſie beſonders bei Anchyloſe gerühmt.

Unguentum Suberacetatis Plumbi compos. (RC.): Ung. Acetat. Plumbi, Solut. Muriat. Hydr. oxyd. et Ammon, sing. part. aeq. probe misceantur. — Bei Flechten, tinea ꝛc.

Unguentum adstringens (*Gr.*): Axungine Porci uncias quatuor, Ol. Terebinth. drachmas duas, Extracti Saturni semunciam.

Saturnus acetosus, Pulvis Extracti Saturni. (*Gr.*)

Extractum Saturni ad siccitatem usque vaporatum.

Protoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi acidulus siccus, Acetas Plumbi crystallisatus s. plumbicum crystallisatum, Acetis Plumbi, Cerussa acetata, Plumbum aceticum s. aceticum crudum s. acetatum, Superacetas Plumbi, Saccharum saturninum s. Saturni, Sal Saturni, Sal Plumbi, Acetas Protoxydi Plumbi, Acetas Plumbi neutrum; Bleizucker, eſſigſaures Blei, Bleiſalz; Protoa-

cétate de plomb, Acétate de protoxide de plomb, Acétate de plomb ou de plomb neutre, Sel de Saturne, Sucre de plomb, Sucre de Saturne (*Gal.*); Sugar of lead (*Ang.*); Blye-sukker (*D.*); Lootzuiker (*Bel.*); Zuchero di Saturno (*I.*); Cukior olowiany, Przyoccian olowin nieczysty (*Pol.*); Blysocker (*Suec.*).

§. I. Wie man ihn im Handel findet.

B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. DD. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. LH. Li. O. Pol. Sax. Suec. WW. *C. G. Par. Pid.*

Bevor dieses Salz angewendet wird, muß es gereinigt werden (*Saccharum Saturni depuratum*, *Plumbum aceticum depuratum*, *Acetas Plumbi depuratus s. in crystallos concretus* etc.

℞. Acetatis Plumbi . . partes duas.
Aquae calidae . . . partes tres.

Solutioni ut perfecta sit, adde Acidi acetici concent. pauxillum, liquorem adhuc calidum filtra et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Ba.)

Fenn. Salis partem unam, Aquae quatuor et unam Aceti dest.; — Bor4. Salis partes duodecim, Aquae dest. calidae q. s., Aceti dest. partem unam; — LH. Acetatis partem unam cum Aquae destillatae partibus quatuor, coquere, filtrare et ut in praeparatione pharmaceutica procedere; — Sax. Salis partes tres in totidem Aquae dissolvere, Aceti dest. partem unam addere, mixta coquere, colare et crystallisationi subjicere.

℞. Plumbi acet part. unam (q. libet).
Aquae calidae part. unam (q. s.).

Dissolve, liquorem per telam trajice, adde Aquae partem unam, calefac, filtra et lentae crystallisationi subjice. (Bor. Han. Hass. HassP. O. Suec. *Sw. Vm.*)

Vm. Sal in Aquae quam minima quantitate solvere et liquori torrentem Gasis acidi carbonici immittere tam diu, donec nullum amplius provocetur praecipitatum.

§. II. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. Br. D. Du. Ed. Ful. Gal. Gen. Hass. His. His8. LH. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Pm. Sar. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Cerussae . . . . quantum vis.
Aceti destillati pondus decuplum.

Digere in vase vitreo, donec acidum sit saturatum; decantha et filtra liquorem, quem crystallisationi subjice; crystalli siccentur. (Am. Ams. Du. Ed. Gen. Hass. Lon. LP. Lus. Wür. *C. Gr. Pid. Vm.*)

Modus procedendi fere in omnibus pharmacopoeis idem indicatur, exceptis differentiis inter proportionem plumbi et acidi, parvi momenti; sed Pal. Oxydum Plumbi obtentum calcinatione metalli igni aperti ope; — A. D. et Fer. Minium adhibent; — His. His8. et *Vm.* Cerussam vel Lithargyrum; — Ful. *Sp.* et *Sw.* Cerussam vel Minium; — Wir. et *Fi.* Lithargyrum vel Minium; — Br. Gal. LH. Pm. et *T.* Lithargyrum; — LH. Pm. plures crystallisationes.

Au Sar. et *Br.* Subacetatem lente evaporare et deinde in loco frigido crystallisationi subjicere; — Lon. *Re. Plumbi Acetas*: Acidi acetici fortioris octarium unum cum Aquae dest. ferventis sesquioctario miscere et paulatim addendo Plumbi Subcarbonatis libram unam coquere, donec acidum saturetur, tunc per chartam colare, Aquam ad pelliculae apparitionem consumere et seponere ut crystalli fiant, quae super charta bibula exsiccentur; — *Gr.* Acid. pyrolig. purif. 80° B. lib. 65, Litharg. lib. 58, Aquae q. s.

Der Bleizucker wird als adstringirend, austrocknend und zertheilend oder zurücktreibend betrachtet und sehr häufig äußerlich zur Zertheilung oder Auflösung mancher phlegmonöser und erysipelatöser Entzündungen angewendet. Man giebt ihn auch innerlich, um colliquative Schweiße Schwindsüchtiger zu mäßigen, Diarrhöen zu hemmen, endlich auch bei sogenannten passiven Hämorrhagien und in verschiedenen Fällen von chronischem Catarrh.

Kalkwasser, Alkalien und ihre kohlensäuerlichen Verbindungen, Schwefel- und Salzsäure, alkalische Seifen, Alaun, schwefelsaures Eisen, Kupfer und Zink, Borax, Schleimharz und die meisten thierischen Substanzen zersetzen ihn und können daher nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, welche das Salz im festen Zustande enthalten.

Pulvis temperans. (*Pic.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Nitri . . . . . unciam unam.

Fiat pulvis. — Gabe von zwei Scrupeln bis zu einer Drachme in Auflösung in einem Glase Brunnenwasser, zwei oder drei Mal in der Woche.

Wir. hoc praeparatum sub nomine

Nitrum saturninum sequenti modo indicat:

℞. Nitri crudi . . . uncias tres.
Acetatis Plumbi . uncias duas.
Dissolve in Aquae Rosarum q. s., tunc vaporando ad pultem spissam redige et denique blandi caloris ope penitus exsicca — Dieſer Bleiſalpeter wurde ehedem äußerlich zu Augen-, Gurgelwaſſern und Einſpritzungen in die Harnröhre angewendet.

Pulvis ad phthisin s. antiphthisicus. (*Bo. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Opii, singulorum . . grana sex.
Sacchari . . scrupulum unum.
Misce exacte et in doses duodecim divide. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends bei colliquativen Schweißen und Diarrhöen Schwindſüchtiger.

Pulvis stypticus. (*Ca.*)

℞. Solut. Ferri muriat. saturat unc. quatuor.
Evaporatae ad siccum adde
Acetatis Plumbi pondus aequale.
Evaporationem leni calore ad siccum usque continua; residuum pulvera et cribra. — Aeußerlich und innerlich bei Blutflüſſen. — Gabe, innerlich, vier bis zwölf Gran.

Pulvis antipsoricus. (*Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Flor. Sulphuris, sing. part. duas.
Zinci sulphurici . partem unam.
Man verdünnt, nach Chauſſier, eine ſtarke Priſe mit einigen Tropfen Oel und reibt es in die Handflächen ein.

Pulvis escharoticus. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Cerussae,
Aluminis, sing. drachmam unam.
Soll die Vernarbung atoniſcher Geſchwüre befördern.

Pilulae Acetatis Plumbi. (*Pie. Ra. Va.* Char.)

℞. Acetatis Plumbi,
Pulv. Althaeae, sing. drach. unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae triginta sex. — Gabe, vier bis zwölf Stück täglich, zur Mäßigung der Schweiße Schwindſüchtiger. Gewöhnlich ſind acht bis zehn hinreichend. Man läßt ſie zu der Zeit nehmen, wo der Schweiß beginnt.

Pilulae antiphlogisticae. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Camphorae,
Nitri, singulorum . grana tria.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae sex. — Den Tag über gegen übermäßige Schweiße Schwindſüchtiger und manche Bruſtentzündungen.

Pilulae adstringentes s. stypticae. (*E. Gr. Ra. Re. Va.*)

℞. Sacchari Saturni . . grana tria.
Opii . . . . . granum unum.
Fiant pil. no. 3. — Zweimal täglich 1 Stück und mit Weineſſig geſäuerte Tränke nachzutrinken. (*Gr. Re.*) Bei Lungen-, Mutterblutfluß und Diarrhoe.

℞. Acetatis Plumbi grana quatuor.
Opii purificati . granum unum.
Extr. Liquiritiae . scrup. unum.
Fiant pilulae sedecim. — Duméril wendet ſie gegen chroniſche colliquative Diarrhöe zur Verminderung der Stuhlausleerungen an. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Acetatis Plumbi grana duodecim.
Opii . . . . . grana sex.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae duodecim. — Bei Blutſpeien und andern Blutflüſſen von Nutzen. (*E.*)

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae. (*B*. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Ipecacuanhae, sing. drach. unam.
Opii . . . . . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae quadraginta. — Thacher empfiehlt ſie bei ſogenannten paſſiven Mutterblutflüſſen. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

B. Präparate, in denen der Bleizucker mit fetten Körpern verbunden iſt.

Ceratum s. Pomatum saturninum s. Saturni s. Goulardi. (Gen. LH.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Cerati Galeni uncias duodecim.
Misce triturando. (Gen.)
LH. Cerae albae uncias quatuor, Olei optimi libram unam, Salis Saturni unciam unam; — interdum convenit addere Camphorae drachmam unam ad duas.

Oleum s Balsamum Saturni s. Goulardi. (Hass. *Ca. Gr. Pid. Pie. Vm.*)

℞. Olei Terebinthinae quantum vis.
Calefac in vase vitreo et per partiunculas adde
Acetatis Plumbi pulverati . q. s. agitando continue, donec nihil amplius dissolvatur; sepone deinde et liquorem adhuc calidum decantha. (*Vm.*)

Hass. *Ca. Pid.* et *Pie.* Acetatis sicci unciis quatuor infundere Essentiae Terebinthinae uncias octo et in digestione relinquere in arena per horas 24; — *Gr.* Sacch. Sat. uncias octo, Ol. Terebinth. q. s.

Reizend, gegen freſſende und ſchmerzhafte Geſchwüre, gegen Brand, jedoch mit Vorſicht anzuwenden.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Pie.*)

℞. Trochiscorum alborum Rhazis semunciam.
Acetatis Plumbi,
Mercurii dulcis, sing. drachmam unam.
Axungiae Porci quantum sufficit ut fiat unguentum.

Unguentum s. Pomatum Acetitis Plumbi s. saturninum. (LP. *Bo.*)

℞. Acetitis Plumbi pulverati unciam unam.
Axungiae . . . . sesquilibram.
Misce ut fiat unguentum (LP.). — Kühlend und austrocknend.

℞. Acetatis Plumbi . unciam unam.
Aceti destillati . . uncias octo.
Dissolve, ad siccum evapora, pulvera et commisce cum
Axungiae Porci . unciis duabus.
Extracti Cicutae drachmis duabus.
Nach Barthez ſchmelzend und auflöſend.

Pomatum s. Unguentum antihaemorrhoidale. (*Pie.*)

℞. Pomati Limacum unciam unam.
Cerussae,
Laudani liq., sing. semidrachmam.
Acetatis Plumbi . drachmas duas.
Pulveris Radicis Althaeae . q. s.

Pomatum s. Unguentum resolvens. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Acetatis Plumbi . drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Cerae albae . . unciam unam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Barthez empfahl ſie bei ſcorbutiſchen Geſchwüren.

Linimentum Plumbi compositum. (*Re.*)

℞. Ung. Lithargyri . unciam unam.
Camphorae,
Opii, sing. . . . . grana octo.
Acetatis Plumbi grana quindecim.
Misce. — Bei psorophthalmia Abends bei Schlafengehen auf die Augenlider.

Ceratum Acetatis Plumbi, Unguentum saturninum s. Cerussae acetatae s. Acetatis s. Acetitis Plumbi s. Plumbi Superacetatis. (D. Lon. LonN. *C. Gr. Re. Sw.*)

℞. Cerae albae . . . uncias duas.
Olei Olivarum . . semioctarium.
Acetatis Plumbi pulv. drachm. duas.
Liqua ceram in septem unciis olei, adde sensim sal cum reliquo oleo tritum et triturando misce. (Lon. LonN. *C. Gr.*)

Re. Olei uncias sedecim, caeterum ut antea; — *Gr.* praeterea: Cerae albae sesquiunciam, caet. ut Lon.; vel: Ung. simpl. uncias viginti, Sacch. Saturni unam; vel: Ung. Cerae alb. sesquilibram, Sacch. Sat. unciam. — D. Salis sesquiunciam, Olei duodecim et Cerae tres; — *Sw.* Salis drachmam unam, Olei uncias octo et Cerae sesquiunciam.

Unguentum antihaemorrhoidale. (*Bo. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Suberis usti pulverati semunciam.
Butyri recentis . . uncias duas.
Misce triturando.

Unguentum oculare s. ophthalmicum. (*Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi scrupulum unum.
Unguenti albi drachmas quinque.
Bals. Commendatoris scrup. duos.
Commisce bene.

Ceratum Saponis s. saponaceum s. Pottii. (*Ca. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Acetatis Plumbi pulv. partes quatuor.
Saponis albi rasi partem unam cum dimidia.
Misce intime in mortario marmoreo in balneo aquae calefacto; aquâ evaporatâ adde
Cerae albae . . . . partes tres, antea liquatas cum
Olei Olivarum . partibus tribus.
Misce bene triturando. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . . libram unam.
Aceti . . . . . libras octo.
Saponis . . . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi consumptionem usque et adde
Olei Olivarum,
Cerae flavae, sing. . libram unam.
Conterendo misce. (*Ca. Sw.*)

Re. Saponis duri uncias octo, Cerae flavae quinque, Lithargyri pulv. libram, Ol. Oliv. octarium, Aceti congium; — *Gr.* Cerae fl. decem, Ol. Oliv. libram, caet. ut *Re.*

austrocknend, zum Verbinden von Geschwüren angewendet und hinsichtlich der Wirkung von der Bleiweißsalbe nicht verschieden.

Sparadrap resolvens. (*Pie.*)

℞. Cerae virgineae . . uncias octo.
Olei Olivarum . . libram unam.
Liquatis adde
Camphorae,
Salis Ammon., sing. drach. unam.
Acetatis Plumbi . unciam unam.
Fascias linteas in mixturam immerge.

Unguentum adstringens (for grease in horses) (*Gr. Re.*): Terebinth. Venet. uncias quatuor, Axung Porci sex, Acetatis Plumbi duas; — *Gr.* aliud *Ung. adstringens* indicat e Mellis unc. octo, Sacch. Sat. sesquiuncia, Vitrioli coerul. uncia una.

Unguentum sedans. (*Pie*)

℞. Sagapeni,
G. Ammoniaci, sing. . drach. sex.
Terebinthinae,
Resinae Pini, sing. . uncias octo.
Aquae Vitae . quantum sufficit.
Solutioni adde
Acetatis Plumbi,
Cerussae, sing. . . sesquiunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Euphorbii . . . drachmas tres.
Axungiae Porci . libram unam.
Olei Liliorum,
— Lavandulae,
Cerae albae, sing. quant. sufficit.

Reizend, ehedem für auflösend gehalten, heutzutage nicht mehr gebräuchlich.

Emplastrum resolvens. (*Bo. Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Florum Sulphuris . semunciam.
Picis albae . . . uncias duas.

Auf venerische Leistenbeulen anzuwenden. — Man erneuert es alle zwei Tage.

C. Präparate, in denen Flüssigkeiten das Excipiens des Bleizuckers bilden.

Acetas Plumbi solutus s. liquidus, Aqua cum Saccharo Saturni s. saturnina, Solutio Acetatis Plumbi aquosa, Liquor Plumbi acetici. (A. Ba. BorC. DD. Ham. Li. *Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi . partem unam.
Aquae destillatae . . partes sex.

Solutionem filtra. (A.) — A. nennt diese Formel sehr unpassend *Acetum Lithargyri*; — BorC. *Extractum Saturni*: dissolutio partis unius Salis in Aquae tribus; — DD. *Aqua saturnina*: solutio partis unius Salis in Aquae nonaginta sex.

Ba. Salis partem unam et novem Aquae; — Ham. et Li. Aquae quadraginta octo.

Injectio Plumbi Acetatis s. resolvens: Salis partem unam, Aquae viginti quatuor ad quadraginta octo (*Ra*); — Solutionis Plumbi Acetatis guttas sex, Aq. destill. uncias quatuor, misce; bei'm entzünd. Stadium des Trippers, bei gleichzeit Urinbrennen, Priapismus und chorda mit der inject. opii.

Bor4. Liquorem Plumbi acetici indicans parationem ejus non indicat; ut reagens.

Solutio Acetatis Plumbi aquosa opiata. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo.
Tincturae Opii . semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.

Gabe, alle drei Stunden ein Löffel gegen übermäßige Schweiße Schwindsüchtiger.

Tinctura saturnina s. saturnino-martialis s. adstringens. (*Au. Gr.*)

℞. Acetatis Plumbi . unciam unam.
Sulphatis Ferri . . semunciam.
Alcoholis . . . . uncias octo.

Gabe, zehen Tropfen für Kinder, zwanzig für Erwachsene, bei Blutflüssen, besonders aus der Nase.

Gr. Sacchari Saturni, Vitriol. virid., sing. uncias duas. Spir. rectif. libras duas. — Bei Phthisis.

Aqua ophthalmica, Collyrium Sacchari Saturni (B°. GalM. *Gr. T.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Aquae Rosarum . . uncias sex.

Gr. Salis grana sex, Aquae Rosarum uncias sex; — GalM. collyrium fere simile indicat.

℞. Acetatis Plumbi . drachmas sex.
Zinci sulphurici . semiscrupulum.
Aquae Rosarum . . uncias sex.

Bei hartnäckigen Augenentzündungen einige Tropfen in's Auge zu tröpfeln. (*T.*)

Lotio antiseptica. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aquae Plantaginis . uncias duas.

Collyrium resolvens s. adstringens sedativum. (Gen. LH. Li. *Au. Pie. Ra. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi . semiscrupulum.
Aquae . . . . . uncias duas.
Dissolve. (Gen.)
℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Infusi Flor. Sambuci
unc. quatuor.
Solutini adde

Alcoholis vulnerarii drachm. duas. Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp.St. Ant.)

℞. Acetat Plumbi in Aqua solut. partes tres. Mucilag. Cydonior. partem unam, Misce. (Li.)

℞. Aquae Rosarum uncias quatuor. Acetatis Plumbi . grana quatuor. Gummi Arabici . semidrachmam. Misce. (LH.)

℞. Acetatis Plumbi . semidrachmam. Aquae Plantaginis, — Rosarum, sing. unc. duas. Misce. (*Pic.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana tria Opii . . . . . grana quatuor. Seminum Cydoniorum grana sex. Aquae Rosarum unc. duas vel tres. Misce. (An.)

℞. Acetatis Plumbi . grana decem. Aluminis . . drachmam unam. Aquae Rosarum uncias quatuor. Misce. (*Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana tria Seminum Cydoniorum grana sex. Aquae Rosarum, — Foeniculi, sing. unc. duas. Laudani Sydenh. sesquidrachmam. Misce. (*Au.*)

Julep s. Julapium leniens. (*Pic.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana octo. Aquae Buglossi, — Nymphaeae, sing. unc. tres. Syrupi Papav. albi unciam unam.

Gargarisma sedans. (*Pic.*)

℞. Acetatis Plumbi grana sexaginta. Opii gummosi . . . grana sex. Aquae Rosarum . . uncias octo. Syrupi Mororum unciam unam.

Collutorium Catechu saturninum s. adstringens. (*Au*)

℞. Catechu . . . . drachmas tres. Aquae Calcis . uncias duodecim. Acetatis Plumbi scrupulum unum. Mellis rosati . . . uncias duas.

Fomentum saturninum, Fomentatio resolvens. (*Au*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas. Aceti . . . . . uncias tres. Aquae . uncias viginti quatuor

Von Girtanner gegen Phimoſis empfohlen.

Lotio Plumbi Acetatis composita. (*Re.*)

℞. Solutionis Plumbi Acetat. drachmas duas Acidi acetici . . uncias quatuor. Spiritus tenuioris . unciam unam. Aquae destillatae octarium unum. Interdum Spir. camphoratus additur.

Gargarisma saturninum s. adstringens. (*Au.*)

℞. Herbae Salviae . . semunciam. Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde Aluminis . . drachmam unam. Aquae saturninae uncias duas.

Bei Mercurialſpeichelfluß empfohlen.

Injectio adstringens s. adstringens refrigerans. (LH. *Au.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo. Aquae . . . . unciam unam.

Bei beginnendem Tripper empfohlen.

℞. Aquae destillatae . libram unam. Acetatis crystallisati drachmam unam.

(LH.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam. Essent. Terebinth. uncias quinque.

Solutioni Camphorae pauxillum addatur. — Von Hoffmann ein remedium divinum gegen chroniſchen Tripper genannt.

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam. Aquae . . . . . uncias sex. Liquoris Myrrhae . uncias duas. Tincturae Opii . unciam unam.

Bei chroniſcher Gonorrhöe.

Potio ad tussim convulsivam. (*Ca.*)

℞. Acetatis Plumbi grana duo ad quatuor. Aquae Rosarum . . uncias duas. Syrupi Violarum drachmas duas.

Von Robert Thomas alle vier Stunden zu einem Kaffeelöffel voll empfohlen.

Injectio saturnina myrrhata s. cum Myrrha. (B*.)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam. Aquae destillatae . uncias sex. Solutioni adde Tinct. Myrrhae aquos. unc. duas. — thebaicae . unciam unam.

Frank rühmte ſie bei chroniſchem Mutterblutfluß. — Hierher gehört auch die *Aqua vulneraria Plenckii* (*Bo.*), wozu die Formel folgende iſt:

℞. Aquae Calcis . . libram unam Fulig. ardentis fornacis . unciam unam. Cerussae . . . . . semunciam. Coque per semihoram et adde deinde Olei Myrrhae . . . semunciam.

Wahrſcheinlich bildet ſich bei dieſer Operation etwas brenzlich-eſſigſaurer Kalk und etwas brenzlich eſſigſaures Blei.

Digitized by Google

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (Br. *Sp.*)

℞. Lithargyri . . . . uncias sex.
Boli Armenae . . unciam unam.
Mastichis,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Aceti . . . . . libras duas.
Coque leni igne per horam dimidiam. — In Bähung angewendet.

Aqua vegeto-mineralis s. vegeto-mineralis Bellii, Solutio Plumbi Acetatis crystallisati fortior. (B*. RC.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Aceti boni . . . uncias quatuor.
Aquae destillatae . . libras duas.
RC. Acetat. Plumbi cryst. scrupulum, Aceti vel Acidi acetici diluti drachmam, Aquae dest. vel font. uncias quinque.

Injectio adstringens. (*Sa.*)

℞. Acetatis Plumbi . semidrachmam.
Aceti destillati . . libram unam.
Aquae Rosarum . sesquilibram.
Bei Mutterblutflüssen.

Fomentatio leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Camphorae, sing. . uncias duas.
Oxycrati . . . . . uncias sex.
Aquae frigidissimae . . . q. s.

Injectio aluminosa composita. (*Sy.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmam unam.
Aluminis . . semidrachmam.
Sulphatis Zinci grana octodecim.
Aquae destillatae uncias sedecim.
Ein schlechtes Präparat, welches man gegen Tripper empfohlen hat.

Collyrium tenqianum. (*Pie.*)

℞. Aceti Plumbi . grana quindecim.
Salis Ammoniaci . . grana tria.
Aquae Rosarum. . . uncias tres.

Aqua vulneraria camphorata. (Ham. Wür. *Pie. Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
destillatae . libram unam.
Alcoholis camphorati uncias duas.
Serva. (Ham.)

℞. Acetatis Plumbi . semidrachmam.
Camphorae in uncia una Alcoholis dissolutae . . uncias tres.
Adde sensim, vas agitando,
Aquae fontanae . libras quatuor.
Serva. (Wür. *Pie. Sp.*)

Lac virginale. (*Pie.*)

℞. Lithargyri . . unciam unciam.
Cerussae . . . . drachmas tres.
Camphorae . . scrupulos duos.
Dissolve in
Aceti albi . . . unciis duabus.
Solutioni adde
Aquae Solani,
— Lactucae,
— Nymphaeae,
sing. uncias tres.
Post aliquot dies sepositionis filtra.
Zum Waschen des Gesichts, drei oder vier Mal täglich.

Opiatum leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . semidrachmam.
Nitri . . . . . drachmas sex.
Conservae Cynorrhodi uncias duas.
Syrupi Capilli Veneris . . q. s.
Gegen Geilheit bei beiden Geschlechtern gepriesen. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends. Man kann auch Laudanum und Campher hinzusetzen.

Tinctura antiphthisica Gramanni. (B*. Wir.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Sulphatis Ferri drachmam unam.
Aceti,
Alcoholis, singulorum uncias duas.
Aquae Rosarum . drachmas sex.
Dissolve acetatem in aceto blandi ignis ope; adde sulphatem pulveratum et post solutionem liquori affunde alcohol cum Aqua Rosarum mixtum; stent blando calori sepositа
Von Gramann, Wedel, Vogel und Andern gegen die colliquativen Schweiße und Diarrhöen Schwindsüchtiger, auch gegen Tripper und nächtliche Pollutionen empfohlen — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen. — Mit Recht bemerkt Wir.: „caute tamen ubique, vel nunquam adhibendum esse, censemus.“

Protogallas Plumbi.

Dieses Salz wird nie eigens bereitet, sondern es bildet, wenigstens sehr wahrscheinlich, die Basis folgender beiden Präparate.

Magma scytodepsicum ex Quercu, Linimentum saturnino - quercicum. (B* *Au.*)

℞. Cort. Quercus pulverati
unciam unam
Aquae fontanae . . uncias sex.
Decoque ad dimidii remanentiam; in colaturam instilla
Extr. Saturni (circiter) semunciam.
Filtra liquorem et praecipitatum absque siccando sub alcohole serva. — Autenrieth rühmte diese Substanz bei'm Aufliegen.

Lotio Quercus saturnina s. adstringens. (*Au.*)

℞. Decocti Corticis Quercus,
Aquae saturninae, sing. uncias sex.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Liquoris Myrrhae . uncias duas.

Bei Excoriationen, welche den Brand drohen.

Proto-Oleo-Margaras Plumbi.

Dieser Name, unter welchem wir alle Pflaster vereinigen, in welchen eine innige Verbindung zwischen dem Protoxyd des Blei's und den sauren Producten, welche durch die Einwirkung der Grundbestandtheile fetter Körper mittelst der Wärme auf einander hervorgehen, stattfindet, ist nicht ganz genau. Denn in der That enthalten die meisten Pflaster, außer ölsaurem und fettsaurem noch stearsaures, einige capersaures, vielleicht auch buttersaures und einige endlich, schwefel- und essigsaures Blei Doch schien er uns wegen seiner Kürze und weil doch jene beiden Salze am häufigsten vorhanden sind, passend zu seyn

Man bereitet die Bleipflaster bald mit Bleiglätte, bald mit Mennige und bald mit Bleiweiß, weßhalb wir sie unter drei verschiedene Abtheilungen gebracht haben; zu irgend einer von ihnen haben wir auch diejenigen gesetzt, welche zwei und selbst drei dieser Bleizusammensetzungen enthalten. Zweckmäßig scheint es uns, zu erinnern, daß, nach Hagen, ein Theil Bleiweiß einen Theil, ein Theil Mennige anderthalb und ein Theil Bleiglätte zwei Theile Oel zu seiner Auflösung erfordert. Die Untersuchungen Henry's haben gelehrt, daß 1) in Bezug auf fette Körper, die von Natur schleimigen Oele oder die, welche es erst geworden sind, sehr schlüpfrige Pflaster geben; daß das Olivenöl vor allen den Vorzug verdient und daß das Schweinefett sich in dieser Hinsicht nur wenig von ihm unterscheidet; 2) in Bezug auf die Oxyde, daß die Mennige sich nur langsam und schlecht verbindet; daß das gelbe Bioxyd nur eine lockere Masse liefert; daß die Bleiglätte vor allen am meisten zu der Verfertigung von Pflastern paßt und daß endlich die Englische der Hamburger vorzuziehen ist.

§. III. Präparate mit dem Protoxyde des Blei's (Bleiglätte).

Diachylon simplex, Emplastrum commune s. Diachylum s. Diachylum simplex s. Lithargyri s. Lithargyrii simplex s. Oxydi Plumbi semivitrei s. Oxydi plumbici s. Plumbi, Emplastrum simplex, Ceratum Oxydi Plumbi semivitreum, Emplastrum Protoxydi Plumbi fusi s. simplex ex Protoxydo Plumbi fuso s. Protoxydi Plumbi.

1) *Emplastrum Diachylum simplex s. Oxydi Plumbi mucilagineum s. mucilaginosum.* (Br. His. His8. Li. Pal. Sar. Wir. Wür. *Sp.*)

℞. Mucilag. Foenu graeci,
— Seminum Lini,
— Rad. Althaeae, sing. libram.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.

Coque oleum et oxydum super leni igne, addendo subinde Aquae fontanae unciam unam ad duas et agita continue; tunc immissis mucilaginibus, coquere continua blando igne, donec massa consistentiam requisitam habeat. (Br. Sar. Wir. Wür. *Sp.*)

Pal. eandem formulam, sed Lithargyri solum sesquilibram indicat.

℞. Radicis Althaeae,
Seminum Lini, sing. semilibram.
Aquae . . . . . libras octo.

Infunde et tunc coque ad extrahendum mucilaginem, et cola exprimendo; deinde sume

Hujus mucilaginis . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.

Coque oleum una cum lithargyro, mucilaginem pedetentim addendo, ad emplastri consistentiam. (His. His8.)

℞. Empl. albi cocti,
— emollient, sing. libras duas.

Liqua blandissimo igne et sedulo misce. (Li.)

Dieses Pflaster ist ganz in Vergessenheit gekommen; man hat den Namen desselben aber vermöge eines sehr gewöhnlichen Mißbrauchs dem folgenden beigelegt, obgleich es, was doch sowohl das griechische als das lateinische Beiwort bezeichnet, kein Atom Schleim enthält.

2) *Emplastrum simplex s. Diachylon simplex s. Diachylon minus s. Plumbi s. Lithargyri simplex s. commune.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Du. Ed. Fenn Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R Sax. Suec. *Br. C. Ca. Fi. Gr Re. Sw. T. Vn.*)

℞. Lithargyri pulverati,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci, sing. part unam.

Calefac sensim, spatulae ope agitando; aquâ massae infusâ coque, continue agitando et pro aqua evaporata novam addendo, donec nullum lithargyri amplius vestigium animadverta-

tur; tunc ab igne remotum malaxa in Aqua frigida. (Gal. GalM. *Ca.*)

Ams. et B. Axungiae partes duas, Olei et Lithargyri, singulorum tres.

℞. Lithargyri . . . partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Fac ut antea. (A. Am. An. Bel. D. DD. Du. Ed. Fer. LP. R. *Br. C. Vm.*)

Su. Lithargyri partem unam et quatuor Olei; — Hass. HassP. Lithargyri quatuor et septem Olei; — Gen. Lithargyri quatuor et Olei duas cum dimidia; — *Sm.* Lithargyri duas et tres Olei; — LH. Lithargyri libras quinque, Olei novem; — Lon. LonN. Lus. *Gr. Re.* Lithargyri quinque et octo Olei (Aquae octarios duos, qui si coquendo sint consumpti, Aquae ferv. pauxillum est adjiciendum LonN.); — Fenn. Lithargyri quatuor et Olei tres; — Ba. Bor. Bor4. Du. Han. O. Sax. Suec. *Gr.* Lithargyri quinque et novem Olei (*Gr.* Aquae libras duas); — *Gr.* Lithargyri quinque, Olei decem pond.; — *T.* Olei quatuor, Aquae duas et Lithargyri tantidem; — *Fi.* Olei duas, Lithargyri et Aquae, sing. unam.

℞. Lithargyri . . . . partes sex.
Axungiae . . partes quindecim.

Eodem modo procede ut antea. (Pol. *Vm.*)

℞. Lithargyrii . . . . libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti destillati . . uncias sex.
Aquae communis quantum sufficit.

Lithargyrio cum aceto per horae quadrantem coctis adde oleum et tunc per vices aquam ut fiat emplastrum. (Pm.)

Dieſes Pflaſter, welches in der chirurgiſchen Praxis ſehr in Gebrauch iſt, dient beſonders, um Wunden und Geſchwüre, deren Oberfläche der Sitz einer nicht zu heftigen Entzündung iſt, gegen die äußere Luft zu ſchützen. Auch kommt es zu vielen andern Salben.

Cereoli exploratorii s. simplices, Candelae cereae s. probatoriae s. saturninae, Specilla cerea. (Li. *Gr. Re. Vm.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis q. libet.

Fascias linteas immerge calido et in cereolos forma. (*Gr.*)

℞. Emplastri simplicis uncias quatuor.
Liquato blando igne adde
Cerae . . . . . sesquiunciam
Olei Olivarum uncias (drachmas) tres.

In miscellam immerge fascias linteas apte concisas, quas in cereolos forma. (Li. *Gr. Re. Vm.*) (*Bell's bougies.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Cerae albae . . . partes octo.
Emplastri simplicis partes quatuor.

Fiant cereoli. (*Vm.*)

Ceratum saturninum. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis . partes sex.
Cerae albae . partem dimidiam.

Liquata seorsim misce et adde
Olei Olivarum part. duas c. dimid.

Emplastrum emolliens loco Emplastri de Althaea. (Pm.)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,
Olei Olivarum, utriusque libram unam.
Cerae albae . . uncias quatuor.
Sebi bovini . . . uncias octo.

Blando igne simul liqua et in tabellas effinge.

Sparadrapum pro fonticulis. (*Gr.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis libram.
Iridis Florentinae unciam unam.

Praeterea: Diachyli libras duas, Picis Burgundicae, Sarcocollae, sing. uncias quatuor, Terebinthinae communis unam. — Supra telas extende.

Sparadrapum Diachyli. (*Gr.*)

Emplastrum Diachylon supra telas extensum.

Emplastrum anodynum s. Sebi anodynum. (His. His8.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Cerae albae . . . uncias sex.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Sebi hircini . . . uncias duas.

Liqua simul. — Addendo Olei Olivarum uncias quatuor, habes: *Ceratum anodynum.*

Emplastrum epuloticum s. Oxydi Plumbi epuloticum. (His. His8.)

℞. Lithargyri,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci, sing. libras tres.

Coque cum Aquae q. s., continue agitando, donec massa non amplius digitis adhaereat; adde deinde
Cerae albae . . uncias novem.
Resinae Pini . . . uncias sex.

Coctionem ad emplastri consistentiam continua. — Dieſes Pflaſter unterſcheidet ſich kaum von dem einfachen. Mit Unrecht giebt ihm His. His8. den Namen *Empl. Diapalmae.*

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus s. epuloticus. (His. His8.)

℞. Emplastri epulotici . libras duas.
Cerae pallidae . . . semilibram.

Liqua et massam supra fascias linteas extende.

Unguentum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale s. ad varices ani. (Sar.)

℞. Rad. Scrophulariae rec. unc. tres.
Fol. Hyoscyami albi manip. tres.
Butyri recentis . . sesquilibram.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.

Coque lente radicem et folia in butyro ad humidi consumptionem, cola exprimendo, adde lithargyrum, agita bene ad perfectam refrigerationem usque et admisce denique vitellos.

Unguentum Cerae cum Aceto. (*Re.*)

℞. Cerae albae . . unciam unam.
Emplastri plumbici . uncias tres.
Olei Olivarum . . libram unam.
Acidi acetici diluti . uncias duas.

Misce secundum artem. — Bei Excoriationen und oberflächlichen Hautausschlägen.

Emplastrum anodynum Fulleri (*Re.*): Empl. Diachyli uncias quatuor, Ol. Olivar. drachm. tres, Terebinth. duas, Opii, Camph., Acetat. Plumbi, sing. scrupulos duos, misce ut f. emplastrum.

Emplastrum roborans s. Thuris s. adstringens. (Lon. *C. Gr. Sw.*)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Liquatis adde
Pulv. Sang. Draconis uncias tres.
— Olibani . . semilibram.

Misce bene.

Gr. praeterea: Emplastri Diachyli simplicis libras viginti octo, Olibani octo, Boli communis unam.

Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. Oxydi Plumbi fuscum s. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum s. Acetatis Plumbi carbonatum s. matris s. matris Theclae, Emplastrum fuscum s. fuscum Protoxydi Plumbi fusi. (A. An B*. Ba. Bel. Br. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. His. Li. Sax. Wir. Wür. *Br. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . partes 500.
Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini, sing. . part. 250.

Liqua et adde sensim
Lithargyri . . . . . part. 250.

Coque donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit; adde deinde mixturam fusam e
Cerae flavae . . . partibus 190.
Picis nigrae . . . partibus 80.

Effunde in modulos chartaceos (B*. Gal.)

GalM. butyrum omittit, duplloem Axungiae quantitatem adhibendo.

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini, sing. partem unam.

Coque et adde
Lithargyri . . . partem unam.

Coque, continue agitando, donec massa fusca sit reddita; adde deinde
Cerae flavae . . partem unam.

Post refrigerationem serva. (B*. Br. Sax. *Sp.*)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum, sing. libras duas.
Butyri recentis,
Cerae flavae, sing. libram unam.

Mixta calefac, donec in carbonem verti coeperint et adde
Lithargyri pulverati libram unam, spathulae ligneae ope continue agitando, donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit. (Am. Bel.)

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Cerae flavae,
Sebi vervecini, sing. unc. quatuor.
Olei Olivarum . semidrachmam.

Liqua corpora grassa super leni igne, adde lithargyrum, et coque continue agitando, donec emplastrum nigrum sit redditum. (Wür. *Sw. Vm.*)

Wir. Axungiae uncias quatuor, Butyri, Sebi vervecini, Cerae, sing. tantidem, Olei libram et Lithargyri uncias quatuor; — Gen His. et His3. Olei libram unam, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi hircini et Lithargyri, sing. semilibram; — *Br.* Olei uncias quindecim, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi vervecini et Lithargyri, sing. semilibram; — Li. Olei uncias sex, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi cervini et Lithargyri, sing. uncias sex.

℞. Axung. Porci uncias quatuordecim.
Sebi vervecini,
Cerae flavae,
Lithargyri pulv., sing.
unc. quatuor.

Coque, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (A.)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum, sing. uncias sex.
Cerae flavae . . . uncias duas.

Massae liquatae et bullienti sensim adde
Lithargyri pulverati uncias duas.

Coque, donec unguentum nigrum sit factum. (Ful.)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,
Axungiae Porci, sing. partes tres.
Cerae flavae . . partem unam.

Liqua, ignem ad nigrescentiam massae augendo. (*Vm.*)

℞. Empl. Diachyli simplicis
part. quatuordecim.
Coque, continue agitando, donec colorem fuscum acceperit; adde deinde
Picis nigrae . partem dimidiam.
Sebi vervecini . partem unam.
Serva. (Ba.)

℞. Emplastri Norimberg. partes octo.
Olei Olivarum . partes quinque.
Calefac, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (Han.)

Dieſe Salbe gilt für erweichend und zeitigend.

Emplastrum universale Waltheri. (*Dulk.*)

Emplastri fusci adhuc mollis libras cuique adde Aluminis usti, Succini praep., sing. drachmas tres.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo-plumbicum. (Suec.)

℞. Saponis Potassae duri et rasi
partes decem.
Olei Olivarum
partes quadraginta quinque.
Liqua saponem in oleo et adde
Pulv. Lithargyri partes octodecim
— Cerussae . partes novem.
Coque, donec massa colorem fuscum acceperit; adde
Terebinthinae communis
partem unam cum dimidia.

Emplastrum Salis Ammoniaci. (*Gr.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis
uncias duas.
Saponis albi . . unciam unam.
Salis Ammoniaci . semunciam.
Gegen weiße Geſchwülſte.

Emplastrum Diapalmae s. Diaphoenicon. (Br. Pal. Sar. Wir. *Pid. Sp. T. Vm.*)

℞. Olei Palmae . . . partes sex.
— Olivarum partes sexaginta sex.
Fol. teneror. Quercûs part octo.
Coque ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Litharg. pulv.
partes quadraginta octo.
Coque ad consistentiam emplastri, sensim addendo solutioni aquosae
Vitrioli albi . . . partes quatuor.
Serva. (*Sp.*)

Br. Sar. et Wir. Axungiae Porci, Olei Olivarum, Fol Quercûs, Lithargyri, sing. partes octo et unam Vitrioli albi in duodecim Aquae dissoluti; — Pal. Axungiae vetustae partes sex, Olei Palmae novem vel Olivarum q. vis, Lithargyri tantidem et Vitrioli albi in Aqua dissoluti unam.

℞. Lithargyri . . . libras duas.
Axungiae . . . . . libras tres.
Coque, sensim addendo
Aquae, cujus unciae sedecim Aluminis drachmam unam in solutione tenent quantum sufficit.
(*Pid.*)

℞. Olei Olivarum . partes novem.
Axungiae . . . . . partes sex.
Lithargyri . . . partes novem.
Zinci sulphurici . partem unam.
Fiat emplastrum. (*Vm.*)

Einfacher iſt folgende Formel von Soubeiran:

℞. Emplastri simpl. partes ter mille.
Sulphatis Zinci
partes centum viginti octo.
Liquefac emplastrum, adde sulphatem in Aqua dissolutam et igni modico, continue agitando, relinque, donec omnis humor evanuerit.

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Axungiae Porci . . uncias sex.
Ferri sulphurici c. Olei Olivarum q. s. in pultem redacti
unc. duas.
Fiant magdaleones. (*T.*)

Ein in ſehr gelindem Grade abſtringirendes Pflaſter, welches Sar. et *Sp.* unrichtig *E. Diachalciteos* nennen, da in letzterem ſtatt des weißen Vitriols rothcalcinirtes Schwefeleiſen oder Chalcit enthalten iſt.

Sparadrap, Sparadrapus s. Sparadrapum album, Tela Gualthieri s. Gualteri. (GalM. Wir. *Gr. Sp.*)

℞. Empl. Diapalmae,
— simpl., sing. . libram unam.
— albi cocti . . semilibram.
Liquatis adde
Pulv. Iridis Flor. sesquiunciam.
Massam supra fascias linteas extendo. (Wir. *Sp.*)

℞. Empl. simplicis,
— Diachyli gumm., sing.
part. quindecim.
Cerae flavae . partes quinque.
Terebinthinae . . partes tres.
Liqua in balneo aquae, tunc supra linteum extende (GalM.)

Gr. Olei Olivarum semilibram, Sevi ovilli uncias quatuor, Cerae decem, Lithargyri, Terebinthinae communis, Thuris, Mastiches, sing. duas, Boli Armenae, Farinae Tritici, sing. unam, liquefacta et mixta adhuc calida extende etc.

Emplastrum confortativum Vigonis s. defensivum rubrum s. Ferri s. Oxydi Plumbi rubrum (*Vigonis*) *s. Oxydi Plumbi semivitrei cum Sulphate Ferri calcinato s. Oxydi Ferri rubri s. sticticum s. roborans s. stypticum s. Paracelsi s. Siliquarum s. Thuris.* (B. Br.

Du. Ed. Fer. GalH. His. His3. Pal. Sar. Wir. *C. Fi. Gr. Re. Sp. T. Vm*)
℞. Pulv. Lithargyri,
— Minii,
— Calaminae, sing. semilibram.
Olei Lini,
— Olivarum, sing. . libr. unam.
Coque igne blandissimo, continue agitando et adde sensim Aquae libram unam in solutione tenentem
Vitrioli albi . . unciam unam.
Emplastro consistentiam requisitam obtento adde
Colophonii,
Cerae flavae, sing. libram unam.
Terebinthinae,
Olei Bacc. Lauri, sing. semilibram.
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aloës hepaticae,
Aristolochiae longae,
Sanguinis Draconis,
Haematitis, sing. unciam unam.
Misce bene. (Br. Pal. Wir.)
℞. Olei Olivarum . . . uncias sex.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Lithargyri uncias quatuor c. dimid.
Gummi Ammoniaci,
Bdellii, sing. . . . semunciam.
Galbani . . . . . uncias sex.
Opopanacis,
Olei laurini,
Lapidis calaminaris,
Aristolochiae longae,
— rotundae,
Myrrhae,
Olibani, sing. . . drachmas duas.
Terebinthinae Chiae . unciam.
Misce. (*Gr. Re.*)
Praeterea: Diachyli simpl. libras viginti octo, Diachyli cum Gummi duas, Canellae albae, Olibani, sing. libram unam et uncias octo.
℞. Lithargyri,
Minii,
Olei Lini,
— Olivar., sing. unc. duodecim.
Coque ad consistentiam emplastri, Aquam addendo in solutione tenentem
Vitrioli albi . . uncias quatuor.
Coctione finita adde
Colophonii,
Cerae, sing. unc viginti quatuor
Terebinthinae uncias duodecim.
assa colatâ colaturae adde
MPulv. Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Bdellii,
— Myrrhae,
— Aloës hepaticae,
— Mumiae,
Pulv. Rad. Aristolochiae longae,
— Sanguinis Draconis,
— Haematitis, sing. unc. duas.
Olei Bacc. Lauri unc. duodecim.
Misce bene. (*Sp.*)
℞. Mucilag. Rad. Consolidae maj. libr. sex.
Olei Juglandis . libras quatuor.
Minii,
Lithargyri, sing. . libram unam.
Calaminae . . uncias quatuor.
Sanguinis Draconis,
Colcothar,
Aluminis, singulorum unciam unam.
Rad. Aristoloch. rot. sesquiunciam.
Coque minium, lithargyrum et calaminam cum oleo, mucilaginem sensim addendo et reliqua pulverata cum massa parumper refrigerata commisce. (Sar.)
℞. Mucilag. Rad. Althaeae,
— — Consolidae maj.,
Olei Myrrhae, sing. libras duas.
Sebi hircini,
Lithargyri praep., sing libr. unam.
Minii . . . . . uncias sex.
Terebinthinae,
Mastichis,
Boli Armenae, sing. unc. quatuor.
Coque oxyda cum mucilaginibus, sebo et oleo; adde deinde terebinthinam, bolum et denique mastichem. (Sar.)
℞. Rad. et Fol. Consolidae maj.,
Baccarum Myrti,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Summit. Hyperici, sing. unc. quatuor.
Aquae . . . . libras novem.
Coque ad tertiae partis usque consumptionem; tunc sume
Olei Olivarum . libras quatuor.
Sebi hircini . . . libram unam.
Lithargyri . . . . libras duas.
Coque ad consist. emplastri, sensim addendo decoctum praemonitum, tunc in massa liqua
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Post sufficientem decoctionem emplastro semirefrigerato adde mixturam e
Pulv. Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis, sing. unc. duabus.
— Sang. Draconis unc. tribus.
— Boli Arm. . unc. quatuor.
— Minii . . . . unciis sex.
Misce bene. (His. His3.)
℞. Resinae Pini,
Colophonii, sing. uncias quatuor.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Massae liquatae et colatae adde

Extr. Siliquarum dulc. ad mellis consist. redacti . libr. unam.
Mellis optimi . . . uncias duas.
Emplastri Minii uncias quatuor.
Ferri subcarb. porphyr. drach. sex.
Misce bene. (His. His3.)

℞. Lithargyri . uncias duodecim.
Olei Olivarum unc. viginti quatuor.
Coque ad consist. emplastri, tunc in massa liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae Venetae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Liquatis adde
Colcothar . . . . uncias tres.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. partem unam.
Liquatis adde
Emplastri simplicis partes sedecim.
Momento quo refrigescunt adde
Terebinthinae . . partem unam, tritae calide cum
Colcothar loti parte una c. dim.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Resinae Pini . . . semilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum, sing. uncias tres.
Colcothar . . . . uncias octo.
Oxydum cum oleo tritum adde reliquis leni igne liquefactis. (B.)

Ed. *C. Fl. Gr.* Emplastri simpl. partes viginti quatuor (sex *Gr.*), Resinae Pini sex, Cerae flavae tres, Olei tantidem et Oxydi Ferri octo; — *T.* Diachyli simpl. uncias sedecim, Olei Olivarum duas, Resinae Pini quatuor, Cerae flavae duas et Colcothar quinque et scrupulos octo.

℞. Emplastri simplicis,
— Diachyli gummosi,
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
Colcothar, sing. partes aequales.
Oxydum cum olei pauxillo porphyrisa et reliquis substantiis fusis adde. (GalH.)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Olibani . . . . . semilibram.
Liquatis adde
Oxydi Ferri rubri . uncias tres.
Agitando bene misce. (Du. *Gr. Re.*)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Sebi vervecini . uncias sedecim.
Liquatis adde
Colcothar . . . . uncias duas.
Misce sedulo. (Fer.)

Ceratum Diapalmae. (LP.)

℞. Emplastri communis libram unam.
Oxydi Ferri rubri per Acidum sulphuricum . . . uncias duas.
Sanguinis Draconis unciam unam.
Olei communis . uncias quinque.
Fiat lege artis ceratum.

Emplastrum imperiale s. Siliquarum imperiale. (His. His3.)

℞. Emplastri Picis nigrae,
— Minii,
— Collae ad herniam (His.), sing. uncias quatuor.
— Resinae Guillermi servitoris,
— Siliquarum (formula His.), singulorum uncias duas.
Oxydi Ferri rubri . semunciam.
Acetatis Plumbi neutralis,
Camphorae pulv., sing. drach. duas.
Liqua emplastra blando igne et massae antequam refrixerit, adde reliqua pulverata et mixta.

Dieſes Gemiſch unterſcheidet ſich hinſichtlich der Wirkung nur wenig von dem emplast. defensiv. rubrum.

Emplastrum Collae ad herniam s. contra rupturam de pelle s. Opodeldoc s. resolvens Raistingii. (His. His3. Wir. *Bo. Pic.*)

℞. Lithargyri . . . . libras duas.
Olei Olivarum libr. duas c. dim.
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae de Chio,
Olei Bacc. Lauri, sing. unc. quatuor.
Opopanacis unc. duas c. dimidia.
Bdellii,
Gummi Ammoniaci,
Sarcocollae,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Aloës Socotrinae unciam unam.
Radicis Aristolochiae uncias duas.
Camphorae . . . uncias tres.
Fiat emplastrum. (*Bo. Pic.*)

℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . libras duas.
Coque leni igne, sensim addendo
Aceti,
Aquae font., sing. unc. quatuor, donec massa colorem clare fuscum obtinuerit. Adde
Cerae flavae . . . semilibram.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Post refrigerationem adde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consistentiam redactam e
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, singulorum uncia una.
Admisce deinde

Pulv. Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Calaminae,
— Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis, sing. unciam unam.
Olei Bacc. Lauri sesquiunciam.
Agita ad perf. usque refrigerationem. (Wir.)

℞. Baccarum Myrti contusarum,
Lumbricorum cum Vino lotorum,
singulorum uncias sex.
Aquae (Ferrariae His.) libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam; tunc sume
Hujus decocti . . . libras tres.
Olei Olivarum . . libras duas.
Lithargyri . . . libram unam.
Coque ad consumptionem humidi usque et ad emplastri consist.; adde deinde mixturam liquatam et colatam e
Cerae flavae . . . . libra una.
Picis nigrae,
Resinae Pini,
Colophonii, sing. . unciis novem.
Adde deinde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consist. inspiss. e
Galbani,
G. Ammoniaci, sing.
unciis quatuor.
Emplastro semirefrigerato admisce sensim mixturam e
Pulv. Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Sanguinis Hirci,
— Collae, singulorum
unciis quatuor.
— Rad. Aristolochiae rotund.,
— — — longae,
— — Consolidae majoris,
— — — minoris,
— Gallarum,
— Boli Armenae,
— Gypsi,
— Mumiae, sing. unciis tribus.
Misce bene. (His. His.)

Dieſe unförmliche Miſchung, mit welcher einige der Formeln des empl. defens. rubrum Aehnlichkeit haben, wurde als ſchmelzend, auflöſend, die Vernarbung befördernd und abſtringirend betrachtet.

Emplastrum pro fracturis dictum. (Pm.)

℞. Empl. Diachylon simpl. libr. duas c. dim.
Cerae flavae . . uncias quinque.
Terebinthinae . uncias quinque.
Sarcocollae subtiliter pulveratae,
Sanguinis Draconis, sing.
uncias duas.
Olibani,
Myrrhae,
Masticis, sing. . unciam unam.
Misce fiat lege artis emplastrum.

Unguentum Apostolorum s. dodecapharmacum s. viride. (Br. Pal. Wir. *Pic. Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae flavae, sing. uncias duas.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii,
Myrrhae,
Galbani, singulorum semunciam.
Opopanacis,
Aeruginis, sing. drachmas duas.
Lithargyri . . . unciam unam.
Olei Olivarum . . libras tres.
Coque oleum cum lithargyro super igne blando, infundendo sensim Aceti albi uncias duas; adde deinde ceram liquatam cum resina, tunc massâ paullo refrigeratâ, terebinthinam et denique reliquas substantias pulveratas et mixtas. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae albae,
Gummi Ammoniaci, singulorum
drachmas quatuordecim.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii, singulorum drachmas sex.
Galbani,
Myrrhae, sing. drachmas quatuor.
Opopanacis,
Aeruginis, sing. drachmas duas.
Lithargyri . . drachmas novem.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Fac ut supra. (Pal.)

Pic. Terebinthinae, Gummi Ammoniaci, Resinae Pini, sing. drachmas decem, Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Lithargyri drachmas novem, Aristolochiae rot., Olibani, Bdellii, sing. unciam, Myrrhae, Galbani, sing. semunciam, Opopanacis, Aeruginis, sing. drachmas duas et Olei Olivarum sesquilibram.

Dieſe Salbe, jetzt mit Recht vergeſſen, galt ehedem für austrocknend, brandſtillend und die Vernarbung befördernd.

Emplastrum divinum. (Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Aeruginis . . . partem unam.
Emplastri simpl., part. triginta sex.
Massam tam diu igni superimpositam tene, donec rubescat; adde deinde
Empl. Diachyli gumm. part. sex.
Resinae Pini . . . partes duas.
Myrrhae . part. unam c. dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . uncias sedecim.
Olei Olivarum uncias triginta duas.
Aeruginis . . . unciam unam.
Coque et adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Galbani,
— Myrrhae,
— Bdellii, sing. uncias duas.
— Gummi Ammoniaci uncias tres.
— Olibani,
— Opopanacis,
— Mastichis,
— Radicis Aristolochiae rotundae, singulorum unciam unam.
— Magnetis . sesquiunciam
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . libras tres.
Emplastro adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Magnetis . semilibram.
— Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Opopanacis,
— Bdellii, sing. . uncias tres.
— Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Aeruginis,
— Aristoloch. rot., sing. sesquiunciam.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Misce sedulo. (Wir.)

Emplastrum Ranarum simplex s. de Ranis sine Mercurio s. Vigonis sine Mercurio. (His. His3. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Olei Chamomillae,
— Anethi,
— Lilii albi, sing. uncias duas.
Adipis vitulinae . . semilibram.
Ranas . . . . . no. 6.
Lumbricor. lot. libr. tres c. dimid.
Dec. Rad. Ebuli,
— — Inulae, sing. unc. duas.
Coque ad humidi disparitionem et tunc coque colaturam cum
Lithargyri . . . . libra una.
Massae emplasticae adde
Pulv. Euphorbii drach. quinque.
— Olibani . drachmas decem.
— Schoenanthi,
— Stoechadis,
— Matricariae, sing. semunciam
Terebinthinae clarae uncias duas.
Styracis liquidae . sesquiunciam.
Adipis viperinae unc. duas c. dim.
Olei Lavandulae . uncias duas.
— Lini . . . sesquiunciam.
Misce bene. (Pal.)

℞. Ranas viventes . . . . no. 10.
Lumbricorum viv. unc. quatuor.
Herbae Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Matricariae, sing. . semunciam.
Radicis Inulae,
— Ebuli, sing. . uncias tres.
Vini albi . . . . libras duas.
Aceti boni . . . sesquilibram.
Coque lente ad dimidii usque remanentium, cola et colaturae sensim adde massam emplasticam liquatam de
Olei Olivarum,
Lithargyri pulv., sing. libra una.
Emplastrum ab igne removens adde
Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae,
Cerae flavae, sing. uncias duas.
Pulv Olibani . . drachmas sex.
— Euphorbii drach. quinque.
Styracis liquidae,
Croci, singulorum . semunciam.
Misce bene. (Wir. *Sp.*)

℞. Ranas viventes . . no. 80. (40.).
Rad. rec. Ebuli,
— — Bardanae, sing. sesquilibram.
Aceti . . . . . libras tres.
Aquae . . . . libras novem.
Macera per dies duos, coque deinde ad dimidii consumptionem et cola; tunc sume
Colaturae . . . libras quinque.
Olei Olivarum . libras novem.
Coque ad humidi consumptionem, ab igne remove et adde
Axungiae Porci . . libras tres.
Lithargyri pulverati . libras sex.
Decocti praemoniti . . . q. s.
Coque, donec massa digitis adhaerere cessaverit; adde deinde
Cerae flavae . . . libras tres.
Terebinthinae . . uncias duas.
Massae fere refrigeratae adde
Pulveris Euphorbii unciam unam.
Misce sedulo. (His. His3.)

Dieſes ſo berühmte Pflaſter kennt man heutzutage faſt nur noch dem Namen nach. Es iſt noch complicirter als das alte Diachylonpflaſter, unterſcheidet ſich aber von demſelben nur durch eine etwas ſtärker reizende Wirkung.

Emplastrum Oxydi Plumbi Diabotanum s resolutivum s. Diabotanum Blondelli. (His. His3. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Rad. et Herb. rec. Bardanae,
— — — Chamaepityos,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Inulae,
— — — Aristolochiae rotundae,

Digitized by Google

Herb. et Rad. rec. Raphani rust.,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Panis porcini,
— — — Chelidonii
min., sing. libr. quatuor.
Succi Cicutae,
— Hormini,
— Chelidonii maj., sing.
lib. quatuor.
Lithargyri praep. libr. duas c. dim.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Cerae flavae,
Terebinthinae,
Colophonii,
Tacamahacae,
Sulphuris, sing. . libram unam.
Asphalti,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias sex.
Euphorbii,
Camphorae, sing. . sesquiunciam.
Olei ess. Caryophyll. semunciam.

Contunde herbas et radices mundatas, infunde succos, et per duos dies macera, tunc ad dimidii consumptionem coque; cola exprimendo, colaturam cum oleo et lithargyro, continue agitando, ad aptam consist. coque, adde ceram, colophonium et terebinthinam, tunc tacamahacam, mastichem et euphorbium, denique post refrigerationem emplastri, reliquas substantias pulveratas et cum oleo caryophyllorum tritas. (Sar.)

℞. Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti boni . . quantum sufficit.

Coque ad consist. emplastri, sub finem addendo mixturam liquatam e
Succi inspissati Cicutae,
— — Chelidonii maj., sing.
unc. duabus.
— — Elaterii uncia una.
Extr. Rad. Inulae,
— — Valerianae, sing.
semuncia.

Coque denuo per aliquot momenta et adde tunc mixturam fusam et colatam e
Cerae flavae,
Picis nigrae,
Terebinthinae, sing. . semilibra.
Styracis liquidae . unciis tribus.

Massae fere refrigeratae admisce
Pulv. Gummi Ammoniaci,
— Galbani, sing. uncias tres.
— Olibani . . . uncias duas.
— Mastichis,
— Tacamahacae, sing.
unc. unam.
— Baccarum Lauri,
Pulv. Radicis Iridis,
— Hellebori nigri,
— Sem. Cumini, sing.
drach. sex.
Olei Olivarum (Laterum His3)
uncias tres.
Camphorae in Oleo solut.
semunciam.

Misce bene. (His. His3.)

℞. Herb. et Rad. rec. Bardanae,
— — — Petasitidis,
— — — Calendulae,
— — — Chamaepityos,
— — — Levistici,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Cicutae,
— — — Inulae,
— — — Armoraciae,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Sedi minoris,
— — — Chelidonii maj.,
— — — Chelidonii min.,
— — Gratiolae, sing.
unc. tres.
Aquae . . . . libras viginti.

Coque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et adde colaturae
Succi Cicutae,
— Chelidonii majoris,
— Hormini, sing. libras duas.
— Sedi minoris semilibram.

Consume ad extracti mollioris usque consistentiam; tunc recipe
Hujus extracti . . semilibram.
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, sing. unc. quatuor (duas).
in Aceto scillitico dissoluta et ad extracti consist. evaporata; tunc recipe
Lithargyri pulverati libram unam.
Olei Lumbricorum,
— Catellorum,
— Meliloti,
— Mucilaginis, sing.
unc. quatuor.
Aquae fontanae . uncias decem.

Coque ad consistentiam emplastri, cui adde sensim extractum cum gummatibus mixtum et
Flor. Sulphuris
unc. septem c. dimid.
Pulv. Rad. Iridis Florentinae,
— — Panis porcini,
— — Ranunculi tuberosi,
— — Coronae imperialis,
— — Serpentariae,
— — Hellebori albi, sing.
drachm. tres.
— — Sigilli Salomonis,
— — Ari, sing. semunciam.

Pulv. Rad. Aristolochiae longae,
— — — rotundae,
— — Clematitis, sing. drachm. unam.
Baccarum Lauri drachmas duas.
Semin. Angelicae,
— Nasturtii, sing. drach. tres.
— Cumini . . sesquiunciam.
Fimi columbini . . semunciam.
Pulv. Asphalti,
— Olibani,
— Mastichis, sing. uncias quatuor.
— Tacamahacae . uncias sex.
— Bdellii,
— Myrrhae, sing. sesquiunciam.
Adde deinde sensim mixturam liquatam e
Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. . semilibra.
Adjice denique
Styracis liquidae . . uncias sex.
Camphorae in Olei ess. Caryophyll. semuncia solutae drach. sex.
Olei lateritii . drachmas decem.
Serva. (Wir. *Sp.*)

Dieſes Ungeheuer von Zuſammenſetzung, welches ſeinen Namen der großen Menge Pflanzen, welche mit dazukommen, verdankte und ehedem dem empl. Vigonis gleichgeachtet, ja ihm von Manchen noch vorgezogen wurde, galt als ſchmelzend und auflöſend, iſt aber heutzutage vielleicht höchſtens nur in Spanien in Gebrauch.

§. II. Mit dem Deutoxyd des Blei's (Mennige) bereitet.

Unguentum magistrale s. de Minio s. Oxydi Plumbi rubrum. (His. HisS.)

℞. Minii . . . . uncias quinque.
Cerussae,
Lithargyri, sing. . sesquiunciam.
Olei Rosarum . . sesquilibram.
Coque parumper, continue agitando et adde
Cerae albae . . uncias quatuor.
Agita ad perf. refrigerationem usque.

Emplastrum resolvens opiaceum. (*Br.*)

℞. Olei Lini . . . . libras duas.
Minii,
Cerussae,
Cerae flavae, sing. . uncias octo.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Opii pulverati . . unciam unam.

Bei anfangenden ſcirrhöſen Geſchwülſten. — Man legt täglich ein neues auf.

Emplastrum Oxydi Plumbi rubri camphoratum, Emplastrum s. Ceratum Noribergense s. Noricum s. triphármacum s. Minii adustum s. Minii camphoratum s. Matris. (B*. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Sar. Sax. Wir. *Ca. Fi. Sp. Vm.*)

℞. Minii pulverati . . uncias octo.
Olei Olivarum . . libram unam.
Coque, continue agitando, donec massa coloris fusci prodeat, cui semirefrigeratae adde
Cerae flavae . . sesquiunciam et post hujus liquationem
Camphorae cum Olei pauxillo tritae drachmas duas.
Misce bene. (Han.)

HassP. Picis solidae semunciam addit; — Bor4. Olei uncias sedecim, Cerae quatuor et Camphoram in Spiritu Vini rectificatiss. solutam, caeterum ut Han.; — *Sp.* Minii uncias duodecim, Olei Rosarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas duas; — *Vm.* Minii uncias sedecim, Olei Olivarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas tres; — *Ca.* Olei Olivarum libram, uncias tres et drachmam unam, Minii uncias quatuor et drachmas tres, Cerae libram et Camphorae drachmas sex; — Gal. Olei partes sexcentas, Minii trecentas, Cerae quingentas et Camphorae viginti quatuor; — Hae duae supremo loco nominatae pharmacopoeae inter coctionem Oleo et Oxydo certam Aquae quantitatem addere jubent; — *Fi.* Minii uncias quinque cum Aquae comm. unciis sex et Olei Olivarum decem ad eam consist. coquere ut massa digitis non amplius adhaereat et tunc addere Cerae flavae uncias octo, Camphorae drachmas tres et Minii unciam unam.

℞. Minii . . . . . libram unam.
Olei Napi . . . . libras duas.
Coque, continue agitando, donec emplastrum colorem fuscum acquisiverit et adde
Camphorae c. Alcohole tritae drachmas duas.
Misce bene. (B*. Sax.) — Dieſe Formel iſt von Trommsdorf.

℞. Minii . . . . . uncias octo.
Aceti . . . . uncias quatuor.
Olei Rosarum . . libram unam.
Coque ad consistentiam emplastri mollis et adde
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Misce sedulo. (Sar. Wir.)

D. Minii libram unam, Aceti semilibram, Olei libras duas, Cerae sesquiunciam et Camphorae drachmas duas; — B*. et Br. Minii, Aceti, sing. li-

bram unam, Olei duas, et Camphorae sesquiunciam absque cera.

Dieſes Pflaſter wird als lindernd und ſchützend betrachtet. Man wendet es beſonders an, um die Vernarbung nicht ſehr ausgebreiteter Geſchwüre zu beſchleunigen und Theile, auf welche durch langes Liegen im Bette Druck gewirkt hat, vor der Reizung zu bewahren.

Emplastrum camphoratum Stahlii. (*Sp.*)

℞. Olei Olivarum uncias duodecim.
Minii . . . . . uncias octo.
Coque ad constistentiam requisitam et adde massae refrigeratae
Camphorae in Olei pauxillo dissolutae . . . . . uncias duas.

Dieſes Pflaſter iſt einfacher als das vorige und ihm vorzuziehen.

Emplastrum Porri. (*Bo*)

℞. Minii . . . . . libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Succi Porri . . . . libras sex.
Coque ad consistentiam requisitam et adde
Cerae flavae . . . libram unam.
Saponis albi . . . libras duas.
Agita ad refrigerationem usque.

Emplastrum anglo-saxonicum. (B*.)

℞. Cerae albae,
Minii, sing. . . . libram unam.
Pulv. Succini,
— Camphorae,
— Aluminis usti, sing. drachm. duas.
Olei Olivarum . . libram unam.
Coque oleum, donec colorem fuscorubrum acquisiverit, adde deinde minium, coquendo continua, et simulac massa consist. emplastri acquisiverit, adde succinum et post refrigerationem, camphoram et alumen.

Zum Verbinden übelriechender Geſchwüre.

Emplastrum mammillare. (Pal.)

℞. Emplastri Minii,
— Mucilaginis,
Pulveris Minii,
— Lithargyri, sing. semunciam.
Olei Liliorum,
— Ovorum,
— Elaterii,
— Sesami,
Butyri recentis,
Cetacei, sing. . . unciam unam.
Camphorae . . . . semunciam.

Auflöſend gegen Anſchwellungen der Brüſte bei Stillenden und um das Aufſpringen der Bruſtwarzen zu verhüten.

Emplastrum de Doyen. (*Ca.*)

℞. Minii,
Olei Hyperici, sing. libram unam.
Resinae Pini . . uncias quatuor.
Olibani . . . . . uncias duas.
Saponis albi . . . semunciam.

Emplastrum antiarthriticum. (Wir.)

℞. Olei Semin. Hyoscyami,
— — Papaveris,
— — Lini, sing. unc quatuor,
Minii . . . . . libram unam.
Aquae Sambuci . . semilibram.
Coque lente ad consist. emplastri et adde
Saponis Veneti . . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.

Ehedem auf ſchmerzhafte und von Krämpfen ergriffene Theile empfohlen.

Emplastrum miraculosum. (Wir)

℞. Minii,
Lithargyri, sing. . . semilibram.
Cerussae . . . . libras duas.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Coque leni igne et adde
Saponis Veneti rasp. unc. quatuor.
Massae ad emplastri aliquanto duri consistentiam redactae adde
Pulv. Baccar. Lauri semunciam.
— Camphorae unciam unam.

Es wurde ehedem, wie auch der Name anzeigt, als ein vortreffliches Mittel gegen alte Geſchwüre und ſelbſt friſche Wunden betrachtet. Es unterſcheidet ſich nicht bedeutend von dem folgenden.

Emplastrum Oxydi Plumbi saponaceum s saponaceum de Barbette. (Br. His. His3. Pal. Wir.)

℞. Minii,
Cerussae, sing. . uncias quatuor.
Olei Rosarum . . libram unam.
Coque, continuo agitando et Aquae fontanae uncias aliquot affundendo, ad emplastri consist.; massae deinde ingere
Saponis Veneti rasi uncias quatuor et his solutis
Camphor. c. Alcohole trit. semunciam.
Misce. (Br. Pal. Wir.)

His. His3. Miscere Minii uncias duodecim et sex Cerussae cum Olei unciis triginta duobus, addere Saponis in Aquae q. s. dissoluti uncias tres, miscellam subigendo in linimenti formam redigere, coquere blando igne, continue agitando et subinde Aquae pauxillum affundendo, humidum deinde omne consumere, addere Cerae sesquiunciam et

semirefrigeratis adjicere Camphorae unciam unam.

Die Alten hielten es für ſchmelzend, auflöſend, ſchmerzſtillend und Kindern auf den Bauch gelegt, für gelind abführend.

Emplastrum balsamicum (B*.)

℞. Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis Veneti,
Minii,
Cerussae, sing. . libram unam.
Castorei . . . . sesquiunciam.
Camphorae. . . . uncias tres.

Dieſes anfangs geheime Pflaſter, für deſſen Mittheilung Catharina II. 30.000 Rubel bezahlte, wurde bei Migräne, Blindheit, Taubheit, Rheumatismus, Zahnſchmerz, Kropf, Lähmung, Anſchwellung der Brüſte, Geſichtskrebs und in einer Menge anderer Krankheiten empfohlen, doch verdiente es keine ſolche Anpreiſung.

§. III. Mit kohlenſäuerlichem Blei (Bleiweiß) bereitet.

Emplastrum Cerussae s. album coctum s. Subcarbonatis Plumbi s. cum Subcarbonate Protoxydi Plumbi s. cum Cerussa s. griseum coctum. (B*. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Sm. Sp Sw. T.*)

℞. Cerussae porphyr partes quatuor.
Olei Olivarum . . partes tres.

Coque continue agitando et subinde Aquam calidam affundundo, donec cerussa sit liquata. (*Sp.*)

Ba. Li. et Sax. Cerussae partes duas et unam Olei; — *Vm.* Cerussae et Olei sing. unam; — HassP. Olei libras quatuor cum dimidia, Cerussae octo; — Pol. Cerussae novem et sex Axungiae Porci.

℞. Cerussae porphyr. partem unam.
Olei Olivarum partes duodecim.

Coque, continue agitando et Aquam pedetentim addendo ad consist. emplastri et adde

Cerae albae . . . partes tres.

Post refrigerationem serva. (*Sw.*)

B*. Bor. Han. et O. Cerussae partes octo, Cerae unam et Olei quatuor cum dimidia; — Wür. Cerussae octo, Cerae quatuor et unam Olei; — Br. Pal. et Wir. Cerussae octo, Cerae unam et sex Olei; — D. Cerussae octo, Cerae unam et quatuor Olei; — Sar. Cerussae quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Ful. Cerussae duodecim, Cerae unam et decem Olei; — *Vm.* Cerussae quatuor, Cerae unam et Olei sex.

℞. Cerussae . . . . partem unam.
Lithargyri . . . . partes duas.
Olei Olivarum . partes quatuor.

Coque cum Aquae q. s. et adde

Cerae albae liquatae partem unam.

Misce bene. (*Vm.*)

Bor4. Lithargyri libram unam, Olei Olivarum quatuor cum dimidia, coque instillando sensim modicam Aquae communis calidae copiam, et post solutionem lithargyri adde Cerussae pulveratae libras septem, coque Aquam addendo, donec fiat emplastrum; — Pm. Cerussae libras duas, Lithargyri unam, Olei Olivarum duas, Aquae font. q. s., ut s. a. fiat emplastrum; — *Fi. T.* Olei, Cerussae, sing. libram unam, Emplastri Diachyli simpl., Cerae albae, sing. uncias sex, Aceti albi libram unam.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum . partem dimidiam.

Leni igne mollefactis adde

Cerussae pulveratae partem unam et agita ad refrigerationem usque. (Bel.)

Dieſes Pflaſter wird als austrocknend und lindernd betrachtet.

Emplastrum de Spermate Ranarum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Spermatis Ranarum,
Olei Olivarum, sing. libras tres.
Cerussae libr. quatuor c. dimid.
Cerae albae . . . libram unam.
Aluminis . . . uncias quatuor.
Terebinthinae . drachmas duas.
Camphorae . . unciam unam.

Fiat emplastrum. (Pal.)

℞. Olei Spermatis Ranarum,
Cerussae, sing. . libras quinque.

Coque ad Cerussae solutionem usque, Aquam et Acetum sensim addendo, ne massa urat; ab igne remotae adde

Aluminis crudi . uncias quinque.
Camphorae c. Alcohole trituratae unciam unam.

Misce bene triturando. (Wir.)

Sp. Olei Spermatis Ranarum partes sexaginta, Cerussae octodecim, Aluminis sex et duas Camphorae.

Dieſes Pflaſter unterſcheidet ſich von dem vorhergehenden hinſichtlich der Wirkung, welche eben ſo wenig kräftig iſt, nur wenig; auch iſt es mit Recht ganz in Vergeſſenheit gekommen.

Emplastrum Plumbi Subcarbonatis (*Cerussae*) *compositum.* (Am. *C.*)

℞. Cerussae . . . . libram unam.
Olei Olivarum . octarios duos.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Empl. Diachyli simpl. sesquilibram.

Iridis pulveratae . uncias novem.
Coque oleum et plumbum in Aquae pauxillo, continue agitando ad perfectam usque mixtionem; adde ceram et emplastrum et his liquatis, bene agitando, pulverem.

Ceratum Cerussae compositum. (Am. C.)

℞. Empl. Cerussae compositi part. quinque.
Olei Olivarum . . partem unam.
Liqua emplastrum et adde oleum, agitando donec massa refrixerit.

Unguentum Bicour. (Ca.)

℞. Olei rosati . . uncias duodecim.
Cerae albae . . . uncias octo.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Adde in fine coctionis
Bals. Peruviani liq. . semunciam.
Bei ſchmerzloſen Geſchwülſten empfohlen.

Emplastrum benedictum s. Carbonatis Plumbi ustum. (His. His3. Pal.)

℞. Olei Olivarum . . sesquilibram.
Rad. Calami . . unciam unam.
— Iridis,
— Althaeae, sing. . drach. sex.
Oleo coquere incipienti adde radices mundatas et concisas, coque donec liquidum nigrescat et deinde ab igne remoto adde
Cerussae . . . . semunciam.
Tutiae praeparatae drachmas sex.
Coque denuo ad emplastri consistentiam usque et adde
Cerae flavae . . . semunciam.
Balsami Peruv. nigri sesquidrachmam.
Misce bene. (Pal.)
His. His3. Olei libras tres, Radicis Althaeae, Arundinis, sing. uncias duas, Radicis Iridis tres, sex Cerussae et Tutiae tres, Cerae flavae uncias quatuor et Balsami semunciam.

Pocgereba.

Cortex Pocgereba; Pocgerebarinde; Pocgereba (*Gal.*).
Br. *Gr.*
Eine Americaniſche Rinde in gerollten Stücken von der Dicke einer Gänſefeder bis zu der eines Fingers, hart, derb, feſt, gerade oder krumm, äußerlich runzlig und dunkelbraun inwendig braun, geruchlos, von ſchwachem adſtringirendem Geſchmack.
Bei Ruhr in Gebrauch.

Podophyllum.

Podophyllum peltatum (pedatum), *Willd.*; Mayapfel; Podophylle (*Gal.*); May apple (*Ang.*).
Am. C.
4. (Polyandria Polygynia, L.; Podophyllaceae, J.) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Bigel.* Am. Med. Bot. II. t. 23.)
Man wendet die fingersdicke Wurzel an. — Sie iſt, zu zwanzig Gran gegeben, ein vortreffliches Purgirmittel.

Extractum Podophylli. (Gr.)

℞. Radicis Podophylli libram unam.
Alcoholis . . octarios quatuor.
Aquae . . . . octarios decem.
Macera radicem per dies quatuor in alcohole, tunc in aqua ad octariorum duorum remanentiam coque; tincturas seorsim evaporatas commisce et lente ad spissitudinem requisitam redige.

Polanisia.

Polanisia dodecandra, Cand; Baſtardſenf; Mosambé dodecandre (*Gal.*); Bastard mustard (*Ang.*).
C.
⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Capparideae, J.) Eine Pflanze Oſtindien's. (*Bart.* Flore of N. Amer. t. I. XXII.)
Die Wurzel wird für wurmwidrig gehalten

Polygala.

Die Pharmacopöen zeigen an:
1) *Polygala amara, L.*; bittere Kreuzwurz, Kreuzblumenkraut, Milchblume; Polygale amer (*Gal.*); Bitter Milkwort (*Ang.*); Vstawac, Zezhulka, Mudatka (*B.*); Korsblomster (*D.*); Poligala lechera (*His.*); Kruisbloem (*Bel.*); Poligala (*I.*); Wyczka (*Pol.*); Poligala leitera (*Lus.*); Jungfrumariaelin (*Suec.*).
A. Ams. Am. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Gal. Gen. Ham. Han Hass. HassP. His. His3. Li. O. Pol R. RC. Sax. Wir. Wür. *Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va. Z.*
4 (Diadelphia Octandria, L.; Polygaleae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Jacq.* Flor. Austr. V. t 413. *Plenck* t. 548. Dict. d. Sc. nat. Cah. XIV. Düss. off. Pfl. XII. t. 11.)
Man wendet die Wurzel (radix Polygalae amarae) an; ſie iſt hart, faſt holzig, faſerig, außen gelblich, innen weißlich und geruchlos. Sie hat einen bittern und zugleich ſüßlichen Geſchmack.
Man nimmt gewöhnlich, wegen der Kleinheit der Wurzeln, die ganze Pflanze; ſelten aber trifft man ſie im Handel, wo man ſtatt ihrer häufig die Polygala vulgaris verkauft.

Bitter, toniſch, bruſtlindernd, ehedem beſonders gegen Lungenſchwindſucht empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme.

2) *Polygala vulgaris, L.*; Kreuzblume; Polygala commun (*Gal.*).

Ams. Gal. Wir. Wür. *Fi. G. Gr. M. Re.*

4 Eine Europäiſche Pflanze (*Jacq.* Fl. Aust. V. 413.)

Die Wurzel und das Kraut (radix et herba Polygalae vulgaris s. Ambarvalis), welche man gewöhnlich zugleich ſammelt, ſind weniger wirkſam, als die der P. amara, wie man behauptet, obgleich dieſe nur eine Varietät derſelben zu ſeyn ſcheint und in allen ihren Theilen um die Hälfte kleiner iſt.

3) *Polygala Senega, L.*; Klapperſchlangenwurzel, Senegawurzel; Polygala de Virginie, Senega, Seneka (*Gal.*); Rattle snake root (*Ang.*); Indiczk Wirginiansky (*Pol.*); Senega (*Lus.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *B. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sp. Va.*

4 Eine Pflanze Nordamerica's. (*Linné* Amoen. Acad. 2. p. 139. t. 2. *Plenck* t. 549. Berl. Jahrb. X. t. 5. *Bigel* Am. Med. Bot. III. t. 30. *Woodwille* Med Bot. III. t. 93. Düss. off. Pfl. XII. t. 12.)

Man wendet die Wurzel (radix Senegae s. Senekae s. Polygalae Americanae s. Virginicae) an; ſie iſt gedreht, knotig, äſtig und hat eine grauliche harzige Rinde, unter welcher ein weißliches Parenchym liegt. Der Geruch iſt ſchwach und widerlich, der Geſchmack anfangs ſüß, dann ſcharf und bitter und ſie bewirkt Speichelfluß.

Sie enthält, nach Peſchier, drei eigenthümliche Stoffe, Polygalin oder Senegin (Gehlen), Iſoluſin und Polygalſäure.

Reizend, harntreibend, eröffnend, in hoher Gabe Brechen und Purgiren erregend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

4) *Polygala rubella, Willd.*

Am. *C. Gr.*

Species bechicae. (Han.)

℞. Radicis Polygalae . semunciam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Concisa misce.

Pulvis resolvens antiphlogisticus s. aperitivus. (Ful.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,
Nitri, singulorum drachmam unam.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae resolventes. (B⁺. *Va.*)

℞. Rad. Polygalae Virgin. . q. vis.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück. — Wendt rühmt dieſe Pillen zur Zertheilung des hypopyon.

Potio pectoralis amara s. cum Polygala. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Radicis Polygalae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Electuarium Polygalae amarae s. pectorale. (*Au.*)

℞. Pulv. Rad. Polygalae amar. semunc. am.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel täglich, bei chroniſchen Leiden der Bronchien.

Extractum Polygalae amarae. (HassP. Wür.)

℞. Rad. Polygalae amarae . q. vis.
Coque in Aquae q. s. per horam unam, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, tunc ad mellis spissi consist. consume.

HassP. ut extractum cardui benedicti

Extractum Radicis Senegae s. Polygalae Virginicae. (Bor Bor4. Ful. HassP. Sax.)

℞. Rad. Polygalae Virg. libram unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Digere leni calore per dies aliquot, filtra tincturam et ad mellis consist. consume, sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime et itidem consume, extracta tum commisce et vaporando inspissare continua. (Ful.)

HassP ut extractum colombo.

℞. Radicis Senegae . partes duas.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae communis . partes novem.
Digere per horas 24 lente vaporando, alcoholem elice et quod restat ad extracti consist. consume. (Bor. Sax.)

Bor4 ut extractum aconiti.

Gabe, ſechs bis funfzehen Gran.

Tinctura s Essentia Senegae. (Han. *Vm.*)

℞. Radicis Senegae . partem unam.
Aquae Vitae . . . partes sex.
Infunde frigide per plures dies. (*Vm.*)

Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Gabe, dreißig Tropfen täglich mehrmals.

Infusum Polygalae amarae. (*Ra.*)

℞. Rad. Polygalae amar. semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. — Tonisch, bei der Behandlung bösartiger Fieber als Trank empfohlen.

Decoctum Polygalae amarae. (B*. Ful. His. His3. RC. *Fi.*)

℞. Polygalae amarae unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut coquendo libras duas colaturae obtineantur. (His. His3.)

B*. Polygalae amarae uncias duas et Aquae libras tres ad dimidium redigendas; — *Fi.* Polygalae amarae vel vulgaris drachmas duas ad unciam unam coquere in Aquae sesquilibra ad tertiae partis remanentiam.

℞. Polygalae amarae sesquiunciam.
Aquae . . . uncias octodecim.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde
Oxymellis simplicis . uncias duas.
Misce. (Ful.)

RC. Polygalae semunciam, Aquae sesquilibram ad libram coquere et colaturae, si placet, addere Radicis Scillae praep. scrupulum unum, Mellis semunciam.

Bei Lungenschwindsucht gepriesen. — Gabe, vier bis sechs Unzen täglich mehrmals.

Decoctum Senegae s. Polygalae Senegae s. Polygalae Virginicae (Am. B*. Ed. Ful. Gen. Lon. LonN. Wür. WW. *Br. C. E. Fi. Gr. Re. Sa. Sw. T.*)

℞. Rad. Polygalae Virg.
unciam unam.
Aquae libras (octarios Lon LonN. *Re.*) duas.
Decoque ad dimidii remanentiam. (Am. Ed. Lon. LonN. Wür. WW. *Br. C. Gr. Re.*)

B*. Radicis uncias tres et Aquae libras duas, ad tertiam partem redigendas; — Ful. et Gen. Radicis unciam unam et Aquae sesquilibram ad libram unam redigendam; — *T.* Senegae drachmam unam cum Aquae libra una in vase tecto per sexagesimas aliquot coquere; — *Fi.* Senegae semidrachmam cum Aquae libra una ad octo unciarum remanentiam.

℞. Rad. Polygalae Virg. unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque ad libram unam, cola et colaturae adde
Syrupi simplicis . unciam unam.
Misce bene. (*Sa. Sw.*)

℞. Polygalae Virg. . unciam unam.
Liquiritiae . . . . semunciam.
Aquae . . . . sesquioctarium.
Coquendo ad octarii remanentiam consume. (*E.*)

Reizend, bei catarrhalischen Lungenaffectionen, bei Gliederreißen und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, zwei Unzen täglich zweimal; bisweilen stündlich eine halbe Unze, bis Stühle erfolgen.

Syrupus Senegae s. Polygalae Virginicae. (Am. B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. HassP. Pol. Suec. *C. Fi. T. Vm.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. unciam unam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Coque ad unciarum decem colaturae remanentiam; adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Fiat syrupus. (B*. Bor. Bor4 Fenn. Han. HassP. Pol. Suec.)

℞. Rad. Polygalae Virg. partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Infunde leni calore, in vase tecto, per horas aliquot, cola leviter exprimendo et adde
Sacchari albi . partes octodecim.
Fiat syrupus (*Vm.*)

T. Senegae uncias tres cum Aquae bull. libra una infundere per horas 12, filtrare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare.

℞. Rad. Polygalae Virg. unc. quatuor.
Aquae . . . . octarium unum.
Coque ad dimidii consumptionem usque; liquido decanthato adde
Sacchari . . . . libram unam.
Fiat syrupus. (Am. *C.*)

℞. Radicis Senegae . unciam unam.
Alcoholis 22° . . uncias octo.
Digere per triduum, filtra per chartam, destillando liquidi dimidium elice et residuum cum
Sacchari ad glob. cocti
libr. duabus
leni calore ad aptam consist. coque. (*Fi.*)

Syrupus Senegae cum Liquiritia. (*Au.*)

℞. Elixir Succi Liquirit. drach. unam.
Syrupi Polygalae Virg. unc. unam.
Gabe, stündlich einen Kaffeelöffel voll.

Syrupus Senegae moschatus. (*Au.*)

℞. Syrupus Polygalae Virg. unc. tres.
G. Ammoniaci cum Mucilag. G. Arab. triti . . . scrup. unum.
Moschi . . . . grana decem.
Elixir Succi Liquiritiae
guttas quindecim ad viginti.
Gabe, stündlich ein Löffel.

Decoctum pectorale. (Ham. *B. Ra.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,

Lichenis Island., sing. semunciam.
Aquae fontanae uncias sedecim.
Coque leni igne ad colaturae unciarum decem remanentiam, tunc adde
Mellis glycyrrhizati unciam unam.
Misce. (Ham.)

℞. Rad. Polygalae amarae unc. tres.
Herb. Farfarae,
— Veronicae, sing. unc. unam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume. (*Ra.*)

Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt es mit Zucker oder mit Honig.

Decoctum diureticum. (Ham. *Va.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. concis. semunciam.
Scillae concisae scrupulum unum.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Parte tertia coquendo consumpta, cola et adde
Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.
Tincturae thebaicae scrupulos duos.
Mellis glycyrrhizati unciam unam.

℞. Radicis Polygalae,
Baccar. Junip. contus., sing. semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque per semihoram et adde
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Vini albi . . . . uncias octo.
Drei bis vier Löffel, Morgens nüchtern, bei atonischer Wassersucht. (*Va.*)

Decoctum emmenagogum. (*E.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. unc. unam.
Cort. Aurantiorum drachmas duas.
Aquae . . . . octarium unum.
Decoque radicem cum aqua ita ut hujus pars tertia consumatur, adde corticem et post aliquot tempus cola.
Gabe, vier Unzen täglich bei Amenorrhöe.

Decoctum pectorale corroborans, Haustus pectoralis incitans, Potio pectoralis s. excitans s. cum Polygala. (*Au. B. Va.*)

℞. Rad. Polygale Virg. drach. duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Camphorae c. Mucilag. G. Arab. tritae . . . drachmam unam.
Misce sedulo. (*B.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. drach. duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce bene. (*B.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. drach. duas.
Decocti Chinae bullientis . q. s. ut infusionis unciae septem obtineantur; colaturae adde
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Corticum Aurantiorum,
— Althaeae, sing. unc. unam.
Misce exacte. (*B.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. semidrachmam ad drachmam unam.
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias tres.
Infunde et colaturae adde
Elixir paregorici drachmam unam.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Misce sedulo. (*Au.*)
Löffelweise.

℞. Radicis Polygalae drachm. duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Infunde et adde
Syrupi Tolutani . unciam unam.
G. Ammoniaci semidrachm. ad drachm.
M. Löffelweise alle 2 Stunden zur Beförderung der Expectoration bei manchen rebellischen Lungencatarrhen. (*Va.* Hót. D.)

Polypodium.

Polypodium vulgare, L.; Engelsüßtüpfelfarrn, Engelsüß, Süßfarrn, Tüpfelfarrn; Polypode commun (*Gal.*); Common polypody (*Ang.*); Osladyc (*B.*); Engelsoedt (*D.*); Polypodio (*Lus.*); Engelzoet (*Bel.*); Felce quercina a quercia, Filicola, Polipodio officinale (*I.*); Paprolka (*Pol.*); Stensoeta (*Suec.*).

A. Ams. An. Ba. Bor. Br D. Fer. Ful Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. Li. LP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

4 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Pl. méd. V. 278. *Bert.* Bild. X 38. fig. 2.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (radix Polypodii s. Filiculae dulcis) genannt, an; sie ist hart, dick, holzig, mit vielen röthlichen häutigen Schuppen bedeckt und mit schwärzlichen Fasern versehen. Sie ist fast geruchlos, hat aber einen anfangs süßlichen, dann bittern, widerlichen und schwach adstringirenden Geschmack.

Sie enthält, nach Buchholz, zuckerartigen Stoff, Schleimharz-, Harz, Oel und Satzmehl.

Schwach adstringirend, besonders bei catarrhalischen Krankheiten, auch gegen Würmer; sie macht die Basis des Herrenschwand'schen Mittels gegen den Band-

wurm aus. — Gabe des Pulvers, eine bis zwei Drachmen.

Polytrichum.

Polytrichum commune, *L.*; goldener Widerthon, Güldenwiderthon, Güldenhaarmoos; Polytric commun, Percemousse (*Gal.*); Great golden maidenhair (*Ang.*); Guldhaer (*D.*); Golden wederhood (*Bel.*); Biaernmossa (*Suec.*).

Br Gal. Wir. *Be. G. Gr. M. Sp.*

♃ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic pl. t. 415.)

Man wendet das Kraut (herba Adianti aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus capillaceus major) an, welches aus einem einfachen, wuchernden Stängel mit linienlanzettförmigen, gezähnelten Blättern beſteht und weder Geruch noch Geſchmack beſitzt.

Sehr ſchwach adſtringirend.

Pomum.

Malus communis, *Cand.*, *Pyrus Malus*, *L.*; Apfelbaum; Pommier (*Gal.*); Appletree (*Ang.*); Missenske gablko (*B.*); Aebletrae (*D.*); Manzano (*His.*); Appelboom (*Bel.*); Malo (*I.*); Jablon (*Lus.*); Mareiro (*Lus.*); Appeltraed (*Suec.*).

Am. Ba. Bor. Bor4. Br. Ful. Gal. Han. HassP. His. His3. O. Pol. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. Gr. M. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa verbreitet iſt. (*Blackw.* Herb. t. 141. 178. *Schk.* t 133. *Plenck.* t. 394. *Hayne* IV. t. 46. Düss. off. Pfl. III. t 1.)

Seine zahlreichen, durch die Cultur entſtandenen Varietäten geben ſehr verſchiedene Früchte, Aepfel (Poma, Poma acidula), unter denen jedoch bloß die Renet- und die Borsdorfer Aepfel; Poma renetia et Borstorfiana; Remette, Pomme de Borstorf (*Gal.*) angewendet werden.

Pulpa Pomorum dulcium s. Melimelorum. (LH. RC.)

℞. Pomorum dulcium quantum vis.

Coque ex Aqua et per filtrum exprime. — Zum Umſchlag auf entzündete Augen.

LH. Pulpam eodem modo ut pulpam prunorum.

Gelatina Pomorum (*Re.*): Pomorum succulent. libras sex detracta pelle concis. coquere lente in Aquae mens. quart. ad pulpae consist., trajicere, addere Syrupi quart. tres et per sexag. decem coquere: vel (*Gr. Re.*) Sacch. part. unam cum Succi quatuor coquere.

Succus Pomorum. (Ful. Gal. His. His3. Sar. *T.*)

℞. Pomorum Renetiorum quantum vis.

In pulpam rasis, semina separa, exprime inter duo strata straminis secalini concisi et cum Aqua tepida loti; succum, postquam subsedit, cola et in lagenis sub olei strato serva.

Lagenae etiam vapori Sulphuris urentis exponi vel libris duabus Succi, Sulphureti Calcis grana quindecim addi possunt

Syrupus Pomorum redolentium. (Fer. His. His3. *Fi.*)

℞. Succi Pomorum . libram unam. Sacchari albi pulverati libras duas.

Solve lenis caloris vel balnei aquae ope. (His. His3.)

Fer. *Fi.* vel dissolvere Sacchari libras tres in Succi quatuor vel (Fer.) coquere quadrantes Pomorum ab epidermite et seminibus liberatos in Syrupo Sacchari.

Potus ex Pomis s. Pomorum, Decoctum Pomorum. (B^e. *Au.*)

℞. Pomor Renetiorum unc. decem. Aquae font. libr. duas c. dimid.

Coque per horam in vase tecto et cola — Dieſer Trank, welcher ſchon an ſich ſehr angenehm iſt, wird es durch Zuſatz von Zucker noch mehr. Man kann, wenn die Indication es erfordert oder erlaubt, entweder eine Drachme Muscatpulver oder eine halbe Drachme gepulverten Zimmt oder endlich drei Unzen Rheinwein zuſetzen. Im letztern Falle dient der Trank nur als Vehikel des Reizmittels, im erſtern, um dem Kranken das Waſſertrinken angenehm zu machen, da die geringe Reizwirkung deſſelben faſt gar nicht in Anſchlag zu bringen iſt.

Populus.

Man findet von dieſer Gattung:

1) *Populus balsamifera*, *L.*; Balſampeſpe; Peuplier baumier (*Gal.*); Balsamtree (*Ang.*); Balsam popeler (*Bel.*).

Gal GalM. Li. Sax. *B. G. Gr. M. Pid.*

Ein Baum (Dioecia Octandria, L.; Amentaceae, J.), welcher in Nordamerica und Sibirien wächſt (*Cat.* Car. I. p. 34. t. 34. *Plenck* t. 714.)

Die Knoſpen, welche man anwendet, ſind ſehr groß, eirund, länglich, ſpitzig, mit geſchindelt über einander liegenden, feſten, länglichen, hohlen Schuppen. Ihre Ober-

Digitized by Google

fläche iſt mit einem harzigen, klaren, goldgelben Safte von gewürzhaftem Geruch und brennendem und etwas bitterem Geſchmack überzogen.

2) *Populus nigra, L.*; Pappel; Peuplier noir. Peuplier franc (*Gal.*); Poplar (*Ang.*); Topol (*B.*); Poppel (*D.*); Chupo, Alemo o Alamo negro (*His. Lus.*); Popelier (*Bel.*); Pioppo o Fioppo (*I.*); Topola czarna (*Pal.*); Asp (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. D. Du. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. LH. LP. Sax. Suec. Wir. *Br. Fl. G. Gr. M. Sp.* Z.

Ein Baum, welcher in ganz Europa wächſt. (*Blackw.* t. 248. *Zorn* Ic. pl. t. 577.)

Man wendet die Knoſpen (oculi s. gemmae Populi, recentes et siccatae), Pappelknoſpen, Pappelknöpfe, an; ſie ſind rundlich, länglich, ſpitzig, gelblichbraun, mit Schuppen von verſchiedener Größe, welche über einander liegen und eine glänzende, mit einem klebrigen, goldgelben, durchſichtigen Safte überzogene Oberfläche zeigen. Sie haben einen durchdringenden, balſamiſchen, ſehr angenehmen Geruch und einen bittern, brennenden und gewürzhaften Geſchmack.

3) *Populus tremula, L.*; Zitterpappel, gemeine Eſpe; Tremble (*Gal.*); Trembling poplar tree (*Ang.*).

Suec. *Gr. Re.*

Ein Europäiſcher Baum (Nouv. Duh. II. t. 887.)

Man wendet die Ausläufer der Wurzel an, welche adſtringirende Kräfte beſitzen. Die Rinde iſt bitter und als Stellvertreter des Enzians, der Quaſſie ꝛc. empfohlen.

4) *Populus tremuloides* (*Gr.*). — Die Rinde iſt toniſch und magenſtärkend.

Tinctura s. Essentia Populi s. Oculorum Populi. (Li. *Vm.*)

℞. Gemmar. Populi rec. part. unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Infunde frigide et liquorem filtratum serva. (*Vm.*)

Li. Gemmarum partem unam et duas Alcoholis.

Essentia Populi vulneraria. (Wir.)

℞. Gemmar. Populi rec. semilibram.
Alcoholis concentrati sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo, filtra et colaturae adde
Essent. Flor. Hyperici semilibr.
Digere per aliquot temporis spatium, tunc destillando Alcoholis dimidium elice et quod remanet serva.

Reizend, äußerlich bei atoniſchen Geſchwüren, innerlich bei Tripper, weißem Fluß, Diarrhöe und Lungenſchwindſucht empfohlen. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen und mehr. — Hat viel Aehnlichkeit mit der tinct. alcoholica hyperici compos.

Unguentum populeum. (Fer. Li. *Br.*)

℞. Gemmarum Populi balsamiferae siccarum . . . semilibram.
Butyri recentis . libram unam.
Coque lente ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (Li.)

Br. contundere Gemmarum sicc. uncias octo, addere Axungiae liquatae libras duas, tenere in balneo aquae per horas tres in fusione et deinde decanthare; — Fer. digerere per dies septem Gemmarum recent. libras duas in Axungiae libris quatuor contritas.

Dieſe Salbe iſt die einzige, welche den Namen ung. populeum verdient.

Portulaca.

Portulaca oleracea, L.; Portulak; Pourprier commun (*Gal.*); Purslane (*Ang.*); Portulak (*D. Suec.*); Berdolaga (*His.*); Porselein (*Bel.*); Porcellana (*I.*); Kurza noga (*Pol.*); Beldroega (*Lus.*).

Ams. Br. Gal. His. His3. Wir. *Be. G. Gr. M. Sp.*

☉ (Dodecandria Monogynia, L.; Portulaceae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 287. *Schk.* t. 130. *Plenck* t. 361. *Zorn* Ic. pl. t. 489.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Portulacae) beſteht aus einem rundlichen, glatten, glänzenden, ſaftigen Stängel und länglichen, keilförmigen, fleiſchigen, glatten, dunkelgrünen Blättern. Der Geſchmack deſſelben iſt wäſſerig und etwas gewürzhaft. — Der Saame iſt ſehr klein, nierförmig, gekrümmt, etwas runzelig, ſchwarz und geſchmacklos.

Man zählt ihn zu den ſogenannten vier kleinern kalten Saamen. Das Kraut, welches mehr in der Küche als in der Heilkunſt gebraucht wird, ſoll, in großer Menge auf einmal genoſſen, purgiren.

Portulaca pilosa (*Gr.*) harntreibend.

Conserva Portulacae. (*Vm.*)

℞. Foliorum Portulacae partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contunde folia, adde saccharum et lente calefac.

Aqua Portulacae. (Gal. Pal.)

℞. Herbae Portulacae partes quinque.
Aquae partes duodecim c. dimid.

Destillent decem circiter partes; productum infunde Herbae partibus decem, adde Aquae partes decem et destillando denuo partes decem abstrahe. Operationem tertia vice repetere potes. (Gal.)

Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillet pars una cum dimidia.

Potassium.

Ein in der Medicin ungebräuchliches Metall, deſſen zahlreiche Zuſammenſetzungen aber zu ſehr mannichfaltigen Zwecken benutzt werden.

Protoxydum Potassii, Potassa caustica s. pura, Kali vegetabile purum s. causticum; cauſtiſches Kali; Protoxide de Potassium, Potasse caustique (*Gal.*).

§. I. Im flüſſigen Zuſtande.

Deutoxydum Potassii liquidum, Aqua Potassae s. Potassae causticae s. purae s. Kali puri s. caustici, Lixivia caustica, Potassa pura liquida, Liquor Potassae s. Kali caustici s. Potassae causticae, Lixivium causticum s. Potassae purae magistrale s. saponariorum s. saponarium s. causticum vegetabile; Laugenwaſſer; Solution de Potasse ou de potasse caustique, Potasse liquide, Liqueur des savonniers (*Gal.*). (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. HisS. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RG. Sax. Suec. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . uncias octo.
Infunde
Aquae . . . . uncias viginti.
Effervescentia cessatâ adde statim
Kali subcarbonici . uncias sex,
dissolutas in Aquae unciis octo. Misce bene totum, tege ad refrigerationem perfectam usque, infunde in infundibulum vitreum, cujus orificium telae panniculo occlusum est, quod prodit in vase subposito recipiens, et simulac nihil amplius profluit, aliquot uncias Aquae in infundibulum effundens, quod repetendum est, donec liquidi librae tres prodierint, ad quod dies duo ad tres requiruntur. (Ed. Fer. Gen. *C. Sw.*)

Es giebt von dieſem Verfahren faſt eben ſo viel, jedoch meiſt geringe Verſchiedenheiten als Pharmacopöen.

Du. *Gr.* Calcis vivae uncias octo humecta cum Aquae bull. octariis duabus ad extinct. usque, admisce tunc Kali subcarb. uncias sex; massam refrigeratam in infundibulum effunde, cujus collum linteo obstructum est et destillando lixivii octarios tres abstrahe, cujus pondus specificum sit 1,100; — Gal. Subcarbonatis partes duas et unam Calcis cum Aquae communis duodecim solvendo et coquendo in lixivium redige, cola liquorem, inspissa, donec 36° areom. indicet, tunc sepositum ut subsideat decantha; densitas ejus erit 1,334. — Parari potest etiam ex parte una Potassae purae fusae ac duabus Aquae dest.; — Ams. Bel. Aquae calidae uncias quatuor infunde in Calcis vivae novem, post extinct. adde Subcarbonatis uncias sex, immitte omnia in infundibulum, cum gossypio obturatum, adde, quum nihil amplius transit, Aquam bull., ut lixiviae librae tres obtineantur; — HisS. Calcis vivae recentis libras quatuor, Carbonatis Potass. communis libras duas, Aquae fontanae libras viginti in lixivium redacta ad dimidium coquere, filtrando carbonatem calcareum separare, ad consistentiam syrupi tenuioris vel usque vas uncia una aquae destillatae repletum, drachmas novem hujus liquoris capiat, vaporare; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Dissolve Potassae libram unam in Aquae octariis duobus, Calcis semilibrae infunde Aquae octarios sex, misce liquores calidos; sepone in vase tecto et post refrigerationem cola: octarius unus uncias sedecim pondere aequat; — R. Extingue sensim Calcis uncias quatuor in Aquae ferv. pauxillo, adde Aquae ferv. uncias octodecim et tunc Cinerum arenaceorum uncias tres, agita fortiter et post refrigerationem adde Aquae q. s ut lixivii unciae octodecim obtineantur; — Sax. Dissolve Kali subcarb. in Aquae pondere sextuplo, calefac deinde et Calcem pedetentim adde, subinde videndo, num lixivium in acidum aliquod instillatum effervescentiam provocet et statim calcem addere desinendo, hoc si fieri desierit; cola per pannum exprimendo; lava residuum cum Aquae calidae pauxillo, exprime denuo, post subsidentiam decantha et inspissa, donec liquor 36° areom. indicet; — Li. Calcis libras quatuor extingue cum Aquae bull. q. s., adde deinde Subcarbonatis uncias sedecim in Aquae libris novem dissolutas, sepone per horas 24; liquorem vicissim Calcis et Acidi sulph. ope, experimento subjice et si a nullo eorum turbatur, filtra in infundibulum, gossypio instructum et si requiritur, vaporationi subjice, donec in vase, Aquae dest. librae unius capaci, unciae sedecim contineantur; — Ful. Calcis

uncias sex extingue cum Aquae q. s., adde Subcarbonatis uncias tres in Aquae sesquilibra dissolutas, post aliquot tempus filtra in infundibulum, gossypio instructum et liquori prodeunti adde Aquae q. s. ut pondus ejus sesquilibram impleat.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis . . . . . partes tres.
Misce et adde
Aquae pluvialis partes sedecim.

Coque per semihoram, saepius agitando; cola per linteum dupliciter plicatum, sub finem parumper exprimendo; massam residuam ablue cum
Aquae . . . partibus quatuor.
Evaporet utrumque liquidum commixtum ad octo partium remanentiam; sepone in lagena magna bene obturata, liquidum clarum decantha et in parvas lagunculas distribue. (B.)

Hass et *Pid.* infundere Aquae font. libras sex in unam Calcis vivae, addere, simulac haec est extincta, Cinerum clavell. semilibram, coquere, donec liquor corrodat et plumam anseri nam immissam dissolvat et diluere deinde Aquae q. s., tunc filtrare; — Bor. Fenn. Han. O. Pol. RC. Suec. et *Vm.* Subcarbonatis libras duas solvere in Aquae libris decem (viginti), solutioni sensim addere Calcis pulv. libras tres, coquere per horae quadrantem, spatulae ope agitando, seponere per tempus aliquot, colare et vaporando consumere, donec liquor pondus specificum 1,337 acquisiverit; — HassP. Cinerum clavell. libras duas, Aquae sedecim, Calcis vivae sesquilibram vel libras duas in pulverem dilapsas coquere per semihoram etc; — Bor4. Kali carbonici e Cin. clavell. libras duas cum dimidia, Aquae ferv. duplum, successive ingerere Calcariae ustae pulveratae libras tres, coquere etc. Pond. spec. = 1,330—1,340; — Ba. Dissolvere Subcarbonatis depurati partem unam in Aquae comm. decem, coquere liquorem et addere, continue agitando, Calcis purae trientes duos; post horae quadrantem bullitionis per linteum colare, residuum cum Aquae comm. partibus quinque coquere, lixivia ambo commiscere, per horas 24 seponere, liquorem deinde decanthare et evaporare donec pondus specificum sit 1,35.

B. proponit, dissolvere Potassae prope ignem fusae partem unam in Aquae dest. duabus. — Letzteres Verfahren giebt ein schnelleres und in Betreff der Qualität vorzüglicheres Product.

§. 11. Im festen Zustande.

Alcali causticum, Causticum alcalinum s. commune s. commune fortius s. potentiale s. salinum, Cauterium potentiale, Kali causticum siccum et fusum, Hydras kalicum s. Potassae purae fusae, Lapis causticus s. causticus chirurgorum s. infernalis s. infernalis alcalinus s. septicus, Potassa s. Potassa cum Calce s. Calcis ope parata et igne fusa s. fusa s. pura s. caustica s. caustica fusa, Ruptorium commune, Hydras Protoxydi Potassii s. Deutoxydi Potassii impurus, Hydras kalicus et kalicus fusus; Aetzkali, Aetzstein; Potasse fondue, Pierre à cautère, Hydrate de protoxide de potassium (*Gal.*). (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . partes tres.
Infunde Aquae q. s. ad extinct. et adde
Kali subcarb. purif. partem unam.
Dilue totum cum multa Aqua, agita bene baculi ope, filtra, ad siccum consume, tunc massam fusam in modulos ferreos adipe obductos vel supra marmor calidum effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe. (Wür.)

His. et His3. digerere et agitare simul Calcis vivae libras duas, Kali subcarbonici unam et sedecim Aquae, filtrare deinde, liquorem ad siccum usque evaporare, residuum fundere in crucibulo et supra lapidem calidum effundere.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis grossiuscule pulv.
part. unam.
Aquae communis partes duodecim.
Coque per semihoram, cola, ad siccum consume, residuum in crucibulo liqua et supra marmor calidum effunde. (Gal. GalM.)

LH. Subcarbonatis, Protoxydi Calcii, singulorum libras duas, Aquae viginti quatuor et ad finem effusionem supra laminas cupreas s. marmor; — *Re.* Solut. Potassae octarios tres ad unum decoquere, addere Calcis extinctae libram et miscere; — *Br.* Coque simul Subcarbonatis libram unam, Calcis tres et sedecim Aquae per horae quadrantem, evapora ad siccum et residuum fusum supra lapidem laevem oleo obductum effunde; — Pm. Subcarbonatis libram unam, Calcis tritae uncias sex et Aquae communis libras

duodecim per semihoram coquere, filtrare et ad siccitatem usque vaporare, in crucibulo argenteo fundere et massam liquatam in modulos cylindraceos conjicere; — *T.* Salis Tartari libras tres in Aquae duodecim solvere ignis ope, addere Calcis in Aquae decem extinctae duas et per horae quadrantem coquere, filtrare et in lagenis hermetice clausis reponere, donec fluidum transparens sit, decanthare deinde, vaporando ad extracti consist. consumere, fundere etc.; — **A.** Dissolve Subcarbonatis libram unam in Aquae bull decem et, continue agitando, adde sensim Calcis vivae pulv. libras duas; coque per horam unam et diutius, tunc sepone, decantha, consume in tantum, donec massa tranquille olei instar fluat et in modulos vel supra laminam ferream effunde; — Sar. Coque Cinerum sarmentorum calcinatorum libras quatuor et Calcis vivae duas cum Aquae comm. decuplo ad dimidii remanentiam, cola et ad siccum consume; residuum in crucibulo fusum supra lapidem calidum oleo obductum effunde; — *Sp.* Coque per horas aliquot Subcarbonatis partem unam, Calcis vivae quatuor et Aquae pondus vicies majus; filtra, ad siccum evapora et residuum leni calore fusum in modulos effunde.

℞. Potassae caust. crystall. . q. vis.

Ingere partitim in crucibulum argenteum; aquâ crystallisationis perdita et omnibus aequale fusis et tranquillis, in modulum ferreum calefactum effunde. (*Vm*)

℞. Lixivii saponariorum quantum vis.

Consume in tantum, donec gutta supra lapidem frigidum dejecta, statim concrescat (*siccum*); massam deinde in crucibulum ingere, calefac, donec olei instar fluat et illam in modulos voluminis plùmae anserinae effunde (*fusum*). (Am. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw.*)

Ams. Ba Bel. et Gal. lixivium ad siccum evaporare et tunc fundere.

Vm. modulos, in quos Alcali fusum ingeritur, oleo non obducere suadet.

Pharmaceutae aliquot Potassam guttatim supra lapidem oleo obductum effundi volunt. (*Br.*)

§. III. Im Zuſtande vollkommener Reinheit.

Potassa per Alcoholem. (Gal. LH. *Gr. T.*)

℞. Potassae liquidae . quantum vis.

Ad siccum consumptam in Alcohole (40°) dissolve et deinde hujus partem unam destillando abstrahe: residuo in pelvi argentea evaporato, cochlearis ope pelliculam nigrescentem, qua liquor tegitur, separa, quod remanet, supra laminam argenteam effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe.

LH. Potassam causticam praemonito modo obtentam per horas 24 cum Alcohole 40° conjungere, solutionem in retortam vitream immittere, tubo et recipiente instructam, tres quadrantes Alcoholis abstrahere etc.; — *Gr.* Solutioni Potassae ad syrupi consist. vaporatae et ad 130° F. circiter refrigeratae addere Alcoholis pond. triplum, post aliquot dies clarum abstrahere, etc.; — *T.* Lapidis caustici uncias octo in vase cylindrico librarum trium capaci Alcoholis 40° B. infundere et mixtura saepius agitare, tunc per horas aliquot seponere, quo facto mixtura tria praebebit strata, e quorum superiore liquorem alcoholicum siphonis ope separa, ad consistentiam oleosam evapora et adhuc calidum supra laminam porphyream oleo illitam effunde, refrigeratum frange et serva.

Das Product iſt reines Potaſſiumprotoxydhydrat, der Aetzſtein dagegen enthält kaliſche. ſchwefel- und ſalzſaure Salze ꝛc.

Die reine Pottaſche iſt im concentrirten Zuſtande äzend und beizend, mit vielem Waſſer verdünnt, ſtark reizend. Man hat ſie in dieſer Geſtalt als ſäuretilgendes, harntreibendes und beſonders ſteinzerſtörendes Mittel zu 10 bis 15 Tropfen in einem Vehikel angewendet.

Feſt und geſchmolzen dient ſie als Aetzmittel.

Potassa caustica. Potassa cum Calce, Causticum commune fortius et mitius, Calx cum Cali puro, Cali causticum cum Calce. (Am. Du. Ed. GalH. Gen. Lon. LonN. O. *Gr. Sp*)

℞. Liquoris saponarior. octarios tres.
Decoque ad octarii reman. et adde
Calcis extinctae . libram unam.
Misce exacte. (Lon. LonN.)

An. Du. Ed. *C. G. Gr.* Liquorem saponariorum ad tertiam (vel quartam *Gr.*) partem evaporare et addere deinde Calcis vivae q. s. ad obtinendam pastam solidam; — *Sp.* dissolvere Potassae caust. partem unam in Aquae tribus, addere deinde Calcis vivae q. s. ut liquorem totum consumat et pastam proferat.

Henry (GalH.) Kali causticо vulgari antequam effundatur, Calcis vivae pulv.

Digitized by Google

pauxillum addere, quo prohibetur, ne humiditas aëris tam cito absorbeatur.

Dieſes Aetzmittel wirkt weniger ſtark als das vorige.

Cauterium potentiale, Lapidem septicum, Causticum commune mitius Gr. e Calcis vivae et Saponis mollis partibus aeq. parandum indicat.

Pasta caustica Elsii. (B*. Wir.)

℞. Lixivii saponariorum uncias octo.
Decoque ad unc. duarum remanent. et liquori bullienti adde
Extracti Opii . . drachmas duas.
Calcis vivae . . drachmas sex vel q. s. ut totum humidum absorbeatur.

Causticum commune cum Opio. (*Gr. Re.*): Paratur miscendo Potassae cum Calce drachmas duas, Opii pulv. semidrachmam cum Saponis mollis q. s.

Lixivium lithontripticum Saundersii. (*Ca.*)

℞. Potassae venal. calcin. semilibram.
Concharum calcin. sesquilibram.
Aquae bull. libras octo et dimid.
Post horas 24 sepositionis filtra. — Man giebt täglich drei Drachmen auf drei Mal in einem Aufguß von Leinſaamen, wozu man funfzehen Gran gebrannte Magneſia ſetzt.

White's Solutio Potassae (*Gr.*): Subcarbonatis Potassae uncias duas, Aq. Calcis octo. Gegen Magenſäure der Kälber. (Veterin.)

Hanway's preventive wash for venereal (*Re.*): Liquoris Potassae drachmas duas, Aquae Rosarum uncias octo.

Fomentatio Brünningshauseni. (B*.)

℞. Potassae caust. fusae unc. unam.
Aquae comm.
uncias quadraginta octo.
Dissolve. — Dieſe Auflöſung will man mit Erfolg bei einer mit Convulſionen befallenen ſchwangeren Frau auf den Unterleib angewendet haben.

Injectio Girtanneri. (B.)

℞. Potassae causticae semidrachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve — Von Girtanner im Anfang des Trippers zur Verhütung des völligen Ausbruchs empfohlen.

Collyrium Gimbernati. (B*. *Ca. Pie. Sw. Va.*)

℞. Potassae causticae granum unum.
Aquae destillatae unciam unam.
Dissolve alcali in aqua. (B*. *Sw. Va.*)

Ca. et *Pie.* Kali dosin duplam adhibent. — Bei Augenfleck. Man läßt einige Tropfen in das mit dem Flecke behaftete Auge einbringen und wäſcht dann das Organ mit einer ſchleimigen Abkochung.

Solutio Cohemi. (B*. *Au.*)

℞. Potassae causticae liquidae
guttas decem ad viginti.
Decocti Juniperi . libram unam.
Misce. — Den Tag über zu trinken.

Aqua ophthalmica resolvens. (Ham.)

℞. Potassae causticae granum unum.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Extracti Opii . . grana quatuor.
Dissolve et filtra.

Solutio Saviardi. (B*. *Va.*)

℞. Potassae causticae drachmas duas.
Camphorae . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Zum Waſchen ſchmerzloſer und mit Fleiſchwucherungen bedeckter Geſchwüre.

Cereoli cum Kali caustico. (*Au.*)

℞. Potassae causticae grana quatuor.
Extracti Opii . drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Gummi Arabici quantum sufficit ut solutio spissa fiat, in quam fila immersa sicca, hoc modo continuando, donec cereoli satis sint spissi.

Hecker empfahl dieſe auflöslichen Bougies bei chroniſchem Tripper.

Tinctura Metallorum s. Antimonii tartarisata s. Stibii alcalisata s. Antimonii acris s. Antimonii alcalina s. Antimonii nigra s. Antimonii balsamica s. Salis Tartari s. Tartari s. alcalina s. kalina s. alcalina acris, Alcohol Potassae s. alcalisatum, Spiritus potassatus, Solutio alcoholica Potassae; ſcharfe Spießglanztinctur, Kalitinctur. (Ba. Bor. Bor4. Br. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Gr. Sp. Sw. Va. Vm.*)

℞. Reguli Antimon. mart. unc. duas.
Cupri,
Stanni, sing. . . unciam unam.
Liqua simul, pulvera amalgama et pro partiunculis cum Nitri unciis duodecim detonare fac; ignem ita auge ut residuum in scorias virescentes redigatur, cui deinde pulverato infunde
Alcoholis . . . sesquilibram.
Liquorem, postquam fusco-rubrum colorem accepit, filtra. (Br. *Sp.*)

℞. Reguli Antimon. mart. unc. tres.
Nitri depurati uncias octodecim.
Mixta pro portionibus in crucibulum rubre excandescens injice et post deflagrationem per horae spatium cal-

cina, tunc massam fusam in mortarium ferreum Creta tritum infunde et in pulverem redige, cui adhuc calido in retortam ingesto infunde

Alcoholis concentrati
uncias quadraginta octo.

Decantha et post tres dies digestionis filtra. (Ful.)

Li. Reguli sesquiunciam, Nitri uncias novem et Alcoholis libras duas; — Wir. Reguli uncias quatuor, Nitri viginti et Alcoholis sesquilibram; — Br. Reguli libram unam, Nitri tantidem et Alcoholis sesquilibram; — *Sp.* Reguli uncias quatuor, Nitri octo et duodecim Alcoholis.

℞. Antimonii crudi . . semilibram.
Kali subcarbonici . libram unam.

Mixturam in crucibulo fusam in scorias flavescentes redige, contunde deinde in mortario ferreo calefacto et pulveri infunde

Alcoholis . . . . . libras tres.

Post tres dies cola. (Br. Pal. Sar. Wir. Wür. *Sp. Sw.*)

℞. Antimonii crudi . . uncias sex.

Liquatis in crucibulo adde

Nitri siccati . . . sesquiunciam.

Igne per horae quadrantem alito, massam pulveratam coque cum

Nitri fixi . . . . . unciis octo

in Aquae libris duabus dissoluti ad syrupi consist. usque et magmati infunde

Alcoholis . . . libram unam.

Post sufficientem digestionem decantha. (Br.)

℞. Reguli Antimonii medicin. adhuc calidi et pulv. unc. quatuor.

Infunde lixivium praeparatum e

Kali subcarbonici . . unciis sex.
Aquae communis . unciis octo.

Coque ad pultis consistentiam et adde

Alcoholis concentrati uncias decem.

Digere calore blandissimo, saepius agitando, donec liquor colorem nigrescenti-rubrum acquisiverit. (Ful.)

℞. Kali subcarbonici . . uncias sex.

Calcina fortiter in crucibulo et contuso adhuc calido infunde

Alcoholis concentrati
unc. duodecim.

Digere e balneo arenae, donec liquor ruber sit redditus. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür *Sw.*)

Gr. digerere per dies aliquot et decanthare, caet. ut antea; — *Sp* calcinare Salis Tartari uncias octo cum tribus Calcis vivae per horam unam et residuum digerere cum Alcoholis concent. unciis viginti quatuor; — Wir. calcinare fortiter Salis Tartari uncias sex cum Pulveris Carbonum sesquiuncia et residuum digerere cum Alcoholis libra una.

℞. Potassae causticae partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.

Digere in balneo arenae per dies aliquot. (B. Bor. Han. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Bor4. HassP. Kali caustici sicci recenter parati uncias quatuor cum Spiritus Vini alcoholisati libris duabus calefacti agitare et digerere; — *Va.* Potass. caust. drachmam, Alcohol. rectif. uncias octo.

Man braucht dieſes Präparat heutzutage nur wenig; es gilt als reizend, eröffnend, harn- und ſchweißtreibend. — Gabe, zwanzig bis ſechszig Tropfen.

Mixtura tonico-nervina Stahlii. (B⁴. Br. Ful. Pal. Sax. Wir. *Sp.*)

℞. Tinct. Antimonii acris unc. duas.
Spir. Cornu Cervi rectificati
unciam unam.

Misce sedulo. — Reizend, eröffnend, auflöſend, ſchmelzend, nervenſtärkend, krampfſtillend, ſchweiß- und harntreibend. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen.

Mistura alkalina anodyna. (*Gr.*)

℞. Tincturae Opii . drachmas duas.
Liquoris Potassae
drachmas duas cum dimidia.
Spiritus Myristicae . semunciam.
Aquae purae
uncias undecim c. dimidia.

Misce.

Mistura antacida. (*Gr.*)

℞. Liquoris Potassae drachmas duas.
— Calcis . . . . uncias sex.

Gabe, einen oder zwei Eßlöffel nach Umſtänden, in Fleiſchbrühe.

Tinctura salina (Sar.)

℞. Potassae purificatae uncias sex.
Corticis recentis Aurantiorum,
Rad. Gentianae pulv., sing.
sesquiunciam.
Aquae destillatae . sesquilibram.

Post dies quatuor digestionis adde

Alcoholis rectificati . uncias octo.

Digere denuo per horas 24 et filtra. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Mixtura resolvens spirituosa. (Ful.)

℞. Tinct. Antimonii nigr.
unciam unam.
— Pimpinellae alb. drach sex.
— Succini . . drachmas tres.
Saponis Alicant. rasi drach. duas.

Misce et dissolve. — Dieſe Mixtur, welche ſehr gut ſtatt der Dippel'ſchen Seife gebraucht werden kann, gilt als reizend, toniſch, balſamiſch, ſchmelzend,

krampfstillend, nervenstärkend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis siebenzig Tropfen.

Sapo chimicus Dippeli. (Wir.)

℞. Kali subcarbonici libram unam.
Antimonii crudi . . semilibram.
Limaturae Cupri . . uncias tres.

Mixta et liquata contunde, antequam sint refrigerata, adde Olei Juniperi vel Terebinthinae uncias novem, ut fiat pulvis; infunde deinde Alcoholis concentrati q. s. ut digitorum aliquot crassitiem tegatur; digere per plures dies et liquidum coloratum decantha; digestionem bis terve cum novo Alcohole repete; tincturas commisce, destillando spiritus partem unam abstrahe et reliquo Saponem Venetum cum Balsami Peruviani pauxillo adde.

Ein sehr unchemisches Präparat, welches Dippel äußerlich als auflösend und schmerzstillend, bei Podagra und Frostbeulen empfahl.

Protoxysulphuretum Potassii, Sulphuretum Potassii s. Protoxydi Potassii, Sulphuretum Potassae s. Lixiviae s. Kali s. Kalii cum Sulphate kalico s. kalicum, Hepar Sulphuris s. Sulphuris salinum s. Sulphuris vulgare. Kali sulphuratum s. Sulphuretum; Schwefelleber, Schwefelkali; de Protoxisulfure de potassium, Sulfure protoxide de potassium, Sulfure de potasse, Foie de soufre (*Gal.*) (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

§. I. Im festen Zustande.

℞. Sulphuris sublimati partem unam
Kali subcarbonici . partes duas.

Liqua simul in retorta (crucibulo), igne gradatim aucto (massam homogeneam in laminam ferream aut in mortarium ferreum) et post refrigerationem vase dirupto, contentum statim in lagenam ingere et serva. (A B. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Wir. Wür. *C Gr. Re. Sw. T.*)

LH Florum Sulphuris uncias sex Subcarbonatis tres; — *Gr.* Sulphuris libram unam, Subcarbonatis Potassae tres, liqua in vase tecto; — Lon. 1809. *Gr.* Florum unciam unam, Subcarbonatis quinque; — Bor4. et HassP. Kali sulphuratum e Sulphure depurato et Kali carbonico e Tartaro; *Kali sulphuratum pro balneo* e Sulphure citrino et Kali carbonico e Cinerib. clav. parare.

Es ist wichtig, die Masse so lange zu erhitzen, bis sie ruhig wie Wasser fließt; denn sobald sie aufschwillt, enthält sie Kohlensäure. Auch müssen die Flaschen, in welchen man sie aufbewahrt, vorher erwärmt werden, um die Luft und Feuchtigkeit herauszuziehen.

Vm. terere simul Subcarbonatis pulv. partes sex cum dimidia et tres Florum Sulphuris et mixturam in crucibulo liquefacere; — Ba. Subcarbonatis partes quatuor et tres Sulphuris; — Du. Ed. Fer. Li. Pm. RC. Sax. Suec. *Br. Fi. Gr. sing.* partes aeq. — Die letzteren Verhältnisse, welche auch Vauquelin hat, geben eine Mischung von schwefelsaurem und Schwefelkali mit einem Ueberschuß von Schwefel.

Béral Potassae partes quindecim et Sulphuris quadraginta; — hat das Unangenehme, daß es wegen des darin enthaltenen Schwefeleisens bei'm Baden die Haut grün färbt.

Henry Subcarbonatis Potassae e combustione Tartari part. duar. et unius Sulphuris in baculis pulv. in retortam pro tribus trientibus inde replendam immittere, vas supra balneum arenae collocare et igne primum blando, deinde sensim aucto massam liquefacere.

℞. Sulphuris in baculis partem unam
et tres quadrantes.
Potassae caust. fus.
part. quinque c. dimid.

Misce simul et in retorta super balneo arenae liqua. (*Vm.*)

Van Mons nennt dieses Präparat *Sulphuretum simplex Potassae*, ein Name, den man auch dem Sulfüre giebt, welches durch Zersetzung des Sulphats mittelst Kohle bei hoher Temperatur entsteht. In Betreff der Bereitung seines *Supersulphuretum Potassii* zeigt er zu dessen Gewinnung folgende Formel an:

℞. Sulphuris in baculis
partes quinque et dimidiam.
Potassae caust. fusae partes tres.

Liqua in retorta vitrea super balneo arenae gradatim calefacto.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Aqua Sulphureti Kali s. Potassae. (Du. *C. Gr. Re.*)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Potassae caust. liq. uncias novem.

Coque per sexagesimas decem et filtra. Pond spec. est 1,120.

Re Sulph loti partem unam, Solut. Potass. caust. undecim.

Reizend, erregend, in hoher Gabe giftig, in vielen Fällen Auswurf und Ausdünstung befördernd, äußerlich austrocknend. Man hat es gegen Asthma und Croup angewendet, jedoch ohne sonderlichen Nutzen, bei alten Catarrhen, chronischen Rheumatismen, Gicht, Krebs, Flechten, Krätze, Kopfgrind und einer Menge anderer Krankheiten des Hautgewebes. Auch hat man es als Gegengift gegen Arsenik und Blei benutzt. — Gabe, fünf bis fünfzehen oder zwanzig Gran.

Säuren und säuerliche, metallische oder erdige Salze dürfen nicht damit verbunden werden, da sie es zersetzen würden.

Hydrosulphas s. Hydrosulphuretum Potassae (*Gr.*): Sulphureti Ferri artific. uncias quatuor, solve in Acidi muriat. unc. octo antea cum Aquae octariis duobus cum dimid. diluti et Gas inde enatum in lagena Aquam Potass. puram continentem excipe.

Pulvis ad s. contra ptyalismum s. salivationem. (*Bo. Sm. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Sulphureti Potassii
scrup. quatuor.
Cremoris Tartari drach. quatuor.
Divide in partes viginti quatuor. — Hahnemann empfahl dieses Pulver gegen Mercurialspeichelfluß. Der Kranke nimmt drei Stück, Morgens, Mittags und Abends, in einem halben oder ganzen Glase Zuckerwasser. Ungeachtet aller Lobeserhebungen, oft sehr unwirksam.

Colley's depilatory (*Re.*): E Sulphureto Potassae et Calce. — Nicht sicher.

Pilulae Sulphureti Potassae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Sulphureti Potassae
grana quindecim.
Saponis medicinalis . drachmam.
Balsami Peruviani . . . q. s.
ut fiant pil. no. 30. 3 Stück alle 4 Stunden bei Hautübeln, oft mit einer Tasse heißem Wachholderthee ½ Stunde nach dem Einnehmen.

Pilulae Carbonum kalinae. (*Au. Va.*)

℞. Sulphureti Potassii drach. unam.
Extracti Cardui benedicti,
Carbonis pulv., sing. drach. duas.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, funfzehen bis zwanzig Stück täglich viermal, bei Lungenschwindsucht.

Sapo sulphurato-ceratus s. antisialagogus Singeri. (Ba.)

℞. Sulphureti Potassii partem unam.
Aquae bullientis . . partes duas.
Dissolve et adde
Cerae flavae . . partem unam.
Consume, agitando continue, donec massa non amplius digitis adhaereat; tunc in modulos chartaceos effusam refrigefac.

Linimentum saponato-hydrosulphuratum, Unguentum s. Pomatum de Jadelot s. saponaceo-hydrosulphuratum s. antipsoricum. (B⁺. Gal. LH. *Au. Ca. Fi. Va.* Hosp. Inf.)

℞. Sulphureti Potassii . uncias sex.
Diem antea in Aquae ponderis tertia parte solutum tritura cum solutione e
Saponis albi rasi . libris duabus
in Olei Papaveris libris quatuor et adde
Olei essent. Thymi . drach. duas.
Bei Krätze empfohlen. — Gabe, eine Unze auf die Einreibung. (B⁺. *Au. Ca.*)

LH. easdem quantitates, sed Oleum Olivarum et Lavandulae; — *Va.* Saponis et Olei Oliv., sing. partes aeq.

℞. Saponis comm. part. quinquaginta.
Liqua in balneo aquae in vase vitreo et adde
Olei Papav. part. viginti quinque.
Commisce triturationis ope intime et adde deinde
Sulphureti Potassii pulv.
part. decem.
Tritis bene, adde
Olei Papav.
part. septuaginta quinque.
Misce sedulo (Gal.)

Ra. Sulphureti uncias sex, Aquae duas, Saponis libras duas et Olei Olivarum tantidem.

Henry (GalH.) Saponem in Aquae parva quantitate mollefacere, evaporare in balneo aquae, addere deinde Oleum per portiunculas, mixturam agitare, semper in aquae balneo, donec bene sit homogenea, infundere illam deinde in patinam vernice obductam et cum ea, pistilli lignei ope continue agitando, Sulphuretum sensim commiscere.

Mit diesem Präparat hat das *Unguentum Sulphuris cum Potassa* (LH.) oder das *Pomatum sulphuro-alcalinum* Alibert's Aehnlichkeit, welches ebenfalls bei der Behandlung der Krätze angewendet und aus zwei Theilen Schwefelblumen, einem Theil gereinigter Potasche und acht Theilen Schmeer bereitet wird. (*Ra.*)

Unguentum s. Pomatum ad scabiem.

℞. Sulphuris sublimati partes duas.
Potassae Subcarbonatis
partem unam.
Axungiae . . . . partes octo.
Misce. — Morgens und Abends auf alle krätzige Stellen einzureiben. — Man

giebt dabei eine bittre und ſchwach toniſche oder eine kühlende Tiſane, je nachdem der Kr. jung und ſtark, oder alt und ſchwächlich iſt, und läßt außerdem täglich oder alle zwei Tage ein einfaches Bad nehmen. (Hôp. St. Louis.)

Pomatum contra tineam (*Va.* Hosp. St. Lud.) Sulphureti Potass pulv., Subcarbonat. Sod., sing. drachmas tres, Axung. purif. unc. tres. — Täglich den abgeſchornen und durch Cataplaſmen von den Cruſten befreiten Kopf einzureiben und dann mit Fließpapier zu bedecken.

Sulphuretum Potassae martiale. (Per.)

℞. Kali subcarbonici,
Sulphuris, sing. . unciam unam.
Aethiopis martialis drachm. duas.

Liquata in crucibulo supra laminam marmoream effunde et post refrigerationem in frusta frange. — In drei- oder viergranigen Pillen oder zu einem Scrupel in zehen Unzen Waſſer, löffelweiſe genommen.

Emplastrum resolvens et anticancrosum. (*Bo.*)

℞. Sulphureti Potassii,
Pulv. Cicutae, sing. drach. duas.
Camphorae pulveratae,
Terebinthinae, sing.
drach. quatuor.
Saponis albi . . semidrachmam.
Cerae flavae . . unciam unam.
Emplastri simplicis uncias quatuor.

Zur Auflöſung lymphatiſcher Drüſengeſchwülſte empfohlen.

Solutio Hepatis Sulphuris. (Ham. LH.)

℞. Kali sulphurati . . semunciam.
Aquae destillatae . . uncias tres.
Solutionem filtra.

LH. Kali scrupulum unum, Aquae sesquilibram. — Vom Dr. Rollo mit vielem Nutzen bei Diabetes mellitus angewendet.

Aqua Kali sulphurati, Potio sulphurosa. (*Au Va.*)

℞. Kali sulphurati, drachmam unam.
Aquae . . . . libram unam.
Sacchari . . drachmam unam.

Va. Sacchari . . drachmas duas.

Als Gegengift bei Arſenikvergiftung empfohlen.

Potio ad s. contra herpetem. (*Ca.*)

℞. Sulphureti Potassii
grana quadraginta.
Aquae . . . . . libram unam.
Solutionem filtra.

Lotio hydrosulphurosa acida.

℞. Sulphureti Potassae unc. quatuor,
Acidi sulphurici . . semunciam.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Zweimal täglich zu waſchen, mit einer kleinen Quantität anfangend. (*Dupuytren.*)

Balneum sulphuratum s. sulphurosum. (*B. Ra. Va.*)

℞. Sulphureti Potassii uncias duas.
Aquae communis quantum sufficit pro balneo, circiter libras centum.

Va. Hosp. Inf. dimid. solum Sulphureti quant.

Balneum antipsoricum Hôt. D. semilibram pro Aquae indicata quant. continet. (*Va.*)

Balneum sulphuratum et gelatinosum Dupuytrenii. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Sulphureti Potassii uncias quatuor.
Aquae communis libras ducentas.
Solutioni infunde
Collae flamand. alb. . libras duas dissolutas in
Aquae bullientis . libris decem.

Balneum resolvens. (*Sm.*)

℞. Sulphureti Potassii unciam unam.
Salis marini . . . uncias duas.
Sodae . . . drachmas quatuor.
Fol. Salviae
manip. unum ad duos.
Coque omnia per horas 24 in
Aquae communis . octariis sex.

In Waſchungen, Douchen oder Bähungen bei spina ventosa oder Scropheln. Iſt Eintauchen möglich, ſo muß dieß eine halbe Stunde lang dauern und drei- oder viermal täglich wiederholt werden.

Syrupus de Sulphureto Potassae s. Sulphuris s. Kali sulphurati, Arcanum bechicum Willisii, Syrupus Hepatis Sulphuris s. bechicus. (*B*. Gal. Wir. Au. Br*. Ca. T. Va.*)

℞. Sulphureti Potassae . semunciam.
Aq. Hyssopi vel Foeniculi
semilibram.
Sacchari albi . uncias quindecim.

Dissolve sulphuretum frigide et saccharum in balneo aquae solve. (Gal.)

*Br**. Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi uncias octo et Sacchari uncias quindecim; — *T.* Sulphureti semunciam, reliqua ut *B**.; — *Ca.* Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi semilibram et Sacchari libram unam.

℞. Sulphureti Potassae . semunciam.
Aq. fontanae,
— Foenic., sing
unc. quatuor c. dimidia.
Solutioni adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

Coque ad syrupi consist. et cola. (*B°. Wir. Au.*)

Willis digerere jubebat Sulphureti uncias duas in Vini Hispanici libris tribus per horas 24, liquorem filtrare et in illo solvere Sacchari libras duas. (*Ca.*)

Boullay et Planche proposuerunt:

℞. Potassae purae cum Alcohole paratae . . . drachmam unam.
Aquae destillatae drach. quinque.

Calefac et adde Sulphuris puri tantum quod dissolvi potest; liquidi unciam unam cum Syrupi communis unciis triginta et una commisce et mixturam in lagena bene obturata agita.

Von Chaussier bei catarrhalischen Lungenaffectionen und Croup empfohlen. Befördert die Schleimsecretionen, bewirkt bisweilen Erbrechen oder Stühle und begünstigt die Ausdünstung. — Gabe, einen Kaffeelöffel für Kinder, einen oder zwei Eßlöffel für ältere Personen.

Solutio Sulphureti Potassae alcoholica. (Vm.)

℞. Sulphureti Potassae sicc. q. vis.
Alcoholis . . quantum sufficit.

Dissolve blandi caloris ope, liquorem post refrigerationem filtra et in lagena in collum inversa serva.

Vm. hoc praeparatum iterum sub nomine *Tinctura Sulphuris* (Teinture de soufre) indicat parandum dissolvendo Sulphureti Potassae partem unam in Aquae Vitae duodecim. Eadem ipsa Tinctura Sulphuris etiam a Sar. *Gr* et *Sp.* — Sar. Sulphuris uncias duas cum Subcarbonatis uncia una liquare et productum contusum cum Alcoholis libra una digerere; — *Gr.* Hepatis Sulphuris uncias duas, Spirit. tenuioris libram; — *Sp.* eodem modo procedit sed productum per dies aliquot cum Alcoholis unciis octo digerere. — Ehedem wurde diese Tinctur gegen Krätze empfohlen. — Gabe, sechszig Tropfen.

Lotio Potassae Sulphureti. (Re.)

℞. Sulphureti Potassae . semunciam.
Aquae Calcis . . . octarium.

Contere. — Bei psora, porrigo, lepra etc.

Boli in ptyalismo mercuriali s. contra salivationem. (B. Va.)

℞. Sulphureti Potassae . grana tria.
Roob Sambuci . quantum sufficit.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Subprotocarbonas Potassii, Subcarbonas Protoxydi Potassii, Subcarbonas Potassii.

§. I. Im festen Zustande.

A. Unrein.

Carbonas Potassae venale s. impurum s. alcalinus s. kalicus crudus s. e Lixivio cinereo, Cineres clavellati et perlati, Cinis infectorius, faecum, Alumen faecum, Cineres Russici etc., Carbonas Lixiviae alcalinus, Alcali vegetabile aëratum, Hypercarbonas Potassae venale, Kali carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alcali fixum vegetabile impurum, Potassa impura s. venalis, Subcarbonas Potassae impurus s. crudus s. kalicum impurum; käufliches, unreines, kohlensaures Kali, rohe Pottasche; Potasse, Potasse du commerce (*Gal.*). (Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.*)

Dieß ist ein Gemisch von kohlensäuerlichem, schwefel- und salzsaurem Kali, Kalk und Magnesia, Kieselerde, Eisenoxyd und bisweilen von Braunsteinoxyd in sehr verschiedenen Verhältnissen

Cineres herbarum, ash balls (*Gr.*) Vorzüglich die Asche von Farnkräutern.

B. Rein.

1) Reinigen der käuflichen Pottasche.

Kali praeparatum s. carbonicum, Lixivia purificata, Cineres clavellati depurati, Sal Cinerum clavellatorum depuratus, Subcarbonas Potassae s. Kali s. kalicum depuratum, Alcali Lignorum depuratum, Carbonas Potassae s. superpotassicus purus s. depuratus; gereinigte Pottasche, kohlensaures Kali; Potasse préparée, purifiée (*Gal.*). (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. GalM Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. R. Sax. Suec. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Potassae venalis pulveratae,
Aquae frigidae, sing. part. aeq.

Misce, subinde agitando, sepone deinde per dies septem aëri exposita, cola, et in vase ferreo, continue agitando, ad siccum consume. (An. Bel. Du. Ful. Han. Hass. Li. R. Sax. *Pid. Sp.*)

℞. Potassae venalis . partem unam.
Aquae bullientis . . partes tres.

Coque per horae quadrantem, liquorem adhuc calidum decantha, et sepone per horas 24 in patina ut sales subsideant; cola, ad dimidium consume,

ad locum frigidum repone et ad siccum usque deinde vapora. (Ba. Bor.)

Bor4. Kali carbonici crudi partem unam cum Aquae ferv. duabus ad cuticulam evaporare, per aliquot dies seponere, liquorem a crystallis decanthare et ad siccum evaporare, Aquae dest. frigidae aequali quantitate solvere, solutionem filtrare et leni calore ad siccum evaporare; — HassP. Salis et Aquae part. aeq. macerare donec dilapsa sint, liquorem ad cuticulam evaporare etc. ut antea; — *Fi. T.* Salis partem unam, Aquae quatuor, caeterum ut HassP.; — Lon. LonN. *Re.* Potassae libras tres in Aquae ferv. octariis tribus cum dimidio liquare, colare, lente consumere ut liquor spissescat, dein igne subducto assidue agitare, donec sal in granula abeat; — *Gr.* Potassae et Aquae pondus aequale.

℞. Potassae venalis . partem unam.

Calcina fortiter in crucibulo ferreo et infunde deinde per tres dies in

Aquae . . . . . partes tres, subinde agitando. Decantha, lava residuum, donec aqua colores vegetabiles coeruleos non amplius virides reddat, liquores commixtos ad pelliculae apparitionem consume, per aliquot dies sepone, decantha, sales alienos separa et reliqua vaporando ad siccum redige. (Ams. Bel. GalM. Lon. Wür.)

Ed. *C.* et *Sw.* Aquae et Salis partes aequales; — Fenn. et *Sw.* Potassae partem unam et Aquae unam cum dimidia.

℞. Potassae venalis,
Aquae frigidae, sing.
partem unam.

Stent, subinde agita, per horas 24; filtra deinde et ad siccum consume; residuum, usque rubro-album coloretur, calefac in crucibulo, dissolve deinde in Aquae parte una cum dimidia, filtra liquorem et eo lente refrigerato, altero die crystallos formatas separa et sicca. (*Vm.*)

Wenn man nach *Vm.* die käufliche Pottasche dadurch reinigt, daß man die Auflösung bis zum Salzhäutchen abdampft, um den crystallisirbaren Salzen ihr Waſſer zu entziehen, ſo kann man ſo viel von dieſen ſogenannten frembartigen Salzen trennen, daß am Ende kein Alcali übrig bleibt. Bei Befolgung des eben beſchriebenen Verfahrens hat derſelbe die Cryſtalliſationsfähigkeit des kohlenſauren Kali erkannt.

Unter dem Namen *Gallatocarbonas Potassae*, Gallato-carbonate de potasse hat man ein Präparat beſchrieben, welches für ein neutrales kohlenſaures oder doppelt kohlenſaures Salz ausgegeben wird, in der That aber nur ein kohlenſäuerliches Salz iſt; die Formel dazu iſt folgende:

℞. Subcarbonatis Potassae quant. vis.

Dissolve in Aquae quam minima potest quantitate, filtra liquorem et tannini ope in pastam siccam redige, quae in crucibulo per horam dimidiam fortiter ad ruborem usque candeat; post refrigerationem massam in Aqua dissolve et liquorem filtratum ad siccum consume. (*Sw**. *Vm.*)

2) Bereitung des Salzes durch Verbrennung des Weinſteins.

Sal Tartari, Sal Tartari alcalinus ex Tartaro combusto, Cineres clavellati, Alcali Tartari s. vegetabile, Carbonas s. Subcarbonas Potassae s. Potassae e Tartari Crystallis s. Potassae purissimus, Subcarbonas Deutoxydi Potassii, Alcali vegetabile aëratum, Kali carbonicum s. Carbonas kalicus e Tartaro, Kali praeparatum e Tartaro s. e Tartaro s. subcarbonicum purissimum, Subcarbonas Potassae e Tartaro s. purissimus; Weinſteinſalz; Sel de tartre, Cendres clavelées (*Gal.*). (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

℞. Crystallorum Tartari quantum vis.

Ad ruborem usque calefac in crucibulo argenteo, donec fumus non amplius evolvitur, residuum grossiuscule pulveratum in illo ipso crucibulo, saepius agitando, per horas duas torre, coque deinde cum Aquae duplo pondere per horae quadrantem; decantha liquorem clarificatum, quam operationem ter e serie repetes, filtra lixivia commixta, ad siccum in pelvi argentea consume, sub finem saepius agitando, et denique ad rubrum usque calefac massam penitus refrigeratam in lagena bene obturata servando. (Du.)

Ba. Fenn. et Sax. Crystallos Tartari itidem praescribunt; omnes reliquae pharmacopoeae indicant vel Tartarum crudum vel Residuum e destillatione tartari et priorem in crucibulo vel aheno ferreo vel denique inter prunas in charta involutum ad alborem calcinari et donec nullum fumum amplius emittet; — Pm. carbonibus comburere, donec nullus fumus evolvatur, massam frigefactam Aqua pluviali lixiviationi subjicere, lixivium filtrare et liquorem ad siccum redigere; — HassP. itidem ad alborem et donec sine flamma seu fumo candeat urere, residuum adhuc calidum,

Digitized by Google

pulveratum in Aquae bull. sextuplo solvere, filtrare, per horas 24 seponere et ad siccum consumere jubet.

GalH. melius procedi dicit miscendo Tartarum cum quarta parte Carbonis vegetabilis pulv. et mixta in parva crucibula inter strata carbonum disposita ingerendo.

3) Bereitung des Salzes durch Einäſchern des Salpeters mit Kohle.

Nitrum (a. Carbonibus) fixum. (Gal. Sar. *Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Nitri puri . . . quantum vis.

Liqua in crucibulo, in illud injiciendo per vices Carbonem grossiuscule pulveratum, donec flamma non amplius appareat; residuum deinde calcina per horae quadrantem, dissolve in Aqua et filtratum liquorem ad siccum consume.

GalH. calcinare fortiter ut remaneat hyponitris, saepius in producto occurrens.

4) Bereitung des Salzes durch Einäſchern des Salpeters und des Weinſteins.

Nitrum per Tartarum fixum, Subcarbonas Deutoxydi Potassii purus, Sal Tartari depuratus, Fluxus albus. (Fer. Gal. Pm. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Nitri puri,
Cremoris Tartari, sing. part. aeq.

Ingere mixta in mortarium ferreum, accende carbonem ardentem appropinquando, dissolve residuum in Aquae q. s. et liquorem colatum ad siccum consume. (Fer. Gal. Pm. *Fi. Gr.*)

T. Cremoris Tartari crudi partes duas et unam Nitri in crucibulo per aliquot tempus igni exponere, agitare, deinde in laminam marmoream effundere et post refrigerationem cum Aqua bull. tractare etc.; — LH. Nitri partem unam, Tartari crudi duas; — *Vm.* Tartari partem unam et duas Nitri. — Dieſe Formel iſt der des Codex gall. vorzuziehen, welche ein mit Salpeter gemiſchtes Salz giebt.

Man muß übrigens das Gemiſch in einen kaum gerötheten Schmelztiegel werfen, die Maſſe ſogleich nach dem Einäſchern auslaugen und die Flüſſigkeit bis zur Trokkenheit abdampfen. Bewirkte man, ſtatt ſo zu verfahren, die Einäſcherung bei hoher Hitze, ſo daß das kohlenſäuerliche Kali in einen Zuſtand teigiger Schmelzung gebracht würde, ſo erhielt man letzteres, nach Guibourt's intereſſanter Bemerkung, mit blauſaurem Kali gemiſcht.

5) Bereitung des Salzes durch doppelte Zerſetzung:

℞. Carbonatis Barytae unc. duodecim.
Sulphatis Potassae unc. quindecim.
Pulveratis infunde
Aquae bull uncias viginti quatuor.

Mixta agita bene, post refrigerationem liquorem filtra et ad siccum redige. (*Sw**)

6) Bereitung des Salzes durch Verbrennen von Pflanzen (Alumen catinum):

Carbonas Potassae Absinthii, Sal Absinthii s. Tachenianus, Sal lixiviale Tachenii. (Br. Ful. Gal. His. His3. Pal. Sar. Wir. Wür. *Re. Sp. T.*)

℞. Herbae siccae Absinthii . q. vis.

Ingere in ollam ferream tectam igni modico superponendam, ita ut lente uratur et magnam fumi copiam sed minime flammam emittens in carbonem redigatur; tunc operculo semoto carbonem torre, continue cum baculo agitando; coque cinerem cum Aquae pondere sextuplo, cola liquorem bullientem et ad siccum consume.

His3. Herbam mediocriter siccam in aëre libero sensim in cineres albos comburere, hos aqua pura et ferventi elixare, filtrare, igne moderato ad siccum vaporare, ad albedinem urere et si opus fuerit, solutionem, filtrationem et vaporationem repetere.

Auf dieſelbe Weiſe wie dieſes *Sal Absinthii* bereitet man das

Sal s. Carbonas Potassae Cardui benedicti. (His. His3. Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Centaurii minoris. (A. Gal. His3 Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Ligni Juniperi. (Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Ononidis (Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Tamarisci. (Sar.)
Sal Stipitum Fabarum. (Sar.)

Das in dieſen Fällen erhaltene Kali führt den Namen der Pflanze, von welcher es gewonnen iſt; jedoch iſt es darum immer daſſelbe

Ful. coquere Carbonem productum e combustione Absinthii sicci unius libraе cum Potassae purificatae unciis duodecim in Aquae q. s. dissolutis, et decoctum ad siccum evaporare. — Ein lächerliches Verfahren.

Man darf das kohlenſäuerliche Kali nicht mit Mineralſäuren, mit Borax, mit ſalzſaurem und eſſigſaurem Ammoniak, mit Alaun, ſchwefelſaurer Bittererde, Kalk, Kalkwaſſer und nicht mit Metallſalzen verbinden.

Sal Tartari purissimum (HassP.) ut sal sodae puriss. (quod vide) sed cum

serva foliata Tartari et Sale Tartari parat.; lixivium elutriatione carbonis residui obtentum et filtratum ad siccum inspissetur et sal residuum servetur; — reagens.

Sapo vegetabilis, Pulvis gummosus alcalinus. (*Gal.*)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati partes quatuor.
Gummi Arab. pulv. part. triginta duas.
Tritura simul per longum tempus.

Pulvis anticolicus Camerarii. (Wir.)

℞. Salis Absinthii,
— Chamomill., sing. drachm. tres.
Crystalli rupestris praep. semunciam.
Cornu Cervi praep. drachmas sex.
Rasurae Eboris . . uncias duas.
Fiat pulvis tenerrimus. — Camerarius rühmte dieses Pulver bei Krankheiten von Säure in den ersten Wegen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel für Erwachsene, ein halber Scrupel für Kinder.

Pulvis digestivus. (Pal.)

℞. Salis Absinthii drachmas decem.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Kali sulphurici,
Diagrydii sulphurati, sing. scrupulos duos et grana quinque.
Elaeosacchari Citri unciam unam.
Fiat pulvis. — Bei Unterleibsverstopfungen empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Liquor Potassae Subcarbonatis s. Salis Tartari s. Kali carbonici s. Kali subcarbonici, Liquamen Salis Tartari, Hypocarbonas Potassae liquidum, Lixivium Tartari s. Alcali vegetabilis, Aqua Kali s. Potassae Subcarbonatis s. Subcarbonatis Kali, Alcahest Glauberi, Carbonas Lixiviae alcalinus solutus s. Potassae alcalescens liquidus, Solutio aquosa Subcarbonatis Potassae, Subcarbonas Deutoxydi Potassii solutus; flüssiges Weinsteinsalz, kohlensäuerliche Kaliflüssigkeit; Solution aqueuse de sous carbonate de potasse, Liqueur de sel de tartre (*Gal.*).

1) Von selbst entstanden. *Oleum Tartari per deliquium, Sal Tartari per se liquidus.* (Br. Du. Hass. Pal. RC. Sar. Wir Würr. *Fi. Gr. Pid. Re Sp. Sw. T.*).
Obtinetur seponendo Subcarbonatem crystallisatum ad locum humidum (cavam) ita ut deliquescat, et liquorem filtrando.

2) Besonders bereitet. Da der Sättigungsgrad dieser Flüssigkeit unendlich verschieden ist, wie man leicht einsehen wird, so hat man vorgeschlagen, sie mittelst bestimmter Verhältnisse des Salzes und des Wassers zu bereiten, nämlich:
His. His3. Salis partem unam et Aquae dimidiam; — Am. An. Lon. LonN. Pm. *C. Gr. Re. Va.* Salis et Aquae part. aeq.; — *Sw. Vm.* Salis unam et Aquae unam cum dimidia; — A. Ba. Bor. Bor4. D. Fenn. HassP. Li O. Pol. Sax. Suec. Aquae duas (Pond. spec. 1,325—1,335 Bor4.; 1,300 = 40° Ar. B. HassP.); — Lus. R. RC. Aquae tres; — Wir. Aquae quatuor vel quinque; — Ful. Aquae q. s.
Diese Auflösung wird äußerlich als Schönheitsmittel angewendet; innerlich als absorbirend, reizend, einschneidend, reinigend und harntreibend.

Liquor Salis Tartari purissimi (HassP.): Salis drachmas duas, Aquae destillat. unciam; reagens.

Julapium Subcarbonatis Potassae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Liquoris Subcarb. Potassae drachmas sex.
Aquae Menthae . . uncias octo.
Misce. — ½ bis 1 Unze täglich 2 oder 3 Mal in einem passenden Vehikel.

Solutio lithontriptica. (B⁶. *Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas novemdecim et grana duodecim.
Aquae communis uncias quindecim.
Dissolve. — Gabe, einen bis zwei Scrupel täglich drei Mal. (B⁶.)
Au. Subcarbonatis drachmas tres, Aquae libras duas; solve. — Täglich zu trinken.

Lotio antirachitica Bonhomme. (*Pie.*)

℞. Kali subcarbonici calcinati semunciam ad unciam unam.
Aquae purae . . libram unam.
Dissolve.

Pediluvium alcalinum. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Kali subcarbonici . uncias octo.
Aquae comm. calidissimae q. s. pro pediluvio. — Reizend, ableitend.

Tisana alcalina Mascagni. (*Sm. Va.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.
Dissolve. — In vier und zwanzig Stunden zu kleinen Löffeln, jeden mit einem Kaffeelöffel syrupus gummi arabici, althaeae oder pulmonis vitulini versüßt. Mascagni empfahl sie bei chronischer Pneumonie.

Potio lithontriptica. (*E.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae Calcis . . octarios duos.
Gabe, alle zwei Stunden ein Glas in Milch.

Mixtura diuretica. (*Gr.*)

℞. Infusi Gentianae compositi sesquiunciam.
Potassae Subcarbonatis grana decem.
Spiritus Aetheris compositi semidrachmam.
Tincturae Cinnamomi drachmam.
Auf eine Gabe.

℞. Potassae Subcarbonatis scrupulum.
Succi Limonum semunciam, vel q. s.
Aquae Cinnamomi . . unciam.
Aceti Scillae . sesquidrachmam.
Tincturae Opii . guttas quinque.
Syrupi Aurantiorum semidrachmam.
Auf eine Gabe zweimal täglich.

Lixivium juniperinum s. cum Junipero. (*Sa.*)

℞. Cinerum Ligni juniperini unc. tres.
Aquae communis . libras duas.
Digere per horas duodecim inter cineres calidos et filtra.
Auf dieſelbe Weiſe bereitet man das *Lixivium Absinthii*, *Genistae* und *Tamarisci*.

Tisana antidysenterica. (*Sm.*)

℞. Cinerum Sarmentorum Vitis viniferae . . . drachmas quatuor.
Aquae communis sextarios (setiers) tres cum dimidio.
Coctione partem tertiam consume. — In vier und zwanzig Stunden zu trinken. — Man vermiſcht dieſen Trank mit einer gleichen Menge Waſſer.

Collutorium alcalinum. (GalM. *Va.* Hosp. milit.)

℞. Kali subcarbonici partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.
Tritura simul in mortario vitreo.

Syrupus alcalinus. (Gen.)

℞. Kali subcarbonici drachmas tres.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Dissolve.

Lotio ad s. contra perniones. (B*. *Va.*)

℞. Kali subcarbonici unciam unam.
Aquae Rosarum . libram unam
Solutionem filtra. — Brugnatelli empfiehlt Leinen in dieſe Flüſſigkeit zu tauchen und auf die Froſtbeulen zu legen.

Potio ad strumam s. antistrumosa. (*Sm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Ipecacuanhae,
Mercurii dulcis, sing. sesquidrach.
Aquae . . . . octarium unum.
Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe, zwei Eßlöffel in einer Pinte Tiſane, den Tag über.

Potio absorbens. (*Au. E. Va.*)

℞. Magnesiae subcarb. drach. unam.
Aquae uncias quinque cum dimidia.
Tinct. Cinnamomi drachmas tres.
Subcarbonat. Potassae liq. drach. unam.
Gabe, zwei oder drei Löffel nach der Mahlzeit. (*Au.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Sacchari albi, sing. drach. unam.
Tinct. Lavandulae comp. drach. duas.
— Opii . . guttas quatuor.
Aquae Menthae . uncias quatuor.
Gabe, alle Stunden oder zwei Stunden einen Löffel.

Potio antispasmodica. (*Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, indem man in den Zwiſchenräumen zehen Tropfen laudanum giebt. — Bei Convulſionen, zugleich mit Klyſtiren von zwei Scrupel kali subcarbonicum in einem Chamillenaufguß und Epithemen von einer Auflöſung einer Unze kali caust. in zwei Pfund Waſſer von Deutſchen Aerzten mit Nutzen angewendet.

Aqua kalino aetherea, Potio antiasthmatica. (*Au.*)

℞. Kali subcarbonici drachmam unam.
Aquae Menthae pip. unc. quatuor.
Liquoris Hoffmanni scrupulos duos.
Syrupi Sacchari . semunciam.
Gabe, ein Löffel, bei Aſthma.

Mixtura s. Potio saponacea. (*Au. Va.*)

℞. Liquor. Kali subcarb. semunciam.
Olei Amygdal. dulc. sesquiunciam.
Aquae . . . . uncias decem.
Syrupi emulsivi . unciam unam.
Löffelweiſe alle halbe Stunden, bei Arſenikvergiftungen.

Mistura cosmetica. (*Gr.*)

℞. Olei Amygdalarum uncias quatuor.
— Tartari per deliquium uncias duas.
— Rhodii . . guttas quatuor.
Misce. — Reinigt die Haut, macht ſie aber empfindlich.

Lotio saponacea (*Gr*): Ol. Oliv. unc. 4, Ol. Tart. p. deliq. unc. ½, contere et adde Aq. Ros. unc. 12. — Schönheitsmittel.

Potio expectorans. (*E.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrup. unum.
Coccionellae . . semiscrupulum.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll alle zwei oder drei Stunden, bei'm Keuchhusten.

Decoctum Carbonatis Potassae Absinthii s. febrifugum, Febrifugum salsum. (His. His3.)

℞. Salis Absinthii drachmam unam.
Mellis electi . uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque, despuma bene et cola.

Mixtura alcalina. (*Sm.*)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 4.
Tere, sensim affundendo,
Aquae bull. octarium (chopine).
Emulsioni adde
Olei Tartari per deliquium guttas decem ad scrupulum unum.

Eßlöffelweise alle Viertelstunden und selbst öfter. — Man hat es bei Sublimatvergiftung empfohlen.

Mistura diaphoretica. (*Gr.*)

℞. Potassae Carbonatis grana decem.
Misturae Camphorae unciam unam.

Auf ein Mal mit Limoniensaft, während des Aufbrausens.

Potio repellens s. antilactea. (*Sm. Va.*)

℞. Subcarb. Potassae scrup. unum.
Aquae Tiliae . . . uncias sex.
— Flor. Aurant. unciam unam.
Syrupi Althaeae . uncias tres.

Löffelweise in vier und zwanzig Stunden zu verbrauchen, indem man die Brüste mit einer starken Auflösung von Seife in einer Abkochung der Mohnköpfe bäht.

Potio antiscorbutica. (*B.*)

℞. Subcarbon. Potassae drach duas.
Aquae Cochleariae . uncias sex.
— Flor. Aurant. semunciam.
Syrupi Erysimi . unciam unam.

Potio diuretica. (*Sm. Sw.*)

℞. Salis Genistae gr. viginti quatuor.
Succi Cerefolii depur. cochlearia 24.
— Millepedum . . no. 100.
Misce bene. (*Sm.*)

℞. Subcarbonat. Potassae gr. decem.
Oxymell. scill. t. sesquidrachmam.
Tinct. Lavand. comp. semidrachmam.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Misce. (*Sw.*)

Linimentum alcalinum. (Wür. *Sp. Va.*)

℞. Subcarb. Potassae liq. unc. duas.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Misce sedulo. — Plenck empfahl es bei Schrunden.

Julapium leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aquae Florum Tiliae,
— Rosarum, sing. unc. quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Cort. Aurant. unc. unam.

Auf drei oder vier Mal in vier und zwanzig Stunden, in einem passenden Behikel.

Tisana diuretica. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Gummi Arabici drachmas quinque.
Saponis medicin. semidrachmam.
Subcarb. Potassae . sesquidrach.
Nitrat. Potassae gr. viginti quatuor,
Infusi Juniperi . . libras duas.

Von Récamier in verschiedenen Fällen von Wassersucht nützlich befunden.

Lac infantum. (*Pie.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrup. unum.
Aquae Florum Tiliae uncias duas.
Aquae Cerasorum nigrorum,
Olei Amygd. dulc., sing. unc. unam.
Vitellos Ovorum recentium no. 3.
Mucilag. Gummi Arab. drach. unam.

Emulsio ad s. contra lumbaginem. (*Ca.*)

℞. Subcarb. Potassae semidrachmam.
Aquae communis . uncias decem.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum . quantum satis.
Olei Amygd. dulc. sesquiunciam.
Syrupi Althaeae . uncias duas.

Glasweise alle halbe Stunden.

Potio purgans et febrifuga. (*Ca.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrup. unum.
Olei Ricini . . . uncias duas.
Tritura in mortario vitreo et adde
Syrupi Capilli Veneris semunciam.
Aquae Menthae pip. uncias tres.

Auf zwei Mal im Zwischenraum einer halben Stunde.

Fomentatio resolvens. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Saponis Massiliensis, sing. unciam.

Aquae Sambuci . . libras duas.
Solutioni filtratae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum antipsoricum. (*E.*)

℞. Subcarb. Potassae . semunciam.
Aquae Rosarum,
Cinnabaris, sing. . unciam unam.
Olei ess. Bergamottae semunciam.
Florum Sulphuris,
Axungiae, sing. . uncias novem.
Misce triturando.

Tinctura antiarthritica. (Br.)

℞. Lumbricorum terrestr. cum Oleo Tartari per deliq. in pulpam redact. . . . . unc. unam.
Radicis Aristolochiae rotundae,
— Juniperi, sing. semunciam.
Extr. Chamaepityos . drach. tres.
Castorei,
Croci,
Subcarb. Potassae, sing. drach. duas.
Spir. Cochleariae unc. duodecim.
Post sufficientem infusionem cola exprimendo.

Collyrium rubrum. (*Bo. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Subcarbonatis Potassae grana 25.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Chelidonii maj. unc. duas.
Digere per horas 24 ex arena, filtra deinde liquorem et adde
Tinct. Aloës gutt. viginti quatuor.

Gegen Hornhautflecken empfohlen. — Man tröpfelt einige Tropfen davon in's Auge.

Julapium stomachicum, Mixtura Carbonatis Potassae Absinthii stomachica. (His.)

℞. Salis Absinthii scrupulos quatuor.
Aquae Corticis Citri,
— Menthae,
— Absinthii, sing. unc. quatuor.
— Cinnamomi . uncias duas.
Solutioni adde
Tinct. Ligni Aloës drach. duas.
Syrupi Cort. Citri unciam unam.
Reizend. — Löffelweise zu nehmen.

Tinctura antisyphilitica Besnardi. (B*. *Au. Bo. Sw*. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partes duas.
Aquae Cinnam. vinos. part. viginti.
Maceratis adde
Gummi Arabici . . partes duas
Subcarb. Ammoniaci part. unam.
— Potassae . partes quatuor.
Post unum diem blandi caloris ope digestionem filtra. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae Cinnam. simpl., sing. libr. unam.
Opii . . . . . uncias duas.
Aquae Cinnam. vinos. unc. quatuor.
Stent in digestione per septimanas tres, saepius agitata, in balneo aquae, tum colaturae adde
Gummi Arabici . uncias duas.
Subcarb. Ammoniaci unc. unam.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Post aliquot dies filtra. (B*. *Bo.*)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Opii,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Triturata simul dissolve in
Aquae Chamomillae . unciis sex.
Adde deinde
Subcarbonatis Ammoniaci,
Aquae Vitae, sing. drachmas duas.
Digere in balneo aquae et post refrigerationem filtra. (*Sw*.*)

Au. Subcarbonatis Potassae semunciam, Aquae Cinnamomi uncias quatuor, Opii grana duo et Subcarbonatis Ammoniaci drachmam.

Gabe, ein halber bis zwei und vier Scrupel in Gersten- oder Zuckerwasser.

Tinctura antisyphilitica Talbotii. (*Au.*)

℞ Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Aquae Melissae unc. tres c. dimid.
Extr. Opii,
— Chelidonii, sing. scrup. unum.
Post horas 24 digestionis adde
Ammoniaci caustici drachmas duas.

Diese Tinctur, welche in der letzten Zeit von Eichheimer gerühmt wurde, hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen.

Potio incisiva. (*Bo.*)

℞. Subcarb. Potassae scrup. unum.
Coccionellae . . semidrachmam.
Aquae Hyssopi . uncias quatuor.
Syrupi Capitum Papaveris,
— Tolutani, sing. semunciam.
— Ipecacuanhae,
Aquae Flor. Aurant., sing. unc. unam.
Tritura simul coccionellam et sal, infunde aquam hyssopi fervidam; post refrigerationem filtra et adde reliqua. — Gabe, alle zwei Stunden einen Kaffee- oder Suppenlöffel, je nach dem Alter der Kinder, bei'm Keuchhusten.

Remedium antidiabeticum de Redfearn. (*Au.*)

℞. Chinae rubrae . unciam unam.
Aluminis calcinati drachmas tres.

Subcarb. Potassae . drach. duas.
Petrolei . . . quantum sufficit
ut fiat electuarium. — Gabe einer Muskatnuß groß, täglich dreimal. Zu gleicher Zeit nimmt man den Tag über eine Auflöſung von drei Drachmen sulphuretum potassae in ſechszehn Unzen Kalkwaſſer und vier Pillen, zu welchen die Formel folgende iſt:

℞. Sulphatis Sodae drachmam unam.
Saponis medicin. scrup. quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici
quantum sufficit
ut fiant pilulae triginta.

Unguentum Bardenii s. antipsoricum. (B. *Va.*)

℞. Subcarb. Potassae . unc. unam.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Axungiae Porci uncias quatuor.

Zu vier Einreibungen den Tag über.

Protocarbonas Potassii, Carbonas Protoxydi s. Deutoxydi Potassii, Sal Tartari alkalinus aëratus s. perfecte saturatum, Kali aëratum s. carbonicum neutrale, Kali carbonicum acidulum, Carbonas Potassae s. Potassae completum s. purissimus s. neutrum, Deutocarbonas Potassii, Alcali vegetabile crystallisatum s. perfecte saturatum, Bicarbonas Potassae; geſättigt kohlenſaures Kali; Protocarbonate de potassium, Carbonate de protoxide de potassium, Carbonate de potasse, Bicarbonate de potasse (*Gal.*). (An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. LH. Lon. LonN. Pm. Pol. Suec. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aquae communis . partes tres.

Post dissolutionem liquorem filtra et in eum immitte torrentem Gasis acidi carbonici. Post horas 24 (tres dies Bor4.) vaporata ad crystallisandum repone. (An. B. Ba. Bel. Bor4. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Pol. Suec. *C.*)

℞. Subcarb. Potassae libram unam.
— Ammoniaci . uncias tres.
Aquae communis octarium unum.

Potassae in aqua solutae ammoniacum adde, mixturam per horas tres temperaturae 130° F. (180°) balnei arenae expone, donec ammoniacum perfecte sit expulsum; tunc liquorem sepositum crystallisationi subjice. (GalH. Lon. *Va.*)

LH Salis prioris libram unam, secundi et Aquae destillatae, singulorum uncias quatuor et balneum arenae 100° F.

Dieſes iſt das Verfahren Berthollet's.

℞. Potassae per Alcoholem . q. vis.
Aquae destillatae pondus triplum.

Immitte torrentem Acidi carbonici in liquorem, donec perfecte sit saturatus, tunc evaporatum blandi caloris ope ad crystallisandum repone. (*Sw.*)

GalH. ut pulchrae crystalli obtineantur, suadet, liquorem magna Acidi carbonici copia saturatum, in quo jamjam est formata, ad trientes duos consumere et illum deinde per dies duos seponere; — Pm. Subcarbonatis Potassae libram unam, Aquae destillatae sex; solutioni gas acidum carbonicum Wulfiani apparatus vel compressionis machinae ope ad saturationem usque immittere, crystallos vaporatione spontanea obtentas siccare etc.; — *Fi.* Carbonatem Potassae liquidum (Oleum Tartari) adhibens torrentem Gasis immittere ut supra; — LonN. *Re* Per Liquoris Potassae Subcarbonatis congium torrentem Gasis transmittere ad plenam saturationem et vaporare, cavendo ne calor gradum 120 excedat; — *T.* praeter hunc agendi modum suadet Sal in vasis fictilibus vitreatis emanationibus Musti Uvarum vel aliorum fluidorum fermentantium exponere; — *Gr.* Subcarbonatis libram unam in Aquae tribus solvere et torrentem Gasis e Marmore et Acido sulph. extricatum transmittere.

Gal. tubum in solutionem immergi vult; — An. B. Ba. Bel. et *Vm.* ad ejus superficiem paene attingere.

HassP. ut sal sodae perfecte saturatum s. protocarbonatem sodae.

Gr. Cineres perlatos in Aqua solvere, addere Furfur vel Ligni Seobem et in crucibulo ad ruborum usque calefacere, post refrigerationem sal eluere, evaporare et in crystallos cogere, quamdiu crystalli exoriuntur, liquidum remanens cum novo Furfure calefacere et agere ut antea.

Aqua Carbonatis Potassae puri s. acidula s. Supercarbonatis Potassae s. aërata alcalina s. cum Carbonate Potassae acidula s. Oxycarbonatis aciduli Potassae s. Falconeri s. Supercarbonatis kalici, Aqua lithontriptica, Potio alcalina, Aqua mephitica alcalina; kohlenſaures Waſſer; Eau méphitique alcaline, Potion alcaline (*Gal.*). (Am. Bor. D. Ed. Fenn. GalH. His. His3. Pol. Suec. *Br. C. Fi. Re. Sw. Vm.*)

℞. Subcarb. Potassae puri unc. unam.
Aquae libras (octarios) decem.

Sale in Aqua dissoluto, torrentem Gasis acidi carbon per liquorem transmitte. (Am. Ed. Fenn. *Br. C. Re. Sw.*)

Fi. Carbonatis neutri drachmam unam, Aquae destillatae libram unam.

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas

Aquae communis . partes tres.
In lagenam octariorum trium capacem Acido carbonico repletam immitte et per longum tempus agita. (Bor. GalH. Pol.)

℞. Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aquae Acido carb. satur. libr. unam.
Dissolve et in lagena bene obturata serva. (D.)

Suec. Salis uncias tres et Aquae cum Gase saturatae libras quinquaginta sex.

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Aquae . partes centum viginti.
Satura solutionem numero desiderato atmosphaerarum Gasis Acidi carbonici. (*Vm.*)

℞. Carbon. neutr. Potassae unc. tres.
Aquae . . . uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (*Sw*.)

℞. Carbon. neutr. Potassae part. unam.
Aquae cum Acido carbonico saturatae . partes centum viginti.
Dissolve. (*Vm.*)

His. *Va.* Carbonatis neutralis drachmas tres et Aquae Gase impraegnatae libras duas; — His3. Carbonatis Potassae purissimi crystallisati semunciam in Aquae destillatae unciis triginta duabus dissolvere et huic solutioni Gas acidum carbonicum e Carbonatis Calcis vulgaris et Acidi sulphurici concentrati, singulorum semuncia paratum impellere.

Reizend, als Digestiv und steinzerstörend betrachtet. Auch hat man es bei sogenannten lymphatischen Krankheiten gerühmt. — Gabe, zwölf Unzen täglich, womit man allmälig steigen kann. — Bisweilen setzt man etwas Branntwein zu.

Liquor Salis Tartari perfecte saturati (HassP.): Salis drachmas duas, Aquae dest. unciam; reagens.

Mixtura effervescens. (*Gr.*)

℞. Misturae Amygdalae . unciam
Vini Ipecacuanhae guttas decem.
Potassae Carbonatis grana decem.
Adde
Succi Limonis . drachmas tres.
Während des Aufbrausens zu nehmen, expectorirend.

℞. Misturae Amygdalarum unciam.
Potassae Carbonatis grana decem
Syrupi Papaveris rubri drachmam.
Succi Limonum . drachmas tres.
Lindernd.

Potio lithontriptica. (E.)

℞. Carbonatis neutralis Potassae grana decem ad quindecim.
Aquae Seltersianae . uncias sex.
Drei oder vier Mal täglich zu trinken.

Protocarbonas Potassii et Ammoniaci, Carbonas Protoxydi Potassii et Ammoniaci s. Potassae et Ammoniaci. (*Sw.*)

℞. Subcarb. Potass. cryst. part. quatuor.
— Ammoniaci cryst. part. unam.
Trituratis simul et commixtis infunde Aquae frigidae q. requiritur ad dissolutionem. Filtra, liquori torrentem Acidi carb. immitte ut saturetur; calefac parumper ut sal quod subsederat redissolvatur, et crystallisationi subjice.

Bei Harnruhr, Verdauungsbeschwerden und besonders bei Harnsteinen empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme in einer halben Unze Wachholder- oder Münzenwasser, täglich vier Mal.

Hypophosphis Potassae. (*Vm.*)

℞. Tincturae Salis Tartari . q. vis.
Phosphori granulati . . . q. s.
ut frigide saturetur. Decantha et serva.

Immittere potes etiam in lagenam smiri obductam Phosphorum granulatum cum Potassa liquida concentrata et addere Alcoholem rectif., per aliquot dies seponere et deinde decanthare.

Protosulphas Potassii, Alcali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum s. sulphuricum depuratum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum s. vitriolatum Schroederi, Panacea duplicata, Sal de duabus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiae s. polychrestus s. polychrestus Parisiensis s. Tartari sulphuratum s. Tartari vitriolatus, Specificum Paracelsi, Spiritus Vitrioli coagulatus Mynsichti, Sulphas Potassae, Tartarum vitriolatum, Tartarus vitriolatus, Nitrum fixum Schroederi, Sulphas Protoxydi Potassii s. Deutoxydi Potassii s. Kali, Vitriolum Potassae, Panacea Holsteniana, Potassa sulphurica s vitriolata; schwefelsaures Kali, vitriolisirter Weinstein; Protosulfate de potassium, Nitre fixe de Schroeder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus ou polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Sulfate de potasse, Sulfate de protoxide de Potassium, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse (*Gal.*).

§. I. Wie es im Handel vorkömmt.

Ba. Bel. Bor4 Ed GalM. Hass. HassP. His. His3. LH Li. Sax. *C. Par.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salzes.

Kali sulphuricum depuratum.

B. Ba. Bel. Bor4. Hass. HassP. Li. Sax.

℞. Sulphat. Potassae ven. part. unam.
Aquae communis . partes octo.
Dissolve, liquori instilla solutionem aquosam Subcarbonatis Potassae, donec non amplius turbetur; filtra, evapora ad cuticulae tenuis apparitionem et crystallisationi subjice. (B. Bel. Hass. Sax.)

HassP. Salis partem unam, Aquae sex, coquendo solvere, addere Liquoris Cinerum clavell. q. requiritur vel ad saturationem acidi praeponderantis vel ad terrarum metallorumque praecipitationem; — Li. Aquae duplum pondus adhibet; — Ba. dissolvere Salis partem unam in Aquae bull. quinque et liquorem ad locum frigidum reponere ut in crystallos abeat; — Bor4. Sal bene crystallisatum et albissimum Aqua communi frigida abluere et siccare.

§. III. Im Ganzen bereitet.

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Hau. Hass. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. T. Vm.*

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Aquae communis partes duodecim.
Dissolve et liquori adde sensim.
Acidi sulphurici (20°) . . q. s. ad saturationem alcali; vapora aliquoties ad cuticulae apparitionem usque, cola et lente refrigefac. (Ams An. B Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen Hass. His. His3. Li. Lus. Pal. R. Sar. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. T.*)

RC Acidi sulph. Aquae sextuplo pondere diluti q. libet in amplum vas vitreum infunde et instilla Solutionem Subcarb. Potassae puriss. in Aquae sextuplo pondere ad saturandum acidum usque, finita effervescentia liquorem filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Ferri . . partes duas.
Aquae bullientis . . partes octo.
Dissolve. Recipe
Subcarbonatis Potassae . . q. s.
Dissolve in
Aquae . . . partibus quinque.
Liquores ambos commisce ut perfecte saturentur, filtra deinde, praecipitatum bene ablue, aquas lotionum liquori filtrato admisce, evapora ad cuticulae usque apparitionem et crystallisationi subjice. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

Gr. Solutionem Vitrioli viridis aquosam Olei Tartari ope praecipitare, praecipitatum lotum et filtratum vaporare et crystallisationi subjicere.

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, singulorum partes aequales.
Immitte in crucibulum pro dimidio replendum; calcina aëri exposita, donec fumi nihil amplius prodeat; dissolve residuum in Aqua bull., ad siccum evapora, productum denuo calcina per plures horas, tunc in Aqua dissolutum et filtratum vaporationi subjice ut in crystallos abeat. (Sar. *T*)

Gr. Coquendo Residuum e destillatione Nitri cum Vitriolo viridi, colando et ad siccum vaporando *Sal enixum* obtinetur.

℞. Residui ex destillatione Nitri cum
Acido sulph. q. vis (libr. duas Lon. LonN.)
Coque in
Aquae . q. s. (congiis duobus).
Acidum cum excessu Subcarbonatis Potassae satura: evapora ad cuticulam, filtra et crystallisationi subjice. (B. Bor. Bor4. D. Du. Fer. Ful. Hau. LH. Lon. LonN. O. Pm. Pol. RC. Suec. *Br. C. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

A. Ed. et Gal. Subcarbonatem Calcis pro saturando Acidi excessu indicant. — Ein Verfahren, welches ein weniger reichliches Product liefert.

Sar. solutionem ad tertiae partis consumptionem usque evaporare, filtrare deinde et ad siccum consumere; calcinare, igne fortissimo, per plures horas, in Aqua dissolvere, filtrare, ad siccum evaporare, denuo calcinare, productum in Aqua dissolvere, liquorem filtratum ad dimidium consumere et in loco frigido crystallisationi subjicere.

Fenn. excessum Acidi ignis ope expellere.

Gr. Liquidum e praeparatione Magnesiae albae relictum vaporare et crystallisationi derelinquere.

Nach Chevallier und Idt, enthält das auf diese Weise erhaltene Salz bisweilen etwas Salpeter.

℞. Nitri depurati . . partes duas.
Florum Sulphuris partem unam.
Ingere mixta per portiunculas in ollam ferream rubro candentem. Flammâ extinctâ massam prope ignem retine per horas duas, ollam totam ad ruborem usque calefaciens; quod post refrigerationem remanet, pulvera, dissolve in Aqua bull., cola ad cuticulam,

evapora et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Sar.)

Ams. B. Br. Ed. Wir. Wür. *C. Gr. Re.* et *Sp.* Nitri et Sulphuris part. aeq.; — Ed *Gr. Re.* productum deflagrationis post refrigerationem absque tractando cum aqua servare jubent.

Li. loco nitri Subcarbonatem Potassae et ejus cum Sulphure partes aequales adhibere.

Das Product ſcheint eine Miſchung von ſchwefelſaurem und ſchwefligſaurem Kali zu ſeyn. Gewiß iſt, nach Duncan, daß es keinen freien Schwefel enthält, ſo daß der Name *Sulphas Potassae cum Sulphure*, welcher ihm von Ed. *Gr.* gegeben wird, unpaſſend ſcheint.

℞. Urinae Hominis bonae valetudinis quantum vis.

Frigori expone ita ut ad dimidium congelet; reliquum filtra, in patinam effunde, crystallos sponte concretas ablue et siccatas serva. (Wür.)

Dieſes nannte man ehedem *Sal nativum*, *Sal fusibile*, *Sal microcosmicum urinae*; es iſt ein Gemiſch von phosphorſaurem Natron und Ammoniak und von ſchwefelſaurem Kali und Natrum, in welchem das erſtere dieſer Salze, nach Berzelius, zu 2,94, das zweite zu 1,65, das dritte zu 4,45, das vierte zu 1,50, das fünfte zu 3,71 und das ſechste zu 3,16 auf 100 enthalten iſt. Um es vollkommen farblos und rein zu erhalten, muß man es anfangs durch Alcohol behandeln, dann in Waſſer auflöſen und die Flüſſigkeit cryſtalliſiren laſſen.

Reizend, eröffnend und purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme als alterirendes und von einer bis ſechs Drachmen als Purgirmittel.

Es darf weder mit Salz-, Salpeter- und Hydrochlorſäure, noch mit ſalzſaurem Kali, und ebenſowenig mit Mercurialſalzen und ſalpeterſaurem Silber verbunden werden.

Pulvis digestivus. (Li. Wir. *Sw.*)

℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Concharum praep. partem unam.
Misce bene. (Wir.)

℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Pulveris Rad. Ari partem unam.
Misce triturando. (Li.)

℞. Sulphatis Potassae partes octo.
Citratis Calcis . partes quatuor.
Pulveris Rad. Ari partem unam.
Misce. (*Sw.*)

Die Gabe iſt im Allgemeinen eine halbe Drachme.

Pulvis digestivus cum Rheo s. compositus. (DD. *Va.*)

℞. Sulphatis Potassae partes quatuor.
Pulveris Rhei . . partem unam.
Tritura simul. — Gabe, eine halbe Drachme. — Man kann ſtatt des ſchwefelſauren Kali ſchwefelſaures Natron oder ſchwefelſaure Magneſia nehmen.

Pulvis antiphlogisticus. (*Huf.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Nitri,
Salis Seignetti, sing. . part. aeq.

Pulvis aperiens et resolvens. (*Bo.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Tartari martial. solub., sing. drach. duas.
Salis Genistae drachmam unam.
Nitratis Potassae semidrachmam.
Millepedum . . grana triginta.
Misce sedulo. — Grimaud empfahl es bei Verſtopfungen der Unterleibseingeweide, bei Oedem, Infiltration und Unterdrückung oder Verminderung der Urinabſonderung. — Gabe, fünfzehen oder zwanzig Gran, Abends bei'm Schlafengehen.

Tabellae desalterantes. (*Pie.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Sacchari . . . . libram unam.
Olei essentialis Citri guttas octo.
Gummi Tragacanthae . . q. s.
ut fiant tabellae duarum ad sex linearum crassitudine.

Reizend und alterirend. — Gabe, eine halbe Unze und mehr in einem Glaſe Waſſer.

Conserva spagyrica. (Wir. *Sp.*)

℞. Salis Absinthii . . uncias duas.
— Melissae,
— Urticae, sing. unciam unam.
Tartari vitriolati . semunciam.
Arcani duplicati . uncias duas.
Fiat pulvis, cui infunde
Spir. Sulph. per campan. drach duas.
Post effervescentiam adde
Conservae Rosarum rubrarum,
— Dianthi, sing. libr. unam.
Misce bene. (Wir.)

℞. Salis Absinth. unc. tres et drach. sex.
Pulv. Cinnamomi drachmas duas.
— Macidis,
— Caryophyllorum,
— Zingiberis, sing. drach. unam.
— Sulphatis Potassae unciam unam et drachmas sex.
— Sacchari albi . uncias octo.
Conserv. Rosar. rubr. unc. sedecim.
— Dianthi . . . uncias octo.
Acidi sulphurici drachmas duas.
Olei ess. Anisi,

Olei ess. Citri, sing. drach. unam.
— — Foenic. semidrachmam.
— — Cinnamomi scrup. unum.
— — Menthae gutt. quatuor.
Misce sedulo. — Ehedem als auflösend und als ein nützliches Auflösungsmittel bei Verstopfung des Unterleibs, Gelbsucht, hartnäckigen viertägigen Wechselfiebern, Mangel der Menstruation betrachtet. — Gabe, von einer Drachme bis zu einer halben Unze.

Fel Vitri, Recrementa Vitri, Sal Vitri, Anatron. (Br. Wir. *Gr. Sp.*)

In weißen, leichten und schwammigen Massen. — Es ist ein Gemisch aus salzsaurem Kali oder Natron, welches sich während des Schmelzens des Glases trennt und auf der Oberfläche der glasigen Masse schwimmt.
Ehedem als einschneidendes und Abführmittel.

Solutio Sulphatis Potassae aquosa. (Ba.)

℞. Sulphatis Potassae partem unam.
Aquae destill. partes novemdecim.
Dissolve. — Bei'm Verordnen dieses Salzes im flüssigen Zustande muß man sich erinnern, daß, nach Gay-Lussac, 100 Theile Wasser bei 12° 72 C. $10\frac{57}{100}$, bei 101°, 50 C. $26\frac{33}{100}$ desselben auflösen.

Liquor Tartari vitriolati (HassP.): Solutio Tartari vitriolati scrupuli unius in Aquae dest. drachmis sex. — Reagens.

Potio laxativa. (*Sa.*)

℞. Sulphat's Potassae drachmas sex.
Aquae Melissae . uncias quatuor.

Emulsio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae drach. unam.
Dissolve in emulsionis e
Seminum Malvae unciis tribus.
Aquae Hordei quantitate sufficiente paratae sesquilibra. Adde deinde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Glasweise.

Mixtura acida. (*Sa. Va.*)

℞. Sulphatis Potassae . semunciam.
Nitratis Potassae drachmam unam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Va. Sulphatis semidrachmam (semunciam?), Decocti Hordei libras duas, dissolve et adde Oxymellis simpl. unciam, Aceti sesquiunciam.

Mixtura vinosa. (*Sa.*)

℞ Sulphatis Potassae semidrachmam.
Decocti Hordei . . libras duas.
Solutioni adde
Roob Ribium,
Vini, singulorum sesquiunciam.
Aceti . . . . . unciam unam.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.

Potio resolvens (*fondante*). (*B. Va.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Infusi Rhei . . . . uncias sex.
Allmälig zu nehmen bei Milchversetzungen und Milchknoten.

Subprotosulphas Potassii, Potassae Supersulphas, Supersulphas Potassae, Sulphas acidus Potassae, Bisulphas Potassae s. kalicus, Kali sulphuricum acidum, Sal enixum; saures schwefelsaures Kali; Subprotosulfate de potassium, Subsulfate ou Sulfate de potasse, Bisulfate de potasse (*Gal.*). (Bor4. Fer. Lon. LonN. Suec. *E. Gr. Par. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Salis e destillatione Nitri cum Acido sulphurico residui libras duas.
Aquae bullientis octarios quatuor.
Dissolve, filtra, coctione ad dimidium redige et ad crystallisandum sepone. (Lon. LonN. *E. Gr. Re. Vm.*)
T. Obtinetur e residuo destillationis Acidi nitrici et nitrosi, triturando et solvendo in Aquae pondere quintuplo vel sextuplo.
℞. Acidi sulphurici,
Aquae, singulorum partes septem.
Subcarb. Potassae partes quatuor.
Misce et liquorem vaporando consume. (*Sw**.)
℞. Acidi sulphurici . partes decem.
Subcarb. Potass. part. sex c. dimid.
Acido Aquae duplo diluto, mixturae adhuc calenti, simulac ob effervescentiam fieri potest sal admisce; filtrata tunc leviter evaporent et ad crystallisandum seponantur. (*Vm.*)
℞. Sulph. Potass. pulv. part. octo c. dimid.
Acidi sulphurici partes quinque.
Sicca prope ignem, ad ruborem levem calefac, dissolve in Aquae bull. parte una cum dimidia, filtra et crystallisationi subjice. (*Vm.*)
Fer. Sulphatis uncias duas et tres Acidi.
℞. Sulphatis Potassae . partes octo.
Acidi tart. part. septem c. dimidia.
Contere, lava cum Aquae tepidae pauxillo, filtra liquorem et parumper evaporatum ad crystallisandum sepone. (*Vm.*).
℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Acidi sulphurici . partem unam.
Aquae communis . partes tres.

Misce, ad siccum consume et pulvera. (Bor4. Suec.)

Purgirend, fäulnißwidrig; man will es mit Vortheil bei gaſtriſchen und adynamiſchen Krankheiten angewendet haben; bisweilen ſetzt man es zu der Abkochung der China.

Potus sulphurico-salinus, Tisana sulphurico-salina. (*Sw*.)

℞. Supersulphatis Potassae drach. sex.
Aquae . . . . . libras sex.
Dissolve et solutioni adde
Aquae Vitae,
Syrupi Violar., sing. sesquiunciam.

Reizend, gelind laxirend und für fäulnißwidrig gehalten; man verordnet den Trank bei galligen und adynamiſchen Fiebern, Blutbrechen und Mutterblutfluß. — Gabe, glasweiſe mehr oder minder oft.

Protosulphas Potassii et Ammoniaci, Sulphas Potassae et Ammoniaci. (*Vm.*)

℞. Supersulphatis Potassae
quantum vis.
Aquae fervidae duplum pondus.
In solutionem infunde
Ammoniaci liquidi quantum sufficit ut acidum cum excessu saturetur et ad crystallisandum sepone.

Protosulphas Potassii et Magnesii, Sulphas Potassae et Magnesiae. (*Vm.*)

℞. Sulphat. Potass. part. tres c. dim.
Sulphatis Magnesiae partes decem.
Misce, solve in Aquae fervidae q. s., filtra liquorem et ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Magnesiae partes decem.
Subcarbonatis Potassae calcinati
partes tres cum dimidia.
Tritura, sensim addendo
Aquae tepidae . quantum sufficit ad solutionem salium. Ebulliant aliquoties, tunc filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Supersulphat. Potass. part. unam.
Aquae . . . partes octodecim.
Satura calide solutionem cum
Magnesiae sufficiente quantitate.
Filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphatis Magnesiae partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Solutioni sensim infunde aliam Solutionem saturatam Potassae caust., donec nihil amplius praecipitetur; sepone, decantha, praecipitatum cum Aquae frigidae pauxillo ablue, dissolve in Aquae bull. pondere octuplo et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protohyposulphis Potassii, Hyposulphis Potassae, Sulphis sulphuratus Potassae. (*Vm.*)

℞. Sulphitis Potassae
partes septem cum dimidia.
Potass. caust. fus.
part. quinque c. dim.
Sulphuris pulv. part. unam c. dim.
Liqua sal in Aquae tepidae quantum fieri potest minima quantitate, adde potassam, deinde sulphur, calefac per semihoram in vase tecto, filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphureti Potassae,
Sulphitis Potassae, sing. part. aeq.
Contere per aliquot tempus, dissolve deinde mixturam in Aquae quantum minima quantitate, filtra et ad crystallisandum repone.

℞. Hydrosulphatis Potassae . q. vis.
Dissolve in Aqua et torrentem Gasis acidi sulphurosi in liquorem immitte, donec nihil ejus amplius absorbeatur, calefac leviter, filtra et ad crystallisandum sepone.

Potes etiam transmittere Gas acidum hydrosulphuricum in solutionem Sulphitis Potassae, calefacere deinde liquorem, filtrare et crystallisationi subjicere.

Man kann dieſes Salz ſtatt des sulphis sulphuratum sodae benutzen.

Protosulphis Potassii, Sulphis Potassae. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae, singulorum partem unam.
Dissolve et filtra, cum Gase acido sulphuroso satura, calefac deinde in balneo aquae tepido et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protonitras Potassii, Nitras Deutoxydi s. Protoxydi Potassii, Nitras Potassae, Nitrum, Sal Nitri, Sal Petrae, Kali nitricum, Nitras kalicum s. kalicus s. Lixiviae; ſalpeterſaures Kali, Salpeter; Protonitrate de potassium, Nitrate de protoxide de potassium, Nitrate de potasse, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre (*Gal.*); Nitrato de Potassa (*Lus.*).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Nitrum crudum s. venale; roher Salpeter; Nitre cru (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Br. C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T. Va.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salpeters.

Nitrum s. Kali nitratum s. nitricum depuratum s. purificatum s purum, Ni-

Printed by Thomas Bensley and Son,
Bolt Court, Fleet Street.

Deflagratione finita et vase parumper refrigerato massam liquatam in pelvim immitte inter manus agitatam ita ut sal parietibus ejus tenuis et uniformis strati instar adhaereat, quod post refrigerationem separatum in frusta dirumpe. (His. His3.)

An. Nitri libras duas et Sulphuris semunciam; — Sar. *Gr.* Nitri libram unam et Sulphuris drachmas (uncias *Gr.*) duas; — Ams. Sulphuris partem unam et Nitri viginti; — Gal. Sulphuris partem unam et Nitri centum viginti octo; — Br. Pal. Wir. *Fi. Re. T.* et *Vm.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — *Gr.* Nitri uncias sedecim liqua et liquatum in modulos calidos effunde (*Crystall. min.*). Caeterum agendi modus ubique aequalis.

Parari potest quoque absque sulphure, fundendo et deinde in modulos effundendo. (*Re.*)

Reizend, in hohen Gaben purgirend, jedoch unter die kühlenden oder vielmehr entzündungswidrigen Mittel gestellt, ohne Zweifel wegen der durch die Reizung der ersten Wege bewirkten Ableitung, und ganz besonders für ein harntreibendes Mittel gehalten. Man hat es bei Wassersuchten, Blutflüssen, Flechten, Tripper angewendet. — Gabe, gewöhnlich zehen Gran bis eine halbe Drachme; neuere Practiker sind aber weit höher gestiegen, ein Beweis, daß der Salpeter nicht so giftig wirkt, als Fodéré und Orfila behauptet haben.

Schwefelsäure, schwefelsaures Natrum und Bittererde, Alaun und schwefelsaure Metalloxyde dürfen nicht damit verbunden werden, da sie Zersetzung bewirken.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters nicht merklich durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis refrigens. (*Re.*): Pulv. Nitri grana duodecim ad scrup. unum. In einem Glase Wasser aufgelöst zu nehmen.

Nitrum perlatum. (Wir.)

℞. Nitri purificati uncias quatuor.
Matris Perlar praep. semunciam
Misce bene. — Ehedem verordnete man dieses Pulver von fünf Gran bis zu einem Scrupel bei bösartigen Fiebern und man schrieb gewöhnlich dem ganz wirkungslosen Zusatz des Salpeters die Hauptwirkung zu.

Hierher gehört auch der *Pulvis nitrosus* (*Au.*) Nitri et Testarum Ovorum praep., sing. partes aequales.

Pulvis Iridis cum Nitro s. anticatarrhalis. (*Au. Va.*)

℞. Rad. Iridis Flor. . unciam unam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Sacchari . . . . unciam unam.
Gabe, ein Kaffeelöffel bei Catarrhalbeschwerden.

Pulvis aperitivus. (Gen. *Sw**.)

℞. Nitri . . . . . unciam unam.
Pulv. Gummi Arab. sesquiunciam.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. unc. tres.
Harntreibend, erweichend, in dem hitzigen Stadium der Harnröhrenentzündung empfohlen. — Gabe, anderthalb bis zwei Drachmen, drei Mal täglich, in Wasser. (*Sw**.)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Magnesiae . . . . semunciam.
Divide in partes duodecim. (Gen.)

Pulvis Nitratis Potassae compositus. (RC.)

℞. Nitratis Potassae,
Sacchari albi, sing. . semunciam.
Gummi Arabici . unciam unam.
Misce ut fiat pulvis. — Gabe, eine bis anderthalb Drachmen.

Pulvis leniens Thedenii. (*Dulk.*)

E Nitri, Concharum praep., Natri sulph. siccat. et Rhei, sing. pulv. part. aequalibus.

Pilulae aperitivae. (*Sw*. Va. Vm.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex.
Pulv. Gummi Arab. drachmas tres.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. unc. tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quinque. (*Sw*. Va.*)

℞. Nitri partem unam cum dimidia.
Concharum praep. partem unam.
Pulv. Gummi Arab. partes duas.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. part. quatuor.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

Harntreibend, erweichend, schmerzstillend, bei Harnröhrenentzündung und Dysurie empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück, täglich drei Mal. — Auffallend ist es, daß Van Mons in seiner Ausgabe des Swediaur die Austerschaalen nur dann zusetzt, wenn die Gonorrhöe durch den Gebrauch des Biers erzeugt worden ist.

Trochisci de Nitro s. Nitratis Potassae. (Ed. Wür. *C. Gr. Re. Sp.*)

℞. Nitri purificati . partem unam.
Sacchari . . . . . partes tres.
Contere et pulveri adde

Mucilag. G. Tragacanthae q. s. ut fiat massa in trochiscos dividenda. (Ed. Wür. *Gr. Re.*)

Sp. Nitri partem unam, Sacchari sex, unam Succi Citri et Mucilaginis q. s.

Electuarium temperans. (Gen. Ham.)

℞. Nitri purificati . drachmas duas.
Conservae Rosarum,
Oxymellis simpl, sing. unc. duas.
Misce. (Ham.)

Gen. Nitri semunciam et Conservae Rosarum uncias quatuor absque oxymelle.

Linctus Potassae Nitratis (Gr.): Nitri contriti sesquidrachmam, Mellis Rosae unciam, Oxymellis simpl. semunciam, misce. Zu 1 Drachme bisweilen.

Tisana nitrata. (*Pic.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Tisanae communis libras quatuor.
Dissolve sal in tisana. — Glasweise.

Pulvis ad Tisanam ordinariam extemporaneam. (*Va.* Chaussier.)

℞. Nitratis Potassae semidrachmam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Extracti Graminis sicci
— Liquirit. sicci, sing. unc. duas.
Gummi Arabici . unciam unam.
Misce sedulo. — Ein Kaffeelöffel in einem Glase Wasser, bei acuter Harnröhrenentzündung. Auf Reisen sehr bequem.

Potio diuretica. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Succi Cerefolii . cochlearia 24.
Dissolve. — Eßlöffelweise.

Potio febrifuga. (B*.)

℞. Nitri . . . . . unciam unam.
Succi Bacc. Oxycocci libr. unam.
Dissolve. — Gegen Wechselfieber. — Man giebt davon täglich eine Unze bis ein halbes Pfund. — Statt des succus oxycocci kann man auch den succus rubi oder myrtilli nehmen.

Mixtura nitrosa. (BorC.)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias octo.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce.

Gargarisma commune. (Ful. Li.)

℞. Nitri . . . . drachmam unam.
Aquae communis . uncias octo.
Solutioni adde
Syrupi Aceti . . unciam unam.
Kühlend, reizend, auflösend.

Mixtura e Kali nitrico s. nitrata s. refrigerans s. sedativo-refrigerans. (WW. *Sa. Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . drachmam unam.
Aquae communis . uncias octo.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis unciam unam.
Alle Stunden zwei Eßlöffel. (WW.)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Aquae purae . . . uncias sex.
Solutioni adde
Aceti,
Syr. Aceti Rubi Idaei, sing. unc. unam.
Man giebt alle zwei Stunden einen oder zwei Löffel. (*Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . drachmam unam.
Aquae Flor. Sambuci . unc. octo.
Syrupi Mororum . sesquiunciam.
Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel. (Sar.)

Mixtura Nitratis Potassae s. nitrosa. (RC.)

℞. Nitratis Potassae drachm. unam.
Aq. Menth. pip. vel font. unc. tres.
Solve et adde
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Alle 3 bis 4 Stunden 1 Unze, bisweilen mit Zusatz von 5 Tropfen Tinct. Op. zu jeder einzelnen Gabe.

Linctus s. Looch refrigerans. (*Sa.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Syrupi Rubi Idaei unciam unam.
— Ribium . . uncias tres.
Misce bene.

Linctus ad aphoniam. (*Re.*)

℞. Nitri . . . . scrupulos duos.
Rob vel Extract. Sambuci unciam.
Misce. — Ein Theelöffel bisweilen, indem man es im Munde zergehen läßt.

Injectio lithontriptica. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Acidi nitrici . drachmas duas.
Collae Flamandicae unciam unam.
Aquae . . . . libram unam.
Dieses Einspritzungsmittel wurde zur Auflösung von Steinen, welche aus phosphorsaurem und sauerkleesaurem Kalk bestehen, vorgeschlagen.

Potio aperitiva. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Nitri . . . . scrupulum unum.
Dec. Quinque Radic. unc. quinque.
Syr. Quinque Radic. uncias duas.
Loco syrupi Oxymel (scillit. *Va.*) et, si necesse est, Spiritus Mindereri semuncia addi potest. — Wird bei Wassersuchten empfohlen.

Potio nitrosa s. nitrata, Potion ni-

trée (*Ra. Va.* Char.). Nitri grana octodecim, Decocti Graminis uncias quatuor et Syrupi Quinque Radicum unciam unam. — Paßt wie die vorige zur Bethätigung der Urinabſonderung.

Potio diuretica (Hót. D.) Vinum album et pro liquidi libra una Nitri semidrachmam continet. (*Va.*)

Potio temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . grana quindecim.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Solutioni adde
Aquae Flor. Aurant.
drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Auf zwei oder drei Mal während der Nacht, im Anfang hitziger Krankheiten

Julapium refrigerans. (*Pic.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Infusi Capilli Ven. uncias quinque.
Solutioni adde
Succi Aurantiorum uncias duas.
Syrupi Granati . unciam unam.
Auf vier Mal.

Julapium Nitratis Potassae. (*Va* Hosp. Angl.)

℞. Nitratis Potassae,
Acidi nitrici alcoholis., sing.
drachm. tres.
Syrupi Limonis drachmas quatuor.
Aquae Menthae
uncias decem c dimidia.
Misce. — Eine Unze, 3, 4 oder 6 Mal täglich.

Gargarisma refrigerans s. nitratum s. Nitri s. Potassae Nitratis s. nitrosum. (LP. *Fi. Gr. Re. Sa. Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex.
Decocti Hordei . libram unam.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce. (*Re. Sm.*)

LP. Specier. resolv. unciam, Aquae comm. libram, decocto colato adde Nitri drachmam, Mellis rosati unciam, misce; — *Gr.* Nitri drachmas duas, Mellis quatuor, Aquae Rosarum uncias sex; — *Sa. Va.* Mellis rosati uncias tres loco oxymellis; — *Fi.* Nitri scrupulum, Aquae communis libram, Aceti semunciam, Mellis rosati unciam.

Potio antiphlogistica. (Ham.)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Dec. Rad. Althaeae uncias octo.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Löffelweiſe.

Tisana antiphlogistica. (*Au. Ca. E. Va.*)

℞. Hordei mundati uncias duodecim
Aquae . . . . . libras tres.
Coque donec hordei semina sint dirupta, tunc decocto adde
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Syrupi Aceti . . . uncias duas.
Alle Stunden eine kleine Taſſe, bei entzündlichen Fiebern. (*Ca.*)

Au. Va. Decocti Hordei libras duas, Nitri drachmam et Oxymellis (Syrupi Aceti *Va.*) unciam; — *E.* Decocti Hordei octarium, Nitri drachmas duas et Succi Citri unciam unam ad duas.

Potio diuretica. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Dec. Hordei octarium (chopine).
Olei Amygd. dulc. unc. quatuor.
Syrupi Althaeae . . uncias sex.
Taſſenweiſe alle vier Stunden, bei Dysurie und Strangurie.

Decoctum stomachicum resolvens, Tisana stomachica resolvens. (B.)

℞. Decocti amari . libram unam.
Extracti Taraxaci drachmam unam.
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Allmälig zu nehmen, bei Anſchwellungen der Unterleibseingeweide mit träger Verdauung.

℞. Decocti amari . libram unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Den Tag über zu nehmen.

Clysma s. Enema refrigerans. (*Au. Sa. Va.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Dec. Semin. Lini uncias quinque.
Solutioni adde
Olei Lini recentis,
Oxymellis simpl., sing. unc. unam.
Misce. (*Sa. Va.*)

℞. Decocti Hordei . uncias decem.
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis . . . . unciam unam.
Misce. (*Au.*)

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.
Nitri . . . . drachmam unam.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Misce. (*Au.*)

Emulsio nitrata s. nitrosa. (GalM. *Au. B. Sa. Va.* Hosp. Angl.)

℞. Emulsionis Amygd. dulc.
libram unam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Misce. — Alle Stunden 1 Viertelglasvoll bei Entzündungen der Urin- und Geſchlechtswerkzeuge.

℞. Nitri . . . . scrupulum unum.
Dissolve in unciis sex emulsionis praeparatae cum
Amygd. dulc. excort.
drachmis sex.

Semin. Papav. albi drachma una.
Aquae Tiliae quantitate sufficiente.
Solutioni adde
Syrupi Succi Citri unciam unam.
Stündlich, löffelweise. (*Sa.*)

℞. Amygd. dulc. excort. semunciam.
Aquae . . . . . libram unam.
Nitri . . . . . semunciam.
Syrupi Althaeae . unciam unam.
Fiat emulsio. (*Au.*)

℞. Emulsionis gummos. libram unam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis despumati unciam unam.
Misce. (*B.*)

GalM. Emulsioni simplici Nitri partes decimas tres addere; — sec. *Va.* triplicem Nitri quantitatem supra monitae.

Emulsio Barthezii. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Dissolve in emulsione praeparata cum
Seminum frigid. maj. . semuncia.
Decocti Chinae drachmarum duarum . . . . . unciis octo.
Solutioni adde
Syr. Capilli Ven. . unciam unam.
Auf zwei Mal, bei Blutspeien und andern Brustbeschwerden.

Tisana vinosa. (*Pie. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Nitri. . . . . semidrachmam.
Aquae communis . . libras duas.
Solutioni adde
Vini albi vel rubri unc. quinque (sex *Va.*)
Ein Reizmittel für den Darmcanal, glasweise zu nehmen.

Potio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Nitri,
Sacchari albi, sing. scrupulos duos.
Aquae alexit. simpl. uncias duas.
Essent. Piperis Jamaic.
drachm. duas.
Dieser Trank ist keineswegs kühlend, sondern vielmehr stark reizend.

Potio leniens s. sedans et diuretica. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . grana viginti.
Aquae dest. Parietariae,
— — Petroselini,
— — Cort. Fabarum, sing.
unciam unam.
Acidi nitr. alcohol. scrup. unum.
Syrupi Limonum unciam unam.
Auf einmal zu nehmen. — Man wiederholt es alle vier Stunden, wenn die Schmerzen nicht weichen, indem man nöthigenfalls eine Unze Syrupus Papaveris albi zusetzt.

Pulvis refrigerans (*Gr.*) Salis Nitri grana quindecim; in einer Tasse Wasser aufgelöst, unmittelbar zu nehmen.

Julapium leniens et purgans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas tres.
Aquae Lactucae
— Rosarum,
— Portulacae,
— Rhoeados, sing. uncias tres.
Solutioni adde
Syrupi Violarum,
— Granati, sing. sesquiunciam.
Auf drei Mal den Tag über.

Julapium temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . grana duodecim.
Aquae Lactucae,
— Portulacae, sing.
unc. quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Violarum . . uncias duas.
— Limonum . unciam unam.
Aquae Flor. Aurant. semunciam.
Auf zwei oder drei Mal, während der Nacht zu nehmen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Campher.

Pulvis nitro- s. nitroso-camphoratus. (*Sy. Va.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Camphorae grana quatuor ad octo.
Gummi Arabici scrupulum unum.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

℞. Nitri,
Sacchari, sing. grana quindecim.
Camphorae grana duo ad quatuor.
Ebenso angewendet wie das vorige.

Pulvis temperans camphoratus. (D. DD.)

℞. Pulv. refrigerant. part. octodecim.
Camphorae pulv. . partem unam.
Misce sedulo.

Pulvis alexipharmacus. (Wir.)

℞. Nitri crudi . . . sesquiunciam.
Oculorum Cancri Acido citrico saturatorum . . unciam unam.
Boli Armenae . . . sesquiunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Pulverata misce. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Aqua diuretica camphorata. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Camphorae c. Alcoholis pauxillo tritae . . . drachmam unam.
Trituratis simul adde pedetentim

Aquae octarium (chopine) unum
Eßlöffelweiſe.

℞. Nitri . . . . . uncias quatuor.
Aquae Parietariae . libras duas.
Solutioni adde
Acidi acetici . . uncias quatuor.
Alcoholis . . . . semilibram.
Camphorae . . . drachmas sex.
Agitata diu filtra. — Sogleich eßlöffelweiſe zu nehmen.

Emulsio refrigerans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Liqua in emulsione refrigerata, praeparata triturando in mortario
Semin. Cannabis pugillum unum et pastae sensim infundendo
Aquae bullientis
octar. (chopine) unum.
Solutioni adde
Camphorae in Aethere solut
grana sex.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Abends zu vier Gläſern, ſtündlich, bei gonorrhoea chordata.

Tisana emulsiva s. emulsionnata camphorata s. cum Camphora. (*Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . . scrupulum unum.
Camphorae . . . . grana octo.
Seminum Melonum uncias duas.
Fiat emulsio cum
Aquae fontanae . libris duabus.
Adde
Sacchari . . . . uncias duas.
Alle zwei Stunden ein Glas mit Zuſatz einiger Tropfen Citronenſaft.

Mixtura diuretica et refrigerans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . grana quinquaginta.
Camphorae . grana quadraginta.
Mellis Narbonnensis unciam unam.
Tere diu et adde
Aquae . sufficientem quantitatem.
In der erſten Periode der Harnröhrenentzündung empfohlen.

Mixtura nitrato-camphorica. (*Sw*.*)

℞. Nitri . . . . sesquidrachmam.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Olei Camphorae semidrachmam
ad drachmam unam.
Commisce exacte, tunc tritura cum
Mellis albi . . . . sesquiuncia.
Aquae Salviae . . unciis decem.
Reizend, für krampfſtillend und ſchweißtreibend gehalten und bei eranthematiſchen Fiebern, beſonders aber gegen Seitenſtechen empfohlen. — Gabe, einen oder zwei Löffel alle zwei Stunden.

Mistura febrifuga. (Inf. for childr. (Gr.)

℞. Misturae Camphorae
uncias viginti tres.
Antimonii tartarizati
drach. quatuor.
Potassae Nitratis . . grana sex.
Spiritus Aetheris nitrici,
Syrupi Limonum, sing.
semunciam.
Misce. — 1 Drachme bis halbe Unze. — Interdum adde Vinum Ipecacuanhae, vel Tincturam Digitalis, vel Tincturam Opii, vel Syrupum Papaveris.

2) Durch Eiſen.

Pulvis diureticus martialis. (Ham.)

℞. Pulveris diuretici . quantum vis.
Limat. Ferri porphyr.
scrupulos quatuor.
Divide in partes octo.

3) Durch ſalzſaures Ammoniak.

Pulvis refrigerans. (*Sw*.*)

℞. Nitri . . . . . partes duas.
Salis Ammoniaci . partem unam.
Misce terendo. — Man wendet es, in eine Blaſe gethan und mit Waſſer getränkt oder mit zerſtoßenem Eis vermiſcht, in kühlenden Umſchlägen auf die Oberfläche des Körpers, beſonders in Fällen von eingeklemmten Brüchen an.

Fomentatio s. Fotus refrigerans s. frigidus s. frigida Schmuckeri s. Richteri, Mixtura frigorifica s. antiphlogistica. (B*. Ful. Han. HassP. *Au. B. Br. Ca. Fi. Pie. Sp. Sw. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Nitri . . . . . uncias octo.
Salis Ammoniaci uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras viginti.
Solutioni adde
Aceti . . . . . libras duas.
Misce bene. (*Ca. Sw.*)

B*. Nitri, Salis Ammon., sing. libram, Aquae uncias sexcentas quadraginta et Aceti nonaginta sex; — *Pie.* Nitri libram, Salis Ammoniaci uncias octo, Aquae libras duodecim et Aceti quatuor; — *Sp.* Nitri semunciam, Salis Ammon. uncias duas, Aquae centum viginti, et Aceti duodecim; — *Br.* Nitri uncias duas, Salis Ammon. unam et Aquae font. c. Acido acet. acidulatae libras duas; — Han. Salis. Ammon., Nitri, sing. unciam unam, Aquae et Aceti, sing. sedecim; — HassP. Salis Ammon., Nitri, sing. partem unam, Aceti quatuor, Aquae quadraginta octo; — Ful. Nitri uncias duas, Salis Am-

mon. unam, Aceti semilibram et Aquae libras sex; — *Au.* Nitri uncias quatuor, Salis Ammon. duas, Aceti libram unam et Aquae octo; — *B. Va.* Nitri drachmas tres, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram unam et Aquae quatuor; — *Fi.* Nitri, Salis Ammon, sing. semunciam, Aquae uncias novem, Aceti fortis tres; — vel: Nitri semunciam, Salis Ammon. drachmas duas, Aquae libras duas, Aceti uncias duas (*Foment. Richteri*).

Dieſe Flüſſigkeit iſt beſonders bei Quetſchungen und Austretungen von Blut ꝛc. von Nutzen. Man tränkt vier- oder ſechsfach zuſammengelegte Leinwand damit und legt ſie kalt auf; die Ueberſchläge müſſen alle Stunden erneuert werden.

Tinctura antigonorrhoica s. contra gonorrhoeam. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Aquae . . . . octarium unum.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . drachmas duas.
Alcoholis sufficientem quantitatem.
Macerentur ad refrigerationem producti usque et filtrentur. — Gabe, ein Löffel in einem Glaſe Waſſer.

4) Durch Opium.

Pulvis diaphoreticus. (*Gr.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Opii . . . . . granum unum.
Salis Nitri . . . grana sedecim.
Pulverata misce. Bei Schlafengehen.

Boli contra tussim. (*Pie. Sm. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Nitri purificati grana duodecim.
Pilul. de Cynoglosso
grana quatuor.
Conserv. Rosar. rubr. scrup. duos.
Fiant boli duo. — Jeden Abend alle zwei oder drei Stunden.

Potio antinephretica, Liquor antinephreticus. (Fer. *Va.* Hosp. Ital.)

℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Aquae . . libras tres (duas *Va.*)
Decocto unciarum octo colato adde
Nitri . . . . . unciam unam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen täglich in acht Unzen Leinſaamen- oder Eibiſchabkochung. Bei ſchmerzhaften Affectionen der Urinwege.

5) Durch Meerzwiebel.

Pulvis diureticus. (*Gr. Pie. Sw.*)

℞. Nitri calcinati . . partes octo.
Radic. Vincetoxici . partes sex.
Scillae siccatae . partem unam.
Misce bene (*Pie. Sw.*)

Sw. praeterea: Nitri grana quindecim, Scillae et Piperis Jamaic., sing. decem.

℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
scrup. quatuor.
Pulveris Scillae . . grana octo.
— Zingiberis grana sedecim.
Misce et divide in partes octo. (Ham.)

Gr. Rad. Scill sicc. grana duodecim, Salis Nitri drachmam, Sacch. albi, Cinnamomi, sing. tantidem, misce fiant pulveres no. 6. Zweimal täglich ein Stück

Bei Waſſerſuchten, beſonders Bauchwaſſerſucht Aſthma und chroniſchen Blaſenkrankheiten, als harn- und ſchweißtreibendes Mittel — Die erſte Formel iſt von Van Helmont. Man giebt das Pulver zu zehen bis zwanzig Gran, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Mixtura diuretica. (*Fi. Gr. Sw.*)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Pulv. Rad. Scillae semidrachmam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Fi. loco pulveris scillae Extracti Scillae scrupulum unum.

Bei Waſſerſuchten und Bruſtbeſchwerden von ſogenannter Verſchleimung geprieſen. — Gabe, zwei bis drei Löffel drei Mal täglich.

℞. Salis Nitri . . drachmam unam.
Mixturae Ammoniaci uncias sex.
Spiritus Juniperi comp.
sesquiunciam.
Aceti Scillae . . drachmas sex.
Gabe, alle vier Stunden einen Eßlöffel. (*Gr.*)

Decoctum resolvens et diureticum *Tisana resolvens et diuretica.* (*B.*)

℞. Decocti Graminis libram unam.
Extracti Trifolii,
Nitri, sing. . . drachmam unam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Allmälig zu nehmen, bei Verſtopfungen der Leber und der Milz.

Potus antiphlogisticus diureticus, Tisana diuretica. (*B.*)

℞. Dec. Rad. Asparagi libras duas.
Nitri . . . . drachmas duas.
Oxymellis scillitici . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

6) Durch ſäuerliche oder Neutralſalze.

Mixtura refrigerans. (*Au. Sw.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Syr. Aceti Rubi Idaei unc. unam.
Alle zwei Stunden einen Eßlöffel. (*Sw.*)

℞. Nitri.
Cremoris Tartari, sing.
drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias sex.
Succi Citri,
Syr. Limonum, sing. unc. unam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au.*)

Mixtura salina simplex. (*Sa.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
drachm. sex.
Aquae Foeniculi uncias quinque.
Solutioni adde
Aetheris sulph. drachmam unam.
Syr. Capit. Papav. . uncias duas.
Ebenso wie das vorige angewendet.

Potus antiphlogisticus et diureticus, Tisana refrigerans et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis . libras duas.
Cremoris Tartari . unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari . . . . uncam unam.
Den Tag über allmälig zu trinken.

Tabellae de tribus, Saccharum nitratum. (*Sa*)

℞. Nitri purificati . unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiant tabellae.

Pulvis temperans diureticus s. temperans albus s. nitrosus s. Nitri tartaricus. (Fenn. Ham. Li. *B.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Cremoris Tartari . semunciam.
Divide in partes octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Nitri . . . . . partem unam.
Cremoris Tartari . . partes tres.
Misce bene. (Ham.)

Li. Salium, sing. partes aequales.

℞. Nitri purificati,
Cremoris Tartari, sing.
unciam unam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Pulverata seorsim commisce. (Fenn.)
— Gabe, eine halbe Drachme für Erwachsene.

Pulvis Nitri tartaricus. (Suec.)

℞. Nitri depurati . . partes decem.
Acidi tartar. bene sicc. part. duas.
Subcarb. Magnesiae part. unam.
Sacchari albi . . partes triginta.
Tritura acidum cum magnesia, tunc cum saccharo et denique cum nitro.

Mixtura refrigerans. (*Sw.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas tres.
Acidi tartarici scrupulum unum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Dissolve. — Interdum adduntur Olei Amygdalarum dulcium uncia una vel duae. — Stündlich, löffelweise.

Pulvis temperans Bouillon - Lagrange. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . libras tres.
Tartari libras quatuor c. dimid.
Acidi borici . . . libram unam.
Pulverata per cribrum setaceum tenerrimum cribra. — Temperirend, laxirend, bei Hautkrankheiten, manchen Catarrhalbeschwerden und retentio urinae empfohlen. — Gabe eine halbe Drachme in einer Pinte Wasser, wozu man zwei und eine halbe oder vier Drachmen zerfallenes Glauberfalz setzt, und wovon man Morgens ein Glas voll trinkt.

Pulvis Nitri oxalicus s. nitrosus s. temperans Rosensteinii. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Nitri depurati . . sesquiunciam.
Salis Acetosellae . . semunciam.
Tabellar. Citri
unc. septem c. dimidia.
Pulverata misce. (B*.)

℞. Nitri . . . . . uncias tres.
Salis Acetosellae . unciam unam.
Sacchari albi . . uncias decem.
Pulverata seorsim misce. (Suec.)

Vm. Acetosellae Salis unciam unam, Nitri duas et tres Sacchari.

Pulvis diaphoreticus. (*E.*)

℞. Nitri . . . . drachmam unam.
Tartari stibiati . granum unum.
Mercurii dulcis . . . grana sex.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Syrup.

Trochisci refrigerantes s. temperantes. (Ful. *Sp.*)

℞. Pulv. Nitri . . . drachmas sex.
— Salis Acetosellae
drachm. duas.
— Sacchari albi . uncias sex.
Mucilag. G. Tragacanth . . q. s.
ut fiat massa trochiscorum. (Ful.)

Sp. Nitri unciam, Salis Acetosellae

drachmas quatuor, Sacchari uncias sex, Essentiae Citri semiscrupulum et Mucilag. G. Tragacanthae q. s.
Gabe, eine bis vier Drachmen.

Pulvis febrifugus salinus. (*Vm.*)

℞. Nitri . partes duas cum dimidia.
Subcarb. Potassae
part. unam c. dimidia.
Cremoris Tartari . partes duas.
Sulphatis Potassae . partes tres.
Nucis moschatae partem unam.
Pulverata sedulo misce.

Pulvis temperans. (Bor. BorC. Bor4. Han. HassP. O. R. *Vm.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae, sing. part. aeq.
Pulverata misce.

Pulvis temperans Unzeri. (Br. *Pid. Sp.*)

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Potassae, sing.
unc. unam.
Pulv. Diatragacanth. drach. duas.
Misce bene. (*Pid.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae,
Subcarb. Magnesiae, sing.
part. aeq.
Misce ut fiat pulvis. (B.)

Sp. eandem formulam sed loco magnesiae Oculos Cancrorum.

7) Durch Schwefel.

Pulvis pyricus s. pyricus de Siruensee. (B*.)

℞ Nitri . . . . . partes sex.
Sulphuris,
Carbonis, sing. . partem unam.
Pulverata misce. — Arzneimittel bei Bißwunden wüthender Thiere. — Ein schlechtes Mittel, da es nur oberflächlich wirkt.

8) Durch Metallsalze.

Pulvis diaphoreticus. (*Va.* Hosp. Amer.)

℞. Nitri . . . . drachmam unam.
Tartari stibiati . granum unum.
Calomellis . . . . grana sex.
Misce, fiant doses sex. — Ein Stück alle zwei Stunden in Syrup.

Protochloras Potassii, Chloras Deutoxydi s. Protoxydi Potassii, Chloras Potassii s. Potassae, Murias Potassae hyperoxygenatum s. supraoxygenatus s. oxygenatum, Kali vegetabile salito-dephlogisticatum, Chloruretum Potassae oxydatum, Haloidum oxygenatum, Oxygeno-chloruretum Potassii, Oxymurias Potassae, Potassae Euchloras, Kali muriaticum oxygenatum s. oxymuriaticum s. chloricum, Chloras kalicus; oxydirt salzsaures Kali; Protochlorate de potassium, Chlorate de protoxide de potassium, Chlorate de potasse, Muriate suroxigené de potasse (*Gal.*). (B*. Bor4. Fer. Gal. LP. Pm. *Br. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Salis communis,
Acidi sulphurici, sing.
part. quinque.
Potassae caust fus. part. quinque
c. dim.
Oxydi Mangani part. octo c. dim.
Potassae Aquam adde, donec liquidum non supra 30° B. indicet, filtra, in vitrum cylindricum, longum et arctum infunde, in liquorem transmitte torrentem Chlori rel quas tres substantias commiscendo producti, lamellas quae subsident, colli ge et cum Aquae frigidae pauxillo ablue. (B*. Fer. Gal. *Br. Re. Sw. T. Vm.*)

Fi. Salis marini libras duas, Oxydi Mangani, Acidi sulph., sing. unam, Potassae caust. fus. unciam, Aquae purae libras quatuor; — GalH. et *Sw.* Subcarbonatem praescribunt; — GalH. liquidum 20° B. et redissolutionem lamellarum in Aqua bull. indicat; — Pm. Salis marini decrep. libras tres, Oxydi Mangani uncias novem, Acidi sulph. concentr. viginti, Salis Tartari libram, Aquae dest. sex et redissolutionem lamellarum in Aquae destill. bull. quadrupla quantitate; — LP. Carbonatis Potassae libram in Aquae ad saturationem q. s. et Gas e mixtura praeparata e Muriatis Potassae libris quatuor, Oxydi Mangani una et Acidi sulph. duabus diluti duabus libris Aquae; — — *Gr.* Salis comm. libras tres, Mangani, Acidi sulph. c. Aq. dest. s. q. diluti, sing. duas, destillentur in recipientem, Ciner. perl. unc. sex in Aq. libris tribus solut. continentem, evaporent etc.

Bor4. Kali oxymuriaticum venale indicat, quod depuratur solvendo in Aquae dest. ferv. partibus tribus, filtrando et ad crystallisationem reponendo.
Reizend, bei Scorbut, Flechten, chronischer Leberentzündung und venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehen bis dreißig Gran.

Solutio Muriatis Potassae oxygenati, Liquor ad ulcera atonica, Solutio Chloratis Potassae. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Chloratis Potassae drach. unam.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Dissolve. — Man tränkt mit dieser Flüssigkeit Charpieplumasseaux oder trägt

ſie mittelſt eines Pinſels auf ſchmerzloſe Geſchwüre, um das Leben der Gewebe zu bethätigen.

Aqua alcalina oxymuriatica, Eau de Javelle. (B⁴. Du. *Gr. Re.*)

℞. Salis comm. decrep. libras duas.
Oxydi Mangani . libram unam.
Aquae,
Acidi sulph., sing. . libras duas.

Commisce sal et oxydum, immitte in retortam et infunde aquam, adde deinde sensim acidum et transmitte torrentem Gasis evoluti e Liquore praeparato cum Subcarbonatis Potassae unciis quatuor et Aquae unciis viginti novem. Liquidum saturatum pendet 1,087.

Potus oxygenatus, Tisana oxygenata. (*Sw.*)

℞. Solut. Chloratis Potass. lib. duas.
Aquae purae . . libras quatuor.

Commisce. — Reizend, in Fällen allgemeiner Aſthenie geprieſen. — Gabe, ein bis zwei Pfund täglich.

Potio oxygenata (RC.): Muriatis Potassae drachmam unam, Aquae destillatae libras tres.

Protohydrochloras Potassii, Hydrochloras Protoxydi Potassii, Hydrochloras s. Murias Potassae, Sal digestivum s. febrifugum s. febrifugus etc. Sylvii, Spiritus Salis marini coagulatus, Chloruretum Potassii; hydrochlorſaures Kali, Sylvius Digeſtivſalz; Protohydrochlorate de potassium, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sal digestif ou febrifuge de Sylvius. (*Gal.*). (B⁴. Ba. Br. Gal. His. His3. Sar. Wir. *Fi. Gr. Sp. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae . q. vis.
Aquae . . . . quantum sufficit ad dissolutionem; liquori filtrato infunde
Acidi hydrochlorici . . . q. s. ad saturandam potassam. Evaporet liquidum, donec 30° indicet et sepositum crystallisationi subjiciatur. (Ba. Gal. His. Wir *Gr. T.*)

His3. Acidi libram unam instilla paulatim Aquae libris octo et adde Carbonatis Potassae libras duas vel q. s. ad perf. saturationem; — *Fi.* Salis Tartari q. vis.; infundatur Acidum muriaticum per vices, donec effervescentia cessaverit; filtra et ad cuticulam usque consume.

℞. Salis comm. partes quinque c. dimid.
Subcarb. Potassae calcin. part. sex c. dim.
Aquae . . . . partes sedecim.

Coque, filtra et ad crystallisandum repone, liquorem calidum servando, donec non amplius crystallos demittat. (*Vm.*)

B⁴. Sar. *Fi. Gr. Sp.* et *T.* Residuum e praeparatione Subcarbonatis Ammoniaci elegi; — Br. et Wir. Sal commune per Sal Tartari in Aqua dissolutum decomponi et crystallisationi subjici volunt.

Potest etiam, secundum *Chevallier* et *Idt*, Sulphas vel Supertartras Potassae dissolvi in Aqua dest et liquori infundi Hydrochloras Calcis liquidus, donec non amplius oriatur praecipitatum. (*T.*)

Dieſes Salz führt, cryſtalliſirt, den Namen *Chloruretum Potassii.*

Reizend, ſchmelzend, einſchneidend, gegen vier- und dreitägige Fieber als ſchweiß- und harntreibendes Mittel geprieſen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel in vier Mal ſo viel Waſſer.

Hydrosulphas Potassae. (*Vm.*)

℞. Potassae caust. calcin. part. unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Post solutionem immitte torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem, qui post subsidentiam clarefactus servetur.

Protoacetas Potassii, Acetas Protoxydi s. Deutoxydi Potassii, Acetas Kali, Acetis s. Acetas Potassae s. Lixiviae s. kalicum s. kalicus, Alcali Tartari Aceto saturatum, Alcali vegetabile cum Aceto, Arcanum Tartari, Kali acetatum s. aceticum, Lixivia acetata, Magisterium Tartari purgans, Oxytartarus, Sal diureticus, Tartarus acetosus, Terra foliata Tartari; Weinſteinblättererde, eſſigſaures Kali; Protoacétate de potassium, Acétate de protoxide de potassium, Acétate de potasse, Terre foliée de tartre (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

1) Im feſten Zuſtande.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci et pulverati . . . . libram unam.
Aceti fortis libras duas vel tres.

Calefac sal in capsula vitrea et adde sensim acetum; cessatâ effervescentiâ destillent in balneo aquae ad siccum; residuo adde novum Acetum et iterum

destillando ad siccum redige; continua ita, donec acetum immutatum transeat; sicca deinde sal blando calore, dissolve in Alcoholis triplo et tunc, filtratus liquor destillet in balneo aquae; residuum siccum serva. (Pal. Sar.)

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Dissolve in Aquae parva quantitate et solutioni adde
Aceti destillati . . libras octo.
Coque ad syrupi parumper spissi consist., adde novum Acetum ita ut perfecte saturetur, sicca lente, continue agitando, liqua residuum in Aqua dest. et liquorem filtratum lente consume. (Ams. An. Wür. *Br.*)

℞. Subcarbonatis Potassae . q. vis.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Infunde sensim acidum sali et per plures dies digere, saepius agitando et an saturatio perfecta sit videndo; tunc lente ad siccum evaporatis, sal in Aqua pura dissolve et liquorem ad siccum usque consume. (B. Bel. Bor. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Han. His. His3. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Suec. Wir. *C. Fi. Gr. Pid sp. Sw.*)

His3. loco Aceti et Acidum acet., octavam partem tantum sumendo, proponit; — LH. Subcarbonatis libras duas, Acidi acet. dest. q. s. ad saturationem perfectam, filtrare et ad dimidium evaporare, liquorem post refrigerationem a sedimento decanthare, per carbonem animalem filtrare, addere parvum excessum Acidi acet. concentr. et in balneo aquae sale communi saturato fervente ad siccum vaporare; — LP. Carbonatis libras quatuor, Acidi acet. q. s. ad saturationem perfectam, filtrare, balneo arenae et tunc balneo mariae ad siccum vaporare etc.; — praeterea Potassae purificatae drachmam unam saturare perfecte Acido acetico.

℞. Subcarbonatis Potassae . q. vis.
Immitte sensim in
Aceti dest llati . . . . . q. s.
ita ut perfecte dissolvatur. Cola liquorem et in capsula argentea consume ad quartae (tertiae Bor4. HassP.) circiter partis remanentiam, tunc refrigeratum sepone ut subsideat et decanthato sensim adde Acetum; evaporet deinde ad siccum. (Gal Bor4 HassP. *T.*)

Lon. *Re.* Potassae sesquilibram, Acidi acetici congium; parte dimidia consumta instilla Acidum quod ad plenam saturationem sufficit; iterum ad dimidium evaporet etc.: — LonN Potassae libram, Acidi acet. fortioris octarios duos, Aquae dest. ferventis octarios duos, primum ad cessationem effervescentiae, deinde ad cuticulam evaporare; — Pm Subcarbonatis uncias sex, Aceti dest. q. s. ad saturationem et ultra, liquorem evaporationi submittere et balneo maris siccum reddere. Postea immixta Carbonis vegetabilis pulv. uncia una in crucibulo argenteo fusionem igneam perficere, massam frigefactam Aceto stillato solvere, solutionem filtrare et balneo maris ad sicc. redigere Acetatem adhuc calidum in vase rite claudendo reponere; — *Vm.* hunc ipsum agendi modum indicans Acidum leviter calefacere, antequam sal immittatur et liquorem statim caloris vividioris ope et sub continua agitatione ad siccum redigere.

Proposuerunt quidam ad obtinendum majorem salis alborem, liquorem per filtrum e Carbonibus compositum transmittere (*T.*), vel illum frigide cum Carbone animali tractare, vel cum Pulvere Carbonum vegetab. praeparatorum coquere (Bor4. HassP.), vel Sal pluries dissolvere et vaporationibus successivis subjicere.

℞. Acetatis Calcis desiccati
partes septem cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae desiccati
partes undecim et tres quadrantes.
Misce terendo et adde Aquae bull. q. exacte ad acetatem productum dissolvendum requiritur, quod per plures vices est infundendum, cola exprimendo et statim sicca ut supra. (*Vm.*)

℞. Sulph. Potassae pulv. part. octo c. quadrante.
Acetat. Barytae cryst. part. tredecim.
Commisce, adde Aquam et ut antea age (*Vm.*)

Vm. praeterea Tartratis Potassae et Acetatis Calcis, sing. part. aeq. et in Aqua ad saturationem dissolutas vicissim commiscere ita ut alter alterum decomponat; fit hoc infundendo tartratem in acetatem, colando cum expressione, residuum abluendo et liquores commixtos evaporando.

T. Acetatem Plumbi liquidi per Solutionem Carbonatis vel Sulphatis Potassae decomponere, mixta igni exponendo ad bullitionem usque, filtrare et liquido infundere guttas aliquot Sulphatis vel Carbonatis Potassae et ad siccum usque evaporare.

2) Im flüſſigen Zuſtande.

Acetas Potassae liquidus s. aquosus, Liquor Terrae foliatae s. Tartari vegetabilis s. Kali acetici s. digestivus Boerhaavii s. Alkali acetici nigri s. Terrae foliatae Tartari s. Salis Alcali vegeta-

bilis acetati, Salsilago Oxytartari, Acetas Lixiviae solutus, Mixtura salina pauperum: Blätterweinſteinerdeflüſſigkeit, flüſſiges eſſigſaures Kali; Acétate de potasse liquide, Liqueur de terre foliée de tartre (*Gal.*). (A. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. DD. Fenn. GalM. Ham Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. *Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae . q. vis.
Acidi acetici concentrati . q. s.
ad saturandum sal i. e. partes circiter duas; infunde sensim sali acidum, mixturam tubi vitrei ope agitando. Liquor filtratus pendeat 1.230 ad 1,235. (Ba.)

℞. Subcarb. Potassae unc. duodecim.
Aceti . . . . quantum sufficit ut perfecte saturetur. Mixta stent in digestione per aliquot dies, subinde agitata; adde Acetum si requiritur, vaporando ad unciarum octoginta octo remanentiam (B.), vel ita consume ut liquor 7° indicet (Bel.).

Von dieſer Formel giebt es zahlreiche Verſchiedenheiten: Hass. Misce Subcarbonatis libram unam et Aceti comm. q. s. ad sal neutralisandum, consume deinde ad librarum trium remanentiam et filtrata serva; — A. Subcarbonatem cum Aceto dest. (pond. 1,005), tunc totum ad librarum trium remanentiam consume, ita ut liquoris pondus sit 1,200; — Fer. GalF. GalH. Subcarbonatem cum Aceto satura et adde Aquae font. q. s. ut totum pondus sit sesquilibra; — BorC. DD Ful. *Sp Vm.* In Aceto alho 6° Subcarbonatis dissolve quantum potest; liquorem filtra et serva; — Ham. Subcarbonatis unciam unam satura cum Aceti quantitate necessaria et ad unciarum sex remanentiam consume; — GalM. Commisce Subcarbonatis partem unam et Acidi 13° sedecim, calefac ad perfectam saturationem et serva.

℞. Acetatis Potassae partem unam.
Aquae destillatae . partes duas.
Dissolve. (Ams. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Pol. R. Sax. *Fi. Sw. T. Va.*)

Bor4. Pond. sp. = 1,140 — 1,150.

Hass. et *Pid.* Sal volunt ut in aëre libro, deliquescat et liquor filtretur.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturandum sal. Liquori adde
Aquae comm. unc. duas ad quatuor.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce bene. (B.)

℞. Subcarb. Potassae libram unam
Infunde per portiones
Aceti . quantitatem sufficientem ut saturetur. Liquorem post tres dies filtratum consume balnei arenae ope ad librarum trium remanentiam et adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Serva in lagena obturata. (Li.)

Das eſſigſaure Kali iſt ein Reizmittel, welches, je nach den Gaben oder den Umſtänden, als auflöſend, eröffnend, harntreibend und abführend wirkt. Man wendet es bei Waſſerſucht, Gelbſucht und Verſtopfungen der Unterleibseingeweide an. — Die Gabe iſt von einem Scrupel bis zur Drachme und mehr. Das flüſſige betreffend, ſo giebt man es gewöhnlich zu vierzig bis achtzig Tropfen in einem paſſenden Vehikel.

Mineralſäuren, Tamarindenabkochung, Queckſilberſublimat, ſalpeterſaures Silber, ſchwefelſaures Natrum und Bittererde, ſalzſaures Ammoniak und cremor. tart. dürfen nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salzes nicht oder wenigſtens nicht merklich durch fremde Subſtanzen verändert iſt.

Bolus antilactosus s. lac pellens. (*Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Acetatis Potassae scrupulum unum.
Conservae Flor. Calendulae q. s.
Misce sedulo. — Morgens vier und zwanzig Tage lang zu nehmen, um die Milch aus den angeſchwollenen Brüſten zu entfernen; man trinkt dann einen Napf voll Quendel- und Selleriabkochung mit friſcher Butter verſetzt. Nöthigenfalls kann man Abends noch einen Biſſen nehmen.

Potio cum Acetate Potassae s. diuretica. (*Ra. Sa. Sm. Va.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Succi Cerefolii uncias duodecim.
Solutioni adde
Syr. Quinque Radic. aper. unc. duas (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Tiliae . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi drach. unam.
Syrupi Aceti . . unciam unam.
Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Ocul. Cancror. praep. drach. tres.
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Cessatâ effervescentia liquorem dilue cum
Aquae fontanae . . unciis octo.
Solve in eo deinde
Acetatis Potassae drachmam unam et adde denique
Syrupi Foeniculi unciam unam.
Misce sedulo. (*Sa.*)

Löffelweiſe. — In der letztern Formel hängt die harntreibende Wirkung vornehmlich von dem eſſigſauren Kali ab.

Potio aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Chamomillae uncias sex.
Aquae Cinnam. hordeat. unc. duas.
Extr. Millefolii drach. quatuor.

Gabe, ein Eßlöffel dreimal täglich. Man trinkt dann einen Bouillon von vier Unzen Hammelfleiſchbrühe mit einer Handvoll Cichorien-, Huflattig- und Brunnenkreßblättern.

Mixtura ad icterum s. antiicterica. (*Ca.*)

℞. Acetatis Potassae,
Extr. Taraxaci liq., sing. semunciam.
— Cicutae liq. . gr. 10 ad 20.
Aquae Foeniculi . . uncias sex.
Syr. Quinque Radicum unc. unam.

Gabe, zwei Löffel alle vier Stunden.

Tisana aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Nitri . . . . scrupulum unum.
Succi Boraginis . . uncias duas.
Solutioni adde
Seri Lactis clarif. octarium unum.

Desbois von Rochefort verordnete dieſen Trank, den Tag über, aber größtentheils Morgens nüchtern zu nehmen.

Potio temperans, Mixtura salina. (Hass. Suec. *Sa.*)

℞. Subcarb. Potassae drachmas tres.
Aceti . . . . . uncias novem vel quantum satis ad saturationem.
Adde
Aquae fluvialis . libram unam.
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Misce et filtra. (Suec.)

Hass. Subcarbonatem cum Aceto saturare, liquoris uncias quatuor vel quinque cum Aquae dest. aequali quantitate diluere et addere Syrupi apti alicujus unciam unam; praeterea: Salis Tartari q. vis, Aceti Vini q. s. ad saturationem (loco *Potionis Riverii*) (HassP.); — *Sa.* in lagenam immittere Aceti uncias novem, Aquae libram et Sacchari uncias duas, tunc addere Subcarbonatis Potassae drachmas tres et bene obturatam in loco frigido servare.

Gabe, zwei Eßlöffel alle zwei oder drei Stunden.

Conserva resolvens et aperiens. (*Bo.*)

℞. Terrae foliatae Tartari semunciam
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Succi Nasturtii,
— Fumariae,
— Mercurialis,
Succi Taraxaci, sing. uncias duas.
Sacchari . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Eßlöffel voll, drei oder vier Mal täglich.

Electuarium ad scrophulas s. antiscrophulosum. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae . drachmas sex.
Conservae Cochleariae uncias duas.
Extr. Graminis,
— Taraxaci, sing. unc. unam.
Syrupi Cichorii compositi . q. s.

Gabe, ein Kaffeelöffel viermal täglich in einem Glaſe einer ſchwachen Hopfenabkochung.

Potus diureticus simplex, Tisana diuretica s. diuretica simplex. (*Au. B. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Decocti Graminis libram unam.
Liquor. Terrae fol. Tartari unc. duas.

Allmälig zu nehmen.

Potio diuretica. (*Au.*)

℞. Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturandum alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Limonum . . semunciam.

Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturationem alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.

Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti aromatici quantum sufficit ad saturandum. Adde
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis . libras duas.
Liq. Terrae fol. Tartari unc. duas.

Allmälig zu nehmen bei Waſſerſucht

℞. Decocti amari . . libram unam.
Tinct. Rhei aquos. unc. quatuor.
Terrae fol. Tartari drach. duas.

Bei Anſchwellungen der Unterleibseingeweide.

℞. Infusi Cort. Aurant. libram unam.
Terrae fol. Tartari drach. duas.
Sacchari . . . unciam unam.

Bei ſogenannten aſthenischen Entzündungen.

Decoctum diureticum tonicum. (LH.)

℞. Radicis Butuae . . semunciam.
Coque in
Aquae . . . . . sesquilibra
ad remanentiam . . . librae unius.
In ultimis bullitionibus adde
Baccarum Juniperi contusarum
drachmas duas.
In colatura dissolve
Acetatis Potassae . semunciam.
Gabe, vier Unzen drei Mal.

Mistura diuretica. (*Gr.*)

℞. Potassae Acetatis . . drachmam.
Oxymellis Colchici drachmas duas.
Aquae . . . . . unciam unam.
Spiritus Juniperi comp.
semunciam.
Auf eine Gabe.

℞. Liquoris Ammonii acetici unciam.
Potassae Acetatis . . drachmam.
Auf eine Gabe täglich drei Mal.

Mistura diuretica et tonica. (*Gr.*)

℞. Infusi Gentianae comp.
uncias sex.
Acetatis Potassae sesquidrachmam.
Spiritus Juniperi compositi,
— Armoraciae comp., sing.
semunciam.
— Aetheris nitrici
drachmas duas c. dimidia.
Misce.

Acetum aromaticum extemporaneum. (*Gr.*)

℞. Acetatis Potassae
drachmam unam.
Essentiae Limonum . guttas tres.
Olei Vitrioli . . guttas viginti.

B. Präparate, in denen die Wirkung des essigsauren Kali mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Alcohol.

Hierher gehört außer den folgenden Formeln auch der *Liquor Terrae foliatae Tartari* nach Li.

Potio diuretica. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Acetatis Potassae . unciam unam.
Vini albi . . . . libram unam.
Bei sogenannten passiven Wassersuchten, d. h., wenn kein Zeichen einer heftigen Reizung des Darmcanals bemerkt wird.

Liquor Terrae foliatae Tartari spirituosus. (Br. Pal. Wir.)

℞. Acetat. Potass. bene siccati
uncias duas.
Alcoholis concentrati uncias octo.
Stent in digestione per dies aliquot, tunc filtrentur. — Ehedem als ein vortreffliches Mittel bei Hypochondrie, Podagra, viertägigem Fieber und allen durch Stockungen entstandenen Krankheiten gepriesen. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen.

Solutio lithontriptica della Lena. (B*.)

℞. Acet. Potassae liq.
unc. duas cum dimidia.
Subcarb. Potassae . unc. unam.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Stent in digestione ad perfectam salis solutionem usque.
Man kann von dieser Flüssigkeit zehen bis dreißig Tropfen in einem schicklichen Vehikel geben.

Essentia dulcis. (Wir. *Ca.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae . . . . . sesquiunciam.
Coque in capsula porcellanea, donec massa tota colorem nigrum acceperit et refrigeratae infunde
Alcoholis (80°) uncias duodecim.
Dissolve, subinde agitando, et filtra. (*Ca.*)
Wir. dissolvere massam in prioribus liquidi partibus tribus, destillando simul Aquae Vitae libras quatuor, Aluminis uncias quatuor et unam libram Aquae obtentis.
Reizend, stärkend, eröffnend, balsamisch und harntreibend. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen in einem passenden Tranke für Erwachsene; drei oder vier bis zwölf für Kinder.

2) Durch Spießglanz.

Liquor Kali acetici cum Rheo, Mixtura desobstruens. (*Au. Pid.*)

℞. Subcarb. Potassae drachm. unam.
Aceti . . . . quantum sufficit ad saturandum perfecte alcali. Solutioni adde
Tinct Rhei aquos. unciam unam.
Vini antim Huxh. drachm. unam.

Electuarium antiscrophulosum s. ad scrophulas. (*Bo.*)

℞. Acetat's Potassae,
Pulv. Spong. ustae, sing.
drachmas duas.
— Mercur. dulc.
grana duodecim.
— Sulphureti Antimonii
sesquidrachmam.
— Jalapae . . grana sedecim.
Florum Sulphuris drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Von Baumé bei ſcrophulöſen Anſchwellungen der Lymphdrüſen empfohlen. — Gabe, zwölf bis vierundzwanzig Gran, zwei Mal täglich.

3) Durch Aether.

Mixtura salina. (DD.)

℞. Acet. Potassae liq. unc. duodecim.
Aetheris sulph. drachmam unam.
Infusi Menthae pip. . uncias sex.
Commisce bene.

Liquor resolvens. (*Sa.*)

℞. Liquor. Terrae fol. Tart. unc. quatuor.
Extr. Centaurii min. drach. duas.
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Syrupi Kermetis . . uncias duas.
Misce sedulo.

4) Durch China.

Mixtura resolvens. (*Bo. Pie.*)

℞. Acetatis Potassae . grana decem.
Extracti Chinae . . grana tria.
— Cicutae . . . grana duo.
Infusi Foliorum Jaceae uncias tres.

Von Baumé bei Drüſenverſtopfungen empfohlen. — Löffelweiſe drei oder vier Mal täglich.

Electuarium febrifugum et aperiens. (*Bo.*)

℞. Acet. Potassae liq. . uncias duas.
Extr. Chinae . . drachmas duas.
— Cascarillae . drach unam.
Elixir Proprietatis unciam unam.

Gaub rühmte es bei Wechſelfiebern mit Verſtopfung oder Waſſerſucht. — Gabe, dreißig Tropfen in einem Löffel Waſſer alle zwei Stunden an den freien Tagen.

5) Durch Meerzwiebel.

Liquor scilliticus. (Ham.)

℞. Subcarbonatis Potassae . . q. s. ad saturandum perfecte
Aceti scillitici . . unciam unam.

Essentia scillitica Keupii. (*Br. Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
Aceti scill. c. Aceto dest. praep. unc. duodecim.
Coque ad mellis consist. et adde
Alcoholis (36°) . . uncias sex.
Digere per aliquot dies et decantha.

— Bei Aſthma und Waſſerſucht empfohlen. Gabe, vierzig bis ſechszig Tropfen in einem paſſenden Vehikel.

Haustus diureticus s. Potio diuretica Milmanni. (B*.)

℞. Subcarb. Potassae gr. quindecim.
Aceti destillati . quantum sufficit ad solvendum alcali. Liquori adde
Aquae communis . semunciam.
— Menthae crisp. unc. unam.
— Piperis Jamaicensis,
Aceti scillit., sing. drachm. unam.
Syrupi Sacchari . drachm. duas.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme alle ſechs Stunden, bei Waſſerſucht.

Mixtura resolvens. (*Sa.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Oxymellis scillitici . uncias duas.
Aquae Foeniculi,
— Petroselini,
— Juniperi, sing. uncias sex.
℞. Liq. Terrae fol. Tartari semunciam.
Extracti Inulae . drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Aquae Hyssopi . . . uncias sex.

Potio diuretica et leniens s. sedans. (*Pie. Va.* Hosp. Monspel.)

℞. Acetatis Potassae,
Oxymellis scill., sing. drachmam unam.
Aquae Tiliae . . uncias quatuor.
Laudani liq. Sydenhami guttas quindecim.
Syr. Quinque Radicum unciam.

Löffelweiſe.

Elixir resolvens. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae purific. uncias duas.
Aceti scillitici . quantum sufficit ad saturationem. Adde
Aquae dest. Chamomillae libras quatuor.
Tinct. Antimonii Jacobi,
— Martis aper., sing. unciam unam.
Extr. Fumariae,
— Trifolii,
— Millefolii,
— Cardui bened., sing. semunc.
Filtra liquorem.

— Alle zwei Stunden einen kleinen Löffel, als Reizmittel für den Nahrungscanal. — Man empfiehlt dieſes Elixir bei Waſſerſucht.

Hyper s. Superprotooxalas Potassii, Superoxalas Protoxydi Potassii, Superoxalas s. Binoxalas Potassae, Bioxalas kalicus cum Aqua, Oxalas acidulum Potassae s. Potassae acidulus s. basicus s. acidum s. acidus, Superoxalas kalicum, Hyperoxalas Potassae, Acetosellae Sal, Sal Acetosellae s. Acetosellae verus, Oxalium, Kali oxalicum acidulum, Oxalas Potassae s. subpotassicus; ſaures ſauerkleeſaures Kali, Sauerkleeſalz; Surprotooxalate de potassium, Suroxalate de protoxide de potassium, Suroxalate ou Binoxalate de potasse, Oxalate acide

ou acidule de potasse, Sel d'oseille (*Gal.*).

§. I. Wie es im Handel vorkömmt.

An. B. Ba. Pel. Bor. Bor4. D. Fenn. Hass. HassP. Li O. Pol. Sax. Suec. *C. T. Va.*

T. führt die Bereitungsart an, welche mit der im folgenden §. angegebenen ziemlich übereinkömmt.

§. II. Besonders bereitet.

Br. Fer. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp. Vm.*

℞. Folior. rec. Acetosellae . q. vis.
Contunde in mortario marmoreo cum pistillo ligneo, exprime succum preli ope, calefac in balneo aquae et adde Albumen subactum ut clarefiat; evaporet deinde in balneo aquae et in loco frigido crystallisationi subjic atur. (Br. Fer. Ful. Pal. Sar. Wir. Wür. *Br. Pid. Sp Vm.*)

Fi. Gr. per se clarificare, filtrare, levis bullitionis ope ad syrupi consist. redigere et in lagenis ad crystallisandum seponere.

℞. Acidi oxalici . partes duodecim.
Subcarb. Potass. calcin.
part. sex cum dimidia.
Misce et dissolve in Aquae quantum minima potest quantitate; filtra et in crystallos redige. (*Vm.*)

Fi. Acidi crystallis. partes quatuor, Salis Tartari unam et Aquae dest. q. s.; — *Gr.* Aquam Subcarbonat. Potass. instillando in Solutionem Acidi oxalici aquosum etc.

Entzündungswidrig, kühlend, adstringirend, aber wenig in Gebrauch.

Quadroxalas Potassae (*T.*): Sal Acetosellae cum Acidi oxal. quantitate sua ipsius aequali conjungendo bullitionis ambarum substantiarum in Aquae dest. q. s ope paratur. — Ist weniger löslich, kann aber eben so angewendet werden.

Oxalas neutrum Potassae, Kali oxalicum purum. (HassP. *T.*)

Paratur saturatione Liquoris Acidi oxalici calefacti cum Liquore Salis Tartari purissimi vel saturando Acidum Kali oxalici cum Potassa — ut reagens.

Pulvis Oxalatis Potassae. (B*.)

℞. Salis Acetosellae scrupulos duos.
Elaeosacchari Citri
unc. duas c. dimid a.
Commisce bene.

Trochisci temperantes. (Wir. *Pid.*)

℞. Salis Acetosellae drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias octo.
Olei Citri . . . guttas decem.
Pulverata cum
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
in massam redige in trochiscos dividendam.

Liquor Kali oxalici. (HassP.): Kali partem unam, Aquae destillatae octo; ut reagens.

Protocitras Potassii, Citras Protoxydi Potassii, Citras Potassae s. kalicum s. kalinum, Kali citratum, Sal Absinthii citratum: citronsaures Kali; Protocitrate de potassium, Citrate de protoxide de potassium, Citrate de potasse (*Gal*). (Ba. Bor. Han. O. *Br. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarb. Potassae cryst. . q. vis.
Succi Citri recens expressi q. s. ad saturationem. Infunde pedetentim succum et subinde liquorem reagentium ope de saturationis gradu indagando; sepone per horas viginti quatuor, filtra et ad siccum consume.

Citras Potassae aquosus, Mixtura salina s. salina simplex s. antiemetica, Solutio Citratis kalici. (B. Fenn. LH. Lus. Suec. *Au. Br. Sw.*)

℞. Subcarb. Potassae . drachm. tres.
Succi Citri . . . . semilibram, vel quantum ad saturationem kali sufficit. Adde
Aquae fontanae . . . . . q. s. ut libra una liquidi impleatur et
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce bene. (B*. Fenn. Lus. Suec. *Br.*).

LH. Carbonatis drachmam, Succi Limonis ad saturationem, Aquae comm. uncias quinque, Syrupi comm. semunciam. (Auf drei Mal.)

℞. Subcarb. Potassae drachm. unam.
Succi Citri . . . . uncias tres.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Sacchari albi . . . semunciam.
Misce. (*Sw.*)

Gabe, alle fünf oder sechs Stunden drei Eßlöffel.

Mixtura salina composita s. Macbridii. (LH. Lus.)

℞. Succi Citri . . . unciam unam.
Subcarbonatis Potassae . . q. s. ad saturandum acidum. Adde
Aquae Menthae . uncias septem
Tartari stibiati . granum unum.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Misce.

LH. Syrupum sacchari omittit, Mentham crispam indicans.

Gabe, auf zwei Mal, wenn nicht das erste Mal Erbrechen eintritt.

Mixtura tonica. (*E.*)

℞. Succi Citri . . . sesquiunciam.
Subcarb. Potassae drachm. unam.
Tincturae Chinae unciam unam.
Aquae Cinnamomi . uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden ein Löffel.

Protrotartras Potassii, Deutotartras s. Tartras Deutoxydi Potassii, Tartras Protoxydi Potassii, Tartras neutrum Potassae, Alcali vegetabile tartarisatum s. fixum tartarisatum, Kali tartaricum s. tartarisatum, Lixivia tartarisata, Sal vegetabile s. vegetabilis, Sal panchrestum s. diureticum vegetabile, Tartarus tartarisatus s. solubilis, Tartris Potassae, Tartarum solubile s. tartarisatum s. Tartaras Kali s. Tartras kalinus s. Lixiviae s. Potassae: weinsteinsaures Kali, Weinsteinkali, tartarisirter Weinstein; Prototartrate de potassium, Tartrate de potassium, Tartrate de protoxide de potassium, Tartrate de potasse, Tartrate neutre de potasse, Tartre tartarisé, Tartre soluble, Sel végétal (*Gal.*). (A. Am. Ams. An B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal Gen. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pm. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae . q. vis.
Aquae ferventis quantum sufficit (sextuplum vel octuplum) ad solutionem. Liquori bullienti adde
Cremoris Tartari quantum sufficit ad saturandum perfecte acidi excessum. Post refrigerationem filtra et ad cuticulam evaporata in crystallos coge.

LH. Solutionem Subcarbonatis in Aquae quadruplo Cremore perfecte saturatam coquere, filtrare et evaporatam usque 46° ar. indicet in locum tepidum ad crystallisandum seponere; — *Re.* Subcarbonatis uncias sedecim, Aquae bull. congium, Cremoris libras tres; — Bor. Bor4. massam post saturationem solutam, ad siccum inspissatam in Aquae dest. frigidae partibus decem solutam per horas 36 seponere, liquorem filtratum et ad siccum evaporatum servare; — HassP. per horas 24 seponere; — Pm. Subcarbonatis uncias sex, Aquae dest. libras sex, Cremoris q. s.; — Fer. Ful. Li Sar. Wür. *Sp.* et *Vm.* a reliquis non differunt, quam quod Solutionem Subcarbonatis ei Supertartratis addant.

2) Im flüssigen Zustande. *Liquor spleneticus ex Tartaro.*

℞. Tartari albi crudi,
Nitri crystallis., sing. libr. unam.

Post detonationem mixturae in crucibulo, residuum dissolve in
Aquae bullientis . libris tribus.
Cola et colaturae adde
Tartari albi pulverati libram unam.
Digere per dies septem et decantha. (Pal. Wir *Sp.*)

Reizend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme, als alterirendes, etwa eine Unze als abführendes Mittel.

Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure, Kalkwasser, salzsaurer Kalk, schwefelsaures Natrum und vegetabilische Säuren dürfen, weil sie Zersetzung bewirken, nie damit verbunden werden.

Tartarum solubile extemporaneum. (*Gr.*): Cremoris Tartari libras tres, Kali praep. unam.

Pulvis leniens s. lenitivus antihypochondriacus Kleinii, Solamen hypochondriacorum, Pulvis digestivus Kleinii. (B*. Ham. *Re. Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Rhei,
Cort. Aurant., sing. . part. aeq.
Fiat pulvis. (B*. Ham.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Pulv. Rhei,
— Cort. Aurant., sing. drach. unam.
Olei Cajeput . scrupulum unum.
Misce et divide in partes 24. (*Sw.*)

Re. Trium priorum, sing. semidrachmam, Ol. Cajeput guttas tres.

Von Klein und Baldinger vielleicht zu sehr gerühmt; es bewirkt bisweilen gelindes Purgiren. — Gabe, zwei oder drei Stück alle zwei Tage, jedes in einer Tasse Zuckerwasser.

Pulvis incidens s. resolvens. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae,
Salis Ammoniaci,
Subcarb. Magnes., sing. semunciam.
Radicis Ari . . drachmas duas.

Nutzen wie das vorige.

Liquor Tartari tartarisati, Solutio Tartari solubilis, Solutio Tartari solubilis aquosa, Limonata Cremoris Tartari solubilis. (BorC. *Br. Ra.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.

Liqua sal in aqua. (*Ra.*)

BorC. Salis unciam unam, Aquae duodecim et Mellis in solutione dissolvendi semunciam.

Lavirend, glaswеise zu nehmen.

Br. Salis libram unam et Aquae tantidem, ad usum servandum.

Fomentatio excitans s. incitans. (*Ra.*)

℞. Cremor. Tartari solub. unc. unam.
Aquae . . . . libram unam.
Dissolve. — Zum Auswaſchen oder Bähen atoniſcher langwieriger Geſchwüre.

Purgans Grantii. (*Sm.*)

℞. Tartrat. Potassae
drach. sex ad octo.
Infusi Cichorii . uncias viginti.
In solutione solve
Mannae in lacrymis uncias duas.
Zwei Wochen lang, täglich oder einen Tag um den andern, zu vier Gläſern des Morgens zu nehmen; während das Mittel wirkt, trinkt man Kalbfleiſchbrühe. — Wurde beſonders bei Hypochondrie und chroniſchen Leberkrankheiten gerühmt.

Potio laxans. (*Ca. Va.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Infusi Fol. Cichorii libras duas.
Solutioni adde
Mellis depurati quantum sufficit.
Gelind abführend; in vier und zwanzig Stunden zu mehreren Gläſern.

Potio ad atrabilem s. resolvens Mutzelii. (B°. Ful. *Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis albi, sing. . semunciam.
Dissolve in
Aquae fontanae . . unciis octo.
Stündlich einen oder zwei Löffel; bei Melancholie und Manie ſehr gerühmt (B°. Ful.)

℞. Tartratis Potassae unciam unam.
Mellis Narbonn. . uncias quatuor.
Misce exacte, aliquot guttas Essentiae Anisi addendo. — Kaffeelöffelweiſe, indem man ein Glas helle Molken und einen Napf Kalbsbouillon nachtrinkt. (*Sm.* nach Balbinger.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extr. Gentianae,
— Centaur. min., sing.
drach. duas.
Aquae . . . . . semilibram.
Stündlich zu halben Unzen bei Leberverſtopfungen. (*Ca.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extr. Centaur. min. drach. duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Auf gleiche Art zu nehmen. (*Sw.*)

Emulsio salina. (Suec.)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Mellis boni . . . sesquiunciam.
Aquae fontanae . libram unam.
Dissolve et solutionem in mortario marmoreo tritura cum
Amygd. dulc. excort. uncia una.
Emulsionem cola. — Sehr gelindes Abführmittel, glaswеiſe zu nehmen.

Potio purgans infantum s. pro infantibus. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Infusi laxantis,
Aquae font., sing. unciam unam.
Mellis glyzyrrhizati semunciam.

Potio purgans. (*Bo.*)

℞. Tartrat. Potassae drach. quatuor.
Jalapae pulveratae . grana octo.
Cerevisiae . . . . vitra duo.
Infunde per horas 24, filtra et adde
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Auf zwei Mal Morgens, drei Stunden auseinander, mit Kräuterbouillon zu nehmen.

Solutio Tartari solubilis alcoholica. (*Pid.*)

℞. Tartratis Potassae uncias quatuor.
Aquae destillatae . uncias octo.
Solutioni adde
Alcoholis . . . drachmas duas.
Filtra et serva — Kommt zu Potionen, Mixturen und Tiſanen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Liquor salinus. (Li.)

℞. Tartratis Potassae libram unam.
Salis Ammoniaci . uncias duas.
Cort. Aurantiorum unciam unam.
Aquae destillatae . libras tres.
Digere blando calore per dies quatuor, saepius agitando, et filtra.

Elixir amarum s. aperiens s. resolvens. (Br. Ful. Ham.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Trifolii . unciam unam.
Dissolve in
Aquae Menthae pip. unciis octo.
Serva. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae,
Extr. Taraxaci, sing. semunciam.
Dissolve in
Infusi Rhei . . . unciis tribus.
Solutioni adde
Aquae Menthae pip. uncias tres.
Misce bene. (Ham.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Gentianae unciam unam.
Dissolve in
Aquae destillatae . . unciis sex.

Solutioni adde
Aquae Menthae pip. uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

℞. Tartratis Potassae . uncias duas.
Aquae . . . uncias duodecim.
In solutione dissolve
Extr. Trifolii,
— Cardui benedicti,
— Centaur. min., sing.
unc. unam
Liquori adde
Aquae Cinnam. simpl. uncias duas.
Misce bene. (Br.)

Mixtura resolvens roborans. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Extr. Fumariae,
— Trifolii, sing.
sesquidrachmam.
Aquae Cardui benedicti uncias sex.
— Menthae piperitae,
Syrupi balsam., sing sesquiunciam.
Reizend, schmelzend und eröffnend. — Löffelweise.

Mixtura desobstruens s. resolvens. (*Sw.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis, singulorum . semunciam.
Aquae Cinnamomi . uncias octo.
Aetheris alcoholis. . drach unam.
Reizender als die Poti ad atrabilem, unter denselben Umständen gebraucht. — Gabe, anfangs alle zwei Stunden, dann nur drei Mal täglich eine halbe Unze.

Superprototartras Potassii, Hyperprototartras Potassii, Super- s. Hypertartras Protoxydi Potassii, Hypertartras s. Supertartras Potassae s. Supratartras Deutoxydi Potassii, Bitartras Potassae, Tartras acidus s. acidulus Potassae, Tartras superpotassicus s. subpotassicus, Supertartras kalicum; saures weinsteinsaures Kali; Surprototartrate de potassium, Surtartrate de protoxide de potassium, Surtartrate de potasse, Bitartrate de potasse, Tartrate acide ou acidule de potasse. (*Gal.*)

§. I. Wie man es im Handel findet.

1) **Unrein.** *Tartarus s. Turtarum, Tartarus crudus s. impurus, Bitartras kalicus cum Aqua crudus, Sal essentiale Tartari, Supertartras s. Supertartris Potassae impurus;* roher Weinstein; Tartre cru, Sel essential de tartre (*Gal.*).

A. An. B. Ba. Bel. Bor BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be Br. C. Fi. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Vn.*

Eine Salzkruste, welche sich an der Innenwand von Fässern ansetzt, in denen Wein enthalten ist, und welche aus einer Zusammenhäufung vieler crystallischen Blättchen besteht. Sie ist, je nach der Farbe des Weins, aus welchem sie sich absetzt, entweder weiß (Tartarum album) oder roth (T. rubrum) und besteht aus saurem weinsteinsaurem Kali mit einer gewissen Menge weinsteinsaurem Kalk und einem färbenden Stoffe.

2) **Gereinigt.** *Crystalli Tartari, Cremor Tartari, Tartarus crystallisatus, Tartarus depuratus, Tartris acidulus Potassae purus, Supertartras Potassae, Bitartras kalicus cum Aqua depuratus*; gereinigter crystallisirter Weinstein, Weinsteincrystalle, saures weinsteinsaures Kali; Tartre cristallisé, Crème de tartre (*Gal.*).

Diese verschiedenen Namen werden dem folgenden Salze beigelegt, welches sich crystallisirt in vierkantigen Prismen oder in Pulvergestalt darstellt. (A. Am. An. B. Ba. DD. Ed. GalM. HassP. Li. Lon. Pm. Sax. Suec. *C. Fi. Gr. T.*)

§. II. Reinigung des käuflichen Weinsteinrahms.

B. Bel. Bor, Bor4. Br. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Lus. O. Pol. Sar. Wir. Wür. *Br. Gr. Pid. Sp. Sw. Vn.*

℞. Cremoris Tartari . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit ad dissolutionem salis. Cola liquorem, Albuminis ope clarifica, despuma et per pannum colatum in crystallos coge. (Gal. *Br. Gr.*)

B. Bel. Br. Hass. Lus. Sar. Wir. Wür. *Pid. Sp.* et *Vn.* eundem agendi modum sed absque clarificatione albuminis ope indicant.

Bor. Bor4. Han. HassP. O. et Pal. substantias heterogeneas separare, cum Aqua frig. abluere, siccare et pulverare.

℞. Tartari crudi . . libras decem.
Argillae purae . libram unam.
Aquae libras octodecim (quinquaginta His3.)

Coque per horas duas, cola liquorem adhuc calidum, sepone ad locum frigidum ut in crystallos concrescat, quas cum Aqua frigida ablutas et in Aqua dissolutas novae crystallisationi subjice. (His. His3. *Gr. Sw.*)

Dieser beiden Verfahrungsweisen bedient man sich im Großen zu Venedig und Montpellier. (HassP. *Fi. T.*)

℞. Tartari albi cum Aqua fervida abluti et pulverati partem unam.
Aquae . . . . partes viginti.

Bulliendo dissolve, tunc denuo coque ad cuticulae spissae apparitionem usque, quae separetur, liquorem continue calefaciendo et ita perge, donec cuticula formari cessaverit. (Wür.)

Praeparatio. (LH.) ℞. Faecum Vini albi libras duodecim, solve in Aqua ferv., filtra et Albumine Ovi clarifica, filtra denuo et ad pelliculam evaporatam crystallisationi subjice; crystallos Aqua dest. lotas sicca et hanc operationem repete.

British cream of tartar (*Gr.*): Tartari partes tres, Salis enixi unam in Aqua dissoluta et crystallisata; ſtatt des Weinſteins verkauft.

Cremor Tartari reductus (*Gr.*): Crystall. Tart. libr. tres, Salis enixi unam.

Das Salz iſt kühlend, harntreibend und abführend. — Gabe, von einer Drachme bis zu zwei Unzen in acht Unzen bis zwei Pfund Waſſer.

Pulvis hepaticus ruber. (Wir. *Sp.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Ligni Santali rubri,
Petal. Rosar. rubr., sing
semunciam.
Acidi sulph. tenuis . drach. duas.
Contere petala, acidum aspergendo; adde deinde lignum et sal. — Kühlend. — Gabe, zwei Scrupel bis eine Drachme.

Mixtura Kali tartarici s. tartarica. (*Au.*)

℞. Cremoris Tartari,
Extr. Marrubii albi, sing.
drach. duas.
Aquae Melissae . . uncias tres
Auf zwei Mal, Morgens und Abends, bei Hämorrhoiden mit Verſtopfung.

Electuarium Cremoris Tartari. (B*. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Roob Prunorum . uncias duas.
Lindernd. — Gabe, alle zwei Stunden ein halber Löffel.

Oxymel tartarosum. (*Sw.*)

℞. Cremoris Tartari . partem unam.
Mellis despumati . partes duas.
Misce bene. — Bei ſogenannten galligen Fiebern und Waſſerſuchten empfohlen.

Pulvis dentifricius s. Tartari compositus. (Bor. Br. D. Fenn. Fer. Han. O. Pal. Pol. Sar. Suec. Wir. *Ca. Fi. Re. T. Vm.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Pulv. Rad. Iridis Flor. unc. duas.
— Myrrhae,
— Sang. Dracon., sing.
unc. unam.
Olei Caryophyll. gutt. quadraginta.
Misce bene. (Bor. D. Han. O.)

℞. Cremoris Tartari,
Rad. Ratanhiae, sing. . . q. vis.
— Iridis pulveratae . . q. s. ad praebendum suavem odorem. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Ratanhiae . . . . uncias sex.
Ossis Sepiae . . uncias decem.
Cremoris Tartari,
Rad. Iridis, sing. drach. quatuor.
Misce. (Fer.)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Rad. Iridis Flor. . uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Catechu, singulorum unciam unam.
Olei Caryophyll. gutt. quadraginta.
Fiat pulvis subtilissimus. (Pol.)

℞. Crem. Tartari
part. viginti quatuor.
Radicis Iridis Florentinae,
Myrrhae,
Kino, singulorum . partes octo.
Coccionellae cum aliquot guttis Succi Citri trituratae partem unam
Fiat pulvis, cujus unciis singulis guttas quatuor Olei Caryophyllorum adde. (Fenn. Suec.)

℞. Crem. Tartari part. triginta sex.
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae praeparatae,
Corallii rubri praeparati, singulorum partes viginti quatuor.
Sang. Draconis partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes sex.
Coccionellae . . . partes tres.
Caryophyllorum . partem unam.
Fiat pulvis subtilissimus. (Ful.)
Re. Cinnamomi partem unam, reliqua ut antea.

℞. Ossis Sepiae praeparati,
Rad. Irid. Flor, sing. unc. unam.
Sanguinis Draconis,
Cremoris Tartari, sing. semunciam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Misce ut fiat pulvis. (Sar.)

℞. Cretae,
Laccae, singularum partes sedecim.
Crem. Tartari
part. quadraginta octo.
Cinnamomi,
Caryophyllorum, sing. part. unam.
Contere. (*Vm.*)

℞. Cornu Cervi usti . uncias tres.
Ossis Sepiae . . . uncias duas.
Cremoris Tartari unc. dimidiam.
Radicis Iridis Florentinae,
Laccae, singularum unciam unam.
Caryophyllorum drachmam unam.
Misce fiat pulvis tenerrimus. (*Fi. T.*)

℞. Cremoris Tartari,

Rad. Irid Flor., sing. sesquiunciam.
Ossis Sepiae calcin. et porphyr. uncias tres.
Laccae . . quantum sat's. (*T.*)
℞. Laccae in granis,
Ossis Sepiae,
Rad. Irid. Flor., sing. unc unam.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Caryophyllorum,
Myrrhae,
Mastichis, sing. . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Br. Pal. Wir.)
℞. Corallii rubri porphyrisati,
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae, sing. drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmas novem.
Sanguinis Draconis drachmas tres.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Coccionellae . unciam unam et scrupulum unum.
Caryophyllorum . grana viginti.
Misce bene. (*Ca.*)

Electuarium dentifricium s. gingivale. (Br. Han. *Gr.*)

℞. Pulv. Crem. Tartari subtiliss.,
— Pumicis tenerrimi, sing. unc. sex.
— Myrrhae tenerrimi,
— Oculorum Cancrorum ten.,
— Irid. Flor., sing. unc. duas.
— Coccionellae tenerrimi drachmas sex.
Mellis rosati . . . libras tres.
Olei Caryophyll. . drach. unam.
Misce sedulo. (Han.)
℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Coccionellae . drachmam unam.
Essent. Myrrhae saturatissimae et destillatione ad dimid. redact. unc. tres.
Mellis rosati . uncias quatuor.
Tincturae Laccae unciam unam.
Misce triturando, digere per horas 24 et colaturae adhuc calidae adde
Olei ess. Cinnamomi gutt. septem.
Serva. (Br.)
Gr. Myrrhae drachmas tres, Cremoris, Coccionellae, sing. sesquidrachmam, Caryophyll. aromat. drachm. unam, Mellis unc. quatuor: vel: Oxymellis e Crem. Tart. unc. duodecim, Tinct. Myrrh. rubrae tres, Ol. Cajeput gutt. decem, Ol. Cinnam. viginti, misce.

Pulvis ophthalmicus s. Tartari argillatus s. ad maculas corneae s. ophthalmicus Baldingeri. (Ful. Hass. R. Suec. Wür. *Re. Vm.*)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari albi, sing. . semunciam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Fiat pulvis tenerrimus. (Hass.)
℞. Cremoris Tartari,
Boli Armenae,
Sacchari albi, sing. . part. aeq.
Pulverata per linteum duplicatum trajice. (Ful. R. Suec. Wür. *Re. Vm.*)

Trochisci de Cremore Tartari. (Wir.)

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Sacchari albi . . . uncias sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiat pasta homogenea. — Bei Fiebern, um den Durſt zu ſtillen.

Manna tabulata s. tartarisata, Pastilli de Manna tartarisata. (*Sp. Va.* Hosp. Germ.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Mannae . . . uncias quatuor.
Aquae . . . . . uncias decem.
Coque ad consist. requisitam et in tabellas forma. — Ein angenehmes Laxirmittel für Kinder.

Pulvis temperans s. refrigerans s. laxans et temperans s. laxans et temperans Tronchini. (D. DD. Hass. *Re. Sm. Va.*)

℞. Cremoris Tartari . . uncias tres.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati uncias quatuor.
Misce exacte. (*Sm. Va.* Hosp. Angl.)
Hass. Cremoris libram, Nitri uncias tres absque saccharo; — DD Cremoris uncias duas, Nitri et Sacchari, sing. semunciam; — D. *Re.* Cremoris uncias tres, Nitri et Elaeosacchari Citri, sing. semunciam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen, Morgens, in einem Glaſe abgeklärten Molken.

Electuarium lenitivum s. refrigerans. (A. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Nitri . . . . . semunciam.
Sacchari albi . drachmas decem.
Syrupi Limonum quantum sufficit.
Herrenſchwand verordnete dieſe Latwerge zu einem Kaffeelöffel alle zwei Stunden, des Morgens, indem er ein Glas Molken nachtrinken ließ. (*Sm.*)
℞. Pulpae Prunorum . libras tres.
Roob Sambuci . . libram unam.
Cremoris Tartari . semilibram.
Mellis despumati quantum sufficit ut fiat electuarium. (A.)

Pulvis eccoproticus. (Ful.)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Subcarbonatis Magnesiae,
Flor. Sulphuris, sing. semunciam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Einſchneidend, harntreibend, ſchmelzend,

abführend. — Gabe, eine bis drei Drachmen.

Pulvis cephracticus. (*Ca.*)

℞. Cremoris Tartari,
Magnesiae purae,
Florum Sulphuris,
Rhei electae,
Florum Chamomillae,
Elaeosacch. Foeniculi, sing. semunciam.

Von Selle bei Verstopfung der Unterleibseingeweide empfohlen. — Gabe, ein Löffel den Tag über mehrmals.

Pulvis Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis. (RC.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Gummi Guttae . . grana duo.
Pulveris aromatici grana decem, vel
— Zingiberis scrupulum unum.

Purgirend, harntreibend, bei Haut- und Bauchwassersucht. — Früh eine halbe bis eine Unze in einem wässerigen Trank.

Pulvis salinus s. Tartari compositus. (Wür. WW.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Salis polychresti drachmas duas.
Misce. (Wür.)

℞. Cremoris Tartari drach. quinque
Sulphatis Potassae drachmas tres.
Tartari stibiati . granum unum
Misce et divide in partes octo. (WW.)

Pulvis digestivus. (*T.*)

℞. Cremoris Tartari,
Tartari vitriol., sing. part. aeq.

Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze und mehr.

Pulvis Frankii. (*Fi. T.*)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Tartari stibiati . granum unum.

Ein oder mehrere Male in 24 Stunden.

Electuarium purgans. (*Sa.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis de Seignette . semunciam.
Mannae electae . drachmas sex.
Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Syrupi Rosarum solventis . q. s.

ut fiat electuarium spissum. —

Electuarium Sulphuris compositum. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Cremoris Tartari drachmas quatuor.
Florum Sulphuris unciam unam.
Theriacae . . . uncias tres.
Misce. — Einen Kaffeelöffel täglich ein oder zwei Mal.

Solutio Tartari depurati s. Cremoris Tartari, Decoctum Crystallorum Tartari. (Han. *Va.*)

℞. Cremoris Tartari drachm. tres (vel sex *Va.*)
Aquae dest ferv. uncias triginta duas (libr. duas *Va.*)
Solutioni adde
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.

Abführend, harntreibend, kühlend. — Gabe, täglich zwei Pfund.

Limonata Cremoris Tartari. (*Va.* Char.) unterscheidet sich davon nur durch die Dosis des Cremor, (℥jj auf die angegebene Quantität) und durch die Abwesenheit des Syrups.

Tisana Cremoris Tartari (B*.): Cremoris Tartari semunciam, Aquae bull. libram, Syrupi Rubi Idaei unciam.

Decoctum Tartari citratum (Sax.): Cremoris Tartari partem unam, Aquae viginti, decoque ad quindecim et adde Succi Citri partem dimidiam.

Potio hydragoga. (His. His3. *Sw.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae purae . uncias quinque.

Drei, vier, fünf oder sechs Mal täglich. — Man hat diese Potion bei Bauch- und Hautwassersucht empfohlen. (*Sw.*)

His. Cremoris Tartari unciam, Aquae octarios duos.

Tisana Milmanni.

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Aquae Hordei . . . libras duas.
Solutioni adde
Aquae Vitae unc. unam ad duas.

Bei Wassersucht empfohlen.

Potus acidus vegetabilis (RC.): Decocti Furfuris vel Hordei vel Aq. Panis biscocti libras duas, Cremor. Tart. scrup. quatuor, Syr. simpl. vel Rob Oxycocci unc. unam, vel Mell. despumat. semunciam.

Potio diuretica. (*Sw.*)

℞. Crem. Tartari semunc. ad sesquiunciam.
Decocti Hordei quantum sufficit.
Dissolve. — Löffelweise den Tag über.

Tisana Cremoris Tartari. (B*.)

℞. Cremoris Tartari,
Uvarum pass. contus., sing. uncias duas.
Aquae font. bull. . libras quatuor.

Post horas aliquot infusionis coque parumper et cola. — Glasweise zu nehmen.

Potus s. Tisana imperialis, Imperial. (B⁴. *Gr. Re. Va.*)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Corticis Aurantiorum uncias tres.
Aquae bull. octarios tres (libr. sex *Va.*)
Post sufficientem infusionem cola.
Gr. Sacchari uncias quatuor addit; — *Re.* Cremoris et Cort. Limon. recent., sing. semunciam; caet. ut *Gr.*

Mixtura purgans acidula. (*Sm.*)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari pulv., sing.
drachm. quatuor.
Syrupi Ribium . . uncias tres.
Essentiae Anisi . guttam unam.
Von Stoll in galligen Fiebern empfohlen. — Morgens nüchtern auf vier Mal mit Limonade oder Kalbfleischbrühe.

Tisana febrifuga et laxans. (*Bo.*)

℞. Cremoris Tartari . semilibram.
Infusi concentr. Chamomillae
octarium unum.
Dissolve. — In hartnäckigen Wechselfiebern gerühmt.

Potio purgans. (*B. Pie. Va.*)

℞. Cremoris Tartari drachm. unam.
Syrupi Limonum,
— Cichorii, sing. unc. unam.
Infusi Chamomillae uncias duas.
Misce. (*Pie.*)
℞. Pulpae Tamarindorum unc. unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Cremoris Tartari unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*B. Va.*)
℞. Pulpae Tamarind. . unc. unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Mannae,
Cremoris Tartari, sing.
unciam unam.
Auf zwei Mal. (*B.*)

Mixtura laxans. (*Sm.*)

℞. Cremoris Tartari drach. quatuor.
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Solutioni adde
Syrupi Mororum . uncias duas.
Gabe, ein Eßlöffel voll drei oder vier Mal täglich.

Aqua laxans Youngii (Youngs purging drink. (*Gr.*)

℞. Carbonatis Sodae
drachm. duas cum dimidia.
Crystallorum Tartari uncias tres.
Aquae . . . . drachmas octo.
In lagenis lapideis statim bene obturandis servandum. — Ein angenehmes kühlendes Getränk im Sommer.

Potio tartarica composita. (*Sw⁶.*)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae bullientis . . libras tres
Post refrigerationem decantha et adde
Tartari stibiati . . semigranum.

Liquor aperitivus s. salinus laxativus, Aqua laxativa. (*Sp.*)

℞. Salis Epsomensis,
Cremoris Tartari, sing.
unciam unam.
Sulphatis Potassae . semunciam.
Aquae bullientis . uncias decem.
Solutionem filtra.

Vinum Genistae Sydenhami s. diureticum Sydenhami s. lixiviale. (B⁴. *Bo. Pie.*)

℞. Cinerum Genistae . uncias duas.
Vini albi . . . octarium unum.
Post infusionem 24 horarum filtra (*Bo. Pie.*)
B⁴. Cinerum libram, Foliorum Absinthii semidrachmam et Vini Rhenani libras duas.
Gabe, vier Unzen drei Mal täglich, bei Wassersucht.

Vinum hydrogogum. (*Sa.*)

℞. Vini Rhenani . . libram unam.
Subcarbonatis Potassae semunciam.
Cessatâ effervescentiâ adde
Syr. Spinae cervin. sesquiunciam.
Glasweise zu trinken.

Vinum Juniperi alcalisatum. (Wür.)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Vini albi . libras duas c. dimid.
Post horas duodecim infusionis cola.

Vinum excitans. (Wür.)

℞. Salis Tachenii,
Vini generosi, sing. . semunciam.
Dissolve et adde
Oxymellis colchitici uncias duas.
Aetheris sulph. scrupulum unum.

Vinum diureticum anglicum. (*Ca.*)

℞. Subcarb Potassae sesquidrachmam.
Scillae siccatae,
Rhei pulveratae,
Baccar. Juniperi, sing.
drachm. unam.
Radicis Zedoariae drachmas duas.
Cinnamomi pulv. drachmas tres.
Vini albi . . . octarium unum.
Post sufficientem macerationem filtra. — Gabe, drei oder vier Glaser täglich, bei Wassersucht.

Super- s. Hyperprototartras Potassii boraxatus s. cum Borate Sodae, Tartras Deutoxydi Potassii Tartrate et Borate Deutoxydi Sodii commixtus, Tartras s. Supertartras Potassae solubilis per Acidum boricum, Borax tartarisatus, Tartras acidulus Potassae solubilis admixto Acido boracico, Tartris Potassae et Sodae boraxata, Tartarum boraxatum, Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis. (Ba. Bel. Bor. Bor4. Ful. Gal. Han. HassP. LH. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Fi. Gr. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Boracis . . . . partem unam.
Aquae . . . . . partes decem.
Dissolve coquendo et adde
Cremoris Tartari . . partes tres, i. e. quantum dissolvitur; sepone, filtra et ad siccum consume. (Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. HassP. Sax. Suec. Wir. *Sw*.*)

Ful. Cremoris partes quatuor et unam Boracis; — Pm. *Fi.* Cremoris libram, Boracis uncias duas, Aquae libras octo solvere, filtrare et ad mellis consist. (siccitatem) consumere etc. — *Gr.* Boracis partes duas, Cremoris quinque in Aq. q. s. solvere etc.; — *T.* Cremoris uncias sex, Aquae libras octo, Boracis unciam unam.

℞. Cremoris Tartari . partes tres.
Boracis . . . . partem unam.
Pulverata misce. (Pal.)

R. Boracis partem unam et quatuor Tartari; — *Vm.* Boracis novem et Tartari novem cum dimidia.

℞. Crem. Tart.
partes ducentas et decem.
Acidi borici . . partes triginta.
Aquae destillatae . partes viginti.
Acidum et aquam supra ignem impone, et adde solutioni simulac calefactae sensim tartarum agitando; evaporata ad siccum pulvera. (Gal.)

Re. Cremoris partes centum et viginti, caeterum ut antea; — LH. Solutioni Acidi borici unciarum sex et Aquae ferv. librarum sedecim addere Cremoris libras quatuor, coquere per horae quadrantem, filtrare et vaporare; — *Vm.* seorsim pulverare et tunc commiscere Cremoris Tartari partes octo et unam Acidi boracici.

Soubeiran dissolvere prope ignem nudum Cremoris Tartari partes quatuor et unam Acidi borac. in Aquae viginti quatuor, filtrare, leni calore ad siccum consumere et pulverare. (GalH.)

Van Mons hat ein Mittel angegeben, um den Cremor Tartari auflöslicher zu machen, welches von allen übrigen verschieden iſt, nämlich:

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Aquae . . . partes octodecim.
Dissolve coquendo in vase clauso, adde sensim Acidum tartaricum, donec guttae aliquot liquoris in corpus frigidum effusae non amplius cremorem tartari demittant; filtra deinde et ad siccum consume.

Limonada laxans s. refrigerans diuretica. (*Pie.*)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati . uncias duas.
In drei Gläſern Waſſer halbſtündlich.

Potio tartaro-boracica, Aqua salina, Fundans Lassone. (GalM. Ham. LH. *Bo.*)

℞. Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . . drachmas tres.
Aquae bullientis . libram unam.
Dissolve. (Ham.)

Bo. Salium cujusque drachm. unam et Aquae libram unam.

℞. Cremoris Tartari drachm. unam.
Boracis . . . grana duodecim.
Aquae frigidae . . libras duas.
Refrigerato adde
Syrupi communis sesquiunciam.
Gabe, nach Gefallen. (LH.)

℞. Cremoris Tartari partes viginti.
Boracis . . . . partes quinque.
Mellis despumati partes sexaginta.
Aquae . . . quantum sufficit ad implendum liquoris octarium unum; tritura sales, infunde aquam pro parvis portiunculis et solutioni mel adde. (GalM.)

Gelind abführend und mit Vortheil ſtatt der aqua tamarindorum anzuwenden; glasweiſe zu nehmen. — Man muß bei jedesmaligem Gebrauche die Flaſche ſchütteln.

Potio diuretica. (B*. *Au.*)

℞. Tart borax.
drachm. quatuor ad sex.
Aquae Juniperi,
— Petroselini, sing.
uncias tres.
Solutioni adde
Aetheris nitrici . drachmas duas.
Syr. Capit. Papav. unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel. (B*.)

℞. Tartari boraxati . . semunciam.
Roob Ebuli . . . uncias duas.
Aquae Juniperi . . uncias tres.
Syrupi Spinae cervinae,
— Violarum, sing.
semunciam.
Löffelweiſe. (*Au.*)

Pilulae hydragogae s. e Tartaro boraxato. (Au.)

℞. Extracti Trifolii . . uncias duas.
Tartari boraxati sesquidrachmam.
Rad. Polygalae Virginicae
drachm. duas.
— Colchici . sesquidrachmam.

Misce fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, sechs bis zwölf Stück alle zwei Stunden.

Prototartras Potassii et Sodii. Tartras Protoxydi Potassii et Sodii, Tartras s. Tartris s. Tartarus Potassae et Sodae, Sal polychrestum solubile s. polychrestus Seignettes. Seignetti s. Rupellense s. Rupellensis, Alcali minerale tartarisatum, Soda tartarisata s. tartarizata, Natrum s. Natron tartarisatum s. tartaricum, Tartarus natronatus s. solubilis de Seignette, Tartras kalico-natricum s. kalico-natricus cum Aqua s. Potassae sodicus s. Sodae et Kali; natrumhaltiger, natronisirter Weinstein, Seignettesalz; Prototartrate de potassium et de sodium, Tartrate de protoxide de potassium et de sodium, Tartrate de potasse et de soude, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble (*Gal.*). (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Lon. LonN. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. T. Va. Vm.*)

℞. Subcarb. Sodae q. vis (unc. viginti Lon. LonN. *Gr. Re.*)
Aquae bull. q. s. (octar. decem Lon. LonN. *Gr. Re.*)
ad dissolutionem salis; liquori adde
Crem. Tart. q. s. (libr. duas Lon LonN. *Gr. Re.*)
vel quantum ejus solvi potest; consume ad 33° ar. et ad crystallisandum sepone. (A. Am. Ams. An B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. Han. Hass. His. Lon. LonN. O. Pol. Sar Sax Suec. Wir. Wür. *C. Pid. Re. Vm.*)

His3. Carbonatis Sodae libram unam, Cremoris Tartari tres vel q. s. ad perfectam saturationem, Aquae comm. duodecim; — *Fi. T.* Subcarbonatis libram unam, Aquae tres, Cremoris q. s.; — HassP. Salis Sodae depurati libras duas, Aquae bull. octo, Cremoris tres, et denique Salis Sodae unciam unam; — Bor4. Aquae sextuplum et Cremoris tantum ut natrum fere neutralisetur; crystalli, si opacae apparent, in Aquae frig. partibus tribus solve etc.; — Gal. *Sp.* et *Vm.* Subcarbonatem in Solutionem Cremoris Tartari infundere.

Secundum GalH. lixivium hujus praeparati fere totum e Tartrate Sodae constat, e quo Sal Seignetti separatur, addendo Tartratis Potassae certam quantitatem

℞. Tartrat. Potassae
part. undecim c. dimidia.
Subcarb. Sodae sicci
part. duas cum dimidia.
Aquae . partes viginti quatuor.

Subsidere fac pro momento, decantha et in crystallos coge. (*Vm.*)

℞. Cremoris Tartari . libras duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ad solutionem salis, quam bullientem Potassae ope neutralisa et adde
Salis comm. . uncias quinque et
. drachmas duas.

Solutione refrigerata et hydrochlorate potassae in fundum demisso, consume liquorem ut in crystallos abeat. (*Vm.*)

Gr. Cremoris libras tres, Aquae congios tres, Ciner perl. q. s. ad saturandum acidum superfluum, Salis comm. uncias undecim.

℞. Tartrat. Potassae
part. undecim c. dimidia.
Sulphatis Sodae partes tres et quatuor partes quintas.
Aquae tepidae
part. viginti quatuor.

Calefac, liquori Sodae caust. pauxillum immitte, filtra et in crystallos redige. (*Vm.*)

Reizend, harntreibend, abführend. — Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze auf die Pinte Wasser.

Pulvis de Fordyce. (*Sm. Va.*)

℞. Tartrat. Potass. et Sodae
grana decem.
Rhei . . grana tria ad septem.

Misce. — *Va.* Hosp. Angl. Rhei grana sex. Bei Verstopfung der Kinder. — Man giebt es vierzehn Tage hinter einander alle Morgen, in einem passenden Vehikel.

Mixtura resolvens. (*Sm.*)

℞. Tartr. Potassae et Sodae
semunciam.
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Infusi Fol. Cichorii libr. unam.

Solutioni adde

Oxymellis scillitici uncias quatuor.

Von Boerhaave bei Unterleibsstockungen empfohlen. — Gabe, vier Eßlöffel Morgens im Zwischenraume einer Stunde.

Serum Lactis Van Swietenii. (*Sm.*)

℞. Radicis et Foliorum Taraxaci,
Herbae Fumariae,
Foliorum Nasturtii,

Fol. Cerefolii, sing. manip. unum.
Concisa coque per minima quinque vel sex cum
Seri Lactis clarif.
octar. uno (chopine).
Colatis et fortiter expressis adde
Tartratis Potassae et Sodae
drachmam unam ad duas.
Mellis Narbonnensis drachmas sex.

Alle Morgen nüchtern einen Monat lang, in vier Gläsern, in Zwischenräumen einer Stunde bei Unterleibsstockungen nach Wechselfiebern oder alten hypochondrischen Beschwerden.

Potio salina purgans (*Va.* H de la Mat.): Tartratis Potass. et Sod. drachm. sex, Tart. emet. granum unum, Aq. Flor Aurant. drachm. duas, Syrupi Mellis unciam, Aquae uncias duas. Misce. Löffelweise in verschiedenen Zwischenzeiten als Purgirmittel.

Prototartras Potassii et Ammoniaci, Tartras Protoxydi Potassii et Ammoniaci, Tartras Potassae et Ammoniaci, Tartras kalico-ammonicus, Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniatus s. ammoniacalis s. solubilis ammoniacalis, Sal ammoniacum tartarcum, Alcali volatile tartarisatum; ammoniakhaltiger auflöslicher Weinstein, Weinsteinammoniak; Prototartrate de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de protoxide de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de potasse et d'ammoniaque, Tartre soluble ammoniacal (Gal.).

§. I. Im festen Zustande.

B*. Bor. Bor4. D. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. Sax. Wir. *Sw*. Vm.*

℞. Cremoris Tartari . quantum vis.
Aquae bullientis quantum sufficit ad solutionem; liquori sensim adde
Subcarb. Ammon. liq. . . q s. ad saturandum acidi excessum; filtra et leni igne ad siccum consume.

HassP. Cremoris q. libet, Aquae ferv. quadruplum pondus, Spiritus Salis Ammoniaci aquosi quantitatem aliquanto praeponderantem, sepone loco frigido per 24 horas, filtra et ad cuticulam consumtis denuo adde Spiritus Salis Ammoniaci aquosi partem, ut tartarus, qui sub evaporatione secesserit, resolvatur, liquorem in vas murrhinum calefactum effunde et ad crystallisandum per aliquot dies loco frigido sepone etc; — Hass. Li. et Sax Ammoniacum caust. indicant; — Han. et *Vm.* in crystallos, quae tunc pulverentur, redigi volunt; — B*. antequam in crystallos redigatur liquor, addere Liquoris ammoniacalis pauxillum, ut crystalli tartari, quae forte inter evaporationem subsederunt, redissolvantur.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Tartari solubilis.

Li.

℞. Subcarb. Ammoniaci liq. unc. sex.
Adde sensim
Cremoris Tartari quantum sufficit ad perfecte saturandum ita, ut omnis effervescentia cesset; sepone per dies aliquot et filtra

Reizend, harntreibend und gelind abführend, in hitzigen Fiebern, Wassersuchten und Stockungen in den Organen des Unterleibs, jedoch selten angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich mehrmals.

Chromas Potassae (*Gr.*): Chromatem Ferri cum Nitri pond. aeq. ignis fortis aestui exponere, salem eluere, filtrare, vaporare, crystallisare, tunc bis terve redissolvere et crystallisare et crystallos in Aquae pondere quintuplo solvere. — Testmittel auf Metalle, besonders Blei.

Protooleomargaras Potassii.

Unter diesem Namen vereinigen wir hier alle eigentlich sogenannten Seifen, selbst die mit mineralischer Basis.

§. I. Im Handel vorkommende Seifen.

1) *Sapo Alicantinus s. Aloniensis s. ex Olivo s. Hispanicus s. Aloënsis s. Hispanicus albus, Sapo albus s. durus*; Spanische, weiße Seife; Savon d'Alicante (*Gal.*).

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Gal GalM. Gen. Hass. HassP. Li Lon. LonN. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. Gr. M. Re. Sa. Sp.*

Man bereitet sie aus Baumöl und Natron. Sie ist weiß, hart und gleichartig.

2) *Sapo Venetus s. Castilliensis marmoreus*; Venezianische Seife; Savon de Venise (*Gal.*)

Bel. Br. Fenn. Fer. HassP. Pol. Suec. *Gr. Pid.*

Wie die vorhergehende bereitet; sie ist auch hart, aber marmorirt.

3) *Sapo domesticus s. nostras*; gewöhnliche, gemeine Seife; Savon domestique (*Gal.*).

A. Ba. Bor. BorC. Bor4. DD. Fer. Gal GalM. Han. Hass. HassP. Pal. R. RC. Sax. WW. *M. Par.*

Wie die vorhergehenden bereitet, mit blauen Adern, welche von Schwefeleisen und Alaun herrühren, die in dem Natron enthalten sind.

4) *Sapo mollis s. niger s. viridis s. kalinus s. piceus*; ſchwarze, weiche, grüne Seife; Savon noir (*Gal.*).

DD. Ed. Hass. Lon. LonN. RG. Suec. *C. Gr. Par. Pid. Re.*

Aus Oel (Fiſchthran) und Pottaſche bereitet. Auch aus: Sapo moll. libr. septem, Ol. cetacei una, Aq. octar. septem cocta et cum Eboris usti q. s. colorat. — Zu Salben von Thierärzten. (*Gr.*)

5) *Sapo Wologdensis*; Wologder Seife; Savon de Wologd (*Gal.*).

Fenn. R. RC.

Aus Talg und Pottaſche, zu Wologda und anderwärts bereitet.

§. II. Pharmaceutiſche Seifen.

A. *Sapo medicinalis s. Sodae medicinalis s. medicatus s. amygdalinus s. medicinalis amygdalinus s. albus.*

A. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Fenn. Fer. Gal. GalM. Han. HassP. His. His3. LH. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Cu. Fi. Gr. Re. Sw T. Vm.*

℞. Subcarbonatis Sodae,
Calcis vivae, sing. libras quatuor.
Aquae . . . . . libras viginti.

Coque, trajice per linteum, liquorem consume donec unciae octo requirantur ad implendum vitrum, aquae unciarum sex capax et adde refrigerato
Olei Olivarum . . . . duplum.

Coque continue agitando, donec massa homogenea et spissa formetur, quam in modulos effusam sicca. (A. An. B. Ba. Bel. Bor. Fenn. Fer. GalM. Han. His. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür *Br. Sw.*)

Pm. Carbonatis Sodae libram unam, Calcis viv. duas, Aquae comm. triginta, coquere per horas 2, filtrare, liquorem ad dimid. evaporare vel usque turbidus appareat, seponere, decanthare liquorem a residuo calcareo, iterum vaporare ad consist. syrupi tenuis vel usque vas uncia una aquae dest. repletum, drachmas novem ponderis hujus lixivii capiat, tunc hujus Lixivii libram unam, Olei Oliv. duas miscere et coquere ad emplastri consist. et massam semirefrigeratam in modulos papyro involutos mittere; — LP. Sodae libras quatuor, Calcis vivae sex, Aquae comm. viginti coquere per bihorium et filtrare, vaporare usque vas Aquae comm. unciae unius capax drachmas undecim lixiviae capiat, libram unam hujus Lixiviae cum duabus Olei Amygdalarum per octo dies, subinde agitando seponere; — Gal. Lixivii caust. (36°) partes centum, Olei Amygd. dulc. duocentas et decem; — *T.* Lixivii partes 54 et Olei Olivarum vel Sevi 100; — *Vm.* Lixivii partem unam et Olei Amygd. dulc. duas cum quadrante; — LH. *Ca.* Lixivii libras duas, Olei Amygd. dulc. (Olivarum LH.) libras quatuor et uncias tres; — *Gr.* Olei Amygd. q. vis, Lixiv. Saponar. triplicem quant., addere Salis comm. q. s.; vel Lixiv. Sodae 38° B. libras duas, Ol. Amygd. quatuor contrita per hebdomades aliquot in modulis detinere; vel: Ol. Amygd. octarios septem, Lixivii tredecim, Salis comm q. s.; — Bor4. HassP. *Fi.* Liquoris Natri caust. recenter parati, Olei Olivar. Provincialis recentissimi duplum.

Br. Sar. Wir Wür. *T.* et *Vm.* formulam fere similem, sed loco sodae Potassam caust.

Fi. T. Saponem Alicantinum vel Venetum balnei aquae ope in Alcoholis diluti pondere nonduplo solvere, sedimentum subsidere, alcoholem destillando elicere et vaporando consumere.

Transparent soap (*Gr.*): solvendo Saponem amygd. in Spir. Vini, filtrando et spiritum destill. abstrahendo; vel: Sapon. mollis libr. 15. siccare, solvere in Spir. Vin. rect. cong. 2, Succ. Limon. unc. 18 et ad libitum odorificata.

B. *Sapo cacaotinus*; Cacaoſeife; Savon de cacao (*Gal.*). (B. Fer. Han. Li. *Sp. T. Vm.*)

℞. Lixivii Sodae . . partem unam.
Butyri Cacao liquati partes duas.

Coque, donec perfecte sint commixta.

T. Liquori ita condensato, ut corpori frigido immissus coagulet, solutionem Salis comm. concentratam infundere, ut sapo melius a liquore separetur, qui tunc in balneo aquae fundatur.

Sapo vegetabilis. (LP.)

℞. Saponis albi . . . uncias duas.
Alcoholis . . . uncias quatuor.

Tritura in mortario lapideo et sicca, commisce exacte cum Carbonatis Potassae drachmis tribus et Gummi Tragacanthae pulverati libra una. — Bei Gonorrhöe und Obſtructionen; 1 Drachme mit 2 Pinten Waſſer verdünnt, auf den Tag.

Sapo Medullae bovinae s. animalis s. Wologdensis. (Gal. *Ca. Sw. T. Vm.*)

℞. Medullae bovin. praep.
part. quingentas.
Potassae causticae liquidae partes
ducentas et quinquaginta.

Liqua leni igne, continue spathulae ope agitando, donec mixtura perfecte in aqua sit solubilis; solve deinde in

Aquae bullientis partibus bis mille. Solutioni adde
Salis comm.
part centum octoginta.
dissolutas in
Aquae destillatae partibus mille.
Refrigerata trajice per linteum, exprimendo, et sicca. (Gal. *Ca. Fi.*)

Sw. Lixivii Saponarior. partes duas et Medullae bovin. quatuor cum dimidia; — *Vm.* Sodae caust. unam cum dimidia et duas Medullae; — *T.* Solutionis Potassae caust. 36° ar. B. uncias sex, Medullae libram unam, Aquae dest. vel pluvialis quatuor, Solutionis Kali muriat. filtratae et saturatae uncias quatuor.

Alle dieſe Seifen ſind mehr oder weniger reizend; man hat ſie als ſchmelzend, harntreibend und ſteinauflöſend geprieſen. Mit Vortheil wendet man ſie an bei Vergiftung durch Säuren. Aeußerlich wirken ſie auflöſend oder zeitigend. — Gabe, von zehen Gran bis eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

T. Saponem de toelette indicat, praeparatum cum Potassa caust. et Axungia praep. vel Butyro vaccino.

Sapo liquidus (*Re.*): Sapon. Alicant. opt. subtiliss. ras. libras duas, Spir. Vini opt. congium, Ol. Rorism. vel Lavand. boni semunciam in lagena per dies decem vel duodecim soli exponere, lagenam noctu ex aëre libero semovendo et agitando donec sapo sit solutus, tunc per gossypium filtrare.

Sapo animalis aromaticus. (*Ca. Vm.*)

℞. Olei Nucis mosch. expr.
part. unam.
Medullae bovinae partes quinque.
Liquatis admisce
Sodae caust. liq. . partes septem sensim addendo et continue agitando ad perfectam conjunctionem usque. (*Vm.*)

Ca. Medullae partes septem, Olei Nucis mosch. unam, Cetacei tantidem et Lixivii Sodae caust. q. s.

Sapo Resinis medicatus (Gal. *Re.*): Resinae Jalapae, Scammonii vel alius resinae part. octo, Sapon. amygdalin. sedecim, Alcoholis q. s. ad dissolvendum, quo evaporato ad extr. consist. redige.

Ceratum exploratorium (pour le toucher). (GalH.)

℞. Olei Olivarum partes sex mille.
Cetacei,
Cerae albae, sing.
part. quadringentas
Liqua, per linteum trajice et adde sensim, continue agitando,
Sodae caust. part quadringentas octoginta.

Man darf dieſes Cerat erſt einige Zeit nach ſeiner Bereitung anwenden, damit es nicht mehr alcaliſch iſt.

Pulvis cosmeticus. (B*)

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Rad. Iridis Flor. . uncias tres.
Hippocastani pulverati libras duas.
Olei ess. Lavandulae,
— — Bergamott., sing.
gutt. quadraginta.
— — Citri . guttas triginta.
— — Caryophyll. gutt. decem.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Sodae sesquiunciam.
Rad. Iridis Flor. . unc. unam.
Cardamomi min. . drach. unam.
Olei ess. Lavandulae,
— — Bergamott., sing.
gutt. triginta.
— — Citri . guttas viginti.
— — Cinnamomi gutt. tres.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

Sapo cosmeticus. (Bor4.)

℞. Saponis Hispanici . uncias tres.
Rad. Iridis Flor. unciam unam.
Olei Lavandulae semidrachmam.
— Bergamottae scrup. unum.
Aquae Rosarum quantum sufficit ut fiat globulus.

Sapo aromaticus pro balneis. (Bor4.)

℞. Saponis Hispanici uncias quatuor.
Amyli . . . . . uncias duas.
Rad. Iridis Flor. unciam unam.
Bals. Peruv s. Ind. gutt. septem.
Olei Bergamottae,
— Corticis Citri,
— Lavandulae, sing.
scrup. unum.
Misceantur.

Camphor balls (*Re.*): Amyli valde sicc. lib. 6., Ceruss. sicc. lib. 8. laevig. et cribrata misce cum Pulv. Oryz. subtiliss. lib. 14. et Saponis opt. sicc. et rasi lib. 48, Camph. laevig. lib. $1\frac{1}{2}$, Aq. Hung. octar. $\frac{1}{2}$, additis sensim Ol. Rorism. et Lavand., sing. unc. $\frac{1}{2}$, misce. — Schönheitsmittel, doch nicht ſicher.

Boli saponacei. (*Sa. Sw. Va.*)

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.
Olei ess. Carvi gutt. duas ad tres.
Syrupi balsamici (Tolut.) q. s.

Digitized by Google

Interdum adduntur Extracti Aloës grana quatuor vel Rhei grana septem. — Purgirend.

Boli lithontriptici. (*Sp.*)

℞. Saponis Alicantini uncias octo.
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fruct. Cynosbati tost., sing. unc. unam.
Salis Tartari . drachmam unam.
Aquae Vitae . quantum sufficit.
Fiant boli sexaginta.

Pilulae saponaceae s. resolventes s. solventes del Porati. (B*. Gal. GalM. Ham. *Fi. Huf. Sm. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Saponis medicinalis semilibram.
Radicis Althaeae unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas duas.
Olei Amygdal. dulc. . . . q. s.
Fiat massa pilularis. (Gal. GalM. *Va.*)

GalH. loco olei facillime ranciditatem accipientis Syrupum Sacchari.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.
Rhei,
Myrrhae, sing. . . drach. unam.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*)

℞. Saponis albi . . unciam unam.
Extracti Juniperi,
Pulv. Gentianae, sing. drach. quatuor.
Fiant pilulae quatuor granorum. (*Sm.*)

℞. Saponis Veneti,
Galbani,
Extr. Chelidonii, sing. drach. duas.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. (Ham.)

℞. Saponis medic. sesquidrachmam.
G. Ammoniaci drachmam unam.
Extr. Graminis . scrup. quatuor.
Fiant pilulae grani unius. (B*.)

B*. et *Huf.* Saponis, G. Ammoniaci et Extracti Chelidonii, sing. part. aeq., ut fiant pilulae granorum duorum; — *T.* Saponis Veneti uncias tres, G. Ammoniaci tantidem, digerere in Alcoholis diluti 24° Ar. B. q. s. ad submergendum; massae mollefactae et homogeneae adde Pulv. Rhei subtilissimi uncias tres; — *Fi. T.* Saponis, G. Ammoniaci, sing. partes quatuor, Rhei, Radicis Jalapae, sing. unam.

℞. Saponis officinalis unciam unam.
Gummi Ammoniaci,
Extr. Centaurii min., sing. semunciam.
Olei Succini . . guttas decem.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*)

℞. Acetatis Potassae,
Gummi Ammoniaci,
Pilul. Rufi, sing. partem unam.
Saponis albi . . . partes duas.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiat massa. (*Vm.*)

Pilulae Allii sativi. (RC.)

℞. Radicis Allii,
Saponis Alicant., sing. semunciam.
Pulveris Liquiritiae quantum satis ut fiat massa, e cujus singulis drachmis catapotia duodecim formentur. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Suppositorium ad alvum sollicitandum s. laxans. (B*. Pal. *Sp. Va.*)

℞. Saponis . . . . uncias duas.
Salis culinaris . unciam unam.
Mellis inspissati quantum sufficit.
Fiant coni diversae magnitudinis. — Vor der Anwendung muß man sie mit Wermuthöl bestreichen.

Suppositorium catharticum (*Gr. Re.*): Saponis drachmam unam, Elaterii grana duo. — Bei hartnäckiger Verstopfung oder krampfhafter Strictur des rectum.

Cataplasma saponaceum s. resolvens s. maturans s. pus maturans. (B*. Ful. GalH. LP. RC. *Ra. Sp. Va.*)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Saponis Veneti . unciam unam.
Lactis vaccini . . libram unam.
Coque simul. (B*. Pul. GalH. *Va.*)

LP. Lactis quantum sufficit, caeterum ut antea.

℞. Farinae Hordei . . uncias octo.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Aquae . . . . quantum sufficit ut fiat cataplasma. (*Ra.*)

Sp. Cataplasmatis, Micae Panis uncias sedecim et Saponis rasi duas.

℞. Farinae secalitiae . partes duas.
Saponis nigri,
Radicis Cepae tostae,
Mellis, singulorum partem unam.
Fiat cataplasma. (RC.)

Mel Saponis. (B*. *Va.*)

℞. Saponis communis,
Mellis, singulorum uncias quatuor.
Salis Tartari . . . semunciam.
Aquae Fumariae drachmas duas.
Zur Auflösung schmerzloser Geschwülste empfohlen.

Linctus saponatus s. saponaceus, Looch saponaceum s. saponatum. (Ful. Li. Wir. Wür *Ca. Sa. Sp. Sw. Va.*)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. partes octo.
Syrupi Mannae partes duodecim.
Misce triturando. (Li. *Va.*)

Wür. Saponis partes tres, Olei sedecim et Syrupi Mannae viginti quatuor.

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. partes octo.
Syr. Capilli Ven. partes duodecim.
Misce triturando. (Wir. *Sp.*)

Sa. Saponis partem unam, Olei sedecim et Syrupi Capilli Veneris viginti quatuor.

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. part. viginti quatuor.
Syrupi Rhei partes triginta sex.
Contere. (Ful.)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. partes octo.
Syr. Limonum part. unam c. dimid.
Misce triturando. (*Ca.*)

℞. Saponis . . . partes quatuor.
Olei Amygd. dulc. part. octodecim.
Syr. Papav. part. quadraginta octo.
Contere. (*Sw.*)

Unguentum s. Pomatum saponaceum. (*Ra.*)

℞. Saponis albi . . libram unam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Mollefacto in aqua sapone, trajice per cribrum. — Gegen Krätze angewendet.

Sapo aromaticus. (B*.)

℞. Solut. Sapon. aquos. concentr. unc. sex.
Olei ess. Bergamottae,
— — Lavandulae,
— — Rorismar., sing. drach. duas.

Als nervenſtärkend und toniſch in Bädern angewendet.

Clyster communis. (RC.)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei, vel
— Avenae, vel
— Radicis Althaeae, vel
Infusi Seminum Lini, vel
— Florum Chamomillae, vel
Aquae tepidae . . libram unam.
Olei Lini . . . unciam unam.
Misce.

Clysma s. Enema resolvens. (*B. Sp. Va.*)

℞. Fol. Malvae manipulum unum.
Aquae . . . . uncias sedecim.
Decoque ad unciarum duodecim remanentiam et in colatura solve
Saponis Veneti . drachmas duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Decocti Hordei . . uncias sex.
Saponis Veneti drachmam unam.
Mellis . . . . drachmas sex.
Dissolve. (*B. Va.*)

Fomentatio laxans et antispasmodica. (*Bo.*)

℞. Florum Chamomillae,
— Meliloti, sing. manip. unum.
Baccarum Lauri,
Carvi, singulorum unciam unam.
Lactis . . . . quantum sufficit ut post horae quadrantem decoctionis librae tres obtineantur, quarum colaturae adde
Saponis Veneti . sesquiunciam.
Croci . . . . drachmas duas.

Fomentum Saponis compositum. (RC.)

℞. Acetat. Ammon. liq. unc. quatuor.
Solut. Saponis (Alcohol. saponat.) uncias duas.
Misce. — Reizend, auflöſend.

Fomentum Saponis ammoniatum. (RC.)

℞. Solutionis Saponis,
Acetat. Ammon. liq., sing. unc. unam.
Ammoniae liquidae semunciam.
Misce. — Wie das vorige, aber ſtärker.

Solutio saponacea Hahnemanni (RC.): Saponis partem unam, Aquae quatuor. — Lauwarm als Gegengift bei Arſenikvergiftung.

Potio saponacea. (B*. *Ca. Ra.*)

℞. Saponis medicinalis drachmas tres.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Althaeae . unciam unam.
Magnesiae . . drachmam unam.

Gegen Vergiftung durch Mineralſäuren empfohlen. (*Ca.*)

℞. Saponis . . . . drachmas sex.
Infusi Melissae . uncias quatuor.
Syr. Capilli Ven. unciam unam.

Auf drei oder vier Mal in einigen Fällen von Meteorismus des Unterleibs. (*Ra.*)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Pulv. Margarit. drachmam unam.
— Ocul Cancri sesquidrach.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Aquae Menthae,
— Corticis Citri,
— Foeniculi, sing. uncias duas.

Löffelweiſe. — Boerhaave wendete es bei Kindern gegen Säure in den erſten Wegen an. (B*.)

Linimentum causticum.

℞. Calcis causticae,
Saponis, sing. . partes aequales.
Fiat linimentum. — Aeußerlich bei Warzen, Muttermählern ꝛc.

Alcohol c. Sapone s. saponatum, Spiritus Saponis s. saponatus, Tinctura s. Solutio Saponis, Solutio Saponis alcoholica, Lotio alcoholica saponacea, Fomen-

tatio saponacea, Linimentum saponaceum s. saponaceum alcoholicum. (Ba. BorC. Fer. Ful. GalM. Pm. RC. *Ra. Re. Va.*)

℞. Saponis venalis . partem unam.
Alcoholis (0,900) partes quatuor.
Dissolve et filtra. (Ba.)

RC. Saponis partem unam, Alcoholis sex.

℞. Saponis Alicant. rasi libr. unam.
Alcoholis . . . . . libras tres.
Aquae destillatae . libram unam.
Solutionem filtra. (BorC.)

GalM. Alcoholis (23°) partes tres, Saponis unam; — *Ra.* Alcoholis (26°) libram, Saponis uncias quatuor; — *Ra.* Alcoholis libram et Saponis uncias duas; — *Ra. Va.* Hosp. St. Lud., St. Ant. Alcoholis libram et Saponis semunciam; — vel: Alcoholis libras duas, Aquae tantidem et Saponis uncias decem; — *Va.* Hosp. Infant. Saponis drachmas duas.

℞. Saponis Alicantini rasi uncias octo.
Subcarb. Potass. purif.
unc. quatuor.
Dissolve sal in Aquae unciis sedecim, adde saponem et ad mellis consist. decoque; massae deinde infunde
Alcoholis rectificati uncias sedecim.
Post septimanam digestionis filtra. (Ful.)

Pm. Saponis Veneti uncias sex, Subcarbonatis Potassae drachmam unam, Alcoholis 20° sesquilibram, Aquae destillatae uncias sex, misce, dissolve secundum artem et filtra.

Dieſe Auflöſung, deren Stärkegrad nach den Umſtänden natürlich verſchieden ſeyn muß, iſt ein Auflöſungsmittel, welches man mit Nutzen bei Verdrehungen, nachdem die Entzündung aufgehört hat, anwenden kann. Lugol wendete es mit Nutzen in der Behandlung der Krätze an.

Fomentatio antiphlogistica. (Hass. *Pid.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias tres.
Aquae Calcis . . . libras duas.
Solutioni adde
Alcoholis . . . uncias quinque.
Trochisc. alb. Rhazis semunciam.
Auflöſend.

Spiritus Saponis s. saponatus s. saponaceus s. resolvens, Tinctura Saponis, Solutio Saponis alcoholica aromatisata, Linimentum saponaceum. (A. An. B. B*. Bor. Bor4. Han. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. *Gr. Ra. Re. Sp. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Spiritus Lavandulae partes octo.
Dissolve et filtra. (*Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae Rosarum partem dimidiam (unam Bor. Han. etc.)
Solutionem filtra. (B*. Bor. Bor4. Has. HassP. O. Sax.)

Pol. Alcoholis partes tres cum dimid.

℞. Saponis albi . . . uncias sex.
Subcarb. Potassae drach. unam.
Alcoholis (0.910) . . semilibram.
Aquae Lavandulae . semilibram.
Solutionem filtra. (A.)

Sp. Terere Saponis Veneti uncias quatuor cum Subcarbonatis Potassae duabus et magma digerere in mixtura ex Alcoholis unciis duodecim et Essentiae Bergamottae semidrachma; — An. dissolvere Saponis uncias quatuor in Aquae Vitae viginti quatuor, et solutioni addere Spir. Lavandulae et Spir. Rorismarini, sing. uncias duas.

℞. Saponis Alicant. rasi unc. quatuor.
Subcarb. Potassae purif. unc. duas.
Coque in Aquae librae una ad consist. magmatis spissi, cui infunde
Spir. Lavandulae uncias sedecim.
Digere blando igne per dies quatuor et filtra (R.)

B. Saponis uncias octo, Subcarbonatis libram et Spir. Rorismarini uncias sedecim.

℞. Olei albi . . . . uncias duas.
Saponis . . . . drachmas duas.
Alcoholis vulnerarii libram unam.
Solutionem filtra. (*Ra.*)

Auflöſend, bei chroniſchen, ſchmerzloſen Geſchwülſten, rheumatiſchen Schmerzen und Contracturen der Gelenke angewendet.

℞. Saponis Veneti . . uncias sex.
Subcarb. Potass. (Sal. Absinth.) unciam.
Gummi Benzoës . . semunciam.
Spiritus rectif. octarios quatuor.
(*Gr. Re.*)

Gr. praeterea: Sapon. Aloens. ras. uncias octo, Sal. Absinth. quatuor, Aq. q. s. dissolve, filtra, fere ad siccum vapora, adde Spir. rectif. libram unam, digere per sex dies et filtra.

Va. Hôt. D. Sapon., Alcoh., sing. semunciam, Bals. Fioravanti uncias duas, auflöſend; — Hosp. St. Ant. loco balsami Fiorav. Oleum album et reliquorum dosin dimidiam.

Balneum emolliens et antisepticum. (*Bo.*)

℞. Foliorum Rutae,
— Scordii,
— Malvae, sing. uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti librae duae obtineantur.
Colaturae adde

Saponis Veneti drachmam unam dissolutam in
Alcoholis . . . drachmis sex.

Linimentum saponaceum s. Saponis, Balsamum saponaceum s. Saponis compositum, Alcohol Camphorae saponaceum, Aqua Vitae saponacea, Solutio Saponis alcoholica camphorata, Tinctura Saponis camphorata. (B*. His. His3. LH. Lus. *Sp. Vm.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . unciam unam.
Filtra. (LH. Lus.)

His. His3. Saponis uncias duas, Camphorae drachmas sex et Alcoholis libram; — *Sp.* Saponis unciam unam et Aquae Vitae camph. sedecim; — B*. Saponis quantitatem arbitrariam, Aquae calidae et Alcoholis camphorati, singulorum unciam unam.

℞. Aquae Vitae camphoratae
partes sedecim.
Saponis albi . . partem unam.
Macera ad perfectam solutionem usque et filtra. (*Vm.*)

Tinctura Saponis camphorata s. composita (*Gr.*): Sapon. Hisp. uncias quatuor, Camph. duas, Ol. Rorism. semunciam, Spir. rect. libras duas; vel: Sap. mollis libr. sedecim, Aq. cong. dissolve, adde Camph. libram in Spir. rectif congio uno dissolut., Spir. ten. cong. quatuor, Olei Rorism. uncias octo; vel: Sap. moll. libras quinque, Camph. unc. duodecim, Ol. Rorism. duas, Spir. rect. octarios decem, Aquae sex. — Bei Rheumatismen zum Einreiben; innerlich bei Gicht, 40 Tropfen.

Linimentum saponatum Kaempffii. (*Ca. Pid.*)

℞. Saponis Veneti concisi unc. unam.
Infunde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Alcoholem accende et baculi ope agita, donec urere cessaverit. Liquori refrigerato adde
Camphorae . . scrupulos duos.
Solutionem filtra. — Auflösend.

Embrocatio Saponis. (*Gr. Re.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Spiritus Vini . uncias duodecim.
— Cornu Cervi uncias quatuor.
Camphorae . . . . . unciam.

Balsamum saponaceum s. Saponis, Linimentum Saponis s. saponaceum s. Saponis compositum s. Saponis camphoratum, Solutio Saponis alcoholico-aromatica et camphorata, Linimentum saponato-camphoratum, Tinctura Saponis camphorata. (Am. An. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Lon. LonN. LP. Suec. Wir. *C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Saponis Alicant. albi unc. decem.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . . uncias duas.
Olei ess. Rorismarini,
— — Origani, sing. semunciam.
Solutionem filtra. (D. *Sp.*)

Gr. Sapon. albi libram, Camphorae uncias quatuor, Ol. Orig., Rori m., sing. drachmas quatuor, Spir. rectif. q. v.; vel: Sapon. alb. unc. quatuor, Camph. unam, Ol. Rorism. drachmas duas, Ol. Orig. gutt. triginta, Spir. rect. octarium, Aq. semioct.

℞. Saponis Alicantini uncias quatuor.
Camphorae . . . uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere saponem in alcohole per dies aliquot, filtra, adde camphoram et oleum. (Ed. *C.*)

LP. Saponis uncias octo, caetera ut Ed.; — Am. et *C.* Saponis uncias duodecim, Camphorae duas, Olei Rorismarini tantidem et Alcoholis octarios octo; — Ful. Saponis uncias quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et duas libras Alcoholis; — *Gr.* Saponis libram, Camphor. uncias duas, Ol. Rorism. drachmas quatuor, Spir. rect. octarios duos.

℞. Saponis albi rasi . uncias tres.
Camphorae rasae scrupulos duos.
Salis Ammoniaci . semunciam.
Aquae communis quantum satis.
Saponi in aqua bullienti soluto adde salem et camphoram. (*Fi.*)

℞. Saponis duri . . . uncias duas.
Spir. Turionum Pini libram unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . . semunciam et si requiritur
Olei ess. Rorismarini drachmam.
Filtra. (Suec.)

℞. Saponis albi rasi . uncias duas.
Spir. Millefolii comp. libr. unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam.
Serva. (Fenn.)

℞. Saponis medicinalis . uncias tres.
Spir. Rorismarini libram (octarium).
Solutioni adde
Camphorae . . . unciam unam.
Liquorem filtra. (An. Du. Lon. LonN. *Gr. Re. Sw. Vm.*)

Wir. Saponis uncias sex, Spiritus Ro-

rismarini libras duas et Camphorae semunciam.

Auflöſend.

Freeman's bathing spirits (*Gr.*): Sapon. mollis libras sex, Camph. uncias octo, Spir. rect., Aq., sing. congios tres, colora cum Elix. Daffyi; vel: Sapon. moll. unc. duodecim, Camph. duas, Kali praep. semidrachmam, Aq. Vit. octarios quatuordecim, Elix. Daffyi uncias quatuor, misce.

Jackson's bathing spirits (*Gr.*): Sapon. moll. libras duas, Camph. uncias duodecim, Ol. Rorism., Ol. Orig., sing. unciam unam et drachmas quatuor, Spir. rectif. congios duos.

Pearl water (*Re.*): Sapon. oleos. Hisp. opt. rasi semilibram in Aq. fluv. vel pluv. bull. congio solve et ad refrigerationem usque repone, adde Spir. Vin. rectif. mens. quart, Ol. Rorism. semunciam et misce. — Schönheitsmittel und zur Vertreibung der Sommersproſſen.

Embrocatio Saponis cum Camphora (*Re*): Linimenti Saponis uncias duas, Spirit. Camph. unam, Olei Origani drachm. duas, Tinct Opii semunciam, misce. — Bei Lenden-, Hüftweh und chroniſchen rheumatiſchen Geſchwülſten.

Balsamum anodynum, *Linimentum Saponis et Opii s. cum Opio s. anodynum s. opiatum s. saponaceo-opiatum s. excitans resolvens*, *Solutio Saponis alcoholica camphorata et opiacea*, *Tinctura Saponis cum Camphora et Opio.* (Am. Ed. Gal. LH. Lus. Suec. *Bo. Ca. Re.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Opii . . . . . drachmas sex.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . . unciam unam.
Serva. (Lus.)

LH. Tincturae Saponis camphoratae libram unam, Tincturae Opii uncias duas.

Bo. et *Ca.* Alcoholis sesquilibram, Saponis uncias quinque, Opii unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas tres; — Ed. *Re.* Alcoholis libras duas, Saponis uncias quatuor, Opii unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas (uncias *Re.*) duas.

Am. addere Solutioni Saponis alcohol. aromat et camphor. Opii unciam

℞. Saponis albi . . . uncias duas.
Opii . . . . . semunciam.
Spir. Turion Pini libram unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam.

Aeußerlich bei chroniſchen Schmerzen; innerlich bei ſogenannter nervöſer Kolik. — Gabe. fünfzehen bis zwanzig Tropfen in einem halben Glaſe Meliſſen- oder Lindenblüthenaufguß.

Linimentum saponaceum opiatum, *Balsamum anodynum.* (Gal. *Re.*)

℞. Saponis amygdalini semunciam.
Tinct. Opii alcohol. unciam unam.
Tere solutionem cum
Olei Amygd. dulc. unciis duabus.

Linimentum aethericum s. aceticum s. Saponis aethereum, *Sapo Aetheris acetici s. aceticus aethereus*, *Solutio Saponis aetherea.* (GalH. *Bo. Ca. Pie. Sw*. Vm.*)

℞. Saponis Medullae partem unam.
Aetheris acetici partes quinque.

Dissolve in vase clauso balnei aquae tepidi ope et liquorem decantha. (*Vm.*)

Vm. praeterea Saponis partem unam cum dimidia et unam Aetheris acetici; — *Bo.* Saponis unam et duas Aetheris; — GalH. Saponis tres et sedecim Aetheris; — *Ca.* et *Pie.* Saponis unam et octo Aetheris; — *Sw*.* Saponis tres et duas Aetheris.

In Einreibungen bei chroniſchen rheumatiſchen Schmerzen.

Balsamum aceticum camphoratum. (GalH. *Bo. Ca. Pie.*)

℞. Saponis animalis,
Camphorae, sing. drachmam unam.
Essentiae Thymi . guttas decem.
Dissolve balnei aquae ope et adde
Aetheris acetici . unciam unam.
Filtra. (*Bo. Ca. Pie.*)

GalH. dissolvere Saponis drachmam unam et Camphorae tantidem in Aetheris acet. unciis duabus et solutioni addere Essentiae Terebinthinae guttas decem.

In Einreibungen bei Rheumatismen, gichtiſchem Hüftweh und gichtiſchen Schmerzen.

Balsamum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Spiritus Lavandulae uncias quatuor.
Saponis animalis aromatici,
Aetheris acet., sing. unciam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Olei ess. Menthae piperitae,
— — Cinnamomi,
— — Lavandulae,
— — Nucis moschatae,
— — Caryophyllorum,
— — Sassafras, sing.
gutt. quindecim.

Ebenſo gebraucht wie das vorige.

Linimentum aethereum. (*Sa.*)

℞. Saponis mollis,
Alcoholis rectif., sing. unc. unam.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam
ssolutam in
Aetheris sulphurici . uncia una.

Unguentum saponaceum s. Saponis, Oleum Saponis, Linimentum saponaceum camphoratum. (Ham. *Ca. Sw. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Olei Olivarum . partes quinque.
Tere saponem in mortario, dissolve in oleo et liquorem post sepositionem decantha. (*Vm.*)

℞. Camphorae . . drachmas duas.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Solutioni adde
Saponis Veneti . unciam unam.
Misce exacte. (Ham.)

℞. Saponis nigri . . . semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Balsami Arcaei . unciam unam.
Misce. (*Ca. Sw.*)
Bei Rheumatismen empfohlen.

Linimentum antipleureticum s. Saponis. (Wir. *E. Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias duas.
Olei Lauri,
— Lumbricor. terrest., sing. unc. unam.
Solutioni adde
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (Wir.)

℞. Saponis Veneti . . uncias duas.
Olei Lauri . . . unciam unam.
Liqua leni calore et post refrigerationem adde
Balsami tranquilli unciam unam.
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (*Sp.*)

℞. Linimenti Saponis . uncias duas.
Ammoniaci liquidi unciam unam.
Tincturae Opii . . semunciam.
Misce. (*E.*)

Unguentum paralyticum s. contra paralysin. (B*. Br. Wür. *Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias sex.
Olei Juniperi . . unciam unam.
Seminum Erucae drachmas sex.
Misce triturando.

Balsamum Succini. (*Vm.*)

℞. Olei fusci et spissi Succini partem unam.
Saponis Alicantini . partes duas.
Liqua.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (*Sm.*)

℞. Olei Olivarum,
Aquae Calcis,
Saponis albi rasi,
Albuminis, sing. . uncias duas.
Subige bene.

Emplastrum Cumini saponaceum. (*Sa.*)

℞. Saponis duri,
Cerae flavae, sing. unciam unam.
Emplastri Cumini . uncias tres.
Misce exacte.

Emplastrum Protoxydi Plumbi s. commune cum Sapone s. Emplastrum de Sapone s. Saponis s. saponatum s. saponaceum s. mammillare, Ceratum Saponis. (Am. An. Du. Ed. Gal. GalM. Li. Lon. LonN. Lus. RC. Sar. Suec. *C. Ca. Gr. Re. Vm.*)

℞. Cerussae,
Minii, singulorum libram unam.
Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis . . . . . uncias octo.
Coque, agitando continue et sensim Aquam addendo, ad emplastri usque consistentiam. (Sar.)

Gr. Olei communis libras duas, Minii libram unam, Saponis Veneti semilibram.

℞. Saponis albi . . . uncias octo.
Cerae flavae . . uncias decem.
Lithargyri . . . libram unam.
Olei Olivarum octarium unum.
Aceti . . . . . octarios octo.
Coque lithargyrum cum aceto, adde saponem, tunc ceram et oleum. (Am. *C.*)

℞. Emplastri Diachyli partes ducentas.
Pulv. Minii partes quinquaginta.
— Cerussae part. viginti quinque.
Cerae albae partes nonaginta sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque, continue agitando et adde, ab igne removendo, aqua rejecta
Saponis albi rasi
partes centum viginti quinque.
Coque igne exiguo. (Gal. *Ca.*)

℞. Empl. Diachyli simpl. libras duas.
Cerae albae . . . uncias tres.
Liquefactis leni igne adde
Saponis albi . . . semilibram.
Fiat emplastrum. (An.)
Jeromel liquare simul Emplastri Diachyli libram et Cerae albae unciam, tunc massae refrigeratae addere pro partiunculis Saponis medicinalis teneris uncias tres; — GalM. Diachyli partes octo, Cerae flavae duas et quatuor Saponis.

℞. Empl. Diachyli simpl. part. octo.
Saponis . . . . partem unam.
Misce simul. (Suec.)
Du. Lon. *Gr.* Emplastri partes duas et unam Saponis; — Lus. Emplastri

unam et tres Saponis; — LH. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Emplastri sex (duodecim *Gr.*) et unam Saponis. (Interdum addere convenit Camphorae in Olei q. s. dissolutae unciam unam, LH.; tunc habes emplastrum sequens.)

℞. Empl. Diachyli simpl. part. quatuor.
— — gummosi part. duas.
Liquatis adde
Saponis duri (Veneti) partem unam.
Coque parumper. (Ed. *Gr.*)

℞. Empl. Diachyli gumm. part. decem.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Cerae albae . . partem unam.
Saponis albi . . partes quatuor.
Liqua simul. (*Vm.*)

℞. Empl. Diachyli gumm. part. duas.
Saponis Alicantini partem unam.
Liqua, continue agitando. (Li.)

Cereoli simplices, Candelae probatoriae. (*Gr.*)

Fasciae lineae Emplastro Saponis liquato calido immersae et in cereolos formatae.

Emplastrum saponatum s. Saponis camphoratum s. resolvens cum Sapone et Camphora. (Ams. Au. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. Li. LP. O. Pol. R. Sax. *B. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Olei Rosarum uncias duodecim.
Minii,
Cerussae, singulorum uncias sex.
Coque fortiter et adde
Saponis rasi . . uncias quatuor.
Agita ad refrigerationem fere usque et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Empl. Diachyli simpl. libras tres.
Cerae flavae . . . semilibram.
Saponis . . . . . uncias tres.
Liquatis adde
Camphorae (in Olei Olivar. Provincial. pauxillo sol.) semunciam.
Misce bene. (B. Bel. Bor. Bor4. D. Ham. O. Pol.)

HassP. Emplastri communis sesquilibram, Cerae flavae, Saponis Alicantini, sing. uncias quatuor et Camphorae in Oleo Olivarum solutae semunciam; — Au. addere singulis unciis Emplastri Saponis simplicis Camphorae grana decem; — Li. partem vigesimam quartam; — GalM. vigesimam quintam et quinquagesimam pro arbitrio; — *Vm.* quadragesimam octavam; — Sax. Camphorae partem unam, Saponis duas, Cerae quatuor et Emplastri Diachyli simpl. viginti quatuor; — LP. Emplastri comm. uncias sex, Saponis albi sicc. tres, Camphorae in Oleo comm. dissolutae semunciam, Terebinthinae drachmas sex; fiant s. a. magdaleones.

℞. Empl. Diachyli simplicis sesquilibram.
Liqua leni igne et adde continua sub agitatione
Saponis Hispan. pulverati unc. quatuor.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.
Misce bene. (Hass. *Pid.*)

Ams. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae drachmas sex; — R. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae unciam; — Ful. Emplastri uncias duas, Saponis unam et Camphorae drachmam; — *Br.* Emplastri uncias sex, unam Saponis et pro libra quaque Camphorae drachmam; — *Sw.* Emplastri libram, Saponis unciam et Camphorae drachmam; — Gal. *T.* Emplastri libram, Saponis uncias quinque et Camphorae unam; — *B.* Emplastri semilibram, Saponis uncias quatuor et Camphorae semunciam; — *Fi.* Emplastri libras tres, Saponis uncias octo, Camphorae, Lithargyri laevigati, sing. sesquiunciam.

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. part. quatuor.
Liquatis adde
Saponis pulverati partes quatuor.
Massae semirefrigeratae denuo adde
Camphorae cum Olei copia aequali tritae . partem nonagesimam.
Misce bene. (Ba.)

Ceratum saponaceum. (LP.)

℞. Emplastri saponacei (camph. LP.) libram unam.
Olei communis . uncias quatuor.
Fiat blando igne ceratum. — Bei Brüchen und Geschwüren.

Emplastrum balsamicum. (*Sw.*)

℞. Emplastri Diachyli libras quinque.
Liquatis adde
Saponis albi . . . libram unam.
Camphorae . . . . uncias tres.
Castorei c. Alcohole triti sesquiunciam.
Misce exacte.

Oleum Saponis. (Br. Ful. His. His3. Pal. Sar. Wir.)

℞. Saponis rasi . . partem unam.
Arenae lotae . . . partes tres.
Destillent ex arena in retorta, tunc

oleum supra cinerem sarmentorum rectificetur. (Br. Ful. Pal. Sar. Wir.)

His destillare Saponis partem unam cum una Laterum contusorum et oleum bis terve redestillare ut limpidissimum obtineatur; — His3. Saponis libram unam, Pulveris Laterum duas.

Reizend, ehedem zur Zertheilung von Ekchymosen, Stillung von Krämpfen und Zahnschmerzen und zur Austrocknung übelaussehender Geschwüre.

Potentilla.

Von dieser Gattung werden angeführt:

1) *Potentilla Anserina*, *L.*; Gänsekraut, Gänserich, Fingerkraut, Silberkraut; Ansérine vulgaire, Argentine (*Gal.*); Silberweed (*Ang.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* t. 157. *Blackw.* t. 6. *Plenck* t. 415. *Hayne* IV. t. 31. *Zorn* Ic. pl. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Anserinae s. Argentinae s. Argentariae) ist faserig und schwärzlich. Sie hat einen süßlichen Geschmack — Das Kraut besteht aus einem sehr dünnen Stängel mit gefiederten Blättern, deren gezähnte Blättchen unten glänzend silberweiß behaart sind. Es ist geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas styptisch.

Ein sehr schwaches adstringirendes Mittel.

2) *Potentilla reptans*, *L.*; Fünffingerkraut, Fünfblatt, Handblatt; Quintefeuille (*Gal.*); Cinqfoil leaved grass (*Ang.*); Femfingerert (*D.*); Cinco en rama (*His. Lus.*); Vyfvingerkruid (*Bel.*); Cinquefoglio, Pentafillo officinale, Cinque dita della Madonna (*I.*); Pieciornik (*Pol.*); Femfingerwert (*Suec.*).

Ams. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. *Fi. Gr. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 302.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an

Die Wurzel (radix Potentillae s. Pentaphylli s. Quinquefolii s. Quinquefolii majoris) ist walzig, außen schwärzlichbraun, inwendig weißlich und von schwach styptischem Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem fadenförmigen Stängel und gestielten, fünfzeiligen Blättern mit stumpfen, sägezähnigen, hellgrünen Blättchen. Es hat einen etwas bittern und adstringirenden Geschmack.

Gr. hat außerdem noch *Potentilla argentea.*

Primula.

Primula officinalis, *L.*; Schlüsselblume; Primevère officinale (*Gal.*); Cowslips (*Ang.*); Oxedrif (*D.*); Primula veris (*His.*); Sleutelbloem (*Bel.*); Primavera (*I.*); Bakwiza (*Pol.*); Primovera (*Lus.*); Oxelaegg (*Suec.*)

Ams. Br. Gal. Gen. His. His3. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Hayne* III. t. 34. *Bert.* Bild. X. 48. fig 1. Dict d. Sc. nat. cah. 4. Fl. méd V. 284.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Primulae veris (vulgaris, acaulis, elatior *Gr.*) s. paralyseos s. Verbasculi pratensis) ist ein dicker etwas röthlicher Ausläufer, welcher mit langen, weißen, fleischigen Fasern besetzt ist. Sie hat einen angenehmen, anisartigen Geruch und einen schwach adstringirenden, etwas bittern Geschmack. — Das Kraut besteht aus eirunden, gestreckten, runzligen, dicken, stumpfen, behaarten, gezähnten, unten etwas weißlichen Blättern. Sie haben fast keinen Geruch und einen rein krautartigen Geschmack. — Die Blüthenkronen, welche man allein nimmt, sind einblättrig, walzig, fünftheilig, gelb und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen Geschmack

Die Wurzel ist brechenerregend, das Kraut schmerzstillend. (*Gr.*)

Primula Auricula, *Auricula Ursi* (*Gr.*) Wund- und Brustmittel.

Conserva Primulae veris. (Pal. Wir)

℞. Flor. Primulae veris part. unam. Sacchari albi . . . partes duas. Contere.

Aqua paralyseos s. Primulae veris. (Pal.)

℞. Flor. Primulae veris part. unam. Aquae . . . . . partes tres. Destillet pars una cum dimidia.

Syrupus e Floribus s. Florum paralyseos s. Primulae veris. (Pal. Wir. *Gr.*)

℞. Flor. rec. Primulae veris libr. tres c. dimid.
Aquae font. bull. libras quatuor. Infunde per horas 24, exprime et in unciis octodecim colaturae solve
Sacchari albi uncias triginta duas. *Gr.* Florum libras duas, Aq. bull.

octar. sex per horas 12 infundere et addere Sacch. q. s.

Acetum Primulae veris. (Wür.)

℞. Radicis Primulae veris leviter siccatae et contusae sesquiunciam.
Aceti boni . . . libram unam.
Macera per dies quatuordecim, saepius agitando, exprime leviter et adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Post aliquot dies decantha.

Oxymel Primulae veris. (Wür.)

℞. Aceti Primulae veris partem unam.
Mellis albi . . . . partes duas.
Coque lente ad syrupi consistentiam.

Prinos.

Prinos verticillatus, L.; wirtelförmiges Prinos; Prinos, Apalachine à feuilles de prunier (*Gal.*); Deciduous winterberry, black alder (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Strauch (Hexandria Monogynia, L.; Rhamneae, *J.*) des nördlichen America. (*Duh.* I. t. 23.)

Man wendet die Rinde, welche bitter und etwas scharf ist, als Fiebermittel an.

Die Blätter von *Prinos glaber* (*Gr.*) als Thee.

Prunella.

Prunella vulgaris, L.; gemeine Brunelle, Gottheil, Braunheil, Selbstheil; Prunelle (*Gal.*); Selfheal (*Ang.*); Czerno klowek, Swalnjk menssj (*B.*); Prunelle (*D.*); Brunela (*His.*); Bruinella (*Bel.*); Zywokest modry (*Pol.*); Prunella (*Lus.*).

Br. Gal His. His3. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Re. Sp* Z.

4. (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 24. *Plenck* t. 492. *Hayne* VI. t. 10. *Zorn* Ic. pl. t. 156.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Prunellae s. Brunellae s. Consolidae minoris) an; es besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen Stängel mit gestielten, länglich eirunden, etwas sägezähnigen Blättern und in gedrängten Wirteln beisammenstehenden, eine endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas bitter und schleimig. — Es wurde ehedem als Wundmittel betrachtet.

Succus Prunellae. (Wür.)

℞. Herbae recentis Prunellae q. vis.
Contunde in mortario ligneo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepositum decantha et in lagenis serva, singulis libris liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Syrupus Prunellae. (Wir.)

℞. Succi Prunellae depurati et lenta evaporatione super igne ad dimidium redacti uncias novem.
Solve in eo
Sacchari albi . uncias sedecim.

Prunus.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Prunus domestica, L.*; Pflaumenbaum; Prunier domestique (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. His. His3. LH. Li. LP. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welchen man in allen Obstgärten antrifft. (*Blackw.* t. 305. *Plenck* t. 379. *Hayne* IV. t. 43. Düss. off. Pfl. V. t. 9. *Bert.* Bild. V. 74. fig. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 493.)

Man wendet die Frucht [Prunus; Pflaume; Prune (*Gal.*); Plum (*Ang.*); Sswestka, Ssjwa (*B.*); Blom (*D.*); Cirnelo (*His.*); Pruin (*Bel.*); Prugno (*J.*); Sliwina (*Pal.*); Ameixa (*Lus.*); Plom (*Suec.*)] an. Sie ist hinsichtlich der Größe, Gestalt und Farbe unendlich verschieden. Sie hat einen süßen, meist zugleich etwas sauren Geschmack. Im Ofen oder an der Sonne getrocknet, nennt man sie gebackne oder gewelkte Pflaumen (Pruneaux), wozu man gewöhnlich die Damascener Pflaumen (Pruna Damascena oder auch die Pruna Brignoliensia) wählt. Das rohe Muß (Pulpa Prunorum cruda) wird von Bor4. angezeigt.

2) *Prunus spinosa, L.*; Stechborn, Schlehenbaum; Prunier sauvage (*Gal.*); Slaetorn, Kreygebaertorn (*D.*); Acacia del pais (*His.*).

A. Ams. Ba. D. Fer. Ful. Gal. His. His3. Li. R. Sax. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* IV. t. 44. Düss. off. Pfl. IV. t. 17. *Zorn* Ic. pl. t. 4.)

Man wendet die Rinde, die Blüthen und die Frucht an.

Die Rinde (cortex Acaciae nostratis s. vulgaris s. Germanicae s. Pruni sylvestris s. Pruneoli sylvestris) ist graubraun. Sie hat einen bittern und adstringirenden Geschmack. — Die Blüthen sind weiß, haben einen angenehmen Geruch, wel-

der ſich durch Trocknen nicht ganz verliert und einen bittern, etwas ſtyptiſchen Geſchmack. — Die Früchte, Prunellen, Schlehen (Pruna sylvestria, Prunelles) genannt, ſind rundliche, ſchwarze, mit einem blauen Reif bedeckte Steinfrüchte, welche unter einem grünlichgelben Fleiſche einen glatten rundlichen Kern enthalten. Der Geſchmack iſt herbe und adſtringirend, wird aber durch Gefrieren ſüß. Die im Kern enthaltene Mandel hat den Geſchmack der bittern Mandeln.

Die ganze Pflanze iſt adſtringirend. Der verdickte Saft ihrer Früchte liefert den Acaciensaft (Acacia nostras, Succus Acaciae Germanicae, Succus Prunorum sylvestrium). Die Blüthen ſind ein purgirendes Hausmittel zu einer halben Unze im friſchen Zuſtande oder zu zwei Drachmen getrocknet auf ſechs Unzen Waſſer. Acacia Italica iſt der eingedickte Saft von Spartum spinosum.

Das Oel von Prunus Armeniaca (Oleum chrysomelinum) wird ſtatt des Mandelöls gebraucht. (*Gr.*) Die Früchte (Mala Armeniaca praecocia) ſind nährend, laxirend, Fiebermittel, die Saamen bitter und ſeifenartig.

Prunus virginiana. (*C.*) wild cherry tree. Die Rinde, beſonders der Wurzel, wurde bei Wechſelfiebern heilſam befunden. Die wilden Americaner gebrauchen ſie gegen Syphilis. Auch hat man ſie bei Dyspepſie, Phthiſis und Lendenabſceß mit Nutzen gebraucht.

Pulpa s. Conserva Prunorum s. Prunorum depurata. (An. Ba. Bor. Bor4. D. Han. His. His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wür. *Fi. Gr. Pid. Sm. T. Vm.*)

℞. Prunorum . . . quantum vis.
In Aqua bull. mollefactis, liquidum decantha, nucleos separa et per crinium trajice, cum cochleari ligneo primendo; pulpam exime et in olla tecta serva. (Li. *Gr. T. Vm.*)

Gal. et Lus. miscere pulpam cum Aqua Decocti et totum blando calore sufficienter consumere.

℞. Prunorum bonorum partem unam.
Aquae communis . partes duas.
Coque ad mollitiem fructuum usque et nucleis separatis pulpam per cribrum trajectam consume, Sacchari partem sextam addendo. (Ba. Bor. Han. O. Pol. RC. Sax. *Sm.*)

His. Lus. et *Pid.* Sacchari partem unam, et duas Pulpae; — His3. Pulpae unam, Sacchari duas; — LH. cuique librae Pulpae e Prunorum libris octo et Aquae q. s. coctae addere Sacchari uncias duas; — LP. Pulpae libram unam, Sacchari uncias sex; — An. D. R. et Wür. Sacchari unam et Pulpae tres; — Bor4. Pulpa Prunorum cruda addita Aquae comm. q. s. per cribrum setaceum trajecta evaporet ad extracti spissioris consist.; singulis libris admisceantur Sacchari albi pulv. librae duae.

Ein mildes Abführmittel.

Decoctum purgans antiphlogisticum s. laxans. (*B. Sp.*)

℞. Prunorum . . . . uncias duas.
Contunde cum nucleis et adde
Aquae . . . . . libras tres.
Tertia parte coquendo consumptâ colaturae infunde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*B.*)

℞. Prunorum . . uncias quatuor.
Aquae octarios duos cum dimidio.
Coquendo partem quintam consume, sub finem addendo
Liquiritiae . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (*Sp.*)

Conserva Prunorum. (Sar. *Br. Fi. T.*)

℞. Prunorum . . . quantum vis.
Digere in Aqua, igne lenissimo, donec mollescant, pulpam per cribrum setaceum trajice, adde Sacchari partes tres et sufficienter consume, continue agitando. (Sar.)

Fi. Prunorum libras septem in pulpam redact., Sacchari albi tres; — *Br.* Terere Pruna cum Sacchari pulverati duplo et inde pastam homogeneam formare; — *T.* Pulpae Prunorum libras quatuor, Syrupi Decocti Prunorum ad plumam inspiss. libras sex lente ad spissitudinem requisitam consumere.

Conserva Prunorum leniens. (*Fi. T.*)

Obtinetur in Decocto ad conservam simplicem adhibito Sennae drachmas sex digerendo et huic Infusum Pulpae addendo. Prunorum libras septem, Infusi Sennae, Sacchari, sing. libras tres.

Conserva Prunae sylvestris s. Prunorum sylvestrium, Pulpa Prunorum sylvestrium condita. (*Gr.*)

℞. Prunorum sylvestrium . q. libet.
In Aquae pauxillo super igne macerando mollefac, cavendo tamen ne rumpantur, pulpam per cribrum trajice et adde Sacchari pondus triplum. — Adſtringirend.

Rob Prunorum acidorum (*Gr.*): Prunorum immaturorum libras octo, Sacchari albi septem.

Acacia nostras, Roob Prunorum sylvestrium s. Fructuum Acaciae Germanicae. (A. Sar.)

℞. Fruct. Acaciae Germ. fere matur. q vis.

Contunde, exprime succum et statim in balneo aquae, continue cum spathula agitando, ad electuarii consist. consume.

Aqua Florum Acaciae. (Ful. Li. Pal. Sax. Wür. *Sm.*)

℞. Flor sicc. Acaciae Germ. partes duas.

Aquae . . . . quantum sufficit.

Destillent partes viginti. (*Sm.*)

Pal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Li. et Wür. Florum unam et Aquae sex; — Sax. Aquae octo; destillet dimidia pars.

℞. Florum sicc. Acaciae libras tres

In sacco inclusos in cucurbita suspende continente

Aquae . . . . . libras decem.

Destillet sesquilibra absque coctione. (Ful.)

Syrupus Acaciarum s. Florum Acaciarum. (Pal. Wür.)

℞. Flor. rec. Acaciae Germanicae, Aquae bull., sing. . libras duas.

Digere per noctem in vase tecto; colaturae unciis novemdecim adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque et cola syrupum. (Wir.)

Pal. infundere Florum libras duas in Aquae bull quatuor per horas 12, liquidum deinde infundere Florum novorum libris duabus, operationem tertiâ vice repetere et cum colatura suprema et Sacchari albi libris quatuor syrupum parare.

Laxirend, wurmtreibend, gegen Nierenentzündung. — Gabe, von einer bis zu drei Drachmen für Kinder: von sechs Drachmen bis eine Unze für Erwachsene.

Ptarmica.

Achillea Ptarmica, L.; Deutscher Bertram, wilde Bertramwurzel, Sumpfgarbe, Niesekraut, Bertramachillenkraut; Ptarmique, Herbe à éternuer (*Gal.*); Common sneeze wort (*Ang.*); Hvid regnfan (*D.*); Ptarmica (*His. Lus.*); Tysk bertram, Vild bertram (*Bel.*); Erba da sternutare (*I*); Richawiec ziele (*Pol.*); Nysgraess (*Suec.*)

Bor. Br. D. Gal. Gen. Han. Li. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. G. Gr. M. Re. Sp.*

24 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 672. *Plenck* t. 633. *Zorn* Ic. pl. t. 342.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Ptarmicae) ist lang, walzig, etwas gegliedert, federspulendick, an den Knoten behaart, außen graulichgelb, inwendig weißlich, von kaum merklichem Geruch und einem anfangs schwachen, dann scharfen Geschmack. — Das Kraut besteht aus lanzettförmigen, spitzigen, fein gezähnten, glatten Blättern. Der Geschmack desselben ist scharf und brennend.

Reizend, bei Zahnschmerz empfohlen. Die Russen wenden es gegen Blutharnen und Mutterblutfluß an. Blätter und Wurzel erregen Niesen.

Die Blüthen von Achillea nobilis (Pharm. Petrop.) sind gewürzhaft, adstringirend und tonisch; 1 Scrupel bis 2 Drachmen 2 bis 3 mal täglich.

Pteris.

Pteris aquilina, L.; Flügelfarrn, Adlersaumfarrn, Farrnkrautweiblein; Ptéride, Fougère femelle (*Gal.*); Commonbrake (*Ang.*).

Ful. R. Wir. Wür. *Gr. M.*

24 (Cryptogamia, L.; Filices, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* Herb. t 207. *Bert.* Bild. X. 38. fig. 1.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (radix Pteridis aquilinae s. Filicis s. Filicis feminae) genannt, an; sie ist fingersdick, lang, außen schwarz, innen gelb. Schräg durchschnitten zeigen sich auf der Durchschnittsfläche zwei sich kreuzende schwärzliche Linien, welche ein undeutliches Bild eines Adlers mit zwei Köpfen geben. Sie hat einen sehr starken Geruch und einen anfangs schleimigen, dann etwas bittern, widerlichen und schwach styptischen Geschmack.

Wurmwidrig. — Gabe, für Kinder dreißig Gran, für Erwachsene drei Drachmen.

Pulegium.

Mentha Pulegium, L.; Poley, Polei, Poleiminze; Pouliot (*Gal.*); Penny royal mint (*Ang.*); Poley (*Bel. D.*); Poleg (*B.*); Poleo (*His*); Puleggio (*I.*); Poly (*Pol.*); Poejo (*Lus.*); Pulega (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. R. RG. Sax. Wir. Wür.

Be. Br. C. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 490.)

Man wendet das Kraut (herba Pulegii s. Pulegii vulgaris) an; es beſteht aus einem faſt walzigen, behaarten, ſehr äſtigen Stängel mit eirunden, ſtumpfen, ganz klein gezähnten Blättern, und hat einen ſtarken, durchdringenden, nicht ſehr angenehmen Geruch und einen etwas brennenden, hintennach kühlenden Geſchmack.

Reizend, nervenſtärkend.

Oleum Pulegii aethereum, Aethereoleum Pulegii. (Am. Br. Du. Han. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. Gr. Re. T.*)

℞. Herbae floresc. Pulegii . q. vis.
Aquae communis quantum sufficit.
Destillando elicitum oleum superna tans collige. (Am. Du. Han. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

T. Herbae q. vis. Aquae bull. pondus quadruplum, destillet liquidi pars dimidia.

℞. Herb. floresc Pulegii
part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies destillatio fiat. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae floresc. Pulegii . q. vis.
Aquae Pulegii . quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Aqua Pulegii s. Pulegii simplex s. Menthae Pulegii. (A. Ams. Ed. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. Lon LonN. Pal. Sar. Sax. Wür. *Gr. Pid. Re. Sp. Vm.*)

℞. Herbae floresc. Pulegii part duas
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent partes quatuordecim. (Ham.)

RC. Destillent partes decem; — Ams. et *Sw.* Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — Pal. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Wür. Aquae sex; — Hass et *Pid.* octo Aquae; destillent partes quatuor; — A Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Gen Herbae libram et Aquae q s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex; — Fer. Herbae libras quatuor et Aquae sedecim; destillent librae octo; — Lon. Gr. Pulegii sesquilibram, Aquae q. s., destillet congius; — LonN. *Gr. Re.* Pulegii exsiccati semilibram (recentis duplum *Gr.*) vel Olei Pulegii pondere drachmas tres, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillet congius; — *Gr.* sec. Lon. ante 1745. Herbae recentis libras octo, Aquae q. s. ut congius abstrahatur; sec Ed. Herbae recentis libras tres; praeterea: Olei unciam, abstrahantur congii duodecim; vel: Olei libram, abstrahantur congii triginta.

℞. Herbae rec. Pulegii part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars et nova supra novam Herbam destillatio instituatur. (Sar.)

℞. Herbae rec. Pulegii . partes tres.
In sacco inclusam in medio cucurbitae suspende continentis
Aquae . . . . partes duodecim ita ut saccus ad aquam non attingat; destillent partes sex. (Ful.)

℞. Herbae rec. Pulegii libram unam.
Aquae purae . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae decem, quibus adde Aquae Vitae uncias quinque. (Ed.)

Vm. Herbae recentis partes decem, Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae centum sexaginta; destillent partes quadraginta.

Spiritus Pulegii, Aqua Pulegii spirituosa. (Lon. LonN. Sar. *C. Gr. Re. Sm.*)

℞. Herbae rec. Pulegii partem unam.
Aquae Vitae . . . partes tres.
— purae . . . . partes sex.
Destillent partes duae cum dimidia. (*Vm.*)

Lon. *C. Gr.* Herbae sesquilibram, Aquae Vitae octarios octo et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — LonN. *Gr. Re.* Olei Pulegii pondere scrupulos septem (duos? *Re.*), Spiritus rectificati octarios quatuor cum dimidio, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; lento igne destillet congius; — *Gr.* Spiritus rectif. octarios duos, colora cum Spinachia, exprime et adde Olei Pulegii uncias tres (Essence of penny royal.) (*Essentia Pulegii.*)

℞. Herbae rec. Pulegii part. unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post horas 24 digestionis destillent in balneo aquae fere ad siccum; macera et productum cum nova Herba novae destillationi subjice (Sar.)

Pulmonaria.

Pulmonaria officinalis, L.; Lungenkraut; Grande pulmonaire (*Gal.*); Common longwort (*Ang.*); Spettet longeurt (*D*); Pulmonaria (*His. Lus.*); Gewoon lungekruid (*Bel.*); Polmonaria, Sinfito

macchiato (*I.*); Plaonik (*Pol.*); Meduniza (*R.*); Lungaert (*Suec.*); Koiwiek (*Ta.*)

Ams. An. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. *Be. Br. Fi. G. Gr M. Re. Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L; Borragineae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 367. *Plenck* t. 73. *Hayne* II. t. 44. Fl. méd. V. 286.)

Man wendet das Kraut (herba Pulmonariae maculosae s. Symphyti maculosi) an; es besteht aus eirunden, gestielten, kurz steifbehaarten, weißgefleckten Wurzelblättern und abwechselnden, sitzenden, längern, schmälern, ganzen Stängelblättern. Es hat fast gar keinen Geruch. Der Geschmack ist krautartig, schleimig und etwas adstringirend.

Ehedem rühmte man es sehr bei Lungencatarrh. Heutzutage ist es fast außer Gebrauch.

Succus Pulmonariae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Fol. Pulmonariae mundatorum part. sedecim.

Contunde in mortario marmoreo, sensim addendo

Aquae communis . partem unam.

Exprime succum, qui postquam subsedit, frigide per chartam emporeticam filtretur.

Pumex.

Lapis Pumex s. Pumicis, L.; Bimstein, Bimsenstein; Pierre Ponce (*Gal.*); Pumice stone (*Ang.*); Piedra poncez (*His.*); Puimsteen (*Bel.*); Pietra pomice (*I.*); Zazel kamienna (*Pol.*).

Br. Gal. Han. His. His3. Wir. Wür. *Fi. Gr. Sp.*

Ein vulcanischer, weißlichgrauer oder gelblicher, sehr poröser, leichter, brüchiger, faseriger, in der Richtung der Fasern glänzender selbst seidenglänzender Stein mit körnigem und ungleichem Bruche, welcher trocken anzufühlen, leichter als Wasser und zu einem weißen Glase schmelzbar ist.

Er kömmt zu verschiedenen Zahnpulvern.

Pulvis dentifricius albus. (Br. *Sp.*)

℞. Pumicis . . . . . uncias duas.
Ossis Sepiae . . unciam unam.
Cremoris Tartari,
Rad. Iridis Flor., sing. semunciam.
Olei ess. Caryophyllorum gutt. quatuor.

Fiat pulvis tenerrimus.

Punica.

Punica Granatum, L.; Granatbaum; Grenadier, Balaustier (*Gal.*); Pomegranate-tree (*Ang.*); Ranua, Roman (*Ar.*); Pomapran, Granatowe gablko (*B.*); Delunghedie (*Cy.*); Anar (*Hin. Pe.*); Balaustries (*His.*); Rodia (*Graec. mod.*); Granatboom (*Bel.*); Granato, Pomo Granato, Melogranato, Balausto (*I.*); Gangsalan (*Ja.*); Dalimb (*Mah.*); Dalema, Daime (*Mal.*); Drzewo granatowe (*Pol.*); Romeira (*Lus.*); Granatoschnoe derewo (*R.*); Dadima (*Sa.*); Darim (*Suec.*); Malilam palam (*Tam.*); Dadima pundu (*Tel.*); Nar (*Tu.*).

Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lou. LonN. LP. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. Ma. Par. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, J.) des südlichen Europa's. (*Blackw.* t 97. *Schk.* t, 131. b. *Plenck* t. 376. Düss. off. Pfl. t. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 270)

Man wendet die Wurzelrinde, die Blüthen und die Früchte an.

Die Wurzelrinde (cortex Granati) ist außen gelblichgrau, innen graulichgelb oder schwach röthlich, geruchlos und von schwach styptischem und bitterlichem Geschmacke. Das Pulver ist grünlichgelb. Es ist unlängst als ein untrügliches Mittel zur Austreibung des Bandwurms gepriesen worden. — Die Blüthen (flores Balaustiorum, Balaustia, der wilden, Citini, der cultivirten) sind halbkugelig, schön roth, fast geruchlos und von etwas styptischem Geschmack. Sie sind adstringirend, aber weniger als die Rinde der Frucht. — Die Früchte, Granaten (Mala Punica, Granata); Grenades (*Ga.*), sind rundliche, von den Kelchabschnitten gekrönte und durch eine Queerscheidewand in zwei vielfächerige Höhlen getheilte Beeren; diese Fächer enthalten eckige, mit einem breiigen Umschlage versehene Saamen. Das äußere Fellchen (Malucorium, Malicorium, Malacorium, Granati Cortex) ist graulichgelb oder röthlich, dick, hart und ledrig. Es hat einen adstringirenden Geschmack. Man hat es in allen Fällen angewendet, wo man auf die lebenden Gewebe adstringirend wirken wollte.

Adstringirend; man darf keine Eisensalze damit verbinden. Rehmann empfahl die Rinde der Frucht gegen Wechselfieber, zu sechs bis zwölf Stück von zwei bis sechs Scrupel, während der Apyrexie.

Species Decocti pro gargarismate adstringente s. adstringentes s. adstringentes pro gargarismate. (B*. Gal. GalM. Han. LH. Pal. *Fi. Pid. Re.*)

℞. Radicis Bistortae,

Flor. Granati,
— Malvae arbor., sing.
uncias duas.
Concisa misce. (Han.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Prunellae, sing.
uncias quatuor.
— Salviae . . . uncias duas.
Flor. Rosarum rubrarum,
— Ligustri,
— Balaustiorum, sing.
unciam unam.
Concisa misce. (Pal. Wir.)

Br. eandem formulam sed absque ligustro; — *Fi.* Plantaginis, Consolidae min., sing uncias quinque, Salviae uncias tres, Florum Rosarum, Balaustiorum, sing. unciam unam. (½ Unze auf 1 Pfund ſchwaches Decoct.)

℞. Radicis Bistortae,
Herbae Agrimoniae,
— Pervincae,
Flor. Malvae arboreae,
— Balaustior., sing. unc. duas.
Concisa misce. (*Pid.*)

℞. Corticis Granati,
Rad Bistortae,
— Tormentillae, sing part. aeq.
Concisa misce. (Gal. GalM. *Re*)

LH. Tormentillae, Corticis Quercus, Granati, singulorum partes aequales.

Species pro fotu ad haemorrhoidum fluxum immodicum. (Pal.)

℞. Herbae Millefolii,
— Plantaginis,
— Verbasci,
Flor. Sambuci, sing.
manip. quatuor.
Corticis Granati . unciam unam.

Succus Granatorum s. Pomorum Granatorum. (Gal. His. His3. *Fi. Sw. T.*)

℞. Fruct. Granatorum acid. q. vis. Cortice externo separato reliquum transverse concide, tritura spatulae ligneae ope ut semina separentur, contunde deinde in mortario lapideo vel porphyreo, exprime vel in sacco vel inter duo strata straminis secalitii concisi et cum aqua tepida abluti; succum (prelo expressum His.) sepositum et decanthatum in lagenis sub olei strato serva.

Syrupus Granatorum s. de Granatis s. Succi Pomorum Granatorum. (Gal. His. His3. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Succi Granatorum depurati et filtrati . . . . . libras duas.
Sacchari albi
libras tres cum dimidia.
Solve lenis caloris ope. (Gal.)

His. His3. et Lus. Succi partem unam et duas Sacchari; — Wir. Succi uncias decem et sedecim Sacchari ut fiat coquendo syrupus; — *T.* Succi libras quatuor, Sacchari septem; — Sar. Syrupi communis q. necesse est ut fiat levis evaporationis in balneo aquae ope syrupus.

Vinum Granati. (*Fi.*)

℞. Seminum maturorum . . q. vis. Contunde leviter in mortario marmoreo, sepone, donec odorem vinosum emittant, exprime succum et filtratum per chartam serva in parvis vasis vitreis a strato olei obtectum.

Decoctum Corticis Radicis Granati. (8*. GalF. *E. Ma. T.*)

℞. Corticis Radicis Granati
uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Partem quartam coquendo consume. — Gegen Bandwurm. — Gabe, zwei Unzen alle halbe Stunden. — Vier Gaben ſind gewöhnlich zur Austreibung des Wurms hinreichend.

T. Corticis drachmas decem, Aquae font. uncias viginti, macerare per horas 24, deinde ad dimidium decoquere et tunc adhuc per horas circiter 12 in infusione relinquere, supremo decanthare. — Für Erwachſene die ganze Portion auf dreimal in einer Stunde. — Oft bricht der Kranke die erſte Portion wieder aus; es iſt gut, wenn man Tags vorher ein Abführmittel giebt. (D. A. Bojti Nuova Giorn. de Letterati No. XXV. Pisa 1826.)

Decoctum Corticis Granati, Tisana adstringens. (GalM.)

℞. Corticis Granati . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae duae colaturae obtineantur. Coque per horae quadrantem et adde
Liquiritiae rasae drachmas duas.
Abſtringirend.

Fomentatio adstringens. (*Ra.*)

℞. Corticis Granati,
Rad. Bistortae, sing. uncias duas.
Vini rubri . . . libram unam.
Coque et colaturae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Clysma s. Clyster s. Enema Corticum Granatorum s. adstringens. (His. His3 LH.)

℞. Corticis Granati . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae librae duae obtineantur.

LH. Corticis Quercus, Granati, singulorum drachmas duas, Catechu se-

midrachmam, Aquae quantum satis ut semilibram decocti obtineas.

Gargarisma adstringens. (*Ca.*)

℞. Infusi Agrimoniae,
— Nucum Cypressi,
— Corticis Granati,
— Flor. Sambuci, sing. unc. quatuor.
Mellis rosati,
Syr. Mororum, sing. drach. tres.
Acidi sulphurici . guttas viginti.

Decoctum Corticis Granati Rehmanni. (B*)

℞. Corticis Granati . uncias duas.
Gummi Arabici drachmam unam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Decoque ad dimidium et librae cuique decocti adde
Extracti Trifolii semidrachmam.
Aetheris sulph. alcoholisati drachm. unam.

Adstringirend — Gabe, eine halbe Tasse alle anderthalb Stunden.

Pyrethrum.

Anthemis Pyrethrum, L.; Speichelwurz, Bertram; Pyrèthre salivaire (*Gal.*); Pellitory of Spain (*Ang.*); Bertram (*D. Suec.*); Akur kurha (*Ar.*); Peltram (*B.*); Pelitre (*His.*); Radice di Santa Apollonia, Piretro (*I.*); Piretro (*Lus.*); Zebue ziele (*Pol.*).

A. Am. Ams. An B Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. Lon⅟. LP. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Svanthereae, *Cass.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 209. *Plenck* t. 621. *Lam.* Ill t. 683. fig. 4. Düss. off. Pfl. X. t. 6. Fl. méd. V. 287.)

Die Wurzel (radix Pyrethri officinalis s. salivalis s Dentariae) ist lang, dick, spindelförmig, fleischig, wenigstens fingerdick, außen rauh und braungelb, inwendig weiß, mit Fibern besetzt und fast geruchlos. Sie hat einen beißenden, scharfen und etwas sauern Geschmack, welcher ein anhaltendes Gefühl von Hitze hinterläßt.

Sie enthält, nach Gauthier, ein flüchtiges und ein fettes Oel, einen gelbfärbenden Stoff, Emetin, Schleimharz ꝛc.

Reizend, die Speichelabsonderung bethätigend und fast nur in Gurgelwasser und als Kaumittel angewendet. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer Drachme.

Species resolventes. (*Pid.*)

℞. Radicis Pyrethri . . uncias duas.
Herbae Salviae . . semilibram.
Seminum Sinapis . uncias tres.
Concisa misce. — Zu Gurgelwasser.

Pulvis sternutatorius. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri,
Seminum Staphydis agriae,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Piperis longi . . semidrachmam.

Bolus excitans. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri semidrachmam.
Syrupi Cort. Aurant . . . q. s.

Abends zu nehmen.

Pilulae Pyrethri s. incitantes. (*Au.*)

℞. Pulv. Rad. Pyrethri drachmam unam.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs Stück alle vier Stunden, bei Wechselfiebern und Lähmungen.

Pilulae excitantes. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri drachmam unam.
Olei ess. Menthae pip. guttas quinque.
Conservae Cochleariae . . q. s.

Fiant pilulae octodecim. — Gabe, zwei bis drei Stück täglich.

Trochisci excitantes. (*Ca. Re.*)

℞. Infusi Pyrethri alcoholici unciam unam.
Sacchari pulverati uncias decem.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.

ut fiant trochisci centum quinquaginta. — Gabe, vier bis neun Stück täglich, bei chronischen Brustbeschwerden.

Masticatorium excitans. (*E.*)

℞. Radicis Pyrethri,
Mastichis, sing. drachmam unam.

Fiat massa in duas partes aequales dividenda.

Masticatorium pro equis (*Re.*): E Ligno Lauri et Juniperi, Asafoet. Hepate Antimonii et Rad. Pyrethri.

Electuarium excitans.

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Unguentum contra pediculos. (B*.)

℞. Pulv. Radicis Pyrethri,
— Semin. Sinapis, sing. unc. duas.
— — Petroselini unc. quatuor.

Axungiae Porci unc. triginta duas.
Olei ess. Anisi drachmas duas.

Emplastrum Pyrethri. (B⁶. *Ca.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias tres.
Terebinthinae unciam unam et drachmas duas cum dimidia.
Liqua leni igne et adde
Sagapeni,
Galbani,
G. Ammon., sing. . unc. unam.
Semirefrigeratis adde
Pulv. Radicis Pyrethri,
— Semin. Sinapis, sing. unc. unam.

Auflöſend, ſchmelzend.

Gargarisma Pyrethri. (*Re.*)

℞. Radicis Pyrethri unc. dimid. ad unam.
Aquae . . . . . octarium.
Coque ad dimidium et refrigerato adde
Solutionis Ammoniae uncias duas.

Gargarisma sialagogum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas tres.
— Liquiritiae sesquidrachmam.
Fol. Salviae,
— Majoranae,
— Hyssopi, sing. semimanipulum.
— Stoechadis pugillum unum.
Aquae . . . quantum sufficit.
Decoque ad librae unius remanentiam.

Gargarisma excitans. (*Ca.*)

℞. Aquae Salviae . . uncias octo.
Spiritus Cochleariae uncias sex.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Radicis Pyrethri sesquidrachmam.
Post horas duodecim infusionis cola et adde colaturae
Mellis . . . . . semunciam.

Collutorium sialagogum. (*Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri unciam unam
Aquae bullientis . libram unam.
Post horam cola et colaturae adde
Aceti . . . . . uncias tres.
Salis Ammoniaci drachmas tres.

Gargarisma antiodontalgicum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Radicis Tormentillae drachmas tres.
Aceti rubri . . octarium unum.
Coque et ab igne removendo adde
Opii,
Camphorae, sing. drach. unam.
Semin. Hyoscyami . drach. tres.
Post horam unam infusionis filtra.

Collutorium antiodontalgicum. (*Ca. Pie. Sp.*)

℞. Salis Ammoniaci drachmam unam.
Radicis Pyrethri drachmas duas.
Extracti Opii . . . grana duo.
Aceti,
Aquae Lavand., sing. unc. duas.
Stent in digestione calida per aliquot horas et tunc colentur. — Wird gegen Zahnſchmerz von Beinfraß und Rheumatismus gerühmt; man nimmt einen Löffel davon in den Mund.

Collutorium excitans. (*E.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Aceti . . . . . drachmas sex.
Opii gummosi . . . grana tria.
Digere per horam unam super arena.
— Man faßt einen Löffel davon in den Mund.

Tinctura odontalgica s. Pyrethri s. Radicis Pyrethri odontalgica s. antiodontalgica, Diaclysma Radicis Pyrethri odontalgicum, Elixir antiodontalgicum. (B⁶. Br. His. His3. Wir. *Bo. Ca. Gr. Re. Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri unciam unam.
Spiritus Rorismarini semilibram.
Post sufficientem digestionem filtra. (*Ca.*)

Gr. Re. Spiritus Rorism. uncias octo.

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas.
Spiritus Lavandulae libram unam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Digere ex arena per horas 24 et filtra. (*Bo.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas sex.
Rasur. Ligni Guajaci unc. duas.
— — Sassafras unc. unam.
Fol. Nicotianae . drachmas tres.
Summit. Thymi,
— Origani, sing. drach. duas.
Caryophyllorum drachmam unam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . libras tres.
Post dies duodecim macerationis cola. (His. His3.)

Sw. Pyrethri drachmas sex, Guajaci unciam, Sassafras tantidem, Nicotianae drachmas tres, Serpylli, Origani, sing. drachmas duas, Camphorae semidrachmam, Opii scrupulum et Alcoholis libras duas.

℞. Radicis Pyrethri,
Semin. Hyoscy., sing. drach. duas.
Rasurae Guajaci . uncias duas.
Corticis Sassafras . semunciam.
Caryophyllorum,
Piperis longi, sing. drach. unam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam

Santali rubri . drachmas duas.
Alcoholis . . uncias quindecim.
Post sufficientem digestionem filtra. (Br. Wir.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Alcoholis . . . libram unam.
Post decem dies infusionis colaturae adde
Camphorae . . unciam unam.
Olei Rorismarini . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.
Misce. (B*. secundum Oxley.)

℞. Radicis Pyrethri,
Nucis moschatae, sing. unc. unam.
Caryophyllorum,
Ligni Guajaci, sing. semunciam.
Alcoholis (26°) . . libras tres.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae adde
Olei ess. Rorismarini gutt. decem.
— — Bergamottae guttas quatuor.

Reizend, bei Zahnkrankheiten und Zungenlähmung empfohlen. — Man wendet sie etwas erwärmt als Mundwasser an, oder tränkt auch Baumwolle damit und bringt sie in den hohlen Zahn.

Tinctura Pyrethri aetherea; *Oxley's tinct. of pyrethrum.* (*Au. Gr.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Aetheris (Spir. Aeth. *Gr.*) sulph. libram unam.
Post dies decem digestionis cola et colaturae adde
Camphorae . . unciam unam.
Olei Rorismarini . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.
Ebenso gebraucht wie die vorige.

Spiritus Pyrethri. (GalF.)

℞. Radicis Pyrethri . libram unam.
Alcoholis (35°) . libras quinque.
Aquae . . . . . libram unam.
Maceratis per dies duos librae quinque destillent.

Spiritus Pyrethri compositus. (GalH.)

℞. Spir. Pyrethri . octarium (litre).
Cinnamomi teneris scrup. quatuor.
Vanillae,
Coriandri,
Caryophyll., sing. drach. unam.
Macidis,
Coccionellae,
Croci,
Salis Ammon., sing. gr. octodecim.
Aquae Flor. Aurant. semunciam.
Olei ess. Anisi,
— — Citri, sing. gutt. octodecim.
— — Lavandulae,
— — Thymi,
Tinct. Ambrae, sing. gutt. novem.
Post dies quatuordecim macerationis filtra.

Vinaigre dentifrique (*Gr.*): Radicis Pyrethri uncias duas, Cinnamomi, Caryophyll., Guajaci, sing. drachmas duas, Spiritus Cochleariae uncias duas, Aq. vulner. rubr. quatuor, Aceti opt. albi libras quatuor. — Bei Zahnschmerz oder cariösen Zähnen den Mund auszuspülen, allein oder verdünnt.

Pyrola.

Pyrola rotundifolia, *L.*; Waldmangold, rundblättriges Wintergrün; Pyrole à feuilles rondes (*Gal.*); Vintergroen (*D.*).

Br. Gal. His. Hiß. Li. Sax. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Decandria Digynia, L.; Ericineae, J.) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 594. *Pleuck* t. 335. *Hayne* IV. t. 21. *Oed.* Fl. Dan. t. 110.)

Man wendet das Kraut (herba Pyrolae) an; es besteht aus einem Büschel runder, grüner, lebriger, langgestielter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern und etwas styptischen Geschmack.

P. altera, secunda, kühlend, austrocknend; Blätter urintreibend, bei Wassersucht; P. umbellata, Chimaphila umbellata, Blätter harntreibend, tonisch. (*Gr.*)

Extractum Pyrolae umbellatae (*Gr.*).
Decoctum Pyrolae. (*Re.*)

℞. Fol. Pyrolae umbell unciam unam.
Macera per horas sex in
Aquae mens. . . libris duabus.
Contunde deinde herbam et in liquorem rejice, evapora, exprime, donec ad libram mens. redigeris.

Q.

Quassia.

Quassia amara, *L.*; Quassienholz, Americanisches Bitterholz; Quassie, Bois de Surinam (*Gal.*); Legno del Surinam (*I.*); Quassia amarga (*Lus.*); Drzewo kwassya (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer Ful. Gal. Gen Ham. Han. Hass. HassP. LH Li.

Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Fi. Gr. Re. Va.*

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, J.) Surinam's. (*Hayne* IX. 14. *Lam.* Ill. gen. t. 343. fig. 1. *Plenck* t. 333. *Curt.* Bot. Mag. t. 497. Düss. off. Pfl. XIII. t. 1. *Desc.* Fl. Ant. I. 5.)

Man wendet das Holz des Stammes und besonders der Wurzel (lignum Quassiae) an, welches mit seiner Rinde bekleidet, in Stücken von verschiedener Länge und Dicke, bisweilen kaum kleinen Fingers, bisweilen aber armsdick, von einem oder mehreren Fuß Länge, welche walzenförmig, glatt oder der Länge nach gespalten, meist gerade, selten krumm, bisweilen knotig und ästig sind, zu uns kommt. Die Rinde ist gelblichgrau, nicht sehr dick, glatt anzufühlen und hängt nur wenig am Holze. Letzteres ist gelblichweiß, leicht und innerlich von zartem Gewebe. Sie hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bittern Geschmack.

Ihre Bitterkeit verdankt sie einem eigenthümlichen Stoffe, dem Quassin (Quassina).

Man leitet dieses Holz auch von Quassia excelsa, *Sw.*, einem Baume Jamaica's (*Comm.* Hort. I. p. 149. t. 942. *Hayne* IX. t. 16.) ab.

Bitter, tonisch, magenstärkend, bei Verdauungsbeschwerden, Diarrhöe und Blutflüssen gebraucht. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Das Holz von Quassia polygama liefert ebenfalls einen guten bittern Aufguß. (*Gr.*)

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae (aquosum). (Am. Ams. Au. Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. T.*)

℞. Rasurae Ligni Quassiae libr. unam.
Aquae frigidae . libras decem.
Macera per duos dies, subinde agitando, cola, repone ut desideat, liquorem cola et leni igne consume. (Pol.)

℞. Ligni Quassiae raspati . q. vis.
Coque in Aquae q. s. per horam unam, cola exprimendo, liquorem post subsidentiam decantha et vaporando ad mellis spissitudinem redige. (Wür.)

Lus. Ligni libram unam et sex Aquae.

℞. Rasur. Ligni Quassiae libr. unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco frigido, tunc coque parumper; cola exprimendo et ad extracti consist. consume. (Br.)

Am. Hass. *C.* et *Pid.* coquere Ligni libram unam in Aquae octo ad dimidii remanentiam.

℞. Rasur. Ligni Quassiae libr. unam.
Aquae bullientis . . libras octo.
Digere per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola; residuum coquatur per horae quadrantem cum Aquae novae libris quatuor et coletur; liquores commixti post subsidentiam decanthati evaporent. (Am.)

Pm. Ligni libras duas coquere primo cum Aquae libris viginti quatuor per semihoram, colare et tunc cum Aquae libris duodecim coquere et praelo exprimere, liquores simul ad libras tres evaporare, refrigeratos filtrare et balnei maris ope extractum parare.

Ams. Bor. D. Han. O. Pol. R. et Sax. pluries e serie coquere Ligni partem unam cum Aquae decem et colaturas commixtas (sub finem Spiritus Vini rectif. aliquantulum addendo Bor.) consumere; — Bor4. Ligni libram unam cum Aquae sedecim ad dimidii remanentiam, residuum itidem cum Aquae sedecim ad octo decoquere et sic pergere quamdiu opus fuerit, liquores commixtos post subsidentiam decanthatos ad quatuor librarum remanentiam et has in balneo vaporis ad extr. absinthii consist. inspissare; — *Fi.* Ligni libram unam primum per semihoram cum duodecim, deinde cum sex Aquae decoquere, decocta commixta ad sesquilibrae remanentiam et post refrigerationem filtrata in balneo aquae ad extracti consist. consumere; — HassP. ut extractum colombo; — *T.* Ligni partem unam cum Aquae duodecim per semihoram coquere, colare cum expressione, decoctionem cum nova Aqua repetere etc.; — Ba. coquere Ligni partem unam primum cum quinque deinde cum decem Aquae partibus et liquores commiscere.

Gabe, zehen bis fünfzehen Gran.

Extractum Quassiae s. Ligni Quassiae alcoholicum. (Ful. Li.)

℞. Ligni Quassiae . libram unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Post aliquot dies digestionis leni calore, exprime, filtra et ad mellis consist. consume; sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime, filtra et itidem evapora; liquores syrupi formam prae se ferentes commixti ad extracti consist. evaporent. (Ful.)

Li. digerere Ligni semilibram primo in Alcoholis libris sex per dies duos, tunc per horas 24 cum Aquae bull. libris novem et tincturas commixtas consumere.

Pilulae tonicae. (*Au.* E.)

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.
Pulveris Gentianae . . . q. s.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein Stück täglich drei oder vier Mal. (*E.*)

Au. Extracti drachmas duas et Pulv. Zingib. q. s. ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehen Stück auf ein Mal.

Elixir cum Aqua Calcariae ustae s. antacidum. (*Au*)

℞. Extracti Quassiae drachmam unam.
Aquae Calcariae . . uncias octo.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Infusum Quassiae s. Quassiae excelsae. (Am. B*. Ed. Lon. LonN. Lus. RC. *C. E. Fi. Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Ligni Quassiae rasi semidrachmam.
Aquae bullientis . uncias octo.
Digere per horas duas et cola. (Am. Ed. *C.*)

B*. Ligni drachmas quatuor et Aquae libram; — B*. Lon. LonN. *Gr. Re.* Ligni scrupulum et Aquae semioctarium; — RC *Sw.* Ligni drachmas duas et Aquae libram (octarium *Paris*); — Lus. Ligni drachmas tres et Aquae libram; — *Fi. T.* Ligni drachmam, Aquae libram.

℞. Ligni Quassiae,
Serpentariae Virginicae,
Cort. Aurant., sing. semunciam.
Aquae bullientis . octarios duos.
Infunde et cola. (*E.*)

Bitter. — Gabe, eine bis zwei Unzen mehrmals täglich.

Infusum Quassiae cum Sulphate Zinci. (Am. *C.*)

℞. Rasur. Ligni Quassiae drach. unam.
Sulphatis Zinci . . grana octo.
Aquae frigidae . semioctarium.
Macera per horas duas et cola.

Haustus stomachicus, Potio stomachica. (*B.*)

℞. Radicis Colombo drachmam unam.
Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infusi unciae octo obtineantur. Colaturae adde
Elixir. stomach. Whytti drach. duas.
Allmälig zu nehmen.

Decoctum Ligni Quassiae. (Ful. Ham.)

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coquendo ad sesquilibrae remanentiam consume. (Han.)

℞. Rasur. Ligni Quass. sesquiunciam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Ad libras tres coctione redige, sub finem addendo
Florum Chamomillae sesquiunciam.
Subsideant, tunc decantha. (Ful.) — Gabe, alle zwei oder drei Stunden ein Löffel.

Decoctum Quassiae s. Ligni Quassiae compositum, Decoctum amarum. (Wür. *Va.*)

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.
Flor. Chamomillae sicc. sesquiunciam.
Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Parte quarta coctione consumptâ, cola.

Va Subcarbonatem omittens ad quartae partis remanentiam decoquere.

Tinctura Quassiae vinosa. (Hau.)

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. quatuor.
Vini Malacensis . . libras duas.
Post sufficientem digestionem filtra. — Bitter, tonisch. — Gabe, drei Drachmen bis eine halbe Unze, täglich zwei Mal.

Vinum amarum. (*Va.*)

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. duas.
Vini Malacens . . libram unam.
Caryophyll. pulv. . scrupulum.
Digere et filtra. — 1 bis 4 kleine Löffel täglich drei oder vier Mal bei Erbrechen Schwangerer ꝛc.

Tinctura Quassiae s. Ligni Quassiae s. Quassiae excelsae (alcoholica). (Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Gen. Han. HassP. O. Sax. *C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Rasur. Ligni Quass. unc. unam.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Digere per duos dies et filtra. (Am. Du. *C. Gr. Re.*)

Ed. Ligni unciam et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — B. et Bel. Ligni partem unam et Alcoholis (15°) sex; — Ams. Alcoholis (0,917) sex; — *Fi.* Alcoholis (30°) sex; — *Sw.* Ligni uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — *Vm.* Ligni partem unam et Aquae Vitae sex; — Hau. et O. Ligni uncias quinque et Alcoholis libras duas; — D. Ligni partem unam et quinque Alcoholis; — Sax. decem Alcoholis; — HassP. ut tincturam colombo; — *T.* Ligni uncias quatuor cum Alcoholis 25° B. libris duabus per octo dies digerere.

℞. Ligni Quassiae . unciam unam.
Alcoholis (20°) uncias quatuor.

Digere per dies quatuor in balneo aquae tepido, cola et residuo infunde
Alcoholis (20°) . . uncias duas.
Post duos dies cola et colaturas mixtas filtra. (An.)

℞. Rasur. Ligni Quass. uncias duas.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Cardamomi minoris semunciam.
Aquae Vitae . . . libras duas.
Post dies quatuor macerationis cola. (Gen.)

Essence of camomill (*Gr.*): Ligni Quassiae uncias octo. Spir. rectif. congium, Ol. Chamaemeli q. s. ad odorem.

Quercus.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Quercus alba, L.*; weiße Eiche; Chêne blanc (*Gal.*); White oak (*Ang.*)
Am. *C. Gr.*

Ein Baum (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, *J.*) der Vereinigten Staaten. (*Mich.* Arb. Amer. II. t. 1.)

Die Rinde, welche man anwendet, ist adstringirend und brechenerregend.

2) *Quercus tinctoria, L., Q. nigra*; Quercitroneneiche, Färbereiche; Chêne quercitron (*Gal.*); Black oak (*Ang.*)
Am. *C. G. Gr.*

Ein Baum der Vereinigten Staaten. (*Mich.* Arb. Amer. II. t. 22.)

Man wendet die Rinde an, welche stark adstringirend ist.

3) *Quercus Robur, L.*; gemeine Eiche; Chêne Rouvre (*Gal.*); Oak (*Ang.*); Dub (*B.*); Eeg (*D.*); Majup'hal (*Hin. Sa.*); Eik (*Bel.*); Querce, Quercia (*I.*); Kora debowa, Carvalho (*Lus.*); Ek (*Suec.*).
Am. Ams. An. B. Ba Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham Han. Hass HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Sp.* Z.

Ein großer Baum, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* VI. 35. 36. *Blackw.* t. 487. *Plenck* t. 670. Nouv. Duh. VII. 57. *Bert.* Bild. V. 68. fig 2.)

Man wendet die Rinde und die Früchte an.

Die Rinde der jungen Zweige (cortex Quercus s. quercinus) ist glatt, außen aschgrau, inwendig roth. Sie hat einen eigenthümlichen Geruch und einen bittern und sehr adstringirenden Geschmack. — Die Früchte (Glandes s. Nuces Quercûs s. quercinae), Eicheln; Glands (*Gal.*); Zoladz (*Pol.*) sind eiförmig oder eirund, länglich, geruchlos und haben einen herben, bittern Geschmack. Ihre Becher (Cupulae s. Calyculi Glandium Quercûs) bestehen aus graulichen, dicht dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen.

B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ham. Han. Hass. O. Pol. Sax. Suec. Wür. *Be. M.*

Quercus pedunculata, Willd.
Ba. Bor4. HassP. LonN. *Re.*

4) *Quercus Ilex, L.*; Steineiche; Chêne Yeuse (*Gal.*).
His. His3. *Gr.*

Ein Baum des südlichen Europa's und des nördlichen Africa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 618.)

Die Eicheln, welche man anwendet, sind bisweilen süß und eßbar, länglich und unten von Becherchen bekleidet, welche aus sehr kleinen, dicht dachziegelartig auf einander liegenden und filzigen Schuppen bestehen.

Die Eichenrinden, besonders die von der gemeinen Eiche, enthalten viel Gärbestoff (Concinnum. Tannin) mit einer extractivstoffigen Substanz. Sie besitzen eine sehr stark adstringirende Kraft, so daß man sie nicht in hoher Gabe anwenden kann, ohne die Verdauungswege zu reizen, ja ohne eine allgemeine Reaction zu bewirken. Man hat sie statt der China vorgeschlagen, allein sie hat als Fiebermittel eine weit geringere Wirkung. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu einer Unze. Die Eicheln dienen, wenn sie süß sind, als Nahrungsmittel; die andern hat man, geröstet, als ein nützliches Reizmittel bei Drüsenkrankheiten, besonders Scropheln, empfohlen. Der Gärbestoff als Magenmittel zu ½—1 Gran in Pulver, Pillen mit Rosenconserve ꝛc., als adstringens zu 2 bis 3 Gran in Pillen mit rob sambuci q. s. alle 2 oder 3 Stunden.

5) *Quercus Suber, L.*; Korkeiche; Liège (*Gal.*); Corktree (*Ang.*); Korketrae (*D.*); Alcorhoque (*His.*); Korkboom (*Bel.*); Savero (*I.*); Savereiro (*Lus.*); Korktraed (*Suec.*).
Gal. Suec. Wir. *Be. G. Gr. M. Re. Sp.*

Ein Baum des südlichen und westlichen Europa's. (*Blackw.* t. 193. *Plenck* t. 671. *Bert.* Bild. I. 66. fig. 1. Nouv. Duh. VII. 45.)

Man wendet die Rinde und die Frucht an.

Die Rinde (cortex Suberi s. Suber) ist biegsam, leicht, rissig, schwammig, elastisch und von röthlichgelber Farbe.

Nach **Chevreul** besitzt sie als vorzügliches Agens einen eigenthümlichen Stoff, **Suberin** (Suberina), Subérine (*Gal.*).

Ehedem wendete man sie innerlich als Adstringens an.

Die Eicheln haben im Allgemeinen einen süßen und angenehmen Geschmack.

Gr. führt außer diesen noch *Quercus Ballota*, deren Eicheln ein Oel liefern,

und Q. *foliata* an, wovon man die Blätter äußerlich bei'm Brand braucht.

Pulvis Quercus compositus, Pulvis Corticis Quercus et Anthemidis nobilis. (BorC. RC. *Au.*)

℞. Corticis Quercus scrupulum unum.
Rad. Calami,
— Gentianae, sing. gr. quinque.
Fiat pulvis (BorC. *Au.*)

℞. Corticis Quercus grana quinque.
— Aurantiorum,
Olibani, singulorum grana decem.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Pulv. Corticis Quercus,
— Flor. Anthemid. nob., sing. scrupulum. (RC.)

Cataplasma antisepticum s. cum Concinno s. adstringens. (GalM. LH. Li. *Va.*)

℞. Pulv. Corticis Quercus,
Pulv. Salicis fragil., sing. part unam.
Aceti camphorati . partes sex.
Misce. (Li. *Va.* Hosp. milit.)

℞. Farinae Hordei,
— secalitiae,
Cort. Quercus pulv., sing. part. aeq.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad consist requisitam. (GalM.)
— Massae refrigeratae addendo Camphorae partem quinquagesimam vel vigesimam quintam, habes *Cataplasma antisepticum s. c. Concinno et Camphora s. cum Camphora.* (GalM.)

℞. Farinae Hordei,
Corticis Quercus, singulorum sesquiunciam.
Coque cum Aquae sufficiente quantitate ad consistentiam cataplasmatis et adde
Salis Ammoniaci drachmas tres. (LH.)

Suppositorium roborans. (*Ca.*)

℞. Corticis Quercus,
Rad. Tormentillae, sing. part. unam.
Mellis . . . . . partes duas.

Infusum adstringens s. Corticis Quercus compositum. (*Gr*)

℞. Corticis Quercus . semunciam.
Aquae . . . . . semilibram.
Liquoris expressi sesquiunciae adde
Pulveris Gallarum . grana decem.
Tincturae Catechu,
— Cardamomi compositae,
Syrupi Corticis Aurantii, sing. semidrachmam
Auf eine Gabe.

Extractum Corticis Quercus. (BorC. Du. *Br. Gr. Re.*)

℞. Corticis Quercus . libram unam.
Aquae purae . . . libras octo.
Coquendo dimidia parte consumptâ cola exprimendo, et colaturam blando igne ad consist. pilularem consume. (Du. *Gr. Re.*)

℞. Corticis Quercus partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Coque per horas duas et per cribrum trajice; residuo cum nova Aqua cocto, liquores commixti sufficienter evaporent. (*Br.*)

℞. Cort. Quercus pulv. libram unam.
Aquae bullientis libras duodecim.
Digere, saepius agitando, per horas 24, tunc liquorem leviter ad consumptionem tertiae partis usque consume; post refrigerationem filtra et in balneo aquae ad extracti consist. usque inspissa. (BorC.)

Tinctura Corticis Quercus. (A.)

℞. Cort. Quercus grossiusc. pulv. unc. duas.
Alcoholis (0,910) . libram unam.
Digere ad sufficientem extractionem usque et filtra. — Adſtringirend.

Decoctum Quercus s. Quercus Roboris s. Corticis Quercus, Tisana adstringens febrifuga. (B*. BorC. Ed. Lon. LonN. *Fi. Gr. Re. T Va.*)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Aquae communis octarios (libras) duos.
Decoque ad unius octarii (librae) remanentiam et cola. (B*. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Ed. *Fi.* Corticis unciam, Aquae libras duas cum dimidia et reductionem ad unciarum sedecim (ad dimidium, *Fi.*) remanentiam; — BorC. Corticis uncias duas, Aquae sedecim et decoctionem ad unciarum duodecim remanentiam; — *T.* Corticis uncias tres cum Aquae libris quatuor ad dimidii remanentiam decoquere; — *Va.* Corticis unciam, Aquae libras quatuor, ad dimid. decoquere, colare et edulcorare.

Adſtringirend, toniſch, fieberwidrig, bei Wechſelfiebern empfohlen. — Gabe, alle drei Stunden eine Taſſe.

Decoctum Corticis Suberi. (*Bo. Pie.*)

℞. Suberi raspati . scrupulos duos.
Aquae . . . . octarios duos.
Decoque ad dimidii remanentiam. (*Pie.*)

Bo. addere jubet Syrupi Capilli Veneris uncias duas.

Gabe, acht Unzen, drei Mal täglich, acht oder zehen Tage lang. Man kann syrupus Nymphaeae zuſetzen und die Wirkung durch ein Klyſtir von einer ſtarken Abkochung der Korkeichenrinde oder von Peterſilie, jeden Morgen gegeben, unterſtützen.

Fomentatio cum Concinno s. Corticis Quercus. (Gal M.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut coquendo octarius unus colaturae obtineatur.

Injectio adstringens. (*Sw.*)

℞. Cort. vel Fol. Quercus unc. unam ad duas.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Decoque ad librae unius colaturae remanentiam. — Zu Einſpritzungen in die Harnröhre, drei oder vier Mal täglich, bei rebelliſchem chroniſchem Tripper. — Man kann dieſe Einſpritzung auch mit einer halben Unze Galläpfelpulver bereiten.

Injectio Quercus (*Re*): Decocti Cort. Querc. octarium, Alumin. purif. semunciam. — Bei erſchlafftem Zuſtand der vagina und des rectum.

Fomentatio adstringens s. roborans s. styptica, Fomentum quercinum. (LH. *Au. Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Corticis Quercus . semunciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad dimidii remanentiam et adde
Florum Chamomillae unciam unam.
Post semihoram infusionis colaturae adde
Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce. (*Au.*)

℞. Summit. Millefolii . unc. unam.
Radicis Caryophyllatae,
Cort. Quercus, sing. semunciam.
Aq. Calcariae unc. viginti quatuor.
Decoque ad unciarum duodecim colaturam et adde
Alcoholis . . . . uncias tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Rad. Quinquefolii maj. unc. unam.
Corticis Quercus pulverati,
Rosarum rubr., sing. drach. sex.
Aquae . . . . . libram unam.
Post sufficientem coctionem cola. (*Ra. Va.*)

℞. Rosarum rubrarum,
Corticis Quercus, singulorum drachmas sex.
Digere per triduum cum
Vini tincti (rubri?) . libra una, cola et exprime. (LH.)

Lac adstringens. (*Sa.*)

℞. Corticis Quercus,
— Granati,
Rad. Tormentill., sing. drach. duas.
Aquae fontanae,
Lactis vaccini, sing. libram unam.
Coque ad dimidii remanentiam, in fine addendo
Cinnamomi pulv. drachmas duas.

Decoctum Corticis Quercus cum Alumine s. Quercus aluminosum, Fotus s. Fomentatio adstringens. (DD. RC. *Sa. Sw.*)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum octodecim liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et adde
Alumin's crudi pulv. drach. tres.
Dissolve. (DD.)

RC. Corticis drachmam, Aquae font. libram, ad uncias octo decocto adde Aluminis drachmam, Syrupi simpl. semunciam. — Gabe, eine Unze drei oder vier Mal täglich, mehr oder weniger, ſeltener oder häufiger, je nach der Wirkung und den Umſtänden. Ohne Syrup, äußerlich in Bähung und Gurgelwaſſer.

℞. Corticis Quercus libram unam.
Balaustiorum . uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras sex.
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde
Aluminis . . . . drachmas sex.
Dissolve. (*Sa.*)

Sw. Corticis Quercus semilibram, Balaustiorum vel Cort. Granati uncias tres, Aquae libras sex, reductionem ad tres, et Aluminis drachmas sex.

Decoctum Corticis Quercus cum Aceto, Fotus antisepticus, Fomentatio antiseptica. (DD. Ful. Ham.)

℞. Corticis Quercus unciam unam.
Herbae Absinthii . uncias duas.
Aquae purae uncias triginta sex.
Coque ad unciarum viginti liquidi remanentiam; cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (DD.)

℞. Corticis Quercus . uncias duas.
Aceti . . . uncias triginta sex.
Coque, sub finem addendo
Herbae Rutae,
— Scordii, sing. . drach. tres.
Salis Ammoniaci . semunciam.
Cola. (Ful.)

Ham. Corticis Quercus unciam, Aceti libras duas, Rutae manip. unum, Scordii tantidem et in colaturae sesquilibra solvere Salis Ammoniaci semunciam.

Gargarisma Quercus s. antisepticum. (RC. *Gr. Re.*)

℞. Dec. Quercus aluminosi (RC.) libram unam.

Aceti,
Tinct. Myrrhae, sing. unc. unam.
Misce. — Interdum loco aceti Acidi sulph. vel muriat. guttae quindecim.
Gr. Re. Aluminis semiscrupulum, Corticis Quercus drachmas duas, Olei Vitrioli guttas triginta, Aquae fervidae uncias sex.

Cerevisia quercina s. adstringens. (*Sw*. Vm.*)

℞. Glandium Quercus partem unam.
Cerevisiae fortis partes sedecim.
Infunde in balneo aquae tepido per plures dies et cola

Emulsio adstringens. (*Bo.*)

℞. Glandium Quercus excorticatarum,
Amygdal. dulc., sing. . . no. 6.
Infusi Verbasci . . uncias sex
Syr Hederae terrest. unc. unam.
Bei Harnruhr empfohlen. — Abends bei Schlafengehen zu nehmen.

Opiatum adstringens. (*Bo.*)

℞. Conservae Cynorrhodon uncias sex.
Glandium Quercus pulv. unc. tres.
Corallii rubri praeparati,
Catechu, singulorum sesquiunciam.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Syrupi Rosarum rubrarum q. s.
Bei Diarrhöe und chronischer Ruhr. — Gabe, eine Drachme alle vier Stunden.

Unguentum Autenrietlii contra decubitum (*Dulk*): Cort. Querc. q. vis cum Aq. part. octo ad dimid. dec., colat. et add. Aceti Plumbi quamdiu praecipit. oriatur, quod in colatorium charta empor. tectum impositum Aqua comm. sedulo elotum in tantum siccetur, ut pultem unguinosam praebeat, quae loco frigido servanda est. — Muß bald verbraucht oder, besser, jedesmal frisch bereitet werden.

Glandes s. Nuces Quercus s. quernae tostae. (Ba. HassP. Li. Sax)

℞. Glandium Quercus quantum vis.
Cupulis et cortice separatis concide nucleos in partes quatuor, sicca prope ignem cribro impositos et tunc in pelvi ferrea torre, agitando continue, donec frusta brunnea et fragilia reddita sint; post refrigerationem molae ope in pulverem redige.

Infusum Glandium Quercus tostarum. (B*. *Fi.*)

℞. Gland. Quercus tost. semunciam.
Aquae bullientis uncias sex ad octo.
Infunde et cola. — Bitter, bei Gekröseverstopfungen und Atrophie gepriesen. — Man kann den Aufguß angenehmer machen, wenn man eine Drachme Chocolate zusetzt.

Coffea Glandium. (*Au.*)

℞. Glandium Quercus tostarum
drachmas sex.
Coffeae ustae . drachmas duas.
Aquae sufficientem quantitatem.
Post brevem ebullitionem cola. — Dieser Trank mit Milch und Zucker gemischt, wird bei Scropheln und Rhachitis für nützlich gehalten. — Gabe, zwei oder drei Tassen täglich.

R.

Radix Lopeziana.

Radix Indica Lopezina, Lopezka jaar, Racine de Jean Lopez (*Gal.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal Wir. *A. Gr. M. Sp.*

Diese Wurzel kommt in sehr großen holzigen Stücken vor, deren Holz gelblichweiß, derb, geadert, geruchlos und sehr bitter ist. Die Rinde besteht aus einer innern röthlichen, bitter und styptisch schmeckenden und einer äußern körnigen, pulverartigen, hellgelben Schicht, welche letztere wahrscheinlich von irgend einem Cryptogam herrührt.

Man kennt die Pflanze, von welcher diese Wurzel kommt, nicht genau. Sie wird aus Africa gebracht. Manche halten Morus indica dafür. Fer. leitet sie, aus einem sonderbaren Irrthum, von Lopezia racemosa, *Cav*, aus Mexico ab.

Reizend, tonisch, bei chronischer Diarrhöe und im letzten Stadium der Abzehrung angewendet.

Gabe des Pulvers, sechs bis zwanzig Gran, drei oder vier Mal täglich.

Syrupus adstringens. (*Sm.*)

℞. Rad. Lopez. minutim concis.
unc. unam.
Aquae bullientis sesquioctarium.
Digere inter cineres calidos per horas 48, coque deinde blando igne ad remanentiam liquoris octarii (chopine) unius, in quo colato solve
Sacchari albi . . . libram unam.
Semel vel bis ebulliant. — Gabe, täglich wenigstens sechs Löffel.

Electuarium adstringens. (*Sm.*)

℞. Radicis Lopezianae drachmas duas.
Conserv. Rosarum rubrarum,
— Cynorrhodon, sing. unc. duas.
Syrupi Gummi quantum sufficit.

Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Tinctura adstringens. (*Sm.*)

℞. Rad. Lopezianae sesquidrachmam. Alcoholis uncias duas cum dimidia. Post sufficientem digestionem filtra. — Gabe, ein Kaffeelöffel täglich drei Mal in einem paſſenden Vehikel.

Ranunculus.

In den Pharmacopöen werden angeführt:

1) *Ranunculus acris. L.*; ſcharfer Hahnenfuß; Renoncule âcre (*Gal.*); Upricht crawfoot (*Bel.*); Rainunculo (*Lus*).

Br. Gal. His. His3. LP. *G. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Ranunculaceae, *J.*) Eine in ganz Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Orfila* méd. lég. t. 3. *Bull.* t 109. *Plenck* t. 458. Fl. méd. VI. 294.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba s. folia Ranunculi s. Ranunculi acris s. pratensis) beſteht aus zweierlei Blättern, von denen die untern in drei vielſpaltige Lappen getheilt, die obern linienförmig ſind. — Die Blüthen ſind gelb.

2) *Ranunculus aquatilis, L.*; Waſſerhahnenfuß, Waſſerhähnlein; Renoncule aquatique (*Gal.*).

His. His3. *Gr.*

♃ Eine Europäiſche Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 376)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut beſteht aus theils in haardünne Läppchen getheilten, theils ganzen und ſchildförmigen Blättern. Es hat einen ſcharfen Geſchmack. — Die Blüthen ſind weiß.

3) *Ranunculus bulbosus, L.*; knolliger Hahnenfuß; Renoncule bulbeuse (*Gal.*); Bulbous crawfoot (*Ang*); Knollwartige Ranonkel (*Bel.*); Solvifrar (*Suec.*).

Gal. *G. Gr. M.*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 27. *Plenck* t. 457. *Bigel.* Am. med. Bot. III. 1. t. 47. *Oed.* Fl. Dan. t. 351.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (bulbi Ranunculi bulbosi) iſt einfach, rundlich, knollig, weiß. — Das Kraut beſteht aus einem aufrechten Stängel und zuſammengeſetzten Blättern.

Die ganze Pflanze hat eine außerordentliche Schärfe.

4) *Ranunculus sceleratus, L.*; giftiger Hahnenfuß, Froſcheppich, Feigblatterneppich; Renoncule des marais (*Gal.*); Marsh crawfoot, Sharp hanewood (*Ang.*); Puggepeber (*D.*); Ranonculo mulvado (*His.*); Water haanevoet (*Bel.*).

Gal. *C G. Gr. M.*

⊙ Eine in Europa an ſumpfigen Orten gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 259. *Plenck* t. 456. *Bull.* t. 47. *Bert.* Bild. IV. 7. fig. 1.)

Man wendet das Kraut (herba Ranunculi palustris s. aquatici) an; es beſteht aus einem glatten, hohlen und ſehr äſtigen Stängel und theils geſtielten, rundlichen, glatten, zur Hälfte in drei eingeſchnittene oder gekerbte Lappen geſpaltenen, unbehaarten, blaßgrünen, theils in längere, ſchmälere, linienförmige, gefingerte oder handförmige Lappen geſpaltenen Blättern.

Eins der heftigſten reizenden und ſcharfen Gifte. Einige Schriftſteller halten dieſe Pflanze für die herba Sardoa des Saluſt, durch deren Gebrauch das ſardoniſche Lachen entſteht.

5) *Ranunculus Flammula, L.*; kleiner Sumpfhahnenfuß; Petite Douve (*Cal*); Lisser spearwort (*Ang.*); Liden gnul hanefod (*D.*); Kleen egelkolen (*Bel.*); Aelt graes (*Suec.*).

Gal. *G. M. Re.*

♃ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächſt. (*Bull.* t. 15. *Plenck* t. 459. *Zorn* Ic. pl. t. 326.)

Man wendet das Kraut (herba Flammulae, Ranunculi flammei minoris) an; es beſteht aus einem glatten Stängel mit ganzen und ganzrandigen, eirundlanzettförmigen, geſtielten Blättern. Es beſitzt einen außerordentlich ſcharfen und brennenden Geſchmack.

Reizend; die ſchwediſchen Landleute wendeten es als Pulspflaſter gegen Wechſelfieber an.

Gr. führt noch *Ranunculus flammeus major*, *Lingua* und *Ranunculus Thora* an.

Raphanus.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Raphanus sativus, L.*; Rettig, Ratich, Reddik; Raifort cultivé, Radis noir (*Gal.*); Radish (*Ang*); Reddiske (*D.*); Rabano (*His.*); Tamme radys (*Bel.*); Rafano (*I.*); Rabao (*Lus.*); Raettika (*Suec.*)

Ams. Br. D. Fer. Gal. His. His3. Pal. Wir. Wür. *Be. G. Gr. M. Pid. Sp.*

⊙ et ♃ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine Pflanze, welche urſprünglich in China einheimiſch ſeyn ſoll, aber überall gebaut wird. (*Lam.* Ill. t 566. *Blackw.* t. 81. *Plenck* t. 518. Fl. méd. VI. 292.)

Digitized by Google

Die Wurzel (radix Raphani nigri s. hortensis) iſt dick, kreisrund, außen ſchwarz, inwendig weiß, ihr Fleiſch iſt feſt und ſaftig. Sie hat einen ſtarken, eigenthümlichen Geruch und einen ſehr ſcharfen, beſonders in der Schaale deutlichen Geſchmack. Die Saamen geben ein Oel (Oleum Raphani.)

Die Radiſchen und Rüben ſind Varietäten dieſer Art und durch die Cultur entſtanden.

2) *Cochlearia Armoracia*, *L.*; Meerrettig, Meerrettigsſcharbockheil, Kreen, Krän; Raifort sauvage, Cran (*Gal.*); Broad horse radish (*Ang.*); Kren (*B.*); Peberrod (*D.*); Rabano, Marviro (*His.*); Meerradys (*Bel.*); Armoraccio, Peperello bobrasso, Barba forte, Cren (*I.*); Chrzan (*Pol.*); Rabão rusticano, Rabano rustico (*Lus.*); Chren (*R.*); Pepparrot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sa. Sp.* Z.

4 (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in verſchiedenen Gegenden Europa's wachſende Pflanze. (*Blackw.* t. 415. *Schk.* t. 181. *Plenck* t. 513. *Hayne* V. t. 29. Düs. off. Pfl. XIII. t. 21. *Zorn* Ic pl. t. 457.)

Die Wurzel (radix Armoraciae s. Raphani rusticani s. rustici s. sylvestris s. marini) iſt geſtreckt, walzenförmig, dick, außen gelb, innen weiß und faſerig. Sie hat einen ſehr durchdringenden Geruch und einen ſcharfen, beißenden, bittern Geſchmack.

Sie enthält Satzmehl und ein flüchtiges Oel, deſſen vorzüglicher Beſtandtheil der Schwefel zu ſeyn ſcheint.

Kräftig reizend, magenſtärkend, antiſcorbutiſch; gekaut, Speichelabſonderung befördernd, gegen friſch entſtandenes Halsweh durch Erkältung. — Gabe des Softes, eine halbe Drachme in Milch oder Wein.

Pediluvium ex Armoracia s. irritans. (*Au. Va.*)

℞. Aquae fervidae . libras quatuor.
Rad. Armorac.
unc. duas ad quatuor.

Schlegel empfiehlt es zur Wiederherſtellung des unterdrückten Fußſchweißes.

Species contra scorbutum s. antiscorbuticae. (*Pal.*)

℞. Herbae Cochleariae,
— Nasturtii aquatici,
— Beccabungae,
Herbae Marrubii albi
— Fumariae,
— Trifolii, sing. semunciam.
Radicis Armoraciae . semilibram.
— Polypodii,
— Sassaparillae, sing. unc. tres.
Seminum Anisi . drachmas sex.
Concisa et contusa misce.

Succus Armoraciae compositus s. diureticus. (B*. Suec.)

℞. Succi Armoraciae uncias quatuor.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (B*.)

℞. Succi Armoraciae unciam unam.
Spiritus Frumenti . uncias sex.
Aceti . . . . . uncias duas.
Misce. (Suec.)
Gabe, zwei Löffel.

Conserva antiscorbutica. (*Va.*)

℞. Succi Armoraciae,
Cochleariae,
Trifolii, sing. . . . uncias duas.
Sacchari . . . . . q. s.
Misce. — 1 bis 2 Unzen täglich.

Potio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Pie. Sm.*)

℞. Succi Raparum coctarum expressi,
Aquae comm., sing. uncias octo.
Mellis albi . . . . uncias duas.
Den Tag über, Kaffeetaſſenweiſe.

Mel Armoraciae. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Succi Armoraciae . uncias tres.
Mellis albi . . . libram unam.
Misce frigide. (Suec.)

Vm. Succi partem unam et quatuor Mellis; — B* secundum *Dispensatorium pauperum Pragense*, Succi partem unam et duas Mellis, leni igne ad aptam consist. inspissanda.

Aqua Armoraciae. (GalH. *Fi. T.*)

℞. Rad. Armoraciae rec. part. unam.
Aquae purae . . partes quinque.
Destillent partes duae.

Aqua diuretica. (Sar. *Ca. Pie.*)

℞. Rad. Armoraciae,
— Petroselini,
— Saxifragae, sing. libr. unam.
Baccarum Juniperi . uncias sex.
Succi Limonum,
Aquae Ononidis, sing. libras tres.
Post horas 24 macerationis destillent in balneo aquae. (Sar.)

℞. Succi Porri,
— Ceparum,
— Armoraciae, sing. libr. duas.
— Parietariae,
— Citri, sing. . semilibram.

Post trium dierum digestionem destillent lente. (*Ca. Pie*)
Gabe, eine Unze Morgens und Abends.

Spiritus Raphani rusticani s. Armoraciae. (Hass. Sar.)

℞. Radicis Armoraciae recentis,
Succi Armoraciae,
Aquae communis, sing. libras sex.
Alcoholis . . . . libras duas.
Destillet dimidia pars; producto adde
Rad. Armoraciae rec. libras tres.
Destillent in balneo aquae. (Sar.)
℞. Radicis Armoraciae,
Aquae communis, sing. partes sex.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Destillent partes duas. (Hass.)

Spiritus Armoraciae compositus. (B*. Ful. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

℞. Radicis Armoraciae . libras tres.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Destillent librae quatuor in balneo aquae; adde
Aquae Piperis Jamaic. libras octo.
Misce bene. (Ful.)
℞. Radicis Armoraciae,
Cort. sicci Aurant., sing. libram.
Nucis moschatae . . semunciam.
Aquae Vitae . . . octarios octo.
— communis quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Maceratis per horas 24 destillent lente octarii octo. (B*. Lon. LonN. *Gr. Re.*)
Löffelweiſe zu nehmen.

Tisana ad scorbutum s. antiscorbutica. (*ParC.*)

℞. Spir. Armoraciae comp.
unciam unam.
Infusi Cichorii . octarium unum.
Misce.

Cerevisia Armoraciae s. antiscorbutica. (*Ca. Huf. Va. Vm.*)

℞. Armoraciae . . uncias quinque.
Cerevisiae . . . . libras duas.
Infunde per horas 24 et colaturae adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce bene. (*Huf.*)
Va. Hosp. Inf. Alcoolati antiscorb. (Spir. Armor. comp.) uncias duas, Cerevisiae sesquilibram.
℞. Cerevisiae recent. octar. sedecim.
Immerge, inter fermentandum, saccum linteum continentem
Betonicae,
Salviae,
Agrimoniae,
Cochleariae,
Absinthii Pont., sing. manip. unum.
Radicis Inulae,
Rad. Armoraciae, sing.
uncias quatuor.
Post duos vel tres dies cola. (*Ca.*)
℞. Fructus Aurantiorum . . no. 3.
Succum expressum infunde in
Cerevisiae fortis
partes sexaginta quatuor.
In mixtura frigide macera
Fol. rec. Cochleariae,
— — Nasturtii,
— — Salviae, sing.
partem unam.
Seminum Sinapis,
Rad. Armoraciae, sing.
part. dimidiam.
Post aliquot dies cola leviter exprimendo. (*Vm.*)
Gabe, zwei oder drei Gläſer täglich, bei Scorbut und Nieren-, Blaſen- und Leberkrankheiten.

Cerevisia antiscorbutica s. Turionum Pini. (RC. *Ca.*)

℞. Cerevisiae . . . libras quatuor.
Radicis Armoraciae uncias duas.
Fol. Cochleariae . sesquiunciam.
Turionum Pini . unciam unam.
Post sufficientem infusionem exprime.
Gabe, zwei bis vier Unzen täglich. (*Ca.*)
℞. Radicis Armoraciae,
Semin. Sinapis nigrae contus.
Extr. Turionum Pini, sing.
libras duas.
Syrupi Molassis . libras quatuor.
Cerevisiae tenuis, vel
Infusi Malti Hordei, vel
Decocti ejusd. libr. centum et viginti.
Digere leniter per dies quatuor vel sex ut fiat fermentatio et cola. — Gabe, ein halbes bis ein Pfund täglich, bei Scorbut und Lähmung; bisweilen läßt man kalt ein Pfund kohlenſaures Kali darin einweichen, wodurch es beſonders harntreibend und bei Waſſerſucht nützlich wird. (RC.)

Acetum Armoraciae s. Cochleariae Armoraciae. (*Re. Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae unciam unam.
Aceti . . . . . libram unam.
Post septem dies macerationis filtra.
Re. Radicis rasae unciam digerere in Aceti octario per dies quatuordecim et exprimere. — Beſonders als Schönheitsmittel gegen Sommerſproſſen, auch gegen ſcorbutiſche Mundgeſchwüre.

Aqua emetica. (*Pie.*)

℞. Juglandium viridium,
Rad Armoraciae, sing. libras duas.
Aceti . . . . . libras tres.
Digere leni calore per dies quinque

vel sex et deinde cola. — Gabe, eine halbe bis drei Unzen.

Tinctura Raphani composita. (B*. GalM.)

℞. Rad. rec. Raphani . uncias duas.
Cort. sicci Aurant. unciam unam.
Spiritus Cochleariae libras quatuor.
Digere per dies aliquot et cola exprimendo. — Reizend, bei Scorbut empfohlen. — Gabe, ein Löffel.

Gargarisma antiscorbuticum. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Infusi amari . . . uncias sex.
Tincturae Raphani . semunciam.
Mellis Rosarum . . uncias duas
Va. Hosp. St. Ant. Tinct. Armoraciae drachmas duas, Specier. amarar. scrupul., Syrup. Mellis unciam, Aquae comm. uncias quatuor. — Bei schmerzlosen, scrophulösen Affectionen des Mundes.
Va. Hosp. Inf. Tinct. antiscorbut. drachm. duas, Syrupi Mellis unciam unam, Decocti Hordei libram unam.

Vinum Armoraciae. (Suec.)

℞. Radicis Armoraciae . semilibram.
Vini albi . . . . . libras octo.
Digere per dies quatuor et cola. — Reizend, gegen Scorbut.

Vinum Cochleariae compositum. (B*. GalM. *Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae unciam unam.
Cinnamomi,
Semin. Sinapis nigr., sing. sesquiunciam.
Vini albi libras duas cum dimidia.
Macera per tres dies, vas saepius agitando, tunc liquidi partem limpidam decantha. (*Sw*)
℞. Tinct. Armoraciae comp. unc. unam.
Vini albi octarium (litre) unum.
Misce. (B*. GalM.)
Reizend; bei Scorbut, Unordnungen in den Verdauungsfunctionen von Schwäche des Magens und Lähmung empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Eßlöffel zwei Mal täglich. Nöthigenfalls kann man ihn in Wasser geben.

Vinum antiscorbuticum (Gal. Pm. Sar. *Gr. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Armoraciae . partes tres.
Semin. Sinapis partem unam c. dimidia.
Herb. Nasturtii aquatici,
— Cochleariae,
— Beccabungae, sing. part. unam.
Spir. Cochleariae partem unam c. dimidia.
Vini Rhenani partes nonaginta sex.
Infunde per dies septem, exprime leviter et filtra. (*Vm.*)
℞. Rad. Armoraciae rec. unciam unam.
Foliorum recentium Cochleariae,
— — Nasturtii aquatici,
— — Trifolii,
Seminum Sinapis, sing. semunciam.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Vini albi . . . . . libras duas.
Digere per horas 36, subinde agitando; cola paullo exprimendo et adde colaturae
Alcoholis Cochleariae semunciam.
Misce. (Gal. *Gr.*)
Pm Armoraciae uncias quindecim, Cochleariae, Nasturtii aquatici, Sinapis, sing. sex, Salis Ammoniaci tres, Vini albi generosi libras triginta, infunde, digere per triduum, cola, filtra.
℞. Rad. rec. Armorac. unc. duodecim.
— — Bardanae unc. quinque.
Fol. rec. Cochleariae,
— — Nasturtii,
— — Beccabungae,
— — Fumariae,
Semin. Sinapis, sing. . uncias sex.
Salis Ammoniaci . . uncias tres.
Vini albi unc. trecentas octoginta.
Post septem dies infusionis exprime fortiter et filtra. (*Sp.*)
℞. Rad. rec. Armorac. unc. quatuor.
Fol. rec. Cochleariae,
— — Trifolii, sing. manip. duos.
— — Salviae . manip. unum.
Vini albi . . . . . libras sex.
Digere, blando calore, per horas 24 et cola. (*Sa.*)
Gabe, ein Likörglas voll und mehr.

Vinum diureticum. (*Sa.*)

℞. Radicis Armoraciae,
— Iridis Flor., sing. uncias sex.
Vini albi . . . quantum sufficit ut post semihoram infusionis colaturae librae duae obtineantur, quibus adde
Syrupi Foeniculi,
— Juniperi, sing. uncias duas.

Syrupus antiscorbuticus s. antiscorbuticus compositus s. Cochleariae officinalis compositus s. de Armoracia compositus. (An. Bel. Gal. *Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cinnamomi contusi partem unam.
Fol. rec. contus. Cochleariae,
— — — Beccabungae,
— — — Nasturtii, sing. partes triginta.

Sem. Sinapis contus.
part. triginta quinque.
Rad. rec. Armorac.
part. quadraginta quinque.
Succi Aurant. . partes nonaginta.
Vini rubri
part. ducentas sexaginta.
Infunde, blando calore, per horas 24; post refrigerationem cola exprimendo; in colatura blandi caloris ope solve
Sacchari albi
partes quadringentas octoginta.
Cola syrupum per pannum. (*Vin.*)

℞. Foliorum recentium concisorum
Cochleariae,
— — — Trifolii,
— — — Nasturtii,
Radicis Armoraciae,
Pomor. Aurant. amar. concis.
libram unam.
Cinnamomi contusi sesquiunciam.
Vini albi generosi libras quatuor.
Macera per duos dies in cucurbita stannea, galeâ suâ tectâ et bene lutatâ. Destillet deinde in balneo aquae liquoris libra una, cum quo et
Sacchari albi . . libris duabus
in balneo aquae, vase tecto, syrupum para. Quod in cucurbita remanet, cola absque expressione; liquorem post subsidentiam decantha et coque ad syrupi consistentiam cum
Sacchari albi . . libris duabus.
Clarifica et nonnisi tepidum cum praecedente commisce. (Gal.)

℞. Herb. rec. Cochleariae,
— — Lepidii,
— — Nasturtii, sing.
libras quinque.
Radicis Armoraciae libras decem.
Cinnamomi pulverati uncias sex.
Pom. Aurant. amar. c. Cortice concisorum . . . libram unam.
Alcoholis (20°) . . libras duas.
Aquae destillatae . . libras octo.
In alembicum immissis, destillent lente liquoris librae quinque, cum quibus et
Sacchari albi . . . libris decem
fiat in balneo aquae syrupus. Exprime fortiter, quod in cucurbita remanet. Liquori prodeunti adde
Sacchari albi . . libras decem.
Clarifica, coque lente ad syrupi consist. et post refrigerationem syrupum cum praecedente commisce. (Au. Bel.)

Sw. loco mixturae alcoholis et aquae Vini albi libras decem et liquori expresso residui addere Aquae libras decem et viginti Sacchari, ut syrupus secundus obtineatur.

℞. Succi non depurati Cochleariae,
— — — Beccabungae,
Succi non depurati Nasturtii,
— — — Radicis Armoraciae, sing. . uncias duodecim.
Succi non depur. Pomor. Aurant. amar. . . . . uncias viginti.
Cort. rec. Fruct. Aurant amar.
unciam unam.
Digere frigide in vase tecto, subinde agitando, per horas circiter duodecim, filtra et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Post solutionem adde demum
Spiritus Cochleariae,
Aquae Cinnam., sing. unc. unam.
Post subsidentiam decantha (*Sp.*)

Rob antiscorbuticum (LP.). Succi antiscorbutici (LP.) depur. libras duas, Plantar. amar. uncias duas, coque ad librae unius remanentiam, cola et adde Mellis et Sacchari, sing. libram, coque ad consist. debitam. — Gabe, eine bis sechs Unzen.

Syrupus purificans amarus. (*Ca.*)

℞. Vini albi . . . libras sedecim.
Foliorum Cochleariae libras tres.
— Trifolii,
Rad. rec. Armoraciae, sing.
libr. duas.
— — Gentianae, libr. unam.
Macera per dies aliquot; tunc recipe
Hujus Vini . . . libram unam.
Sacchari libram et unc duodecim.
Liqua blando igne, adde hujus syrupi singulis libris alius syrupi cum Spiritu Cochleariae parati unciam unam.

Infusum Armoraciae. (RC.)

℞. Armoraciae . . . unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Post horam unam infusionis cola.

Infusum Armoraciae s. Armoraciae compositum s. Seminum Sinapis s. Raphani s. stimulans. (Am. B*. Gen. Lon. LonN. Wür. *C. Gr. Re. Va.*)

℞. Radicis Armoraciae,
Semin. Sinapis, sing. unc. unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Macera per duas horas in vase leviter tecto et adde
Spir. Cochleariae (Armoraciae) comp. . . . . unc. unam.
Misce bene. (B*. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Am. et *C.* eandem formulam sed spiritum cochleariae omittentes; — *Va.* Aquae bull. libras duas.

℞. Radicis Armoraciae,
Seminum Sinapis,
Conserv. Cochlear., sing.
unc. unam.
Aquae bullientis . . libras duas.

Infunde per horas 24 in vase tecto et cola. (B*. Wür.)

℞. Radicis Armoraciae,
Semin. Sinapis, sing. unc. unam.
Canellae albae . drachmas tres.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per duas horas et colaturae adde
Aquae Anisi . . . uncias duas.
Misce. (Gen.)

Reizend, bei Scorbut, Lähmung, Waſſerſuchten und Wechſelfiebern empfohlen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

℞. Seminum Sinapis nigrae,
Radicis Armoraciae, sing. semunciam.
Aquae ferventis . libram unam.
Frigefacta exprime et adde
Spiritus Ammoniae aromatici drachmam.
— Pimentae . . semunciam.

Von Paris bei Lähmung empfohlen, 2 Eßlöffel 3 Mal täglich.

Syrupus Armoraciae s. Raphani rusticani. (B*. Ful. Li. Suec. Wir. *Fi. Gr.*)

℞. Succi Armoraciae rec. expr. q. vis.
Sacchari albi . quantum sufficit ut fiat syrupus. (Suec. *Gr.*)

Ful. et Li. Succi et Sacchari, singulorum partes aequales.

℞. Radicis Raphani sativi rasae,
Aquae, singularum partes aequales.
Contere bene, exprime succum et partibus novem hujus adde
Sacchari albi . . partes septem.
Liqua in vase clauso. (*Vm.*)

Cullen infuso e drachma una Rad. Armorac. rasae in Aquae ferv. unciis duabus colaturae addere Sacchari duplum (B*); — *Fi.* Armoraciae uncias duas cum Aquae bull. octo per horas quatuor infundere et addere Sacchari albi libram.

Gabe, von einer bis zu drei Drachmen.

Infusum paralyticum s. ad paralysin. (*Sa. Sw.*)

℞. Radicis Armoraciae,
Semin. Sinapis, sing. sesquiunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Macera per horas duas et colaturae adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Misce. — Reizend, bei Lähmung geprieſen. — Gabe, vier Unzen zwei Mal täglich.

Infusum antihydropicum s. ad hydropicos. (*Sa. Sw.*)

℞. Infusi amari,
— ad paralysin, sing. libr. unam.
Misce. — Gabe, vier Unzen täglich zwei Mal.

Decoctum s. Apozema antiscorbuticum. (Gal. *Bo. Ca. Sp.*)

℞. Radicis Armoraciae uncias duas.
Aquae . . . . uncias octoginta,
Coque per horae quadrantem et adde
Herbae Beccabungae,
— Nasturtii,
— Cochleariae,
— Acetosae, sing. manip. duos.
Coque parumper, cola et adde
Aceti . . . . uncias quatuor.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Radicis Raphani,
— Parellae,
— Trifolii, sing. semunciam.
Nasturtii aquatici,
Cochleariae,
Beccabungae, sing. pugill. unum.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti vitra tria obtineantur. Colaturae adde
Syrupi antiscorbutici Portali absque Sublimato unciam unam.
Misce. (*Bo.*)

℞. Rad. Patientiae,
— Bardanae, sing. unc. unam.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque per sexagesimas 20 et adde
Radicis Armoraciae unciam unam.
Fol. Cochleariae,
— Trifolii,
— Nasturtii, sing. drach. sex.
Post sexagesimas decem infusionis cola. (Gal. *Ca.*)

Bei hartnäckigen Flechten, Scorbut und Krankheiten, welche im lymphatiſchen Syſtem ihren Sitz haben, empfohlen. — Gabe, täglich mehrere Gläſer

Apozema diureticum. (*Pie. Sm.*)

℞. Rad. Armoraciae drach. duas ad quatuor.
Bacc. Juniperi contus. pugill. dim.
Marrubii albi pugillum magnum.
Aquae bullientis vitra tria magna.
Stent in infusione inter cineres calidos per horam et post refrigerationem colentur.

Auf drei Mal, Morgens nüchtern; zu jeder Gabe ſetzt man einen Eßlöffel einer Miſchung von vier Unzen Syrupus scilliticus mit vier Unzen Syrupus Polygalae Virginicae cum Vino albo paratus.

Ratanhia.

Krameria s. Crameria triandra, Ruiz et Pav., dreimännige Kramerie; Ratanhia (*Gal.*); Raiz para los dientes (*His.*).

B. Bel. Bor4. Fer. Gal. Han. HassP. His. His3. Sax. *C. Fi. Gr. Par. Re.*

♃ (Tetrandria Monogynia, L., Polygaleae, J.) Eine Südamericaniſche Pflanze. (Fl. Peruv. t. 1. p. 61. Ic. 93. 94. Berl. Jahrb. XI. t. 1. *Hayne* VIII. t. 13.)

Man wendet die Wurzel (radix Ratanhiae s. Rathaniae s. Rhataniae s. Ratanhae) an; ſie iſt holzig, hart und rundlich und beſteht aus einer dicken Rinde mit etwas unregelmäßiger Oberfläche, von ſchwärzlichrother Farbe und bitterem adſtringirendem Geſchmack und einem ſehr derben, weißlichen oder ſchwachgelblichen, geruch- und geſchmackloſen Holze.

Peſchier hat eine eigenthümliche Säure (Acidum kramericum) darin entdeckt.

Sie darf nicht mit Gallerte, Eiſenſalzen und Mineralſäuren verbunden werden.

Ein ſehr kräftig adſtringirendes Mittel, welches bei alten Schleimflüſſen und ſogenannten paſſiven Blutflüſſen häufig gebraucht wird.

Infusum Ratanhiae. (*Gr.*)

℞. Radicis Ratanhiae contusae drachmas tres.
Aquae ferventis . semioctarium.
Macera per horas sex. — Mit aromatiſchen und toniſchen Mitteln.

Extractum Ratanhiae. (B*. Bor4. Fer. Gal. HassP. His. His3. Pm. Sax. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Corticis Ratanhiae partem unam.
Aquae purae . . . partes octo.
Macera per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, liquores commixti post horas 24 sepositionis ad aptam consist. evaporent. (B*. Fer. Sax.)

Bor4. Ratanhiae libram unam cum Aquae sedecim et residuum cum eadem Aquae quant. utrumque ad dimid. decoquere, decoctionem quoties opus fuerit, repetere et liquores commixtos, subsidendo et decanthando depuratos ad librarum quatuor remanentiam et balneo vaporis ope ad extracti absinthii spissitudinem consumere; — HassP. ut extractum colombo, ligni campechiensis etc. — Pm. Ratanhiae uncias sex cum Aquae ferv. libris sex per horas tres infundere, cum expressione colare, decanthare, et liquorem Albumine Ovi clarificatum balnei maris ope ad extr spissitud. redigere.

℞. Cort. Ratanhiae pulv. libram unam.
Aquae . . . libras duodecim.
Infunde per dies duos in balneo aquae vel levis caloris ope, saepius agitando; infusionem repete cum nova Aqua, donec nullum amplius accipiat saporem; liquores commixti et filtrati primum ignis ope, deinde in balneo aquae ad siccum evaporent. (His.)

Fi. Ratanhiae uncias quatuor cum Aquae comm. libris quatuor calide per horas tres infundere, fortiter exprimendo colare, decanthare liquidum et Albumine clarificatum in balneo aquae ad extracti consist. consumere.

℞. Cort. Ratanhiae pulv. quantum vis.
Abunde cum Aqua humectatum macera per horas 24, adde deinde Aquae frigidae pondus massae toti aequale, coque per sexagesimas quindecim vel viginti, liquorem bullientem per pannum laneum (Flanell) cola, residuo infunde Aquae bull. pondus duplum, coque denuo per horae quadrantem, cola et colaturas mixtas, postquam per momentum subsederunt, decantha et continue coquendo consume. (*Vm.*)

℞. Tincturae Ratanhiae alcoholicae bene saturatae . quantum vis.
Destillet quarta pars in balneo aquae, residuum leni calore ad extracti sicci consistentiam evaporet (Gal.)

Gabe, zwanzig Gran bis eine halbe Unze.

T. Extractum siccum cum Radice et Alcohole diluto solo vel etiam cum Aqua et deinde cum Alcohole parare jubet; — Radicis libras tres cum Aquae q. s. decoquere novam Aquam addendo pro evaporata etc et inspissare balnei vaporis vel solis ope ad siccum.

Bor4. HassP. haben das *Extractum Ratanhae venale* in Brasilia paratum.

Decoctum Radicis Ratanhiae. (B*. Fer. *Fi.*)

℞. Radicis Ratanhiae . semunciam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coquendo ad colaturae semilibrae remanentiam consume. (B*.)

Fer. *Fi.* eandem formulam sed colaturae addere Aceti Sacchari drachmas duas et quatuor.

Adſtringirend. — Gabe, von einem Löffel bis zu einem halben Glaſe.

Tisana Ratanhiae. (*Va.* Hosp. Ital.)

℞. Radicis Ratanhiae . semunciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque ad dimid. et adde
Aceti . . . . semidrachmam.
Sacchari . . . . . q. s.

Kleine Taſſenweiſe. Statt des Eſſigs kann man Citronenſaft und ſtatt des Zuckers syr. rosar. rubr. zu zwei Drachmen nehmen. Nach dem Alter in ſteigenden Gaben bei Kindern gegen häufige Blutflüſſe.

Tinctura Ratanhiae aquosa (Fer.)

℞. Extr. sicci Ratanhiae drach. quinque.
Herb. Lepidii unc. quatuor c. dim.
Aquae . . . . uncias novem.
Macera per dies tres et cola.

Tinctura Ratanhiae acetosa s. cum Aceto. (Fer.)

℞. Extr. sicci Ratanhiae drach. unam.
Sulphatis Sodae . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Solutioni adde
Aceti . . . drachmam unam.

Tinctura Ratanhiae, Alcohol cum Ratanhia acetatus. (B°. Fer. HassP. *Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Cort. Rad. Ratanhiae pulv. unc. tres.
Alcoholis . . . . libras duas.
Post septem dies digestionis, blando calore, cola. (B°.)

Gr. Re. Ratanh. uncias duas, Spir. ten. octarium; — *Vm.* Ratanhiae partem unam et sex Aquae Vitae; — HassP. Spiritum Vini rectificatum, caeterum ut *Vm.*

℞. Extr. Ratanhiae drach. quatuor.
Alcoholis (24°) . uncias quatuor.
Aceti destillati . . uncias octo.
Digere per tres dies et filtra. (Fer. *Fi. T.*)

Adſtringirend. — Gabe, dreißig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Rhataniae aromatica. (*Gr.*)

℞. Rad. Rhatan. contus. uncias tres.
Cort. Canellae . . uncias duas.
Spiritus tenuioris . octarios duos.
Digere per dies decem et per chartam cola. — Magen- und adſtringirendes Mittel mit einem toniſchen Aufguß.

Tinctura Ratanhiae composita. (B°. Fer.)

℞. Rad. Ratanhiae pulv. uncias tres.
Corticis Aurantiorum uncias duas.
Serpentariae Virgin. semunciam.
Croci . . . . drachmam unam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere per dies duodecim et cola. — Adſtringirend. — Gabe, ſechzig bis achtzig Tropfen.

Tinctura Ratanhae saccharata. (Bor4.)

℞. Radicis Ratanhae uncias quatuor.
Sacchari tosti . . uncias duas.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Spir. Vini Gallici uncias sedecim.
Digere per aliquot dies, exprime et filtra.

Pulvis dentifricius antiscorbuticus. (*Va.*)

℞. Extr. Ratanh. . . semunciam.
Carbonis Ligni . . uncias duas.
Cinnamomi,
Caryophyll., sing. . drach. duas.
In pulv. tenerrimum redactas bene commisce.

Gargarisma adstringens. (Fer. *Gr. Va*)

℞. Extr. Ratanhiae drach. quatuor.
Aquae . . . . uncias viginti.
Solutioni adde
Aceti . . . . uncias quatuor.

Gr. Infusi Ratanhiae uncias sex cum dimidia, Acidi sulphurici diluti drachmas duas cum dimidia, Syrupi Mori unciam. — Bei Erſchlaffung des Zäpfchens ꝛc. (*Sprague.*) — *Va.* Extr. Ratanh. drachm. tres, Aq. sesquilibr., coque et adde Syrupi Moror. unc. unam, Acidi sulph. q. s.

Unguentum adstringens. (Fer.)

℞. Extracti Ratanhiae,
Olibani, sing. . uncias quatuor.
Galbani . . . . . uncias duas.
Unguenti defens. rubri unc. sex.
Terebinthinae unc. duas c. dim.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Auf Brüche anzuwenden.

Pilulae adstringentes. (Fer.)

℞. Extr. Ratanhiae drachmam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad molle reddendum. Fiant pilulae decem ad duodecim.

Electuarium adstringens. (Fer.)

℞. Pulveris Ratanhiae unciam unam.
— Zingiberis drachmam unam.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll, bei Fiebern und Anfällen von Epilepſie.

Boli Ratanhiae s. adstringentes. (*Ca. Va.*)

℞. Pulv. Extr. Ratanhiae sesquiscrup.
— Aluminis . grana decem.
Conserv. Cynorrhodi drach unam.
Syrupi adstringentis . . . q s.
Fiant boli viginti. — Gabe, zwei Stück alle drei oder vier Stunden.

Va. Extr. Ratanh. pulv. scrup., Conserv. Ros. rubr. drachm., Syr. Cort. Aur. q. s. ut fiant boli octo. — Zwei alle zwei Stunden.

Potio adstringens, Mixtura adstringens. (Fer. *B. Ca. Gr. Ra. Va.* Char.)

℞. Extr. Ratanhiae drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Syrupi Chinae . unciam unam.

Misce. (*Ra.*)

Gr. Va. Loco syrupi chinae Diacodii unciam.

℞. Extracti Ratanhiae semidrachmam.
Aluminis . . . . grana decem.
Infusi Rosarum uncias quinque.
Syrupi Rosarum,
— Catechu, sing. unciam unam.
Aquae Rabelii guttas quindecim.
Misce. (*Ca.*)

℞. Tincturae Ratanhiae compositae,
Pulv. Ratanhiae, sing. drach. sex.
Aquae . . . . . uncias sex.
Misce. (Fer.)

℞. Infusi Rosarum . unciam unam.
Acidi sulph. Aqua dil.
gutt. quadraginta.
Extracti Ratanhiae drachmas duas.
Syrupi Mororum drachmas sex.
Misce. (*B.*)

Löffelweise. — Der erste Trank wird besonders bei Mutterblutfluß, der vorletzte bei Fiebern und Anfällen von Epilepsie empfohlen.

Elixir tonicum ad dentes. (*Maury.*)

℞. Rad. Ratanhiae . . uncias octo.
Contusam macera per dies 8 in
Aquae vulner. spirit. octariis (litre) quatuor.
Filtra et adde
Olei Menthae . drachmas duas.
— Cort. Aurant. drachm. tres
aptissime in Spir. Vin. rectificatiss. unciis quatuor solvenda.

Resina elastica.

Resina Cayennensis, Gummi elasticum, Cahuchu; Caoutchouc, Kaoutsock, Federharz, elastisches Harz; Caoutchouc, Gomme élastique, Résine elastique, Résine de Cayenne (*Gal.*); Elastick harpix (*D.*); Kautschuk (*Suec.*).

D. Fer. Gal. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp.*

In dicken, lederartigen, dichten, stark federnden, braunen oder rothbraunen, geruch- und geschmacklosen Stücken.

Diese Substanz, welche sich von den eigentlichen Harzen dadurch unterscheidet, daß Azot einen ihrer Bestandtheile bildet, ist in vielen Pflanzen und Pflanzenproducten vorhanden; besonders aber liefert es der coagulirte Saft von Siphonia Cahuchu, *Schreb.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Euphorbiaceae, J.) Brasilien's und Guiana's. (Fl. méd. II. 93. *Lam.* Ill. t. 790. *Plenck* t. 692. Berl. Jahrb. VIII.) Urceola und Castilla elastica liefern ebenfalls elastisches Harz. Durch Wärme wird es weich und löst sich in Oelen, Steinöl und Aether auf. Man benutzt es als Firniß zu elastischen Catheter, Bougie's ꝛc.

Emplastrum e Resina elastica. (*Ca. Sw.*)

℞. Resinae elasticae uncias quatuor.
Essent. Terebinthinae libr. unam.
Digere, modico calore, per dies septem, in vase clauso, tunc blando igne coque; post subsidentiam decantha et adde
Olei Olivarum,
Cerae albae, sing. . uncias duas.
Coque lente ad evaporationem essentiae usque et massam refrigeratam serva. — Zur Bereitung von Heftpflasterstreifen.

Cereoli elastici (Elastic gum catheters and bougies (*Gr.*). Filum ex intestino paratum (Darmsaite) Cera obtuctum et justo curvatum saepius in Solutionem Resinae aetheream ingeratur, donec satis spisso gummi strato sit circumdatum, tunc calore perfecte siccatum in Aqua coquatur, ut cera liquefacta et filum separari possint: loco hujus fili Filum ferreum, sericeo obductum adhiberi potest; vel Filum ferreum spiraliter volutum tenue fascia Gummi elastici, cujus superficies in Aquam ferventem vel potius in Aetherem vel Solutionem Camphorae in Spiritu Nitri, cui Spiritus Vini aliquantulum additur, mollis reddita est, circumtegitur, huic fasciae alia sericea et filum cannabinum superinvolvitur, quibus si gummi bene siccatum videtur, semotis, cereolus elasticus per momentum in Aquam bullientem immittatur, quo expanditur, ut filum ferreum retrahi possit.

Rhamnus.

In den Pharmacopöen sind angeführt:

1) *Rhamnus Frangula, L.*; Faulbaum; Bourgène (*Gal.*); Blackaldertree (*Ang.*); Taersttrae (*D.*); Arraclan (*His.*); Vuilboom (*Bel.*); Frangula (*I.*); Kruszyna (*Pol.*); Frangulina (*Lus.*); Brakvoed (*Suec.*).

Gal. GalM. Gen. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Sa. Sp.*

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Rhamneae, J.) des nördlichen Europa's. (*Hayne* V. t. 44. Diiss. off. Pfl. VI. t. 21 Nouv. Duh. III. t. 15.)

Man wendet die Rinde (cortex Frangulae s. Alni nigrae s. nigrae bacciferae) an, welche dunkelgrün und weißpunctirt ist. Unter der Oberhaut ist sie gelb und nach dem Trockenwerden braunroth. Sie hat keinen Geruch, aber einen etwas bittern Geschmack.

Sie wirkt laxirend. — Die Beeren beſitzen dieſelbe Eigenſchaft.

2) *Rhamnus catharticus, L.*; gemeiner Kreuzdorn, Färbebeere; Nerprun purgatif (*Gal.*); Purging buckthorn (*Ang.*); Psy gahody, Rzessetlak (*B.*); Korsbaer, Vrietorn (*D.*); Ramno catartico (*His.*); Purgeerende wegedoorn (*Bel.*); Spino cervino (*I.*); Szaklak kzewia (*Pol.*); Espinha cervina (*Lus.*); Getappel, Saftgraent (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed Fer. Gal. GalM. Gen. Han. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. Sax. Suec. Wir. *Bo. C. G. Gr. M. Se. Sp.* Z.

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächſt. (*Blackw.* t. 135. *Plenck* t. 140. *Hayne* V. t. 43. Düss. off Pfl. III. t. 10 Nouv. Duh. III. t. 10.)

Man wendet die Früchte (baccae Rhamni s. Spinae cervinae s. domesticae) an; es ſind erbſengroße, runde, glänzende, ſchwärzliche Beeren mit vier Saamen in der Mitte eines ſaftigen Fleiſches. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen bittern, widerlichen, ſcharfen Geſchmack.

Sie enthalten, nach Vogel, einen eigenthümlichen, färbenden Stoff, Rhamnin (Rhamnium).

Ein ſehr kräftiges Purgirmittel, welches man bei Waſſerſucht ſehr gerühmt hat.

Das Oel von Rhamnus Siculus, Elaeodendrum Organ wird ſtatt des Olivenöls verkauft. (*Gr.*) Rh. Alaternus laxirend; Rh. Lotus, die eßbaren Früchte zu einem angenehmen Wein: Rh. soporifera, Früchte ſchmerzſtillend, ſchlafmachend, in Abkochung; Rh. paliurus, Saamen harntreibend, Wurzel und Blätter abſtringirend, trocknend; Früchte einſchneidend; Rh. Oenoplia, Oenoplia, unreife Früchte magenſtärkend, abſtringirend, Saft der reifen laxirend; Rh. niger, Rh. lycioides, Früchte in Abkochung zur Linderung der Schmerzen bei Gicht; Rh. sanguineus, Abkochung der Rinde in Milch bei Krätze (itch); Rh. infectorius, Beeren purgirend. (*Gr.*)

Succus Rhamni cathartici s. Spinae cervinae s. Baccarum Spinae cervinae. (Gal. Sar. *T.*)

℞. Bacc. Spinae cerv. matur. q. vis.

Contere inter manus, seminibus parcendo; massam per tres vel quatuor dies fermentationi subjice, cola exprimendo et succum in lagena sub strato olei serva.

Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Roob Spinae cervinae. (A. Gal. Wür. *T.*)

℞. Bacc. Spinae cerv. matur. q. vis.

Contere, granis parcendo, massam per (duos vel) tres dies sepone, donec fermentationis initium animadvertatur; exprime fortiter, tunc succum per pannum colatum et post tres vel quatuor horas decanthatum blando calore ad extracti consist. inspissa. (Gal.)

℞. Succi Bacc. Spinae cerv. libr. unam.

Coque ad mellis consist., sub finem uncias duas Sacchari addendo. (Wür.)

A. Sacchari partem unam et novem Succi; — *T.* Succum balnei aquae vel vaporis ope ad syrupi consist. inspissare et cuique librae Sacchari uncias tres addendo, ad mellis consist. consumere.

Gabe, von einem Scrupel bis anderthalb Drachmen.

Syrupus Rhamni s. Rhamni cathartici s. domesticus s. Spinae cervinae s. de Spina cervina. (Am. Ams. An. Bel. Bor4. Br. Gal. GalM. Gen. Han. Li. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. Gr. Re. Sp. Sw. T. Vn.*)

℞. Succi clarif. Bacc. Spinae cerv., Sacchari albi, sing. . part aeq.

Fiat lento igne syrupus. (Gal. LP. *T.*)

Am. An. Lus. et *C.* Succi partes quatuor et duas Sacchari; — Wür. Succi sex et quatuor Sacchari; — Ams. et Bel. Succi uncias sedecim et Sacchari libras duas c. dimid.; — *Gr.* Succi clarific. libras duas, Sacch. albi tres; — GalM. Succi partes tres et quatuor Sacchari; — *Sw.* Succi libras septem c. dimid. et Sacchari libras tres c. dimid; — Gen. Succi libras sex et Sacchari tres; — Li. Succi partem unam et Sacchari unam c. dimid.; Bor4. Succi uncias viginti, Sacchari libras tres.

Sw. si necesse est, addere Tincturae Piperis Jamaic. alcohol. libram.

℞. Succi Baccar. Rhamni depur. octarium unum.

Zingiber's concisi,

Pimentae pulv., sing. semunciam.

Macera blando calore per horas quatuor et filtra; tunc Succi depurati octarios alios tres coquendo ad dimidium (sesquioctar.) consume, liquores commisce et adde

Sacchari libras tres cum dimidia.

Fiat syrupus. (Lon. LonN. *Gr. Re. T.*)

℞. Bacc. Spinae cerv. matur. libras sedecim.

Exprime succum, sedimento Aquae bull. tantum ut obtegatur infunde, macera per horas 24 et cola exprimen-

do; liquorem cum succo commisce et adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Clarifica Albuminis ope et ad syrupi consist. usque consume, cui refrigerato adde

Olei Cinnamomi,
— Caryophyllorum,
— Macidis, sing. c. Saccharo tritor. . . scrupulum unum.

Misce bene. (*Vm.*)

℞. Succi depur. Spinae cervinae unc. viginti.

Sacchari albi uncias triginta duas.

Coque ad consist. requisitam et sub finem adde in nodulo inclusa

Anisi,
Mastichis, sing. . drachmas tres.
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyll., sing. sesquidrachm.

Serva (Br. Han. Wir. *Sp.*)

Pal. Succi libram unam, Sacchari duas et Aromatum, sing. drachmam; — Sar. Succi et Sacchari, sing. part. aeq., Anisi et Mastichis, sing. drachmas duas et Zingiberis, Cinnamomi et Caryophyllorum, sing. unam.

Potio purgans. (*ParC.*)

℞. Decocti Prunorum unc. quatuor.
Syrupi Spinae cerv. . unc. unam.

Misce.

Rhaponticum.

Rheum Rhaponticum, *L.*; Pontischer Rhabarber; Rhapontic (*Gal.*); Pontic rhubarb (*Ang.*); Reupontykum, Zemezluc wetssj (*B.*); Rapontico (*His. Lus.*); Rhapontic (*Bel.*); Rapontico, Rheaturco Rabarbaro dei Monaci (*I.*)

Br. Fer. GalM. His. His3. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp* Z.

4 (Enneandria Trigynia, L.; Polygoneae, *J.*) Eine im südlichen Rußland einheimische, in südlichen Ländern Europa's gebaute Pflanze. (Fl. méd. VI. 296.)

Man wendet die Wurzel (radix Rhapontici s. Rhapontici veri s. Rhabarbari Rhapontici) an; sie kommt unter zwei verschiedenen Formen vor; die eine der Varietäten ist faustdick oder minder, von holzigem Ansehen, äußerlich röthlichgrau, auf dem Queerbruche roth und weiß marmorirt, in sehr dichten, strahlig von der Mitte nach dem Umkreise laufenden Streifen; sie hat einen sehr adstringirenden und schleimigen Geschmack, kracht nicht unter den Zähnen und färbt den Speichel gelb; der Geschmack ist dem der Rhabarber ähnlich; aber unangenehmer; das Pulver ist gelb mit röthlichem Anstrich. Die andre ist drei oder vier Zoll lang, zwei oder drei dick, von weniger holzigem Ansehen, reiner blaßgelb oder weniger röthlich: der Bruch strahlig, der Geschmack adstringirend und schleimig, der Geruch dem der Rhabarber ähnlich, auch sie kracht nicht unter den Zähnen

Sie enthält, nach Henry, weit mehr Satzmehl und weniger kleesauren Kalk als die Rhabarber, aber mehr rothfärbenden Stoff. Hornemann hat darin eine eigenthümliche Substanz, das Rhaponticin (Rhaponticinum) gefunden.

Tonisch, laxirend.

Extractum Rapontici. (GalM.)

℞. Rad. Rhapontici sicc. part. unam.
Aquae frigidae . partes quatuor.

Infunde per horas 24, cola deinde, leviter exprimendo, infunde residuum

Aquae frigidae . partibus duabus et cola. Liquores commixti in balneo aquae ad extracti consistentiam evaporent.

Rheum.

Rhabarbarum; Rhabarber; Rhubarbe (*Gal.*); Rhubarb (*Ang*); Rhabarber (*Bel. D. Suec.*); Rawend (*Ar.*); Rabarbara (*B.*); Tay huam, Hay-hoang (*C.*); Ta-hoam (*Co.*); Rewund chini (*Duk*); Ruibarbo (*His. Lus.*); Reywan chinie (*Hin.*); Rabarbaro (*I.*); Schara modo (*Ma.*); Reywand (*Pe.*); Korzen rabarbarowy (*Pol.*); Variatu kalung (*Tam.*); Dschum-za (*Th.*).

Die Pharmacopöen bezeichnen mit diesem Namen vorzüglich folgende beide Substanzen;

A. *Rheum s. Rhabarbarum officinale.*

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp.* Z.

Man unterscheidet mehrere Arten derselben:

1) *Rhabarbarum s. Rheum verum s. Indicum s. Sinense s. Chinense s. e China s. Danicum*; Indische, Chinesische, Dänische Rhabarber; Rhubarbe de Chine ou des Indes (*Gal.*); in rundlichen, außen schmutzig gelben Stücken von einem derben Gewebe, ziegelrother Marmorzeichnung, matt ziegelrother Farbe und bitterem Geschmack. Sie kracht unter den Zähnen und färbt den Speichel orangegelb. Das Pulver hat eine zwischen Falb und Orangegelb die Mitte haltende Färbung.

Sie kommt aus China über Canton zur See.

2) *Rhabarbarum Tataricum s. Moscoviticum s. Rossicum s. Russicum s. Turcicum*; Russische, Tatarische Rhabarber; Rhubarbe de Moscovie, de Tartarie ou de Bucharie (*Gal.*). in etwas platten, unregelmäßigen, eckigen, großlöcherigen, außen rein gelben Stücken, von minderer Dichtheit als die vorige, mit rothen und weißen, sehr deutlichen und sehr unregelmäßigen Adern durchzogen. Sie hat einen sehr merklichen Geruch und einen bittern, adstringirenden Geschmack. Sie färbt den Speichel stark safranroth und kracht unter den Zähnen. Das Pulver ist reiner gelb als das der vorigen. Diese wird am meisten geschätzt, obgleich die Chinesische, wenn sie von guter Beschaffenheit ist, ebenfalls gesucht wird. Sie kömmt ebenfalls aus China, aber aus Kiachta durch Siberien.

Nach Guibourt kommen beide Spielarten von Rheum palmatum, L. *Blackw.* t. 600 *Plenck* t. 322 Fl. méd. VI. 297. *Bert.* Bild. I. 73.), welche in der Gegend von KianSin und Chan-Sin in der Chinesischen Tartarei wächst. Pfaff verwirft diesen Ursprung zwar nicht, zieht ihn aber in Zweifel.

Man findet im Handel noch eine andre Sorte:

3) *Rhabarbarum Britannicum s. Gallicum s. nostras*; Europäische Rhabarber; Rhubarbe d'Europe (*Gal.*), welche von Rheum undulatum, compactum und selbst palmatum kommt, welche Pflanzen in verschiedenen Gegenden Europa's, in Deutschland, Frankreich und England gebaut werden. Diese unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden sowohl in physischer als chemischer Hinsicht und zeigt im Allgemeinen, einige geringe Verschiedenheiten abgerechnet die Merkmale der zweiten Varietät des Rhabarbers

Die Morgenländische Rhabarber enthält, nach Henry, einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Rhabarbarin (Rhabarbarinum); Rhabarbarine oder Caphopicrite, ein fettes Oel, sauern, äpfelsauren Kalk, Schleimharz, Satzmehl, kleesauren Kalk, welcher den dritten Theil des Gewichts beträgt ꝛc. Letzteres Salz bewirkt, daß sie unter den Zähnen kracht. Hornemann betrachtet das Rhabarbarin als einen unreinen Stoff; er schreibt der Rhabarber einen andern eigenthümlichen Stoff das Rheumin (Rheuminum); Rheumine (*Gal.*), zu, welcher mit den Säuren verwandt, aber demungeachtet von der Rhabarbersäure (Acidum rheumicum), Acide rheumique (*Gal.*), welche Henderson annimmt, deren Existenz aber nicht erwiesen ist, sich sehr unterscheidet. Auch hat man darin einen zuckerartigen Stoff erkannt, dessen Vorhandenseyn auch durch Meißner bestätigt wird.

B. *Rheum s. Rhabarbarum spurium*; Mönchsrhabarber, Alpenampfer; Rhubarbe des moines, fausse Rhubarbe (*Gal.*); Bastard monks rhubarb (*Ang.*); Skreppe (*D*); Romaza (*His.*); Spitzbladdige pattich (*Bel.*); Romice (*I.*); Szczaw kobyli (*Pol.*); Babaca menor (*Lus.*); Haestsyrae (*Suec*).

Bel. Br. Gal. *Gr. M. Sp.*

Dieß ist die Wurzel von Rumex alpinus, L. ♃ oder ♂ (Hexandria Trigynia, L.; Polygoneae, *J.*), einer auf den Alpen wachsenden Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 261.)

Diese Wurzel (radix Hippolapathi s. Rhabarbari monachorum) ist sehr dick, holzig, faserig, außen roth inwendig gelb. Sie hat einen unangenehmen Geruch und einen bittern, herben und widerlichen Geschmack.

Die Rhabarber ist tonisch oder purgirend, je nach der Gabe; tonisch zu fünf bis zehen, purgirend zu achtzehen bis vier und zwanzig und mehr Gran.

§. 1. Präparate, welche die Rhabarber in Substanz enthalten.

Rhabarbarum tostum. (His. His3. Pal. Sar. *Fi.*)

℞. Rhei pulverati . . quantum vis,
In pelvim ferream amplam et planam immissum ignis moderati calori expone, continue cum spathula agitando, donec colorem fuscum acquisiverit; tunc refrigeratum serva.

Pulvis Rhei (*Re.*): Radix Rhei palmati pulverata.

Species Diaturbith cum Rhabarbaro. (Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Radicis Rhei,
Turbith, singulorum uncias duas.
Hermodactylorum unciam unam.
Diagrydii (sulphurati cum seminibus Tiglii triti),
Cremoris Tartari,
Semin. Violar, sing. semunciam.
Fiat pulvis, cui adde
Olei Cinnamomi . guttas decem.
Serva. (Pal. Wir.)

℞. Cinnamomi . . . partem unam.
Zingiberis,
Semin. Anisi, sing. . partes tres.
Scammonii . . partes quatuor.
Hermodactylorum,
Rad Turbith, sing. partes octo.
— Rhei . . . partes decem.
Fiat pulvis (*Vm.*)

Purgirend, wurmtreibend. — Gabe, einen bis zwei Scrupel.

Pulvis absorbens. (*E*)

℞. Chelar. Cancror. praep. drachm. unam.
Rhei . . . . . scrupulos duos.
Divide in partes quatuor. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich.

Pulvis Rhei compositus s. excitans. (*E. Re.*)

℞. Rhei,
Ipecacuanhae, sing. drach. unam.
Mit Erfolg auf schmerzlose Geschwüre, Warzen und andre Excrescenzen angewendet.

Pulvis Rhabarbari s. Rhei cum Tartaro Rhei s. Tartrate Potassae s. cathartícus s. Rhei compositus s. lenitivus s. lenitivus tartarisatus. (DD. Ful. Han. *Gr. Sm. Sy.*)

℞. Rhei,
Cremoris Tartari, sing. semunciam.
Fiat pulvis. (DD.) — Gabe, ein Scrupel.

Gr. Olei grana viginti quinque, Cremoris drachmam; — *Sy.* Rhei grana viginti et Tartari decem pro dosi; — *Sm.* Rhei et Tartari solubilis, singulorum partes aequales.

℞. Pulv. Rhei,
— Cremoris Tartari,
— Cort. Aurant., sing. unc. unam.
Misce. (Han.)

Ful. Rhei drachmas duas, Tartari tartaris. semunciam et Cort. Aurant. scrup. quatuor.

Gabe, von einer halben bis zur ganzen Drachme.

Pulvis Rhei compositus s. Rhei et Sulphatis Potassae s. antihecticus s. purgans. (BorC. *Sa. Sp.*)

℞. Rhei . . . . . grana sex.
Sulphatis Potassae grana duodecim.
Fiat pulvis. (*Sp.*)

BorC. Rhei partem unam et tres Sulphatis.

℞. Rhei . . . . semidrachmam.
Sulphatis Potassae grana decem.
Scammonii . . . . grana octo.
Olei ess. Foeniculi guttam unam.
Fiat pulvis. (*Sa.*)

Pulvis purgans. (*Gr.*): Rhab. grana quindecim, Scammonii, Ammon. Subcarb., sing. quinque. Auf eine Gabe

Pulvis puerorum epilepticus cum Rheo s. catharticus absorbens s. laxans s. infantum cum Rheo s. Magnesiae compositus s. Rhei salinus s. Rhei et Magnesiae s. Rhei cum Magnesia s. digestivus s. e Rheo. (B*. Br. D. DD. Fer. Gen. Li. Suec. *E. Sa. Sw. Va.*)

℞. Rhei . . . . . partem unam.
Magnesiae albae . . partes tres.
Fiat pulvis. (*Sa. Sw.*)

Suec. Rhei et Magnesiae, sing. part. aeq.; — *Va.* Rhei partem unam, Magnesiae duas; — Gen. Rhei partem unam et quatuor Magnesiae; — Fer. Rhei unam et octo Subcarbonatis Magnesiae.

℞. Rhei . . . . scrupulum unum.
Magnesiae calcin. semidrachmam.
Olei Cinnamomi . guttam unam.
In Syrup zu nehmen. (*E.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Magnesiae albae,
Foeniculi,
Sacchari albi, sing. drach. duas.
Fiat pulvis. (Suec.)

Br. Rhei, Magnesiae, sing. unciam, Foeniculi drachmas duas et Sacchari semunciam.

℞. Rhei,
Magnesiae albae,
Elaeosacch. Foeniculi, sing. part. aequales.
Fiat pulvis. (D. DD.) — Gabe, ein Scrupel.

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Visci querni,
Rad. Liquiritiae, sing. drach sex.
Magnesiae albae unc. duas c. dimidia.
Fiat pulvis. (B*. Li.) — Gabe, ein Scrupel bis eine halbe Drachme.

Pulvis Rhei compositus (*Gr.*): Pulv. Rhei drachm. tres c. dimid., Hydrarg. c. Creta drachm. unam, Potass. Subcarb. sesquidrachm. Misce — 5 Gr. — 1 Scrup. 2 oder 3 Mal täglich.

Pulvis ad tormina infantum s. Rhei saponaceus. (*Au. Sp.*)

℞. Rhei . . . . semidrachmam.
Saponis officinalis drachmam unam.
Oculorum Cancrorum semunciam.
Anisi,
Cumini, sing. scrupulum unum.
Croci . . . . . grana quatuor.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Misce. (*Sp.*)

℞. Pulv. Saponis medic. grana decem ad viginti.
— Magnesiae subcarbonicae,
— Sacchari,
— Rhei, sing. semidrachmam.
Misce. (*Au.*)

Boli e Rheo. (GalM. *Sa. Sw. Va.*)

℞. Rhei pulverati . semidrachmam.

Syrupi Sacchari quantum sufficit. Misce. (*Sa. Sw.*) — Adduntur si necesse est, Mercurii dulcis grana quinque vel Jalappae grana decem.

℞. Rhei pulverati . partem unam.
Sulphatis Sodae . . partes duas.
Fiat cum Aquae pauxillo bolus. (GalM. *Va.*)

Eolus ad diarrhoeam s. e Rheo sedativus s. adstringens. (*Sa. Sw.*)

℞. Rhei . . . . grana quindecim.
Diascordii . . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sa.*)

℞. Rhei . . . . grana duodecim.
Pulveris aromatici . grana tria.
Tincturae sedativae guttas viginti.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Misce. (*Sw.*)

Boli resolventes et purgantes. (*B. Va.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis Ven. (amygd.)
sesquidrachmam.
Roob Sambuci quantum sufficit ut fiant boli octo. — Gabe ein Stück alle zwei Stunden.

Boli purgantes. (LH.)

℞. Rhei . . . . semidrachmam.
Sulphatis Sodae . scrupulos duos.
Misce fiant cum Syrupo communi boli duo. — Gabe, auf ein Mal.

Pilulae Rhei. (Li. RC. *Sa.*)

℞. Rhei pulverati . . quantum vis.
Infusi Rhei . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum — Gabe, fünf bis funfzehen Stück

℞. Pulveris Rhei . . . semunciam.
Aloës . . . . . drachmas tres.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Olei Menthae guttas quindecim.
Syrupi Zingiberis . quantum satis ut fiat massa. — Gabe, funfzehen bis fünfundzwanzig Gran, täglich zweimal, mit lauwarmem Wasser oder Chamillenthee, bei Verdauungsbeschwerden ꝛc. Sind den pilulae aloës compositae sehr ähnlich. (RC.)

Pilulae de Rhabarbaro (*Gr*): Rhei unc. unam, Resin. Jalap., Tart. vitriol., sing. drachm. duas c. dimid., Olei Nuc. mosch. semidrachm., Extr. Gentian. liq. q. s.

Pilulae resolventes s. resolventes cum Rheo s. e Rheo cum Natro acetico s. ecphracticae. (BorC. Li. WW. *E. Sw.*)

℞. Pulveris Rhei,
Acetatis Sodae,
Fell. Tauri inspiss., sing.
drach duas.
Gummi Arabici semidrachmam.
Fiant pilulae granorum duorum. (BorC. WW.)

℞. Rhei pulverati sesquidrachmam.
Saponis Veneti drachmas quatuor.
Essentiae Terebinthinae . q. s.
Fiant pilulae granorum quinque. (*Sm.*)

℞. Fellis Tauri inspissati,
Gummi Ammoniaci pulverati,
Rhei pulverati, sing. unciam unam.
Fiant pilulae granorum duorum. (Li.)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Saponis albi . . grana decem.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, vier Stück auf einmal. (*E.*)

℞ Rhei . . . . sesquidrachmam.
Sulphatis Ferri . semidrachmam.
Saponis albi . scrupulos duos.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quadraginta. (*E.*)

Pilulae amarae. (*Re. Vm.*)

℞. Extracti Gentianae,
Saponis albi, sing. partem unam.
Rhei partem unam cum dimidia.
Tere in mortario ut fiat massa pilularis.

Moseley's pills (*Re.*): E Rheo et Gentiana cum Conservae vel Mucilag. q. s. paratae.

Pilulae rhabarbarinae antacidae s. absorbentes. (*Sw.*)

℞. Rhei,
Magnesiae calcin., sing. drach. duas.
Extracti Gentianae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quinque.

Pilulae roborantes ad blennorrhoeam s. stimulantes. (*Sa. Sy.*)

℞. Rhei pulverati drachmam unam.
Terebinthinae coct. drach. duas.
Fiant pilulae triginta sex. (*Sa.*)

℞. Rhei,
Gummi Arab., sing. unciam unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sy.*)

Electuarium stomachicum. (*Sw.*)

℞ Rhei pulverati sesquidrachmam.
Pulv. Ari,
— aromat., sing. drach. unam.
Oxydi Ferri nigri scrupulum unum.
Conserv. Cort. Aurant. unc. duas.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Gabe, einer Muscatnuß groß, täglich zwei Mal.

Electuarium ad dysenteriam s. antidysentericum. (*Ca.*)

℞ Confectionis japonicae uncias duas.
Balsami Locatelli unciam unam.
Rhei pulverati . . semunciam.
Syrupi Althaeae quantum sufficit.
Gabe, wie bei'm vorigen.

Conditum purgativum, Pulticula saponacea. (*Sa. Sm. Sp.*)

℞. Sulphatis Potassae drach. unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Rhei . . . . sesquidrachmam.
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
Misce. (*Sa.*) — Gabe, ein Kaffeelöffel voll.

℞. Saponis officinalis semidrachmam.
Aquae Menthae . drachmas tres.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum drachmam unam.
Magnesiae albae scrupulos duos.
Rhei . . . scrupulum unum.
Syr. Althaeae,
— Chamomillae, sing. drach. duas.
Misce. (*Sp.*) — Gegen Kolik bei Kindern empfohlen.

℞. Rhei,
Cremoris Tartari, sing. drach. duas.
Pulpae Prunorum . uncias octo.
Syrupi Cydoniorum . . . q. s
Misce. (*Sm.*) — Gabe, vier Kaffeelöffel täglich.

Passulae anthelminticae s. vermifugae. (*Par.*)

℞. Passularum minorum semilibram.
Rhei in nodulo inclusi semunciam.
Helminthochortos in nodulo unciam.
Aquae Portulaccae uncias quatuor.
In furnum immitte, pane exinde remoto et vas ibi relinque, donec passulae intumuerint et mollefactae sint.

Tabellae de Rheo s. Diarrhodon cum Rhabarbaro. (Gal. Pm. Sar. *Fi. Gr. Re.*)

℞. Rhei pulverati . . semunciam.
Mucilag. G. Tragacanth. Aqua Cinnam. par. . . . . q. s.
Fiant tabellae granorum duodecim. (Gal)

Re. Sacchari drachmas quinque, reliqua ut Gal.; — *Gr.* Rhei unciam unam, Sacchari sex, Mucilag. G. Tragacanth. c. Aqua Cinnam. par. q. s.; — *Fi.* Rhei pulv. semunciam, Sacchari albi pulv. uncias quatuor, Mucilag. Tragacanthae cum Aqua Cinnamomi parati q. s., ut fiant tabellae no. 192, quarum quaeque rhei sesquigranum continet.

℞. Pulveris Diarrhodon,
— Rhei, sing. . sesquiunciam.
— Sacchari albi . libr. unam.
Mucilag G. Tragacanth . q. s.
Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Pulveris Rhei,
Cremor. Tart., sing. drach. duas.
Cort. rec. Aurant. semidrachmam.
Sacchari in Aqua Florum Aurantiorum dissoluti uncias quatuor.
Fiant tabellae. (Br)

℞. Granulorum ex Sacch. et Amylo parat. . . . . unc. duas.
Sacchari albi . . . libras sex.
Amyli subtiliter pulv. libram unam.
Pulveris Rhei . . . uncias duas.
Aquae fontis . . quantum satis.
Saccharo in julapium debitae consist. converso, tragemata confice. (Pm.)

Haustus catharticus pro infantibus, Potio purgans. (*Pie. Sw*)

℞. Rhei . . . . grana duodecim.
Aquae Cichorii . . uncias tres.
Syrupi Cichorii . unciam unam.
Löffelweise für ein Kind von neun bis zehen Jahren. (*Pie.*)

℞. Rhei . . . grana sex ad octo
Calcariae subcarb. grana decem.
Aquae purae . . drachmas tres.
— Cinnamomi drachmas duas.
Syrupi Sacchari drachmam unam.
Wie das vorhergehende zu nehmen. (*Sw.*)

Potio purgans et vermifuga. (*Pie.*)

℞. Cinnabaris . . . grana decem.
Resinae Guajaci,
— Jalapae, sing. gr. quinque.
Rhei . . . . drachmam unam.
Antimonii diaphor. gr. quindecim.
Syrupi Cichorii comp. drach. sex.
Aquae Cichorii . . uncias duas.

Mixtura amara s. amara cum Rheo. (*Sw.*)

℞. Sulphatis Potassae . semunciam.
Rhei,
Extr. Gentianae, sing. drach. duas.
Aquae Menthae pip. uncias octo.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura Rhei composita. (*Gr.* Guy's Hosp. *Sprague.*)

℞. Radicis Rhei . . . drachmam.
Subcarbonatis Sodae drachmas duas.
Tincturae Corticis Aurantii sesquiunciam.
Decocti Liquiritiae uncias decem cum dimidia.

Sprague. Radicis, Subcarbonatis, sing. semi- ad sesquidrachmam, Decocti un-

cias sex cum dimidia, Tincturae drachmas sex.

Eine bis anderthalb Unzen zwei oder drei Mal täglich.

§. II. Präparate, welche den wirksamen Bestandtheil des Rhabarbers ohne das zu seinem Ausziehen angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Rhei s. Rhabarbari (aquosum). (Ams. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Gal. Gen. Han. HassP. His. His3. LH. Li. LP. O. Pal. Pm. Sar. Suec. Wir. *Fi. T. Vm.*)

℞. Rhei in frusta minora conc. q. vis.
Aquae frigidae quantum sufficit ut paullulum obtegatur; post horas 24 adde Aquae triplum pondus et cola absque expressione; residuo infunde Aquae pondus aequale, cola leviter exprimendo; colaturae commixtae et Albuminis ope clarificatae ad extracti spissi consist. evaporent. (*Vm.*)

Ba. macerare binis vicibus, qualibet per horas 24, Rhei partem unam in Aquae frigidae quinque.

℞. Rhei electi . . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Macera in loco calido per horas quatuor, tunc coque parumper, cola exprimendo et ad consist. requisitam consume. (Br. Fer. His. Pal. Wir.)

His3. Rhei libram unam cum Aquae font. sedecim per dies tres loco frigido infundere, tunc leviter coquere per horas quatuor, seponere, ad syrupi consist. vaporare et denique balneo aquoso inspissare, donec manibus malaxari possit; — *Fi.* Calide infundere Rhei uncias quatuor in Aquae comm. libris quatuor et fortiter premendo colare, fluidum decanthare et Albuminis ope clarificatum in balneo aquae ad extracti consist consumere; — *T.* Rhei libram unam, Aquae fervidae octo, infusionem per horas 24 etc.

℞. Rhei concisi . . libram unam.
Aquae bullientis libras sedecim.
Digere per horas 24, tunc sepone et cola; residuo infunde Aquae bull. libras octo et post horas 24 iterum cola, quo facto liquores commixti sufficienter evaporent. (Ams. Sar.)

Bor4. Rhei q. vis, Aquae fervidae decuplum, sepone per horas 36 et liquorem exprimendo separa; residuum iterum infunde Aquae fervidae quintuplo et post refrigerationem exprime; liquores primo leni igne ad tertiam partem tum in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem evaporent; — HassP. Rhei libram unam, Aquae fervidae sex, macerationem per 24 horas, residuo infundere Aquae fervidae libras quatuor et ad siccum consumere; — Pm. Rhei uncias sex cum Aquae ferv. libris sex per horas tres infundere, colare cum expressione, decanthare et liquorem Albumine Ovi clarificatum balneo maris ad extracti consist. inspissare.

℞. Rhei electi . . . partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola cum expressione; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti spissitudinem evaporent. (Bor. D Han. Li. O.)

Suec. ternas vel quaternas ebullitiones succedentes, quamlibet cum Aquae partibus tribus instituere; — LH. ut extractum absinthii; — LP. Radicem cum Aqua coquere, exprimere, colare, et faecibus delapsis in balneo mariae ad extracti consist. evaporare.

℞. Rhei . . . . . libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera per horas 24, subinde agitando et cola; novâ Aquâ rheo infusâ macera itidem et tunc levi cum expressione cola; liquores commixti et iterum colati in balneo aquae sufficienter evaporent. (Gal.)

℞. Rhei electi . . . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.
Macera per horas 24, subinde agitando et cola; residuum macerctur in Aquae novae frig. libris octo et coletur; liquoribus ambobus commixtis et in balneo aquae ad consist. syrupi evaporatis, lineas circiter duas liquidi patinis infunde, et in furno vel balneo aquae ad siccum consumptis, squamulas separa. (Gal.)

Dieß ist das *Sal essentiale Rhei s. Rhabarbari.*

Gabe, fünfzehen bis zwanzig Gran.

Extractum Rhei s. Rhabarbari alcoholicum. (Ful. Lon. LonN. Lus. Pol. Sax. Wür. *C. Gr. Re.*)

℞. Rhei concisi,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.
Digere per horas 12, cola exprimendo, destillando alcoholem separa et residuum ad consist. extracti consume. (Pol.)

Ful. et Wür. Rhei libram unam, Alcoholis tantidem, octo Aquae et tres dies digestionis; — Sax. Rhei partes duas, Alcoholis tres, novem Aquae et

digestionis horas 24; — Lon. LonN. et *C.* Rhei libram unam, Alcoholis (0,930) octarium unum, Aquae octarios septem et macerationem per quatriduum; — *Gr.* Rhei libram macera in Aquae octariis septem cum dimidio, mixtis cum Spiritus rectificati semioctario, per quatriduum, exprime et postquam subsederit liquor clarus evaporet; — *Re.* Rhei libras duas, Spir. rectif. congium per quatriduum digerere, filtrare et tinct. ad propriam consist. vaporare.

℞. Rhei pulverati . libram unam.
Alcoholis . . . libras quatuor.

Post dies quatuor digestionis decantha, residuum cum Aquae libris decem ad duas redigendis coque; cola decoctum et consume; tincturam ad mellis consist destillando redactam cum residuo decocti commisce et tunc totum, continue agitando, ad aptam consist. consume. (Lus.)

Gabe, wie bei'm vorigen.

Extractum Rhei compositum s. catholicum s. panchymagogum s. cnico-pharmacum. (B*. Bor. Bor4. D. HassP. O. Pal. Pol. Sax. *Pid.*)

℞. Extracti Rhei . . uncias tres.
— Aloës . . unciam unam.

Mollefactos in Alcohole balnei aquae ope ad massae pilularis consist. consume (Pol.)

℞. Extracti Rhei . . uncias tres.
— Aloës . . unciam unam.

Misce (in Aquae dest. q. s. soluta Bor4. HassP.) et adde

Saponis jalappini in Alcoholis q. s. solut. . . . . unc. unam.

Evaporent in balneo aquae ad aptam consist. (B*. Bor4. HassP. O Sax.)

D. Extracti Rhei uncias duas, Extracti Aloës drachmas quinque et Saponis jalapp. in Alcohole soluti unciam.

℞. Extracti Rhei . . uncias duas.
— Aloës aquosi . semunciam.
— Hellebori nigri drachmam unam et grana triginta sex.

Misce in mortario calefacto cum

Resinae Jalapae pulv. . drachmis duabus et granis viginti quatuor.

Serva ad usum. (*Pid.*)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Semin. Carthami excort. unc. quatuor.
Polypodii querni . uncias duas.
Zingiberis albi . drachmas duas.
Foliorum Sennae,
Turbith, sing unc. duas c dimid.
Agarici albi . . drachmas sex.
Scammonii . . drachmas decem
Mannae elect. unc. duas c. dimid.

Infunde per plures vices agaricum, scammonium et turbith in Aquae libris duabus ita ut penitus extrahantur; quod restat macera in Aquae bull. libris tribus et coque deinde ad tertiae partis consumptionem, sub finem addendo residuum prioris extractionis spirituosae; cola exprimendo, mannam in colatura solve, solutionem clarificatam cum extracto spirituoso commisce, alcoholem lenis caloris ope expelle et quod restat ad extracti mollis consist. consume. (Pal.)

Purgirend. — Die Gabe des letztern iſt von einem Scrupel bis zur halben Drachme, ohne Manna, von einer Drachme bis zu vier Scrupel mit Manna.

§. III. Präparate, welche den wirkſamen Beſtandtheil des Rhabarbers mit dem zu ſeinem Ausziehen angewendeten Vehikel zugleich enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Infusum Rhei s. Rhabarbari, Tinctura Rhei aquosa, Anima Rhei. (A. B*. Ba. Ed. Gen. Ham. Lon. LonN. Lus. Wür. *B. Br. C. Fi. Gr. ParC. Ra. Re. T. Va.*)

℞. Rhei concisi . drachmam unam.
Aquae bull. octarium dimidium.

Macera per horas duas et cola. (B*. Lon. LonN. *Gr. ParC. Re.*)

Ba. Rhei partem unam et duodecim Aquae; — A. Rhei semunciam et Aquae semilibram; — *Br.* Rhei uncias tres et Aquae libras duas cum dimidia; — *Ra. Va.* Hôt. D. Rhei unciam unam et Aquae libras duas; — Ham. Rhei unciam et Aquae q. s. ut colaturae unciae octo obtineantur; — *Fi.* Rhei drachmas duas, Aquae bull. uncias sex et horas 12 infusionis vel ebullitionem unicam cum Aquae unciis sex cum dimidia; — *B.* Rhei drachmas tres et Aquae uncias sex; — *T.* Rhei drachmam unam, Aquae uncias duas.

℞. Rhei contusi . . . semunciam.
Aquae bullientis . uncias octo.

Macera per horas 12, in vase tecto, et adde

Aq. Cinnamomi vinos. unc. unam.

Cola. (Ed. Lus. *C*)

Wür. Rhei drachmas tres, Aquae semilibram et Aquae Cinnamomi vinosae drachmas sex.

℞. Rhei pulverati . unciam unam.
Aquae Menthae pip. unc. duodecim.

Digere blando calore et cola (Gen.)

Tonisch und ſchwach purgirend, bei einigen chroniſchen Krankheiten und in der

Reconvalescenz nach hitzigen Krankheiten, in denen die Verdauungswege nicht vorzüglich afficirt waren.

Infusum Rhei amarum, Decoctum amaro-aromaticum laxativum, Potio tonica. (*Au. B. Va.*)

℞. Decocti amari . libram unam.
Infusi Rhei . . uncias quatuor.
Aquae Menthae pip. unc. unam.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Rhei . . . . . drachmas tres.
Cort. Aurant. . semidrachmam.
Aquae Menthae pip. unc. quatuor.
In colatura dissolve
Extr. Centaurii min. drach. duas.
Den Tag über zu nehmen. (*Au.*)

Va. loco extr. cent. min. Extracti Gentianae drachmam unam, caet. ut *Au.*

Haustus incitans resolvens, Potio excitans et resolvens. (*B.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Decocti Chinae . · uncias octo.
Infunde et adde colaturae
Camphorae c. Mucilag. G. Arab. tritae . . . semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Cort Aurant. unc. unam.
Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden.

Infusio laxativa sedans, Potio laxans et sedans. (*B.*)

℞. Infusi Rhei . . . . uncias sex.
Syr. Acet. Morphinae unc. unam.
Auf zwei Mal zu nehmen, bei reizbaren Subjecten.

℞. Infusi Rhei . . . uncias sex.
Aquae Menthae pip. unciam unam.
Liquoris Hoffm. scrupulum unum.
Auf vier Mal zu nehmen.

Potio resolvens et laxans. (*B.*)

℞. Infusi Rhei . . . uncias octo.
Subcarb. Potassae . drach. tres.
Syrupi Cichorii comp. unc. unam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Decoctum Rhabarbari, Tinctura aquosa s. Anima Rhabarbari. (His. His3.)

℞. Rhei contusi . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque leviter et cola. — Auf einmal zu nehmen.

Syrupus Rhei s. Rhei palmati s. de Rheo s. de Rhabarbaro. (Am. An. B. Ba. Bel. Fenn. Hass. Lus. Suec. *C. Sw. Vm.*)

℞. Infusi Rhei . . partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Fiat syrupus. (Fenn. Hass. Lus. Suec.)

℞. Rhei minutim concisi part. unam.
Aquae bullientis partes duodecim.
Infunde per horas 12 calore 30 ad 40° et parti 1 colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duas.
Fiat syrupus (Am. Ba *C.*)

℞. Rhei concisi . . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Infunde et infusionem in Aquae aequali quantitate repete; colaturis tunc commixtis adde
Sacchari albi partes quatuordecim.
Albumnis ope clarificata ad syrupi consist. coque. (*Sw. Vm.*)

℞. Rhei concisi . . uncias octo.
Aquae . . . . libras quatuor.
Infunde per horas 24, cola et colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Massae residuae adde
Aquae . . . . libras quatuor.
Infunde, calore sensim ad bullitionem usque aucto, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . libras quatuor.
Clarifica, ad consist. aptam consume et syrupum semirefrigeratum cum praecedente commisce. (An.)

℞. Rhei concisi . . . uncias tres.
Aquae bullientis . . libras duas.
Macera per horas 12, tunc leviter coque, cola exprimendo, filtra et subsidendo et decanthando depurato adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat leni calore syrupus. (B. Bel.)

Syrupus cum Rheo s. Rhabarbaro s. Rhei aromaticus. (Am. Gal. Pol. *C. Fi.*)

℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Aquae bullientis . . libras duas.
Digere per noctem: altero mane cola, unciis viginti colaturae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Pol.)

℞. Rhei pulverati drachmas decem.
Seminum Coriandri,
— Foeniculi, sing. semidrach.
Aquae unc. duodecim c. dimidia.
Immitte in lagenam ad collum usque replendam et in balneum aquae immergendam, quo facto per sexagesimas viginti, balneo tunc gradatim refrigerato, lagenam exime et post horas 24 liquido decanthato et colato adde
Sacchari albi unc. viginti quinque.
Solve in balneo aquae. (Gal.)

Fi. Aquae uncias quatuordecim, Sacchari libras duas, caeterum ut antea.

℞. Rhei . . . drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. . . semunciam.

Nuces moschatas . . . . no. 2.
Aquae . . . . octarium unum
Digere, ad dimidium consume et adde
Sacchari . . . . libram unam.
Alcoholis diluti octar. dimidium.
Coque parumper. (Am. C.)

Syrupus Cichorii et Rhabarbari s. Cichori cum Rhabarbaro s. de Rheo s. de Cichorio compositus. (A. Am. Ams. Br. Gal. Gen. Han. His. His3. LP. Pal. Pm. Sar. Wir. Wür. *Bo. Fi. Pid. Re. T.*)

℞. Herb. rec. Cichorii unc. quatuor.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque ad consumptionem partis tertiae usque, sub finem addendo
Rhei electi minutim concisi
uncias quatuor.
Cola exprimendo et adde colaturae
Sacchari albi . . libras quatuor.
Clarificata ad consist. syrupi coque. (His. His3.)

℞. Herb. et Rad. Cichorii rec.
uncias duas.
Aquae purae . . libras tres.
Decoque ad tertiae partis consumptionem et addo
Rhei concisi . . . uncias tres.
Digere per horas 12 et post levem coctionem cola; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat coquendo syrupus. (Ams.)

℞. Succi Cichorii depurati libras duas
Rhei electi concisi . uncias duas.
Digere per noctem inter cineres calidos; altero mane exprime; residuum digere iterum cum
Aquae bullientis . libris duabus.
Post brevem coctionem cola exprimendo; liquoribus commixtis adde
Syrupi communis . . libras tres.
Fiat syrupus. (*Sa.*)

℞. Radicis Cichorii . . uncias sex.
Fol. Cichorii . . uncias novem.
— Fumariae,
— Scolopendrii, sing. unc. tres.
Baccarum Alkekengi uncias duas.
Aquae comm. libras quatuordecim.
Decoque ad 12 librarum liquidi remanentiam, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . libras quinque.
Clarifica et leni igne ad syrupi spissi consist. consume. Praeterea recipe
Rhei contusi . . . uncias sex.
Santali citrini,
Cinnamomi, sing. . semunciam.
Aquae communis . libras octo.
Infunde per horas 24 in vase clauso et cola levi cum expressione. Liquor cum syrupo antea praeparato commixtus semel ebulliat, tunc syrupum adhuc calidum nodulo immitte continenti
Cinnamomi,
Santali citrini, sing. semunciam.
Post horas sex infusionis decantha. (Gal.)

Bosson coquere suadet Folia et Herbas per horae quadrantem, tunc per horas duas infundere in Aquae libris decem, colare, decanthare et cum Sacchari libris quinque syrupum ad 25° coctum parare: praeterea parare infusionem cum Rheo, Aromatibus, Aquae libris tribus et Subcarbonatis Potassae drachmis duabus, absque expressione colare, liquorem cum syrupo commiscere, denuo si requiritur coquere et mixturam bullientem Santalo et Cinnamomo immittere. (GalF.)

℞. Rad. Cichorii.
— Taraxaci, sing. unc. quatuor.
Aquae fontanae . . . . . q s. ut coctione librae tres obtineantur; tunc recipe
Rhei concisi . . . uncias sex.
Aquae bullientis . . libras tres.
Macera per horas 24, exprime, colaturam cum decocto praecedente commisce et totum coque cum
Sacchari albi . . . . libris sex.
Syrupum bullientem immitte
Ligni Santali citrini,
Cinnamomi, sing . . semunciae.
Post refrigerationem exprime et per pannum cola. (Gen.)

LP. Rhei contusi uncias sex infunde in Aquae ferv. libris tribus, digere per horas 12, cola et residuo eandem adde Aquae ferv. quantitatem, digere per idem temporis spatium, cola et sume Radicis Cichorii aut Taraxaci libram unam, coque in Aquae libris quatuor, colaturae adhuc bullienti adde residua rhei, coque paululum, cola et adde secundam tincturam et tunc Sacchari libras sex, clarifica liquorem et ad syrupi consist. vapora etc.

℞. Radicis Rusci,
— Asparagi, sing. uncias tres.
Fol. Cichorii,
— Pimpinellae,
— Capilli Veneris,
— Agrimoniae,
— Cerefolii, sing. manip. unum.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque et sub finem in decocto infunde
Sennae mundatae . uncias tres.
Rhei contusi . . unciam unam.
Radicis Turbith,
Hermodactylor., sing. drach. sex.
Flor. Calendulae,
— Tamarisci,

Flor. Sambuci, sing. manip. dimid.
Cola et adde
Sacchari albi . . . sesquilibram.
Fiat syrupus. (*B.*)

℞. Herbae Cichorii . unciam unam.
Radicis Cichorii . . uncias tres.
Rhei . . . . uncias quatuor.
Subcarb. Potassae semidrachmam.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque ad librarum sex liquidi remanentiam; exprimendo fortissime cola et colaturae adde
Sacchari albi . . . . libras sex.
Clarifica et coquendo ad consist. syrupi consume. (A. *Fi. T.*)

℞. Rad. Cichorii unc. duas c. dimid.
Aquae fontanae . sesquilibram.
Coque ad librae unius liquidi remanentiam et adde
Rhabarb. minutim concis. unciam unam.
Subcarb. Potassae grana viginti.
Coque lente et cola leviter exprimendo; adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Clarifica, cola et adde
Aq. Cinnamomi spirit. unc. unam.
Misce bene. (Br. Han. Pal. Wir.)

℞. Radicis Cichorii . . uncias tres.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coque ad tertiae partis remanentiam et adde
Rhei minutim concisi unc. duas.
Subcarb. Potassae semidrachmam
Stent in digestione per horas aliquot in loco calido, tunc semel vel bis ebulliant et cum expressione colentur; colaturae adde
Sacchari clarif. unc. triginta duas.
Cola syrupum. (Wiir.)

Pm. Cort. Radic. Cichorii, Rhei, sing. uncias quatuor, Subcarb. Potassae semidrachmam, Aquae comm. libras octo, decoque radicem per horae quadrantem, cola cum expressione et una colaturae adhuc tepentis parte rheum et subcarbonatem per trihorium, infunde, cola et exprime, altera parte infusionem Rhei et colaturam repete, in colaturis commixtis dissolve Sacchari albi libras sex, clarifica et in syrupum redige; — *Pid.* eandem praebens formulam addit Aquae Cinnamomi spirituosae uncias duas.

Sp. Radicis Cichorii uncias duas cum dimidia, Aquae uncias octodecim, coquendo ad duodecim redigendas, Rhei unciam unam, Subcarbonatis scrupulum unum et Sacchari uncias viginti duas.

Tinctura Rhei s. Rhabarbari s. Rhei etc. aquosa, Anima Rhei, Infusum Rhei s. Rhei alcalinum s. alcalisatum s. aquosum s. cum Subcarbonate Potassae, Tinctura aquosa Rhei alcalina. (A. Ams. An. B*. Ba. Bor. Bor4. Br. D. DD. Ful. Han. HassP. Li. O. Pal. RC. Sax. Wir. *Fi. Gr. Sw. T. Vm.*)

℞. Infusi Rhei simpl. partes undecim.
Subcarb. Potassae partem unam.
Dissolve. (Ba.)

℞. Rhei concisi . . . partes tres.
Aquae comm. partes quinquaginta.
Calefac, donec liquor bullire incipit, tunc ab igne remoto adde
Subcarb. Potassae partem unam.
Post refrigerationem cola. (*Vm.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Subcarb. Potassae drachm. unam.
Aquae purae . . . uncias sex.
Infunde calore gradatim aucto per horas duas, ita ut liquor semel ebulliat, cola, sepone et decantha.

D. Rhei unciam unam, Subcarbonatis drachmas duas et Aquae bull. uncias decem, ebulliant semel; — Ful. Rhei unciam, Subcarbonatis scrupulos quatuor, Aquae uncias octo et horas 24 digestionis; — A. *Gr.* Rhei partes tres, Carbonatis Potassae unam, Aquae bullientis quadraginta octo; — *T.* Rhei unciam unam, Aquae bull. octo, Salis Tartari drachmam, et digestionem inter cineres calidos per horas 24.

℞. Rhei . . . . drachmas duas.
Subcarb. Potassae semidrachmam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae unciae quatuor obtineantur. Liquori, postquam semel ebulliverit, adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Rhei . . . . . partes duas.
Aquae bullientis partes sedecim.
Post horas duas digestionis cola leviter exprimendo et adde
Subcarb. Potassae . part. dimid.
Alcoholis . . . partem unam.
Misce bene. (Li.)

RC. Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis Potassae sesquidrachmam, Aquae ferv. libram, macerationem per horas 12 et colaturae unciarum decem addere Alcoholis diluti unciam unam; — *Sw.* Rhei unciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae bull. uncias duodecim, horas 24 macerationis et Alcoholis Cinnamomi uncias quatuor; — Ams. Rhei unciam unam, Aquae bull. sex, sex horas digestionis, Aquae Cinnamomi uncias quatuor et Subcarbonatis drachmas duas; — B*. Bor. Han. O. et Sax. Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae uncias duodecim, horas 12 macerationis

nis et Aquae Cinnamomi vin. uncias duas; — Bor4. Aquae fervidae uncias octodecim, liquorem refrigeratum colare et colaturae decanthatae unciis decem admiscere, Aquae Cinnamomi vinosae uncias duas; — HassP. Aquae bull. uncias quindecim, caeterum ut Bor. etc.; — *Fi.* Rhei sesquiunciam, Subcarbonatis drachmas tres, Aquae libram, digestionem per horas 24 et Tincturae Cinnamomi uncias duas; — DD. Rhei semunciam, Subcarb. drach. unam, Aquae bull. uncias quatuor, horas 12 digestionis et Aquae Foeniculi unciam; — Wir. Rhei unciam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii, Aquae Cinnamomi cum Buglosso, sing. uncias sex, et horas 24 digestionis; — Pal Rhei unciam, Subcarbonatis drachmas duas, Aquae Cichorii uncias sedecim et horas 24 digestionis; — Br. Rhei unciam, Subcarbonatis sesquidrachmam, Aquae purae uncias tres et Aquae Cinnamomi tantidem.

Tonisch, auch absorbirend und gegen Gelbsucht, Hypochondrie und Säure in den ersten Wegen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine Unze, zwei oder drei Mal täglich.

Infusum Rhei salinum s. boraxatum, Tinctura aquosa Rhei salina. (B*. GalF. Hass. Pol. Wür. *Ca. Gr. Pid. Sp.*)

℞. Rhei contusi . . unciam unam
Aquae destillatae uncias novem.
Acetatis Potassae drachmam unam.
Post horas 24 infusionis filtra. (*Ca.*)

℞. Aceti . . . . . uncias novem.
Subcarbonatis Potassae . . q. s ad saturandum acidum. In solutione digere per horas duodecim
Rhei concisi . . unciam unam.
Filtra. (*Sp.*)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Tartari tartarisati drachmas duas.
Aquae bullientis . . semilibram.
Stent in digestione per horas 24 et filtrentur. (*Pid.*)

Wür eandem formulam, addendo Coccionellae semiscrupulum; — Hass. Tartarum tartarisatum vel boraxatum recipere pro arbitrio.

℞. Rhei . . . . . sesquiunciam.
Boracis pulverati drachmas duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Macera per horas 12 et colaturae unciis decem adde
Aquae Cinnamomi vinos.
uncias duas.
Misce. (B*. GalF. Pol. *Gr.*)
Gabe, ein oder zwei Löffel, drei oder vier Mal täglich.

Decoctum aperiens. (Br.)

℞. Rad. Rhei,
— Rubiae, sing. drachmas tres.
Subcarb. Potassae drachm. duas.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque per horam unam, cola et adde
Decocti Zingiberis . uncias tres.

Elixir viscerale Rosensteinii. (B*. *Re.*)

℞. Rhei concisi . . . uncias octo.
Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Aquae Cinnamomi
uncias quadraginta octo.
Stent in digestione per dies quatuordecim loco frigido et in lagena bene obturata, sub hujus postremae frequenti agitatione; adde deinde
Cort. rec. Aurant. . uncias duas.
Cardamomi minoris,
Sem Foeniculi, sing. semunciam.
Digere, saepius agitando, per dies septem et exprime; residuo infunde
Decocti Rad. Cichorii uncias sex.
Agita, cola exprimendo, commisce colaturam cum priore et in mixtura solve
Sacchari uncias viginti quatuor.
Tonisch, stärkend — Gabe, ein halber bis ganzer Löffel. (B*.)

Re. Cortic. Aurant. ab albedine liberati semunciam, Rhei opt. scrup. sedecim, Acetat. Potassae unciam unam, Vini Gall. alb. uncias septem, digere blando calore per dies quatuor, cola et adde Extr. Gentian. semunciam, Ol. Chamom II. et Millefol., sing. guttas decem.

Syrupus Rhei alcalisatus. (Bor. Bor4. D. Fer. Ful. Han. HassP. Li. O. R. Wir. *Siv.*)

℞. Tinct. aq. Rhei alcal. libr. unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Coque ad consistentiam syrupi. (Ful.)
Li. Tincturae aquosae alcalinae uncias decem et Sacchari uncias sedecim.

℞. Rhei . . . . uncias quatuor.
Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Coque blando igne, cola exprimendo et adde pro unciis viginti colaturae
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (D.)

℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Digere per horas 12 et pro unciis viginti colaturae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (O.)

R. Rhei uncias duas, Salis sesqui-

drachmam, Aquae uncias octodecim et Sacchari libras duas.

℞. Rhei . . . . . uncias tres.
Cinnamomi . . . drachmas tres
Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.

Digere per horas duodecim, cola et colaturae uncarum viginti adde

Sacchari albi . . . libras tres.

Fiat syrupus. (*Sw.*)

Bor. Bor4. et Han. Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae) drachmas sex; — HassP. Rhei sesquiunciam, Cassiae cinnamom. drachmas tres, Salis Tartari unam, Aquae fervidae uncias tredecim, digestionem per noctem et liquoris expressi unciis decem addere Sacchari albi uncias octodecim.

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Subcarb. Potassae . drach. unam.
Succi bullientis Cichorii libras tres.

Post horas duodecim macerationis cola exprimendo et colaturae adde

Sacchari . . . . . libras duas.

Liqua. (Per.)

℞. Rhei,
Fol. Sennae, sing. sesquiunciam.
Cinnamomi . . sesquidrachmam.
Salis Tartari . . scrupulos duos.
Zingiberis . . . semidrachmam.
Aquae Cichorii . uncias decem.
— Rosarum . uncias quatuor.

Digere per tres dies, loco calido, tunc ebulliant semel; exprime, Albuminis ope clarifica et colaturae unciis novem adde

Sacchari albi . uncias sedecim.

Fiat syrupus. (Wir.)

Potio cum Manna et Rheo s. Mannae composita s. purgans. (GalM. *Ra. Va.* Hosp. Char.)

℞. Rhei . . . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Coque per aliquot sexagesimas, tunc in colatura dissolve

Mannae . . . . uncias duas.

(GalM. *Ra. Va.*)

Va Hosp. Infant. Mannae unciam unam, caetereum ut antea.

℞. Rhei,
Subcarb. Potassae, sing. drach. unam.
Decocti Parietariae . . . q. s.

Coque et in colaturae uncia una dissolve

Mannae . . . . . uncias duas.

Cola et adde

Syrupi Rhei comp. unciam unam

Potio purgans et tonica. (*Pie.*)

℞. Mirobalanor. citrin. drach. duas.
Ras. Santali citrini drach. unam.
Rhei contusi . semidrachmam.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis quantum sufficit.

Colaturae adde

Confect. hyacinth. drach. unam.

Mixtura carminativa. (*Sm.*)

℞. Tinct. Rhei aquos. . uncias sex.
Liquoris anod. min. drach. unam.

Gabe, ein Löffel drei oder vier Mal täglich.

Tinctura aperiens. (Ham.)

℞. Infusi Rhei aquosi,
Liquor. Terrae fol. Tart., sing. semunciam.
Vini Antimonii Huxh. drach. unam.

B. Auszug durch Wein.

Tinctura Rhei s. Rhabarbari vinosa, Vinum Rhabarbari s. Rhei s. Rhei palmati s. Rhei palmati aromaticum s. compositum, Elixir Rhei dulce s. compositum. (Am. Au. B. Bel. Ed. Fenn. Gen. Lus. O. Pm. Suec. *C. Ca. Gr. Re. Vm.*)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cinnammomi drachmam unam.
Vini albi . . . . sesquilibram.

Macera per octo dies et cola. (Lus.)

℞. Rhei . . . . . partes octo.
Anisi stellati . . partem unam.
Vini Malacensis part. nonaginta sex.

Digere frigide per octo dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi min. . drach. unam.
Alcoholis (25°) . . uncias duas.
Vini albi Hispanici libram unam.

Post octo dies macerationis cola. (Bel.)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi min. drachmas duas.
Vini Hispanici . libram unam.

Digere per dies quatuor et cola exprimendo. (Fenn. Suec.)

℞. Rhei,
Alcoholis (0,985), sing. unc. duas.
Canellae albae drachmam unam.
Vini albi Hisp. uncias quindecim.

Post dies septem filtra. (Am. B. Ed. *C. Ca. Re.*)

Ams. eandem formulam sed Alcoholem 0,931; — *Gr.* Rhei drachmas duas.

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cort. Aurant. mund. semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.
Alcoholis . . . . uncias duas.

Post aliquot dies macerationis cola. (B*. O.)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Croci . . . drachmam unam.
Vini Hispanici . . uncias octo.
Digere per dies sex, cola et residuo infunde
Vini Hispanici . uncias quatuor.
Post horas 24 digestionis cola et colaturas commisce. (An.)

Gen. *Gr.* Rhei uncias duas, Cardamomi semunciam, Croci drachmas duas et Vini Hisp. libras duas; — *Gr.* praetera: Rhei uncias duas cum dimidia, caetera ut antea et Alcoholis drachmas novem; — Pm. Rhei uncias duas cum dimidia, Cardamomi semunciam, Croci drachmas duas, Vini Malacensis libras duas, Alcoholis 18° uncias octo, digestionem per decem dies.

Reizend, gelind abführend, besonders bei Hypochondrie, Hysterie, Scrofeln und Drüsenverstopfung gerühmt. — Gabe, ein bis zwei Löffel für Erwachsene, dreißig bis sechszig Tropfen für Kinder.

Vinum Rhei s. Rhabarbari amarum, Elixir Rhei amarum. (D. Fenn. Suec. *Vm.*)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Radicis Gentianae drachmas sex.
Cardamomi minoris semunciam.
Vini albi . . . . libras duas.
Digere blando calore et filtra. (D.)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Radicis Gentianae drachmas duas.
Canellae albae drachmam unam.
Vini Hispanici . libram unam.
Digere per tres dies et cola exprimendo. (Fenn. Suec.)

℞. Cinnamomi . . partem unam.
Vini Maderani part. nonagintа sex.
Infunde frigide per duos dies et adde
Rhei . . . . . partes octo.
Post octo dies adde
Radicis Gentianae partem unam.
Post aliquot dies cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Reizend, tonisch. — Gebrauch und Gabe, wie beim vorigen.

Tinctura Rhei vinosa s. Darelii s. dulcis. (B* Ba. Bor. Bor4. Br. Han. Hass. HassP. Pol. Sax. Suec. *Pie. Vm.*)

℞. Rhei . . . . . partes octo.
Cort. Aurant. amar. part. duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Radicis Inulae . partes quatuor.
Vini Maderani . . . partes 128.
Macera frigide per plures dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm*)

℞. Rhei concisi . . . uncias duas.
Cort. Aurant. mund. semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini Malacensis . . libras duas.
Digere, blando calore, per dies quatuor, cola exprimendo et adde
Extracti Inulae . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Serva. (Ba. Bor. Pol. Sax.)
Bor4. extractum Inulae omittit.

℞. Rhei pulverati . . uncias duas.
Passularum minorum unciam unam.
Cortic is Citri,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Cardamomi minoris drachmas duas.
Vini Hisp. (Portoensis) libras duas.
Post duos (tres HassP.) dies digestionis cola exprimendo et colaturae adde
Extracti Inulae . . semunciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Serva. (B*. Br. Han. Hass. HassP. *Pie.*)

℞. Rhei . . . . . sesquiunciam.
Cardamomi minoris semunciam.
Uvarum pass. emucl. uncias tres.
Vini Hispanici . . sesquilibram.
Macera per dies quatuor in loco calido, cola exprimendo et adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Extracti Inulae . . semunciam.
Macidis . . . sem drachmam.
Subcarb. Potassae drach. unam.
Serva (Suec.)

Eigenschaften und Gebrauch, wie bei der vorhergehenden Tinctur. Auch hat man sie gegen Würmer empfohlen, allein man nimmt dann statt des Weins gutes hydromel und setzt nach einer viertägigen Digestion statt des Alantextracts zu der Colatur zwei Unzen extractum tanaceti.

Vinum vermifugum s. Rhei. (LP.)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Cinae . . . . . drachmas sex.
Pulveris aromatici drachmas duas.
Vini albi generosi sesquilibram.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Macera per quatriduum, cola et filtra. — Stärkend, tonisch, Magenmittel, purgirend, wurmtreibend. — Gabe, ½ — 1½ Unze.

C. Auszug durch Alcohol.

Alcohol cum Rheo, Tinctura Rhei s. Rhabarbari alcoholica. (A. Ams. Br. *Fi. T.*)

℞. Rhei electi et concisi unc. unam.
Alcoholis . . . libram unam.
Macera per diem unum et filtra. (Br.)

Ams. Rhei partem unam, Alcoholis (0,907) octo et octo dies extractionis; — A. Rhei uncias duas et Alcoholis (0,910) libram; — T. Rhei uncias

quatuor, Alcoholis 25° B. libras tres et digestionem per sex vel octo dies; — *Fi.* Rhei uncias duas, Alcoholis 25° libram unam et digestionem per dies octo.

Reizend, purgirend, bei Diarrhöe, Colik, Krankheiten von Schwäche der Därme und Verſtopfungen der Unterleibseingeweide. Man giebt ſie mit einem paſſenden Vehikel. In chemiſcher Hinſicht dient ſie zur Prüfung auf Alcalien, wodurch ſie roth gefärbt wird.

Charta Rhabarbari (*Gr.*): Ex Infuso alcohol. (Rhei unc. unam, Spir. Vin. rect. unc. sex, digesta sec. artem et filtrata).

Tinctura Rhei s. Rhei palmati s. Rhabarbari spirituosa s. dulcis s. Rhabarbari s. Rhei alcoholica aromatica, Elixir Rhabarbari, Elixir dulce Rhei. (Am. Du. Ed. Ful. Hass. HassP. LH. Li. Lon. LonN. Lus. *C. Ca. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Rhei concisi . . partem unam.
Aquae Vitae,
— Menthae sing. . part. sex.
Digere frigide per plures dies, exprime leviter et filtra. (*Vm.*)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Aquae Vitae . . sesquilibram.
Post septem dies macerationis cola (Lus)

LH. Rhei uncias tres, Cardamomi minoris unam, Alcoholis 20° libras duas cum dimidia et digestionem per octiduum.

Am. Ed. *C. Ca. Gr.* et *Sw.* Rhei uncias tres (et Spir. tenuioris libras duas cum dimid. *Gr.*); — Ful. et Li. Rhei uncias duas, Cardamomi semunciam et Aquae Vitae uncias duodecim.

℞. Rhei . . . . . uncias duas
Cardamomi . . drachmas duas.
Aquae Cinnamomi spirit.
libr. unam.
Stent in infusione per tres dies (*T.*); — addendo Syrupi ponderis partem dimidiam, habes *Elixir dulce Rhei.*

℞. Rhei concisi . . . uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Croci . . . . drachmas duas.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Macera blando calore per dies quatuordecim et filtra. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Du. septem dies digestionis; — *Gr.* praeterea sec. Du. Glycyrrh. semunciam addit; — Lon. ante 1788. *Gr.* Rhei sesquiunciam, Cardam. min., Croci, sing. drachmas duas, Rad. Glycyrrh. unciam, Spir. tenuioris libram; — *Gr.* praeterea: Rhei libras duas, Card., Gran. Parad., sing. uncias sex, Croci tres, Spir. ten. congios tres; vel: Rhei libram, Glycyrrh. uncias sex, Zing. duas, Card. unam, Croci drachmas tres, Spir. rect. octarios quinque, Aquae tres; vel: Rhei comm. libras tres, Card. uncias decem, Croci sex, Spir. rect., Aq., sing. congios tres; vel: Rhei opt. libras tres, Card. uncias octo, Croci duas, Spir. rect. congios sex.

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Cardamomi minoris semunciam.
Spiritus Vini Gallici libras duas.
Digere per tres dies (septimanam HassP.), filtra et colaturae adde
Sacchari albi contusi unc. quatuor.
Stent in digestione ad sacchari solutionem usque. (Hass. HassP. *Pid.*)

Dieſe Formel giebt die *Tinctura Rhei spirituosa dulcis*, mit welcher Aehnlichkeit hat die

Tinctura Rhei composita. (Am. Lou. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Radicis Liquiritiae . semunciam.
— Zingiberis,
Croci, singulorum drachmas duas.
Alcoholis (0,930) octarium unum.
Aquae . . . . uncias duodecim.
Macera blando calore per dies quatuordecim et filtra.

Am. et *C.* digerere per dies decem Rhei uncias duas, Liquiritiae, Anisi, sing. unam et Sacchari duas in Aquae Vitae octariis duobus cum dimidio.

Reizmittel, welches man beſonders als blähungtreibend, und um die Verdauungsfunction zu bethätigen empfohlen hat. — Gabe, eine halbe bis eine Unze in einem ſchicklichen Vehikel.

Bates's tincture of rhubarb (*Gr.*): Rhei, Glycyrrh., sing. unc. duas, Uvar. pass. enucleat. no. 40, Sem. Anis. unciam, Sacch. candi sex, Spir. rect. libras duas.

Tinctura Rhei amara s. Rhabarbari composita s. Rhei et Gentianae. (Am. Br. Ed. Ham. Han. RC. Wir. *C. Gr. Re. Vm.*)

℞. Rhei concisi . . . uncias duas.
Gentianae . . . . semunciam.
Alcoholis (0,935) libr. duas c. dim.
Post septem dies digestionis filtra. (Am. Ed. *C. Gr. Re.*)

℞. Rhei palmati . . unciam unam.
Gentianae . . drachmas duas.
Zingiberis . . drachmam unam.
Alcoholis diluti uncias quindecim.
Digere per septimanam et per chartam cola. (RC.)

℞. Tinct. Rhei . . . sesquilibram.
— Gentianae comp. semilibram.
Misce. (Lus.)

℞. Rhei . . . . . uncias duas.
Gentianae . . . unciam unam.
Corticis Aurantiorum semunciam.
Alcoholis . . . . libras duas.
Digere per horas 48 et filtra. (Ham.)

℞. Rhei . . . . . partes octo.
Gentianae part. unam c. dimidia.
Serpentariae Virgin. partem unam.
Aquae Vitae part. quadraginta octo.
Infunde frigide per plures dies, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Br. Digerere per tres dies Rhei unciam, Gentianae sesquidrachmam, Serpentariae drachmam et Coccionellae scrupulum in Aquae Vitae libra una.

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Gentianae . . sesquidrachmam.
Serpentariae Virg. drach. unam.
Aquae Vitae,
Vini albi, singulorum semilibram.
Digere et filtra. (Han. Wir.)

℞. Rhei . . . . . unciam unam.
Radicis Gentianae drachmas tres.
Corticis Winteri drachmam unam.
Aquae Vitae . uncias sedecim.
Infunde frigide per plures dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Reizend, ehedem bei galligen Krankheiten, Fiebern und Ruhr empfohlen. — Gabe, funfzig bis achtzig Tropfen.

LP. *Tincturam Rhei* indicat: Rhei uncias duas, Rasurae Quassiae semunciam, Pulveris aromatici drachmas tres, Spiritus Vini libras duas, maceration nem per dies sex etc. — Gabe, ½ bis 1 Unze und mehr.

Rhododendrum.

Rhododendrum chrysanthum, L.; Sibiriſche Schneerose; Rosage à fleurs blanches (*Gal.*); Yellow flowered rhododendron (*Ang.*); Roze sybirgyskie (*Pol.*).

Bor. Bor4. Ed Fer. Han. HassP Pol. R. RC. Sax. Wir. Würt. *C. M. Fl. Gr. Re.*

Ein Halbſtrauch (Decandria Monogynia, L.; Rhodoraceae, J.), welcher auf den Alpen und in Sibirien wächſt. (*Pall.* Fl. Ross I. t. 30.)

Man wendet die Stängel und Blätter (Stipites et folia Rhododendri chrysanthi) an; die Zweige ſind gänſefederdick, lang, bräunlich, die Blätter länglich, oben rauh, unten glatt und kurzgeſtielt.

Reizend, narkotiſch, ſchweiß- und harntreibend.

Rhododendrum maximum (*C.*) bei chroniſchen Rheumatismen.

Conserva Rhododendri chrysanthi. (*Sw.*)

℞. Fol. rec. Rhododendri chrys. part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere ut fiat pasta homogenea.

Pulvis antiarthriticus. (*Ca.*)

℞. Pulv. Liquiritiae drachmas duas.
— Rhododend. chrys. gr. decem.
Misce; fiant doses decem. — Man giebt Morgens und Abends ein Pulver und ſteigt damit täglich, bis ein reichlicher Schweiß ausbricht.

Infusum Rhododendri chrysanthi. (B*. *Au.*)

℞. Fol. Rhodod. chrys. drach. duas ad semunciam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Digere in vase tecto per horas 24 et cola. (B*.)

℞. Fol. Rhodod. chrys. semunciam.
Aquae bullientis . uncias octo.
Infunde et colaturae adde
Tincturae aromat. drachmas duas.
Misce. (*Au.*)

Von Koelpin bei chroniſchem Rheumatismus empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme, zwei oder drei Mal täglich.

Decoctum Rhododendri chrysanthi. (RC.)

℞. Herb. Rhodod. chrys. sicc. drach. duas.
Aquae fervidae . libram unam.
Digere leni calore per horas 12 et cola. — Gabe, zwei Unzen alle zwei Stunden.

Tinctura Rhododendri chrysanthi. (B*.)

℞. Fol. Rhodod. chrys. unc. duas.
Spiritus Vini Gallici,
Vini Hispanici, sing. semilibram.
Digere per dies quatuordecim. — Reizend, etwas narkotiſch und für harntreibend gehalten. — Gabe, fünf Löffel in einem Aufguß des Rückſtands der Tinctur mit Einem Pfund Waſſer.

Rhus.

Von dieſer Pflanzengattung werden beſonders in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Rhus Cotinus, L.*; Perückenſumach, Venusſumach; Fustet (*Gal.*); Coccigria (*Ang.*).

A. Fer. *Gr.*

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Terebinthaceae, J.) des ſüdlichen Europa's (*Jacq.* Fl. Austr. t. 210.)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (Cortex Cotini) iſt außen glatt und weißlich. — Die Blätter ſind verkehrt eirund, ganz, und auf beiden Seiten glatt. Sie haben einen ſtyptiſchen, balſamiſchen und harzigen Geſchmack.

Adſtringirend, toniſch.

2) *Rhus Coriaria, L.*; Sumach, Gärberbaum; Sumac des corroyeurs (*Gal.*); Coriar's sumach (*Ang.*); Tumtum tum (*Ar.*); Zumague (*His.*); Sumack (*Bel.*); Sommaco (*I.*); Sumak (*Pe.*); Sumagro (*Lus.*).

Br. Fer. Gal His. His3. Wir. Wür. *A. Be. Br. G. Gr M. Re. Sp.*

Ein großer Strauch des ſüdlichen Europa's. (*Blackw.* t. 486. *Plenck* t. 232. *Zorn* Ic. pl. t. 510.)

Man wendet die Blätter und die Früchte an.

Die Blätter (folia Sumac) ſind gefiedert und beſtehen aus funfzehen bis ſiebenzehen eirunden, ſitzenden, oben behaarten, am Rande ſtumpf gezähnten Blättern von einem ſehr adſtringirenden Geſchmack. — Die Beeren ſind ſchön roth, von der Größe einer Linſe und von adſtringirendem, ſaurem Geſchmack.

Ein wenig gebrauchtes adſtringirendes Mittel.

3) *Rhus Toxicodendrum et radicans, L.*; Giftbaum, Giftſumach, Wurzelſumach; Sumac vénéneux (*Gal.*); Common upright sumach, Poison oak (*Ang.*); Vergiftboom (*Bel.*); Sommaco radicante (*I.*).

Am. An. Ba. Bel. Ed. Fer. Gal. HassP. Lon. Sax. *Br. C. Fi. G. Gr. Par. Re. Va.*

Ein Bäumchen Nordamerica's. (*Hayne* IX. 1. *Plenck.* t. 235. 236. *Schk.* t. 82. *Bigel.* Am. Med. Bot. III. t. 42 Düss. off. Pfl. III. t. 19. 20. *Dill.* Elth 389. t. 291. fig 375. *Bert.* Bild. III. 97 f. 1.)

Man wendet die Blätter (folia Toxicodendri s. Rhois s. Rhoris Toxicodendri s. radicantis) an; ſie ſind dreizählig, die Blättchen geſtielt, eckig gezähnt oder ganz und filzig. Sie haben eine ſolche Schärfe, daß die bloße Berührung und ſelbſt, wie man ſagt, die Ausdünſtungen die Haut heftig reizen.

Reizend, giftig, bei Flechten und Lähmung empfohlen.

Außer dieſen führt *Gr.* nach Rh. glabrum, — Rinde fieberwidrig; R. Virginianum, typhinum, — Beeren adſtringirend, bei Ausflüſſen verſchiedener Art, Saft des Stängels blaſenziehend, Rh. metopium und Javanicum, welche Harz liefern, Rh. striatum, Vernix ꝛc. an.

Succus Toxicodendri. (*T.*) Ut succus cichorii paratur.

Extractum Rhois radicantis et Toxicodendri. (An. B*. Bel. Gal. Han. HassP. Sax. *Fi. Sw*. T. Vm.*)

℞. Fol. rec. Rhois Toxicod. q. vis.
Contunde in mortario marmoreo, Aquae pauxillum adspergendo, et exprime succum, qui statim, sub finem continue, spathulae ligneae ope agitatus evaporet. (B*. Gal. Han. *Fi.*)

HassP. *T.* Faeculam antea a succo separatam post hujus evaporationem ad syrupi spissitudinem addere et totum in balneo aquae ad massae pilularis mollioris consist. redigere; — *T.* cum Succo ad mellis et tunc ad pilularum consist. evaporato commiscere Pulveris Foliorum q. s.

℞ Fol. rec. Rhois Toxicod q. vis.
Contunde celeriter in mortario marmoreo, Aquae dimidium pondus addendo, cola succum exprimendo, sepone per temporis momentum, decantha supra cribrum setaceum et continue agitando ad extracti consist. inspissa. (*Vm.*)

℞. Fol. rec. Rhois Toxicodendri,
Aquae frigidae, sing. part. unam.
Macera per horas duodecim et adde
Aquae bullientis . . . duplum pondus totius massae; post refrigerationem cola, Albuminis ope clarifica, igni impone et liquorem, simulac spissescere coepit, per pannum trajice, qui tunc continue agitatus sufficienter evaporet. (An. *Vm.*)

℞. Fol. Rhois Toxicod. libras duas.
Aquae bullientis . libras decem
Digere in vase tecto per horas 24, tunc per unam coque; post refrigerationem decantha, exprime deinde folia, liquores commisce et sepositione depuratos ad aptam spissitudinem consume. (Bel.)

Sw.* coquere binis vicibus sequentibus Foliorum sicc. partem unam in Aquae decem, per cribrum setaceum trajicere et colaturam consumere; — Sax. coquere Foliorum sicc. partem unam in Aquae triginta ad quindecim remanentiam, per cribrum trajicere et colaturam inspissare.

T. praeterea succum filtratum in laminas fictiles lineae crassitiem effusum, vaporis vel solis ope siccare jubet.

Gabe, eine halbe Drachme vier Mal täglich bis auf ſechs Drachmen und ſelbſt eine Unze geſtiegen, in Zuckerwaſſer. Man hat es bis zu mehreren Unzen täglich gegeben.

Mixtura Extracti Rhois radicantis, Potio excitans. (*B. Va.*)

℞. Extr. Rhois radic. drachmam unam.
Aquae . . . . unciam unam

Digitized by Google

Gabe, zehen Tropfen, allmälig bis auf einen Kaffeelöffel gestiegen, täglich zwei Mal, bei Lähmung der Extremitäten.

Pilulae Toxicodendri. (Fer. *Bs. Sw. Va. Vm.*)

℞. Chlorureti Barii partem unam.
Extr. Rhois Toxicodend. partes sex.
Fol. Rhois Toxicod. pulv. . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. — Gabe, drei Stück zwei oder drei Mal täglich, bei Flechten. (*Sw. Vm.*)

℞. Fol. Rhois Toxicod. . gr. unum.
Pulv. Liquiritiae scrupul. unum.
Roob Sambuci quantum sufficit
Fiant pilulae quatuor. — Den Tag über zu nehmen, bei Lähmungen nach Schlagfluß. (Fer. *B. Va.*)

Tinctura Rhois radicantis. (Sax. *Huf.*)

℞. Succi Rhois rad. rec. expr.,
Alcoholis concent., sing.
part unam.
Infunde frigide per plures dies et filtra. (Sax.)

Huf. Foliorum Rhois uncias duas, Alcoholis libras et tres dies infusionis.

Ribes.

Man findet von dieser Pflanzengattung besonders folgende Arten angezeigt:

1) *Ribes nigrum, L.*; schwarze Johannisbeere, Gichtbeere, Cassis, Groseillier noir (*Gal.*); Common black currant (*Ang.*); Rybes neb wjno, Jana cerne (*B.*); Saellaer (*D.*); Swarte winbaer (*Suec.*).

Ams. B. Bel. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Hass. Li. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Grossularieae, *J.*) aus dem Norden beider Continente. (*Blackw.* t. 285. *Plenck* t. 147. *Hayne* III. 26. *Zorn* Ic. pl. I. 305.)

Die Früchte (baccae Ribium nigrorum), welche man anwendet, sind kugelige, schwarze Trauben bildende Beeren und mehr gewürzhaft als sauer.

2) *Ribes rubrum, L.*; rothe Johannisbeere; Groseillier rouge (*Gal.*); Red currant (*Ang.*); Rybes, Neb wjno sjana cerwene (*B.*); Raede ribs (*D.*); Agracejo encarnada (*His.*); Rothe aalbezie (*Bel.*); Uva de' prati (*I.*); Porzeczkie (*Pol.*); Smorodina krasnaja (*Lus.*); Raeda winbaer (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 25. *Blackw.* t. 285. *Plenck* t. 146. Düss. off. Pfl. II. t. 11. Fl. méd. IV. 189. *Bert.* Bild. V. 78 f. 1.)

Man wendet die Früchte (baccae Ribesiorum s. Ribium rubrorum) an; es sind kleine, kugelige, sehr saftige Beeren, von rother oder gelblichweißer Farbe, ohne Geruch und säuerlichen und zuckerartigen Geschmacks, welche Trauben bilden.

3) *Ribes Grossularia et Uva crispa, L.*; Stachelbeere; Groseillier à maquereau (*Gal.*); Gooseberry (*Ang.*); Stikkebbaer (*D.*); Grossellero (*His.*); Kruisbezie (*Bel.*); Grispignolo (*I.*); Agrest (*Pol.*); Groselheira espin, Uva espim (*Lus.*); Steckelbaer (*Suec.*)

Fer. Gal. His. His3 LP. *Be. Br. G. Gr.*

Ein Strauch des nördlichen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 277. *Bert.* Bild. V. 78. f. 2.)

Die Früchte, welche man anwendet, sind kugelige oder eiförmige, grünliche oder röthliche Beeren von der Größe einer Haselnuß, vor der Reife von saurem und adstringirendem, dann fadem und zuckerartigem Geschmack.

Conserva Foliorum Ribium nigrorum. (*Vm.*)

℞. Fol. Ribium nigr. in pulpam tenellam redact. . part. unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere et calefac in balneo aquae in vase clauso, donec saccharum solutum sit.

Succus Ribesiorum nigrorum. (Ful. *F.*)

℞. Bacc. Ribium nigr. matur. q. v's.
Contunde in mortario lapideo vel inter manus tere, massam per aliquot dies in cavam sepone, exprime fortiter, succum sepone, per pannum cola et in lagenis longicollibus serva.

Roob s. Gelatina Ribesiorum nigrorum. (Ams. B. Bel. Li. R. Sax. *Re. Sw.*)

℞. Bacc. Ribium nigr. bene matur. q vis.
Coque cum Aquae pauxillo in vase stanneo obtecto, continue agitando, donec baccae rumpantur; cola per cribrum, residuum fortiter exprime et singulis libris succi semilibram Sacchari addendo, ad aptam consist. consume, bene despumando. (Ams.)

B. et Bel. Sacchari partes quatuor pro decem Succi; — Sax. Sacchari unam, Succi octo; — R. sex Succi; — Li. et *Sw.* quatuor Succi. — *Re.* ut gelatina pomorum.

Bei Bräune gerühmt. — Man setzt es zu Gurgelwässern.

Syrupus Ribis nigri s. Ribesiae nigrae s. Ribium nigrorum. (Fenn. Suec. *C. Sw**)

℞. Succi Ribium nigr. depur. libr. unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat leni calore syrupus. (Fenn. Suec.)

C. Succi octarium unum et libras duas Sacchari.

℞. Residui Succi expr. Ribium nigr. q. vis.
Aquae bullientis pondus aequale cum parte dimidia.
Post horas 24 digestionis liquori adde
Sacchari albi . partes aequales.
Clarifica et ad syrupi consist. coque. (*Sw**.)

Spiritus Ribium nigrorum. (*Vm*)

℞. Bacc. Ribium nigr. partes duas.
Contere Aqua tepida submersas, fermentationi subjice et tunc adde
Fol. rec. Ribis nigri part. quartam.
Aquae Vitae part. unam c. dimid.
— communis partes duodecim.
Destillando tres partes abstrahe.

Succus Grossulariae vel Ribium. (Ful. Gal. Hass. His. His3. Sar. Sax. *Pid. Vm.*)

℞. Bacc. Ribium enucl. . . q. vis.
Inter manus contritas in cavam sepone, donec liquor clarus supernatet, succum expressum per aliquot dies adhuc ad locum frigidum sepone et colaturam in lagenis longicollibus a strato olei obtectam serva. (Ful. Gal. His. His. His3. Sar. Sax. *T.*)

℞. Ribium rubrorum . quantum vis.
In pelvi cuprea contritas baccas per cribrum traj'ce, succum sepositione depuratum per pannum cola, colaturae adde Sacchari partem sedecimam; ebulliant semel, tunc in lagenas infunde ad collum solum replendas, in quorum vacuum filum sulphure obductum urens ingeratur. (*Vm.*)

Hass et *Pid.* Sacchari partem quartam addunt.

Vinum Ribesiorum (Currant wine) (*Re.*): Baccarum Ribesior. rubrorum vel nigr. octarios tres, contusis adde Aquae mensuram quart dictam, sepone per horas 24, exprime et cuique mensurae adde Sacch. libr. unam; despuma etc.; vel: Succi Ribes. nigr. mensuris tribus adde Aquae frig. aeq. quant et hujus liquoris mens. tribus Sacch. libras tres, fermentationi derelinque et pro hujus vini mensuris 40 adde Aq. Vitae mensuras tres.

Roob Ribium s. Ribesiorum, Gelatina Grossulariae s. Ribium. (Ams. An. B. Bel. Br. Ful. Gal. Hass. His. His3. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. Sw. T. Vm.*

℞. Bacc. Ribium rubr. matur. q. vis.
Coque cum Aquae pauxillo in vase stanneo, continue agitando, donec rumpantur; residuum per cribrum trajice et fortiter exprime; succi partibus decem adde Sacchari quatuor et sub continua agitatione ad mellis consist. consume. (B. Bel.)

Ams. Sacchari partem unam et quinque Succi; — An. Br. Ful. Hass. Wir. Wür. *Pid.* et *Sw.* Succi quatuor; — R. Succi sex; — Sax. Succi sedecim; — *T.* ut roob cerasorum. — *Gr.* ut gelatinam pomorum; praeterea: Succi libram unam cum Sacch. unciis sex decoquere; vel: Succi, Sacch., sing. partes aeq. lente per horas tres conterere et in vitris seponere, quo peracto tribus diebus lapsis in gelatinam spissam concrescet.

℞. Sacchari clarificati et fortissime cocti . . . . . libras duas.
Aquae . . . . . libras decem.
Clarifica et coque ad trochiscorum duritiem, adde
Succi Ribium (Grossulariae Baccarum),
Aquae, singulorum libram unam.
Coque ad consist. gelatinae et cola. (His. His3.)

℞. Succi Ribium rec. expr. . q. vis.
Cola et coque, modico igne, ad mellis consistentiam. (Gal. Sar. *Gr.*)

℞. Bacc. Ribium matur. libr. quindecim.
Sacchari albi . libras duodecim.
Coque blando igne, saepius agitando, ad evaporationem quartae fere partis humidi usque, cola liquorem adhuc calidum et ad locum frigidum sepone, ut in gelat'nam concrescat. (Wir. *Fi.*)

Vm. addere octariis singulis Succi expressi Sacchari libras duas et ad consist. gelatinae evaporare.

Sauer, kühlend, beſonders angewendet, um Tiſanen annehmlicher zu machen.

Gelatina Grossulariae (*Re.*): Succi et Syrupi e Saccharo solvendo in pond. dimid. Aquae et coquendo parati, sing. part. aeq. per breve temporis spatium coquantur.

Syrupus Ribium s. Ribesiorum s. Ribis rubri s. de Ribesiis et Grossulariae. (B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O Pal. Pol. Wir. Wür. *C. Fi. Pid. Sw. T. Vm.*)

℞. Succi Ribium depur. et filt. lib. duas.

Sacchari albi lib. tres c dimidia. Liqua blandi caloris ope (Gal.)

Br. D. Ful. Pal. Wir. Wür. Succi uncias decem et Sacchari uncias sedecim; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. Succi uncias viginti, Sacchari libras tres; — Hass. *Pid.* Succi uncias decem, Sacchari tredecim et dimidiam; — *Fi.* Succi libram unam, Sacchari duas; — *Sw.* Succi uncias sedecim, Sacchari uncias viginti octo; — Bel. Succi uncias sedecim, Sacchari libras duas cum dimidia; — His. His3. Succi libras duas et uncias duas, Sacchari libras quatuor; — Ba. Succi partem unam, Sacchari duas; — *Vm.* Succi partes duas, Sacchari partes tres cum dimidia; — Li Succi partes tres, Sacchari quatuor; — Fer. *C.* Succi et Sacchari part. aeq.; — *T.* ut syrupum limonum.

℞. Bacc. Ribium rubr. libras centum

Enucleatas in pelvim immitte, calefac agitando, donec nuclei sint diruпti, infunde supra cribrum e crinibus textum, in pulpam converte et succo obtento adde

Succi Cerasorum acid.
lib. quinque.

Mixturam in cavam frigidam sepone, coagulum stupae e virgulis salicinis flexae ope divide, cola et cuique libraе Succi obtenti Sacchari uncias viginti octo adde.

Potus acidus, Tisana acidula. (*Au.*)

℞. Syrupi Ribium,
— Rubi Idaei,
— Berberum, sing. unc. unam.
Aquae bullientis . . libras duas.

Ricinus.

Ricinus communis, L., R. comm. minor, Palma Christi; Wunderbaum; Ricin commun (*Gal.*); Palma Christi (*Aug.*); Skocei wettsj (*B.*); Purgeerkorn (*D.*); Ricino (*His.*); Ricino, Catapuzia, Fagiolo di Roma, Mirasole, Palma Crist, Zecca (*I.*); Wonderboom (*Bel.*); Mamona, Palma Christi, Carrapateiro (*Lus.*); Eranda (*Sa.*); Undertraed (*Suec.*); Vullak unnay (*Tam.*); Amidum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sp.* Z.

⊙ (Monoecia Monadelphia; L.; Euphorbiaceae, *J.*) Ein im südlichen Europa und nördlichen Africa wachsender Baum. (*Blackw.* t. 148. *Plenck* t. 690. *Schk.* t. 312. Dict. d. Sc. nat. cah. XI. Fl. méd. VI. 298. *Bert.* Bild. VII. 87. f. 1.)

Man wendet den Saamen (semen Ricini) an; er ist eirund länglich und auf beiden Seiten platt. Er enthält unter einer dünnen, glänzenden, brüchigen, grau und weiß marmorirten Schaale, an welcher der gelbliche Nabel hervorsteht, einen weißen, öligen Kern.

Oleum Ricini s. Seminum Ricini s. de Kerva s. kervinum s. Palmae liquidum s. Palmae Christi.

1) Wie man es im Handel findet.

Bor. Bor4. D. Du. Ed. Hass. HassP. Lon. LonN. O. Pol. *Gr. Re. Sa.*

2) Besonders bereitet.

A. Am. Ams. An. B Bel. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. Pm. R. Sax. Suec. Wür. *Br. C. Fi. Re. Sw. T. Vm.*

℞. Semin. Ricini matur. a tegmine germineque liberat. . . q. vis.

Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope; pastam in panno et tela arctioris texturae inclusam sensim exprime et oleum caloris balnei aquae ope filtra.

LH. fere ut in praeparatione olei amygdalarum dulcium agere; — *Re.* Oleum absque calore exprimere; — *Figuier* Semina cum Spiritu venali contundere, pastam prelo submittere, ex oleo profluenti alcoholis elicere trientes duos et residuum destillationis coquere, donec omnis humor evanuerit. (GalH.)

Ein schlechtes Verfahren.

Pm. Seminum tegmine liber. libras duas absque contusione praelo statim submittere jubet; — His. His3. Seminum libras sex terere pistillo ligneo in mortario lapideo, per setaceum trajicere et sacculo cannabino immissa praelo submittere; — GalH. *T.* torrere Semina in olla ferrea, post refrigerationem contundere, pastam cum Aquae certa quantitate diluere et totum, continue agitando, super igne ad bullitionem usque tenere, semovere deinde omnem materiam tumidam oleo supernatantem, seorsim calefacere, ut aqua evaporet et oleo separato, illam per manicam trajicere, seponere et decanthare; — Gal. *Re.* Seminibus leviter tostis oleum exprimere et coquendo acridum principium separare.

Das Ricinusöl ist oft scharf, welches bald von dem Schälchen bald vom Keim herrührt. Das vom Keim gewonnene ist sehr mild und nicht purgirend. (*Gr.*) Lecanu und Bossu haben aus dem Oel bei der

Deſtillation zwei Säuren gezogen, Ricinus- und Oelricinusſäure (Acidum ricinicum und oleo-ricinicum), welche ſich mit einer dritten, der Stearoricinſäure (A. stearo-ricinicum), auf Einwirkung der Alcalien bilden; die beiden erſtern finden ſich im alten Oele und von ihnen rührt die Schärfe deſſelben her.

Friſch iſt das Ricinusöl ein mildes Abführmittel und wird oft als Wurmmittel angewendet. — Gabe, zwei Drachmen bis drei Unzen oder einen Eßlöffel ſtündlich, bis der erwartete Erfolg eingetreten iſt.

Emulsio Olei Ricini s. purgans. (Gal. *Au. B. Ca. E. Gr. Pie. Re. Sm. Va. Vm.*)

℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Cum Vitello Ovi et Amygdala una amara contritum solve in
Decocti Carnis . unciis tribus.
Sogleich zu nehmen. (*B.*)

℞. Olei Ricini,
Emulsionis Amygdalar. mnar.,
Decocti Carnis, sing. uncias duas.
Löffelweiſe zu nehmen. (*B.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
— Amygdal. dulc. sesquiunciam.
Emulsionis gumm. unc. quatuor.
Allmälig zu nehmen. (*B.*)

℞. Ricini . . . . . uncias tres.
Mucilag. Gummi Arab.
drach. duas.
Aquae Menthae . uncias octo.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel. (*Au.*)

℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Gummi Arabici drachmam unam.
Syrupi Althaeae . semunciam.
Aq. Flor Sambuci . sesquiunciam.
Aetheris nitrici drachmam unam.
Laudani Sydenh . scrup. unum.
Gabe, alle Stunden einen Löffel.

℞. Olei Ricini . . sesquiunciam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Sacchari albi . drachmam unam.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Tinct. Opii . guttas 40 ad 50.
Gabe, alle Stunden einen Eßlöffel. (*E.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . uncias duas.
Aquae . . . . uncias decem.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel. (*Au.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Sacchari albi . . . semunciam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Aquae Rosarum . uncias decem.
Gabe, zwei Löffel alle halbe Stunden. (*Au.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Syrupi Althaeae . unciam unam
Contere, sensim addendo
Aquae purae . . . uncias octo.
— Cinnam. hord. drach. duas.
Misce bene. (*Sm.*)

Gal. *Re.* Olei unciam, Vitelli Ovi unciam dimidiam, Aquae purae uncias duas, Aquae Florum Aurantiorum et Syrupi Sacchari, sing. semunciam; — *Ca.* Olei unciam unam, Aquae purae duas, Vitelli Ovi q. s, Syrupi Cichorii comp. et Aquae Florum Aurantiorum, sing. semunciam; — *Vm.* Olei partes duas, Vitelli Ovi unam, Syrupi Sacchari, Aquae Florum Aurantiorum, sing. unam et Aquae purae quatuor.

℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.
Magnesiae albae,
Mannae, sing. . drcchmas duas.
Fiat emulsio. (*Pie.*)

℞. Olei Ricini . . . semunciam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Aquae destillatae . . . unciam.
Spiritus Lavandulae compositi
guttas quadraginta.
Syrupi Tolutani semidrachmam.

Haustus catharticus oleosus, Potio Olei Ricini s. laxans s. purgans s. purgans cum Oleo Ricini, Mixtura laxans s. oleosa laxans. (*Au. B. Bo. ParC. Ra. Sw.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
Syrupi Limonum unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

Ra. Va. Hosp. Ven. praeterea Olei et Syrupi Cichorii partes aequales; — *Bo.* Olei et Syrupi Florum Persicae partes aequales.

℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
Syrupi Sacchari unciam unam.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae purae . uncias quatuor.
Fiat potio. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Olei Ricini unciam unam ad duas.
Syrupi tartarici . unciam unam.
Aquae Cichorii . . uncias duas.
Misce. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

Ra. Va. Char. praeterea: Olei, Syrupi Rhamni, sing. uncias duas, Aquae Menthae unam; vel: Olei, Syrupi Cichorii, sing. uncias duas, Aquae Menthae uncias duas; — vel: Olei drachmas sex, Oxymellis scill. semunciam et Syrupi Rhamni unciam. (*Va.* Hôt. D.)

℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Aquae Vitae,
Sacchari, singulorum semunciam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias duas.
Decocti Carnis . . uncias tres.

Auf einmal zu nehmen. (*B.*)

℞. Olei Ricini . . unciam unam.
Dec. Carnis c Herbis unc. quatuor.
Misce. (*Sp.*)

℞. Olei Ricini . . uncias tres.
Saponis medicinalis semunciam
Syrupi Cort. Aurant. . unc. tres.
Gabe, alle halbe Stunden einen Löffel. (*Au. Va.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Subcarb. Potassae . drach. unam.
Mellis . . . . . unciam unam.
Aquae Tiliae . . uncias decem.
Gabe, zwei Löffel alle zwei Stunden. (*Au.*)

Potio anthelmintica oleoso-aromatica. (*B.*)

℞. Olei Ricini,
Aquae Menthae pip., sing.
unc. duas.
Auf einmal zu nehmen.

Clysma emolliens anthelminticum, Enema vermifugum. (*B.*)

℞. Olei Ricini . . . uncias tres.
Dec. Seminis Lini unc. quatuor.
Enema Olei Ricini s. aperiens (*Ra. Va.*): Olei Ricini, Mellis, sing. unciam unam, Olei Lini (Decocti Gruti *Va.*) decem, misce

Tinctura Ricini. (*Gr.*)

℞. Seminum Ricini quantum placet.
Spiritus rectificati vel Frumenti q. s. ut contegantur vel ad solvendum
Gabe, eine Unze purgirend.

Robinia.

Robinia Pseudo-Acacia, L.; Unächter Acacienbaum; Robinier, Faux Acacia (*Gal.*); False Acacia (*Ang.*).
Gal.

Ein Baum (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*), welcher in America einheimisch und in Europa angepflanzt ist. (Nouv. Duh. II. t. 16.)

Die Rinde wirkt purgirend und brechenerregend.

Rosa.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Rosa Centifolia, L.*, R. *Damascena*; Centifolienrose; Rosier à cent feuilles (*Gal.*); Hundred leav'd rose (*Ang.*); Ruze cerwena (*B.*); Fyld rose, raed rose (*D.*); Rosa de Alexandria (*His.*); Damask rozen (*Bel.*); Roze centijfoliie (*Pol.*); Rosa (*R.*); Rosor (*Suec.*).
A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Hass. HassP His. His8. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp Z.*

Ein Strauch (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, *J.*) welcher in allen Europäischen Gärten cultivirt wird. (*Zorn.* Ic. pl. t. 600.)

Man wendet die Blüthen (flores Rosarum incarnatarum s. pallidarum, petala Rosae Centifoliae) an; sie haben eirunde, ganze, blaßrosenrothe Blätter von sehr angenehmem Geruch, welcher sich beim Trocknen fast ganz verliert; der Geschmack ist etwas bitter, scharf und styptisch.

2) *Rosa moschata, Ait.*; Moschusrose; Rose musquée (*Gal.*).
Gal. *Gr. Re.*

Ein in Nordafrica einheimischer Strauch.

Die Blüthen (flores Rosarum Damascenarum) dienen, nach Willdenow, zur Bereitung der Roseneſſenz.

3) *Rosa alba, L.*; weiße Rose; Rose blanche (*Gal.*).
Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein in ganz Europa verbreiteter Strauch. (*Oed.* Fl. Dan. t. 1215.)

Die Blüthen (flores Rosae albae) haben einen angenehmen Geruch und einen etwas bittern, styptischen Geschmack.

4) *Rosa Gallica, L.*; Essigrose, Provinzrose, Damascenerrose; Rose rouge, Rose de Provins (*Gal.*); Red rose (*Ang.*); Edike rose (*D.*); Rosa rubra, Rosa castellana (*His.*); Fransche rosen (*Bel.*); Roza damascenskie (*Pol.*); Rosa vermelha (*Lus.*); Raettikeroser (*Suec.*).
Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His8. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va.*)

Ein Strauch des südlichen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 82. *Plenck* t. 402. Düss. off. Pfl. IX. t. 21.)

Man wendet die Blüthen (flores Rosae rubrae s. Provincialis, petala Rosae Gallicae) an, wenn sie noch nicht ausgebreitet und von den Nägeln getrennt sind.

5) *Rosa canina, L.*; Hundsrose; Hahnbuttenstrauch, Hagebutten; Rosier sauvage, Eglantier (*Gal.*); Dogrose (*Ang.*); Sspek, Plana ruze (*B.*); Hybentorn (*D.*); Rosa silvestre (*His.*); Hondsrose (*Bel.*); Rosa selvatica, Cinorodon, Cinosbatos, Grattaculo, Paterlenga (*I.*);

Digitized by Google

Roza pulna (*Pol.*); Rosa brava (*Lus.*); Niupon (*Suec.*)

Ams. An. Br. D. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. His. His3. Lon. LonN. Wir. *Be. Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Z.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 8. *Plenck* t. 404. *Zorn* Ic. pl. t. 529.)

Man wendet die Blüthen, die Früchte und die Saamen an.

Die Blüthen (flores Rosae sylvestris s. rubrae vulgaris) haben rosenrothe oder fast weiße Blätter von einem süßen und angenehmen Geruch; sie führen gelind ab. — Die Frucht, Hagebutte, Hahnbutte (fructus Cynosbati, Cynorrhodon), Gratte-cul (*Gal.*), ist eine eirunde, glatte, scharlachrothe Beere, welche man, nachdem man die Saamen und die ihnen anhängenden Borsten herausgenommen, trocknet, oder aus denen man auch das breiige Fleisch auspreßt (pulpa Rosae caninae s. baccarum Cynosbati expressa). Der Geschmack ist etwas styptisch. Man hält sie für harntreibend und krampfstillend; doch ist es wohl eher ein abstringirendes und sehr kräftig reizendes Mittel, dessen Mißbrauch Husten, Erbrechen und Tenesmus verursacht. — Die Saamen (semina Cynosbati) sind länglich, eckig, hart und behaart. Man wendet sie heutzutage nicht mehr an

Alle diese Pflanzen sind mehr oder weniger abstringirend und tonisch.

Gr. führt außer diesen noch an: R. arvensis; — R. Eglanteria, rubiginosa, deren Blätter als Thee gebraucht werden; — R. sempervirens, Blätter purgirend; R. mollissima mit eßbaren Früchten.

Succus Rosarum pallidarum. (Gal. His. His3. Sar.)

℞. Petal. Rosar. pallid. mund. q. vis.
Contunde in mortario marmoreo vel ligneo et cola fortiter exprimendo; succum filtratum in lagenis a strato olei obtectum serva. (Gal. His. His3.)

Sar. Flores in saccum inclusos sub Aquam bull. demergere, saccum tam diu suspensum tenere quam aqua viridescens profluat, et simulac haec rubra prodit, exprimere

Conserva s. Confectio Rosae s. Rosarum s. Florum Rosarum rubrarum s. Rosae rubrae s. Gallicae. (Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. C. Ca. Fi. Gr. Pid. Re Sw. Vm.*

℞. Petal. Rosar. rec. et mund.
part. unam.
Contunde in mortario lapideo pistilli lignei ope; pulpae sensim adde
Sacchari pulverati (ad syrupi crassioris spissit. cocti) partes duas.
Fiat massa homogenea. (An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Ham. Hass. HassP. His. His3. O. Pal. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Br. Sw. Vm.*)

Am. Ams. Du. Ed. Li. Lon. LonN. LP. *C. Gr. Re.* Rosarum partem unam et tres Sacchari; — GalM. et Suec. Rosarum et Sacchari partes aequales.

℞. Petal. Rosar. rec.
part. quindecim.
Sacchari pulverati partes triginta.
Contere, pulpam per cribrum e crinibus confectum trajice et adde
Sacchari albi ad elect. consist. cocti et parumper refrig.
part. centum viginti.
Misce sedulo. (*Gal.*)

T. Petalorum uncias sex, Sacchari duas et colaturae addere Sacchari ad plumam cocti libras quatuor; in evaporatorio vel soli exposita ad crustae apparitionem evaporare.

℞. Petal. Rosar. rec. libram unam.
Contunde in mortario vitreo, sensim addendo
Syrupi Secchari spississ. lib. duas.
Humidum blando igne ad aptam consistentiam usque consume. (His.)

℞. Rosarum rubr. mund. libr. unam.
In saccum inclusas per aliquot tempus sub Aquam bull. demerge, saccum tamdiu suspensum tene, donec aqua rubra profluere coeperit, exprime tunc fortiter, contunde faeces in mortario et coque cum Sacchari clarif. libris tribus, succum expressum sensim addendo, ad consist conservae. (Sar. *Fi.*)

℞. Pet. Rosar. sicc. pulv.
part. nonaginta.
Aquae Rosarum quantum sufficit ut massa pulpaeformis obtineatur. Macera per horas sex, saepius agitando, adde Sacchari in Aqua Rosarum soluti et ad crystallisationis punctum cocti partes mille et sedulo in mortario marmoreo pistilli lignei ope commisce. (Gal. *Re.*) (*Conserva Rosarum omni tempore paranda.*)

GalM. Aquam communem, sex horas digestionis blando calore et mixtionem pulpae cum Sacchari quantitate aequali; — Lus. Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum uncias octo, horas sex infusionis et Sacchari albi sesquilibram; — *Ca.* Pulveris uncias sex, Aquae Rosarum q. s. et Sacchari semilibram; — Fer. *Fi. T.* Pulveris uncias tres, Aquae Rosarum octo et Sacchari libras duas.

℞. Pulv. Petal. Rosarum uncias tres.

Aquae Rosarum . . uncias octo.
Post aliquot dies macerationis adde
Sacchari albi . . . sesquilibram
antea cum Aquae q. s. ad syrupum spissum redacti et misce exacte. (Gen.)
Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Conserva Rosarum vitriolata. (Br. Sar. Wir. *T.*)

℞. Conservae Rosarum libram unam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Misce bene. (Br. Sar.)
Wir. Acidi sulphurici duplum; — *T.* Spiritus Vitrioli guttas decem pro uncia una.

Conserva Rosarum mercuriata s. anthelmintica. (*Fi.*)

℞. Conserv. Ros. rubr. rec.
sesquiunciam.
Mercurii purissimi . semunciam.
Agita ad extinctionem mercurii. — Gabe, für Kinder eine halbe bis ganze, für Erwachsene zwei Drachmen und nach Erforderniß mehr.

Pastilli de Rosa, Tabellae rosatae s. Manus Christi, Conserva Rosae rubrae Petalorum s. Rosarum sicca, Saccharum rosatum. (Br. Pal. Pm. Sar. Wir. *Re. Sp. T.*)

℞. Pet. Rosarum rubr. sicc.
unciam unam.
Sacchari ad congelationis punctum cocti . . . uncias sedecim.
Misce bene, ut fiant tabellae. (Wir. *Sp.*)
Br. Pulveri Rosarum antea adspergere Acidi sulph. guttas duodecim; — Pal. Pulveris drachmas sex et Sacchari cocti uncias quatuor.
℞. Rosarum siccarum unciam unam.
Sacchari albi ad consistentiam tabulati cocti . . sesquilibram.
Succi Citri . . drachmas duas.
Rosis pulveratis adsperge succum citri et totum cum saccharo bulliente commisce; fiant tabellae. (Sar.)
℞. Petal. Rosae rubr. pulv.
sesquiunciam.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Infunde balneo maris per horas sex et adde
Sacchari conici subtil. pulv.
libr. unam.
Succi Limonis . unciam unam.
Misce et in eodem balneo fiat conserva (Pm.)
℞. Sacchari albi . . libram unam.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Coque ad aptam consist., ut fiant tabellae. (Pal.)
Addendo sub finem Margaritarum praeparatarum semunciam, *Saccharum perlatum* obtinebis.
Re. T. ut rotulas menthae piperitae.

Tabellae Diarrhodon. (Sar.)

℞. Pulveris Diarrhodon sesquiunciam.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiant tabellae.

Pulpa de Rosae caninae Fructibus s. Cynorrhodontos. (Gal. *Re. T.*)

℞. Fruct. Cynosbati nondum penitus maturorum . . partes sedecim.
Umbilico et pediculo rescisis et seminibus separatis reliquum macera per tres vel quatuor dies in Vini albi partibus duabus ad mollitiem completam usque, contunde deinde pistilli lignei ope in mortario marmoreo et pulpam per cribrum setaceum arctioris texturae trajice.

Conserva s. Confectio s. Roob Cynosbatos s. Cynosbati s. Rosae Gallicae s. caninae s. Fructus Rosae caninae s. Cynosbati. (B*. Ed. Ful. Gal. Gen Lon. LonN. Lus. Pal. Sar. Wir. *Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm*)

℞. Pulpae Cynorrhodontos,
Sacchari albi, sing. . libras tres.
Evaporent blando igne ad aptam usque consistentiam. (Gen. *Sw.*)
Ful. et Pal. Pulpae libras duas et unam Sacchari; — Wir. Pulpae libras tres et duas Sacchari; — Lus. et *Vm.* Pulpae partem unam et duas Sacchari; — B*. Ed. Sar. *Gr.* Pulpae partem unam et tres Sacchari; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Pulpae libram unam et Sacchari uncias viginti; — Gal. *Fi. T.* Pulpae partem unam et Sacchari ad consist. elect. cocti (Syrupi ad pennam cocti) unam cum dimidia; — *Gr.* Pulpae Fructuum librar. 231, Sacch. lib. 216.
Schwach adstringirend, harntreibend, krampfstillend, magenstärkend. — Gabe, vier bis zwölf Drachmen.

Electuarium adstringens Fulleri, Conserva adstringens s. Rosarum rubrarum adstringens. (His. His3. LH. *B. Bo. Pic. Sm.*)

℞. Conserv. Rosar. rubr. uncias duas
Diascordii . . . . semunciam.
Boli Armenae . drachmas duas.
Sang. Draconis sesquidrachmam.
Balaustiorum . . semidrachmam.
Olei Nucis moschatae,
— Cinnamomi, sing. guttas duas.
Syrupi Rosarum rubr. unc. unam.
Misce. (His. His3.)

℞. Conservae Rosarum rubr.
uncias duas.
Nitri pulverati scrupulum unum.
Misce. (LH.)

℞. Conserv. Rosar. rubr.
unc. quatuor.
Nitri . . . . drachmam unam.
Syrupi Diacodii . unciam unam.
Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
Misce. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Conserv. Rosar. rubr.
unc. quatuor.
Syr. Bals. Tolutan. . unc. unam.
Misce. (*B.*)

℞. Conserv. Cynorrhodon
unc. quatuor.
Syrupi Granati . drachmas duas.
— Papav. albi unciam unam.
Nitri . . . . scrupulos duos.
Misce. (*Sm.*)

Bei Blutſpucken. — Gabe, einen Kaffeelöffel alle zwei oder drei Stunden.

Electuarium traumaticum. (Br.)

℞. Conserv. Rosar. rubr. unc. duas.
Balsami Locatelli unciam unam.
Syrupi balsamici . . semunciam.
Misce.

Linctus communis, Mixtura adstringens. (*Sa. Sm.*)

℞. Olei Olivarum unc. duas c. dimid.
Conserv. Cynorrhod. semunciam.
Syrupi Papaveris . unciam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Conserv. Rosar. rubr. unc. duas.
— Rorismarini,
— Inulae,
Syrupi Succini, sing. unc. unam.
Misce exacte. (*Sm.*)

Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich drei Mal. — Bei veralteter Leukorrhoe.

Linctus oleosus. (*Gr.*): Ol. Amygd., Syr. Mori, Confect. Ros. canin., sing. unc. unam, Pulv. Tragac. drach. tres, misce. 1 Drachme bisweilen.

Tisana adstringens. (Bo. *Pie. Sm.*)

℞. Flor. Verbasci . . manip. unum.
Aquae . . . . octarium unum.
Coquendo dimidium consume et in colatura solve
Conserv. Rosar. rubr. unc. unam.

Von Fouquet gegen Ruhr empfohlen.

Infusum s. Mucharum s. Brodium Rosarum, Infusum Rosarum solutivum. (Fer. Hass. His. His3. Li. Sar. Wir. *Fi. Gr. Pid.*)

℞. Petal. rec. Rosarum . libr. duas.
Aquae bullientis . . libras octo.
Digere per dies octo, cola leviter exprimendo, colaturam aequali novorum Florum quantitati infunde, operationem tertia vice repete et liquorem denique in lagena longicolli a strato olei obtectum serva. (Sar.)

℞. Petalorum Rosarum recentium,
Aquae bull. sing. libr. octodecim.
Post horas 24 macerationis cola, et liquorem in lagena a strato olei obtectum serva. (Wir.)

His. Rosarum libram unam, Aquae duas et octo dies infusionis; — His3. Rosarum libras sex, Aquae duodecim et octo horas infusionis; — Hass. et *Pid.* Rosarum rubrarum libram, Aquae octarium et aliquot dies infusionis; — Li. Florum et Aquae partes aequales et tres dies digestionis; — Fer. *Fi.* Florum et Aquae partes aequales et 12 horas digestionis. — *Gr.* e Petalis Rosarum rubrarum et Aqua bulliente.

Dieſer Aufguß dient beſonders zur Bereitung des Roſenſyrups und des Roſenhonigs. — *Gr.* Reagens.

Infusum Rosae s. Rosae acidulum s. compositum s. adstringens, Tinctura Rosarum. (Am. B*. Du. Ed. Gen. His. Lon. LonN. Suec. *Br. C. Gr. Ra. Re.*)

℞. Pet. Rosar. rubr. sicc. semunciam.
Aquae bull. . octarios c. dimidia.
Acidi sulph. Aqua dil. drach. tres.
Macera per semihoram, cola et adde
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Liqua. (Am. B*. Lon. LonN. Suec. *C. Gr. Re.*)

Ed. Rosarum unciam, Aquae libras duas c. dimid., Acidi semunciam, 4 horas digestionis et Sacchari unciam; — Du. Rosarum semunciam, Aquae libras tres, Acidi drachmas tres, semihoram infusionis et Sacchari sesquiunciam; — *Br**. Rosarum unciam, Aquae libras quinque, Acidi sulph. drachmam, infusionis horas 24 et Sacchari uncias duas; — His. Rosarum semunciam, Aquae libras tres, horae quadrantem infusionis, Acidi scrupulum unum absque saccharo; — *Ra.* Rosarum semunciam, Aquae libram, Sacchari sesquiunciam et Acidi semidrachmam; — Gen. Rosarum semunciam, Aquae libras duas cum dimidia, Acidi scrupulum unum, et Sacchari sesquiunciam.

Schwach adſtringirend, ſäuerlich. — Dieſer Aufguß, welcher ſelten allein verordnet wird, dient beſonders, um wäſſerigen Getränken Farbe und einen ſäuerlichen Geſchmack zu geben. Auch wendet man ihn als Vehikel verſchiedener Arzneimittel an; man ſetzt ihn ebenfalls zu Gurgelwaſſern; doch verordnet man ihn auch bisweilen in paſſiven, d. h. von keiner Reizung herrührenden Blutflüſſen.

Infusum (Thé) haemastaticum. (Pie.)

℞. Flor. Rosarum sicc. semunciam.
Aceti albi cochlearia tria majora.
Sacchari . . . . unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post duas horas infusionis cola. — Taſſenweiſe den Tag über. — Gegen Diarrhöe und Blutflüſſe.

Infusum adstringens. (Bo.)

℞. Rosarum rubrarum,
Quinque Myrobalanorum contusorum, . . . sing. semunciam.
Aquae communis . libram unam.
Digere inter cineres calidos, cola et colaturae adde
Syrupi Granati . . semunciam.
Abſtringirend, bei Diarrhöe und Blutflüſſen empfohlen. — Auf drei oder vier Mal den Tag über zu nehmen.

Syrupus Rosarum rubrarum s. Succi Rosarum rubrarum s. Rosae Gallicae s. e Rosis siccis, Rhodosaccharum. (Ams. An. Bel. Ed. Gal. His. His3. Pm. Wir. *C. Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Succi Rosar. rubr. depurati libr. duas.
Sacchari albi . . libras quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad consistentiam syrupi (His. His3.)

℞. Pet. Rosarum rubr. rec. libr. quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo
Infunde per horas 12 in vase tecto; exprime leviter, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Fiat balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Pm. Petalorum, Aquae ferv., sing. part. aeq., infusionem per horas tres, colaturam cum expressione et dissolutionem Sacchari pulv. duplicem illius succi quantitatem in liquore limpido a faecibus decanthato; — Wir Rosarum sicc. semilibram, Aquae bull. sesquilibram, horas 20 macerationis et pro unciis novem colaturae Sacchari uncias sedecim; — An. et Bel. Florum libram unam, Aquae tres, horas 12 digestionis et quatuor libras Sacchari.

℞. Petal. Rosar. rubr. rec. part. unam.
Aquae frigidae . . partes tres
— bullientis . partes septem
Infunde per horas sex, trajice per cribrum absque diu continuata expressione et adde
Sacchari albi . partes quatuor.
Clarifica, ut fiat syrupus. (*Vm.*)

℞. Pet. Rosar. rubr. sicc. part. unam.
Aquae bullientis . partes novem.
Macera per horas 12, coque deinde parumper, cola et colaturae adde
Sacchari albi . . partes decem.
Fiat coquendo syrupus. (Ed. *C.*)

Re. ut syrupum rosae (pallidae); — *Gr.* Pet. sicc. semilibram, Aq. bull. libr. quatuor, infunde, cola et exprime et addendo Sacch. libr. unam ad syrupum coque. (*Syrup. de Rosis siccis*); vel: Pet. sicc. unc. septem, Aq. bull libr. quinque, Sacch. sex. (*Syr. Rosae Gallicae.*)

℞. Pet. Rosar. rubr. sicc. unc. octo.
Aquae bull. libr. quinque c. dim.
Digere per horas 12, coquendo dimidium consume, cola exprimendo, seponendo depura et inspissa, ut addendo
Sacchari puri . uncias sedecim syrupus absque coctione paretur. (Ams.)
T. ut syrupum florum persicae.

Syrupus Rosae s. de Rosis pallidis s. Rosarum pallidarum s. rosatus simplex s. Rosarum solutivarum s. Rosarum solutivus s. rosaceus solutivus s. rosatus solutivus. (Ams. An. Ed. Fer. Gal. Gen. His. His3. Lon. LonN. LP. Pm. Sar. Wir. *C. Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Succi Rosarum pallidarum expressi,
Sacchari albi, sing. part aequales.
Coque, blando igne, ad consist. syrupi. (Gal. Pm.)

Sar. loco sacchari Syrupum communem.

℞. Pet. Rosar. pallid. rec. part. unam.
Aquae bull. partes quatuordecim.
Macera per horas 12, cola et adde
Sacchari albi . . . partes tres
ut fiat coquendo syrupus. (Ed. *C.*)

Gr. Aquae partes quatuor, caet. ut antea (*Syr. Rosae Centifoliae.*); — His. Petalorum partes tres, Aquae bull. sex, horas 12 infusionis et Sacchari partes duas; — Fer. Petalorum partem unam, Aquae bull. octo, infusionis horas 24 et Sacchari partes sex; — LP. Florum uncias octo, Aquae bull. libras sex, macerationem per horas 24, levem expressionem et Sacchari clarif. libras quatuor; — *Fi.* Rosarum pallidarum uncias sex, Aquae bull. libras quatuor, digestionem inter cineres calidos per horas 12 et post colationem, adjectis Albuminibus duobus et Sacchari libris tribus, coctionem ad syrupi spissitudinem; — *Gr.* Liquoris e destillatione Rosar. Damasc. libr. sex, coctione ad octar. tres redact sepone per noctem, decantha, adde Sacch. alb. libr. quinque et ad librar. octo c. dim. coquendo redige.

℞. Pet. Rosar. pall. rec. part. unam.
Contundendo in pastam redige et infunde
Aquae ferv. part. duas c. dimidia.
Post horas 12 macerationis cola leviter exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . pondus aequale.
Clarifica et ad syrupi consist inspissa. (*Vm.*)

℞. Pet. Rosar. pall. rec. libr. duodecim.
Contunde in mortario marmoreo, tunc infunde per horas duodecim in
Aquae . . . . libris quatuor.
Liquori expresso adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Clarifica et coque blando calore ad consist. syrupi. Singulis libris syrupi adde libram Syrupi frigidi praep. cum
Aquae Rosarum pall. drach. decem.
Sacchari albi . . unciis duabus.
Misce bene. (An)

℞. Sacchari puri . . . libras duas.
Aquae fontanae quantum sufficit
Coque ad consistentiam syrupi, quem bullientem infunde
Petal. rec. Ros. pall. libris duabus.
Post tres dies macerationis coque leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Pet. rec. Rosar. pall. libram unam.
Aquae bullientis libras quatuor.
Macera per horas 12, tunc coquendo dimidium consume, continue agitando; cola cum expressione et colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari puri . . libras duas.
Coque ad consist. requisitam. (Ams.)

℞. Pet. sicc. Rosar. pall. unc. septem.
Aquae fervidae octarios quatuor.
Macera per horas 12, redige vaporatione in balneo aquae ad remanentiam liquidi octariorum duorum cum dimidio, adde deinde
Sacchari puri . . . libras sex.
Liqua in balneo aquae. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Lon. ante 1809. *Gr.* Rosas Damascenas adhibet; — *Fi.* Rosarum pall. libras sex et Aquae comm. duodecim in alembicum ingerere, destillando libras quatuor aquae odorosae abstrahere; quod in alembico remanet fortiter exprimere et hoc fluidum sepositione depuratum cum Sacchari libris duabus et dimidia ad syrupi consist. coquere; — *T.* ut syrupum florum persicae.

℞. Petal. Rosar. pallid. libr. quatuor.
Aquae bullientis . libras octo.
Infunde per horas 24, tunc cola fortiter exprimendo; colaturam digere supra novam quantitatem Rosarum, operationem tertia vice repete et supremi liquoris unciis novem adde
Sacchari albi . uncias sedecim ut fiat syrupus. (Br. Pal. Wir.)

Dieß iſt der *Syrupus Rosarum solutivus* Der *Syrupus Rosarum simplex* wird mit demſelben dreifachen Aufguß, aber bloß mit zwei und dreißig Unzen Zucker auf anderthalb Pfund Flüſſigkeit bereitet.

Syrupus Rosarum s. rosaceus solutivus cum Senna s. de Senna rosaceus s. Rosarum compositus. (Ams. Ba. Wür. *Gr.*)

℞. Pet. rec. Rosar. pall. libr. unam.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per horas 12, tunc coque ad librarum quatuor remanentiam, cola exprimendo et macera in liquore per horas duas
Fol. Sennae mundat. unc. octo.
Cola exprimendo. Liquori sepositione depurato adde
Sacchari puri . . . libras duas.
Coque ad consistentiam syrupi. Post refrigerationem adde
Olei ess. Anisi,
— — Foeniculi, sing. gutt. quinque.

Wür. infundere Sennae unciae unae libras duas Infusi Rosarum pallidarum et post aliquot horas digestionis colaturae addere duplum Sacchari puri ad parandum syrupum; — Ba. infundere per semihoram Petalorum partem unam et duas Sennae in Aquae ferv. octoginta octo et cuique parti colaturae addere Sacchari partes duas; — *Gr.* Fol. Senn. uncias sex, Semin. Carvi, Foenic. dulc., sing. drachm. tres, Infus. Ros. Damasc. libr. tres, Sacch. libr. duas.

Mel rosatum (simplex) s. rosaceum s. de Rosis s. Rosae s. Rosae Gallicae, Rhodomel, Mellitum Rosarum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Pet. sicc. Rosar. rubr unc. decem.
Aquae bullientis . . libras sex.
Macera per horas 12, tunc coque blando igne; cola exprimendo, sepone, decantha et adde
Mellis despumati libras quatuor.
Evaporent lente ad syrupi consist. (B.)

An. et GalM. Rosarum sicc. partem unam, Aquae quatuor, horas 12 digestionis et Mellis partes sex; — Br. et Wir. Rosarum recentium partes sex, Aquae tantidem, digestionis horas 20

et Mellis partes sex; — Pal. Rosarum recentium partes novem, Aquae duodecim, reductionem ad quinque colaturae et Mellis quatuor; — Han. O. Pol. et *Sw.* Rosarum siccarum partes octo, Aquae quatuor, 12 horas digestionis et Mellis partes octo; — Ed. Rosarum sicc. partem unam, Aquae duodecim, horas sex digestionis et Mellis partes sedecim; — Fenn. Lus. et Suec. Rosarum siccarum partem dimidiam, Aquae tres, horas 12 digestionis et Mellis partes sex; — Bor. Rosarum siccarum partes quatuor, Aquae octo, horas 12 digestionis et Mellis partes octo; — Bor4. HassP. *Fi.* Rosarum incarn. uncias octo, Aquae libras quatuor, digestionem per noctem et Mellis despumati libras octo; — *T.* Petalorum uncias sedecim, Aquae Rosarum libras octo, 12 horas infusionis et Mellis libras octo; — Ba. Rosarum sicc. partem unam, Aquae octo, horas tres digestionis et Mellis duplum colaturae; — A. et R. Rosarum sicc. partes tres, Aquae duodecim, tres horas digestionis et Mellis partes viginti quatuor; — *Br.* Rosarum sicc. partem unam, Aquae quatuor, horas sex digestionis et Mellis partes quinque; — *Sp* Rosarum partes sex, Aquae tantidem, 24 horas digestionis et Mellis octo partes; — Sax. Rosarum sicc. partem unam, Aquae sex, 12 horas digestionis, Mellis colaturae pondus duplum; — Du. Lou. LonN. *C. Gr. Rc.* Rosarum uncias quatuor, Aquae octarios tres, horas sex digestionis et Mellis libras quinque; — Gen. Rosarum sicc. uncias tres, Aquae libras duas, aliquot horas digestionis et Mellis libras duas cum dimidia; — Ams. Rosarum sicc. uncias octo, Aquae libras sex, horas 12 macerationis et Mellis despumati libras duas.

℞. Petal. Rosar. rubr. part. unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Infunde binis vicibus, singula absque expressione cribrando; cum colatura Albumen unum vel duo subige, ebulliant et per pannum colentur; adde
Sacchari albi . . partem unam.
Mellis albi . . partes quinque.
Evaporent ad syrupi consist. (*Vm.*)

℞. Pet. sicc. Rosar. rubr. part. unam.
Decocti Calicum Rosarum a petalis separatorum partes quatuor.
Infunde per horas duas, cola absque expressione et colaturae adde
Mellis electi . . . partes sex.
Albuminis ope clarificata ad syrupi consistentiam evaporent. (Gal.)

GalM. eundem agendi modum sed loco decocti calicum Aquam adhibet.

Durch letzteres Verfahren kommt eine große Menge Gerbestoff und Gallapfelsäure in das Product. Henry bemerkt außerdem, daß das zum Abklären angezeigte Eiweiß nothwendig einen Theil des wirksamen Stoffs, durch seine Verbindung mit einem großen Theile des Gerbestoffs, vernichten müsse.

℞. Succi depur. vel Infusi Rosarum rubr. saturati partem dimidiam.
Mellis crudi . . partem unam.
Commisce bene. (Hass.)

Pid. ad syrupi consist. coquere Infusi Rosarum saturati uncias novem et Mellis despumati libram; — His. His3. Succi depurati Rosarum et Mellis comm., sing. part. aeq., Aquae communis q. s.; — Sar. Succi depurati partem unam et Mellis despumati duas; — Li. Infusi partem unam et quatuor Mellis; — Wür. Infusi unam et duas Mellis; — Fer. LP. Infusi et Mellis, sing. part. aeq.; — Pm. Syrupi Mellis libras sex, Succi defaecati Rosarum pallid. uncias octodecim, lento igne evapora ad syrupi consist.

℞. Aquae Rosarum . unciam unam.
Mellis despumati uncias quatuor.
Misce. (D. Fer. Ful.)

Die Verschiedenheiten in der Bereitung sind von keiner besondern Wichtigkeit, da man sich dieses Honigs nur fast äußerlich bedient. Er ist adstringirend und wird daher in dieser Eigenschaft zu Gurgelwassern, Collutorien, Einspritzungen angewendet.

Mel rosatum solutivum. (Pm. Sar. Wir. *Fi.*)

℞. Mellis boni . . . libras duas.
Succi Rosarum pallid. libras tres.
Coque, despuma, et lente ad consistentiam requisitam consume. (Wir.)

Sar. Mellis et Succi depur. part. aeq.; — Pm. Syrupi Mellis libras sex, Succi defaecati Rosarum pallid. libras tres, lento igne in syrupum redige; — *Fi.* Infusi Rosarum, Mellis desp., sing. part. aeq. ad aptam consist. redigere.

Selten innerlich, zuweilen zu Klystiren. — Gabe, von anderthalb bis zwei Unzen.

Linctus Acidi muriatici (Gr.): Mellis Rosae drach. decem, Syrupi Rhoeados duas, Acidi mur. gutt. viginti.

Mel solutivum (Gr.): Liquoris e destillatione Rosar. Damasc. librar. sex, Semin. Cumin. unciam, Sacchari libr. quatuor, Mellis duas, coque.

Gargarisma cum Melle rosato s. commune s. detergens. (GalM. Gen, *Ra. Sm. Sp. Va.*)

℞. Infusi Rosarum aciduli semilibram.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce. (Gen.)

℞. Mellis rosati . partes quindecim.

Decocti Hordei . partes centum.
Misce bene. (GalM.)

Ra. Va. Mellis rosati unciam et Decocti Hordei libram.

℞. Fol. Agrimoniae . manip. unum.
— Salviae . pugillum unum.
Aquae . . . semisextarios tres.
Coque per horae quadrantem et colaturae adde
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce bene. (*Sm.*)

℞. Hordei integri . unciam unam.
Aquae . . uncias triginta duas.
Decoque ad dimidium et adde
Foliorum Agrimoniae,
— Rubi, sing. pugillos duos.
Cola et in colatura solve
Nitri . . . . drachmam unam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (*Sp.*)

Collutorium detergens s. adstringens. (*B.*)

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Tincturae Laccae guttas viginti.
Misce.

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Spiritus Cochleariae,
Liquoris Hoffm., sing.
gutt. triginta.
Decocti Hordei libras duas.
Misce.

℞. Mellis rosati . . unciam unam.
Decocti Hordei . libram unam.
Liquoris Hoffmanni guttas triginta.
Misce.

Tinctura Rosarum. (*Vm.*)

℞. Pet. rec. Rosar. Provinc.
part. unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
Macera frigide per dies duos, cola exprimendo et filtra.

Acetum Rosae s. Rosarum s. rosatum. (Bor. Bor4. Br. D. Fer. Han. HassP. His. His3. Lus. O. Pal. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Pet. Rosarum rubr. part. unam.
Aceti rubri . . partes sedecim.
Macera per horas 14 in vase tecto, subinde agitando, cola et filtra.

Sar. Rosarum partem unam, Aceti quatuor, sex dies macerationis et infusionem semel vel bis repetitam supra novas Flores, ita ut acetum magis saturatum obtineatur; — Bor. D. Fer. Han. O. Pol. Sax. et *Vm.* Rosarum partem unam, octo Aceti et dies decem frigidae macerationis; — Bor4. Rosarum rubr. uncias tres, Aceti ferv. q. s., ut post horam colata sesquilibram aceti praebeant; — Wür. Rosarum partem unam, Aceti novem, et tres septimanas macerationis solis calore; — Suec. *Fi. Gr. T.* Rosarum partem unam, Aceti duodecim et quatuor (sex *Fi.* octo (*Gr.*) ad decem) dies macerationis (et novam infusionem cum novis Floribus *Gr.*); — Br. Pal. et Wir. Rosarum partem unam et Aceti sex.

℞. Pet. sicc. Rosar. rubr. exungul
libr. unam.
Aceti albi. . . . . libras octo.
Macera per aliquot dies soli exposita vel aliquot horas in balneo aquae; cola sine expressione et adde
Alcoholis Vini . . uncias duas.
Misce. (His.)

Lus. infundere per dies sex Rosarum libram unam in Aceti sex, parumper coquere, et addere Alcoholis semilibram; — HassP. Rosarum unciam unam, Aceti Vini duodecim, macerationem frigidam per septimanam et Spiritus Vini rectif. unciam.

Acetum Rosarum compositum. (*Sw*. Vm.*)

℞. Flor. sicc. Rosarum rubr. part.
unam c. dim.
Flor. sicc. Rhois . partem unam.
Vini Cydoniorum partes quatuor.
Aceti rubri . . partes decem.
Macera frigide per dies decem, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Sw.* Rosarum partem unam, Rhois unam, Aceti duodecim et infusionem blandi caloris ope.

Aſtringirend, fäulnißwidrig, äußerlich bei Blutflüſſen und Ecchymoſen.

Oleum Rosarum s. rosatum. (Br. Gal. His. His3 Pm. Sar. Wir. *Fi. Re. T.*)

℞. Rosarum rec. part. unam c. dimid.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere per dies duos in balneo aquae, exprime post refrigerationem et operationem semel adhuc repete. (Sar.)

Pm. Rosarum libram unam, Olei quatuor, infusionem calidam per tres dies, expressionem et defaecationem olei; — *Fi.* Rosarum libram unam, Olei quatuor, macera per duos dies, coque per horae quadrantem, exprime et oleum decantha; — *T.* ut oleum iridis.

℞. Rosarum contus. partes quatuor.
Olei Olivarum . partes quinque.
Post octo dierum soli expositionem coque ad consumptionem humidi et cola cum expressione. (Br. His. Wir.)

His3. Petalor. libras tres, Olei octo, macerationem solis calore aut loco calido per triduum vel quatriduum et caetera ut antea; — *Re.* Petal. contus.

partem unam, quatuor Olei macerare per septimanam, exprimere oleum et hoc repetere, donec odorem fortem praebeat.

℞. Rosarum contusarum partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.

Per tres dies soli exposita cola exprimendo et operationem bis repete, suprema vice illam per tres menses producendo.

Gegen Frostbeulen gerühmt.

Adeps Rosarum (*Gr.*): aus den Blumenblättern der Damascener Rosen zur Verdünnung des Geruchs des Moschus, Zibeth's und Ambra's.

Oleum Rosae s. Rosarum aethereum, Aethereoleum Rosarum. (Bor4 Gal. Sar. *Gr. T.*)

℞. Petal. rec. Rosarum part. quinque.
Aquae . . . . partes septem.
Destillent. (Gal.)

Sar. Rosarum partes viginti quinque, Aquae septuag nta quinque et tres Salis.

Bor4. Oleum venale; — *T.* ut oleum florum aurantiorum; — *Gr.* Petala in Aquae salitae pondere duplo per aliquot dies macerata, destillationi et binis cohobationibus subjecta.

Aqua Rosae s. (*ex petalis*) *Rosae Centifoliae s. Rosarum Damascenarum s. Rosarum.* (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Petal. rec. Rosarum partes tres
Aquae . . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma. Destillent partes octo. (Fer. Hass. *Pid.*)

Lus. Florum partes sex et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — Fenn. et Suec. Florum partes tres, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Gen. Florum partes quatuor, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes sex; — Ams. B. et Bel. Florum partem unam et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes decem; — Du. *Gr.* Florum libras sex et Aquae q. s.; destillent octarii octo; — Han. O. et Pol. Florum partem unam et Aquae q. s.; destillent partes quinque; — *Fi.* Rosarum libras tres, Aquae libras quindecim, post 12 horarum digestionem destillent libras sex; — *Gr.* Florum libras tres, Aquae octarios quatuor; destillent in balneo mariae; — Am. Lon. LonN. et *Gr.* Florum libras octo et Aquae satis; destillent octarii octo; — An. Florum partem unam et quinque Aquae; destillent partes quatuor; — LP. *Br.* Florum partes tres (quatuor LP.) et Aquae quindecim; destillent partes octo; — LH. Florum partes tres, Aquae sedecim, destillent partes octo; — Pm. Sar. et Wür. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillent partes duae; — Gal. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet una pars; — R Florum partes decem et Aquae quadraginta; destillent partes quindecim; — Ba. Florum partem unam et novem Aquae; destillent partes tres; — Sax. Florum partem unam et decem Aquae; destillent partes quatuor; — Pal. et Wir. Florum partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Bor4. Florum Rosarum incarn. rec. libras quatuor, Aquae q. s.; destillent librae viginti; — HassP. Rosarum pallidarum libras sex, caeterum ut Bor4.; — RC. Rosarum Centifoliarum libras duas, Aquae q. s.; destillent librae decem.

℞. Petal. rec. Rosar. . partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.

Floribus in sacco e tela confecto et in medio cucurbitae, ita ut aquam non attingat, inclusis destillent absque bullitione partes sex. (Ful. Li.)

℞. Petal. rec. Rosar. partes quatuor.
Aquae . . . quantum sufficit.
Salis culinaris . partem unam.
Destillent partes viginti. (*Sw.*)

A. Florum sale conditorum partem unam et octo Aquae; destillent partes tres; — D. Florum salitorum partem unam et sex Aquae; destillent partes tres; — Bor4. Florum sale conditorum libras sex, Aquae q. s.; destillent libras viginti; — HassP. Florum salitorum libras septem, caeterum ut Bor4.; — *Gr.* Florum salitorum libras sexaginta, Santali citrini uncias octo, Aquae q. s., abstrahantur congii sedecim; — *T.* Rosarum Gallic vel albarum q. placet, Aquae salitae (Aquae partes 100, Salis marini 5) pondus duplum; destillet dimidia pars.

℞. Petal. rec. Rosar. partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.
— purae part. centum sexaginta.
Destillent partes quadraginta. (*Vm.*)

℞. Petal. rec. Rosar. . libr. unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad prohibendum empyreuma; macera per duos dies; destillent librae decem, tunc producto adde
Aquae Vitae . . uncias quinque.
Misce bene. (Ed. *C.*)

His3. Petalorum Rosae pallidae s.

aromaticae libras sedecim, Aquae quadraginta, macerare per biduum, destillare libras viginti et addere Alcoholis Vini unciam unam.

℞. Olei Rosarum . unciam unam.
Spiritus Vini . congium unum.
Aquae destillatae . . . . q. s.
Destillent congii quadraginta. (*Gr.*)

Gabe, eine bis zwei Unzen.

Lac Rosarum (*Gr.*): Kali praep gr. 6, Ol. Amygd. unc 1, Ess. Berg. drachm. 2, Aq. Rosar. unc. 3, Aq. Flor Aur. drachm. 2. misce; vel: Amygdal. unc. 8, Ol. Amygd., Sapon Hispan., Cerae alb., sing. unc $\frac{1}{2}$, Cetacei drachm. 2, Ol. Lavand. dr. $\frac{1}{2}$, Aq. Ros libr. 3, Spir. Vini rect. 1; vel: Amygd. amar. unc. 8, Aq. dest unc. 6, Aq. Flor. Samb. unc. 4, fiat emulsio, cui adde Ol. Tart. per deliq. drachm. 3, Tinct Benz. dr. 2. misce; (*Re.*) Ol. Amygd., Sapon. Hisp., sing. unciam, Ol. Lavand., Cerae albae, Cetacei, sing. drachmas duas, Spir. Vini octarium, Aq. Ros. quadrantes (quarts) duos cum dimidio, Amygdalarum uncias duodecim, Subcarb. Potass. impuri drachmam in Aq calid. drachm. duab. solut. Cosmetisches Waschmittel. — *French milk of roses:* Aq. Ros. libr. $1\frac{1}{2}$, Tinct. Benz., Tinct. Storac., sing. unc., Spir. Ros. drach. 2. — *German milk of r.:* Extr. Sat. drachm. 6, Spir. Lavand. unc 1, Aq. Ros. unc. 6, Aq. font. unc. 18, Ceruss. unc. $\frac{1}{2}$.

Spiritus Rosae s. Rosarum. (Bor4. Br. Pal. Sax. Wir. *Gr.* T.)

℞. Rosarum recentium partes duas.
Alcoholis,
Aquae, singulorum partem unam.
Destillet una pars. (Sax.)

Gr. Petalor. libras octo, Spir. rectif. quatuor, macera et in balneo aquae ad sicc. destilla.

℞. Petalorum Rosarum libram unam.
Vini albi . . . . libras decem.
Alcoholis . . . . sesquilibram.
Destillet dimidia pars, productum novis Floribus infunde et destillet denuo dimidia pars. (Br. Wir.)

℞. Petal. Rosar. pallid.
libr. duodecim.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fermenti . . . . semilibram.
Aquae tepidae . . libras triginta.
Fermentationi tamdiu subjice, donec odor vinosus non amplius evolvatur; destillent deinde et productum rectificetur. (Pal. Wir.)

℞. Olei Rosarum scrupulum unum.
Spir Vini Gallici fortior. unc. sex.
Mixta filtrentur. (Bor4.)

Gr. Olei drachmam, Spir rectif. congium; vel: Olei drachmas tres, Sp. rect octarios duos. (*Essence of roses.*)

T. Rosarum rubr. libras decem macerata destillent in balneo aquae cum Alcoholis 35° B. libris quinque, donec tres quadrantes circiter obtenti sint.

Herzstärkend, Nervenmittel, heutzutage nicht mehr gebraucht und auch ehedem häufiger äußerlich als innerlich.

Tinctura Florum Rosarum s. Rosarum rubrarum aquosa s. Rosarum acidula. (Bor. Bor4. Br. Han. His3. O. Pol. Sax. Wir. *Vm.*)

℞. Petal. Rosar. pallid. semunciam.
Acidi sulphurici drachmam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Digere per horas 24, cola exprimendo et filtra. (Wir.)

Bor. Bor4 Han. O. et Sax. Petalorum sesquiunciam, Acidi semunciam, Aquae bull. uncias duodecim et horas 12 macerationis; — His3. Rosarum siccarum semunciam, Aquae fervidae libras tres, horae quadrantem infusionis et Acidi sulphurici aquosi scrupulum unum; — Pol. Petalorum, Acidi, sing. drachmam, Aquae unciam et tres horas macerationis.

Kühlend, lindernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Oxyrhadinum. (*Gr.*)

℞. Olei rosati . . . uncias duas.
Aceti rosati . . unciam unam.

Als Liniment bei herpes und erysipelas.

Julapium s. Julepum rosatum s. Rosarum s. regium, Syrupus regius s. alexandrinus. (Br. Hass. Pal. Wir. *Gr. Pid. Sp.*)

℞. Aquae Rosarum . uncias viginti.
Sacchari albi libr. duas c dimidia.
Ebulliant semel et colentur. (Pal. Wir. *Sp.*)

Br. Aquae uncias sedecim et Sacchari libras duas cum dimidia; — *Gr.* Hass. et *Pid.* Aquae uncias novem et Sacchari sedecim; — *Gr.* Aquae et Syrupi Sacchari, sing. part. aeq.

Collyrium adstringens. (*Ra.*)

℞. Aquae Rosarum,
Infusi Meliloti, sing. unc. quatuor.
Misce.

Collyrium Acidi acetici (*Re.*): Acidi acetici unciam, Spiritus diluti semunciam, Aquae Rosarum uncias octo, misce. — Bei schwachen thränenden Augen.

Mixtura detergens. (*Sm.*)

℞ Aquae Rosarum . uncias tres

Cremoris Lactis,
Albuminis,
Syr. Violarum, sing. unciam unam.

Von Boerhaave bei Schwämmchen und Geschwulst des Zahnfleisches in Gestalt von Collutorien.

Unguentum rosatum s. rosaceum s. Rosarum s. pomadinum s. refrigerans s. Aquae Rosae, Unguentum rosatum malvinum. (Am. B⁴. Bor. Bor4. Br. Fenn. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Axungiae Porci . quantum vis.
Adde, continue cum pistillo ligneo agitando,
Aquae Rosarum quantum sufficit vel tantum, donec axungia alborem niveum acceperit. (Sax. Suec.)

Fenn. et Lus. Axungiae partes octo et Aquae Rosarum unam; — Pm. Axungiae libras duas (?), Sevi bovilli unam simul liquare, misturae adhuc tepenti commiscere Aquae Rosarum libras quatuor, cum pistillo ligneo per tres dies agitare, aquam ejicere etc. (*Ung. rosat. simplex*.) — *Unguentum rosatum malvinum* paratur, si libris tribus unguenti simpl. leni calore liquefacti Fol. contus. Malvae rec. et Solani nigri, sing. uncias sex immisces, post triduum exprimis et unguentum frigefactum cum spathula ab humore et a faecibus secernis.

℞. Axungiae Porci unc. triginta duas.
Guttatim instilla
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Quando mixtura alborem sufficientem accepit, adde Oleum essentiale aliquid, ut forte illud Lavandulae. (R.)

Br. Wir. et Wür. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae libram et Olei Ligni Rhodii guttas duodecim; — *Sp.* Axungiae in Aqua Rosarum lotae uncias duodecim et Olei Ligni Rhodii guttas sedecim; — *Sw.* Axungiae in Aqua Rosarum lotae libram et Olei Ligni Rhodii drachmam.

℞. Axungiae Porci . . libras duas.
Sebi ovilli . . . . uncias tres.
Liquata simul infunde in Aquam Rosarum, agita bene et refrigerata sicca. Libris singulis addere potes Olei Ligni Rhodii drachmam. (Br.)

Am. et *C.* liquare Cetacei semunciam et Cerae albae drachmam in Olei Amygdal. dulc. unciis duabus, addere Aquae Rosarum uncias duas et ad refrigerationem usque agitare.

℞. Axung. Porci in Aqua Rosarum lotae . . . . . uncias octo.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua lente et post refrigerationem sensim adde
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Olei ess. Citri drachmam unam.
Misce bene. (Bor. Han. Pal.)

Bor4. Aquae Rosarum uncias duas absque oleo; — *Vm.* liquare Cerae albae partem unam, addere Axungiae partes quatuor et sensim addere Aquae Rosarum sesquiunciam; — Ful. Terere Axungiae uncias triginta duas cum Aquae Rosarum quatuor, liquare deinde axungiam prope ignem, ab aqua separare et terere cum Olei ess Citri guttis sexaginta; — Li. Conterere Axungiae libram unam et Aquae Rosarum, Aquae Flor. Aurant., sing. duas, axungiam liquare, ab aqua separare et terere cum Olei Bergamottae guttis viginti quatuor et Olei Lavandulae guttis quindecim.

℞. Axungiae Porci . libram unam.
Aquae Rosarum,
— Flor. Aurant., sing. unc. duas.
Olei ess. Citri gutt. viginti quatuor.
— — Lavandulae gutt. quindecim.
— — Caryophyll. gutt. duodecim.
Misce. (Hass. O. *Pid.*)

Sw. Axungiae libram, Aquae Flor. Aurant. semunciam, Aquae Rosarum uncias tres, Oleorum Citri, Lavandulae et Caryophyllorum, sing. guttas duodecim.

℞. Axungiae Porci . uncias decem.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liqua et adde
Aquae Rosarum . . uncias tres.
— Flor. Aurant. unciam unam.
Sepone per horas 24, decantha aquam et axungiam tritura cum
Olei ess. Lavandulae,
— — Citri, sing. semidrachma.
Misce bene. (B⁴.)

HassP. Axungiae Porci libram unam, Cerae albae uncias tres, Aquae Florum Naphae, Aquae Rosarum, sing. uncias duas, Olei de Cedro guttas viginti quatuor, Olei Bergamotte, Lavandulae, sing. guttas duodecim.

℞. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae uncias duodecim.
Adde sensim, continue terendo,
Aquae Rosarum . . uncias tres.
— Florum Aurantiorum,
Spir. Rosarum, sing. semunciam.
Olei ess. Lavandulae semidrachmam.
— — Ligni Rhodii,
— — Citri, sing. gutt. sedecim.

Misce bene. (*Sp.*)

℞. Olei Rosarum infusi libram unam.
Cerae albae . . . uncias tres.

Liquata simul et mixta in Aqua lava et subige, donec alba sint reddita. (Wir.)

Sar. Olei rosati sesquilibram et Cerae uncias sex.

℞. Axungiae Porci . . libras tres.
Storacis Calamita,
Benzoës,
Iridis Florent., sing. unc. unam.
Fructus Citri,
— Aurant., sing. . . no. 2.
Poma Renetia . . . . . no. 4.
Coque ad consumpt. humidi et adde
Olei ess. Cinnamomi,
— — Caryophyll., sing. gutt. viginti quinque.

Subige totum cum Spiritu Rosarum per fermentationem. (Pal.)

℞. Caryophyllorum drachmas duas.
Cinnamomi,
Benzoës,
Storacis Calamita, sing. drach. tres.
Macidis . . . scrupulos duos
Lavandulae,
Ligni Aloës,
— Rhodii, sing. drach. unam.
— Sassafras . semidrachmam.
Iridis Florentinae unciam unam.
Aquae Rosarum . . semilibram.
Axungiae Porci . libram unam.
Pulpae Pomorum Renet. unc. sex.
Sebi hircini . . uncias quatuor.

Coque lente, digere deinde per tres dies; coque iterum ad omnis aquae consumptionem; colaturam cum Aqua Rosarum subige, donec albescat et adde
Olei Ligni Rhodii guttas viginti.
Misce bene. (B*.)

Dieſe Formel, *Unguentum pomadinum*, iſt von Cartheuſer.

℞. Axungiae cum Aqua Rosarum lotae,
Rosar. pallid. contus., sing. part. aeq.

Sepone per dies duos, tunc axungiam liqua et in ea macera Rosarum aequalem copiam per duos dies, filtra, faeces exprime, liquefac deinde in balneo aquae et sepone. (Gal. *T.*)

Br. liquare simul Axungiae libras duas et Sebi uncias tres, addere Rosarum rubr. contus. uncias duas et Alcannae semunciam, colare et lente, spatulae ope agitando, refrigefacere; — Sar. Digerere per tres dies in balneo Aquae Rosarum rubr. et pallid., sing. libras duas in Axungiae sex, exprimere, addere Cerae uncias sex, liquare inter cineres calidos et seponere, ut refrigerent

℞. Axungiae Porci libras duodecim.
Petal. Rosarum pallid. libras sex.

Post tres dies macerationis coque ad humidi consumpt. et cola exprimendo. (His. His8.)

Pal. et Wir. coquere Axungiae libram unam cum Rosarum unciis quatuor ad humidi usque consumptionem, colare exprimendo et addere Essentiae Rosarum grana tria; — *Fi.* Axungiae libras viginti, Petalorum rec. Rosarum libras quindecim, Aquae Rosarum libras septem; mixta sepone, per dies quatuor in balneum aquae immerge, coque per horas duas, exprime etc.

℞. Axungiae Porci . libras novem.
Sebi ovilli . . . libram unam.
Petal. rec. Rosarum libr. novem.

Digere petala per unum diem in utroque adipe et cola exprimendo. (Fer.)

Species de Hyacintho. (Br. Pal. Wir.)

℞. Hyacinthi praeparati,
Boli Armenae,
Terrae Lemniae,
Corallii rubri praep., sing. sesquidrach.
Margaritarum orientalium praep.,
Smaragdi praep, sing. drach. unam.
Cornu Cervi philosophice praep.,
Rasurae Eboris praeparati,
Ossis Cordis Cervi praeparati,
Radicis Fraxinellae,
— Tormentillae,
Santali albi,
— citrini,
— rubri,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Seminum Acetosae,
— Citri,
— Portulaccae,
Croci,
Myrrhae, sing. scrupulos quatuor.

Completae nominantur, si addis
Ambrae griseae,
Moschi, sing. scrupulos quatuor.

Fiat pulvis — Schwach adſtringirend. — Gabe, ein halber bis ein ganzer Scrupel.

Pulvis contra abortum. (Pal Wir.)

℞. Granorum Kermes . semunciam
Ligni Santali rubri,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Corallii rubri praeparati,
Rasurae Eboris, sing. drach. tres.
Mastichis,
Nucis mosch., sing. drach. unam.
Sacchari pondus omnium aequale, (Wir.)

Pal. Kermetis drachmam unam, Santali rubri semidrachmam, Caryophyllorum scrupulum unum, Nucis mosch.

duos, Radicis Tormentillae semidrachmam, Margaritarum, Corallii rubri, albi, sing. scrupulum unum et Sacchari drachmas tres

Gabe, eine Drachme. — Reizend und daher eher Abortus befördernd, als verhütend.

Pulvis cephalicus ruber. (*Vm.*)

℞. Pulv. Rosarum rubr. uncias sex.
— Acidi tartarici semunciam
— Iridis Florent. uncias sex.
Misce et massam cum Aqua Rosarum humecta.

Pulvis nasalis odoratus. (Pal.)

℞. Petal Rosarum rubr. drach. sex.
Flor. Calcitrapae,
— Calendulae,
— Caryophyllorum, sing. drach. unam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Majoranae,
Serpylli,
Thymi, sing. . scrupulum unum.
Pulveratis adde
Olei ess. Ligni Rhodii gutt. quatuor.
— — Caryophyll. guttas sex.

Pulvis s. Species Diarrhodon. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Petal. Rosarum rubr. unc. duas.
Santali albi,
— rubri, sing. . semunciam.
Radicis Liquiritiae,
Semin. Anisi, sing. drach. duas.
— Basilici,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Rhei,
Croci,
Rasurae Eboris,
Cornu Cervi philosophice praep.,
Mastichis,
Matris Perlar. praep., sing. drach. unam.
Fiat pulvis. (Pal. Wir.)

℞. Rosarum rubrarum uncias duas.
Santali citrini . unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Croci,
Mastichis,
Nardi Indicae,
Foeniculi, sing. . drach. unam.
Fiat pulvis. (Sar.)

Magenstärkend. — Gabe, von einer halben Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis pro epithemate cordis et pulsuum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Rorismarini,
Herbae Majoranae,
— Melissae,
Flor. Cheiri,
— Caryophyll. rubr., sing. semunciam.
— Lavandulae,
— Rosarum, sing. . drach. sex.
Macidis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës,
— Rhodii,
Cinnamomi, sing. drachmas sex.
Cort. Citri,
— Aurant, sing. drach. tres.
Concisa et contusa misce. (Wir.)
Sp. pulverem parare jubet.

℞. Flor. Buglossi,
— Boraginis,
— Melissae, sing. semimanipulum.
Santali albi,
— rubri,
— citrini,
Petal. Rosar. rubr., sing. drach. duas.
Corticis Citri,
Seminum Acetosae,
Ligni Aloës,
Caryophyll, sing. sesquidrachmam.
Doronici,
Radicis Behen rubri,
— — albi,
Succini, sing. scrupulos quatuor.
Fiat pulvis. (Pal.)

Species pro Decocto ad gangraenam. (Pal. Wir. *Vm.*)

℞. Fol. Marrubii,
— Pulegii,
— Rutae,
— Rorismarini,
— Salviae,
— Scordii, sing. . part. unam.
Florum Chamomillae vulgaris,
— Rosarum rubrarum,
— Sambuci, sing. part. duas.
— Althaeae . . . partes sex.
Seminum Foenu graeci partes octo.
— Lini partes viginti quatuor.
Concisa et contusa misce. (*Vm.*)

℞. Herbae Millefolii,
— Absinthii, sing. drach. sex.
— Scordii,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Rutae,
Flor. Sambuci,
— Hyperici, sing. semunciam.
— Rosarum . unciam unam.
Myrrhae . . . . drachmas sex.
Aloës,
Asae foetidae, sing. . semunciam.
Lithargyri . . . . uncias sex.
Concisa et contusa misce. (Pal. Wir.)

Man läßt es in fünf Pfund Kalkwasser und zwei Pfund Essig kochen und wendet die Abkochung, mittelst Flanell, warm an. Auch kann man vier bis sechs Unzen Kampherspiritus zusetzen. — Heutzutage zieht man bei heißem Brand erweichende Mittel mit Recht vor.

Rosmarinus.

Rosmarinus officinalis, L.; Rosmarin; Romarin officinal (*Gal.*); Rosemary (*Ang.*); Rosmarin (*D. Suec.*); Hasalban achsir (*Ar.*); Rosmaryn (*B. Bel. Pol.*); Yong tsao (*C.*); Tay-duong-choi (*Co.*); Romera (*His.*); Ramerino, Rosmarino (*I.*); Alecrim Rosmarinho (*Lus.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. HisS. LH. Li. Lon. LouN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♄ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae, J.) Eine im südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 159. *Plenck* t. 18. *Hayne* VI. t. 25. Fl. méd. VI. 200.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores s. cacumina Anthos s. Rori-marini s. Rorismarini hortensis) an; es besteht aus dünnen, langen, aschgrauen Zweigen mit sitzenden, entgegengesetzten, etwas harten, schmalen, linienförmigen, oben grünen, unten weißlichen, an den Rändern eingerollten Blättern und blaßblauen, kleine buschige, achselständige, gegenüberstehende Trauben bildenden Blüthen. Es hat einen sehr durchdringenden, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, kampherartigen, etwas scharfen Geschmack.

Innerlich reizend, äußerlich auflösend.

Gabe des Pulvers, von achtzehn Gran bis zwei Scrupel.

Conserva Anthos s. Rorismarini. (Ams. B. Bel. Sar. Wir. *Ca. Gr. T.*)

℞. Flor. Anthos contus. part. unam.
Sacchari albi . . . partes tres.
Misce. (Ams.)

B. Bel. et Wir. Florum partem unam et Sacchari albi duas; — Sar. Florum partem unam et Sacchari ad plumam cocti tres; — *Ca.* Florum pulv. partem unam, Sacchari quatuor et Aquae q. s.; — *T.* ut conservam rosarum.

Pulvis aromaticus. (*Ra.*)

℞. Pulv. Rorismarini,
— Salviae,
— Thymi, sing. unc. quatuor.
Salis Ammoniaci,
Camphorae, sing . grana viginti.

Von Dupuytren äußerlich bei Brand oder Hospitalfäulniß, statt der China.

Species aromaticae. (Ful.)

℞. Radicis Iridis Florentinae,
— Zedoariae,
Herbae Melissae,
— Rorismarini,
— Serpylli,
Flor. Lavandulae, sing. drach. sex.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi, sing. . drachm. duas.

Auflösend, nervenstärkend, stärkend, zu Kräutersäckchen.

Species sternutatoriae (*Re.*): Thymi, Tussilaginis, Betonicae, Origani, Hyssopi, Rorismarini, Lavandulae, Euphrasiae, sing. part. aeq.

Species Dianthos. (Wir.)

℞. Radicis Liquiritiae drachmas sex.
— Zingiberis,
— Zedoariae,
— Galangae,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Macidis,
Nucis moschatae,
Nardi Indicae, sing.
scrup. quatuor.
Flor. Rorismarini unciam unam.
— Rosarum,
— Violarum, sing. drach. sex.
Semin. Anisi,
— Foeniculi, sing.
scrup. quatuor.

Fiat pulvis. — Gabe, von einer halben bis einer ganzen Drachme. — Gegen Kopfschmerz, magenstärkend, blähungtreibend.

Extractum Rorismarini. (Wür.)

℞. Summit. floresc. Rorismarini,
Alcoholis, sing. . . libram unam.
Aquae communis . libras octo.

Digere blando calore, per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, alcoholem destillando elice et residuum ad aptam consist. consume.

Infusum Rorismarini. (GalM.)

℞. Summit. floresc. Rorismarini,
Liquiritiae rasae, sing.
drach. duas c. dimidia.

Aquae bullientis quantum sufficit ut librae duae colaturae obtineantur. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Mel Rorismarini s. anthosatum. (Ful. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞, Flor. rec. Rorismar. . unc. octo.
Aquae fontanae . uncias quatuor.
Mellis despumati calidi libras duas.

Digere per dies 10 ad 12 in loco calido, tunc in balneo aquae coque et cola exprimendo. (Pal. Wir.)

Sar. digerere, tunc coquere in balneo aquae Mellis libras quatuor et Florum duas; — *Sp.* digerere per dies aliquot Herbae Rorismarini sicc. uncias octo in Mellis despum. unciis viginti quatuor; — Ful. Commiscere Infusi Rorismarini partem unam et Mellis despumati quatuor.

Reizend, gegen Kopfſchmerz, Kolik, bei Blähungen und auf den Uterus wirkſam. — Man kann es auch zu Klyſtiren ſetzen.

Balneum aromaticum. (*Ca.*)

℞. Rorismarini,
Thymi,
Salviae,
Origani,
Menthae, sing. . . . semilibram.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Decocto adde
Essentiae Saponis uncias quatuor.
Salis Ammoniaci . uncias duas.

Acetum Rorismarini s. anthosatum. (Gal. *Gr. T.*)

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Aceti albi . . . partes sedecim.

Macera per dies 14 in vase tecto, subinde agitando, cola et filtra.

Gr. Florum libram unam, Aceti opt. duodecim; — *T.* Florum uncias sex, Aceti libras sex, decem dierum digestionem etc.

Acetum s. Acidum aceticum aromaticum s. odoratum. (Bor. D Ed. Fer. GalF. Han. HassP. LH. LP. Lus. O. Pal. Suec. Wir. *C. Fi. Gr. Huf. Re. Sp. T.*)

℞. Summitatum Rorismarini,
Fol. Salviae, sing. unciam unam.
Florum Lavandulae sesquiunciam.
Caryophyllorum . semidrachmam.
Aceti . . . . . libras duas.

Macera per dies septem et filtra. (Ed. *C.*)

Re. Florum Lavandulae et Caryophyllorum, singulorum semunciam, caeterum ut antea; — *Gr.* Rorismarini, Salviae, sing. uncias quatuor, Lavandulae duas, Caryophyllorum drachmam, Aceti destillati congium; — GalF. LH. Lus. Suec. et *Sw.* Rorismarini, Salviae, sing. uncias quatuor, Lavandulae uncias duas, Caryophyllorum drachmas duas et Aceti libras octo; — LP. Rorismarini uncias sex, Salviae tres, Lavandulae tantidem, Caryophyll. drachmas tres, Camphorae, in Alcohole dissol. semunciam, Aceti libras octo, octo dies macerationis.

℞. Herb. Absinthii,
— Rorismarini,
— Salviae,
— Menthae pip., sing. unc. duas.
Cinnamomi . . . . semunciam.
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. drach. duas.
Aceti . . . . . libras octo.

Digere super arena tepida, cola exprimendo et filtra. (D. O.)

℞. Radicis Zedoariae,
Caryophyllorum, sing. semunciam.
Herb. Absinthii,
— Rorismarini,
— Salviae
— Menth. pip., sing. unc. duas.
Aceti . . . . . libras octo.

Post sufficientem macerationem cola exprimendo et colaturae adde
Spir. Rorismarini . unc. quatuor.

Misce bene. (Bor. Han. HassP. Pol. *Huf.*)

℞. Rad. Cyperi rotundi,
— Galangae minoris,
— Zedoariae, sing. semunciam.
Herbae Rorismarini,
— Salviae,
Flor. Lavandulae,
— Convallariae majalis,
— Rosarum, sing. drach. tres.
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cort. rec. Citri, sing. drach. duas.
Aceti . . . . . libras duas.

Post tres dies digestionis filtra. (Wir. *Sp.*)

℞. Rad. Zedoariae,
— Galangae, sing. semunciam.
Herbae Rorismarini,
— Rutae,
— Mari,
Flor. Lavandulae, sing. drachm. duas.
Corticis recentis Citri,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Cardamomi min., sing. semunciam.
Acoti . . . uncias quadraginta.
— Convallariae,
— Caryophyll. rubr., sing. uncias duas.

Macera et cola. (*Sp.*)

℞. Summit. Rorismarini,
— Absinthii,
— Salviae,
— Rutae, sing. sesquiunciam.

Calami aromatici,
Cinnamomi,
Caryophyll., sing. drachmas duas.
Aceti . . . . . libras sex.
Post octo dies infusionis exprime et colaturae adde
Camphorae . . . unciam unam.
Addi possunt Allii drachmae duae. (Fer.)

T. Summit. Absinthii Romani et Pont., Rorismarini, Salviae, Menthae pip., Rutae, Florum Lavandulae, sing. uncias duas, Allii, Calami, Cinnamomi, Nucis mosch., Caryophyllorum, sing. drachmas duas, Aceti rubri fortioris libras octo, dies quindecim macerationis et Camphorae in Spiritu Vini 36° B. solutae semunciam.

Das nach den beiden letzten Formeln bereitete Präparat hat noch mehr Aehnlichkeit mit dem Vierräuberessig als die vorhergehenden.

Essentia Rorismarini. (Br.)

℞. Summit. floresc. Rorismarini sesquiunciam.
Spiritus Rorismarini uncias sex.
Post sufficientem digestionem exprime et filtra. — Reizend.

Fomentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Herbae Rorismarini . semunciam.
Vini rubri,
Aquae, singulorum uncias tres.
Infunde et exprime.

Oleum Rorismarini (*coctum*) (His. His3.)

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Olei Olivarum . . . partes tres.
Post tres vel quatuor dies digestionis coque ad consumptionem humidi et exprime.

His3. Summitatum floridarum libras tres, Olei octo caeterum ut antea.

Oleum essentiale Rorismarini s. Rorismarini officinalis s. Anthos aethereum, Aethereoleum Anthos s. Rorismarini. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Li. Lon. LonN. LP. O. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wür. *Br. C. Gr. Re. Sw. T.*)

℞. Florum Rorismarini quantum vis.
Aquae . . . quantum requiritur.
Destillent. (Am. Ams. B. Bel. Du. Ed. Fer. Gen. Lon. LonN. R. Suec. *Br. C. Gr. Re.*)

LP. Aquae quantum satis ut planta commode natet, macerationem per aliquot dies et destillationem; — An. Florum partes tres et decem Aquae; — Gal. Florum quinque et septem Aquae; — Ful. et Li. Aquae tres; — *Sw.* Aquae quatuor; — D. Aquae sex; — Bor. Han. O. Pol. et Sax. Aquae octo; — Ba. Aquae novem; — A. Aquae duodecim; — *T.* Aquae bull. duas.

℞ Herb. floresc. Rorism. part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis destillent. (Br. Pal. Sar.)

℞. Herbae Rorismarini quantum vis.
Aquae dest. Rorismarini. . q. s.
Destillent. (Wür.)

Bor4. HassP. Oleum venale pond. spec. = 905. Bor4. = 0,865. HassP.

Gabe, zwei bis fünf Tropfen.

Oleum Rorismarini rectificatum (*Gr.*): redestillando oleum destillatum, donec dimidium transierit.

Balsamum appolecticum s. aromaticum s. cephalicum Saxonicum s. nervinum s. Scherzeri s. stomachicum, Linimentum aromaticum stimulans, Unguentum aromaticum s. nervinum, Linimentum stomachicum. (B*. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. Li. Pal. Sax. Suec. Wir. Wür. *Ca. Pid. Sp. Sw. Vm.*)

1) Mit Perubalsam.

℞. Olei Nucis mosch. expr. unc. unam.
— ess. Rorismarini,
— — Caryophyll., sing. drachm. unam.
— — Succini semidrachmam.
Balsami Peruviani drachm. unam.
Misce triturando. (Li.)

Pid. Olei Nucis mosch. unciam, Olei Caryophyll., Lavandulae, sing. drachmam, Olei Succini scrupulum et Balsami sesquidrachmam; — Sax. Olei Nucis mosch unciam, Olei Caryophyll., Rorismarini, sing. drachmam, Olei Succini scrup. et Balsami sesquidrachmam; — Hass. Olei Nucis mosch. unciam, Olei Caryophyllorum, Menthae pip., sing. drachmam, Olei Succini scrup. unum et Balsami sesquidrachmam, — *Vm.* Olei Nucis mosch. uncias tres, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, Succini, sing. semunciam et Balsami drachmas duas; — *Sw.* Olei Nucis mosch. drachmas tres, Olei Caryophyllorum, Succini, sing. scrupulum unum et Balsami sesquidrachmam, vel: Olei Nucis mosch. unciam, Olei Caryophyllorum, Lavandulae, sing. drachmam, Olei Succini scrupulum et Balsami sesquidrachmam; — D. Olei Nucis mosch. unciam, Olei Caryophyllorum, Lavan-

dulae, Rorismarini, sing. semidrachmam, Olei Succini semiscrupulum et Balsami drachmam unam.

℞. Olei Nucis moschatae partes tres.
— ess. Caryophyllorum,
— — Benzoës,
Bals. Peruviani, sing. part. unam.
Misce bene. (B*.)

℞. Olei Nucis mosch. unciam unam.
— ess. Absinthii,
— — Corticis Aurantiorum,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Menthae, sing. semidrachmam.
Bals. Peruviani drachmam unam.
Misce. (Pal. Wir.)

Han. eandem formulam sed omisso oleo corticum aurantiorum.

℞. Olei Nucis mosch. unciam unam.
— ess. Rorismarini,
— — Lavandulae,
— — Caryophyll., sing. semidrachmam.
— — Succini,
Moschi c. Alcohole triti, sing. semiscrup.
Bals. Peruviani drachmam unam.
Misce. (Br.)

℞. Olei Nucis mosch. unc. tres c. dimid.
— Jasmini,
— Cinnamomi,
— Ligni Rhodii, sing. sesquidrachmam.
— Lavandulae,
— Majoranae,
— Caryophyll., sing. drach. unam.
— Rutae,
— Succini, sing. scrup. unum.
Moschi,
Ambrae gris., sing. grana sedecim.
Zibethi . . . . semiscrupulum.
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Eboris usti nigri quantum sufficit.
Misce. (Wir. *Sp.*)

Pal. Olei Nucis moschatae unciam, Olei Rorismarini, Caryophyll., Cinnamomi, sing. scrupulum, Olei Lavandulae, Ligni Rhodii, Majoranae, Rutae, Succini, sing. semiscrupulum, Balsami sesquidrachmam et Puliginis Succini quantum sufficit.

℞. Olei Palmae,
— Nucis moschatae,
Medullae cervinae,
— Cruris bovini, sing. unc. quatuor.
Adipis Hominis,
— Melis,
— Viperae, sing. unc. unam
Liqua leni calore et adde
Olei ess. Lavandulae,
— — Menthae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Thymi,
— — Caryophyll., sing. drachmam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Balsami Peruviani unciam unam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Medullae bubulae,
Olei Nucis mosch., sing. uncias quatuor.
Liquata in lagenam amplo ostio munitam immitte et adde
Olei ess. Rorismar. drachm. duas.
— — Caryophyllorum,
Camphorae, sing drach. unam.
Balsami Peruviani in Alcoholis (36°) semuncia dissoluti drach. duas
Liqua omnia in balneo aquae. (Gal. *Ca.*)

T. Camphorae drachmas duas, Balsami in Alcoholis q. s. soluti semunciam, caeterum ut antea.

β) Ohne Perubalſam.

℞. Olei Nucis mosch. unciam unam.
Cerae flavae . . drachmas duas.
Liqua lente et adde
Olei ess. Caryophyllorum,
— — Lavandulae, sing. drachm. duas.
— — Succini semiscrupulum.
Misce. (Fenn. Suec.)

℞. Sebi ovilli . . . . libras duas.
Olei Chamomillae cocti,
Olei Majoranae cocti,
singulorum uncias quatuordecim.
Liqua et adde ab igne removendo
Olei ess. Rorismarini unc. duas.
Misce bene. (Wür.)

℞. Olei Nucis mosch. unciam unam.
— Succini,
— Caryophyll., sing. semidrach.
— Lavandulae,
— Juniperi, sing. drach. unam.
Misce frigide. (Ful.)

℞. Olei Nucis mosch. . . part. 120.
— Lavandulae,
— Succini, sing. partes quatuor.
— Rorismarini . . partes sex.
— Majoranae,
— Menthae pip., sing. part. tres.
— Macidis . . . partes duas.
Contere. (B*.)

Ca. Olei Nucis mosch. drach. triginta tres, Oleorum Lavandulae, Succini, sing. sesquidrachmam, Oleorum Origani, Salviae, Majoranae, Rorismarini, sing. drach. unam, Oleorum Rutae, Macidis, Menthae, sing. scrupulos duos; — *Sp.* Olei Nucis mosch. sesquiunciam, Oleorum Majoranae, Lavandulae,

Digitized by Google

Rorismarini, Succini, Serpylli, sing. drach. duas, Oleorum Rutae, Pulegii, Melissae, Menthae, Cardamomi, sing. scrup. unum; — Br. Olei Nucis mosch. uncias duas cum dimidia, Oleorum Cort. Aurant., Caryophyllorum, Macidis, sing. drachmam, Oleorum Rorismarini, Lavandulae, Absinthii, Cumini, Anethi, sing. semidrachmam, Olei Rosarum parvam quantitatem et Cerae albae semunciam; — Wir. Oleorum Lavandulae, Succini, sing scrupulum unum, Oleorum Pulegii, Majoranae, Salviae, Rorismarini, Saturejae, sing. grana quindecim, Oleorum Rutae, Macidis, sing. semiscrupulum, Oleorum Menthae, Origani, sing. grana duodecim et Olei Nucis mosch. unciam.

℞. Olei Nucis mosch. unciam unam.
— Succini . . semidrachmam.
— Rosarum,
— Cinnamomi, sing. scrup. unum.
— Lavandulae,
— Majoranae, sing. gutt. quindecim.
— Rutae,
— Benzoës, sing. semiscrupulum.
— Caryophyllorum,
— Cort. Citri, sing. gutt. quatuor.
Ambrae griseae sesquidrachmam.
Zibethi . . . scrupulos quatuor.
Moschi . . . drachmam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

Alle diese, ungeachtet der Namenverschiedenheit, einander sehr ähnlichen Präparate unterscheiden sich von dem Hoffmann'schen Balsam wesentlich nur dadurch, daß kein Alcohol dazu kommt. Man wendet sie besonders äußerlich in Einreibungen auf den Unterleib, bei Windcolik, hartnäckiger Diarrhöe und Leibschneiden der Rinder; auf die Schläfe bei Kopfschmerz; in die Hände, welche man dann vor die Augen hält, gegen Gesichtsschwäche und Triefäugigkeit, und auf die Glieder bei schwächlichen Kindern, an. Zuweilen läßt man auch bei Verdauungsbeschwerden einige Tropfen auf Zucker nehmen.

Balsamum vitae Hoffmanni s. ad modum Hoffmanni, Mixtura oleoso-balsamica s. succinea, Liquor balsamico-aromaticus, Tinctura Succini aromatica. (B*. Bor. Bor4. Br. D. HassP. O. Sax. Suec. Wir. *Au. Bo. Ca. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Olei Rorismarini . semunciam.
— Succini rectif. drach. duas.
Alcoholis . . . libram unam.
Misce. (Bor.)

℞. Florum siccatorum Lavandulae,
Fol. sicc. Majoranae,
— — Rutae, sing. unc. unam.
Corticis recentis Citri semunciam.
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Macidis, sing. . drachmas tres.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Aquae uncias sexaginta quatuor.
Destillando liquidi uncias octodecim elice et in producto solve
Bals. Peruviani sesquidrachmam.
Olei Succini rectif. semidrachmam.
Serva. (*Vm.*)

℞. Olei essentialis Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Macidis,
— — Cinnamomi,
— — Citri, sing. scrup. unum.
— — Rutae guttas decem.
Balsami Peruviani semidrachmam.
Alcoholis concent. uncias decem.
Digere frigide et per gossypium filtra. (B*. Bor. O.)

Bor4. omnium horum oleorum, addito illo Florum Aurantii, sing. scrupulum, Balsami drachmam et Spiritus Vini Gallici fortioris quantum antea. Pond. sp. = 0,850—0,860; — HassP. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cassiae cinnamomeae, de Cedro, sing. scrupulum, Oleorum Rutae et Succini rectificati, sing. guttas decem, Balsami semidrachmam, Spiritus rectificatissimi uncias decem; — Sax. Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, sing. partem unam, Oleorum Rutae, Succini rectificati, sing. partem dimidiam, Balsami Peruviani partem unam cum dimidia, Alcoholis concentrati partes ducentas quadraginta et dies quatuor frigidae infusionis; — D. Oleorum Lavandulae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, sing. scrupulum, Olei Succini rectificati guttas decem, Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis concentrati uncias decem et Radicis Alcannae parvam quantitatem ad colorandam tincturam; — *Bo.* Oleorum Cinnamomi, Lavandulae, Caryophyllorum, Citri, Rorismarini, Succini, sing. guttas decem, Balsami Peruviani liquidi guttas viginti et Spiritus Vini rectificati uncias duas.

℞. Balsami Peruviani,
Olei essentialis Lavandulae,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Citri,
— — Macidis,
— — Cinnamomi,

Olei essentialis Rutae,
— — Succini,
Ambrae griseae, sing. scrup. unum.
Misce bene et dissolve in
Alcoholis concentrati unciis decem.
Serva. (Br. Wir.)

Au. Balsami Peruviani grana quindecim, Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Serpylli, Rutae et Succini, sing. guttas decem et Alcoholis uncias quinque; — *Sp.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Cubebarum, Cardamomi, Cinnamomi et Citri, sing. scrupulum unum, Olei Macidis duos, Oleorum Rutae, Succini, Balsami Peruviani et Ambrae griseae, sing. semiscrupulum, Alcoholis uncias viginti; — *Ca.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi et Citri, sing. scrupulum, Oleorum Rutae et Succini, Ambrae griseae, sing. semiscrupulum, Alcoholis uncias quinque; — B*. et *Huf.* Oleorum Lavandulae, Rorismarini, Bergamottae, Juniperi et Terebinthinae, sing. semidrachmam, Alcoholis uncias decem; — *Sw.* Oleorum Lavandulae, Majoranae, Caryophyllorum, Macidis, Cinnamomi, Citri, Rutae et Succini, sing. guttas decem, Balsami Peruviani semidrachmam, Alcoholis uncias decem et denique si necesse est, Ambrae griseae grana quindecim et decem Moschi; — Li. Oleorum Rorismarini, Majoranae, Caryophyllorum, Cinnamomi, Rutae et Citri, sing. scrupulum, Olei Succini semiscrupulum, Balsami Peruviani semidrachmam, Ambrae grana decem, Moschi grana quindecim, Alcoholis uncias decem et quatuor dies frigidae digestionis.

℞. Olei Succini rectif. partem unam.
Balsami Peruviani . partes tres.
Aquae Lavandulae,
— Coloniensis, sing. partes 120.
Dissolve et post aliquot dies filtra. (*Vm.*)

℞. Olei ess. Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
— Lavandulae,
— Nucis mosch., sing.
scrupulum.
Tincturae Succini uncias quatuor.
Misce. (Suec.)

Reizend, nervenstärkend, Kopf- und Magenmittel. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen. — Man wendet es auch äußerlich in Einreibungen an.

Es enthalten zwar nicht alle Formeln zu diesem Präparat Rosmarinöl, doch scheinen sie wegen ihrer Aehnlichkeit mit den vorhergehenden hierher zu gehören.

Balsamum ophthalmicum. (*Au.*)

℞. Bals. Vitae Hoffm. . unc. unam.
Ammoniaci liq. drachmam unam.
Olei ess. Chamomillae
gutt. viginti.
Alcoholis concentrati semunciam.

Von Löbenstein-Löbel bei Gesichtsschwäche in Waschungen auf die Stirn, die Augenlider und die Wangen empfohlen.

Unguentum Rorismarini compositum.

℞. Cerae flavae . . unciam unam.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde
Olei ess. Rorismarini,
Ammonii subcarb., sing.
semunciam.
Misce bene.

Unguentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Ung. Rorismarini comp. unc. duas.
Olei essentialis Lavandulae,
— Cajeput,
— Menthae,
— Chamomillae, sing.
scrup. unum.

Bei asthenischen und nervösen Uebeln, so wie bei Lähmungen von Nutzen.

Aqua Anthos s. Rorismarini. (A. Ams. B. Bel. Wür. *Gr. Re.*)

℞. Herb. floresc. Rorismar.
part. unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas 24 infusionis destillent partes decem. (Ams. B. Bel.)

Wür. Herbae partem unam et sex Aquae; — A. duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — *Gr.* parandi modum non indicat.

Alcohol Rorismarini, Spiritus s. Aqua spirituosa Anthos s. Rorismarini, Alcohol cum Summitatibus Rorismarini, Aqua Reginae Hungariae. (A. Ams. An. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sp. Sw. T.*)

℞. Herb. floresc. Rorism. part. unam.
Alcoholis (20°) . partes quatuor.
Post sufficientem digestionem destillet spiritus 20° indicans. (Ams. An.)

Ful. Gen. et Li. Florum partem unam et sex Alcoholis; destillent partes quatuor; — *Sp.* Florum partem unam et tres Alcoholis; — Du. *Gr.* Florum partem unam cum dimidia et octo partes Alcoholis; destillent partes quinque;

— Ed. Florum partes duas et Alcoholis octo; destillent partes septem; — Br. Pal. et Wir. Florum partem unam et quatuor Alcoholis; — Lus. Florum partes duas cum dimidia et decem Alcoholis; destillent partes quinque; — Fer. Florum partem unam cum dimidia et octo Alcoholis; destillent partes sex; — *Gr.* Florum libras duas, Spiritus rectif. tres. (*Aqua Reginae Hungariae.*)

℞. Flor. sicc. Rorismarini part. unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas 24 digestionis destillent in balneo aquae fere ad siccum, productum novis Floribus infunde et iterum destillationi subjice. (Sar.)

D. Florum libram unam, Aquae Vitae libras sex; mixtis destillando trientes duos abstrahe et productum cum novorum Florum semilibra novae destillationi subjice; — Wür. Florum sesquilibram cum Alcoholis libris decem destillationi et productum novae destillationi supra Florum uncias tres subjicere.

℞. Florum Rorismarini partem unam.
Alcoholis (0,910)
partes quatuor cum dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.

Post horas 24 destillent partes quatuor (0,913). (A.)

Am. Lon. *C. Gr.* Florum libras duas, Aquae Vitae octarios octo et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent octarii octo; — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pal. et Sax. Florum partem unam, Alcoholis quatuor et Aquae q. s.; Pond. sp. = 0,8852 = 22° B. HassP.; — *Br.* Florum libram unam et uncias duas et Aquae Vitae libras octo; destillent tres quadrantes; — Suec. Florum partem unam, quatuor Alcoholis et Aquae duas; destillent partes duae; — LP. Summitatum libras tres, Spiritus Vini septem, Aquae duas, et macerationem per quatriduum; — Fenn. Florum partem unam, Aquae et Alcoholis, sing. duas; destillent partes duae; — His. His8. Florum partem unam et duas Aquae Vitae; post aliquot dierum macerationem destillet una pars; — Pm. Summitatum libram unam, Alcoholis 22° libras octo, Aquae communis sex, digere per diem et balneo maris liquoris libras octo elice; — *Fi. T.* Summitatum floresc. uncias octodecim, Alcoholis 28° B. libras octo, Aquae duas; post macerationem 12 horarum destillent in balneo aquae librae sex (octo); rectificari potest productum ad quinque vel sex librarum remanentiam. (*Aqua Reginae Hungariae.*)

℞. Flor. Rorismarini part. duodecim.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Aquae . . . . . partes duas.

Destillent lente partes sex, productum infunde

Flor. rec. Rorismar.
partib. duodecim.
Aquae . . . . partibus duabus.

Destillent partes sex. (*Sw.*)

℞. Herb. floresc. Rorism.
part. duodecim.
Alcoholis (22°) partes triginta sex.
Aquae dest. Rorismar. part. duodecim.

Post quatuor dies destillent partes triginta. (Gal.)

R. Rorismarini semilibram, Aquae Rorismarini libram et Alcoholis libras quatuor; destillent librae tres.

℞. Olei Rorismar. pond. unc. unam.
Spiritus rectificati . . congium.
Aquae . . . . quantum satis ad prohibendum empyreuma; destillet lento igne congius. (LonN. *Gr. Re.*)

Gr. praeterea: Olei Rorismar. uncias sex, Olei Lavand. congium et unciam unam, Bacc. Cassiae unc. sex, Pimentae quatuor, Spiritus rectif. congios duos, abstrahe cong. tres: vel: Ol. Rorism. sesquiunciam, Ol. Lav. drachmas duas, Ol. Cinnam. guttam unam, Aquae Vitae octarios decem, misce; vel: Ol. Rorism. drachmas quatuor, Ol. Lav. unciam, Spir. rectif. octarios tres, Aquae octarium, misce; — wohlriechend, als Schönheitsmittel, mit Zucker als Liqueur.

Aqua Hungarica s. Reginae Hungariae s. Anthos composita, Alcohol Anthos s. Rorismarini compositus, Spiritus aromaticus. (Br. D. Fer Han. Wir. *Re. Sw. Vm.*)

℞. Florum Rorismarini libram unam.
— Lavandulae uncias quatuor.
Aquae Vitae . . . . libras sex.

Post duodecim horas digestionis destillent librae tres. (D.)

℞. Florum Rorismarini partes tres.
— Lavandulae partem unam.
Aquae Vitae . . . partes sex.
— purae . partes duodecim.

Destillent tres quadrantes. (*Sw.*)

Vm. Lavandulae partem unam, Rorismarini tres, Aquae Vitae duodecim et Aquae quadraginta; destillent partes octodecim; — *Re.* Herbae cum Floribus rec. manip. sex, Flor. Lavand. libram, Ol. Rorism. uncias quatuor, Spir. Vini congios triginta, digere per horas 24, destillando congios viginti quinque abstrahe.

℞. Herbae Rorismarini cum Floribus,
— Serpylli,
— Thymi, sing. part. unam.

Aquae Vitae partes viginti quatuor.
— purae part. quadraginta octo.
Destillent partes viginti. (*Vm.*)

℞. Herb. floresc. Rorism. libr. quatuor.
— — Salviae . uncias sex.
Zingiberis . . . . uncias duas
Aquae Vitae . libras duodecim.
— purae . . . libras duas.
Destillent librae undecim. (Br. Han. Wir.)

Vm. Zingiberis partem unam, Salviae tres, Rorismarini viginti quatuor, Aquae Vitae nonaginta et Aquae centum octoginta; destillent partes sexaginta sex.

℞. Herbae Rorismarini libras duas.
— Salviae . . . uncias tres.
— Thymi . . . uncias sex.
Alcoholis (84°) . libras sedecim.
Macera per dies duos, tunc destillent in balneo aquae, et productum nova destillatione rectificetur. (Fer.)

Aqua vulneraria s. sclopetaria. (*Gr.*)

℞. Foliorum Rorismarini sesqui libram.
Summit. Millefolii,
Folior. Thymi, sing. semilibram.
Aquae Vitae . . . congios duos.
Destillet congius. — Reizend, Waſch- und Wundmittel.

Spiritus carminativus, Alcohol Inulae s. Helenii compositum. (His. His3.)

℞. Rad Helenii,
— Carlinae, sing unc. unam (dimidiam His3.)
Summit. Rorismarini,
— Majoranae, sing. unc. quatuor.
Baccarum Lauri,
Foeniculi,
Carvi,
Anisi, singulorum unciam unam.
Piperis Jamaicensis,
Cinnamomi, sing. . semunciam.
Cort. rec. Aurant. . drach. tres.
Alcoholis Vini . . . libras tres.
Digere per dies duos in vase tecto, tunc destillent in balneo aquae.

Aqua apoplectica. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Herb. floresc. Salviae unc. octo.
— — Majoranae,
— — Serpylli, sing. unc. unam.
Flor. Liliorum Convall. unc. tres.
— Lavandulae,
— Rorismarini, sing. unc. duas.
Cinnamomi . . . sesquiunciam.
Cubebarum . . . semunciam.
Caryophyllorum . drachmas tres.
Macidis . . . drachmas duas.
Vini albi . . . libras duodecim.
Post tres dies macerationis destillet dimidia pars. (Wir)

℞. Rad. Calami,
— Iridis Florentinae,
— Aristoloch. rot., sing. sesquiunciam.
Herbae Majoranae,
— Chamaepityos,
— Rorismarini,
Flor. Primulae Veris, sing. manip.
Semin. Sileris montani,
— Foeniculi, sing. sesquidrachmam.
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum, sing. drach tres.
Cinnamomi,
Ligni Aloës, sing. drachmas duas.
Piperis longi,
Sagapeni,
Opopanacis,
Myrrhae,
Sandaracae, sing. sesquidrachmam.
Aquae Florum Primulae Veris,
— — Tiliae,
Aquae Salviae, sing. unc. octodecim.
Post septem dies infusionis destillent. (*Sp.*)

℞. Flor. rec. Liliorum Convallium,
— — Lavandulae,
— — Primulae Veris,
— — Tiliae,
— — Betonicae,
— — Caryophyll. rubr. sing. unc. unam.
Herbae Rorismarini,
— Majoranae,
— Basilici,
— Salviae,
— Serpylli,
— Mari, sing. . sesquiunciam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Caryophyllorum . drachmas sex.
Nucis moschatae . unciam unam.
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariae,
Santali citrini, sing. semunciam.
Alcoholis,
Vini generosi, sing. libr. quinque.
Macera herbas et flores in alcohole, aromata in vino, misce liquores, destillationi lentae subjice, prius productum clarum et limpidum ad usum internum et secundum, album et oleaginosum, ad usum externum serva. (Pal. Wir.)

Gabe von zwei Drachmen bis eine Unze, bei Windcolik Aeußerlich in Einreibungen oder Räucherungen.

R u b i a.

Rubia tinctoria, L.; Krapp, Krappwurzel, Färberröthe; Garance (*Gal.*); Red matter (*Ang.*); Marena (*B.*); Krap (*D. Bel.*); Granza rubia (*His.*); Robbia (*I.*); Marzana (*Pol.*); Ruida, Granço (*Lus.*); Krapp (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Rubiaceae, J.) Eine in Europa angebaute Pflanze. (Fl. méd. IV. 177. *Blackw.* t. 326. *Schk.* t. 23. *Plenck* t. 57. Düss. off. Pfl. VII. t. 18. *Bert.* Bild. I. 71. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel (radix Rubiae tinctoriae s. tinctorum sativae s. majoris) an; sie ist lang, ästig, gegliedert, walzig, gänsefederdick, und roth, besonders außen. Sie hat einen schwachen Geruch und einen bitterlichen, schwach styptischen Geschmack.

Sie enthält viel Gärbestoff, Gallapfelsäure, Satzmehl, Sauerkleesäure und einen eigenthümlichen Färbestoff, von Collin und Robiquet Alizarine (Izarinum) genannt. Döbereiner hatte schon früher einen dergleichen Stoff, Erythrodanin (Erythrodaninum), besonders dargestellt.

In Ostindien (*Gr.*) gebraucht man statt dieser Art die Rubia Manjista s. Manjith, *Roxb.* [Fuh (*Ar.*); Well madatta (*Cy.*); Menjithe (*Hin.*); Puutvayr (*Mal.*); Runas (*Pe.*); Manjischtha (*Sa.*); Manjittie (*Tam.*); Mandestie (*Tel.*)]; eine in Nepaul und Thibet wachsende Pflanze.

Adstringirend, besonders durch die Eigenschaft, die Knochen der damit genährten Thiere zu färben, berühmt. Man hat sie bei Rachitis empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Species resolventes. (*Huf.*)

℞. Radicis Rubiae,
— Graminis,
— Taraxaci,
— Saponariae,
Herbae Fumariae,
Summit. Millefolii, sing. part. aeq.

Extractum Rubiae tinctoriae aquosum. (Fer. *T.*)

℞. Radicis Rubiae . libram unam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque, cola exprimendo, colaturam Albuminis ope clarifica et sufficienter consume.

T. Radicis libram unam, Aquae bull. octo, post horas 24 infusionis cola, leviter exprimendo, filtra et ad extracti consist. consume.

Extractum Rubiae tinctoriae alcoholicum. (Br. Han.)

℞. Radicis Rubiae . . partes duas.
Alcoholis . . . . . partes tres.
Aquae . . . . . partes novem.
Digere in vase tecto, cola exprimendo, alcoholem lenta evaporatione extrahe et reliqua ad extracti consist. inspissa. (Han.)

Br. Alcoholis ope penitus extrahere, tincturas commixtas filtrare, alcoholem destillatione separare et quod reliquum est ad extracti consist. consumere.

Pulvis ad s. contra rachitidem s. antirachiticus. (*Sm.*)

℞. Rubiae pulveratae drachmas duas.
Concharum praep. drach. quatuor.
Fiant doses octodecim. — Gabe, zwei oder drei Stück täglich in Zuckerwasser, bei einem jungen Kinde.

Pulvis Rubiae compositus. (Wür.)

℞. Rubiae . . . . . semunciam.
Myrrhae,
Boracis, sing. . drachmam unam.

Decoctum Rubiae tinctoriae. (*Sw.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
Macidis . . . drachmas duas.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Tincturae arom. drachmas duas.
Syrupi Acidi citrici uncias duas.
Adstringirend, bei Gelbsucht, Bleichsucht, Amenorrhöe und chronischen Catarrhalbeschwerden empfohlen. — Gabe, drei Unzen drei oder vier Mal täglich.

Tisana antiscrophulosa. (*Ca. Sm.*)

℞. Radicis Rubiae . . semunciam.
Lupuli . . . manipulum unum.
Foliorum Juglandis . . . no. 3.
Aquae semisextarios (demi setiers) tres.
Coquendo ad octarii (chopine) unius remanentiam consume et colaturae refrigeratae adde
Tinct. Martis tartaris. cochlear minus.
Gabe, zwei Gläser, Morgens und Abends.

Tisana tonica et antiherpetica. (*Pic.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
Florum Arnicae,

Stip. Dulcamarae, sing.
semunciam.
Aquae . . . . . vitra sex.
Coque et adde
Foliorum Cochleariae semunciam.

Decoctum Carnis aperiens s. aperitivum. (*Bo. Ca. Pic. Sm.*)

℞. Carnis Colli Vervecis
unc. quatuor.
Radicis Saponariae semidrachmam.
— Rubiae . drachmas duas.
Fol. Cichorii amari manip. unum.
Aquae . . . . sesquioctarium.
Coquendo tertiam partem consume.

Auf vier Mal, Morgens nüchtern, bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide. Zur ersten Tasse setzt man einen Scrupel essigsaures Kali, dessen Gabe man allmälig verstärkt.

Tisana antiicterica. (B*.)

℞. Rad. Rubiae,
— Curcumae, sing. unc. unam.
— Chelidonii majoris,
Summit. Centaurii min., sing.
manipulum.
Aquae fontanae,
Vini Rhenani, sing. . libras duas.
Coque et colaturae adde
Syr. Quinque Radic. aper.
uncias duas.

Von Sydenham gegen Gelbsucht gerühmt: er ließ Morgens und Abends ein halbes Pfund davon nehmen.

Potio antirachitica. (B*. *Sm.*)

℞. Radicis Rubiae siccatae semunciam.
Tartari solubilis drachmas duas.
Aquae fontanae
unc. sexaginta quatuor.
Coque blando igne per horam unam, cola et adde
Mellis despumati . uncias duas.

Bei Rachitis empfohlen. — Levret ließ davon Kindern täglich acht Unzen nehmen. — Von der frischen Wurzel nimmt man das Doppelte.

Decoctum Rubiae compositum (*alcalinum.*) (Wür.)

℞. Radicis Rubiae,
— Rhei, sing. drachmas tres.
Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae font. libras tres c. dimid.
Coque per horam et colaturae adde
Syrupi Zingib. unc. duas c. dim.

Apozema tonicum. (*Bo.*)

℞. Rad. Rubiae,
— Ononidis, sing. semunciam.
Fol. Marrubii,
— Matricariae,
Fol. Artemisiae,
— Rorism., sing. manip. dimid.
Semin. Petroselini pugill. unum.
Croci,
Cinnamomi, sing. scrup. unum.
Aquae . . . . quantum sufficit ut octo unciae colaturae obtineantur, cui adde
Syrupi Marrubii . unciam unam.
Tartari mart. solubilis
semidrachmam.

Bei Menstruationsbeschwerden, Bleichsucht, weißem Fluß und Blutflüssen nach Unterdrückung irgend eines habituellen Ausflusses.

Vinum adstringens. (*Au.*)

℞. Radicis Rubiae . unciam unam.
— Tormentillae,
Fruct. Aurantii virid., sing.
semunciam.
Cascarillae . . . drachmas sex.
Extr. Ligni Campech. drach. tres.
Vini . . . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola.

— Gabe, alle drei Stunden eine halbe bis ganze Unze.

R u b u s.

In den Pharmacopöen werden angeführt:

1) *Rubus chamaemorus*, *L.*; Multbeere; Ronce de montagne (*Gal.*); Mountain bramble (*Ang.*); Multebaer, Myrebaer, Laamanak, Latoch (*D.*); Aalber blaadige bramboos (*Bel.*); Moruszka (*Pol.*).

D. Pol. R. *Bc. Gr. M.*

♃ (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae. *J*) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (Linn. Fl. Lapp. t. 5 f. 1. *Plenck* t. 410.)

Man wendet die Früchte (fructus s. baccae Chamaemori) an; es sind geruchlose, unreif etwas sauer, nachher aber wässerig und nicht sehr angenehm schmeckende Beeren.

2) *Rubus fruticosus*, *L.*; Strauchartige Himbeere, Brombeere, Kratzbeere, gemeiner Brombeerstrauch; Ronce noire (*Gal.*); Common bramble (*Ang.*); Brambaer (*D.*); Zarca (*His.*); Bramen, Brummeln (*Bel.*); Rovo volgare, More di razza o di rogo, Rogo di Macchia (*I.*); Jezyny (*Pol.*); Sylva (*Lus.*); Brombaer (*Suec.*).

An Bor4. Br. Gal. His. His3. Wir. *Br. Fi. Gr. Sp.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Hayne* III. t. 12. *Lam.* Encycl. meth. t. 441. *Bert.* Bild. IV. 18. fig 2.)

Man wendet die Früchte (baccae Rubi nigri s. fruticosi s. vulgaris s. Mori

rubri) an; es ſind geruchloſe Beeren von angenehmem Geſchmack.

3) *Rubus arcticus, L.*; nordiſche Himbeere; Ronce septentrionale (*Gal.*); Dwarf bramble (*Ang.*); Akerbaer (*Suec.*).

Br. R. Suec. *Be. M.*

Ein Strauch des nördlichen Europa's (*Linn.* Fl. Lapp. t. 5. fig. 2. *Plenck* t. 409.)

Man wendet die Früchte (Baccae Norlandicae), Beeren von angenehmem Geruch und angenehmem, weinartigen Geſchmack, an.

4) *Rubus trivialis, Mich.*; Ronce commune (*Gal.*); Dewberry (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Strauch Nordamerica's deſſen Rinde adſtringirende Kräfte beſitzt.

5) *Rubus villosus, Willd.*; haarige Himbeere; Ronce vélue (*Gal.*); Blackberry (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Nordamericaniſcher Strauch. (*Bigel.* Med. Bot. II. t. 38.)

Die Rinde iſt adſtringirend.

6) *Rubus Idaeus, L.*; Himbeere; Framboisier (*Gal.*); Raspberry (*Ang.*); Maliny, Ostrucini (*B.*); Hindbaer, Bryngebaer, Himbaer (*D.*); Frambueso, Sanguesca (*His.*); Framboizen (*Bel.*); Rovo ideo, Lamponi, Framboè (*I.*); Maliny (*Pol.*); Amoreira frambeeza (*Lus.*); Hallon (*Sa.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Blackw.* t. 289. *Plenck* t. 407. *Hayne* III. t. 8. Diss. off. Pfl. t. 20. Fl. méd. III. 170. *Bert.* Bild. IV. 18. fig. 1.)

Man wendet die Früchte Himbeeren (baccae s. fructus Rubi Idaei) an; es ſind faſt runde, rothe, graue oder weiße Beeren, welche aus einer Menge von weichem Fleiſch eingehüllten, auf einem ſehr langen kegelförmigen Fruchtboden ſitzenden Saamen beſtehen.

Decoctum Rubi villosi. (Am. B*.)

℞. Cort. Rad. Rubi villosi unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut coquendo unciae octo colaturae obtineantur.

Adſtringirend, in Nordamerica in Gebrauch. — Gabe, ein halbes Glas täglich mehrmals.

Syrupus Rubi arctici. (Suec.)

℞. Succi Bacc. Rubi arct. rec. expr. et depur. . . . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat leni calore syrupus.

Succus Rubi Idaei. (Br. Ful. Hass. His. His3. Pal. Sar. Sax. Wir. *Pid.*)

℞. Bacc. Rubi Idaei bene matur. quantum vis.
Contere inter manus, massam in cavam sepone, donec liquidum clarum supernatet et cola exprimendo; succum (per setaceum trajectum) per aliquot dies sepone ut depuretur et partem claram in lagenis longicollibus a strato olei obtectam serva. (Br. His. His3. Pal. Sax. Wir.)

Hass. et *Pid.* succo antequam in lagenas immittatur, Sacchari partem quartam addere et semel ebullire.

Roob s. Gelatina Rubi Idaei. (Br. Ful. His. His3. Wir. Wür. *Pid. Sw. T.*)

℞. Bacc. Rubi Idaei matur. q. vis.
Contere, massam per tres dies sepone, et succum leni igne ad consistentiam mellis coque, quartam Sacchari partem addendo. (Br. Ful. Wir. Wür. *Pid. Sw.*)

℞. Sacchari fortiss. cocti lib. duas.
Aquae . . . . libras decem.
Clarifica et coque ad trochiscorum duritiem, adde
Succi Baccarum Rubi Idaei,
Aquae comm., sing. libram unam.
Coque ad consist. gelatinae et cola. (His. His3. *T.*)

Säuerlich, kühlend.

Mel Rubi Idaei. (*Vm.*)

℞. Succi Bacc. Rubi Idaei rec. expr. partem unam.
Mellis albi . . . . partes tres.
Misce frigide et post aliquot tempus sepositionis decantha.

Syrupus Rubi Idaei s. de Framboesiis et Rubi fruticosi. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Fenn. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lus. O. Pal. Pol. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Bacc. Rubi Idaei nondum matur., Sacchari puri, sing. part aeq.
Misce leviter agitando, supra lenem ignem collocata, paullulum coque, cola per cribrum setaceum arcte textum et syrupum serva. (Gal.)

T. Baccas Rubi fruticosi non perfecte maturas calori balnei aquae bullientis exponere, donec rumpantur, addere per vices Sacchari albi pulv. pondus aequale, continue agitando, calorem deinde ad bullitionem usque au-

gere, mixta adhuc bullientia cribro immittere et syrupum parare.

℞. Succi Bacc. Rubi Idaei rec. expr. partes duas.
Sacchari albi part. tres c. dimid.
Solve in balneo aquae tepido. (*Vm.*)
Re ut syrupum fiori.

℞. Succi Bacc. Rubi Idaei depurati uncias viginti.
Sacchari albi . . . libras tres.
Liqua blandi caloris ope (ebulliant semel et fiat l. a. syrupus). (Bor. Bor4. Han. HassP. Lus. O. Pal.)

Bor4. Syrupum Rubi fruticosi eodem modo praeparandum indicat; — Ams. B. et Bel. Succi uncias sedecim et Succi libras duas c. dimid.; — D. Pal. Wir. et Wür. Succi uncias viginti et Sacchari triginta duas; — Hass. et *Pid.* Succi uncias decem et Sacchari tredecim c. dimid.; — A. Fenn. Suec. *Fi.* Succi partem unam et duas Sacchari (eodem modo Syrupus Rubi fruticosi *Fi*); — *Sw.* Succi uncias sedecim et Sacchari viginti octo; — Gen. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas c. dimid.; — *C.* Succi octarium et Sacchari libras duas; — Li. Succi uncias octodecim et Sacchari libras duas; — Ful. Succi et Sacchari partes aequales; — *Gr.* Succi libras duas, Sacchari libras quatuor et drachmas duas.

Fi. Succi Baccarum Rubi fruticosi et Mellis despumati, sing. partes aeq.; lente coquendo paratur: *Syrupus Rubi fruticosi cum Melle s. Diamoron cum Melle.*

Acetum Rubi Idaei. (Bor. Bor4. Gal. Han HassP. O. Pal. Pol. Sar. Wir. *Gr. T.*)

℞. Bacc. Rubi Idaei rec. libras sex.
Aceti Vini rubri libras quatuor
Macera per dies quatuor, cola absque expressione et filtra. (Gal.)

Bor. Bor4. Han. O. Pol et Sar Baccarum partem unam, Aceti duas et unum mensem maceration s (sepositio nem donec liquor colore intense rubro imbutus fuerit Bor4.); — Pal. et Wir. Baccarum partem unam, Aceti sex et aliquot dies macerationis soli expositorum; — *T.* Baccarum libras quatuor, Aceti libras duas et uncias octo, macerationem per dies quatuor vel quinque.

℞. Succi Bacc. Rubi Idaei mat. libr. duas.
Aceti . . . . . semilibram.
Post duos dies macerationis exprime fortiter et colaturae adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Digere blando igne et post refrigerationem decantha (D.)

HassP. Baccarum rec. partem unam, Aceti duas, macerationem per mensem, Sacchari partem unam et ebullitionem; — *Gr.* Baccarum sesquioctarium, Aceti Vini albi octarios tres macerare per horas 24, exprimere et bis adhuc novas Baccas macerare, octario cuilibet Sacchari albi libram unam addendo, coquere, despumare et post refrigerationem octario cuique addere Spiritus Frumenti uncias duas.

Kühlend, beruhigend, in verſchiedener Menge zu Tiſanen hinzugeſetzt.

Raspberry sherbet (*Gr.*): Aceti Rubi Idaei unciam, Aquae octo, misce. Angenehmes Getränk im Sommer.

Aqua Rubi Idaei. (Ba. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. Pol. R. Sax. *Gr. Pid. Sw. Vm.*)

℞. Bacc. Rubi Idaei contrit. part. unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillet una pars. (Br.)

Pal. Baccarum partem unam et quatuor Aquae; destillet una pars; — D. Aquae sex; destillent partes quatuor; — *Vm.* Aquae viginti quatuor; destillent partes sex; — R. Baccarum partes quatuor et decem Aquae; destillent partes sex; — *Sw.* Baccarum partes decem et Aquae q. s.; destillent partes viginti; — Li. Baccarum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo; — HassP. Baccarum contus. ac statim modice express. libras duodecim, Aquae q. s.; destillent librae octodecim.

℞. Pulpae Bacc. Rubi Id. part unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillent partes duae. (Han)

Ba. Pulpae partem unam et Aquae sex; destillent partes tres; — O. Pulpae partes duas et Aquae q. s.; destillent partes viginti; — Hass. et *Pid.* Pulpae partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

℞. Pulpae Bacc. Rubi Id. part. unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Post aliquot dies fermentationis destillent partes duae. (Sax.)

℞. Baccarum Rubi Idaei quantum vis.
Contritas cum Aquae tepidae aequali quantitate subige; fermentationi subjice, adde Aquae frigidae partes viginti quatuor et destillando partes sex abstrahe. (*Vm.*)

℞. Pulpae (i. e. residui post paration nem succi) Bacc. Rubi Id. libr. decem.
Aquae . . . . libras triginta.

Kali carbon. crudi . unc. duas.
Destillent librae viginti. (Bor. Bor4. Pol.)

Bor4. praeterea Re idui sale conditi libras quindecim, reliqua ut antea; — Ful. Baccarum libras octo, Aquae viginti quatuor et unam Subcarbonatis; destillent librae sedecim.

Rumex.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Rumex aquaticus*, *L.*; Wasserampfer, Wassermangold, Wassergrindwurzel, Roßampferwurzel, Butterweckenkraut; Patience d'eau ou aquatique, Rhubarbe sauvage (*Gal.*); Waterdock (*Ang.*); Vandskreppe (*D.*); Waterpatich (*Bel.*); Labaca major (*Lus.*); Vatnsyra (*Suec.*).

A. Ams. P. Bel. Br. D. Ful. Gal. Li. R. Sax. Wir. *Bo. C. Gr. M. Re. Sp. Va.*

♃ Eine Pflanze (Hexandria Trigynia, *L.*; Polygoneae, *J.*), welche in Europa an überwässerten Stellen wächst. (*Zorn* Ic. pl. t. 588.)

Man wendet die Wurzel (radix Lapathi aquatici s. Herbae Britannicae s. Hydrolapathi s. Rhapontici) an; sie ist groß, ästig, geringelt, außen schwärzlichbraun, innen safrangelb und geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas bitter.

Tonisch, schweißtreibend, bei Hautkrankheiten sehr in Gebrauch.

2) *Rumex crispus*, *L.*; Krauser Ampfer; Patience frisée (*Gal.*); Curled dock (*Ang.*); Krused skreppe (*D.*); Gekruide patich (*Bel.*); Svinsyra (*Suec.*)

Gal. *C. Gr. Re.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Curt.* Fl. Lond. t. 204.)

Man wendet das Kraut (herba Lapathi crispi) an; es besteht aus einem walzigen, wenig ästigen Stängel mit lanzettigen, stark wellenförmigen, am Rande wie krausen Blättern. Es hat einen ganz schwach styptischen Geschmack.

3) *Rumex sanguineus*, *L.*; Blutampfer, Blutkraut; Patience rouge (*Gal.*); Bloody dock (*Ang.*); Bluedkruid (*Bel.*).

Gal. *Gr. Re.*

♃ Eine im nördlichen Europa und America wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 127.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Lapathi sanguinei) hat einen herben und adstringirenden Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem ästigen, purpurrothen Stängel mit herzförmigen, lanzettförmigen, feingezähnten purpurrothen Blättern.

4) *Rumex Patientia*, *L.*; Gemüse-Ampfer, Geduldkraut, Mönchsrhabarber; Patience (*Gal.*); Labaca (*Lus.*).

LH. LP. Lus. *Gr. Re.*

Eine in Deutschland, Frankreich und Italien an feuchten Stellen wachsende, ausdauernde Pflanze. (*Blackw* t. 489. *Plenck* t. 282.)

Die Wurzel (radix Lapathi sativi s. Patientiae) ist faserig, lang, dick, äußerlich bräunlich, innen gelblich. Adstringirend und tonisch. Kaum noch gebraucht. — Die ziemlich großen Wurzelblätter häufig wie Spinat als Gemüse.

5) *Rumex acutus* und *obtusifolius*, *L.*; spitz- und stumpfblättriger Ampfer, Grindwurzel; Patience à feuilles aiguës et vulgaire (*Gal.*); Romice Lapato, Acetosa maggiore (*I.*); Labaca aguda (*Lus.*).

Bor. Bor4. HassP. LH. LP. *Gr. Re.*

Eine in Europa an feuchten Stellen wachsende perennirende Pflanze. (*Blackw.* t. 491. *Plenck* t. 290.)

Die Wurzel (radix Oxylapathi s. Lapathi acuti, Rhabarbarum monachorum) ist ästig, von verschiedener Stärke, außen gelblichbraun, innen gelb; getrocknet, außen braun, ohne Geruch, der Geschmack bitter und adstringirend.

Extractum Patientiae s. Lapathi. (Gal. *T. Vm.*)

℞. Rad. Patientiae concis. . q. vis.
Superfunde Aquae q. s. ut leviter obtegatur; macera per horas 12, tunc Aquae aequalem quantitatem addendo macerationem per eundem temporis lapsum continua, liquores commixtos cola et clarificatos ad extracti consist. usque consume. (*Vm.*)

℞. Radicis Patientiae libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera per horas 24, subinde agitando et cola; residuum maceretur eodem modo cum nova Aqua et itidem coletur; liquores commixti in balneo aquae ad extracti spissitudinem evaporent. (Gal.)

℞. Radicis Lapathi . libram unam.
Aquae bullientis . . libras octo
Post horas 24 infusionis cola leviter exprimendo, per pannum vel potius per chartam emporeticam trajice et ad extracti consist. inspissa. (*T.*)

Gabe, ein bis drei Scrupel.

Decoctum Lapathi. (B*. GalM. *Ra. Sp. Va.*)

℞. Radicis Lapathi . unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad dimidiae partis remanentiam. (B*. *Ra.*)

Va. Hôt. D. et Char. Radicis semunciam ad unciam.

℞. Radicis Lapathi . drachmas sex.
Aquae . . . quantum sufficit ut coquendo libras duas colaturae obtineantur; sub finem adde
Rad. Liquiritiae ras. drach. duas.
Infunde per sexagesimas aliquot et cola. (B°. GalM.)

℞. Radicis Lapathi . uncias duas.
— Inulae,
Bacc. Juniperi, sing. semunciam.
Aquae . . . . . libras sex.
Coquendo ad semilibras remanentiam consume, sub finem addendo
Herb. Fumariae concis.
manip. unum.
Cola. (*Sp.*)

Schwach reizend, als blutreinigend betrachtet und bei Hautkrankheiten in Gebrauch. — Gabe, mehrere Gläser den Tag über.

Ruscus.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Ruscus Hypoglossum*, *L.*; Alexandrischer Lorbeer; Laurier alexandrin (*Gal.*); Butchers broom (*Aug.*); Czipkowa bylina (*B.*); Alexandrinse laurier (*Bel.*); Loreiro de Alexandria (*Lus.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Sp.* Z.

♄ (Dioecia Monadelphia, L.; Asparagineae, J.) Eine Pflanze Südeuropa's. (*Zorn* Ic. pl. t 481.)

Man wendet die Blätter (herba Uvularine s. Hypoglossi s. Hippoglossi s. Bislinguae s. Bonifaciae s. Lauri Alexandrinae angustifoliae) an; sie sind eirund-lanzettförmig und tragen in der Mitte ihrer obern Fläche einen zungenförmigen Anhang, in dessen Winkel die Blüthen entspringen. Sie haben keinen Geruch, aber einen stark adstringirenden Geschmack.

Schwach adstringirend, aber wenig in Gebrauch.

2) *Ruscus aculeatus*, *L.*; stacheliger, gemeiner Mäusedorn, Mäusedornbusch, Myrtendorn; Fragon piquant, Petit houx, Houx frelon, housson (*Gal.*); Butchers broom, Knee holly (*Aug.*); Lesny myrtus, Gedlice wlaska (*B.*); Rusco officinale, Pugnitopo, Brusco (*I.*).

An Br. Fer. Gal. GalM. Gen. His. His3. Wir. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Sp. Va 7.*

♂ Eine in den Wäldern Europa's wachsende Pflanze. (*Bull.* t. 243. *Blackw.* t. 155. *Schk.* t. 340. *Zorn* Ic. pl. t. 443

Man wendet die Wurzel (radix Rusci s. Brusci s. Myrtacanthae) an; sie ist lang, holzig, weiß und besteht aus vielen federkieldicken Fasern. Der Geschmack derselben ist anfangs etwas süßlich, hinterher bitter.

Harntreibend. — Sie gehört zu den radices quinque aperientes majores.

Tisana diuretica. (*Pie.*)

℞. Radicis Rusci . . . uncias sex.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et cola.

℞. Rad. Rusci,
— Fragariae,
— Asparagi, sing.
drach. quinque.
Aquae . libras duas cum dimidia.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et adde
Syr. Hyssopi,
— Quinque Radic, sing. unciam.

Ruta.

Ruta graveolens, *L*; Raute, Gartenraute; Rue des jardins (*Gal.*); Common rue (*Ang.*); Sendib (*Ar.*); Ruta (*B.*); Aruda (*Cy*); Ruda (*D.*); Saturi (*Hin.*); Ruite (*Bel*); Ruta (*I. Pol. R.*); Matzkase-so (*J.*); Inghu (*Ja.*); Suddab (*Mah.*); Sadsa (*Mal.*); Arruda (*Lus.*); Bruhmi, Somalata (*Sa.*); Winruta (*Suec.*); Aruda (*Tam.*); Soddapuaku (*Tel.*).

A. Ams. An. B Ba. Bel. Bor. Bord. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M Pid. Re. Sp. Va.* Z.

Ein kleiner Strauch (Decandria Monogynia, L; Rutaceae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 7. *Schk.* t. 115. *Plenck* t. 332. *Hayne* VI. t. 8. Düss. off. Pfl. 1. t. 19. *Zorn* Ic. pl. t. 163.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba s. folia Rutae s. Rutae hortensis) besteht aus einem walzenförmigen und ästigen Stängel und abwechselnden, gestielten, blaugrünen, fast doppelt gefiederten Blättern mit etwas dicken, eirundlänglichen, stumpfen, an der Basis schmälern Blättchen. Es hat einen starken, eigenthümlichen, sehr unangenehmen Geruch und einen brennenden, scharfen, sehr bittern, etwas gewürzhaften Geschmack. — Der Saame ist klein, schwärzlich, nierförmig, runzlich und etwas eckig; der Geschmack ist gewürzhaft.

Reizend, magen-, nervenstärkend, schweißerregend, blähungtreibend, fäulnißwidrig, schmerzstillend und wurmtreibend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zwei Scrupel.

Ruta angustifolia (*Gr.*) wurmtreibend; *R. sylvestris*, Peganum Harmala, Saamen Trunkenheit, Schlaf erregend.

Digitized by Google

Species vulnerariae. (LP.)

℞. Hyperici,
Balsaminae,
Rutae, singulorum . uncias duas.
Misce. — Zu Abkochungen in Einſpritzungen.

Conserva Rutae (*Foliorum.*) (Sar. *Gr.*)

℞. Foliorum Rutae contusorum,
Sacchari albi, sing. partem unam.
Commisce terendo.
Gr. parationem non indicat.

Confectio Rutae. (Lon. LonN. *Ca. Gr. Re. Vm.*)

℞. Foliorum siccatorum Rutae,
Seminum Carvi,
Bacc. Lauri, sing. sesquiunciam.
Sagapeni . . . . semunciam.
Piperis nigri . drachmas duas.
Mellis despumati uncias sedecim.
Misce. — Reizend, Menſtruation treibend.

Pasta rubefaciens et febrifuga. (*Bo.*)

℞. Summit. rec. Rutae unc. duas.
Sinapis pulveratae drachmas duas.
Contunde simul. — Man legt dieſen Teig einige Stunden vor dem Anfall auf das Handgelenk.

Syrupus Rutae (*Re.*): ut syrupus marrubii.

Extractum Rutae aquosum s. Foliorum Rutae graveolentis s. Rutae graveolentis. (Br. Du. Ed. Gen. Pal. Wir. *Gr. Re.*)

℞. Herbae Rutae . . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere in loco calido per dies quatuor, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam usque consist. inspissa. (Br Pal. Wir)

℞. Foliorum Rutae . libram unam.
Aquae purae . . . libras octo.
Decoque ad dimidiae partis remanentiam, cola exprimendo et colaturam, blando igne, ad massae pilularis spissitudinem consume. (Du. Ed. Gen. *Gr Re.*)
Gabe, von zehen Gran bis eine halbe Drachme.

Extractum Rutae alcoholicum. (Wür.)

℞. Herbae Rutae,
Alcoholis, sing. . libram unam.
Aquae communis . libras octo.
Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone et liquorem decantha; alcohole destillatione separato residuum ad aptam usque consist. evaporet.

Pulvis antilyssus s. ad morsum canis rabidi. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Foliorum Rutae,
— Verbenae,
— Salviae,
— Plantaginis,
— Polypodii,
— Absinthii vulgaris,
— Menthae,
— Lamii montani,
— Betonicae,
Summit. Hyperici,
— Centaurii min., sing. part aeq.
Von Paulmier geprieſen. — Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Potio emmenagoga. (*Pie. Va.* Hosp. Monspel.)

℞. Succi Rutae . . unciam unam.
Oxymellis scillitici semunciam.
Löffelweiſe bei hyſteriſchen Beſchwerden.

Injectio auricularis detersiva. (*Sp.*)

℞. Herbae Rutae manipulum unum.
Aquae fontanae . . uncias sex.
Post horas 12 infusionis colaturae adde
Essentiae Myrrhae semidrachmam.
Mellis rosati . . drachmas sex.

Acetum Rutae s. rutaceum. (A. Ams. Bor. Bor4. Br. Hass. Lus. O. Pal. Sar. Wir. Wür. *Gr. Pid. T. Vm.*)

℞. Fol. Rutae rec. . partem unam.
Aceti Vini albi . partes decem.
Macera frigide per plures dies, cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Sar. Rutae partem unam, quatuor Aceti et sex dies digestionis blandi caloris ope; — Br. Hass. Pal. Wir. et *Pid.* Aceti sex et aliquot dies digestionis; — *Gr.* Rutae partem unam, Aceti octo; — Ams. et Bor. Aceti octo et quatuor dies frigidae macerationis; — Wür. Aceti novem et tres septimanas infusionis solis calore; — A. *T.* Aceti duodecim et macerationem per tres (octo vel decem dierum digestionem in loco tepido *T.*) dies; — Bor4. Rutae uncias tres, Aceti ferv. q. s.; post horam cola ut sit sesquilibra.

℞. Fol. rec. Rutae . libram unam.
Aceti communis . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque parumper et colaturae adde
Alcoholis . . . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

A. Rutae uncias tres, Aceti destillati libras duas, aliquot dies digestionis blandi caloris ope et Alcoholis partem

octavam; — Wir. Alcoholis partem vigesimam.

Der Alcohol dient zur Verhütung der Zersetzung.

Acetum Rutae camphoratum. (*Sw**.)

℞. Summit. Rutae cum Flor. unc. duas.
Aceti . . . . uncias sedecim.
Infunde blando calore per horas 24, cola et in colatura dissolve
Camphorae . . drachmas duas.
Filtra. — Ein Prophylacticum.

Oleum Rutae infusum s. coctum. (Br. Gal. His. His3. Pm. Sar Wir. Wür. *Fi. Re. T.*)

℞. Herbae recentis Rutae,
Olei Olivarum, sing. . part. aeq.
Post tres dies digestionis exprime. (Br. Wir.)

Pm. Rutae libram unam, Olei quatuor, infusionem calidam per tres dies, expressionem olei et ejus defaecationem.

℞. Herb. rec. Rutae part. unam c. dimid.
Olei Olivarum . . partes tres.
Digere in balneo aquae per dies tres, post refrigerationem exprime et macerationem cum nova Herba repete. (Sar.)

Gal. *Re.* digerere inter cineres calidos per horas 24 Olei partes duas et unam Herbae et operatione denuo repetitâ, leviter coquere et exprimere; — *T.* Herbae uncias quindecim, Olei Olivarum libras quinque solis calore per 3 vel 4 dies digerere et operationem cum nova Herba repetere, tertia vice macerationem per mensem circiter protrahere, sepositione clarificare etc.

℞. Herbae rec. Rutae partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.
Digere blandi caloris ope per tres dies, coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Wür.)

His. Herbae partem unam et tres Olei; — His3. Herbae libras tres et Olei octo, et trium vel quatuor dierum digestionem; — *Fi.* Herbae libram unam, Olei quatuor per dies duos macerare, per quadrantem horae coquere et exprimere.

Reizend, gegen Kolik und Würmer, nervenstärkend, in Einreibungen und Klystiren.

Unguentum s. Butyrum Rutae. (His. His3. *Va.*)

℞. Fol. rec. Rutae,
— — Absinthii,
— — Menthae, sing. unc. duas.
Axungiae Porci uncias sedecim.
Coque ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo.

Oleum Rutae aethereum, Aethereoleum Rutae. (A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wür. *Br. C. Gr. Pid. Re. Sw. T.*)

℞. Herbae recentis Rutae . q. vis.
Aquae communis quantum sufficit.
Destillent. (Ams. B. Bel. Du. Fer. R. *Br. C. Re.*)

T. Herbae partem unam, Aquae bullientis duplum pondus et plures destillationes atque cohobationes; — Ba. Ful. et Li. Aquae tres; — *Sw.* Aquae quatuor; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — Bor. Bor4. Han. HassP. Pol. et Sax. octo Aquae (destillatio, oleo separato, cum Aqua stillatitia supra novam Herbam et addita Aquae q. s. tam diu repetatur, donec olei desiderata quantitas obtenta fuerit); — A. Aquae duodecim.

℞. Herb. rec. Rutae part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post dies tres destillent. (Br. Hass. Pal. Sar. *Pid.*)

℞. Herbae recentis Rutae . q. vis.
Aquae Rutae . quantum sufficit.
Destillent. (Wür.)

Balsamum Rutae. (Wir. *Sp.*)

℞. Olei Nucis mosch. drach. duas c. dim.
— ess. Rutae . drach. unam.
Misce bene.

Aqua Rutae s. ex Ruta. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. *Br. Gr. Sw. Vm.*)

℞. Herbae rec. Rutae partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent (post horas viginti quatuor) partes decem. (Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Han. Pol. *Sw.*)

Pal. Pm. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Wür. et *Br.* Aquae sex; destillent trientes duo; — Ba. sedecim Aquae; destillent partes octo: — Sax. Aquae quindecim; destillent partes decem; — A. duodecim Aquae; destillent partes quatuor.

℞. Herbae rec. Rutae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars; productum denuo supra novam Herbam destillet. (Sar.)

℞. Herbae rec. Rutae partes decem.
Aquae Vitae . partem dimidiam.

Aquae purae part. centum sexaginta. Destillent partes quadraginta. (*Vm.*) *Gr.* parandi modum non indicat.

Julep s. Julapium antihystericum. (*Sm.*)

℞. Aquae dest. Rutae,
Aquae — Bryoniae,
— — Flor. Aurant., sing. uncias duas.
Syrupi Stoechadis,
— Valerianae,
— Paeoniae, sing. unc. unam.
Auf drei oder vier Mal zu nehmen.

S.

Sabadilla.

Veratrum Sabadilla, *Re.*; Sabadille, Mexicanischer Läuſeſaame, Läuſemörder, Läuſekörner, Mönchenſaat; Cevadille (*Gal.*); Sabadillkorn (*D.*); Sabadiglia (*I.*); Cevadilha (*Lus.*); Nasikiv sabatyli (*Pol.*); Sabadill, Husarfrae (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ Polygamia Monoecia, L.; Colchicaceae, *J.*) Eine Pflanze Mexico's. Willdenow gab mit Unrecht China als das Vaterland derſelben an.

Man wendet die Frucht und die Saamen an.

Die Frucht beſteht aus drei länglichen, röthlichen, nach innen aufſpringenden, dreiſaamigen, geruchloſen, einen ſcharfen, brennenden, anhaltenden Geſchmack beſitzenden Kapſeln. — Der Saame (semen Sabadilli s. Sabadillae s. Sevadillae s. Cevadillae) iſt länglich, gebogen, an einem Ende ſtumpf, rußſchwarz punctirt, von anfangs fadem, bald darauf bitterem, endlich ſcharfem und Ekel erregendem Geſchmack.

Er enthält nach Meißner, Pelletier und Caventou Sabadillſäure (Acidum sabadillicum), Acide cevadique und Veratrin oder Sabadillin (Veratrinum, Sabadillinum).

Aufregend, reizend, innerlich Hitze im Magen und Brechen, äußerlich, beſonders bei jungen Perſonen, Hautentzündung erregend. Man bedient ſich derſelben zur Tödtung der Läuſe und der Eingeweidewürmer. Seeliger wandte ſie mit Erfolg gegen Bandwurm an. Der Gebrauch erfordert aber viel Vorſicht.

Pulvis Capucinorum. (B*.)

℞. Seminum Sabadillae,
— Staphydis agriae,
— Petroselini,
Fol. Nicotianae, sing. part. aeq.
Fiat pulvis tenerrimus. — Zur Tödtung des Kopfungeziefers. — Dieſes Pulver bringt oft Schwindel und andere beunruhigende Zufälle hervor.

Unguentum ad s. contra pediculos. (Ful.)

℞. Pulveris Sabadillae uncias quatuor.
— Sinapis,
— Pyrethri, sing. uncias duas.
Axungiae praep. unc. triginta duas.

Pilulae anthelminticae. (*Ca. Sw.*)

℞. Sabadillae,
Mellis, singulorum semunciam.
Fiant pilulae viginti granorum. (*Sw.*)
Ca. Olei Foeniculi guttas viginti addit.

Enema s. Clysma Sabadillae s. contra ascarides. (B*. *Au. Sw.*)

℞. Sabadillae . . . drachmas duas.
Aquae fontanae . uncias decem.
Coque et colaturae unc. septem adde
Lactis vaccini . . uncias septem.
Infusum ad cimices. Seminum uncias duas, Aceti unciam unam; digere per duos dies. — Zur Tödtung der Bettwanzen, die Bettſtellen damit zu waſchen.

Saccharum.

Saccharum officinarum s. officinale, *Arundo saccharina*, *L.*; Zuckerrohr; Sucre (*Gal.*); Zucchero officinale (*I.*); Assucar (*Lus.*)

(Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine in Indien einheimiſche, zwiſchen den Wendekreiſen häufig angebaute Pflanze. *Plenck* t. 40. (*Tussac* Fl. des Ant. I. t. 23. Düss. off. Pfl. Lief 8. *Bert.* Bild. I. 10. fig. 2. Atlas z. Wörterb d. Naturgeſchich. 3. Lief. 29. Taf. Fg 1); Arundo saccharifera, L. (*Rumph.* Amb. V. 74.)

Aus der perennirenden Wurzel dieſer Pflanze erheben ſich mehrere 1 bis 2 Zoll dicke, 8, 10 bis 12 Fuß hohe, mit einem lockern, zelligen, ſaftigen Mark erfüllte, grüne, gelbe oder violette oder gelb und violet geſtreifte Halme, welche von zweireihigen, 4 bis 5 Fuß langen, ſchmalen, ſchneidenden Blättern umgeben werden, und aus deren Spitze ſich auf einem nackten,

glatten, ungefähr 5 Fuß hohen Blüthenstiele eine sehr große, ästige, ausgebreitete, pyramidale Blüthenrispe erhebt.

Der untere Theil des Halmes, von welchem die Blätter bald abfallen, ist es vorzüglich, in welchem sich der Zuckerstoff in größter Menge ausbildet und den man daher zur Gewinnung des Saftes, aus welchem nachher der Zucker bereitet wird, vorzugsweise benutzt. Der Zucker,

Saccharum, Sacchar, Sal Indus; Σάκχαρ, Σακχάρον; Sucre (*Gal.*); Sugar (*Ang*); Sukhir (*Ar.*); Cukr (*B.*); Sukker (*D.*); Schukkir (*Duk. Pe.*); Azucar (*His.*); Cheni (*Hin.*); Suiker (*Bel.*); Zucchero (*I.*); Saker (*Mah.*); Gula (*Mal.*); Cukiea (*Pol.*); Assucar (*Lus.*); Sarkara (*Sa.*); Socker (*Suec.*); Sakkarr (*Tel.*); Panchadara (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T. Z.*

ist eine derbe, weiße, crystallinische, zerreibliche, geruchlose Substanz von sehr angenehm süßem Geschmack. Der weißeste Zucker (Saccharum albissimum, purissimum, purificatum), welcher gemeiniglich Raffinade genannt wird, ist mehr, der weiße Zucker (Saccharum album), gewöhnlich Melis genannt, weniger rein. Nach Europa wird er als roher Zucker oder Moscovade (Mel Cannae, Saccharum rubrum s. non purificatum s. Moscowatum) gebracht. Der aus der Auflösung des gereinigten Zuckers durch regelmäßige Crystallisation erhaltene Zucker wird Candiszucker, Zuckerkand (Saccharum candum s. cantum s. crystallisatum) genannt, und ist, je nach dem Grade der Reinheit, mehr oder weniger weiß oder gelblich, oder braun und mehr oder weniger durchsichtig (S. candum rubrum et album). Der nicht crystallisirbare Theil des Zuckers heißt Molasse (Saccharum Molasses s. Melasses, Mel ustum, Theriaca communis).

Bor4. zeigt unter den zur materia pharmaceutica gehörigen Gegenständen die Rotulae Sacchari, Zuckerkuchen an.

Syrupus simplex s. communis s. simplicissimus s. Sacchari s. Sacchari albi, Julapium, Saccharum clarificatum. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. RC. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Sacchari albi . . . partes tres.
Aquae . . . . . partem unam.

Dissolve blandi caloris ope, liquori, despumando continue, Albumen unum in Aquae parte una dilutum immitte; coque donec nonnisi parva spumae albae copia appareat et per pannum trajice. (Gal. GalM.)

T. Sacchari libras triginta, Aquae decem, Albumina Ovorum quatuor cum Aquae tanta quantitate subacta, ut pondus libras decem aequet.

Parari potest quoque absque ebullitione, dissolvendo Sacchari partes duas in una Aquae, balnei vaporis ope. (Gal.); — GalM. Syrupus refrigeratus 95° indicet.

Hass. Wür. et *Pid.* Sacchari partes quatuor et tres Aquae; — Pm. Sacchari libras sex, Aquae quatuor, cum Albumine Ovi clarificare, per pannum laneum colare et in syrupum redigere; — Ams. Ed. et *C.* Sacchari quindecim et octo Aquae; — A. An. B. Ba. Bel. Penn. Fer. Ful. HassP. Suec. Wir. *Fi.* et *Sw.* Sacchari partes duas et unam Aquae; — D. His. LP. et *Vm.* Sacchari et Aquae, sing. partes aeq.; — His3 Sacchari libras duas, Aquae quatuor; — Bor. Bor4 Han. O. Pol. Sacchari libras tres et Aquae uncias viginti; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Sacchari libras duas cum dimidia et Aquae octarium unum; — Am. Sacchari uncias quindecim et Aquae semioctarium; — LH. Sacchari depur. libras duas cum Aquae una miscere et semel ebullire vel: Sacchari albi libras tres cum Aquae duabus coquere, clarificare, colare et ad debitam consist. redigere; — Li. Sacchari libras tres et Aquae uncias viginti septem; — Gen. Aquae et Sacchari q. s. ut fiat liquor spissus; — RC. Sacchari libras tres cum dimidia, Aquae libras duas.

Du. Syrupum simplicem inter materias pharmaceuticas indicat i. e. venalem.

Blandeau syrupum colore penitus privatum ita parare proposuit:

℞. Sacchari . . . libras sexaginta.
Carbonis anim. ablut unc. sexaginta.
Aquae . . . octarios sedecim.

Liqua ignis clari ope et infunde per duas vel tres vices, Solutionem Albuminum Ovorum no 6. in Aquae octariis duobus; ab igne remota sepone, despuma et per pannum trajice. (GalH.)

℞. Sacchari . . libras quadraginta.
Aquae frigidae libras viginti duas.

Agita solutionem cum Carbone animali loto, et mixturam subinde vehe

menter movendo per horas viginti quatuor, tunc filtra. (*Durozier*).

℞. Sacchari . . . . libras viginti.
Aquae . . . . . libras decem.
Albumina Ovorum . . . no. 3.

In autoclave inclusa stent super igne per horae quadrantem. (*Grammaire.*)

RC. praeterea *Syrupum Molasses* s. partem sacchari non crystallisabilem indicat.

Syrupus s. Tinctura Corallii. (Gen.)

℞. Corallii rubri,
Cerae flavae, sing. . libras duas.

Cerae liquefactae corallium immitte et tamdiu coque, donec hujus supremi color penitus cum cera commixtus sit; decantha deinde et igni appropinquando adde

Sacchari albi . . . libras duas.

Sacchuro liquato, ab igne remove et adde

Aquae bullientis . sesquilibram sed sensim infundendo et sub continua agitatione, ne materia e vase repellatur; coque denuo ut cera liquefiat et in locum frigidum ad coagulandum sepone; crustâ deinde semotâ syrupum serva.

Rotulae Manus Christi, Saccharum perlatum. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi . . quantum vis.
Aquae Rosarum quantum sufficit.

Fiant rotulae. (*Sp*)

℞. Sacchari albi . . libram unam.
Aquae Rosarum quantum sufficit ad dissolvendum saccharum. Coque ad globulum usque et adde

Matris Perlarum pulv. semunciam.

Fiant rotulae. (Br Wir.)

Clyster laxans (LH.) Sacchari impuri (moscowade) uncias tres pro clystere indicat.

Mixtura demulcens. (*Gr.*): Spermatis Ceti drachmas duas, Vitellum Ovi dimidii, Syrupi simplicis semunciam, Aquae Cinnamomi uncias duas, Aquae quatuor. — Defters 1 Eßlöffel voll.

Sagapenum.

Gummi s. Gummi-Resina Sagapenum s. serapinum; *Σαγαπηνον*; Sagapengummi, Serapingummi; Sagapenum, Gomme seraphique (*Gal.*); Sughenus (*Ar. Duk.*); Sagapeno (*His. Lus*); Sagapeno, Serapino (*I.*); Sagapen (*Pol.*); Kundel (*Sa.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer Gal. GalM. Gen. Han. His. His8. Li. Lou. LouN. LP. Lus. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sa Sp. T. Va. Z.*

Ein Gummiharz in körnigen Massen oder erbsengroßen Tropfen (Sagapenum in granis, was jedoch sehr selten vorkömmt), äußerlich von röthlichgelber, innen von röthlichweißer Farbe. Der Geruch ist unangenehm, dem des Asand ähnlich, aber weniger stark, der Geschmack scharf.

Diese Substanz kommt, nach Willdenow, von Ferula Persica, *Hope* 4, Persisches Seckenkraut (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J*), einer Pflanze Persien's. (Phil. Trans. LXXV. 36. t. 3. 4.)

Reizend, selten angewendet. Reinigung (His8.) wie G. Ammoniacum.

Sago.

Sagu, Faecula Sagu; Sago; Sagou (*Gal.*); Sagu (*Ba. Ja. Lus. Mal*); Sekuhme (*C.*); Sauke chawal (*Duk.*); Sabudana (*Hin.*); Schowarisi (*Tam.*); Zowbium (*Tel.*).

Am. An. B Ba. Bor4 Fer. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. LP. Lus. R. Wir. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. T.*

Eine stärkemehlartige Substanz in kleinen unregelmäßigen, über Stecknadelknopf großen, weißlichen oder röthlichen, sehr harten, gleichsam, besonders in der Mitte, hornartigen, geruch- und geschmacklosen Körnern (Grana Sagu).

Man bereitet den Sago aus dem Mark der Sagopalme, Sagus Rumphii, *Lamk.*, welche auf den Molucken wächst. Außerdem wird noch aus andern Palmenarten, Dioscorea sativa, Phaseolus Mungo, Cycas circinalis ꝛc. Sago bereitet. (*Gr. Re.*) Der Portland Island Sago wird aus den Wurzeln von Arum maculatum gewonnen.

Stärkend, erweichend.

Gelatina Sagu. (Lus. *Gr. Re.*)

℞. Sagu pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Coque lente, agitando continue, ad consistentiam requisitam. Adde

Sacchari albi . quantum sufficit ad gratum saporem.

Gr. Grana in Aqua per horam macerare, defundere, et nova addita coquere ad transparentiam, tunc addere Vinum et Saccharum aut jusculum clarum. — *Re.* ut gelat. panis biscocti.

Gloucester jelly (*Re.*): Rad. Eryng. condit, Ichthyocoll., Hord. perl., Ras. Cornu Cervi, sing. uncias duas, Sago, Oryzae, Conservae Rosar., sing. unam. Coque in Aquae libris quatuor (two

quarts) ad duarum reman. et exprime. Warm mit Milch oder Wein vermiſcht.

S a l e p.

Salab; Salep; Salep (*Gal.*); Salibimisri (*Ar. Duk. Hin.*); Salepo (*Lus.*); Salamisrie (*Tam.*)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. BorC. Br. D. Fenn. Gal. Ham. Han. Hass. HassP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. C. Fi. G. Gr. M. Pid Re. Sp T.*

Eine ſtärkemehlartige Subſtanz in kleinen Stücken von der Größe einer Kaffeebohne bis zu der einer Mandel, von ſtrohähnlicher Farbe, welche halbdurchſichtig, faſt hornartig iſt und einen etwas bock- und ſaamenähnlichen Geruch und einen ſüßen, ſchleimigen Geſchmack beſitzt.

Man bereitet den Salep in Perſien aus den Wurzelknollen unbekannter Orchideen. Vorzüglich wird die Wurzel von Orchis mascula, L. (*Blackw.* t. 53. *Plenck* t. 643), und Morio, L. (*Schk.* t. 271. *Plenck* t. 645), welche beide in Deutſchland, erſtere aber vorzüglich häufig in der Türkei und in ganz Aſien vorkommen ſoll, als Salepwurzel benutzt.

Stärkend.

Pulvis Salep. (B*.)

℞. Salep . . . . . sesquiunciam.
Sagu . . . . . unciam unam.
G. Tragacanthae drachm. unam.

Man verſetzt Morgens und Abends einen Kaffeelöffel voll mit Waſſer und Milch und macht einen Brei daraus, welcher bei Schwindſucht und Huſten von Nutzen iſt.

Conditum Satyrii, Conserva Orchidis. (Pal. Sar. Wir.)

℞. Rad. rec. Orchidis libram unam.
Aquae . . . . . libras octo.

Macera per dies aliquot, tunc coque ad mollitiem usque; in decocto clarifica deinde

Sacchari albi . . sesquilibram.

Infunde radicem per tres dies et tunc coque in syrupo atque in eo retine vel evaporatorii ope sicca. (Sar.)

Pal. et Wir. Radicem in Aqua coquendo mollefacere, tunc exstillare et ei infundere Saccharum ad plumam coctum.

Gelatina s. Mucilago Radicis Salep, Gelatina ex Salep. (An. BorC. Bor4. Han. LP. Lus. Pm. *Fi. Gr. Sw. T. Vm.*)

℞. Salep pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Coque sufficienter. (*Sm.*)

Bor4. Salep drachmam unam, Aquae frigidae uncias duodecim, ad unciarum septem remanentiam decoque.

℞. Pulveris Salep . drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.

Tritura simul. (An.)

BorC. Salep drachmas duas et Aquae bullientis uncias duodecim; — *Gr.* Salep uncias duas, Aquae octarios duodecim, adde Magnesiae calcinatae uncias tres, ut mucor prohibeatur.

℞. Salep pulverati drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Coque et adde

Sacchari sufficientem quantitatem ut sapor gratus prodeat. (Lus.)

LP. Salep drachmas duas, Aquae duodecim, Sacchari duas coquere ad consistentiam gelatinae.

Vm. Salep drachmam, Aquae uncias quatuor cum dimidia et Syrupi Sacchari sesquiunciam; — Han. Salep drachmas duas, Aquae uncias octo et Syrupi Corticum Aurantiorum sesquiunciam; — Pm. *Fi.* Salep unciam cum Aquae libris sex ad duarum remanentiam coquere, colare, ad unam lento calore consumere, addere Sacchari uncias duas et ab igne removendo, affundere Aquae Cinnamomi lacteae semunciam; — *T.* ut *Fi.* sed sub finem aquae cinnamomi loco Aquae Citri drachmas duas et aliquot guttas solum Aquae Cinnamomi.

℞. Pulveris Salep . drachmas duas.
Aquae frigidae quantum sufficit ut coquendo decocti unciae novem obtineantur, cui adde

Syrupi Papaveris . sesquiunciam.
Aquae Lauro-Cerasi drachmas sex.

Misce bene. (*Sw.*)

Decoctum Radicis s. de Radice Salep, Infusum Orchidis. (Li. Wür. *Au. Sa.*)

℞. Pulv. Rad. Salep drachmam unam.
Aquae purae . . uncias sedecim.

Coque ad colaturae librae unius remanentiam. (Wür.)

Au. Salep drachmas duas et Aquae uncias duodecim.

℞. Pulveris Orchidis drachmam unam.

Imbibe Aqua frigida, donec volumen quadruplum obtentum sit; adde deinde

Aquae bullientis . sesquilibram.

Coque per horam dimidiam. (Li.)

℞. Salep pulverati . drachmas duas.
Aquae fontanae quantum sufficit.

Decoque ad librarum duarum colaturae remanentiam et adde

Syrupi Papaveris,
— Diacodion, sing. unc. unam.

Misce bene. (*Sa.*)

Mixtura s. Potio demulcens. (Ham. *Sm.*)

℞. Salep pulverati . scrupulos duos.
Aquae fervidae . uncias decem.
Solutioni adde
Sacchari albi . . . semunciam.
Dissolve. (Ham.)

℞. Salep . . . drachmam unam.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Coque per horae quadrantem et colaturae unciarum quatuor adde
Laudani Sydenh. gutt. quindecim.
Syrupi Diacodion drachm. quatuor.
Misce bene. (*Sm.*)

Potio pectoralis. (*Sm.*)

℞. Salep pulverati,
Sacchari Lactis, sing. drach. duas.
Syrupi Diacodion unciam unam.
— Althaeae . . uncias duas.
Misce. — Löffelweiſe.

Chocolata s. Succoluta alba. (*Pie.*)

℞. Cacao . . . . uncias quatuor.
Salep . . . . . uncias sex.
Aquae . . . . . uncias octo.
Coque exiguo igne per semihoram et adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Farinae . . . quantum sufficit.
Fiant tabellae ponderis semunciae.

Electuarium Diasatyrum s. aphrodisiacum. (Pal. Wir. *Bo. Sp.*)

℞. Cinnamomi . . drachmas duas.
Vanillae . . . drachmas octo.
Radicis Orchidis drachmas sex.
Marrubii . . . scrupulos duos.
Rad. Eryngii conditae unc. duas.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Misce bene. (*Bo.*)

℞. Rad. Orchidis rec. uncias quatuor.
Sacchari ad glob. cocti unc. duodecim.
Contunde, per cribrum setaceum trajice et tere cum
Nucis Indicae conditae,
Zingiberis conditi,
Pinearum recentium,
Pistaciarum, sing. . uncia una.
Adde deinde
Pulv. Caryophyllorum,
— Cinnamomi,
— Scincor. marin., sing. semunciam.
Brodii Zingiberis quantum satis ut fiat electuarium. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis recentis Eryngii,
— — Pastinacae,
— — Orchidis,
Nucum conditarum,
Pinearum,
Pistaciarum, sing. . semunciam
Seminum Anisi,
— Erucae,
— Fraxini,
— Urticae,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. drach. quinque.
Scinci marini drach. duas c. dim.
Moschi . . . . grana septem.
Mellis despumati . libras tres.
Misce fiat electuarium. (Pal.)
Gabe, vier bis ſechs Drachmen.

Salicaria.

Lythrum Salicaria, L.; brauner Weiderich, Ackerweiderich, Weiderichblutkraut; Salicaire (*Gal.*); Common willow herb (*Ang.*); Wrbina brunatna (*B.*); Parcike (*Bel.*); Salicaria (*I.*).

A. Am. B. Ba. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Ham. His. His3. Li. Sax. Wir. Wür. *Be. C. Gr. M. Re. Sp. Z.*

♃ (Dodecandria Monogynia, L.; Salicarieae, J.) Eine in ganz Europa wachſende Pflanze. (*Hayne* III. t. 39. Düss. off. Pfl. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 113.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Salicariae s. Lysimachiae purpureae s. purpureae spicatae) iſt walzig und gelb. — Das Kraut beſteht aus einem vierkantigen, röthlichen, äſtigen Stängel mit gegenüberſtehenden, ſitzenden, herzförmig lanzettigen, ganzen, oben glatten, unten behaarten Blättern. Es iſt geruchlos und hat einen ſchleimigen, bittern Geſchmack.

Man hat es bei Diarrhöe und Ruhr empfohlen. — Gabe des Pulvers, von einer Drachme bis zu vier Scrupel.

Opiatum adstringens. (*Bo.*)

℞. Pulv. Salicariae grana triginta.
— Rad. Arnicae semidrachmam.
— Aluminis . . . grana sex.
Conservae Cynorrhodon . q. s.
Auf einmal und nöthigenfalls binnen vier und zwanzig Stunden zwei Mal wiederholt. Man nimmt es in einer paſſenden Tiſane.

Decoctum Salicariae. (B*.)

℞. Herbae Salicariae unciam unam.
Aquae fontanae . libram unam.
Decoque ad unciarum octo colaturae remanentiam. — Bei Diarrhöe und Ruhr empfohlen. — Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden.

Mixtura antidysenterica. (*Ca.*)

℞. Pulv. Salicariae sesquidrachmam.
Aquae Rhoeados libram unam.

Syrupi Althaeae unciam unam.
Gabe, drei und eine halbe Unze alle drei Stunden.

Salix.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Salix alba*, *L.*; gemeine Weide; Saule blanc, Saule commun (*Gal.*); Willow (*Ang.*); Wrba (*B.*); Piil (*D.*); Sauce (*His*); Wilg (*Bel.*); Salice (*I.*); Kora wierzbowa (*Pol.*); Salgueiro (*Lus.*); Pil (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. HassP. LP. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. *Br. C. Gr. M. Re. Z.*

Ein Strauch oder Baum (Dioecia Diandria, L.; Salicineae, J.), welcher in ganz Europa sehr gemein ist. (*Blackw.* t. 327. *Plenck* t. 710. *Zorn* Ic. pl. t. 402.)

Man wendet die Rinde der drei- oder vierjährigen Zweige (cortex Salicis albae) an; sie ist dünn, biegsam und braunroth, und hat einen eigenthümlichen Geruch und einen sehr adstringirenden, bittern, balsamischen Geschmack.

2) *Salix fragilis*, *L.*; Bruchweide; Saule fragile (*Gal.*).

Ba. Bor4. Br. D. Du. Fer. Han. HassP. Li. O. R. Sax. *E. Gr. Re.*

Ein fast allenthalben in Europa wachsender Strauch. (*Lin.* Fl. Lapp. t. 8 fig. 6.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis fragilis) an; sie hat einen etwas balsamischen Geruch und einen sehr bittern, adstringirenden Geschmack.

3) *Salix capraea*, *L.*; Sooiweide, Sohlweide; Saule marceau (*Gal.*).

Ed. Fer. Gal. His. Hi3. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*

Ein in ganz Europa gemeiner Strauch. (*Pall.* Fl. Ross. t. 87. fig. 2.)

Die Rinde (cortex Salicis capraeae) ist adstringirend.

4) *Salix vitellina*, *L.*; Dotterweide; Saule osier jaune (*Gal.*).

D. R.

Ein Strauch des gemäßigten Europa's. (*Hoffm.* Fasc. I. 57. t. 11. 12. fig. 1—3 und t. 24. fig. 1.)

Die Rinde (cortex Salicis vitellinae) ist adstringirend.

5) *Salix pentandra*, *L.*; Baumwollenweide, Lorbeerweide; Saule pentandre (*Gal.*).

A. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. D. Han. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. *Be. Gr. Sp.*

Ein in Europa sehr gemeiner Baum. (*Oed.* Fl. Dan. t. 943.)

Man wendet die Rinde der ein- bis zweijährigen Zweige (cortex Salicis pentandrae s. laureae) an; sie ist dünn, biegsam, außen braun und hat einen balsamischen Geruch und einen etwas bittern und styptischen Geschmack.

Gr. führt außer diesen noch: *Salix Helix*, *monandra*, *purpurea*, *viminalis*, *amygdalina*, *Babylonica* und *eriocephala* an, deren Rinden sämmtlich sehr bitter und adstringirend sind.

Diese Rinden enthalten ein eigenthümliches Alcaloid, von Fontana, dem Entdecker, Salicin (Salicinum) genannt. Man hat sie als adstringirend und tonisch bei Wechselfiebern statt der China vorgeschlagen. — Gabe des Pulvers, von einer halben bis zu einer ganzen Unze.

Pulvis Salicis compositus. (RC.)

℞. Corticis Salicis . uncias novem.
— Quercus . . uncias duas.
Rad. Gentianae lut. unc. unam.
Misce. — Statt der China.

Cataplasma antisepticum. (Ful.)

℞. Corticis Salicis albae pulverati,
Herbae Rutae. sing. uncias duas.
Aquae Vitae camphor. unc. tres.
Aceti . . . . quantum sufficit.

Unguentum Salicis. (*Huf.*)

℞. Succi Fol. Salicis . uncias duas.
Axungiae Porci quantum sufficit.
Misce blando calore. — Zum Verband unreiner, scorbutischer und brandiger Geschwüre.

Extractum Salicis aquosum. (A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Ful. Han. HasP. O. Pol. RC. Sax. *Br. T.*)

℞. Corticis Salicis . libram unam.
Aquae frigidae . libras decem.
Macera per dies duos, subinde agitando; cola, sepone, et liquorem decanthatum ad consist. extracti inspissa. (Pal.)

℞. Corticis Salicis . partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Digere per horas 12, blando calore, tunc per horam unam coque, cola et liquorem ad extracti consistent. consume. (*Ba.*)

HassP. ut extractum colombo, ligni campechiensis etc.

℞. Corticis Salicis . partem unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum partibus quatuor Aquae et itidem coletur; liquores commixti et post sufficientem depositionem decan-

thati ad extracti consist. evaporent. (An. Bor. Han. O.)

Bor4. Corticis libram unam cum Aquae sedecim ad octo, residuum cum Aquae sedecim ad dimidium decoquere, decoctionem quoties opus fuerit repetere, liquores commixtos ad remanentiam librarum quatuor et deinde balnei vaporis ope ad extracti absinthii consistentiam consumere.

RC. Corticis q. vis cum Aquae octuplo ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consist. consumere; — A. et Sax. Corticem pluribus succedentibus coctionibus penitus extrahere et liquores commixtos in balneo aquae post decanthationem inspissare; — *Br.* coquere illum per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos consumere; — B. digerere eum per horas 24, tunc coquere per duas cum Aquae partibus decem et coctionem per aequale tempus cum novae Aquae partibus octo repetere; — Ams. bis eum decoquere, primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet vice ad dimidium redigendis; — *T.* Coquere per semihoram Corticis libras duas in Aquae libris viginti quatuor et exprimendo colare, coctionem repetere et decocta filtrata inspissare.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Extractum Salicis spirituosum. (Ful.)

℞. Corticis Salicis . libram unam.
Aquae Vitae . . . . libras sex.

Digere per dies aliquot et exprime; faeces coquantur cum Aquae libris tribus et cum expressione colentur; colaturas ambas, quamque seorsim, ad mellis consistent. inspissa et tunc commixtas sufficienter consume.

Infuso-decoctum Salicis Bremeri. (B*.)

℞. Corticis Salicis uncias quatuor.
Spiritus Frumenti . uncias octo.
Aquae . . . . uncias sedecim.

Digere in vase tecto et cola; residuum deinde coquatur cum

Aquae communis unciis triginta ad unciarum quindecim liquidi remanentiam; colaturas commisce. — Fiebermittel. — Zwischen zwei Fieberanfällen zu verbrauchen.

Decoctum Corticis Salicis laureae. (B*. BorC.)

℞. Cort. Salicis concisi unc. unam.
Aquae fontanae uncias sedecim.

Decoque ad unciarum octo remanentiam. (B*.)

BorC. Corticis sesquiunciam et Aquae uncias quindecim ad novem redigendas.

Tonisch, fieberwidrig. — Glasweise.

Injectio antiseptica. (Ful. Ham.)

℞. Corticis Salicis . . uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.

Coquendo parte tertia consumptâ, colaturae adde

Camphorae in Alcoholis q. s. solut. semidrachmam.
Mellis despumati unciam unam.

Decoctura Salicis composita. (RC.)

℞. Corticis Salicis drachmas novem.
Gentianae luteae drachmam unam.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Decoque ad libram. — Interdum addi possunt Corticis Quercus drachmae duae. — Statt des decoct. chinae.

Salsola.

Man findet drei Arten dieser Pflanzengattung in den Pharmacopöen angezeigt:

1) *Salsola Soda, L.*; Salzkraut; Soude commune (*Gal.*); Saltwort (*Ang.*); Sul alikantska lavhowa (*B.*); Saltyder (*D.*); Soda (*His.*); Loogkruid (*Bel.*); Soda (*I.*); Solda (*Lus.*); Soudaaert (*Suec.*).

Gal. His. His3. *Gr. M. Z.*

☉ (Pentandria Digynia, L.; Chenopodeae, J.) Eine an den Küsten des Mittelländischen Meeres wachsende Pflanze. (*Jacq.* Hort. Vind. I. p. 28. t. 68. *Plenck* t. 161.)

Man wendet das Kraut (herba Vitri, Kali) an; es besteht aus ästigen, röthlichen Stängeln mit sitzenden, langen, schmalen, stachellosen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen unangenehmen alkalischen Geschmack.

2) *Salsola Tragus, L.*; stacheliges Salzkraut; Soude épineuse (*Gal.*).

Gal. *Gr. M.*

☉ Eine Pflanze des südlichen Europa's.

3) *Salsola Kali, L.*; Kalisalzkraut; Soude kali (*Gal.*).

Gal. *G. Gr. M.*

☉ Eine Pflanze Südeuropa's.

Diese und die vorhergehende Art können statt des gemeinen Salzkrauts angewendet werden.

Salvia.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Salvia officinalis, L.*; Salbei, Salbey; Sauge commune (*Gal.*); Sage (*Ang.*); Ssalweg (*B.*); Salvie (*D.*); Sal-

via (*His. I*); Salie (*Bel.*); Szalwia (*Pol.*); Salva (*Lus.*); Salwia (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Diandria Monogynia, L.; Labiatae; J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 10. *Plenck* t. 19. *Hayne* VI. t. 1. *Zorn* Ic. pl t. 165.)

Man wendet das Kraut und die Blüthen an.

Das Kraut (herba s. folia Salviae minoris, Salvia hortensis major et minor, S. virtutis) besteht aus einem vierkantigen, einfachen Stängel mit gegenüberstehenden, eirundlanzettigen, ganzen, gekerbten, runzligen, grünlichgrauen Blättern. Es hat einen angenehmen, stark gewürzhaften und etwas kampferartigen Geruch und einen styptischen, gewürzhaften, etwas bittern Geschmack. — Die violettblauen Blüthen bilden eine endständige Aehre. Man sammelt die Pflanze vor dem Aufblühen.

Reizend, nervenstärkend, tonisch, schwach adstringirend, auflösend und austrocknend.

2) *Salvia Horminum, L.*; edles Scharlachkraut; Sauge Hormin (*Gal.*); Purple topped sage (*Ang*); Horminio (*His.*); Edele clarey (*Bel.*); Orminio (*I.*); Ormino (*Lus.*).

Br. Gal. His. His3. Wür. *Be. Gr. Sp.*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 244.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Hormini s. Gallitrichi) besteht aus stumpfen, gekerbten, unangenehm riechenden und etwas bitter schmeckenden Blättern. — Der Saame ist glatt, schleimig und etwas bitter.

Reizend, tonisch.

3) *Salvia pratensis, L.*; Wiesensalbey; Sauge des prés (*Gal.*)

Gal.

♃ Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t 258.)

Man wendet die Blätter (folia Horminі) an; sie sind gestielt, langgestreckt, herzförmig, gekerbt, runzelig, glatt, von angenehmem Geruch und bitterem, adstringirenden Geschmack.

4) *Salvia Sclarea, L.*; zahmes Scharlachkraut; Sauge Sclarée (*Gal.*); Common clary (*Ang.*); Graakuse (*D.*); Maro cortuso (*His.*); Tamne sclarey (*Bel.*); Schiarea (*I.*); Esclarea (*Lus.*).

Fer. Gal. His. His3. Wir. *G. Gr. M.*

♂ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 484.)

Man wendet das Kraut (herba Sclareae s Gallitrichi) an; es besteht aus einem dicken, vierkantigen, sehr ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen und langgestreckten, herzförmigen, runzligen, spitzen, sägezähnigen, gegenüberstehenden Blättern. Es hat einen sehr starken und unangenehmen Geruch und einen bittern, gewürzhaften Geschmack.

Bei *Gr.* findet man außerdem noch: *Salvia Cretica, Aethiopica*, welche auf das Nervensystem wirken, und bei Augenkrankheiten, auch als aphrodisiaca gebraucht werden; *Salv. Verbenaca, Oculus Christi; S. verticillata, Horminum sylvestre*, Saamen in's Auge gebracht, lösen sich in Schleim auf und erleichtern die Ausziehung fremder Körper; und *S. lyrata*, gequetschte Wurzelblätter zur Zerstörung von Warzen und gegen Krebs.

Conserva Florum Salviae. (Sar. Wir.)

℞. Florum Salviae . partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Wir.)

Sar. Florum partem unam et tres Sacchari ad plumam cocti.

Species s Herbae aromaticae s. aromaticae vulnerariae s. vulnerariae. (A. B*. Ba. Gal. *Re. Vm.*)

℞. Herbae Salviae,
— Melissae,
— Thymi,
— Menthae piperitae,
— Hyssopi,
Flor. Lavand., sing. . part. aeq.
Concisa misce. (B*.)

℞. Foliorum Salviae,
— Melissae,
Summit. floresc. Absinthii,
— — Menthae pip.,
— — Serpylli,
Flor. Chamomillae vulgaris, sing. part. aeq.
Concisa misce. (Ba.)

℞. Foliorum Salviae,
— Thymi,
— Serpylli,
— Hyssopi,
— Menthae aquaticae,
— Absinthii,
— Origani, sing. . part. aeq.
Concisa misce. (Gal. *Re.*)

℞. Herbae Hyssopi,
— Marrubii,
— Origani,
— Rutae,
— Salviae,

Digitized by Google

Herbae Saturejae,
— Scordii,
— Serpylli, sing. partes aeq.
Concisa misce. (A.)

℞. Cubebarum,
Nucis mosch., sing. part. unam.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Caryophyllorum, sing. part. duas.
Cort. Aurantiorum part. quatuor.
Menthae crispae,
Rorismarini,
Salviae, singularum partes octo.
Concisa misce. (*Vm.*)

Aqua de Herbis vulnerariis (Gal.): Specier. vulnerar. (Gal.) part. unam, Aquae comm. decem, destillent partes quatuor.

Extractum Salviae. (A.)

℞. Foliorum Salviae . quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Herbâ pluribus coctionibus successivis penitus extractâ, liquores commisce et post decanthationem ad extracti consist. inspissa.

Infusum Salviae. (BorC. DD. GalM. Ham. RC. Suec. WW. *Sa. Va.*)

℞. Herbae Salviae drachmam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Infunde in vase tecto per horae quadrantem et cola exprimendo. (DD.)

BorC. et WW. Salviae sesquiunciam et Aquae uncias octodecim; — RC. Suec. Salviae unciam et Aquae libram (infunde per horam unam et cola RC.); — Ham. Salviae unciam et Aquae q. s. ad colaturam unciarum octo.

℞. Herbae Salviae,
Liquiritiae rasae, sing. unc. unam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae octarius (litre) obtineatur. (GalM.)

℞. Foliorum Salviae . uncias duas.
Flor. Rosarum rubr. unc. unam.
Aquae bull. unc. tres c. dimidia.
Infunde frigide et cola. (*Sa.*)
Va. Aquae bull. libras duas.
Reizend, gewürzhaft. — Taſſenweiſe.

Infusum Salviae acidulum. (B*.)

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut post semihoram digestionis colaturae unciae sex obtineantur, cui adde
Acidi sulph. Aqua diluti drachmam.
Misce bene. — Gabe, alle halbe Stunden eine halbe Taſſe.

Gargarisma stimulans. (*Ca. Sa.*)

℞. Infusi Salviae . . libras duas.
Roob Juglandis . uncias duas.
Aluminis . . drachmam unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Infusi Salviae . . . uncias sex.
Tincturae Chinae,
Syrupi Mororum, sing. semunciam.
Spir. Cochleariae . drach. unam.
Misce. (*Ca.*)

Infusum Salviae vinosum. (B*. *Va.*)

℞. Herbae Salviae . unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Digere per horam unam, cola et colaturae refrigeratae adde
Vini rubri . . . . semilibram.
Gabe, eine halbe Taſſe alle zwei Stunden.

Decoctum incitans aromaticum s. aromaticum. (*B.*)

℞. Foliorum Salviae . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut librae duae decocti obtineantur. Colaturae adde
Elixir acidi Halleri drach. unam.
Den Tag über allmälig zu nehmen.

Vinum aromaticum. (Gal. GalM.)

℞. Specierum aromat. unc. quatuor.
Vini rubri . . . uncias duas.
Macera per dies sex in vase clauso, cola exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Vini rubri . . . partes decem.
Tincturae aromat. partem unam.
Commisce. (GalM.)
Aeußerlich in Waſchungen oder Bähungen.

Vinum Salviae. (Wür.)

℞. Fol. rec. Salviae . sesquiunciam.
Vini rubri . . . sesquilibram.
Post horas 24 macerationis cola.

Fomentum excitans. (*Ra.*)

℞. Vini Salviae . . libram unam.
Alcoholis camphorati uncias octo.
Misce.

Aqua vulneraria spirituosa, Aqua rubra, Tinctura vulneraria s. vulneraria rubra s. aromatica composita. (Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Rorismarini,
— — Saturejae,
— — Origani,
— — Majoranae,
— — Thymi,
— — Serpylli,
— — Hyssopi,
— — Melissae,
— — Calaminthae,

Foliorum recentium Basilici,
— — Menthae aquaticae,
— — Foeniculi,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Rutae,
Summit. floresc. Lavandulae,
— — Hyperici, sing. unciam.
Alcoholis (10°) . . libras duas.
Post octo dies macerationis cola exprimendo et filtra. (Gal.)

T. Salviae, Rorismarini, Origani, Majoranae, Thymi, Serpylli, Hyssopi, Melissae, Basilici, Menthae piperitae, Foeniculi, Angelicae, Absinthii, Rutae, Spicae, Hyperici, sing. unciam unam, Coccionellae drachmas duas, Aluminis scrupulos quatuor, Alcoholis diluti 22° B. Digere per dies quindecim et filtra. — Si loco alcoholis Acetum optimum adhibetur, obtines *Aquam vulnerariam acetosam.*

Aqua vulneraria acetosa, Acidum aceticum dilutum et vulnerarium (*Fi.*) Angelicae, Salviae, Absinthii Romani, Saturejae, Foeniculi, Menthae viridis, Hyssopi, Melissae, Basilici, Rutae, Thymi, Rorismarini, Origani, Calamintae, Serpylli, Florum Lavandulae, sing. sesquiunciam, Aceti fortis libras octo; destillent in balneo aquae libras sex.

℞. Foliorum recentium Absinthii,
— — Angelicae,
— — Basilici,
— — Abrotani,
— — Foeniculi,
— — Hyssopi,
— — Majoranae,
— — Melissae,
— — Menthae aquaticae,
— — Origani,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Serpylli,
— — Thymi,
Flor. Lavand., sing. part. unam.
Aquae Vitae partes triginta duas.
Digere frigide per dies octo, exprime et filtra. (*Vm.*)

Acetum Salviae. (Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Fol. rec. Salviae . part. unam.
Aceti albi . . . partes sedecim.
Macera per dies 14 in vase tecto, subinde agitando, cola ac filtra. (Gal.)

Vm. Salviae partem unam, Aceti octo et octo dies macerationis; — *T.* Foliorum uncias sex, Aceti libras sex et octo ad decem dies digestionis; — *Fi.* Foliorum libram unam, Aceti fortis duodecim et sex dierum digestionem

Oleum Salviae aethereum, Aetheroleum Salviae. (A. Br. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. *Br. Gr. Re. T.*)

℞. Herbae floresc. Salviae . q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Destillent. (*Br.*)

Han. HassP. Herbae partem unam et octo Aquae; — A. Aquae duodecim; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — *T.* Herbae q vis, Aquae bull. pondus duplum, destillare quamdiu liquor aliquid extrahit, tunc per plures vices cohobare

℞. Herb. floresc. Salviae part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies destillent. (Br. Pal. Sar.)

Gr. Oleum Salviae Sclareae destillatum indicat.

Elaeosaccharum Salviae (HassP.) ut elaeosacch. anisi.

Aqua Salviae s. ex Salvia. (A. Ams. Ba. Bor. Bor4. Gal. Han. HassP. Li. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Wür. *Sw. Vm.*)

℞. Herbae floresc. Salviae part. unam.
Aquae . . quantum sufficit.
Post horas 24 destillent partes decem. (Ams. Bor. Bor4. Han. O. Pol. *Sw.*)

HassP. Herbae libras tres, Aquae q s.; destillent librae viginti quatuor; — Gal. Pal. et Pm Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Li. et Wür. Aquae sex; — A Aquae duodecim, destillent partes quatuor; — Sax. Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Ba sedecim Aquae; destillent partes quatuor; — Sar. quatuor Aquae; destillent partes duae et denuo destillent supra novam Herbam

℞. Herbae floresc. Salviae part. decem.
Aquae purae partes centum viginti.
— Vitae . . partem unam.
Destillent partes triginta. (*Vm.*)

Aqua Salviae composita. (Gal.)

℞ Specierum vulner. . partes duas.
Aquae . . . . partes viginti.
Destillent partes octo.

Spiritus Salviae, Aqua Salviae spirituosa. (Fer. Gal *Gr. T.*)

℞. Herbae floresc. Salviae libr. unam.
Vini albi . . . libras quatuor.
Post horas viginti quatuor macerationis destillet dimidia pars. (Gal.)

℞. Herb. floresc. Salviae sesquilibram.
Alcoholis . . . . libras octo.

Destillent librae sex. (Fer.)

T. Herbae florescentis libras duas, Spiritus Vini 32° octo; destillent circiter librae quinque; — *Gr.* Summit. libram, Aquae Vitae congium.

Aqua vulneraria s. traumatica s. sclopetaria s. vulneraria spirituosa s. vinosa s. sclopetaria aromatica s. catapultarum. Alcohol Salviae vulnerarius, Alcohol polyaromaticus. (A. B*. Bel. Bor. Bor4. Br. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Gr. Pid. Sp. T. Vm.*)

℞. Herbae Hyssopi,
— Menthae crispae,
— Salviae,
— Rorismar., sing. unc. duas.
Flor. Rorismarini,
— Lavandulae, sing. unc. unam.
Aquae Vitae . . libras decem.
Destillent, donec liquor limpidus prodire cesset (Li. Wir.)

℞. Herbae Absinthii,
— Anethi,
— Salviae,
— Tanaceti,
— Serpylli,
— Menthae piperitae,
Florum Lavand., sing. sesquiunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.
Alcoholis . . . . libras octo.
Post aliquot dierum infusionem destillent librae octo. (*Pid.*)

℞. Herbae Absinthii,
— Rutae,
— Salviae, sing. drach. octodecim.
— Foeniculi,
— Menthae piperitae,
Flor. Lavand., sing. sesquiunciam.
Aquae fontanae libras duodecim.
Alcoholis . . . . libras octo
Post duos dies infusionis destillent librae octo. (Hass.)

℞. Herb. rec. Agrimoniae,
— — Leontopodii,
— — Bellidis minoris,
— — Bellidis majoris,
— — Betonicae,
— — Buglossi,
— — Foeniculi,
— — Hyperici,
— — Plantaginis,
— — Saniculae,
— — Scrophulariae,
— — Verbenae, sing. manip. duos.
— — Aristolochiae,
— — Artemisiae,
— — Virgaureae,
Herb. rec. Salviae, sing. manip. quatuor.
Vini generosi libras quadraginta.
Stent in digestione, donec massa fermentare parumper coeperit et deinde destillando dimidium abstrahe. (Wir.)

℞. Radicis Consolidae majoris,
Herbae Consolidae majoris,
— Artemisiae,
— Bugulae, sing. manip. quatuor.
— Betonicae,
— Buphthalmi,
— Consolidae minoris,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Verbenae,
— Absinthii,
— Foeniculi, sing. manip. duos.
— Hyperici,
— Aristolochiae,
— Telephii majoris,
— Veronicae,
— Centaurii minoris,
— Millefolii,
— Nicotianae,
— Menthae,
— Hyssopi, sing. manip. unum.
Vini albi uncias centum quadraginta quatuor.
Post trium dierum infusionem destillent. (*Sp.*)

℞. Radicis Consolidae majoris,
Herb. Consolidae majoris,
— Bugulae,
— Saniculae,
— Betonicae,
— Scrophulariae,
— Plantaginis,
— Agrimoniae,
— Hyperici,
— Pervincae,
— Hederae terrestris,
— Artemisiae,
— Veronicae,
— Verbenae,
— Telephii majoris,
— Millefolii, sing. unc. quatuor.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanaceti,
— Absinthii,
— Chelidonii majoris,
— Foeniculi,
— Clematitis,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae, sing. unc. octo.
— Rutae,
— Chamomillae,
— Scordii,

Digitized by Google

Herb. Majoranae,
— Rorismar., sing. unc. quatuor.
Summit. floresc. Lavandulae,
— — Origani,
— — Calamintae, sing. unc. sex.
Vini albi . libras quinquaginta.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

Pal. eandem formulam, addendo tamen Absinthii pontici, Saturejae, sing. uncias octo, Basilici quatuor et Virgaureae tantidem,

℞. Foliorum Salviae . uncias octo.
— Rorismarini,
— Serpylli,
— Thymi, sing. . unc. unam.
Cardamomi minoris,
— majoris, sing. drach. sex.
Macidis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zedoariae,
Galangae,
Calami, singulorum semunciam.
Vini albi . . . . . libras octo.
Alcoholis . . . libras quatuor.

Post sufficientem digestionem destillent tres quadrantes. (Wir.)

℞. Florum Lavandulae,
Herb. rec. Hyssopi,
— — Melissae,
— — Menthae crispae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Serpylli, sing. unc. unam.
Alcoholis (0,850) . uncias decem.
Aquae . . . . libras duodecim.

Post horas viginti quatuor destillent librae decem. (A.)

℞. Herbae recentis Salviae,
— — Absinthii,
— — Menthae piperitae,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Aquae communis quantum sufficit.

Post horas 24 destillent librae octodecim (B°. Bor. Han. HassP. O. Pol.)

Bor4. Herbarum et Florum, sing. uncias duas, Spiritus Vini rectif. sesquilibram, Aquae q. s., destillent librae sex.

℞. Foliorum recentium Salviae,
— — Angelicae,
— — Absinthii,
— — Saturejae,
— — Foeniculi,
— — Menthae,
Foliorum recentium Hyssopi,
— — Melissae,
— — Basilici,
— — Rutae,
— — Thymi,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Origani,
— — Calamintae,
— — Serpylli,
Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Alcoholis unc. centum viginti octo.
Destillent. (*Sp.*)

Gr. Scordii uncias quatuor et Foliorum Basil. tantidem addit, caetera ut antea sed siccata praeter folia angelicae, macerare per dies quatuordecim et destillando congium unum cum dimid. abstrahere.

℞. Herbae florescentis Absinthii,
— — Basilici,
— — Catariae,
— — Hyssopi,
— — Majoranae,
— — Origani,
— — Rorismarini,
— — Rutae,
— — Salviae,
— — Thymi,
Florum Lavand., sing. part. duas.
Aquae Vitae partes nonaginta sex.
— purae partes quadringentas quinquaginta sex.
Destillent partes centum octoginta quatuor. (*Vm.*)

Bel. Salviae, Absinthii, Catariae, Hyssopi, Melissae, Basilici, Thymi, Rutae, Majoranae, Rorismarini, Origani et Lavandulae, sing. partem unam, Aquae Vitae quadraginta octo et Aquae ducentis septuaginta sex; destillent partes nonaginta duae.

℞. Summitatum Salviae,
— Tanaceti,
— Foeniculi,
— Thymi,
— Lavandulae,
— Absinthiii,
— Menthae aquaticae,
— Hyssopi,
— Chamomillae Romanae,
— Origani,
— Majoranae,
— Calamintae,
Stipit. et Rad. Angelicae, sing. unc. duas.
Alcoholis (22°) libr. viginti quatuor.

Post sufficientem macerationem destillent in balneo aquae librae viginti. (Gal. *Ca.*)

T. Salviae, Angelicae, Tanaceti, Menthae vulgaris, Foeniculi, Thymi, Majoranae, Calamintae, sing. uncias qua-

ed by Google

tuor, Absinthii, Hyssopi, Origani, Chamomillae vulgaris, Lavandulae, sing. duas, Alcoholis 36° triginta octo; post duorum dierum digestionem destillent in balneo aquae liquidi unciae triginta vel triginta duae.

℞. Florum Lavandulae,
Herb. rec. Absinthii,
— — Salviae,
— — Majoranae,
— — Rorismarini,
— — Hyssopi,
— — Rutae,
— — Melissae,
— — Thymi,
— — Basilici,
— — Origani,
— — Hyperici, sing. unciam.
Alcoholis (0,935) libras quatuor.
Aquae . . . . . libram unam.

Post horas viginti quatuor destillent librae tres. (*Br. Fi.*)

Aqua vulneraria aquosa s. pura destillata vulneraria (Fi.): Florum Lavandulae, Herbarum rec. Hyssopi, Melissae, Menthae piperitae, Origani, Rorismarini, Rutae, Salviae, sing. unciam unam, Alcoholis 36° quatuor, Aquae libras duodecim; post horas 12 digestionis destillent librae octo.

℞. Fol. Betonicae,
— Hederae terrestris,
— Artemisiae,
— Millefolii, sing. unc. quindec.
— Salviae,
— Angelicae,
— Tanaceti,
— Absinthii, sing. unc. decem.
— Abrotani,
— Foeniculi,
— Menthae,
— Hyssopi,
— Nicotianae, sing. unc. octo.
— Rutae,
— Chamomillae
— Scordii,
— Majoranae,
— Rorism., sing. unc. quatuor.
Summit. floresc. Lavandulae,
— — Origani,
— — Calamintae, sing. unc. sex.
Vini gener. libr. sexaginta septem.

Post horas 24 macerationis destillet dimidia pars. (Br.)

℞. Fol. Betonicae,
— Agrimoniae,
— Artemisiae, sing. . libram.
— Salviae,
— Hyperici,
— Tanaceti,
— Absinthii,
— Menthae, sing. uncias octo.
Fol. Scordii,
— Majoranae,
— Rorismarini,
— Lavand., sing. unc. quatuor.
Vini albi libras triginta (triginta duas His.)

Destillet in balneo aquae dimidia pars. (His. His.)

℞. Herbae Salviae,
— Absinthii,
— Menthae piperitae,
— Rutae,
— Rorismarini,
Flor. Lavand., sing. part. unam.
Aquae . . partes quinquaginta.
Alcoholis . . partes viginti duas.

Post duos dies destillent partes triginta sex. (Sax.)

Aeußerlich als zertheilend, und bisweilen innerlich bei Windcolik.

Fomentatio excitans. (LH.) Salviae, Absinthii, Rorismarini, sing. manipulum, Aquae ferv. libram, colaturae adde Alcoholis Camphorae unciam.

Elixir vitae mulierum, Aqua s. Balsamum embryonum, Aqua aromatica, Aqua balsamica s. Alcohol aromaticus, (Ams. ß*. Bor. Bor4. Br. HassP. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Micae Panis triticei modo e furno exsumpti . . . . libras duas.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae, sing. libram unam.
Nucis mosch. unc. tres cum dimid.
Florum Lavandulae,
Herbae Salviae,
Sem. Carvi,
— Foeniculi, sing. . unc. tres.
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariae,
Herbae Menthae crispae,
Radicis Paeoniae,
Seminum Paeoniae,
Visci querni, sing. . uncias duas.
Macidis . . . . . semunciam.
Galangae minoris drachmas tres.
Croci . . . . drachmas duas.
Vini Maderani . . libras decem.
Aquae Boraginis,
— Buglossi, sing. libr. quatuor.
— Florum Liliorum Convallium libras duas et uncias octo.
Aquae Fragorum,
— Rosarum, sing. uncias sedecim.

Post tres dies digestionis destillet, blando igne, liquidi dimidia pars. (Wir.)

℞. Galangae,
Zedoariae, singulorum semunciam.

Digitized by Google

Herbae Menthae,
— Melissae, sing. unc. unam.
Florum Stoechadis Arabicae,
— Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae, sing. drach. quinque.
Sem. Sileris montani,
— Foeniculi, sing. semunciam.
Nucis moschatae . unciam unam
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Corticis recentis Aurantiorum,
— Citri, sing. . sesquiunciam.
Vini albi . . . . libras duas.

Digere per horas 24 et destillando dimidium producti abstrahe. (Pal. Wir.)

Br. eandem formulam sed loco vini mixturam e libris quinque Aquae Vitae et Aquae libris decem et destillatione liquidi libras sex abstrahere.

℞. Rad. Paeoniae.
— Zedoariae,
— Zingiberis, sing. unc. duas.
— Galangae . . drachmas sex.
Herbae Salviae,
— Melissae,
— Foeniculi,
— Menthae, sing. . unc. tres.
Florum Caryophyllorum rubrorum,
— Tiliae, sing. . uncias sex.
Nucis mosch., sing. uncias tres.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macidis, sing. . . uncias duas.
Alcoholis unc. quadraginta quatuor.
Aquae font.
unc. ducentas quadraginta.

Post aliquot dies infusionis destillando uncias centum nonaginta duas abstrahe. (*Sp.*)

℞. Nucis moschatae,
Macidis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Zingiberis,
Zedoariae, sing. . . semunciam.
Galangae minoris, drachmas duas.
Florum Lavandulae,
Herb. sicc. Menthae,
— — Salviae, sing.
semunciam.
Sem. Coriandri,
— Foeniculi, sing. drach. duas.
Aquae Vitae . . . sesquilibram.
— purae libr septem c. dimid.

Macera per tres dies et tunc destillando liquidi libras tres cum dimidia abstrahe. (Ams.)

℞. Herbae Salviae . . uncias octo.
— Rorismarini,
— Menthae piperitae,
Flor. Lavand., sing. unc. quatuor.
Seminum Foeniculi,
Cassiae caryophyllatae (cinnamomeae), sing. . . uncias duas.
Alcoholis . . . libras quatuor.
Aquae . . . . . libras viginti.

Post horas 24 macerationis destillando libras duodecim liquidi abstrahe. (B°. Bor. HassP.)

Bor4. Spiritus Vini rectificati libras sex.

Reizend, stärkend, herzstärkend und blähungtreibend. — Gabe, eine halbe bis eine ganze Unze. — Man wendet es auch äußerlich an; ehedem soll man es zur Verhütung von Fehlgeburt mit Erfolg benutzt haben, indem man eine damit befeuchtete heiße Brodrinde auf den Leib der Schwangern legte. Heutzutage weiß man, was von der Anwendung solcher reizenden Mittel zu halten ist.

℞. Foliorum recentium
Salviae,
Absinthii,
Menthae piperitae,
Rutae.
Rorismarini,
Summit. Origani, sing. unc. decem.
— Lavandulae uncias quatuor.
Alcoholis 22° . libras duodecim.
Aquae communis . libras decem.

Macera per horas 24, postea liquoris libras duodecim destilla. (Pm.)

Sambucus.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Sambucus Ebulus*, *L.*; Zwergholunder, Attich, Attichhirschschwanz; Hièble, Yèble (*Gal.*); Dwarf elder (*Ang.*); Chebdj (*B.*); Mmerhyld (*D.*); Yezgo (*His.*); Lange vlier (*Bel.*); Ebbio (*I.*); Chebd (*Pol.*); Engos (*Lus.*); Sommarhyll (*Suec.*).

A. Ba. Br. Fer. Gal. Gen. His. His3. Lus. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Gr. M. Pid. Sa. Sp.* Z.

Ein Strauch (Pentandria Trigynia, L.; Caprifoliaceae, J.), welcher überall in Europa wächst. (*Blackw.* t. 480. *Plenck* t. 280. *Zorn* Ic. pl. t. 40)

Man wendet die Rinde der Wurzel, die Blätter, die Früchte und den Saamen an.

Die innere Rinde der Wurzel (radix Ebuli s. Sambuci humilis s. agrestis s. Chamaeactis) ist weiß und hat einen bittern, widerlichen Geschmack. Die Wurzel selbst ist langgestreckt, fingerdick. Sie gilt für brechenerregend und wassertreibend. — Man verordnet zwei Unzen, mit Wasser aufgegossen; auch kann man eine Unze von dem ausgepreßten Safte geben. — Die Blätter (folia Ebuli) sind eirund, lanzettförmig spitzig, gezähnt, oben glatt und

glänzend, unten dunkelgrün. Sie haben einen sehr unangenehmen Geruch. Ehedem wendete man sie äußerlich bei Oedem und Erysipelas an. — Die Früchte (baccae s. grana Actes) sind schwarze, dreisaamige Beeren von einem süßen und widerlichen Geschmack. Sie werden für auflösend, schweiß- und harntreibend gehalten.

Die Saamen geben, in Wasser geweicht und ausgepreßt, Oel.

2) *Sambucus nigra*, *L.*; Fliederbaum, Hollunder; Sureau noir (*Gal.*); Elder (*Ang.*); Ukti, khaman (*Ar.*); Bez (*B.*); Hyld (*D.*); Sauco (*His.*); Vlier (*Bel.*); Sambuco (*I.*); Bzowy (*Pol.*); Sabugueiro (*Lus.*); Busina (*R.*); Floeder (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LH. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.*

Ein Strauch Europa's. (*Blackw.* t. 151. Fl. Dan. t. 545. *Plenck* t. 229. *Hayne* IV. t. 16. Düss. off. Pfl. V. t. 17. Fl. med. VI. 336.)

Man wendet die Rinde, die Blätter, die Blüthen und die Früchte an.

Die mittlere oder innere Rinde der Zweige (cortex s. alburnum Sambuci), von welcher man gewöhnlich die dünne und aschgraue Oberhaut abzieht, ist grün. Sie hat einen starken und widerlichen Geruch und einen anfangs süßlichen, hinterher scharfen und etwas bittern Geschmack. — Die Blätter sind unpaarig gefiedert, dunkelgrün, glatt, die Blättchen eirundlanzettförmig, sägezähnig, spitzig. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen scharfen Geschmack. — Die Blüthen (flores Sambuci) sind weiß, klein und haben einen starken und unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern Geschmack. — Die Früchte (baccae Sambuci) sind saftige, eirunde, schwarze, genabelte, dreisaamige Beeren, welche einen röthlichen, säuerlichen und geruchlosen Saft enthalten. Man nennt sie nach dem Trockenwerden grana Actes. — Statt dieser Art gebraucht die Americanische Pharmacopöe die Beeren von Sambucus Canadensis, *Willd.* (*Gr.*)

Bor4 hat ein *Roob Sambuci crudum s Succus Sambuci inspissatus crudus.*

Pulvis ad erysipelam. (BorC.)

℞ Florum Sambuci,
Furfuris tritici, sing. part. aeq.
Misce.

Species sudorificae (ad infusa paranda) s. diaphoreticae. (Gal. *Fi. Re. T.*)

℞. Florum Sambuci,
— Boraginis,
— Rhoeados,
Ligni Sassafras, sing. part. aeq. (Gal. *Re.*)

℞. Foliorum Melissae,
Flor. sicc. Tiliae, sing. part. tres.
— Sambuci . . partem unam.
Concisa misce. (*Fi. T.*)

Succus Sambuci s. Baccarum Sambuci. (Gal. Sar. *T.*)

℞ Bacc. Sambuci matur. . q. vis.
Contere inter manus, massam tunc per tres vel quatuor dies fermentatam cola exprimendo et succum in lagenis sub olei strato serva.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Succus Ebuli s. Baccarum Ebuli. (Gal. Sar. *T.*)

Ut succum baccarum sambuci.

Tragea Granorum Actes, Pulvis Sambuci. (Wir. *Sp.*)

℞. Succi Bacc. Sambuci . . q. vis.
Farinae secalitiae quantum sufficit.
In pastam redige et panes parvos exinde forma, qui prope ignem coquantur, donec bene sint siccati; tunc in pulverem redactos novo succo humecta et sicca. Quam operationem ter e serie repete. Unciae uni massae pulveratae adde
Nucis mosch. pulv. drach. unam.
Gegen Ruhr empfohlen. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Syrupus Sambuci. (A.)

℞. Succi Bacc. Sambuci rec. expr. libram.
Sacchari albi . . . libras duas.
Ebulliant semel.

Roob Sambuci s. sambucinum s. Sambuci depuratum, Succus Sambuci inspissatus s. inspissatus depuratus, Extractum Baccarum Sambuci, Succus Baccae Sambuci inspissatus, Roob Baccarum Sambuci sine Saccharo et cum Saccharo. (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. LP. O. Pal. Pm. Pol R. Sar. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Sw. T. Vm.*)

℞. Bacc. Sambuci matur. . q. vis.
Coque in vase stanneo tecto, continue agitando, per semihoram vel donec dirumpantur; trajice per cribrum et residuum fortiter exprime; liquores

ambos commisce, mixturae libris quindecim adde Sacchari libras quatuor, et bene despumando ad mellis consist. usque inspissa. (Bel.)

B. Succi libras decem, Sacchari quatuor; — An. Succi libras quinque, Sacchari unam; — D. Succi libras quatuor, Sacchari unam; — Ba. Succi sedecim, Sacchari unam; — Fer. Succi libras quatuor et duas Sacchari; — HassP. Succi depurati partes octo, Sacchari partem dimidiam.

℞. Bacc. Sambuci matur. . . q. vis.

Inter manus contritis, succum exprime et per pannum laneum trajice; succi octariis duobus adde Sacchari albi semilibram, tunc ignis vividioris ope ad mellis consist. consume. (*Vm.*)

Fi. In mortario marmoreo contundere, per diem unum seponere ad fermentationem usque, exprimere, addere Sacchari pondus duplum, coquere et ad mellis consist. consumere; — Pal. Sacchari partem unam et duas Succi; — Am. Ed. et *C.* quinque Succi; — LP. Succi expressi libras quatuor, Mellis boni unam; — Ful. *Gr.* Succi quatuor; — Br. Hass. R. Wir. Wür. et *Sw.* Succi sex; — A. Succi novem; — Bor. O. Pol. et Sax. sedecim Succi; — *T.* Succum e Baccis contritis post duos vel tres dies exprimere, in balneo aquae vel vaporis ad syrupi et adjectis Sacchari unciis tribus pro quaque libra ad mellis consist. inspissare; — *Gr.* Succi congios sedecim, Sacchari libras octoginta septem.

℞. Succi expr. Bacc. Sambuci q. vis.

Sepositione depuratum ignis moderati ope sufficienter inspissa. (Du. Gal. Gen. Li. Sar. *Br. Gr.*)

Pm. Succum expressum lento igne despumare, per pannum colare et balnei maris ope ad extracti mollis spissitudinem redigere; — Bor4. Succum crudum Aqua comm. solvere, post decanthationem colare et primum leni igne, tunc in balneo vaporis ad syrupi spissioris consist. consumere.

Schweißtreibend. — Gabe, anderthalb bis zwei Unzen.

Roob s. Pulpa Ebuli. (A. Ba. Br. Ful. Pal. Sar. Wir. *T. Vm.*)

℞. Bacc. Ebuli rec. . . part. unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut empyreuma prohibeatur; coque, donec dirumpantur et exprime succum, qui addendo Sacchari partem sedecimam ad pulpae consist. evaporet. (Ba.)

A. Sacchari partem unam et novem Succi; — *Vm.* Succi decem; — Br. Ful. Pal. et Wir. Succi sex.

℞. Succi Baccarum Ebuli . q. vis.

Cola et in balneo aquae ad electuarii consistentiam inspissa. (Sar.)

T. ut roob sambuci.

Harntreibend, laxirend. — Gabe, zwei Unzen. — Man verſchreibt es ſelten allein und faſt immer als Excipiens.

Extractum Florum Sambuci. (Sar.)

℞. Flor. Sambuci rec. . libras octo.

Macera per tres dies in alembico et destillando in balneo aquae uncias circiter duas abstrahe; residuo Aquae triplum infunde et post horas sex digestionis coquendo ad tertiae partis remanentiam consume; exprime flores, liquorem clarificatum et colatum ad electuarii consist. inspissa et huic nonnisi tepido Aquam dest. adde.

Mixtura antiasthmatica. (*Sm.*)

℞. Roob Sambuci,
Pulpae Prunorum,
Syrupi Rhoeados, sing. unc. duas.
Nitri . . . . drachmam unam.

Mel Sambuci s. Florum Sambuci. (Wir.)

℞. Flor. rec. Sambuci libram unam.
Mellis despumati . . libras duas.
Aquae Florum Sambuci uncias sex.

Macera per aliquot dies, tunc coque blando igne, cola exprimendo et ad consist. requisitam consume. — Ehedem zu erweichenden und zertheilenden Gurgelwaſſern.

Mel Fructuum s. Baccarum Sambuci. (His. His3.)

℞. Succi Bacc. Sambuci matur.,
Mellis, singulorum libras duas.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque ad syrupi spissi consist. et cola. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Acetum Sambuci s. sambucinum. (Ams. Br. Gal. Lus. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Pid. Sw. T.*)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aceti . . . . partes duodecim.

Macera per dies quatuor, clarifica lactis ope et filtra. (Suec.)

Gal. Florum partem unam, Aceti sedecim et quatuordecim dies macerationis; — Br. Pal. Wir. et *Sw.* Aceti sex; — Sar. et *Pid.* Aceti quatuor et sex dies macerationis; — Wür. Aceti novem et tres septimanas macerationis; — Ams. Aceti octo et quatuor dies macerationis; — *T.* Florum uncias sex, Aceti libras sex, digestionem per octo vel decem dies, colare leviter exprimendo, clarificare sepositione vel filtrare et infusionem, si vis, repetere.

℞. Flor. Sambuci sicc. libram unam.
Aceti communis . . libras sex.
Macera per dies sex, tunc coque et colaturae adde
Alcoholis . . . . semilibram.
Misce bene. (Lus.)

Schweißtreibend, reinigend und austrocknend. — Man wendet es in heißem Zuckerwasser an, um Schweiß hervorzurufen. Auch braucht man es in Gurgelwasser, mit Wasser und Honig vermischt, bei Bräune.

Oxymel Sambuci. (Wür. *Va.*)

℞. Aceti Sambuci . partem unam.
Mellis albi . . . . partes duas.
Coque lente ad consistentiam syrupi.

Decoctum Corticis Sambuci. (B*.)

℞. Corticis Sambuci manipulos tres.
Aquae fontanae,
Lactis, singulorum libram unam.
Decoque ad librae unius colaturae remanentiam. — Von Boerhaave bei Wassersucht empfohlen. — Gabe, eine Hälfte des Morgens, die andere des Abends.

Infusio s. Infusum Florum Sambuci nigrae. (An. DD. Gal. GalM. Ham. RC. *Huf. Ra. Va.*)

℞. Florum Sambuci drachmam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Digere per horae quadrantem et cola exprimendo. (DD. *Huf. Ra.*)

Ham. et GalM. Florum unciam unam et Aquae bull. q. s. ad colaturam unciarum octo; — An. RC. Florum unciam, Aquae libram et digestionem per horam calore gradatim ad bullitionem usque aucto; — *Va.* Florum drachmam unam ad duas, Aquae bull. libras duas; — *Va.* Hôt. D. Char. Florum drachm. duas.

℞. Florum Sambuci drachmas duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et colaturae adde
Syrupi Capilli Ven. unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

Schweißtreibend, bei rheumatischen Affectionen und hitzigen Exanthemen empfohlen. — Man wendet den Aufguß heiß und reichlich an, nachdem man ihn mit Honig, Sauerhonig oder Weinsteinsyrup versüßt hat.

Aqua sulphurosa composita. (*Ca.*)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aquae Bellilluc., sing. libr. unam.

In vier und zwanzig Stunden zu trinken, bei chronischen Catarrhen, Drüsenverstopfung, Scropheln und Flechten.

Gargarisma detergens s. detersivum. (Ful. *Sa.*)

℞. Florum Sambuci unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde, cola et adde
Nitri . . . . . semunciam.
Essent. Pimpinellae drachmas tres.
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

℞. Flor. Sambuci,
— Verbasci, sing. manip. unum.
Aquae bullientis quantum sufficit ad colaturam librae dimidiae, cui adde
Nitri . . . . semidrachmam.
Salis polychresti drachmam unam.
Roob Sambuci,
Syrupi Mororum, sing. unc. unam.
Misce bene. (*Sa.*)

Fomentatio s. Fomentum s. Fotus resolvens. (*Fi. Ra. Sp. Va.*)

℞. Infusi Flor. Sambuci libr. unam.
Aquae Vitae camphor. uncias octo.
Misce bene. (*Ra.*)

Va. Alcoholis camph. uncias quatuor.

℞. Flor. Sambuci . manip. unum.
Aquae . . . . uncias sedecim.
Infunde per horas 12 et adde colaturae
Aquae Vitae camph. unc. unam.
Acetatis Plumbi drachmam unam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Flor. Meliloti,
— Sambuci, sing. drach. duas.
Fol. Menthae,
— Salviae, sing. drach. unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Colaturae adde
Aquae Vitae . . . uncias tres.
Misce. (*Ra. Va.* Hosp. de la Matern.)

℞. Infusi Florum Sambuci,
Aceti Vini albi, sing. sesquilibram.
Ammonii muriat. pulv.
drach. duas.
Misce. (*Fi.*)

Fomentum siccum. (*Fi.*)

℞. Flor. Sambuci pulveratorum,
— Chamomillae, sing.
unc. unam.
Farinae secalitiae libram unam.
Misce.

Oleum Sambuci (His. His3. Sar. *Gr. Re.*)

℞. Flor. Sambuci part. unam cum dimid.
Olei Olivarum . . partes tres.
Post duos dies digestionis in balneo aquae, refrigerata exprime et operationem cum novis Floribus repete. (Sar.)
His. Florum partem unam et tres

Olei; — His3. Florum libras tres, Olei octo; — *Gr. Re.* Florum partem unam et Olei duas coquere, donec crispi fiant, exprimere et sepositione clarificare.

Oleum Sambuci viride (*Gr.*): Foliorum Sambuci recent. libram, Ol. Olivarum octarios duos coque, donec crispa fiant, oleum exprime et denuo igni appone, donec pulchrum colorem viridem adeptum sit.

Unguentum Sambuci s. Sambuci Florum s. sambucinum. (Du. His. His3. Lon. *C. Gr. Re. Sp. T.*)

℞. Flor. rec. Sambuci partes tres.
Axungiae Porci partes quatuor.
Sebi vervecini . . partes duas.
Coque flores cum axungia, exprime et adde sebum. (Du. *Gr.*)

Gr. praeterea: Florum libras viginti octo, Axung. Porci octoginta quatuor, Sevi viginti octo; — Lon. *C. Gr. Re.* coquere Florum et Axungiae part. aeq.; — His. Florum partes quatuor, Sebi tres et Olei Olivarum unam.

℞. Sebi vervecini . . partes tres.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua simul et in mixtura digere
Florum Sambuci partes quatuor.
Post aliquot tempus cola. (*Sp.*)

T. Sebi uncias sex, Olei octodecim, Florum pondus aequale, octo dierum digestionem, evaporationem humidi in balneo aquae etc.

℞. Cort. Sambuci libr. duas c. dimid.
Foliorum Sambuci . semilibram.
Axungiae Porci . libras novem.
Post dies septem macerationis coque ad humidi consumpt. usque. (His. His3.)

℞. Unguenti Sambuci comm. libram.
Cerae albae . . unciam unam.
Olei Lavandulae drachmas duas.

Aqua Florum s. ex Floribus Sambuci. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br D. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. LP. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Gr. Pid. T.*)

℞. Florum Sambuci . partes tres.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillent partes sex. (Suec.)

HassP. destillent partes viginti quatuor; — A. Florum partes sex et Aquae q. s.; destillent partes octo; — Gal. Pm. Sar. et *T.* Florum partem unam et quatuor Aquae; destillent partes duae; — Ba. Aquae sedecim; destillent partes quatuor; — Pal. Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Ams. B. Bel. D. Han. O. Pol Aquae q. s.; destillent partes decem; — Hass. R. Sax. et *Pid.* Aquae octo; destillent partes quatuor; — Wür. et *Br.* Aquae sex; — Bor. Bor4. Aquae quindecim; destillent partes decem; — — Fer. Florum partes tres et Aquae sex; destillent partes sex; — LP. Florum partes quatuor, Aquae quindecim, destillent octo; — *Fi.* Florum libras tres, Aquae libras quindecim; destillent libras sex; — *Gr.* e Floribus recentibus et salitis (libras quinquaginta, Aquae q. s., abstrahantur congii viginti.).

℞. Florum Sambuci . partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.
Flores in saccum include medio cucurbitae ita suspensum, ut aquam non attingat; destillent partes sex. (Ful. Li.)

℞. Flor. rec. Sambuci part. sedecim.
Aquae . . . partes quadraginta.
Macera per dies duos et fermentatione incipiente destillent partes viginti. Producto adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Misce bene. (His. His3.)

℞. Bacc. Sambuci contus. . q. vis.
In dolio fermentent, donec odorem vinosum emittant; destillent deinde leni igne et productum si requiritur rectificetur. (Br. Wir.)

Vinum Baccarum Sambuci, Elderberry wine (*Rc.*): Baccarum part. unam, Aquae duas, coque per ½ hor., liquorem defunde, baccas per crinium exprime, Succi mensurae (quart) cuique adde Sacch. Lisboens. librae partes tres, coque per horae quadrantem, addendo Pip. Jamaicens., Zingib. et Caryophyll. aliquantulum, fermentationi subjice et hac peracta congiis octenis adde Aquae Vitae librae quadrantem etc.

Aqua Ebuli. (Wir.)

℞. Bacc. Ebuli contus. . . q. vis.
In dolium immitte, fermentationi subjice et simulac odorem vinosum adeptae sunt, blando igne destillent; productum, si requiritur, rectificetur.

Julapium sambucinum. (Wir.)

℞. Aquae Sambuci . uncias viginti.
Sacchari albi libr. duas c. dimid.
Ebulliant semel et colentur.

Spiritus Sambuci. (Br. Pal. Wir.)

℞. Florum Sambuci partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
Post tres dies macerationis destillet dimidia pars.

Sandaraca.

Gummi s. Resina Juniperi, Vernix sicca; Σανδαραχη; Sandarach, Wachholderharz; Sandaraque, Gomme de genévrier (*Gal.*); Gum juniper (*Ang.*); Resina de enebro, Grasilla, Sandaraca (*His.*); Geneverharb (*Bel.*).

Ams. B Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. Ham. Han. His. His3. O. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. T. Z.*

Ein Harz in kleinen trocknen Tropfen oder in durchsichtigen Stücken von hell- oder citronengelber Farbe, welche mit der Zeit roth werden. Der Bruch ist glänzend und glatt, Geruch und Geschmack sind dem des gemeinen Harzes ähnlich. Das Pulver ist weiß.

Nach Broussonet's Vermuthung fließt es aus Thuya articulata, *Desf.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.) der Berberei (*Vahl* Symb. 2. p. 96. t. 18. *Desf.* Fl. Atlant. II. t. 252.) *Gr* führt auch T. quadrivalvis an. Lange Zeit leitete man es von Juniperus communis, L., J. lycia, L.; oder J. oxycedrus her, von denen ersterer bisweilen zwischen Holz und Rinde ein sehr verschiedenes, grünliches Harz, welches Deutscher Sandarach (Sandaraca Germanica); Sandaraque d'Allemagne (*Gal.*) genannt wird, zeigt.

Reizend.

Sanguinaria.

Sanguinaria Canadensis, L.; Canadisches Blutkraut; Sanguinaire du Canada (*Gal.*); Bloodroot Puccoon, Indian paint Turmeric (*Ang.*).

Am. *C. Gr. Re.*

⊙ (Polyandria Monogynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Nordamericanische Pflanze. (*Big.* Med. Bot. t. 7.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel ist dick und überall mit vielen Fasern besetzt. Sie liefert einen blutrothen Saft. Ihr Geschmack ist scharf und etwas bitter

Brechenerregend. — Gabe des Pulvers, acht bis zwanzig Gran. — Nach Smith ist ihre Wirkung der des rothen Fingerhuts ähnlich und sie vermindert ebenso die Schnelligkeit des Pulses.

Die Saamen haben in der Wirkung, nach Barton, Aehnlichkeit mit denen des Stechapfels.

Infusum Sanguinariae Canadensis. (B*.)

℞. Rad. Sanguinar. Canad. drach. unam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. — Brechenerregend, von Tully empfohlen. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze, bis die beabsichtigte Wirkung eintritt.

Tinctura Sanguinariae Canadensis. (Am. B*. *C. Re.*)

℞. Rad. Sanguinar. Canad unc. duas.
Alcoholis tenuis octarium unum.
Post sex (decem) dies digestionis filtra.

Zu Anfang der Lungenschwindsucht, bei Brustwassersucht, beginnendem Croup ꝛc. empfohlen. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen und mehr, nach und nach gestiegen.

Sanguis Draconis.

Draconis Sanguis, Gummi s. Resina Sanguinis Draconis; Drachenblut; Sangdracon (*Gal.*); Dragon's blood (*Ang.*): Damulakhwain, Idaramie (*Ar.*); Damulakhwain (*Duk.*); Drakowa krew (*B.*); Drageblod (*D.*); Sangre de dragon (*His.*); Heraduky (*Hin.*); Draakenbloed (*Bel.*); Sangue di dragone (*I.*); Sangue de drago (*Lus.*); Jaranang (*Palembang*); Khunisyawashan (*Pe.*); Pra Smocza krew (*Pol.*); Catukamrigarakta (*Sa.*); Drakblod (*Suec.*); Kandamurgarittum (*Tam.*); Catgamurgum nituru (*Tel.*)

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D Fer. Ful. Gal. Han. HassP. His. Hi3. O. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sa. Sp. T. Z.*

Eine dunkel blutrothe, geruch- und geschmacklose, harte, zerreibliche, trockne, am Feuer schmelz- und entzündbare Substanz, welche mit einem balsamischen Geruch brennt. Man unterscheidet mehrere Sorten:

1) *Sanguis Draconis in granis* (en grains *Gal.*), in kleinen gesonderten durchsichtigen Tropfen.

2) *Sanguis Draconis in lacrymis* (en larmes), in eiförmigen, haselnußgroßen, perlenschnurförmig aneinandergereihten Stücken.

3) *Sanguis Draconis in placentis* (en pains), in platten, einen Zoll dicken und einige Unzen schweren Massen oder Kuchen.

4) *Sanguis Draconis in tabulis* (en tables), in drei oder vier Zoll langen und sechs bis acht breiten und über einen Zoll dicken Platten.

5) *Sanguis Draconis in cannis, Pterocarpi Draconis Resina* (*Gr.*), in kleinen, in Blätter gewickelten Massen.

Dieſer Stoff wird aus den Früchten von Calamus Rotang, L. (C. Draco, *Willd*.) (Hexandria Monogynia, L.; Palmae J.), einem kleinen Baume Oſtindien's (*Rheede* Mal. t. 64. *Bert.* Bild. III. 76. fig. 2), und aus dem Stamme von Pterocarpus Draco, L. (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.), einem Baume Südamerica's (*Hayne* IX. t. 9); von P. Indicus, einem Baume Indien's; von Pterocarpus santalinus, L, einem Baume Oſtindien's, von Dracaena Draco L. (Hexandria Monogynia, L.; Asparagineae, J.), auf den Canariſchen Inſeln (*Blackw.* Herb. t. 358. *Bert.* Bild. II. 8. fig. 1.); von Dalbergia monetaria (Diadelphia Decandria, L; Leguminosae, J.), einem Baume Surinam's und verſchiedenen Arten Croton gewonnen.

Melandri (ſ. Hayne getr. Darſt. d. Pfl.) fand darin ein eigenes Alcaloid, Draconin (Draconinum), welches im S. Drac. in guttis s. lacrymis nur in geringer Menge enthalten iſt, dahingegen das S. Drac. in placentis faſt ganz daraus beſteht.

Ein ſchwaches Adſtringens. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

Pulvis ad haemoptysin. (*Sm.*)

℞. Sanguinis Draconis drachmas duas.
Magnesiae subcarb. drach. quatuor.
Divide in partes duodecim. — Alle zwei oder drei Stunden ein Stück mit etwas Waſſer.

Pulvis adstringens s. contra casum. (Pal. Sar. *Sp.*)

℞. Terrae sigillatae,
Sanguinis Draconis,
Mumiae Aegypt., sing. semunc'am.
Cetacei . . . drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Fiat pulvis. (*Sp.*)

Pal. Trium priorum dictarum substantiarum, sing. drachmas duas et reliquarum ambarum drachmam unam.

℞. Baccarum Myrti,
Balaustiorum,
Boli Armenae,
Mastichis,
Olibani,
Sanguinis Draconis, sing. part. aeq.
Fiat pulvis. (Sar.)

Ehedem nach Stürzen empfohlen. — Gabe, zwei Scrupel.

Tinctura Sanguinis Draconis. (Sar.)

℞. Sanguinis Draconis pulv. unc. duas.
Alcoholis . . . . libram unam.
Post tres dies digestionis in balneo arenae tepido filtra.

Gabe von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep s. Julapium adstringens. (*Pic.*)

℞. Aquae Plantaginis,
— Rosar. rubr., sing. unc. tres.
Corallii rubri,
Sang. Draconis, sing. semidrach.
Syrupi Rosarum rubrarum,
— Cydonior., sing. drach. sex.
Succi Plantaginis . uncias duas.

Sanguis Draconis factitius. (*Gr.*)

℞. Resinae flavae . libras quatuor.
Olei Olivarum . . uncias octo.
Liquatis adde
Boli Venetae,
Santali rubri, sing. . . libram.

Sanicula.

Sanicula Europaea, L.; Sanickel; Sanicle d'Europe (*Gal.*); Sanicle (*Ang.*); Sanikel (*Bel. D. Suec.*), Sanicula (*His. Lus.*); Sanicola (*I*); Zakkiel (*Pol.*).

Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 109)

Man wendet das Kraut (herba Saniculae s. Diapensiae) an; es beſteht aus einfachen, langgeſtielten, runden, fünflappigen, ſägezähnigen, glänzenden Wurzelblättern, dünnen Stängeln und ſitzenden dreiſpaltigen Stängelblättern. Es hat keinen Geruch und einen bittern, etwas adſtringirenden und ſalzigen Geſchmack.

Es kommt mit zu manchen Bruſtſpecies.

Santalum.

Man kennt drei Hölzer dieſes Namens.

1) *Lignum Santali rubri s. Pterocarpi*; rothes Sandelholz, Kollaturholz; Santal rouge (*Gal.*); Red saunders (*Ang.*); Sundal almeer, Undum (*Ar.*); Czerweny santal, Czerwene santalowe drewo (*B.*); Rackta chandana (*Beng.*); Honnay (*Com.*); Ruct haudun (*Cy.*); Lal chudend (*Duk.*); Sandalo rubro (*His.*); Ruckut chundun, Undum (*Hin.*); Root zandelhout (*Bel.*); Sandalo rubio (*I.*); Sundul surkh, Buckum (*Pe.*); Kuchandana, Tilaparni, Runjana, Rukta chandana (*Sa.*); Segapu chandanum (*Tam.*); Kuchandanum (*Tel.*).

An. B. Bor4. Br. Du. Ed. Gal. His. His3. Lon. LonN. Suec Wir. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Dieſes Holz kommt in mehr oder weniger dicken, der Länge nach geſchnittenen,

ſchön rothen, gefurchten Stücken ohne Rinde oder in Raſpelſpähnen vor (scops, rasura Ligni Santali rubri, Lignum Santali rubrum raspatum), zwiſchen deren Furchen ein harziger verhärteter Saft ſitzt. Es hat einen ſehr merklich gewürzhaften Geruch und einen etwas harzigen Geſchmack.

Es kommt von Pterocarpus santalinus, L. (Diadelphia Hexandria, L.; Leguminosae, J.), einem Baume Oſtindien's.

Pelletier hat darin einen eigenthümlichen färbenden Stoff, das Santalin (Santalina, Santalinum), Santaline, entdeckt.

2) *Lignum Santali albi*; weißes Sandelholz; Santal blanc (*Gal.*); Ayasru (*Amb.*); White saunders (*Ang.*); Sundel abiez (*Ar.*); Chandana (*Beng.*); Tanmuh (*Cy.*); Srigunda (*Can.*); Cayhuyndhan (*Co.*); Sandun (*Cy.*); Sundel (*Duk.*); Chunden, Chandana, Katchandan (*Hin.*); Sandalo bianco (*I.*); Tsjendana (*Mal.*); Sundul sufleid (*Pe.*); Chandana, Malagaja (*Suec.*); Chandanum, Chandanacilttay (*Tam.*); Chandanum (*Tel.*); Aikamenil (*Timor.*).

B. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. Wiir. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.*

In der Länge nach geſchnittenen, ſehr ſchweren, mit einer ſchwärzlichgrauen, etwas unebenen Rinde bedeckten Stücken von gelblichweißer Farbe, ſchwach aromatiſchem Geruch und faſt gar keinem Geſchmack.

3) *Lignum Santali citrini s. pallidi*; gelbes Sandelholz; Santal citrin (*Gal.*); Yellow saunders (*Ang.*); Zluty santal, Zlute santalowe drewo (*B.*); Sandalo citrino (*I.*).

An. B. Br. Gal. His. His3. Wir. *Fi. G. Gr. Z.*

Dieſes Holz hat eine gelbliche Farbe und ein feineres Korn als das vorige; es iſt brüchiger, leichter und gewöhnlich ohne Rinde. Es hat einen ſehr deutlich gewürzhaften Geruch und faſt keinen Geſchmack.

Das weiße und gelbe Sandelholz kommen von Santalum album, L. (Tetrandria Monogynia, L.; Onagrariae, J.), einem Baume Oſtindien's (*Rumph.* Amb. II. p. 42. t. 11. *Plenck* t. 101. *Lam.* Ill. t. 74.). Sirium myrtifolium? — Hermann betrachtet das weiße als den Splint, das gelbe als den Kern des Holzes; nach Mérat iſt erſteres das junge, letzteres das alte Holz.

Das gelbe Sandelholz iſt reizend, ſchweißtreibend; das rothe ſchwach abſtringirend.

Decoctum Ligni Santali citrini. (B*.)

℞. Rasur. Lig. Santali citr. semunciam,
Aquae fontanae . . libras duas.
Coquendo dimidium consume. Glasweiſe.

Oleum Santali citrini vel albi aethereum, Aethereoleum Santali citrini vel albi. (Wir. *Gr. T.*)

℞. Rasur. Lig. Santali albi . q. vis.
Aquae . . . . partes quatuor.
Macerentur, destillet dimidium et cohobetur etc. (*T.*)

℞. Ras. Lig. Santali citrini libr. sex.
Aquae purae libras triginta sex.
Salis culinaris . . libram unam.
Macera per quatuor vel quinque dies et destillando obtentum oleum quod in fundum descendit, collige.

Aqua Santali citrini (*Gr.*) ſtatt Roſenwaſſer verkauft.

Unguentum santalinum, Emplastrum santalinum s. incognitum. (Br. Sar. Sax. Wir.)

℞. Olei Myrti . . . . libras tres.
Cerae albae . . uncias novem.
Petal. sicc. Rosarum rubr.,
Lig. Santali rubri, sing.
uncias quatuor.
Camphorae . . . . semunciam.
Cerae in oleo liquatae pulverem rosarum, tunc santalum et denique camphoram in olei pauxillo solutam adde.

℞. Santali albi,
— citrini,
— rubri, sing. drachmas sex.
Flor. rec. Rhoeados sesquiunciam.
— — Rosarum
unc. duas c. dimidia.
Olei rosati . . . libram unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.
Post duos dies macerationis coque lente ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et adde
Boli Armenae,
Cerae albae, sing. . uncias tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Misce. (Wir.)

℞. Pulveris Santali rubri partes sex.
— Croci . . partem unam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis crudi, sing. . part. $1\frac{1}{2}$.
Liqua et massae semirefrig. adde
Resinae Pini,
Cerae flavae, sing. part. sedecim.
Misce bene. (Sax.)

℞. Cerae,
Resinae Pini, sing. unc. quatuor.
Liqua et adde
Ligni Santali rubri sesquiunciam.
Croci . . . . drachmas duas.
Olibani,

Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis, sing. sesquidrachmam.
Misce. (Br. Wir.)

Species diatrion Santalon. (Pal. Wir.)

℞. Santali albi,
— citrini,
— rubri, sing.
drach. duas et scrup. duos.
Flor. Rosarum unc. tres et drachmas tres.
— Violarum . . semunciam.
Rhei,
Seminum Portulaccae,
Eboris ad alborem usti,
Succi Liquirit., sing. drach. duas.
Amyli,
G. Arabici,
— Tragacanth., sing.
scrup. quatuor.
Addi potest
Camphorae . . scrupulus unus

Die Alten verordneten diese Species zur Verbesserung der unregelmäßigen Hitze der Leber, bei schleichenden Fiebern, Gelbsucht und Wassersucht — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Santolina.

Santolina Chamaecyparissus, L.; Gartencypresse, Cypressenkraut; Santoline à feuilles de cyprès, Aurone femelle, Garde-robe (*Gal.*); Sweet scented lavender cotton (*Ang.*); Santolina (*His. I. Lus*); Cypreskruid (*Bel.*).

Fer. Gal. Wir. *Be. Br. Gr M. Re. Sp.*

♄ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherene, *Cass.*) Eine auf den Gebirgen des südlichen Europa's wachsende Pflanze (*Zorn* Ic. pl. t. 245.)

Man wendet das Kraut (herba Santolinae s. Chamaecyparissi s. Abrotani foeminei s. montani) an: es besteht aus grauen, vierzähligen, gezähnten, stumpfen, immergrünen Blättern und hat einen durchdringenden, angenehmen Geruch und einen gewürzhaften und bittern Geschmack

Reizend, nervenstärkend, wurmwidrig.

Saponaria.

Saponaria officinalis, L.; Seifenkraut, Speichelseifenkraut, Waschkraut, Speichelwurz; Saponaire (*Gal.*); Soapwort (*Ang.*); Mydlj koren (*B.*); Saebeurt (*D.*); Jabonera (*His.*); Zeepkruid (*Bel.*); Saponaria, Saponella (*I.*); Mydelnik (*Pol.*); Sabonira, Saponaria (*Lus.*); Saepaaert (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass HassP. Li. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Fl. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va. Z.*

♃ (Hexandria Digynia, L.; Caryophylleae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 113. *Schk.* t. 121. *Plenk* t. 346. *Hayne* II. t. 2. *Bert.* Bild VI. 95. fig. 2. Fl. méd. VI. 311.)

Die Wurzel (radix Saponariae rubrae) ist dünn, hart, sehr lang, von der Dicke einer Schreibfeder, knotig, außen röthlichbraun, inwendig weiß, runzlig und fast geruchlos. Der Geschmack ist anfangs süßlich und schleimig, wird aber bald bitter, herb und etwas scharf. — Das Kraut besteht aus einem glatten, hohlen, walzenförmigen, gegliederten, wenig ästigen Stängel mit unbehaarten, sehr glatten, dunkelgrünen, fast sitzenden, eirundlanzettförmigen, ganzen und ganzrandigen, dreirippigen, am Grunde verschmälerten, kaum spitzigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas seifenartigen, schleimigen, schwach bittern Geschmack.

Das Seifenkraut enthält Harz, Schleimharz und einen eigenen schleimigen Stoff, von Bucholz Seifenstoff (Saponinum) genannt.

Tonisch, schweißtreibend, besonders bei Haut- und venerischen Krankheiten angewendet.

Man *Saponaria vaccaria*, *Vaccaria* (*Gr.*) sind die Saamen erhitzend und urintreibend.

Succus Saponariae. (Hass.)

℞. Herb. vel Rad. rec. Saponariae q. vis.

Contunde in mortario lapideo, exprime sedulo, succum sepone ac filtra. — Gabe, eine bis vier Unzen.

Extractum Saponariae. (A. An. Gen. Han. HassP. LH. LP. Sax. *Br. Sw. T. Vm.*)

℞. Herbae Saponariae libras decem.

Contunde in mortario ferreo, addendo Aquae libras sex, exprime succum, qui semel ebulliat, et tunc leni calore ad syrupi spissi consist. evaporet. (*Sw.*)

℞. Fol. rec. Saponariae . . q. vis.

Contunde cum Aquae pauxillo et per pannum cola; sepone, decantha, tunc prope ignem coagulent et denuo colentur; deinde ad massae pilularis consist. evaporata ab igne remove, admisce faeculam sepositam et denuo ad justam spissitudinem redige. (*Vm.*)

℞. Rad. rec. Saponariae . . q. vis.

Macera per horas aliquot in Aqua, adde majorem Aquae copiam et postquam aliquoties liquor ebulliverit, Al-

bumine clarificatum ad extracti usque consist. consume. (*Vm.*)

℞. Herbae Saponariae partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Infunde per horas 24, coque deinde per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, quo facto liquores ambo, post horas 24 sepositionis ad aptam consist. evaporent. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Saponariae,
Aquae frigidae, sing. part. unam.

Macera per horas 12, tunc adde

Aquae bullientis duplum pondus totius massae. Postquam refrixerint, sepone, Albumine clarifica, igni impone et liquorem spis escere coeptum per pannum trajice et continue agitando, sufficienter consume. (*Vm.*)

℞. Fol. rec. Saponariae . libr. duas.
Aquae communis . libras decem.

Coque per horae quadrantem, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, qui ad consist. requisitam evaporet. (An. Gen.)

Li. coquere Radicis libras duas in Aquae octo ad quatuor remanentiam et decoctum evaporare.

℞. Radicis Saponariae partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur, quo facto liquores ambo commixti et post sufficientem seposit onem decanthati, ad extracti consistent. evaporent. (Han.)

A. Radicem pluribus coctionibus succedentibus penitus extrahere et liquores commixtos post decanthationem in balneo aquae consumere; — *Br.* Radicem coquere per horas duas cum Aquae partibus sex, tunc denuo cum nova Aqua et liquores commixtos inspissare; — HassP. ut extractum ligni campechiensis; — LH. ut extractum absinthii; — LP. ut extractum rhei; — *T.* ut extractum cichorii.

Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Decoctum Saponariae officinalis. (B°. *Sw. Sy.*)

℞. Radicis Saponariae uncias duas.
Aquae fontanae . libras quatuor.

Decoque ad dimidii reman. (B°.)

℞. Herbae Saponariae . semilibram.
Aquae . . . . . libras octo.

Decoque ad dimid remanent. (*Sw. Sy.*)

Bei Scropheln, venerischen und Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, zwei bis vier Pfund täglich.

Species resolventes. (Ful. Sar. *Pid.*)

℞. Rad. Taraxaci,
— Saponariae, sing. unc. duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii, sing. unc. unam.
Flor. Tanaceti,
— Chamomillae, sing. sesquiunciam.

Concisa misce. (Ful. *Pid.*)

℞. Rad. Taraxaci,
— Saponariae,
— Valerianae min., sing. part. duas.
Herbae Centaurii minoris,
— Marrubii albi, sing. partem unam.
Flor. Chamomill. Rom. part. dimid.
— — vulg. . part. duas.
Seminum Lini . partes quatuor.

Zum Klystir bei Stockungen in den Unterleibseingeweiden.

Species guajacinae compositae s. Lignorum. (RC.), vgl. Guajacum: Rasurae Ligni Guajaci partes tres, Radicis Bardanae, Caricis, Saponariae, sing. partes duas, Stipit. Dulcamarae partem unam; — *Decoctum*: Specierum uncias tres, Aquae bull. libras tres, decoque ad duas, sub finem addendo Radicis Liquiritiae drachmas tres; — *Decoctum Specierum cum Mezereo:* singulis decocti libris Mezerei drachma una addatur vel: Decocti Specierum et Decocti Mezerei, sing. part. aeq.

Sarcocolla.

Gummi Sarcocollae; Sarcocolla, Fischleimgummi: Sarcocolle (*Gal.*); Unzerat (*Ar.*); Sarcocolla (*His.*); Kunjudeh (*Pe.*)

Ams. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. Wür. *A. Be. G. Gr. M. Re. Sp. T. Z.*

In kleinen, unregelmäßigen, eckigen, zerreiblichen Körnern von verschiedener Farbe, vom Blaßgelb bis zum dunkeln Granatroth und ganz- oder halbdurchsichtig und undurchsichtig, geruchlos und einen scharfen und brennenden Geschmack besitzend.

Es fließt aus allen Theilen und besonders aus den Kelchen von Penaea Sarcocolla, L., (Tetrandria Monogynia, L.; Acanthaceae, *J.*), einem Strauche Persien's und Arabien's. (Enc. méth. t. 78. fig. 2.)

Diese Substanz enthält, nach Pelletier, sehr wenig Schleimharz und Gallertstoff mit einer eigenthümlichen Substanz, dem Sarcocollin (Sarcocollinum), Sarcocolline.

Tinctura Sarcocollae. (Sar.)

℞. Sarcocollae . . . uncias duas.
Alcoholis . . . . libram unam.
Post tres dies digestionis super arena tepida filtra.

Sarsaparilla.

Salsaparilla, Sarsa, Zarsa, Zarsaparilla; Saſſaparille, Sarſaparille; Salsepareille (*Gal.*); Sarzaparilla (*Ang.*); Sarsaparylle (*B.*); Sarsaparil (*D.*); Zarzaparilla (*His.*); Sarzaparilla (*Bel.*); Salsapariglia (*I.*); Sasaparyle (*Pol.*); Salsaparilha (*Lus.*); Sassaparill (*Suec.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va. Z.*

So nennt man die Wurzel der Smilax Salsaparilla, L., ♄ (Dioecia Hexandria, L.; Asparagineae, *J.*), einer Pflanze Peru's und Braſilien's. (*Plenck* t. 712. *Blackw.* t. 393. Berl. Jahrb. XII. *Bert.* Bild. IV. 58. fig. 2. Fl. méd. VI. 308.) (Nach Willdenow, Berl. Jahrb. 1806, werden die Wurzeln von dieſer Art faſt gar nicht gebraucht, ſondern vielmehr die von Smilax syphilitica, *Humboldt.* Auch Smilax aspera liefert eine ſtatt der wahren Saſſaparille angewendete Wurzel.

Es kommen davon vier Hauptſorten im Handel vor:

1) Saſſaparille aus Braſilien oder Portugieſiſche: in ſechs bis acht Fuß langen, etwa zwei Fuß im Umfang haltenden Bündeln, die aus durcheinandergeflochtenen, ſchreibfederdicken, biegſamen, der Länge nach gerieften Wurzeln beſtehen, welche eine dünne Rinde, aber gewöhnlich keinen Ausläufer und keine Behaarung haben. Sie iſt außen röthlich oder ſchwärzlichbraun, inwendig weiß und mehlig. Der Geruch geht ihr ganz ab, der Geſchmack iſt etwas bitter. Dieſe iſt am meiſten geſchätzt. Sie kömmt aus Peru und Maranham.

2) Saſſaparille von Honduras. Die Rinde iſt ſchmutzigbraun, bisweilen weißlich. Sie hat noch ihre Ausläufer und iſt ſehr lang und faſeriger als die vorige. Inwendig iſt die Rinde roſenröthlich weiß, das darunterliegende Holz iſt weiß, von fadem, ſtärkemehlartigem Geſchmack; die Rinde dagegen ſchleimig und oft deutlich bitter. Sie kommt aus der Hondurasbai.

3) Sarſaparille von Veracruz; mager, dunkelgefärbt und faſerig, ſchlechter als die vorigen.

4) Rothe oder Jamaika-Saſſaparille, mit Ausläufern verſehen, ſechs bis ſieben Fuß lang, rund und durch das Trocknen zuſammengedrückt, mit einer orangerothen, röthlichgrauen oder weißlichen Oberhaut bedeckt; die Rinde iſt bisweilen feucht und der zunächſt unter ihr liegende markige Theil weiß (mehr oder weniger dunkelroth). Man findet ſie in kleiner Menge unter den von Honduras kommenden Bündeln. Sie iſt zwar wenig geſchätzt, verdient aber den Vorzug vor den beiden erſtern, indem ſie einen bitterern, ſtärkeren und gewürzhafteren Geſchmack und einen deutlichen, ſchon durch Reiben bemerkbar werdenden Geruch beſitzt.

Dieſe Wurzel verdankt, nach Palotta, ihre Arzneikräfte einem eigenthümlichen Alkaloid, dem Parillin (Parillina, Parillinum), Parigline, das jedoch Planche nicht darſtellen konnte. Folchi hat aus dem Kern der Saſſaparillwurzel noch ein anderes Alkaloid, das Smilacin (Smilacina, Smilacinum), Smilacine, gezogen.

Sie wird im Allgemeinen als harntreibend und beſonders ſchweißerregend betrachtet, obgleich in beiden Beziehungen ihre Wirkung ſehr ſchwach iſt; offenbar wirkt ſie reizend, eine Eigenſchaft, welche das Parillin in einem noch weit höheren Grade beſitzt. (Nach Palotta wirkt es zugleich deprimirend.) Man wendet ſie vorzüglich in veneriſchen Krankheiten, chroniſchen Rheumatismen und verſchiedenen Hautkrankheiten an. — In Pulver giebt man ſie zu einer halben bis ganzen Drachme. Galläpfelaufguß, Kalkwaſſer, eſſigſaures Blei und ſalpeterſaures Queckſilber dürfen weder mit dem Pulver, noch mit dem Aufguß und der Abkochung verbunden werden.

Die in Oſtindien anſäſſigen Engländer führen unter dem Namen einheimiſche oder Indiſche Saſſaparille, Country sarsaparilla, die Wurzel von Periploca indica, L. (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), einem in dieſen Gegenden einheimiſchen Strauch, an. Dieſe Wurzel [Oshba (*Ar.*); Erramassumul, Irimusu (*Cy.*); Mugrabu (*Hin.*); Shariva (*Sa.*); Nunnarivayr (*Tam.*); Sugundapala (*Tel.*)] wird zu drei oder vier Unzen in Abkochung bei Scropheln, veneriſchen und Hautkrankheiten empfohlen.

Pulvis sudorificus et tonicus. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae,
Saſſafras,
Radicis Rusci, ſing. partes aeq.
Gabe, eine Drachme alle Morgen in weißem Wein.

Opiatum Arabicum. (*Pie.*)

℞. Sarsaparillae,

Chinae,
Nuc. Avellanar. tost., sing. unc. quatuor.
Caryophyllorum uncias quinque.
Mellis Narbonnensis . . . q. s.

Wird in der Provence häufig gegen venerische Halsgeschwüre und sogenannte chronische oder ausgeartete Syphilis angewendet.

Extractum Sarsaparillae s. Smilacis asperae. (Ams. B. His. His3. Lon. LonN. Sar. Wir. *C. Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Radicis Sarsaparillae libram unam.
Aquae bullientis . octarios octo.

Macera per horas 24, decoque deinde ad octariorum quatuor remanentiam; cola liquorem bullientem et ad extracti consist. consume. (Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Radicis Sarsaparillae partem unam.
Aquae bullientis . partes decem.

Digere ber horas 24, tunc coque per duas et cola; residuum coquatur per aequale tempus cum novae Aquae partibus quatuor (ad libras octo); liquores commixti ad extracti consist. evaporent. (B. His. His3.)

Ams. coctionem Radicis primum cum viginti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet vice ad dimidii remanentiam; — *Fi.* Sarsaparillam primum cum Aquae sextuplo coquere, colaturae novam Aquam addere et sic radicem penitus extrahere, tunc decocta consumere; — *T.* ut extractum ligni guajaci.

℞. Radicis Sarsaparillae libram unam.
Aquae bullientis . . libras sex.

Macera per tres dies, coque parumper, cola exprimendo et ad extracti consist. consume. (Wir.)

Sar. liquorem coquendo ad duos trientes consumere, colare et evaporare jubet.

Infusum Sarsaparillae compositum. (*Re.*)

℞. Rad. Sarsap. Aq. frig. lot. et concis. unciam.
Aquae fervidae . . . . libram.

Macera per horas duodecim in vase clauso et exprime.

Decoctum Sarsaparillae s. Sarsae s. Smilacis Sarsaparillae, Tisana Sarsaparillae. (Am. B*. Du. Ed Lon. LonN. Lus. Suec. *Br. E. Fi. Gr. Ra. Re. Sa. Sw. Sy. T. Va.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aquae . . . . . libras octo.

Digere modico calore per horas duas, exime deinde radicem et contusam lente in infusione ad dimidii aquae remanentiam coque.

Am. Du. et *C.* Sarsaparillae sesqui unciam, Aquae bull. octarios duos, duas horas digestionis et coctionem radicis contusae ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — *Sy.* Sarsaparillae uncias tres, Aquae bull. libras tres, quatuor horas infusionis, infusionem radicis contusae per horas septem et coctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam, vel: Radicis uncias tres, Aquae bull. libras tres, 12 horas digestionis et decoctionem ad librarum duarum liquidi remanentiam; — *Br* Radicis uncias sex, Aquae libras sedecim et post certum tempus digestionis, coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — Lus eundem agendi modum, sed Aquae libras decem; — B*. *Ra. Va.* Hôt. D. Sarsaparillae unciam unam et Aquae libras duas ad tertiam partem redigendas; — *Ra. Va.* Hosp. Ven. praeterea: Sarsaparillae unciam unam ad duas et Aquae libras quatuor ad duas redigendas; — B*. Lon. LonN. *Gr.* et *Re.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae octarios quatuor, quatuor horas infusionis, tunc duas macerationis radicis contusae et coctionem ad dimidiae partis liquidi remanentiam; — Suec Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae bull. uncias sexaginta quatuor, horas quatuor macerationis, duas digestionis radicis contusae et evaporationem liquidi coctione ad unciarum triginta duarum remanentiam; — *Fi.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras quinque cum dimidia, horas quatuor macerationis et coctionem ad libras tres; — *T.* Sarsaparillae uncias quatuor, Aquae libras sex, macerationem per horas quatuor vel sex et decoctionem ad dimidium.

Reizend, bei venerischen und rheumatischen Krankheiten angewendet. — Gabe, ein halbes Pfund drei oder vier Mal täglich.

Tisane de Saint-Marie.

℞. Sarsaparillae concis. unc. quatuor.
Aquae . . . . . octarios sex.

Decoque ad octariorum quatuor remanentiam; ab igne removendo adde
Rad. Liquirit. contus. drach. quatuor.

Post sufficientem infusionem refrigerata cola.

Reizend, bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Man trinkt die vorgeschriebene Menge, Morgens nüchtern, lauwarm, auf sechszehn Mal, alle Viertelstunden ein Glas.

Liquor antivenereus Roueni. (B*.)

℞. Dec Sarsaparill. unc. triginta duas.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Aetheris hydrochlorici semunciam.
Spirit. Camphorae drach. duas.
Olei ess Anisi . guttas quinque
Gabe, ein Löffel zwei oder drei Mal täglich.

Syrupus Sarsaparillae. (GalP. *Gr.*)

℞. Sarsaparillae concisae libras tres.
Aquae bullientis . libras triginta.
Infunde per horas 24, tunc ad libras duodecim decoque et cola exprimendo; residuum coquatur in Aquae libris triginta ad duodecim remanentiam et cum expressione coletur, quo facto, decocta ambo commixta ad libras decem vaporatione redigantur et post sepositionem filtratis addantur
Syrupi Sacchari,
Mellis albi, singulorum librae tres.
Coque celeriter ad requisitam consistentiam.

Gr. Radicis libram, Aquae congium ad octar. quatuor decoquere et addere Sacchari libram.

Tisana arabica. (*Pic*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae . . . . . unciam unam.
Aquae . . . . . libras octo.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam.

In der Provence mit dem opiatum arabicum gegen Syphilis gebraucht.

Species sudorificae. (LH.)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Rasurae Ligni Guajaci, singularum partes aequales.

Decoctum Sarsaparillae compositum s. edulcorans s. sudoriferum s. Ligni Guajaci compositum, Apozema sudoriferum, Tisana Sarsaparillae. (Gal. His. His8. LH. Sar. *Ca. Ra. Sp. Sw. Va. Vm.*)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquiunciam.
Aquae communis libras quinque.
Coque per semihoram et adde
Ras. Ligni Guajaci sesquiunciam.
Post horae quadrantem ab igne remove et adde
Liquiritiae rasae . . semunciam.
Ligni Sassafras . drachmas duas.
Vase tecto, liquidum post refrigerationem cola, sepone et libras tres illius defunde. (*Vm.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Ras Ligni Guajaci, sing. sesquiunc.
Aquae tepidae . libras quatuor.
Infunde per horas 12 in vase tecto, coquendo ad libras tres consume, sub finem addendo
Ras. Ligni Sassafras drach. duas.
Liquiritiae rasae . . semunciam.
Post semihoram infusionis cola. (Gal.)

His. His8. Sarsaparillae uncias duas, Guajaci tantidem, Aquae libras octo ad quatuor redigendas, Sassafras unciam et Liquiritiae drachmam; — LH. Sarsaparillae semunciam, Rasurae Guajaci drachmas tres macerare per horas sex in Aquae libris duabus, deinde ad remanentiam unius coquere, sub finem addere Rasurae Sassafras, Liquiritiae contusae, sing. drachmas duas, colare et refrigerato addere Syrupi comm. unciam.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.
Ras. Ligni Guajaci . unc. unam.
Chinae . . . . . semunciam.
Aquae . . . . . octarios duos.
Coquendo dimidium consume, sub finem addendo
Ligni Sassafras drachmas duas.
Cola leviter exprimendo. (*Ca.*)

℞. Rad. Sarsaparillae uncias triginta.
Aquae bull. libras viginti quatuor.
Post horas 24 infusionis decoque ad librarum octo colaturam; qua operatione bis cum residuo repetita, decotorum trium cunctorum mixtorum libris viginti adde
Florum Boraginis,
Petalorum Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Seminum Anisi, sing. uncias duas.
Coquendo ad libras duodecim consume et cola. (*Sw.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae, sing. uncias duas.
Ras. Lig. Santali rubri drach. sex.
— Cornu Cervi . sesquiunciam.
Digere per horas 24, coque tunc in Aquae purae libris duodecim ad dimidii reductionem, sub finem addendo
Ras Lig. Santali citr. drach. sex.
Sacchari albi . . . uncias sex.
Cola. (His His8.)

℞. Rad. Sarsaparillae unciam unam.
Aquae communis . . libras tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo drachmas duas.
Collae Piscium drachmam unam.
Coquendo tertiam partem consume. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae, sing. . semunciam.
Rasurae Ligni Guajaci,
Antimonii crudi, sing. uncias duas.
Aquae bullientis . . libras octo.
Macera per horas 24, tunc per horam coque in vase tecto; adde
Ras. Ligni Sassafras . unc. unam.
Rad. Caryophyllatae semunciam.
Bacc. Juniperi contus. drach. duas.

Coque per horae quadrantem et cola. (*Sp.*) — Durch Zuſatz von einer Unze Senna, zu Ende der Kochung, kann man dieſer Tiſane eine laxirende Wirkung ertheilen, und ſie unterſcheidet ſich dann nur wenig von der tisana antivenerea purgans.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias duas.
— Chinae,
Ras. Ligni Guajaci, sing. unc. unam.
Antimonii crudi in nodulo sesquiunciam.
Aquae communis . . libras sex.

Digere per horas 12 inter cineres calidos, tunc lente ad duas libras decoque, sub finem addendo

Liquiritiae rasae . drachmas sex.

Cola decoctum et bulliens infunde in

Ras. Ligni Sassafras drach. tres.

Vas ad perfectam refrigerationem usque tege, et cola. (Sar.)

Bei veneriſchen, catarrhaliſchen und exanthematiſchen Krankheiten empfohlen. — Gabe, mehrere Gläſer täglich.

Tisana sudorifica. (*Pie. Ra. Sm. Va.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae,
Dulcamarae, sing. unciam unam.
Aquae . . . . . octarios tres.

Decoque ad tertiae partis consumptionem usque. (*Pie*) — Gabe, ein Glas Morgens und Abends. — Man verſetzt dieſe Tiſane mit einem Drittheil Milch und verſüßt ſie mit Zucker.

℞. Sarsaparillae,
Dulcamarae, sing. unciam unam.
Radicis Saponariae drachmas duas.
Aquae . . . . . vitra sex.

Coquendo tertia parte consumpta, adde

Lactis vaccini . . . vitra duo.

Misce bene. (*Sm.*) — Täglich in ſechs Gläſern zu nehmen.

℞. Sarsaparillae,
Chinae,
Guajaci, singulorum semunciam.
Sassafras . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . libras duas.

Coque. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

So gebraucht, wie die vorigen.

Decoctum diaphoreticum incitans, Tisana sudorifica excitans (*B.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Ligni Guajaci, sing. drach. tres.
Dulcamarae,
Foeniculi, sing. drachmas duas.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti libra una obtineatur. — Auf zwei oder mehrere Male zu nehmen.

Decoctum antisyphiliticum nutriens. (*B. Va.*)

℞. Sarsaparillae . . unciam unam.
Lichenis Isl. abluti sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuordecim obtineantur. Colaturae adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Decoctum Ichthyocollae compositum. (B*.)

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
Corticis Sassafras,
Ligni Sassafras, sing. unc. unam.
Aquae bullientis . libras novem.

Digere per horas 12, tunc coque et adde

Ichthyocollae . . . uncias tres, antea dissolutae in Aquae q. s., ut colatura sit unciarum octo.

Von Eimbke bei veneriſchen Krankheiten empfohlen. — Gabe, zwanzig bis fünfzig Unzen täglich.

Tisana (antivenerea) Feltzii. (LH. *Bo. Ca. Pie. Ra. Va.* Lagneau.)

℞. Antimonii crudi in nodulo uncias quatuor.
Aquae communis libras duodecim.
Sarsaparillae . . . uncias duas.
Chinae . . . . unciam unam.
Collae Piscium,
Corticis Buxi,
— Hederae, sing. sesquiunciam.

Decoque ad dimid., trajice per pannum, sepone, decantha et adde

Sublimati corrosivi . grana tria.

Dissolve. (*Bo. Ca. Pie.*)

Eine Formel von Baumé.

Va. Corticem Hederae omittit.

℞. Antimonii crudi pulverati in nodulo uncias quatuor.

In ollam fictilem vitreatam immitte, ita ut fundum non attingat et infunde

Aquae . . . . . libras sex.

Coque per horas duodecim, tunc ad dimidii remanentiam et adde

Sarsaparillae . . . uncias tres.
Collae Piscium . . semunciam.

Ollam per horas 24 inter cineres calidos relinque et decoctum per linteum teneris texturae trajice. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

LH. Sarsaparillae uncias duas, Rasurae Guajaci drachmas duas, Collae tres, Antimonii uncias duas, Aquae comm. libras quatuor, coque ut libras duae supersint. — Gabe, vier Unzen drei Mal.

Die letztere Formel wird heutzutage al-

lein befolgt. Das Antimon iſt unnöthig; wenn man es weglößt, ſo wird die Tiſane der vorigen ähnlich.

Wendet man durch Schwefelſäure gebleichten Fiſchleim an, ſo behält dieſe Subſtanz immer eine gewiſſe Menge Säure, welche auf die Schwefelbaſe wirkt und etwas rohes Spießglanz bildet. Daher die Koliken und das Erbrechen, welches dieſe Tiſane bisweilen erregt. Chevallier und Idt ſchreiben jedoch dieſe Zufälle dem Arſenik zu, welches bisweilen in kleiner Quantität in der Schwefelbaſe enthalten iſt und vom Waſſer aufgelöſ't wird. Beſſer daher, man ſetzt den Spießglanz gar nicht zu, oder nimmt ſtatt des Fiſchleims Arabiſches Gummi, eine Unze auf anderthalb Pinten der eingekochten Tiſane.

Tisana depurans de Vigarous. (*Bo. Pie.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Fol. Sennae mundat. uncias tres.
Rasurae Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Radicis Chinae,
— Iridis Florentinae,
Antimonii crudi,
Anisi viridis,
Cremoris Tartari,
Aristolochiae longae,
— rotundae,
Jalapae contusae,
Polypod. querni, sing. sesquiunciam.
Jugland. rec. c. putam. contus. no. 12.
Vini albi . . . octarios duos.

Infunde per horas 24 inter cineres calidos, tunc adde

Aquae fontanae . . octarios sex.

Consume, modico calore, partem tertiam et per pannum cola.

Residuum cum Vini albi octariis duobus vel tribus et Aquae unciis sex vel septem pro tertia parte consumpta tisanam dilutiorem praebent.

Von der erſtern Tiſane nimmt man den Tag drei Gläſer, die zweite dient zum gewöhnlichen Getränk.

Saint-Marie bereitet mit dieſer Abkochung ein *Roob antisyphiliticum*, wozu folgendes die Formel iſt:

℞. Tisanae de Vigarous octar. unum.
Sacchari libram unam ad duas.

Coque ad consistentiam roob.

Dieſer Roob ſoll bei Syphilis gute Wirkung thun. — Gabe, ein Eßlöffel, täglich vier Mal. Nach jeder Gabe nimmt man ein großes Glas einer concentrirten Abkochung der Sarſaparille, und ſteigt damit, bis man täglich neun bis zehen Löffel Roob verbraucht.

Decoctum catholicum. (Sar.)

℞. Radicis Graminis sesquiunciam.
— Sarsaparillae unciam unam.
Foliorum Cichorii,
— Agrimoniae,
— Betonicae,
— Capilli Veneris Monspeliaci,
— Pimpinellae albae, singulorum manipulum dimidium.
— Sennae,
Cuscutae, singulorum semunciam.
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Seminum Anisi drachmam unam.
Aquae communis libras quatuor.

Coque sarsaparillam et radicem graminis in Aqua ad dimidii remanentiam, adde liquiritiam et herbas, macera sennam, cuscutam et anisum per horas aliquot in Aquae bull. unciis sex, cola et infusum cum decocto commisce.

Decoctum antivenereum laxans, Tisana antivenerea purgans, Decoctum Guajaci compositum et purgans. (Gal. *Ca. Re. Sp.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
Ras. Lig. Guajaci, sing. unc. unam.
Subcarb. Potassae gr. viginti quinque.
Aquae communis libras quatuor.

Macera per horas 12, subinde agitando, tunc ad libras tres coctione consume; infunde deinde in liquido per semihoram

Foliorum Sennae,
Rasurae Ligni Sassafras,
Liquiritiae, sing. drachmas duas.
Rhei,
Coriandri, sing. drachmam unam.

Cola leviter exprimendo et post refrigerationem decantha. (Gal. *Ca. Re.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Rasur. Sassafras, sing. unc. duas.
Antimonii crudi . unciam unam.
Aquae font. libras duas c. dimid.

Decoque ad libras duas et adde

Radicis Polypodii . semunciam.
— Rhei . semidrachmam.
— Liquiritiae,
Foliorum Sennae mundatorum,
Ligni Sassafras, sing. drach. unam.
Subcarb. Potassae grana quatuor.
Coriandri . . . semidrachmam.

Post horas duodecim infusionis bis ebulliant et colentur. (*Sp.*)

Den Tag über zu trinken.

Tisana de Vinache. (*Ca.*)

℞. Antimon. crudi in nodulo unc. duas.

Digitized by Google

Sarsaparillae,
Chinae;
Ligni Guajaci, sing. sesquiunciam.
Aquae . . . . . octarios tres.
Decoque ad octarium unum et adde
Sassafras,
Sennae, singulorum semunciam.
Post sufficientem infusionem cola, sepone et decantha. — In venerischen und Hautkrankheiten gebraucht. — Gabe, mehrere Gläser täglich.

Tisana de Jausserand. (*Bo.*)

℞. Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
singulorum uncias duas.
Salis Tartari . drachmam unam.
Foliorum Sennae,
Ligni Sassafras, sing. unc. unam.
Rhei,
Cort. Chinae contusi, sing.
semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per horas octo, ignis exigui ope, in vase tecto, ad octariorum sex liquidi remanentiam, tunc per idem tempus infunde et cola. — Besonders bei Scropheln empfohlen. — Gabe, täglich drei Gläser.

Tisana sudorifica Astruc. (*Pic.*)

℞. Sarsaparillae,
Sassafras, singulorum uncias duas,
Guajaci,
Chinae, singulorum sesquiunciam.
Antim. crudi in nod. drach. duas.
Aquae . . . libras duodecim,
Infunde calide per horas duodecim, tunc lente coque, sub finem addendo
Foliorum Sennae . semunciam.
Radicis Liquiritiae sesquiunciam.

Decoctum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Sarsaparillae . uncias quatuor.
Antim. crudi in nod. uncias sex.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad dimidium; in reliquis infunde
Radicis Liquiritiae unciam unam.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Von Quarin empfohlen. — Glasweise zu nehmen.

Decoctum Lusitanicum s. antivenereum Ulyssiponense s. Sarsaparillae compositum s. cum Mezereo, Aqua Cauperi. (Am. B*. Du. GalP. Lon. LonN. LP. Lus. Suec. *C. Gr. Re. Sp. Sw. Sy. Va.*)

℞. Ligni Santali rubri,
— — albi,
— Guajaci,
— Rhodii,
Ligni Sassafras, sing. unc. unam.
Sarsaparillae . . . uncias tres.
Sulphureti Antimonii in nodulo
uncias duas.
Corticis Mezerei . . semunciam.
Aquae bullientis . libras decem
Infunde et coque deinde ad dimidii consumptionem, sub finem addendo
Liquiritiae rasae . semunciam.
Cola. (B*. GalF. *Sp.*)

℞. Sarsaparillae,
Ligni Sassafras,
— Santali rubri,
— Guajaci, sing. uncias tres.
Corticis Mezerei unciam unam
Coriandri drach. sex ad unciam.
Aquae fontanae . libras viginti.
Decoque ad dimidii remanentiam. (*Sy.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias sex.
Sassafras,
Guajaci, singulorum unciam unam.
Aquae . . . . libras decem.
Macera, blando calore, per horas sex, tunc ad dimidium decoque et sub finem adde
Liquiritiae rasae unciam unam.
Corticis Mezerei drachmas tres.
Cola. (*Sw.*)

Gr. Sarsaparillae drachmas sex, Sassafras, Corticis Guajaci, Glycyrrhizae, sing. unciam, Mezerei drachmas tres, Aquae octarios decem, coque ad quinque; — Lon. LonN. *Re.* Decocti Sarsaparillae ferventis (e Sarsap. unciis octo cum Aq. libris octo ad dim. redact. *Va.*) octarios quatuor, Sassafras, Guajaci, Liquiritiae, sing. unciam, Mezerei drachmas tres. Decoque per horae quadrantem et cola.

℞. Radicis Sarsaparillae uncias tres.
Corticis Mezerei drachmas duas.
Aquae fontanae . . libras tres.
Decoque ad libras duas et in fine adde
Liquiritiae rasae . sesquiunciam.
Cola liquidi libras duas. (B*. *Sy.*)

℞. Sarsaparillae . . uncias quatuor.
Radicis Chinae? (salsa hortense)
semunciam.
Aquae communis . . libras sex.
Decoque ad librarum trium cum dimidia remanentiam, sub finem infunde
Mezerei . . . drachmas duas.
Refrigerata cola. (LP.)
In venerischen und Mercurialkrankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehen bis fünfzig Unzen täglich, allmälig gestiegen. — Die vorletzte Formel ist von Girtanner und den übrigen vorzuziehen.

Tisana antivenerea. (LH. *Sm.*)

℞. Sarsaparillae concisae uncias duas.

Corticis Mezerei semidrachmam.
Aquae fontanae sesquioctar um.
Decoque ad octarium unum et colaturae adde Liquoris Swietenii cochlear majus. (*Sm.*) — In einem Tage zu verbrauchen. — Plenck rühmte sie sehr.

℞. Rad. Sarsaparillae unciam unam.
Macera per horas tres, tunc coque in
Aquae sesquilibra ad reman.
librae unius.
Sub finem adde
Radicis Apii . . unciam unam.
Cola et adde
Syrupi communis unciam unam.
Gabe, vier Unzen, drei Mal. (LH.)

Tisana s. Ptisana Callaci s. ex Callac, Decoctum Sarsaparillae ex Callac. B*. His. His3.)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Mercur. dulc. in nodulo
drach. duas.
Aquae . . . libras quindecim.
Decoque ad remanentiam tertiae partis, adde deinde
Fol. Sennae mund. . unc. unam.
Seminum Coriandri drachmas sex.
Aluminis . . . semidrachmam.
Coque denuo per horae quadrantem et ante perfectam refrigerationem cola. (His. His3.)

B*. Coriandri drachmas duas.

Ehedem bei venerischen Krankheiten gebraucht. — Gabe, sechs Unzen zwei oder drei Mal täglich, einen Monat oder sechs Wochen lang.

Decoctum antivenereum Passerini vel Salvadori. (Pm. *Fi. T.*)

℞. Sarsaparillae . . . uncias duas.
Fumariae,
Florum Cyani, sing. drach. duas.
Foliorum Sennae drachmas tres.
Aristolochiae rotund. semunciam.
Radicis Scolymi drachmas duas.
Aquae pluvialis . . libris sex.
Coque et adde
Mercurii dulcis,
Aluminis usti, sing. drach. unam.
Decoque ad librarum trium remanentiam, cola per linteum fortiter exprimendo. (*T.*)

Fi Sarsaparillae uncias octo, Aristolochiae duas, Scolymi unam, Aquae libras viginti, decoque ad duarum partium remanentiam, adde Sennae sesquiunciam, Fumariae et Cyani, sing. unciam unam. Decoque ad libras duodecim, adde Mercurii dulcis, Aluminis usti, sing. semunciam, mixta per duas horas igne blandissimo digere, cola fortiter exprimendo per pannum, ita ut librae decem remaneant; — Pm. Ingredientium easdem quantitates ut *Fi.* sed omnia cum Aquae libris triginta ad decem remanentiam decoquere.

Gabe, vier Unzen bis ein Pfund täglich.

Tisana sudorifica et purgans. (*Sm.*)

℞. Sarsaparillae . uncias quatuor.
Aquae purae . . octarios tres.
Coque per horas tres igne perexiguo et sub finem adde
Sennae mundatae,
Salis Epsom., sing. sesquiunciam.
Liquiritiae contus. drach. quatuor.
Post horas viginti quatuor cola. — Gabe, sechs Unzen drei Mal täglich, drei Wochen oder einen Monat lang. — Soll bei chronischen Rheumatismen sehr nützlich seyn. — Sie ist von Rost.

Decoctum Zittmanni. (B*. Bor4.)

℞. Sarsaparillae . uncias duodecim.
Aquae fontanae libras nonaginta (mensuras viginti quatuor Bor4.).
Digere per horas 24, immitte deinde liquido in sacculum inclusa
Pulveris styptici (Ed.) (Sacchari aluminati Bor4.) sesquiunciam.
Mercurii dulcis . . semunciam.
Cinnabaris (Antimonii sublimati)
drachmam unam.
Decoque ad libras triginta (mensuras octo) et sub finem adde
Sem. Anisi,
— Foeniculi, sing. semunciam.
Foliorum Sennae . uncias tres.
Radicis Liquiritiae sesquiunciam.
Liquor, nomen *Decoctum fortius* gerens, seponatur; residuo adde
Sarsaparillae . . . uncias sex.
Aquae libras nonaginta (mensuras viginti quatuor).
Coque (ad mensurarum octo remanentiam), sub finem addendo
Corticis Citri,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae),
Cardamomi minoris,
Liquiritiae, sing. drachmas tres.
Cola et liquorem, *Decoctum tenue s. debile s. mitius* nomen gerentem, sepone.

Theden rühmte dieses Präparat bei venerischen Krankheiten.

Roob antisyphiliticum. (LP. *T. Vm.*)

℞. Sarsaparillae . partes quindecim.
Aquae . partes centum viginti.
Coque ternis vicibus, singula quaque ad dimidii reman.; colaturas clarificatas ad octodecim partes redige et infunde in
Foliorum Sennae,
Florum Boraginis,
— Rosae moschatae,

Sem. Cumini, sing. part. unam.
Cola et sepone, tunc decanthatis adde
Sacchari albi partes quindecim.
Solve leni calore et refrigerationis momento adde
Mellis albi . partes quindecim.

℞. Sarsaparillae . . . libras tres.
Sassafras,
Ras. Ligni Guajaci, sing. libr. duas.
Chinae flavae . . libram unam.
Aquae . . libras quinquaginta.

Decoque per horam circiter unam, filtra et decoctionem cum residuo quater vel quinquies repete, commisce liquores et in iis solve
Sacchari albi,
Mellis opt., sing. libr. quindecim.

Despuma, filtra per linteum et sufficienter evaporata in urceolum effunde, continentem sacculos duos, cujus alter Anisi uncias quatuor, alter Florum sicc. Boraginis tantidem continet, exprime sacculos ante refrigerationem, misce et syrupum para. (*T.*) — LP. Sarsaparillae uncias triginta, Radicis Canna de Alagoa tantidem, Guajaci rasp. octo, Sennae tres, Chinae quatuor coque in Aquae libris octodecim per semihoram, cola, residuum denuo in Aquae libris novem per horae spatium, cola et adde Mellis et Sacchari, sing. libras sex, coque ad consist. debitam. — Hat viel Aehnlichkeit mit dem syrupus Cuisinieri.

Rob antisyphiliticum (*Re.* sec. Laffecteur): Extractum liquidum praeparatum cum Decocto Phragmitis, Sarsaparillae et Sem. Anisi, cui Sublimati quantitas certa additur.

Syrupus Sarsaparillae et Guajaci. (Am. *C.*)

℞. Sarsaparillae concisae,
Guajaci raspati, sing. libr. unam.
Aquae . . . . octarios decem.

Coque per horam unam et exprime; residuum denuo coquatur cum
Aquae . . . . octariis decem per horas duas, sub finem adde
Petalorum Rosarum,
Gummi Arabici,
Fol. Sennae, sing. unciam unam.
Zingiberis . . . . semunciam.
Cola et adde
Mellis despumati,
Sacchari, singulorum libras tres.

Fiat syrupus. — Unterſcheidet ſich von dem folgenden Syrup nur durch den Namen.

Hierher gehört auch der

Syrupus Stevensii. (B*.)

℞. Sarsaparillae,
Ligni Guajaci, sing. libr. unam.
Petal. Rosarum rubr. unc. unam.
Aquae . . . quantum sufficit.

Coque per horam et liquorem decantha; residuum cum Aquae aequali quantitate per horas duas coquatur, sub finem additis
Gummi Arabici,
Fol. Sennae, sing. . uncia una.
Zingiberis . . . . . semuncia.
Decoctis umbobus conjunctis adde
Mellis,
Sacchari, singulorum libras tres et syrupum para.

℞. Sarsaparillae,
Guajaci, singulorum libram unam.
Aquae . . . . libras duodecim.
Mellis albi,
Sacchari crudi (cassonade),
singulorum sesquilibram.

Syrupus de Sarsaparilla compositus s. de Sarsaparilla et Senna compositus s. sudorificus s. Cuisinieri s. Sarsaparillae s. Smilacis Sarsaparillae s. depurans. (Am. An. B*. Gal. GalM. LH. *C. Ca. Re. Sw. T. Va.*)

℞. Sarsaparillae . . . libras duas.
Aquae tepidae libras duodecim.

Infunde per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum
Aquae communis . libris decem et ad sex consumatur. Qua operatione bis vel ter repetita, decocta commisce et leviter coque cum
Florum Boraginis,
— Rosarum albarum,
Foliorum Sennae,
Semin. Anisi, sing. unciis duabus.
Decoque ad dimidium, cola et adde
Mellis albi,
Sacchari albi, sing. libras duas.

Coque ad syrupi spissi consist. (B*. Gal. *Ca. Re.*)

LH. Sarsaparillae libras quatuor, Aquae tepidae viginti quatuor, infusionem per horas 24, coctionem ad libras duodecim, colare et residuum cum Aquae libris viginti ad decem decoquere, colare et operationem bis repetere, decoctis quatuor obtentis addere Foliorum Boraginis, Sennae, Seminum Anisi, sing. uncias tres cum dimidia, coquere blande ad dimidiae partis rem, colare et addere Mellis albi, Sacchari, sing. libras quatuor, etc. — GalH. Sarsaparillam diu maceratam leviter coquere, et Flores, Sennam Anisumque

vel seorsim, vel in producto prioris operationis infundere jubet.

GalM. eundem agendi modum indicat ut Gal., sed loco florum boraginis et rosarum Folia Boraginis adhibendo; — Am. et *C.* loco florum boraginis eandem quantitatem Liquiritiae, Rosas tamen adhibet; — *Siw.* binis vicibus sequentibus coquere Sarsaparillae libras duas in Aquae libris novem ad trium remanentiam, in ambobus decoctis conjunctis infundere Sennae sesquiunciam, Florum Boraginis, Rosarum mosch. et Cumini, sing. tantidem, colare et cum Sacchari, Mellisque boni, sing. libris duabus syrupum parare et clarificare; — An. Infundere Sarsaparillae libras duas cum dimidia in Aquae fervidae libris viginti quatuor per horas 24, tunc coquere ad colaturam librarum octo, operationem binis vicibus sequentibus cum faecibus repetere; decocti hoc modo parati libras viginti quatuor evaporando ad dimidium redigere, sub finem addendo Florum Boraginis, Rosarum rubrarum, Sennae, Anisi, sing. uncias duas et colaturâ lente vaporatâ, cum Sacchari et Mellis despumati, sing. libris duabus syrupum parare.

Pelletan pluribus vicibus sequentibus coquere Sarsaparillae libras duas in Aquae q. s. ad duarum liquoris librarum reman., tunc coquere Sennae uncias duas in Aquae libris duabus per horae quadrantem, liquores commiscere et in illis infundere Florum Boraginis, Buglossi, Rosarum alb., Anisi, sing. uncias duas, colare, addere Mellis et Sacchari albi, sing. libras duas, clarificare et denique ad syrupi consist. coquere.

℞. Sarsaparillae concis. . libr. 24.
Aquae bull. . . . . libr. 170.
Infunde per horas 12 vel 15, tum coque per duas, addendo, horae quadrantem antequam ab igne removeatur
Fol. Sennae libr. unam et unc. octo.
Cola; residuo infunde
Aquae bullientis libras quindecim.
Colaturae expressae adde
Mellis albi . libras octodecim.
Sacchari crudi . libras triginta.
Clarifica Albuminis ope, infunde supra
Cumini contusi
libr. unam et unc. octo.
Coque ad consist. syrupi et adhuc bullienti adde
Extracti Boraginis libras quatuor.

Kürzer iſt Reraudren's Formel:

℞. Syrupi Sarsaparillae vel Boraginis libras duodecim.
— Sennae . . uncias octo.
Calefac in balneo aquae et adde
Extracti Boraginis libram unam.
Roob Sambuci . . uncias tres.
Commisce ad perfectam usque solutionem et cola.

Noch kürzer iſt folgende Formel von Lagneau:

℞. Syrupi Sarsaparillae libras quatuor.
— Sennae . . uncias tres.
Calefac et adde
Extracti Boraginis uncias quinque.
Roob Sambuci . unciam unam.

℞. Sarsaparillae,
Guajaci rasi, sing. libram unam.
Aquae . . . libras duodecim.
Sacchari crudi,
Mellis albi, sing. . sesquilibram.
F. S. A. syrupus. (*Syr. Cuis. reformatus. Va.* Hosp. Ven.) Zwei bis vier Unzen, beſonders als Vehikel des liq. Swietenii.

Syrupus Sarsaparillae vinosus. (*Bo. Pic.*)

℞. Radicis Sarsaparillae sesquilibram.
— Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Jalapae,
— Polypodii,
— Chinae,
Ligni Guajaci,
— Sassafras,
Cremoris Tartari,
Sulphureti Antimonii in nodulo,
Anisi viridis, singulorum uncias sex.
Foliorum Sennae uncias duodecim.
Vini albi . . octarios duodecim.
Macera per horas sex in vase tecto; adde deinde
Aquae . . octarios quindecim.
Coque blando igne per horam unam, defunde et faecibus infunde
Vini albi . . . . octarios sex.
Macera per horas tres, adde deinde
Aquae . . . . octarios octo.
Coque per semihoram, defunde, liquores ambos commisce, sepone et decanthatis adde
Sacchari liquidi (melasse),
— crudi rub., sing. libr. novem.
Coque absque clarificando ad syrupi consistentiam.

Tinctura Sassaparillae a *Gr.* indicatur.

Sassafras.

Laurus Sassafras, *L.*; Fenchelholz, Saſſafras; Sassafras (*Gal.*); Sassafras (*Ar.*); Cay-vang-di (*Cc.*); Sassafraz (*Lus.*)

Am. Ams. An. A. Ba. Bel. Bor. Bor4. Ar. D. Du Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Rc. Sp.* Z.

Ein Baum (Enneandria Monogynia, L. Laurineae, J.) des südlichen America's. (*Blackw.* t. 267. *Plenck* t. 316. *Mich.* Arb. for. de l'Am. III. t. 7. *Big.* Am. med. Bot. t. 35. *Bert.* Bild. III. 29. fig. 1. Fl. méd. VI. 312.)

Das Holz (lignum [trunci et radicis] Sassafras) ist leicht, von schwammigem Gefüge, brüchig, stahlgrau, geruchlos und von einem sehr schwachen Geschmack: das der Wurzel (radix Sassafras), welches zum Theil noch mit der Rinde bedeckt, zum Theil davon entblößt ist, ist gelb oder fahlbräunlich, röthlich, von süßlichem, gewürzhaftem, etwas scharfem Geschmack und fenchelartigem Geruch. — Die Rinde (cortex ligni Sassafras) ist sehr dick, leicht, mürbe, runzlig, graulichbraunroth, innen rostbraun; hat einen angenehmen, fenchelartigen Geruch und einen gewürzhaften, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, schweiß- und harntreibend, bei Gicht, Rheumatismen und venerischen Krankheiten angewendet. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Extractum Ligni Sassafras s. Sassafras. (Wir.)

℞. Ras. Ligni Sassafras libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo, digere, tunc residuum parumper cum Aquae libris tribus coque, clarifica decoctum Albuminis ope et alcohole destillatione separato, reliqua ad extracti consist. consume. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Infusum Ligni Sassafras s. Sassafras. (B*. GalM. *T. Va.*)

℞. Ras. Ligni Sassafras semunciam.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde per horas sex et cola. (B*.)
GalM. Sassafras unciam unam et Aquae bull. q. s., ut post horas quatuor infusionis colaturae semilibra obtineatur; — *T.* Sassafras drachmam, Aquae bull. libram; — *Va.* Ligni unc. unam ad duas, Aquae bullientis libras duas.

Aqua Calcis composita, Aqua benedicta s. benedicta composita. (Br. Du. Lus. *Bo. Pie. Sp. Va. Vm.*)

℞. Ligni Sassafras . . semunciam.
— Guajaci . . . semilibram.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Coriandri . . . drachmas tres.
Aquae Calcis . . . octarios sex.
Post duos dies digestionis cola. (Br. Du. *Re. Sp.*)

℞. Ligni Sassafras . . uncias duas.
Nucis moschatae drachmas tres.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Aquae Calcis . . libras quatuor.
Macera per horas 24 et cola. (Lus. *Va.*)

Vm. Sassafras uncias duas, Nucis mosch. drachmas tres, Liquiritiae unciam unam, Aquae Calcis triginta sex et tres dies infusionis.

℞. Sassafras . . . . semunciam.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Aquae Calcis . . . libras sex.
Infunde per duos dies et cola. (*Pie.*)

℞. Rad. Althaeae,
— Saponariae, sing. unc. unam.
— Sarsaparillae,
Ligni Sassafras, sing. drach. quatuor.
Aquae Calcis . . libras quatuor.
Post duos dies macerationis adde
Syrupi Quinque Radicum aperientium . . . . . uncias duas.
Misce. (*Bo.*)

Bei scrophulösen Krankheiten. — Gabe, täglich mehrere Tassen.

Syrupus e Corticibus s. Cortice Ligni Sassafras s. Sassafras. (Wir.)

℞. Corticis Ligni Sassafras uncias tres.
Vini albi . . uncias viginti duas.
Infunde et colaturae adde
Sacchari . uncias triginta duas.

Tinctura s. Essentia Ligni Sassafras. (Br. Wir. *Sw*.*)

℞. Ras. Ligni Sassafras uncias duas.
Aquae Vitae . uncias duodecim.
Digere per tres dies et filtra. (*Sw*.*)
Br. et Wir. Sassafras sesquiunciam. Alcoholis uncias octo et octo (tres) dies digestionis s. macerationis.

Reizend, ehedem als Mittel gegen Catarrh und als blutreinigend, jetzt besonders als schweiß- und harntreibend betrachtet und vorzüglich bei chronischen Rheumatismen angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich vier Mal, in Sassafrasthee.

Essentia s. Tinctura Sassafras s. Ligni Sassafras composita. (Wir.)

℞. Cort. Ligni Sassafras unc. quatuor.
Foliorum Salviae . uncias duas.
Nucis moschatae . unciam unam.
Cinnamomi . . . semunciam.
Anisi stellati . . drachmas tres.

Alcoholis . . . . libras duas.
Post tres dies digestionis cola exprimendo et filtra. — Reizend, bei Catarrhalbeſchwerden, Gicht, Krankheiten von Luftanſammlung, manchen Arten von Kräzze ꝛc. — Gabe, funfzig bis achtzig Tropfen.

Oleum Sassafras s. Lauri Sassafras s. Ligni Sassafras aethereum, Aethereoleum Sassafras Ligni (Am. Ams. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Sar. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T.*)

℞. Ligni Sassafras . . quantum vis
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillent. (Am. Ams. Du. Ed. *C.*) Ful. Wür. et *Sw.* Ligni partem unam et quatuor Aquae; — Pal. Aquae sex; — Han. Aquae octo; — *T.* Aquae quatuor, unum diem macerationis, destillationem dimidiae partis, cohobationem et separationem olei.

℞. Ligni Sassafras . partes decem.
Aquae . . . . partes viginti.
Salis culinaris . . partem unam.
Post horas duodecim destillent et oleum fundum petens colligatur. (Gal.). Sar. Ligni partes tres, Aquae viginti quatuor et unam Salis; — Hass. Wir. et *Pid.* Ligni sex, Aquae triginta et Salis tres; — *Fi.* Salis unam cum dimidia, caeterum ut Fer.; — HassP. Ligni, Salis, sing. libras duas, Aquae sedecim et repetitionem operationis cum Aqua stillatitia etc.

℞. Ligni Sassafras . . libras duas.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Post duos dies adde
Aquae . . . . libras duodecim.
Salis culinaris . . libram unam.
Destillent. (Li.)
Gabe, zwei bis acht Tropfen.

Oleosaccharum s Elaeosaccharum Sassafras. (B* *Gr.*)

℞. Olei ess. Sassafras . gutt. decem.
Sacchari albi . . drachmas tres.
Contere.
Gr. Olei guttas sedecim, Magnesiae alb., Sacchari, sing. unciam.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras. (Gal. Sar. *Fi.*)

℞. Ligni Sassafras . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Post horas duodecim destillent partes quatuor. (Gal.)
Sar. Ligni partem unam, Aquae sex et Salis parvam quantitatem; — *Fi.* Ligni uncias sex, Aquae libras quatuor cum dimidia, destillent in balneo aquae calido librae tres.
Gabe, eine bis vier Unzen.

Aqua Ligni Sassafras s. Sassafras composita. (Wir.)

℞. Ligni Sassafras . . semilibram.
Cinnamomi . . . . uncias tres.
Vini generosi . . libras decem.
Post aliquot dies digestionis destillet sesquilibra.

Satureja.

In den Pharmacopöen ſind angezeigt:
1) *Satureja hortensis, L.*; Gartenſaturei, gemeines Pfefferkraut; Sarriette des jardins (*Gal.*); Savory (*Ang.*); Satureye (*B.*); Saer (*D.*); Ajedrea (*His.*); Keulen (*Bel.*); Santoreggia (*I.*); Ozabr (*Pol.*); Segurelha (*Lus.*); Kyndel (*Suec.*).

A. Ams. B. Br. Fer. Gal. His. HisS. LP. Wir. Wür. *Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

☉ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine Südeuropäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 419. *Plenck* t. 486. *Hayne* VI. t. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 216.)

Das Kraut (herba Saturejae s. Cunilae sativae) beſteht aus einem ſehr äſtigen, vierkantigen, dünnen Stängel mit gegenüberſtehenden, ſitzenden, einfachen, lanzettigen, linienförmigen Blättern. Es hat einen angenehmen, ſtark gewürzhaften Geruch und einen etwas ſcharfen, brennenden und gewürzhaften Geſchmack.
Reizend.

2) *Satureja capitata, L.*; kopfförmige Saturei; Thym de Crète (*Gal.*).

Br. Gal. His. HisS. Wir. *Be Gr. Sp.*

♄ Eine Pflanze des ſüdlichen und öſtlichen Europa's.

Man wendet das blühende Kraut (herba et spicae Thymi Cretici s. veri) an; es beſteht aus einem dünnen Stängel mit kleinen, ſchmalen, entgegengeſetzten, gekielten, punctirten Blättern und weißen, eine endſtändige Aehre bildenden Blüthen. Es hat einen ſtarken und angenehmen Geruch und einen brennenden und gewürzhaften Geſchmack.
Reizend.

3) *Satureja Thymbra, L.*, Thymbra vera; Saturei; Sarriette de Crète (*Gal.*).

Gal. His. HisS. *Gr. Re.*

☉ Eine auf Creta wachſende Pflanze.

Das Kraut hat kleine, eirunde und ſpizige Blätter.

Gr. führt außer dieſen noch an: Satureja durior, frutescens, montana, spicata, Juliani.

Oleum Saturejae aethereum, Aethereoleum Saturejae. (Pal.)

℞. Herb. floresc. Saturejae part. 25.

Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies digestionis destillent.

Saxifraga.

Saxifraga granulata, L.: weißer Steinbrech, Hundsrebe, Keilhaut; Saxifrage blanche (*Gal.*); Common saxifrage (*Ang.*); Huid steenbraek (*D.*); Witte steenbreek (*Bel.*); Saxifraga branca (*Lus.*); Steenbraecke (*Suec.*),

Br. Gal. His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

4 (Hexandria Digynia, L.; Saxifrageae. *J.*) Eine in ganz Europa verbreitete Pflanze. (*Blackw.* t. 214. *Plenck* t. 345. *Hayne* III. t. 23. *Zorn* Ic. pl. t. 309.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Saxifragae albae) besteht aus kleinen rundlichen Körnchen von der Größe der Coriandersaamen, welche unter einander mittelst Fasern vereinigt und mit einem rothen Fellchen bedeckt sind, welche man ehedem mit dem unpassenden Namen semen Saxifragae albae belegte. Sie hat einen etwas styptischen und bittern Geschmack, welcher sich beim Trocknen verliert. — Das Kraut besteht aus einem ästigen Stängel mit nierformigen, lappigen Blättern. Es hat einen scharfen, etwas sauern Geschmack, von welchem nach dem Trocknen fast keine Spur zurückbleibt.

Saxifraga aurea von Chrysosplenium alternifolium und oppositifolium (*Gr. Re.*), eröffnend, harntreibend, gegen Asthma und Brustkrankheiten. — *S. Cotyledon, tridactylites, Geum* (*Gr.*), eröffnend, harntreibend, bei Gelbsucht, Obstructionen, Scropheln.

Scabiosa.

In den Pharmacopöen sind angeführt:

1) *Scabiosa succisa, L.*; Teufelsabbiß; Mors du diable (*Gal.*); Devilsbitt (*Ang.*); Czertkus (*B.*); Dievelsbid (*D.*); Mordisca de diabolo (*His.*); Duivelsbeet (*Bel.*); Morso del diavolo (*I.*); Cisyna (*Pol.*); Morso de diabo (*Lus.*); Engvaedd (*Suec.*),

An. Br Gal. LP. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.* Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsaceae *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* V. t. 37. Diiss. off. Pfl. VII. t. 20. *Zorn* Ic. pl. t. 150.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Succisae s. Morsus Diaboli) ist kurz, faserig, außen gelblich, inwendig weißlich und in der Mitte wie benagt, indem sie am Ende jedes Jahres zum großen Theil abstirbt. — Das Kraut besteht aus einem einfachen, runden, behaarten, ästigen Stängel mit gegenüberstehenden Zweigen, welche an jedem Gelenke zwei kleine entgegengesetzte, lanzettförmige, ganze Blätter tragen. Es hat einen kaum merklichen Geruch und einen bitterlichen, süßen, styptischen Geschmack.

Schwach abstringirend, aber wenig gebraucht.

2) *Scabiosa arvensis, L.*; Ackerscabiose; Scabieuse des champs (*Gal.*); Field scabious (*Ang.*); Kawias (*B.*); Scaburt (*D.*); Escabiosa (*His.*); Gemeen scharfkruid (*Bel.*); Scabiosa (*I.*); Dryakiew polne (*Pol.*); Escabiosa dos campos (*Lus.*); Akervaedd (*Suec.*).

A Ams. Br. Fer. Gal. His. His3. Wir. Wür. *Be Br. Gr. M. Re Sp.* Z.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Dipsaceae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (Fl. Dan. t. 447. *Blackw.* t. 185. *Schk.* t 22. *Hayne* V. t. 38. *Zorn* Ic. pl. t. 141.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel ist lang, dünn, weiß und hat keinen merklichen Geruch und einen bittern styptischen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem runden, behaarten, hohlen Stängel und eirundlanzettigen, gezähnten untern und wie gefiederten obern Blättern. — Die Blüthen sind blaßpurpurroth.

Aqua Scabiosae. (Pal.)

℞. Herbae Scabiosae partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet dimidia pars.

Scammonium.

Diacrydium, Resina s. Gummi-Resina Scammoniae: Σκαμμωνία; Scammonium, purgirender Windensaft; Scammonée (*Gal.*); Scammony (*Ang.*); Skammonia (*B.*); Sukmumia (*Ar. Duk.*); Skammonium (*D. Suec.*); Escamonea, Scamonea (*His. Lus.*); Mehmudeh (*Hin.*); Scammoneum (*Bel.*); Scamonea (*I.*); Skammonia, Sok suznikowy (*Pol.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn Fer. Gal. GalM. Han. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T.* Z.

Ein Gummiharz, von welchem man drei Sorten unterscheidet:

1) *Scammonium de Aleppo s. Aleppense s. Halepense s. Syriacum, Diagridium, Gummi-Resina Scammoniae s. Convolvoli Scammoniae*, Scammonium von Aleppo, Scammonée d'Alep (*Gal.*), in regelmäßigen, aſchgrauen, leichten, trocknen, ſehr zerreiblichen Maſſen. Der Bruch iſt glänzend, das Pulver bräunlichweiß, der Geruch ſtechend und etwas widerlich, der Geſchmack ſcharf und bitter.

Es iſt der getrocknete Milchſaft von Convolvolus Scammonia, L., ♃ (Pentandria Monogynia, L; Convolvulaceae, *J.*), einer Pflanze Syrien's. (*Plenck* t. 92. *Mill.* Dict. t. 102. *Zorn* Ic. pl. t. 214.)

2) *Scammonium Smyrnaeum*, Scammonium von Smyrna, Smyrniſches oder Antiochiſches Scammonium; Scammonée de Smyrne (*Gal.*) iſt ſchwerer, dichter, weniger zerreiblich, dunkler, von unangenehmerem Geruch und nicht ſo geſchätzt wie das vorige.

Es kommt von Periploca Secamone, L. ♄ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), einer Pflanze Aegypten's (*Alp.* de pl. Aeg. t 48.) — Sibthorp leitet es von Cynanchum Monspeliacum her.

3) *Scammonium Monspeliacum*; Scammonium von Montpellier; Scammonée de Montpellier (*Gal.*), iſt ganz ſchwarz, ſehr hart und derb.

Es kommt von Cynanchum Monspeliacum, L., einem Strauche (Pentandria Monogynia, L; Apocyneae, *J.*) des ſüdlichen Frankreich's und Spanien's (*Sibthorp* Fl. graec. t. 251. *Jacq.* Coll. II. t. 340. *Cavan.* Ic. rar. I. t. 60.)

Auch Convolvolus Brasiliensis ſoll eine Art Scammonium liefern, das ſogenannte Potatoe slip scammony (*Gr.*)

Ein draſtiſches Purgirmittel. — Gabe des Pulvers, drei bis funfzehen Gran.

Diacrydium sulphuratum. (Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Scammonii pulverati quantum vis.

Supra chartam albam sparsum supra cratem, cui carbo urens est subditus, in quem sulphuris uncia successive injiciatur, suffumigetur, agitando donec resina liquefieri et chartae adhaerere incipiat.

Diacrydium s. Diagrydium glyzyrrhizatum s. Liquiritia edulcoratum. (Sar. Wir.)

℞. Scammonii . . . . semilibram.
Decocti Liquiritiae libram unam.

Contere, sepone, liquorem vaporando ad siccum redige et residuum pulvera.

Diacrydium rosatum obtines, si loco decocti liquiritiae Infusum Rosarum; *Diagrydium cydoniatum*, si loco infusi Succum Cydoniorum depuratum (Scammonii libram. Succi uncias octo *Gr.* Succi partem unam, Scammonii duas *Re.*) adhibes.

Resina Scammonii. (Ams. An. Br. Ful. Gal. Pal. R. Sax. Wir. *Br. Gr. T.*)

℞. Scammonii pulverati partem unam.
Alcoholis (0,907) . . partes sex.

Dissolve, filtra liquorem et destillando dimidium abstrahe; resinam e residuo Aquae ope praecipitatam bene ablue et blandissimi caloris ope sicca. (Ams. An. Br. Gal. R. Sax. Wir. *Br.*)

Pal. tincturam destillando ad perf. siccitatem redigere, et residuum siccatum pulverare; — *T.* Scammonii uncias sex cum Alcoholis diluti 25° B. per plures vices calide digerere, liquoribus commixtis destillatione ad dimidium redigere et residuum ad extracti consist. evaporatum in rotulas formare, quae super charta uncta aëris vel vaporatorii ope siccentur.

Gabe, drei bis zehen Gran.

Pulvis hermodactylatus, s. Scammoneae s. e Scammonio s. Scammonii s. Scammoniae compositus s. catholicus s. caryocostinus s. Diacarthami s. purgans, Species caryocostinae. (Am. An. Ed. Fer His. His3 Lon. LonN. Lus. Pm. Sar. *C. Gr. Re. Va. Vm.*

℞. Scammonii,
Cremoris Tartari, sing. part. aeq.
Misce triturando. (Am. Ed. Lus. *C. Gr. Re.*)

Fer. Scammonii, Tartari, Sacchari, singulorum grana octo.

℞. Scammonii,
Extr. Jalappae sicci, sing. part. quatuor.
Zingiberis . . . partem unam.
Fiat pulvis (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Va. Scammonii, Extr. Jalap., sing. grana decem, Zingiberis tres.

℞. Scammonii . . . . semunciam.
Radicis Mechoacannae,
— Jalapae, sing. drachm. sex.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Misce. (His. His3.)

℞. Scammonii,
Hermodactylorum, sing. unc. duas.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . unciam unam.
Fiat pulvis. (An.)

℞. Cinnamomi,
Costi Arabici,
Zingiberis, sing. . partem unam.
Hermodactylorum,

Scammonii, sing. . partes duas.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

℞. Hermodactylorum,
Sacchari albi, sing. drach. decem.
Radicis Turpethi,
Scammonii, sing. . drachmas sex.
Radicis Zingiberis drachmas tres.
Fiat pulvis tenuis. (Pm.) (℈j — iv.)

℞. Seminum Carthami drachmas sex.
Gummi Tragacanthae,
Hermodactylorum,
Scammonii, sing. . . semunciam.
Cinnamomi,
Liquiritiae, sing. drachmas duas.
Turbith . . . . unciam unam.
Fiat pulvis. (Sar.)

Dieſes Pulver hat Aehnlichkeit mit dem pulvis cornachini. — Gabe, zehen bis funfzehn Gran.

Pulvis antarthriticus s. antarthriticus purgans. (*Ca. Sp.*)

℞. Seminum Cardui benedicti,
— Carthami,
Scammonii,
Radicis Sarsaparillae,
— Chinae,
Ligni Guajaci, sing. semunciam.
Cremoris Tartari,
Fol. Sennae, sing. . unc. unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (*Sp.*)

Ca. Seminum, sing. drachmas decem, Salis et Sennae, sing. semunciam, Scammonii, Sarsaparillae, Chinae et Guajaci, sing. drachmas duas et Cinnamomi drachmam unam.

Pulvis e Scammonio cum Aloë (*Gr.*): Scammonii drachmas sex, Extr. Jalapp. duri, Aloës Succotr., sing. sesquiunciam, Zingib. semidrachmam.

Pulvis Scammonii et Calomellis (*Va.* Hosp. Angl.): Scammonii drachmam unam, Calomellis, Sacchari, sing. semidrachmam. Misce, divide in part. 28. — Ein oder zwei Stück täglich.

Pulvis purgans. (*Va.* Hosp. Ang.): Scammonii grana quinque, Rhei quindecim, Subcarb. Ammoniaci sex; misce. — Auf einmal.

Pilulae resolventes. (*Ca.*)

℞. Extracti Gentianae . semunciam.
Fellis Tauri . . drachmas tres.
Scammonii . . drachmas duas.
Fiant pilulae centum sexaginta duae. — Gabe, vier bis ſechs Stück täglich, nüchtern oder vor dem Mittagseſſen.

Pilulae Extracti catholici s. purgantes. (Ams.)

℞. Extr. Aloës gumm. . unc. unam.
— Hellebori nigri drach. duas.
Extr. Colocynthidis drach. unam.
Scammonii . . . drachmas tres.
Fiat massa pilularis.

Tabellae Diacarthami s. Scammonii et Sennae purgantes s. de Scammonio et Senna compositae s. purgantes compositae. (Gal. Sar. *Pie. Re. T.*)

℞. Pulv. Diacarthami (Sar) unc. tres.
Sacchari pulverati libram unam.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant tabellae. (Sar.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Scammonii . . drachmas tres.
Sacchari albi . . . uncias octo.
Ol. ess. Cinnamomi gutt. quatuor.
Aquae Rosarum quantum sufficit.
Fiant tabellae drachmae unius. (*Pie.*)

℞. Scammonii . . drachmas tres.
Fol. Sennae drach. quatuor c. dim.
Rhei . . . . sesquidrachmam.
Cort. Citri conditi unciam unam.
Sacchari unc. sex et drach. sex.
Mucilag. G. Tragacanth. c. Aqua Cinnam. par. q. requiritur.
Fiant tabellae drachmarum sex. (Gal.)

T. tabellas scrupulorum quatuor parare; — *Re.* Caryophyll. arom. drachmam, Sacchari uncias sex, reliqua ut Gal.

Gabe, zwei bis ſechs Drachmen und mehr.

Electuarium caryocostinum, Caryocostinum. (*Gr. Vm.*)

℞. Pulv. Scammonii comp. part. unam.
Mellis albi . . . . partes sex.
Misce. — Purgirend. — Gabe, eine bis ſechs Drachmen.

Gr. Scammonii, Hermodactyl., Caryophyll. arom., Zingib., sing. drachmas sex, Olei Carvi unam, Mellis libram.

Scammonium Smyrnense factitium (*Gr.*): Scamm. Alepp unc. octo, Rad. Jalapp. libr. quatuor, Fol. Senn., Ebor. ust., sing. libram, Zingib. unc. duas, Mannae comm. libr. tres, G. Gutt. libr. duas, Syr. Spin. cervin. tantidem; vel: Rad. Jalapp. libr. duas, Fol. Sennae, Scamm. Alepp., G. Gutt., sing. unc. octo, Ebor. ust., Zingib., sing. quatuor; vel: Scamm. Alepp. libram unam, Extr. Jalapp. quinque, G. Guajac. decem, Sago tantidem, Ebor. usti quatuor.

Electuarium hydragogum. (*Br*., *Ca.*)

℞. Scammonii,
Rad. Jalappae, sing. drach. duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Resinae Jalappae semidrachmam.
Syrupi Rhamni cathart. . q. s.

Purgirend. — Gabe, bis vier und zwanzig Gran, bei ſogenannten aſtheniſchen Waſſerſuchten.

Electuarium Scammonii s. e Scammonio s. purgans, Confectio Scammoneae. (Am Du. Lon. LonN. *C. Gr. Ra. Re. Sp. Va. Vm.*)

℞. Scammonii,
Zingiberis, sing. unc. (drach. *Gr.*) unam.
Olei Caryophyllorum scrupulum unum.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Misce. (Am. Du. *C. Va.*)

℞. Scammonii . . . sesquiunciam.
Caryophyllorum,
Zingiberis, sing. . drachmas sex.
Olei Carvi . . semidrachmam.
Syrupi Rosarum q. s. (libr. dim. *Gr.*)
Fiat electuarium. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Gr. praeterea sec. Lon. 1745. loco syrupi rosarum Mellis semilibram, caeterum ut antea; vel: Scamm. Alepp, Piment., Rad. Glycyrrh., sing. unc. duodecim, Zingib. libram et unc. octo, Ol. Carvi sesquiunc., Ol. Caryophyll. drachm. duas, Mellis libras duodecim; vel: Rad. Jalapp., Zingib., sing. sesquiunc., Scammon. drach. sex, Ol. Carvi duas, Ol. Caryophyll. gutt. sedecim, Mellis libram et uncias octo.

℞. Coriandri . . . drachmas duas.
Caryophyllorum,
Zingiberis, sing. . drachmas sex.
Scammonii . . . sesquiunciam.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Misce. (*Vm.*)

℞. Scammonii . . . semunciam.
Radicis Jalapae uncias quatuor.
Amygdalas dulces . . . no. 20.
Foliorum Sennae . uncias duas.
Anisi,
Cremoris Tartari, sing. unciam.
Pulpae Prunorum uncias sedecim.
— Tamarindorum uncias octo.
Misce. (*Sp.*) — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Electuarium Diaphoenix s. Scammonii et Turpethi compositum. (Gal. Sar. *Re.*)

℞. Pulpae Dactylorum libr. unam.
Turbith . . . uncias quatuor.
Liquiritiae . . . uncias duas.
Scammonii . . . sesquiunciam.
Mellis depur. libr. duas c. dimid.
Coque pulpam cum melle ad consumptionem humidi superflui et adde pulveres. (Sar.)

℞. Pulpae Dactylorum semilibram.
Amygd. dulc. excort. unc. tres c. dim.
Sacchari pulverati . semilibram.
Mellis depurati . . libras duas.
Pulv. Zingiberis,
— Piperis,
— Macidis,
— Cinnamomi,
— Foliorum Rutae,
— Sem. Dauci Cretici,
— — Foeniculi, sing. drach. duas.
— Rad. Turpethi unc. quatuor.
— Croci . . . grana sex.
— Scammonii . sesquiunciam.
Misce bene. (Gal. *Re.*) — Gabe, von einer halben Drachme bis zur halben Unze.

Pruna praeparata s. purgantia. (*Fi.*)

Parantur e Prunis perniconis dictis, nucleum eximendo et loco ejus bolum e Scammonii granis decem et Conservae Violarum q. s. paratum ingerendo. — Auf einmal.

Tinctura Scammonii. (Gal. *T.*)

℞. Scammon. grossiusc. tritur. part. unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.
Digere per tres dies et cola. — Gabe, zwanzig Tropfen bis eine Drachme.

T. Scammonii sesquiunciam, Alcoholis 25° libram et digestionem per dies decem. — Nicht über einen Scrupel und mit einer Emulſion.

Elixir polychrestum Halense. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti panchymagogi unc. unam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Dissolve et solutioni adde
Acidi sulphurici . drachmas tres.
Filtra. (Wir. *Sp.*)

℞. Extracti panchymagogi unc. unam.
Mixturae simplicis . uncias sex
Dissolve. (Wir.)

Purgirend. — Es war lange ein Geheimmittel. Die Formel iſt von Triller. — Gabe, dreißig bis ſechzig Tropfen und mehr.

Oleum purgans. (*Sw*. Va.*)

℞. Scammonii . scrupulos quatuor.
Olei Amygd. dulc. unc. quatuor.
Dissolve blandi caloris ope. — Mildes Purgirmittel — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen, in Emulſion oder mit syrupus papaveris.

Syrupus drasticus. (*Bo.*)

℞. Syrupi Limonum uncias quinque.
Scammonii pulv. drach. quatuor.
Croci Martis aperientis,

Antimon. crudi porphyr., sing. drach. duas.

Misce exacte.

Syrupus de Scammonio, Syrupus ad arthritidem et hydropem s. antarthriticus vel antihydropicus. (Gal. *Ca. Fi. T. Vm.*)

℞. Scammonii pulverati semunciam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Alcoholis (22°) . . uncias octo.

In pelvim argenteam ingere, supra ignem collocandam et simulac massa aliquanto est calefacta, cerei flamma admoveatur ut liquor incendatur; agita continue spatula, donec flamma extinguatur, ab igne vase remoto; liquori refrigerato et per pannum colato adde

Syrupi Violarum uncias quatuor.

Serva. (Gal.)

Fi. Alcoholem 20° adhibet; — *T.* Scammonii drachmas sex, Sacchari uncias sex, Alcoholis duodecim, Syrupi Violarum sex. — Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze; bis eine Unze. *T.*)

℞ Scammonii pulv. . partem unam.
Aquae Vitae . . partes sedecim.

Dissolve, liquori ignem admove et flammâ sponte extinctâ, per linteum trajice et adde

Syrupi Violarum . partes octo.

Serva. (*Vm.*)

℞. Gummi Arabici . partem unam.
Scammonii . . . partes duas.

Misce triturando et cum

Aquae . . sufficiente quantitate emulsionem spissam para, cum qua commisce

Syrupi Violarum partes viginti.

Serva. (*Vm.*)

Potio purgans, Mixtura cathartica Arabica. (*Ca.*)

℞. Aquae Florum Aurantiorum,
Syr. Flor. Persicae, sing. unc. unam.
Spir. Rorismarini drach. unam.
Scammonii . . grana duodecim.

Misce.

℞. Syrupi Limonum unciam unam.
Sulphureti Antimon gr. duodecim.
Scammonii . scrupulum unum.

Misce. — Auf ein Mal. — Die zweite Formel wurde besonders gegen Wassersucht gepriesen.

Emulsio purgans. (Gal. *Re*)

℞. Scammonii . . grana duodecim.
Sacchari albi . drachmas duas.
Vitelli Ovi . . . . . part. ½.

Tere, sensim addendo

Emulsionis simpl. uncias quinque.
Aquae Flor. Aurant drach. duas.

Emulsio vermifuga. (*Sa.*)

℞. Nucleorum Persicarum,
Amygd. amar., sing. drach. duas.
Scammonii . . sem scrupulum.
Aquae Absinthii . . uncias tres.

Scilla.

Scilla maritima, L.; Meerzwiebel, Mausezwiebel; Scille, Oignon marin (*Gal.*); Sea onion (*Ang.*); Alaschil (*Ar.*); Merska cybule (*B.*); Strandlaeg (*D.*); Escilla, Ceballa albarena (*His.*); Zeaujuin (*Bel.*); Scilla, Cipolla marina (*I.*); Korzen cebuli morskiey (*Pol*); Albarra, Cebola albarrá (*Lus.*); Sjaelaek (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Ped. Re. Sa. Sp. Va.* Z.

♃ (Hexandria Monogynia, L.; Asphodeleae, J.) Eine im südlichen Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (*Blackw.* t. 591. *Plenc.* t. 271. *Bert.* Bild. VIII. 17 Fl. méd. VI. 318.)

Man wendet die Zwiebel (radix Scillae marinae s. Squillae s. Scillae rubrae s. Pancratii veri) an; sie ist birnförmig, sehr groß und mit mehrern trocknen, dünnen, papierartigen Häuten bedeckt, unter denen man eirunde, fleischige, rothe oder weiße Schuppen findet. Ihr Geruch ist beißend, der Geschmack anfangs schleimig, wird aber dann bitter, scharf und widerlich. Man wendet nur die rothe Spielart an

Die Meerzwiebel enthält, nach Vogel, außer Schleimharz, holzigen Bestandtheilen ꝛc., einen eigenthümlichen bittern Stoff, Scillitin, (Scillitinum) Scillitine (*Gal.*), welcher den Grund ihrer Wirksamkeit enthält. Nach Tilly besteht dieser Stoff aus nicht crystallisirbarem Zucker und zwei Stoffen, einem sehr bittern und einem außerordentlich scharfen.

In Indien braucht man, nach Ainslie (*Gr.*), statt der Meerzwiebel die Zwiebel von

Erythronium Indicum, Rottler; Unsul; Iskil (*Ar.*); Nurriala (*Cy.*); Junglie piaz (*Duk.*); Kanda (*Hin.*); Peyaz ideschti (*Pe.*); Nurri vungyum (*Tam.*); Addivitella guddalu (*Tel*).

Einige Schriftsteller haben behauptet, die Meerzwiebel wachse in Ceylan, allein

White von Bombay ist der Meinung, daß man Amaryllis zeylanica dafür genommen habe.

Reizend, harntreibend, Brustmittel, bei Wassersucht und chronischen Catarrhen in Gebrauch. — Gabe des Pulvers, ein bis zehen Grun.

§. I. Präparate, welche die Meerzwiebel in Substanz enthalten.

Scilla praeparata, Pulvis Scillae. (His. RC. *Fi. Re.*)

Bulbos Scillae, remotis squamis externis, virgulis penetratos in evaporatorio vel furno parum calido sicca, contunde in mortario, denuo in evaporatorio calefactos contunde et pulverem per setaceum trajiciens penitus siccatum serva (*Fi*); — His. squamas, externo cortice et meditullio ablatis, filo trajecto, solis radiis exponere vel transversim in frustula sectas lenissimo calore exsiccare; — RC. in taleolas transversim sectos leni calore vel balnei aquae vel aestivo soli expositos vel in loco temperate calido exsiccare, ut fiant friabiles, tunc in pulverem terantur etc.

Pulpa Scillae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Bulborum Scillae quantum vis.
Radicibus et tegminibus externis semotis, reliqua inter chartam inclusa coque inter cineres calidos, donec bulbus facile inter manus conteri possit; tunc partibus combustis separatis, medias in mortario marmoreo contunde et per cribrum arcte textum trajiciendo, pulpam para.

Involvi quoque potest bulbus strato tenui pastae farinaceae et sic inter cineres vel in furno coqui. (Gal. *T.*)

Trochisci de Scilla Damocratis s. scillitici. (His. His. Pal. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Scillae . . . uncias duodecim.
Contunde in mortario, addendo
Farinae Orobi vel Lupini
unc. octo.
Divide massam in trochiscos drachmarum duarum (Pal. Wir. *Sp.*)

His. His. et Sar. loco farinae Pulverem Radicis Fraxinellae adhibent.

Pulvis Scillae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Tartratis Potassae drachmas novem.
Misce. — 10—30 Gran täglich zwei oder drei Mal, als diureticum. (10 Gran enthalten 1 Gr. Scille.)

Pulvis Scillae compositus s. compositus Stahlii. (B*. BorC. Br. DD. Fenn. Ful. Gen. LP. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Au. Ca. E. Pid. Sa. Sm. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Scillae . . . . . partes sex.
Radicis Vincetoxici partem unam.
Fiat pulvis. (*Ca. Sw.*)

Br. Pal. Sar. Wir. et *Sp.* Scillae partes tres et unam Vincetoxici; — B*. Scillae partes duas et unam Vincetoxici.

℞. Scillae . . . . partem unam.
Radicis Vincetoxici . partes sex.
Nitri depurati . . partes octo.
Fiat pulvis. (*Pid.*)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Nitri . . . . partes quatuor.
Fiat pulvis. (*Sm.*)

E. Scillae partem unam et Nitri sex; — Gen. Scillae unam et octo Nitri.

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Cinnamomi . scrupulum unum.
Fiat pulvis. (Wür.)

LP. Squillae scrupulus duos, Pulveris arom. drachmas duas, Nitri tantidem; — *Sa.* Scillae grana decem, Nitri quindecim et Piperis Jamaicensis quinque; — *Sw.* Scillae, Piperis Jamaicensis, sing. decem et Nitri quindecim.

℞. Scillae . . . . partem unam.
Nitri,
Cremoris Tartari, sing. partes sex.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Pie. praeterea: Scillae partes sex, Nitri duodecim et Cremoris Tartari viginti.

℞. Scillae . . . . partem unam.
Nitri . . . . . partes tres.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Pulveris aromatici partes duas.
Fiat pulvis. (Fenn. Suec.)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Crem. Tart. part. viginti quinque.
Elaeosacch. Foenic. part. quinque.
Fiat pulvis. (DD.)

℞. Scillae,
Zingiberis, sing. grana duodecim.
Kali sulphurici . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Scillae . . . . partem unam.
Pulveris aromatici . partes duas.
Nitri . . . . . partes tres.
Sulphatis Potassae partes quatuor.
Fiat pulvis. (*Vm.*)

℞. Natri acetici,
Elaeosacch. Junip., sing.
drach. tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Radicis Calami . . semigranum.
Opii . . . . . grana tria.

Fiat pulvis in partes sex dividendus. (BorC.)

℞. Scillae . . . . . grana duo.
Fol. Digitalis purp. . gr. unum.
Tartari depurati sesquidrachmam.
Fiat pulvis. (B*.)

℞. Scillae,
Digitalis purp., sing. gr. unum.
Olei Juniperi . . guttas duas.
Tartari boraxati,
Liquiritiae, sing. . scrup. unum.
Cinnamomi . . . . grana duo.
Misce (B*.)

Harntreibend. — Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

℞. Scillae . . . . . grana duo.
Bacc. Juniperi grana octodecim.

Auf eine Gabe (*Au.*)

℞. Scillae . . . grana quindecim.
Iridis Florentinae,
Liquiritiae, sing. . grana decem.
Sacchari Lactis scrupulos duos.
Olei Anisi . . . . guttas tres.
Fiant doses tres. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück. (*Au. Va.*)

℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacch. Juniperi, sing. drach. tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . . . grana tria.
Fiant doses sex. — Gabe, drei Stück täglich in Wachholderthee. (*Au.*)

Pulvis diureticus. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Scillae . . . scrupulum unum.
Opii . . . . . grana quatuor.
Cinnamomi . drachmam unam.
M. Divide in partes octo. — Zwei Stück täglich bei Wassersucht (jedes Pulver enthält 3 Gr. Squille.

Boli scillitici s. ad s. contra oedema pulmonum. (*Pie. Ra. Va.*)

℞. Scillae pulveratae . grana sex.
Sulphatis Potassae . grana duo.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiat bolus. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Radicis Vincetoxici semunciam.
— Scillae . drachmas duas
Salis Absinthii drachmam unam.
Syrupi Valerianae quantum sufficit.
Fiant boli viginti quatuor. (*Pie.*)

Pilulae e Scilla s. scillitieae s. Scillae ammoniacales s. scillinae s. stimulantes s. Scillae compositae s. Scillae cum Zingibere. (Am. Ams. Au B*. Bel. BorC. Br D Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. RC. Sar. Wir. Wür. *Au. Br. C. Ca. Fi. Gr. Huf. Pid. Pie. Re. Sp. Sw. Va. Vm.*)

1) Ohne Seife.

℞. Pulveris Scillae . sesquiunciam.
Gummi Ammoniaci semunciam.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiat massa pilularis. (Gal. GalM.)

Fer. Scillae pulv., G. Ammoniaci partes aeq et Balsami Copaivae q. s.

℞. Scillae pulveratae semidrachmam.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Nitri depurati drachmam unam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit ut fiant pilulae granorum quatuor. (Gen.)

℞. Gummi Ammoniaci,
Scillae siccatae, sing. partes duas.
Cardamomi minoris partem unam.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiat massa pilularis (Ams.)

Ful. et Li. Trium substantiarum, sing. partes aequales cum Oxymelle scilliticо; — Lus. et *Ca.* partes aequales cum Syrupo Sacchari; — LP. G. Ammoniaci, Scillae, sing. scrupulos duos, Pulveris aromat. unum, Oxymellis scillit q. s. ut fiat massa in pilulas ponderis granorum duorum dividenda; — Wür. et *Pie.* Partes aequales cum Balsamo Copaivae; — Hass. et *Pid.* Partes aequales absque syrupo et balsamo; — *Au.* Scillae, G. Ammoniaci, sing. partes duas et unam Cardamomi absque oxymelle, syrupo et balsamo.

℞. Scillae pulveratae partem unam.
Gummi Ammoniaci,
Cardamomi minoris,
Extr. Liquiritiae, sing. partes tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (An. *Br. Gr. Sw.*)

℞. Scillae pulveratae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum, sing. . partes octo.
Cardamomi minoris partes duas.
Balsami Copaivae partem unam.
Fiat massa pilularis. (Br.)

2) Mit Seife.

℞. Scillae pulveratae drachmam unam.
Saponis albi grana viginti quatuor.
Fiant pilulae quadraginta. (Am. C.)

℞. Saponis albi . . partes septem.
Gummi Ammoniaci . partes tres.
Scillae pulveratae,
Bals. Copaivae, sing. part. unam.
Fiat massa pilularis. (His. His3.)

℞. Saponis albi . . . partes duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulv., sing. partem unam.
Emuls. spissae Bals. Copaivae q. s.
Fiat massa pilularis. (*Vm.*)

℞. Saponis . . . . partes duas.
Scillae pulveratae,
Nitri, singulorum partem unam.
Balsami Copaivae quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*)

℞ Saponis Hispanici . partes octo.
Gummi Ammoniaci,
Radicis Vincetoxici,
Scillae, singulorum semunciam
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiat massa pilularis. (D.)

℞. Saponis albi,
G. Ammoniaci, sing. drach. duas.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Scillae siccatae grana duodecim.
Alcoholis . . quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum duorum. (BorG. *Au.*)

Lon. LonN. *Gr. Re. Va.* Saponis, Zingiberis, sing. partes tres, Gummi Ammoniaci duas, Scillae unam et Syrupi Sacchari q. s.; — Du. *C. Gr.* Scillae drachmam unam, Zingiberis duas, Olei Anisi gutt. decem et Gelatinae Saponis q. s.; — *Br* Scillae drachmam unam, Zingiberis, Saponis, sing. tres, G. Ammoniaci duas et Syrupi Zingiberis q. s.; — *Ca.* Saponis, Zingiberis, sing. drachmas tres, G. Ammoniaci duas, Scillae unciam et Syrupi Sacchari q. s.; — Han. Scillae drachmam unam, Zingiberis, Saponis, sing. tres, G. Ammoniaci duas et Mucilag. Gummi Arabici q. s.

℞. Scillae siccatae et pulveratae,
Gummi Ammoniaci, vel
Asae foetidae,
Pulveris aromatici, vel
— Zingiberis, vel
— Cardamomi,
Saponis oleosi, sing. . part. aeq.
Tincturae aromaticae, vel
— Guajaci volatilis, vel
Syrupi simplicis quantum sufficit.
Fiat massa. (RG.)

℞. Scillae,
Gummi Ammoniaci,
Millepedum, sing. . semunciam.
Saponis . . . . unciam unam.
Balsami Copaivae drachmam unam.
Fiant pilulae granorum decem. (B*. Sar. Wir *Huf.*)

Fi. eandem formulam sed Balsami Copaivae q. s. ut fiat massa pilularis.

℞. Saponis Veneti . drachmas duas.
Gummi Ammoniaci,
Scillae pulveratae,
Millepedum, sing. drach unam.
Olei Anisi . . . guttas septem.
Mellis rosati . quantum sufficit ut fiant pilulae ponderis grani unius. (B*.)

Bel. *Pie.* et *Sp.* eandem formulam sed loco balsami copaivae Oxymel scilliticum adhibent

Die Gabe dieſer Pillen iſt im Allgemeinen ſechs bis funfzehen Gran.

Pilulae desobstruentes s. diureticae s. diureticae resolventes. (*B. Ca. Gr. Sw.*)

℞. Gummi Ammoniaci,
Saponis medic., sing. sesquidrach.
Scillae pulveratae,
Pulveris arom., sing. semidrach.
Olei ess. Junip. . gutt. viginti.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Fiant pilulae quinque granorum. — Gabe, vier Stück alle drei Tage, bei Bleichſucht und chroniſchen Lebertrankheiten.

℞. Saponis medicinalis,
Extr. Taraxaci, sing. drach. unam.
Natri sulphurici scrupulos quatuor.
Scillae . . . . grana sedecim.
Mellis . . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden (*B.*)

℞. Scillae siccatae . . grana duo.
Pilul. Hydrarg. . grana quinque.
Opii . . . granum dimidium.
F. pil. no. 1. Zur Nacht, drei oder vier Nächte hinter einander. (*Gr.*)

Pilulae pectorales. (*Sw*.*)

℞. Gummi Ammoniaci,
Sulphat. Pota s., sing drach. sex.
Rad. Iridis Flor. . semunciam.
Scillae . . . . drachmas duas.
Saponis albi . . . uncias duas.
Extracti Rhoeados quantum sufficit.
Fiant pilulae quinque granorum. — Gab, fünf Stück täglich drei Mal.

Pilulae physagogae. (B*. Wür. *Sm. Sw.*)

℞. Scillae,
Extr. Elaterii, sing. semunciam.
Acidi succinici drachmam unam.
Sulph. Antimon. aur. semidrachmam.
Fiant pilulae granorum trium. (*Sw.*)

℞. Scillae . . . . . semunciam.
Sulphuris Antimonii aurati,
Acidi succinici, sing. drach unam.
Extracti Elaterii . semunciam.
Olei Anisi . . . guttas aliquot.
Succi Liquiritiae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta. (B*. Wür. *Sm.*)

Pilulae hydragogae s. scilliticae compositae. (*Ca. Pid. Pic. Va.*)

℞. Extr. Colocynthidis drach. quinque.
Scillae drach. quinque c. dimid.
Fiant pilulae ducentae. (*Pic. Va.* Hosp. Monspel.)

℞. Scillae pulveratae,
Mercurii dulcis, singulorum drachmas duas cum dimidio.
Oxymellis scillitici . . . q. s.

Fiant pilulae centum. (*Pie.*)

℞. Scillae,
Extr. Trifolii, sing. sesquidrach.
Digitalis purpureae,
Asae foetidae, sing. drach. unam.
Fiant pilulae centum. (*Ca.*)

Va. Scillae pulv., Digitalis purp., Extracti Trifolii, sing. drachmam. M. fiant sec. a. pil. no. 72. Drei bis neun Stück täglich bei Wassersucht. (Jede Pille enthält 1 Gran Squille.)

℞. Extr. Taraxaci drach. tres c. dim.
Saponis Hispanici sesquidrachmam.
Galbani . . . drachmas duas.
Scillae . grana viginti quatuor.
Mercurii dulcis . grana sedecim.
Camphorae . scrupulum unum.
Essentiae Aurantiorum . . q. s.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Pid.*)
Gabe, vier Stück Morgens und Abends

℞. Asae foetidae . drachmas duas.
Saponis medic. drachmam unam.
Camphorae . . semidrachmam.
Scillae . . . grana duodecim.
Olei Juniperi . . guttas viginti.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehn Stück, Morgens und Abends. (*Au*)

℞. Asae foetidae,
Extr. Valerianae, sing. drach. duas.
Scillae,
Opii, singulorum . grana decem.
Fiant pilulae granorum duorum — Gabe, wie bei den vorhergehenden. (*Au*)

Pilulae diureticae. (*B. Ca. Sm. Va.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas quatuor.
Gummi Ammoniaci drachmas duas.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Croci pulverati . scrupulos duos.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Fiant pilulae sexaginta. (*Ca. Sm.*)

℞. Scillae . . . . grana viginti.
Digitalis purp. grana octodecim.
Roob Juniperi quantum sufficit.
Fiant pilulae decem. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. (*B. Va.*)

℞. Pulv. Millepedum drachmas duas.
Scillae pulv. grana triginta sex.
Gummi Ammoniaci drachmas tres.
Myrrhae . . drachmam unam.
Roob Juniperi drachmas quatuor.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

Pilulae expectorantes. (*E. Gr. Par. Va.*)

℞. Myrrhae . . . sesquidrachmam.
Scillae . . . . semidrachmam.
Extracti Hyoscyami scrupulos duos.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, zwei Stück Morgens und Abends.

Pilulae incisivae. (*Ca. Pie.*)

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Kermetis mineralis . grana octo
Extracti Opii gummosi grana sex.
Butyri Cacao . quantum sufficit.
Fiant pilulae triginta sex. (*Ca.*)

℞. Scillae . . . . . semunciam.
Ipecacuanhae . drachmas duas.
Extr. Opii gumm. gr quindecim.
Butyri Cacao . . unciam unam.
Syrupi Gummi quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca.*)

℞. Scillae . . . . . grana sex.
Succini . . . grana quindecim.
Ipecacuanhae . . . grana duo.
Conservae Inulae quantum sufficit.
Fiant pilulae novem. (*Pie.*) — Gabe, zwei oder drei Stück täglich drei Mal.

Trochisci scillitici. (*Pie.*)

℞. Scillae . . . . semidrachmam.
Sacchari . . . . uncias duas.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci centum et viginti.

Electuarium desobstruens s. aperiens antihydropicum s. stimulans. (LP. *Sw.*)

℞ Pulveris Scillae compositi (*Sw.*),
Gummi Ammoniaci,
Tartrat. Potass., sing. drach. duas.
Salis Ammoniaci scrupulum unum.
Syrupi Cinnamomi . . . q. s.
Bei Wassersucht — Gabe, zwei Drachmen drei Mal täglich.

℞. Pulveris Scillae compositi
drachmas sex.
Corticis Salicis . unciam unam.
Acidi tartarosi . . semunciam.
Syrupi antiscorbutici
uncias quatuor.
Misce exacte. (LP.) — Wie das vorige. — Gabe, eine bis zwei Drachmen, täglich alle zwei oder drei Stunden.

Looch ad asthma s. de Scilla. (Br. Pal. Wir. *Fi. Pie. Sp.*)

℞. Succi Scillae,
Mellis depurati, sing. unc. quatuor.
Misce bene (*Pie.*)
Fi. Succi et Mellis, sing. unc. sex.

℞. Scillae pulveratae . grana octo.
Gummi Ammoniaci grana viginti.
Syrupi Althaeae,
Oxymellis scill., sing. unc unam.
Aquae Boraginis . uncias duas.
Misce sedulo. (*Pie.*)

℞. Scillae siccatae . . semunciam.
Iridis Florentinae drachmas duas.
Marrubii,
Hyssopi, sing. drachmam unam.
Myrrhae,
Croci, singulorum semidrachmam.
Mellis despumati . . uncias sex.
Misce exacte. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

Unguentum Scillae. (B⁶. *Huf.*)

℞. Scillae . . . . . uncias tres.
Lixivii caustici quantum sufficit
Coquendo in mucilaginem redactis adde
Axungiae Porci quantum sufficit
ut fiat unguentum. — Auflösend, in Einreibungen auf ſchmerzloſe Geſchwülſte.

Unguentum diureticum s. diureticum resolvens. (*B. Va.*)

℞. Unguenti mercur . drach. unam.
Scillae . . . . semidrachmam.
In Einreibungen bei Waſſerſucht auf die innere Seite der Schenkel, in die Lenden und auf den Unterleib.

Linimentum diureticum s. diureticum gastro-scilliticum. (*B. Va.*)

℞. Scillae pulveratae drachmam unam.
Succi gastrici vitulini uncias duas.
Man reibt in Fällen von Waſſerſucht damit die Lendengegend ein, wenn der Kranke die paſſenden Mittel nicht durch den Mund nehmen kann.

§. II. Präparate, welche nur das wirkſame Princip der Meerzwiebel, mehr oder weniger rein, enthalten.

A. Auszug durch Waſſer.

Extractum Scillae. (A. Ba. Bel. Bor4. Fer. Pm. Wür. *Br. T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae rec. . q. vis.
Contunde in mortario, exprime succum et de tempore primum leni igne, deinde in balneo aquae vaporando consume. (A.)

Bel. contundere Scillam cum Aquae q. s., ut massa fere liquida obtineatur, colare exprimendo, residuum cum Aquae pauxillo triturare et cum expressione colare, liquores tunc commiscere, seponere et decanthatos in balneo aquae consumere; — *Br.* Bulbos contundere, cum Aqua conterere, succum exprimere, residuum cum nova Aquae quantitate coquere et liquores commixtos evaporare; — Pm. Squamas contundere et balneo maris subjicere, donec liquor limpidus evadat, exprimere, clarificare et evaporare; — *T.* macerando Radicem siccatam in pondere Aquae quadruplo ut extractum columbo parare, quod vide; — *Fi.* Squamarum rec. partem unam contundere, addere Aquae frigidae partes sex, in saccum ingerere et prelo submittere, residuum cum nova Aqua per horae circiter quadrantem coquere etc. et liquores consumere.

℞. Scillae concisae . quantum vis.
Coque per horam in Aquae q. s.; cola exprimendo, sepone, decantha liquorem et ad mellis spissi consist. consume. (Fer. Wür.)

Bor4. Scillae q. vis cum Aquae ferv. decuplo per horas 36 infundere, liquorem exprimendo separare, residuum iterum cum Aquae ferv. quintuplo infundere et post refrigerationem exprimere, liquores decanthando etc. depuratos primum leni igne ad tertiam partem, tum in balneo vaporis ad justam extracti spissitudinem consumere.

℞. Scillae recentis . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Macera per horas 24 et cola absque expressione; liquorem tunc sufficienter consume. (Ba. *Vm.*)

Electuarium resolvens martiale diureticum s. diureticum. (*E.*)

℞. Saponis Veneti drachmam unam.
Extracti Cicutae grana duodecim.
— Scillae scrupulum unum.
Aethiopis mart. drachmam unam.
Oxymellis simplicis . . . q. s.
Allmälig zu nehmen.

Decoctum Scillae. (Am. B⁶. *C. Re. Va.*)

℞. Scillae . . . . drachmas tres.
Juniperi . . . uncias quatuor.
Radicis Senegae . . uncias tres.
Aquae . . . octarios quatuor.
Decoque ad dimidium, cola et adde
Aetheris nitrici uncias quatuor.
Va. Scillae scrupulum, Junip drachm. quatuor, Senegae tres, Aquae libram, Aeth. nitr. semunciam.
Reizend, bei Waſſerſucht empfohlen. — Gabe, einen halben bis ganzen Löffel.

Decoctum hydragogum. (*Sa.*)

℞. Rad. Taraxaci integrae unc. duas.
— Althaeae . drachmas decem.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque per horae quadrantem et adde
Scillae . . . . sesquiunciam.
Florum Chamomillae uncias duas.
Post horam unam digestionis in vase tecto, colat. unciis quatuordecim adde
Syrupi Liquiritiae . uncias duas.
Misce bene.

Apozema pectorale et incisivum. (*Bo.*)

℞ Radicis Taraxaci,
Florum Taraxaci, sing. unc. duas.
Radicis Althaeae unciam unam.
Flor. Chamomillae . drach. tres.
Scillae . . . sesquidrachmam.
Succi Liquiritiae . unciam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit
ut librae tres colaturae obtineantur, cui adde

Oxymellis scillitici,
Syrupi Althaeae, sing. drach. sex.
Bruſtmittel, harntreibend. — Taſſenweiſe, ſtündlich.

Decoctum diureticum Hufelandi. (*Ca. Vm.*)

℞. Scillae . . . . semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Liquori postquam semel ebullierit, ab igne remoto adde
Radicis Valerianae drachmas duas.
Cola leviter exprimendo; post refrigerationem colaturam contere cum
Gummi Arabici,
Resinae Guajaci, sing.
drach. duabus
ut fiat emulsio, cui denuo colatae adde
Tincturae Antimonii acris,
Spir. Nitri dulcis, sing.
drach. duas.
Misce. (*Vm.*)

Ca. coquere per sexagesimas viginti Scillae semunciam in Aquae unciis decem, sub finem addere Radicis Valerianae pulv. drachmas duas, colare et colaturam commiscere cum Syrupi Corticum Aurantiorum uncia una, Mucilag. G. Arabici drachmis tribus, Resinae Guajaci, Tincturae Antimonii acris, Spiritus Nitri dulcis, sing. drachmis duabus et Laudani liquidi guttis viginti.
Gabe, ein Eßlöffel alle zwei Stunden.

Mel scilliticum. (Gal. *Fi. T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae uncias duas.
Aquae communis . . libras tres.
Coque leviter per aliquot sexagesimas, tunc digere per dies duos, cola exprimendo et colaturae adde
Mellis . . . . . sesquilibram.
Clarifica et coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)

T. Mellis 32° B. libras duas, caeterum ut Gal; — *Fi.* Squamarum drachmas quindecim, Aquae et Mellis, sing. libras duas cum dimidia

℞. Scillae siccatae . partem unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ad obtinendas infusi partes duodecim, quarum colaturae adde
Sacchari albi . partes duodecim.
Coque parumper, cola per pannum et post refrigerationem adde
Mellis . . . partes duodecim.
Misce bene. (*Vm.*)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Syrupus de Scilla s. scilliticus s. Scillae. (*Fi. T. Vm.*)

℞. Scillae siccatae . partem unam.
Aquae tepidae partes duodecim.
Infunde per horas 12, cola exprimendo et adde
Sacchari albi . partes sedecim.
Clarifica et coque ad syrupi consist. *Fi.* et *T.* ut mel scilliticum sed loco mellis cum Saccharo clarificato parare.

Looch scilliticum s. pectorale. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Looch simplicis uncias quatuor.
Mellis scillitici unc. (drachm. *Va.*) unam.

Mixtura scillina. (RC.)

℞. Aquae Menthae pip. unc. quatuor.
Syrupi Scillae, vel
Oxymellis ejusdem uncias duas.
Misce. — Interdum additur Tincturae Opii camph. uncia una. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze täglich vier Mal.

Potio diuretica. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Aquae Valerianae uncias quatuor.
Aquae Menthae pip. unc. unam. (quatuor *Va.*)
Aetheris nitrici drachmam unam.
Laudani liquidi . semidrachmam.
Mellis scillitici drachmas quatuor.
Syr Quinque Radic unc. unam.
Iſt nach dem decoctum diureticum Hufelandi gemodelt.

Mel Scillae s. scilliticum compositum, Syrupus Scillae compositus. (Am. B°. *C. E.*)

℞. Scillae siccatae et contusae,
Rad. Polygalae Virg., sing.
uncias quatuor.
Aquae . . . . octarios quatuor.
Coque blando igne ad dimidiae partis aquae consumptionem, cola et adde
Mellis despumati . . libras duas.
Coque denuo ad octariorum trium remanentiam et in hujus syrupi unciis quatuor dissolve
Tartari stibiati . granum unum.
Reizend, auflöſend, harntreibend, bei ſchleimiger Engbrüſtigkeit gerühmt. — Gabe, von zehen Tropfen bis zu einem Kaffeelöffel und mehr, alle Viertel-, halbe oder ganze Stunden, je nach Alter des Kranken und nach der Indication.

Syrupus Scillae compositus. (Fenn. O. Suec. *Sp. Vm.*)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Zingiberis . . . . semunciam.
Herbae sicc. Hyssopi uncias duas.
Aquae Menthae pip. libras duas.
Macera per horas 24 in vase clauso, cola exprimendo et liquori sepositione depurato adde

Sacchari albi . . . libras tres.
Coque parumper. (Fenn. Suec. *Sp.*)

O. loco aquae menthae illam Hyssopi indicat; — *Vm.* Zingiberis partem unam, Scillae duas, Hyssopi quatuor, Aquae viginti, infusionem in balneo aquae et Sacchari partes triginta sex.

B. Auszug durch Wein.

Vinum Scillae s. Scillae maritimae s. scilliticum. (Ams. B*. Ful. Gal. GalM. Ham. LH Li. Lus. Pm RC. Sar. Suec. Wür. *Au. Ca. Fi. Gr. Pie. Sa. T. Vm*)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Vini Malacensis . libram unam.
Macera per horas 12, cola ac filtra. (Gal.)

Lus. Scillae unciam et Vini libras duas; — Pm Squamarum Scillae semunciam, Vini Malacensis uncias octo et infusionem per triduum: — Sar. Scillae semunciam et Vini libras duas; — *Gr.* Radicis libram, Vini albi Gallici vetusti congium, digestionem per dies quatuordecim.

LH. Scillae recens siccatae unciam unam, Vini albi viginti duas, Alcoholis 25° duas et sex dies macerationis; — *T.* Squamarum Scillae unciam unam, Vini albi generosi sedecim, Spiritus Vini 36° tres, macerationem per octo dies.

℞. Scillae concisae drachmam unam.
Cort. Aurant. . . unciam unam.
Vini albi . . . . . libras duas.
Digere per horas 24 et cola. (Ham.)

Fi. Scillae semunciam, Corticis drachmam, Vini albi uncias novem, infusionem frigidam per triduum.

℞. Scillae recentis . drachmas sex.
Cinnamomi . . drachmas tres.
Vini . . . . . sesquilibram.
Infunde frigide per horas 12 et cola. (Wür.)

Vm. Scillae partem unam, Cinnamomi dimidiam, Vini Maderani partes quadraginta octo et octo dies macerationis.

℞. Scillae recentis . . semunciam.
Zingiberis . . drachmam unam.
Alcoholis (0,931) . uncias duas.
Vini albi . . . . . libras duas.
Post tres dies cola. (Ams)

Suec. Scillae unciam, Zingiberis drachmam et Vini albi libras duas; — *Au.* Scillae drachmam unam, Calami duas et Vini libram unam.

℞. Scillae . . . . unciam unam.
Corticis Aurantiorum,
Rad. Calami, sing.
drachmas duas.
Vini albi . . . . sesquilibram.
Post tres dies digestionis adde
Oxymellis scillitici drachmas duas.
Misce bene. (*Ca. Pie.*)

RC. Corticis et Radicis, sing. drachmam, Vini albi libram, Oxymellis scillitici unciam, caeterum ut antea; — *Gr.* Vini albi sesquilibram, Oxymellis Squillae uncias duas, Rad. Squillae unam, Cort Aurant., Calami, sing. drachmas duas, digere per triduum et adde Oxymellis scill. uncias duas. (*Vinum scilliticum compositum.*)

℞. Scillae siccatae,
Bacc. Juniperi, sing drach. unam.
Radicis Calami . drachmas duas.
Vini albi . . . . libram unam.
Post tres dies macerationis cola. (B*. Ful.)

Li. Vini albi unciam, Scillae grana quinque, Bacc. Juniperi scrupulos duos et Calami grana decem.

℞. Scillae . . . drachmam unam.
Baccarum Juniperi unciam unam.
Cardamomi minoris
semidrachmam.
Vini albi . . . . semilibram.
Digere blando calore per tres dies. (B*.)

℞. Scillae,
Cardamomi min., sing. part. unam.
Baccarum Juniperi,
Seminum Dauci, sing. part. duas.
Vini Maderani
partes triginta duas.
Post plures dies frigidae macerationis cola leviter exprimendo et filtra. (*Vm.*)

℞. Tincturae Scillae . grana viginti.
Vini albi . . . . unciam unam.
Misce. (GalM.)

Reizend, zuweilen Ekel, selbst Brechen erregend. — Gabe, zwei oder drei Löffel täglich.

Vinum diureticum. (LH.)

℞. Vini scillitici,
— Digitalis, sing. semunciam.
Acidi nitrici alcoholis.
semidrachmam.

Gabe, auf drei Mal in 24 Stunden, in einem passenden Vehikel.

Vinum diureticum amarum s. amarum scilliticum compositum, Infusum scilliticum vinosum compositum. (Gal. *Ca. Ra. Sa.*)

℞. Scillae . . . . drachmas sex.
Cinnamomi,
Cort. Winteri, sing.
drach. quatuo .
Radicis Inulae drachmam unam.
Vini . . . . . libram unam.

Post sufficientem extractionem cola. (*Sa.*)

℞. Squamarum Scillae,
Rad. Vincetoxici, sing. semunciam.
Corticis Chinae,
— Winteri.
— Citri, sing. . uncias duas.
Stipit. Angelicae Bohem. semunciam.
Fol. Absinthii,
— Melissae, sing. unc. unam.
Baccarum Juniperi,
Macidis, singulorum semunciam.
Vini albi generosi . libras octo.

Digere cortices, radices, scillam et macidem pulveratos et cribratos et baccas integras in vino, leni calore, per dies quatuor, cola deinde, leviter exprimendo et filtra. (Gal.)

℞. Scillae siccatae,
Radicis Vincetoxici,
— Angelicae,
Chinae pulv., sing. unciam unam.
Corticis Citri,
— Winteri, sing. unc. duas.
Baccarum Juniperi,
Macidis, sing. . drachmas duas.
Fol. sicc. Absinthii,
— — Melissae, sing. semidrachmam.
Alcoholis . . . . uncias duas.
Vini albi . . . libras quatuor.

Digere in balneo arenae per horas 24, subinde agitando, cola exprimendo ac filtra. (*Ca.*)

℞. Corticis Winteri,
Chinae,
Cinnamomi, sing. unciam unam.
Radicis Angelicae,
Squamarum Scillae,
Baccarum Juniperi,
Macidis, sing. . . uncias duas.
Fol. sicc. Absinthii,
— — Melissae, sing. manip. duos.
Vini albi . . . . libras duas

Macera per horas 24. (*Ra.*)

Tonisch, in Fällen, wo Reizung des Magens nöthig ist und bei sogenannten passiven Wassersuchten empfohlen. — Gabe, eine bis vier Unzen täglich.

Infusum Kali carbonici cum Scilla vinosum, Vinum Scillae alcalinum. (*Au. T.*)

℞. Kali subcarbonici . semunciam.
Scillae . . . scrupulum unum.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Vini albi . . . . uncias octo.

Infunde per horas 12 et cola. — Gabe, einen oder zwei Löffel alle zwei oder drei Stunden.

T. Zedoariae drachmas duas, Squamarum Scillae, Rhei, Bacc. Juniperi, sing. unam, Cinnamomi tres, Kali subcarbon. sesquidrachmam et Vini albi austeri et vetusti uncias triginta duas.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Scillae s. Scillae maritimae. (An. B*. D. Du. Ed. Gal. GalM. Han. HassP. LH. Lon. LonN. RC. *C. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Squamarum Scillae sicc. part. unam.
Alcoholis (22°) . partes quatuor.

Digere per dies sex et cola. (Gal. GalM.)

LH. Scillae uncias quatuor, Alcoholis 22° libras duas et octo dies digestionis; — B*. Lon. LonN. *Gr. Re.* Scillae uncias (drachmas *Re.*) quatuor, Alcoholis (0,930) octarios duos et quatuordecim dies infusionis; — Du. HassP. Scillae uncias quatuor, Alcoholis (0,930) (Spir. Vini rectificati HassP.) libras duas et octo dies infusionis (tinctura expressa unciarum viginti pondere parsit HassP.); — Ed. Scillae uncias duas, Alcoholis (0,935) sedecim et octo dies infusionis; — *Vm.* Scillae partem unam, et sex Aquae Vitae; — D. Scillae uncias sex et duas libras Aquae Vitae; — Han. Scillae uncias quinque et Aquae Vitae libras duas; — *C.* Scillae uncias quinque et Alcoholis (0,930) octarios duos; — RC. Scillae uncias duas, Alcoholis diluti libram et septem dies digestionis; — *T.* Scillae unciam unam, Alcoholis 26° B. octo, digestionem per 12 vel 15 dies.

℞. Scillae rec. contusae uncias sex.
Alcoholis (36°) . . uncias octo.

Post quatuor dies digestionis cola exprimendo et residuo infunde
Alcoholis (36°) . . uncias duas.

Digere iterum blando calore et cola, colaturas mixtas filtra. (An.)

Reizend, harntreibend, besonders bei Wassersuchten gebraucht. — Gabe, zehen bis zwanzig Tropfen in Emulsion oder in einem schleimigen Wasser.

Mel Scillae. (*Gr.*): Mellis libr. tres, Tinct. Scillae duas.

Mixtura anticatarrhalis. (*Ca.*)

℞. Elixir paregorici uncias quinque.
Tincturae Scillae unciam unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, Morgens und Abends.

Mixtura diuretica. (*E. Va.*)

℞. Tincturae Scillae drachmas duas.
Aetheris nitrici . unciam unam.

Gabe, ein Kaffeelöffel, fünf oder sechs Mal täglich, in Wachholderthee.

Hierher gehört auch die von *Au.* sehr unpassend sogenannte *Tinctura Scillae*:

℞. Scillae . . . . . sesquiunciam.
Aetheris muriatici,
Spir. Juniperi, sing. semilibram.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Destillent librae sex. — Gabe, zehen bis dreißig Tropfen.

Tinctura Scillae aromatica. (Suec.)

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Cinnamomi pulv. drachmas duas.
Alcoholis Aqua diluti semilibram.

Infunde per tres dies ac filtra.

Man könnte statt des Zimmts auch das Gelbe der Pomeranzenschaale nehmen und die Tinctur auch auf der Stelle bereiten, indem man zu der einfachen tinct. Scillae eine größere oder geringere Menge tinct. Cort. Aurant. setzte. Die tinct. Scill. aromat. verdient den Vorzug vor der einfachen, sie schmeckt weniger unangenehm und ist vielleicht auch nicht so reizend.

Tinctura Scillae composita. (*Vm.*)

℞. Aceti scillitici . . . partes tres.
Tinct. Cort. Aurant.
part. unam cum dimidia.
Extracti Trifolii . partem unam.

Post plures dies macerationis cola per pannum.

Tinctura Scillae kalina. (B*. Bor4. Fenn. Fer. Hass. Li. Wir. *Huf. Sw*. Vm*)

℞. Scillae pulveratae,
Kali subcarb., sing. . unc. unam.

Tritura simul in mortario et adde
Alcoholis . . . uncias quatuor.

Post horas sex digestionis cola leviter exprimendo. (Hass.)

B*. Bor4. et *Huf.* Scillae uncias tres (duas Bor4.), Potassae causticae drachmas duas, Alcoholis libram et tres dies digestionis; — Li. Scillae, Kali subcarb., sing. unciam unam et octo Alcoholis.

℞. Scillae siccatae . unciam unam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Solut. Potassae causticae
drachm. unam.
Alcoholis . . . . semilibram.

Digere per tres dies et filtra. (Fenn.)

Vm. Potassae causticae partem unam, Cinnamomi duas, Scillae octo et Aquae Vitae quadraginta octo.

℞. Kali subcarbonici . semunciam.
Aceti scillitici uncias duodecim.

Evaporent leni igne ad mellis consistentiam, tum residuum digere cum
Alcoholis . . . . . uncias sex.

Post aliquot dies filtra. (Wir.)

Sw.* Aceti scillitici uncias octodecim et duodecim Alcoholis.

℞. Scillae,
Acetat. Potassae, sing. unc. unam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.

Post tres dies filtra. (Fer.)

Reizend, eins der wirksamsten auflösenden und harntreibenden Mittel; bei Wassersuchten und Asthma empfohlen. — Man fängt mit dreißig Tropfen an und steigt alle zwei oder drei Stunden um fünf, bis der Kranke hundert und mehr nimmt.

Potio diuretica. (*E.*)

℞. Subcarbonat. Potassae
drachm. unam.
Succi Citri . . quantum sufficit ad dissolutionem; adde
Tincturae Scillae . semunciam.
— Opii . . . guttas triginta.
Aquae Cinnamomi uncias quatuor.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Löffel.

Elixir pectorale Wedelii. (B*. Br. Li. Wir. *Ca. Huf. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae, sing. unciam unam.
— Liquiritiae . . semunciam.
Ligni Santali rubri unciam unam.
Herbae Roris Solis sesquiunciam.
Seminum Anisi . . semunciam.
Benzoës . . . . drachmas sex.
Myrrhae . . . . . semunciam.
G. Ammoniaci . drachmas duas.
Croci . . . . . drachmas tres.
Aquae Vitae . . . libras duas.

Digere seorsim gummi ammoniacum, myrrham et benzoën et post sufficientem extractionem tincturam cum ea reliquarum substantiarum commisce. (Br. Wir.)

B*. Rorellam omittit; — *Sp.* addit Radicis Althaeae unciam unam et Benzoës concisae drachmas quatuor.

℞. Radicis Scillae,
— Iridis Florentinae,
— Inulae, sing. unciam unam.
Benzoës,
Myrrhae,
Anisi,
Succi Liquiritiae,
G. Ammoniaci, sing. semunciam.
Croci . . . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . . libram unam.

Post sufficientem digestionem cola. (*Huf.*)

℞. Scillae,
Rad. Inulae,
— Iridis Flor., sing.
unc. tres et drach. unam.
Benzoës . . . drachmas duas.

Liquiritiae,
Anisi,
Myrrhae, sing. drachm. unam et grana octodecim.
G. Ammoniaci . scrupulos duos.
Croci . . . grana septemdecim.
Aquae Vitae (12°)
libram et unc. sex.
Macera per dies 14, subinde agitando et filtra. (*Elix. pectorale Anglicum. Ca.*)

℞. Croci concisi . scrupulos duos.
Aquae Vitae uncias triginta duas.
Infunde per dies duos et adde
Radicis Liquiritiae,
Seminum Anisi, sing. semunciam.
Rad. Inulae,
— Iridis Flor., sing. unc. unam.
G. Ammoniaci . drachmas duas.
Myrrhae . . . . semunciam.
Infunde iterum per dies duos et adde
Scillae . . . . unciam unam.
Benzoës . . . . drachmas tres.
Digere per aliquot tempus et filtra. (*Vm.*)

℞. Radicis Inulae,
— Iridis Florentinae,
— Scillae, sing. . semunciam.
— Liquiritiae,
Seminum Anisi,
Flor Rhoeados, sing. drach. duas.
Alcoholis . uncias quatuordecim.
Digere blando calore per dies quatuor. Praeterea digere in Alcoholis unciis tribus per eundem temporis decursum
G. Ammoniaci drachmam unam.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Benzoës . . . . drachmas tres.
Cola leviter exprimendo et colaturam utramque commisce. (Li.)

Reizend, bei Asthma, Catarrhen, Husten und Heiserkeit empfohlen. — Gabe, vierzig bis sechzig Tropfen.

D. Auszug durch Weinessig.

Acetum Scillae s. Scillae maritimae s. scilliticum, Acidum aceticum scilliticum s. cum Scilla maritima (A. Am. Ams An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Scillae praep. et minutim concis. partem unam.
Aceti boni . . partes duodecim.
Digere blando calore per dies septem, cola fortiter exprimendo et filtra. (Bor. BorC. D. Han. O. Sax. Suec. *Br. Sp.*)

Pm. Easdem quantitates sed digestionem per dies quindecim; — Br. Scillae partem unam cum dimidia, Aceti duodecim, et horas 48 infusionis; — Pal. Scillae unam, Aceti novem et dies 40 infusionis; — DD. Sar. et Wir. Scillae unam, Aceti octo et dies 14 infusionis; — A. Hass. Li. R. *Gr.* et *Pid.* Scillae unam, Aceti sex et tres tres dies (per mensem *Gr.* sec. Lon. ante 1745.) digestionis; — Bor4. Scillae siccatae uncias duas, Aceti destillati q. s. ut post macerationem per triduum colatura post lenem expressionem sit unciarum octodecim.

℞. Scillae concisae . partem unam.
Aceti albi ferv. . partes undecim.
Acidi acetici . . partem unam.
Macera per dies octo, cola exprimendo et post tempus aliquot decantha. Fenn.)

GalM. Scillae partes octo, Aceti rubri nonaginta duas, Acidi acetici (10°) unam et quatuordecim dies infusionis.

℞. Scillae concisae . . uncias duas.
Aceti . . . . uncias duodecim.
Digere blando calore, per dies octo, in vase tecto, cola exprimendo et colaturae adde
Alcoholis . . . unciam unam.
Sepone, decantha et serva. (B. Ba. Bel.)

HassP. Scillae sicc. et concis. uncias duas, Aceti Vini libras duas, octo dierum macerationem, Spiritus rectificatis . sesquiunciam; — Ams. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, 24 horas macerationis blando calore et ad colaturam partem duodecimam Alcoholis (0,907); — Wür. Scillae semilibram, Aceti libras quatuor, quatuor dies digestionis leni calore et tres uncias Alcoholis; — RC. Scillae sicc. et contus. drachmas duas, Aceti libras duas cum dimidia, macerationem per quatriduum et Alcoholis uncias tres; — LH. Lus. Scillae libram unam, Aceti sex, sex dies macerationis, levem ebullitionem et Alcoholis semilibram (uncias octo 25° LH.); — His. His3. Scillae libram unam, Aceti sex, 24 horas digestionis blando calore et tres uncias Alcoholis; — Gal. Scillae sicc. semilibram, Aceti rubri libras sex, Alcoholis (22°) unciam et quatuordecim dies macerationis; — Pol. Scillae unciam, Aceti libram et Alcoholis sesquiunciam; — *Sw.* Scillae libram unam, Aceti octo, duos vel tres dies digestionis blando calore et Aquae Vitae uncias octo; — *Vm.* Scillae partem unam, quatuor

Aceti et Aquae Vitae duas; vel: Scillae unam, Aceti duodecim, unam Aquae Vitae et octo dies frigidae macerationis; — Am. Du. et *C.* Scillae semilibram, Aceti Vini octarios tres et Alcoholis (0,840) uncias quatuor; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Scillae libram unam, Acidi acetici octarios (libras) sex, macerationem per horas 24 et Alcoholis (0,930) semioctarium; — Ed. Scillae unciam unam, Aceti quindecim et Alcoholis (0,835) sesquiunciam; — *Gr.* Scillae uncias duas, Aceti destill. vel comm. libras duas cum dimidia, Spir. Vin. rect. uncias tres; — Gen. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Aquae Vitae uncias tres; — Ful. Scillae uncias quatuor, Aceti libras quatuor et Aquae Vitae uncias duas; — LP. Scillae uncias quatuor, Aceti libras duas, Alcoholis uncias duas, macerationem per dies sex; — Fer. Scillae libram unam, Aceti sex et Alcoholis uncias tres; — *Fi.* Scillae uncias sex, Aceti fortis libras quatuor, Alcoholis 24° uncias duas; — *T.* Squamarum inter. sicc. uncias duodecim, Aceti comm. libras octo, Spiritus Vini 34° B. uncias quatuor, et Aceti radicalis pondus aequale, expone soli vel balnei vaporis calori in vase clauso per dies 14 et filtra.

℞. Rad. Scillae rec libram unam.
Aceti gelu concentr. sesquilibram.
Digere per septimanam in vase tecto, saepius agitando, cola cum expressione et residuo infunde
Aceti gelu concentrati semilibram.
Exprime, sepone colaturas ambas comm xtas, filtra et adde
Alcoholis (38°) . . uncias duas.
Misce bene. (An.)

Reizend, besonders bei chronischen sogenannten schleimigen Lungenübeln und bei Wassersuchten angewendet. Man benutzt diesen Essig auch in Gurgelwasser, bei Entzündung der Mandeln und in gewissen Fällen von beschwerlichem Schlingen. — Gabe, von fünf Tropfen bis zu einer Drachme, täglich zwei Mal, in irgend einem aromatischen Wasser oder in einer Emulsion mit Ammoniakgummi.

Syrupus Scillae maritimae s. Scillae acetosus, Oxysaccharum scilliticum. (Am. B*. Br. Ed. Han. Lon. RC. Wir. Wür. WW. *Br. C. Gr. Re. Sw.*)

℞. Aceti scillitici . . libras duas.
Sacchari contusi . . libras tres
Dissolve blandi caloris ope. (B* Lon.).
Am Ed. *C Gr. Re.* Aceti partes quatuor et septem Sacchari; — Wür. Aceti unam cum dimidia, Sacchari tres cum dimidia; — RC. *Br.* Aceti duas et Sacchari tres cum dimidia.

℞. Aceti scillitici . . sesquilibram.
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . unciam unam.
Digere per tres dies, cola et adde
Sacchari albi . uncias triginta.
Ebulliant semel et colentur. (Br. Han. Wir.)

℞. Aceti scillitici . . semilibram.
Syrupi Cinnamomi,
— Zingiberis, sing. libr. unam.
Misce. (*Sw.*)

Potio expectorans. (*E.*).

℞. Syrupi Scillae . . semunciam.
Tinct Opii camph. drach. duas.
Vini stibiati . drachmam unam.
Gummi Arabici semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel alle Stunden oder zwei Stunden. — Dieser Trank ist besonders für Kinder.

Mel Scillae acetatum, Oxymel s. Oxymellitum Scillae s. scilliticum, Mel Aceti scillitici s. Scillae s. Scillae maritimae. (A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T.*)

℞. Aceti scillitici . partem unam.
Mellis albi . . . partes duas.
Coque ad consistentiam syrupi. (A. An B. Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. His. His3. LH. Li. O. Pol. R. RC. Sar. Sax. Suec. Wir. *Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T.*)

LP. Lus. et Pal. Aceti partes duas et Mellis tres; — Am. Du. Lon LonN. *C. Gr. Re.* Aceti octarios duos et Mellis libras tres; — Pm. Syrupi Mellis libras tres, Aceti scill. sesquilibram, balnei maris ope in syrupum redige; — Ams. et *Vn.* Aceti partem unam et tres Mellis; — DD. Aceti et Mellis part. aeq.; — D. Mellis despum. uncias triginta ad sex vel octo consumptas et Aceti duodecim; — Gen. HassP. Aceti partem unam et quatuor Mellis (HassP. Acetum adhibitum e Squamarum Scillae siccat. unciis quatuor cum dimidia et Aceti Vini libris duabus tepida per dies sex in vitro clauso maceratione, colando filtrandoque paratur).

Im Journal de pharmacie findet sich von einem Unbekannten folgende Formel:

℞. Scillae sicc. libr. unam et unc. duas.
Aceti rubri . . . . libras sex
Alcoholis (36°) . . uncias duas.
Macera per mensem, cola ac filtra; tunc balnei aquae ope in hujus aceti scillitici libra una et uncia una solve Mellis albi libras quatuor.
Löffelweiſe, aber häufiger in Potionen zu einer bis vier Drachmen.

Looch pectorale, Linctus expectorans, oleosus. (*Li. Fi. Gr. Pie. Sw.*)

℞. Oxymellis scill. semunciam ad unciam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Misce. (*Sp.*)
℞. Oxymellis scillitici,
Syrupi Althaeae,
Mucilag G. Arab., sing. p. aeq.
Misce. (*Li.*)
℞. Olei Olivarum,
Oxymellis scillitici,
Syrupi Papaveris, sing. unc. unam.
Misce. — 1 Drachme bisweilen.
℞. Oxymellis scillitici semunciam.
Syrupi balsamici unciam unam.
Olei Amygdal. dulc. sesquiunciam.
Misce. (*Sw.*)
℞. Mellis optimi . . . uncias sex.
Syrupi Polygalae Virginicae,
— scillit., sing. unciam unam
Florum Sulphuris,
Acidi benzoici, sing. scrup. unum.
Ipecacuanhae pulveratae grana sex.
Misce sedulo. (*Fi.*)
Kaffeelöffelweiſe.

Gargarisma e Scilla s. scilliticum. (*Sw. Va.*)

℞. Oxymellis scillitici unciam unam.
Aquae Cinnamomi uncias decem.

Potio ad catharrhum s. anticatarrhalis. (*Sm.*)

℞. Rad. Zedoariae . drach. unam.
Camphorosmae pugillum unum.
Aquae . . . . . uncias octo.
Decoque ad unc. quinque remanentiam et colaturae refrigeratae adde
Salis Ammoniaci . . grana sex.
Spiritus Nitri dulcis guttas sex.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Auf vier Mal, alle zwei Stunden, zu nehmen.

Potio scillitica s. scillitica acidula s. acidulata s. diuretica. (Gal. GalM. *B. Ca. Ra. Re. Sa. Va.*)

℞. Oxymellis scillitici semunciam.
Aquae Menthae . unciam unam.
— trium Nucum unc. quatuor.
Misce. (*Ca.*)

℞. Oxymellis seillitici semunciam.
Aquae Parietariae uncias quatuor.
— Menthae pip. unciam unam.
Spir. Nitri dulcis semidrachmam.
Misce. (Gal. *Re.*)

℞. Oxymellis scillitici . semunciam.
Infusi Hyssopi . uncias quatuor.
Spir. Nitri dulc. semidrachmam.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Spir. Lavandulae . drach. unam.
Subcarb. Potassae grana decem.
Misce sedulo. (*Ca.*)

℞. Dec. Quinque Radic. uncias tres.
Aquae Flor. Aurant. semunciam.
Oxymellis scillitici drachmas duas.
Syrupi Sacchari unciam unam.
Laudani liquidi,
Tincturae Castorei,
— Moschi, sing. . guttas sex.
Spiritus Nitri dulcis,
Aetheris sulph., sing. guttas decem.
Misce. (*Ra. Va.*)

℞. Baccarum Juniperi semunciam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut octo unciae infusi obtineantur. Colaturae adde
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Oxymellis scillitici semunciam.

℞. Baccarum Juniperi unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ad infusi uncias sex; colaturae adde
Acetatis Potassae drachmas duas.
Spiritus Fuliginis guttas triginta.
Liquor. Cornu Cervi succ. drach. duas.
Oxymellis scillitici drachm. unam.
Misce. (*B.*)
℞. Emuls. Amygd. . . libr. unam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (*B.*)
℞. Decocti Graminis . libras duas.
Liquoris Hoffmanni guttas viginti.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (*B.*)
Eßlöffelweiſe.

Brodium diureticum. (*Pie.*)

℞. Radicis Taraxaci unciam unam.
— Liquiritiae . semunciam.
Millepedes . . . . . no 30.
Fol. Taraxaci manip. dimidium.
— Polygalae,
Camphorosmae, sing. pugill. unum.
Oxymellis scillitici semunciam.
Kermetis mineralis granum unum.

Mixtura pectoralis s. expectorans s. Boerhavii. (LH. *B. Ca. Sa. Va.*)

℞. Oxymellis scillitici,
Spir. Piper. Jamaic., sing. unc. unam.

Aquae Menthae . uncias duas.
Misce. (*Sa.*)

℞. Decocti Hordei . . semilibram.
Aquae Hyssopi uncias quatuor.
Oxymellis scillitici . uncias tres.
Aceti scillitici . . drachmas sex.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Misce bene. (*Ca. Va.*)

LH. Hyssopi drachmam coquere cum Aquae ferv. unciis tribus et refrigerato addere Oxymellis scill. unciam, Vini Antimonii semidrachmam. (Gabe, drei Löffel in 24 Stunden und mehr.)

℞. G. Ammoniaci drachmam unam.
Aceti scillitici . . . uncias sex.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (*Ca.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde
Lactis ammoniac. drach. unam.
Camphorae . . semidrachmam.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (*B.*)

Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.

Julep s. Julapium scilliticum. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Specierum bechicarum,
Gummi Arab., sing. grana viginti.
Syrupi Sacchari,
Oxymellis scill., sing. unc. unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Va. Oxymellis scill. drachmam.

Potio incisiva s. gummosa scillitica. (GalM. *E. Ra.*)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Oxymellis scillitici . semunciam.
Misce. (*Ra.*)

℞. G. Ammoniaci pulv. part. dimid.
Tere sensim addendo
Aceti scillitici . partes triginta.
Infusi Hyssopi . partes centum.
Misce bene. (GalM.)

℞. G. Ammoniaci drachmam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Oxymellis scillitici uncias duas.
Tinct. Opii camph. semunciam.
Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden. (*E.*)

Syrupus pectoralis. (*Ca.*)

℞. Oxymellis scillitici sesquiunciam.
Syrupi Ipecacuanhae,
— Diacodion, sing. unc. duas.
— Flor. Aurantior. semunciam.
Misce. — Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel in einer Tasse Brustthee. — Gegen Keuchhusten.

E. Auszug durch Oel.

Oleum Bryoniae Radicis compositum s. Agrippae. (His His3.)

℞. Rad. rec. Bryoniae,
— — Cucum. asin., sing. libram.
— — Scillae,
— — Iridis Germanicae,
— — Ebuli, sing. semilibram.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Coque lente ad consumptionem humidi et cola.

Unguentum Bryoniae s. (*Bryoniae*) *Agrippae.* (His. His3. Sar. Wir.)

℞. Succi Bryoniae . . libras tres.
— Elaterii . . libras duas.
Scillae,
Rad. Iridis Germanicae,
— Filicis maris, sing. unc. sex.
Macera per horas 12, tunc coque, cola exprimendo, et ad extracti consist. evaporatis adde
Cerae albae . uncias quindecim.
Olei Mucilaginis libras quatuor.
Misce bene. (Sar.)

℞. Rad. Bryoniae . . libras duas.
— Cucum. asin. libram unam.
— Ebuli,
— Filicis,
— Iridis Germ., sing. unc. tres.
Scillae . . . . . semilibram.
Tribulorum aquatic. uncias duas.
Olei Olivarum . . . libras sex.
Post dies octo macerationis coque, exprime et adde
Cerae flavae . . libram unam.
Liqua in balneo aquae. (Wir.)

℞. Olei Bryoniae comp. libr. quatuor.
Cerae albae . . . libram unam.
Liqua lente. (His. His3.)

Ein nicht sehr starkes Reizmittel, jedoch, wie man glaubt, nicht ganz unwirksam; auflösend, schmelzend, gegen Wassersucht.

Scolopendrium.

Scolopendrium officinale s. officinarum, Sm., Asplenium Scolopendrium; Hirschzunge; Scolopendre, Langue de cerf, Langue de boeuf (*Gal.*); Hierstongue (*Ang.*); Gelenj gazyk, Psany trank, Cetarak (*B.*); Hiortetongue (*D.*); Lengua de ciervo (*His.*); Hertstong (*Bel.*); Lingua di cervo (*I.*); Jaleni szczaw (*Pol.*); Lingua cervina (*Lus.*); Hiorttunga (*Suec.*)

Br. Fer. Gal. GalM. Gen His. His3. Wir. Wür. *Be. Br. Gr. M. Re. Sp.* Z.

4 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Südeuropäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 47.)

Man wendet das Kraut (herba Scolopendrii s. Linguae cervinae s. Phyllitidis s. Lonchitidis, Asplenium Scolopendrium, Blechnum lignifolium) an; es besteht aus langen, am untern Theile herzförmigen Blättern mit behaarten Stielen. Es hat einen adstringirenden Geschmack.

Scorzonera.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Scorzonera humilis, L.*; Waldscorzonere, Nattermilch; Scorzonère d'Allemagne ou de Bohème (*Gal.*).

Ams. Bor. Br Fer. Ful. Gal. Han. Li. O. Wir. Wür. *Fi. M.*

♃ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine im nördlichen Europa wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. VI. t. 36.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae latifoliae sinuatae s. Serpentariae) an; sie ist geringelt, dick, holzig, außen schwarz, inwendig weiß, und enthält, im frischen Zustande, einen Milchsaft. Sie hat einen etwas bittern und herben Geschmack

2) *Scorzonera Hispanica, L.*; Gartenscorzonere, Schlangengras, Schwarzwurz, Nattergras; Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir (*Gal.*); Garden scorzonera (*Ang.*); Hadj mordowy koren (*B.*); Skorzonera (*D.*); Escorzonera (*His.*); Spaansche Skorzonera (*Bel.*); Scorzonera (*I.*); Escorzoneira (*Lus.*); Skorzonera (*Suec.*).

Bor. Fer. Gal. Han. His. His3. O. Sax. *Be. Br. Fi. Gr. Re. Sp.* Z.

♃ Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's, welche in Küchengärten gezogen wird. (*Blackw.* t. 406. *Plenck* t. 592. Düss. off. Pfl. I. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 405.)

Man wendet die Wurzel (radix Scorzonerae s. Viperinae) an; sie ist lang, fingerdick, außen schwarz, inwendig weiß, mit ringförmigen Runzeln besetzt, und mit einem Milchsaft angefüllt, welcher ausfließt, wenn man in sie einschneidet. Man verkauft sie, abgeschabt und getrocknet, in länglichen, bräunlichrothgelben Stücken. Sie hat keinen Geruch; der Geschmack ist im frischen Zustande süßlich, bitter und mehlig, getrocknet bloß schleimig.

Reizend, harntreibend.

Gr. führt noch *Scorzonera subcaerulea, purpurea* an.

Extractum Scorzonerae. (Br.)

℞. Radicis Scorzonerae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Macera per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam consume.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum, Bezoardicum Curbi incompletum. (His. His3.)

℞. Radicis Scorzonerae unciam unam.
Semin. Citri contus. drach. duas.
Aquae communis . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam, cola et adde
Pulv. bezoard. Chinae semunciam.
Mellis Sambuci . . uncias tres.
Gabe, vier Unzen.

Decoctum Scorzonerae bezoardicum solutivum, Bezoardicum completum s. purgans Curbi. (His. His3.)

℞. Dec. Scorzoner. bezoard. libr. quatuor.
Fol. Sennae mundat. semunciam.
Coque lente, cola et adde
Syrupi Rosarum solutivi uncias sex.
Pulv. bezoard. Chinae semunciam.
Purgirend. — Gabe, vier Unzen.

Scrophularia.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Scrophularia aquatica, L.*; Wasserbraunwurz Wasserkropfwurz; Scrofulaire aquatique (*Gal.*); Water figwort (*Ang.*); Escrofularia acquatica (*His.*); Water speenkruid (*Bel.*); Scrofularia acquatica (*I.*); Escrofularia dos rios (*Lus.*).

Gal. Gen. His. His3. Wir. *Gr. M.*

♂ (Didynamia Angiospermia, L.; Scrophulariae. .) Eine Pflanze, welche in ganz Europa an dem Ufer von Bächen wächst. (*Blackw.* t. 86. *Hayne* V. 36. Fl. méd. VI. 321.)

Man wendet das Kraut (herba Scrophulariae aquaticae s. Betonicae aquaticae s. Ficariae s. Castrangulae) an; es besteht aus einem glatten, vierseitigen, ästigen Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirunden, fast herzförmigen, gekerbten, grünen, glatten Blättern und hat einen unangenehmen und widerlichen Geruch und einen bittern, etwas scharfen, ekelhaften Geschmack.

2) *Scrophularia nodosa, L.*; knotige, gemeine Braunwurz, Feigwarzenwurz, Knollenwurz; Scrofulaire noueuse (*Gal.*); Knotty rooted figwort (*Ang.*); Swinsky neb Kyticnjkowy koren, Rozchodnjk, Aneb prutrznik (*B.*); Millemorbia, Ferraria, Castrangola (*I.*); Fredewnik (*Pol.*)

Br. Du. Fer. Gen. His. His3. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. Gr. M. Re. Sp.* Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.: Scrophulariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 37. *Plenck* t. 504. *Hayne* V. t. 35. *Zorn* Ic. pl. t. 28.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Scrophulariae s. Scrophulariae foetidae s. vulgaris) ist dick, weiß, knotig, von unangenehmem Geruch und bitterm, etwas scharfem Geschmack, welcher durch Trocknen sich etwas verliert. — Das Kraut (herba Scrophulariae nodosae) besteht aus einem knotigen Stängel mit ganzen, eirunden, dreilappigen Blättern. Es hat keinen Geruch und einen bittern, ekelhaften Geschmack.

Oleum Scrophulariae. (*Vm.*)

℞. Herb. et Rad. Scrophulariae rec. partes tres.
Olei Olivarum . . partem unam.
Infunde et cola exprimendo.

Secale.

Secale cereale, *L.*; Roggen; Seigle commun (*Gal.*); Rye (*Ang.*); Rug (*D.*); Centeno (*His.*); Rog (*Bel.*); Segale (*I.*); Rez (*Pol.*); Sontejo (*Lus.*); Raeg (*Suec.*).

Ba. BorC. Bor4. Fer. Gal. Gen. His. His3. RC. Suec. Wür. *Be. Br. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

☉ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine Pflanze, welche ursprünglich in Creta und an den Ufern des Caspischen Meeres einheimisch seyn soll. (*Plenck* t. 46. *Lam* Ill. t. 49. *Blackw.* Herb. t. 424. *Bert.* Bild. II 15. f 2.)

Man wendet den Saamen (semen Secalis s. Frumentum) an; er ist länglich, walzig, etwas spitzig und röthlich und wird besonders als Mehl (Farina Secalis) benutzt.

Farinae resolventes. (*Sp.*)

℞. Farinae secalitiae,
— triticeae,
— Hordei,
— Fabarum,
singularum partes aequales.
Misce exacte.

Pulvis absorbens pro usu externo. (*B.*)

℞. Farinae Secalis . uncias quatuor.
— Lupini . . . uncias octo
Bei Rothlauf, Morgens und Abends die ergriffenen Theile damit zu bedecken.

An den Aehren einiger Getraidearten, besonders aber des Roggens, entwickelt sich eine Art Horn oder Sporn, welcher unter dem Namen

Secale cornutum; Mutterkorn; Ergot (*Gal.*); Spurred, horned rye (*Ang.*).

Am. Bor4. HassP. *C. Gr. Re. Va.* bekannt ist. Es ist gewöhnlich krumm und langgestreckt, selten rundlich, zeigt meist drei stumpfe Ecken und Längsrunzeln und hat eine violette Farbe mit verschiedenen Schattirungen. Die innere Substanz ist schmutzigweiß und fest, zerbricht glatt und mit Geräusch; der Geruch ist, wenn das Mutterkorn frisch und in großer Menge vorhanden ist, unangenehm, der Geschmack etwas beißend und widerlich. Es wird bis einen und anderthalb Zoll lang und zwei bis drei Linien dick.

Nach Decandolle ist es eine Art Schwamm, Sclerotium Clavus (Mém. du Mus. 1816 t. XIV. fig. 8.), nach Andern, und mit größerer Wahrscheinlichkeit, eine bloße krankhafte Ausartung des Ovariums der damit behafteten Grasarten, welche, nach Martin Field, durch den Stich einer Fliege verursacht wird, die darin eine schwärzliche Flüssigkeit zurückläßt, aber ihre Eier nicht in die Stichwunde legt. Dr. Winkler (Geiger's Mag. 1826 Nov.) nimmt ebenfalls eine thierische Excretion, z. B. Honigthau, als Ursache an.

Es enthält, nach Vauquelin, einen gelbfärbenden, einen andern violetten Stoff, ein weißes Oel, eine freie Säure, welche Phosphorsäure zu seyn scheint, freies Ammoniak und einen stickstoffhaltigen Stoff.

Ein Reizmittel, dessen Mißbrauch schwere Zufälle, Starrkrampf, Brand der Glieder und den Tod hervorbringt. In kleinen Gaben scheint es Zusammenziehung des Uterus zu bewirken. Auch hat man es bei schweren Niederkünften in Folge der Unthätigkeit dieses Organs, oder bei Mutterblutflüssen von Mangel an Ton desselben empfohlen. Nach Hall (vergl. v Froriep's Notiz. d. Nat. u. Heilk. Nr. 322.) wirkt es durch Einsaugung in die Blutmasse und Langsamermachen der Circulation, wodurch das Blut unfähig wird, den Uterus und Fötus länger zu erhalten. — Gabe, zehen bis dreißig Gran in sechs Unzen Vehikel.

Infusum Secalis cornuti. (B*.)

℞. Secalis cornuti . semidrachmam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. — Gabe, den dritten Theil, und nöthigen Falls nach vier und zwanzig Stunden diese Gabe zu wiederholen.

Decoctum Secalis cornuti. (B*. *Au. Va.*)

℞. Secalis cornuti . unciam unam.
Aquae fontanae . sesquioctarium.
Decoque ad octarii unius remanentiam.
Va. Aquae libras duas cum dimi-

diam ad unam decoquere. — Von mehreren Practikern dem Aufguß vorgezogen. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstunden.

Potio partum accelerans s. ocytica. (*Pie. Va.*)

℞. Secalis cornuti pulv. drach. unam.
Syrupi Sacchari . . uncias tres.
Laudani Liquidi . guttas viginti.
Essentiae Bergamottae . . q. s.

S e d u m.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Sedum acre, L.*; Katzentäublein, Mauerpfeffer, kleines Hauslauch; Vermiculaire brûlante, Poivre de muraille (*Gal.*); Wallpeper (*Ang.*); Netresk, Tueny muzjk neymensjj (*B.*); Hellekuop (*D.*); Siempreviva menor, Uvas de gato (*His.*); Sherp huislock (*Bel.*); Sedo acre o minore, Vermicolaria, Erba pignuola (*I.*); Vermicularia (*Lus.*); Motodile (*R.*); Fetknoppar, Haellegraes (*Suec.*)

Ams. An B. Ba. Bel. Br. Fer. Gal. Gen. His. His3. Sax. Suec. Wir. *Be. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.* Z.

♃ (Decandria Pentagynia, L.; Crassuleae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. IV. 209.)

Das Kraut (herba Sedi minoris s. minimi s. Illecebrae s. Illecebri vermicularis) besteht aus einem glatten Stängel mit zerstreuten, eirunden, fast dreieckigen, kurzen, saftigen, hellgrünen, nahe aneinander stehenden Blättern, hat keinen Geruch, aber einen scharfen, beißenden, pfefferartigen Geschmack, welcher sich bei'm Trocknen verliert.

Innerlich reizend, Brechen und Purgiren erregend, äußerlich hautröthend.

2) *Sedum Rhodiola, L.*: Rosenwurzel, Rhodiserwurzel; Orpin rose (*Gal.*); Rosewort (*Ang.*); Rosenrod (*D.*); Roozenwortel (*Bel.*); Rodiola (*I.*); Rosenrot (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Dioecia Octandria, L.; Crassuleae, J) Eine auf hohen Gebirgen Europa's wachsende Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 180)

Man wendet die Wurzel (radix Rhodiolae s. Rhodiolae roseae s. Rhodiae s. Rosariae) an; sie ist ästig, weiß, fleischig und knollig, besonders am obern Theil. Sie hat einen sehr angenehmen Rosengeruch und einen etwas scharfen, styptischen Geschmack.

Schwach adstringirend.

3) *Sempervivum tectorum, L.*; großer Hauslauch, Hauswurzkraut; Joubarbe des toits, grande Joubarbe (*Gal.*); Great common houseleek (*Ang.*); Netresk, Tueny muzjk wettsj (*B.*); Huuslaeg (*D.*) Siempreviva de tejados (*His.*); Donderbaard, Huuslook (*Bel.*); Sempervivo, Orchiella, Barba di Giove (*I.*); Hazi zoeld (*M.*); Rozhednik wielki (*Pol.*); Sempreviva (*Lus.*); Tschesnok dikoi (*R.*); Huuslaek (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. His. His3. Li. O. R. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ (Dodecandria Dodecagynia, L., Crassuleae, J.) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Fl méd. IV. 208.)

Man wendet das Kraut (herba Sempervivi s. Sedi majoris) an; es besteht aus einer Rose zarter, fleischiger, eirunder, spitziger, grüner, auf beiden Seiten glatter, an den Rändern behaarter Blätter. Der Geruch ist kaum merklich, der Geschmack wässerig, kühlend, herb, styptisch, wie salzig.

Gabe des Safts, zwei Unzen. — Aeußerlich zum Pflaster. (*Fi.*)

Gr. führt außer diesen noch *Sedum anacampseros, cepaea*, kühlend, adstringirend und harntreibend, und *S. minus, album* an.

Cerevisia antiscorbutica. (B*.)

℞. Sedi acris . . manipulos octo.
Cerevisiae . . . . libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe, Morgens nüchtern drei bis vier Unzen.

Syrupus Sedi majoris s. Sempervivi. (Wir.)

℞. Succi Sempervivi decoctione ad dimidium redacti uncias decem.
Sacchari albi . . uncias sedecim.
Ebulliant semel et colentur. — Kühlend, beruhigend.

Unguentum leniens, Pomatum sedans. (*Ca. Sm.*)

℞. Succi Sedi majoris,
Olei Olivarum, sing. . part. aeq.
Subige. (*Sm.*)

Ca. Succi, Axungiae, sing. uncias tres et Olei Amygdalarum dulc. quatuor

Vortrefflich bei Hautreizung und, wie man behauptet, auch zur Stillung von mit Krebsschäden verbundenen Schmerzen.

Oleum Rhodiolae roseae a *Gr.* indicatur.

Aqua Rhodiae Radicis (*Gr.*) statt des Rosenwassers verkauft.

Selinum.

In den Pharmacopöen sind angezeigt.

1) *Selinum Cervaria, Ro*; Hirschwurz, Hirschheil, Hirschpetersilie, Bergpetersilie; Carotte de montagne, Persil de montagne (*Gal.*); Broad leaved spignel (*Ang.*); Gekruiste beerwortel (*Bel.*).

Wir. *Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine Pflanze, welche auf den Gebirgen Europa's wächst. (*Jacq.* Aust. I. t. 69.)

Man wendet die Wurzel (radix Cervariae nigrae s. Gentianae nigrae) an; sie ist lang, dick, geringelt, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen angenehmen und starken Geruch und einen gewürzhaften, beißenden Geschmack.

2) *Selinum palustre*, L.; Sumpfälsenich, Milchpeterling, Sumpfpetersilie; Persil des marais (*Gal.*); Marsh selinum (*Ang.*); Wandmerke (*D.*); Apio lechal (*His.*); Wilde eppe (*Bel.*); Finsk ingfaera (*Suec.*).

Br. Wir *Sp.*

♂ oder ♃ Eine in Europa an sumpfigen Orten häufige Pflanze. (*Jacq.* Austr. II. t. 152.)

Man wendet die Wurzel (radix Tyllelini s. Olsnitii) an; sie ist spindelförmig ästig, außen gelblich oder schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen starken, gewürzhaften und unangenehmen Geruch und einen starken, etwas bittern und brennenden Geschmack.

3) *Selinum Oreoselinum, Ro.*; Bergpetersilie, Grundheil: Selin de montagne, Persil de montagne (*Gal.*); Divariated spignel (*Ang.*); Vilde quale rodder (*D.*); Apio de montana (*His.*); Bergselie (*Bel.*); Apio de montagna (*I.*); Oposch gorny, Pietruszka gorna (*Pol.*) Apio di montanna (*Lus.*); Vild morat (*Suec.*).

Bor. Br. Gal. Han. Pol. Sax. Wir. *M. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Hayne* VII. t. 8. *Zorn* Ic. pl. t 400.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Oreoselini s. Apii montani) ist fingerdick, sehr lang, faserig, mit einer schwärzlichen Oberhaut bedeckt, unter derselben weiß und in der Mitte gelblich. Sie hat einen angenehmen, gewürzhaften Geruch und einen gewürzhaften, bitterlichen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem runden, schwach gestreiften, glatten, röthlichbraunen Stängel mit dreifach gefiederten, hellgrünen, glatten, aus lanzettigen Blättchen bestehenden Blättern. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und gewürzhaft. — Der Saame ist eirund, platt, auf einer Seite glatt, auf der andern gefurcht, roth und mit einem weißen Rande umgeben Er hat einen starken Geruch und einen bittern Geschmack.

Reizend, harntreibend, nervenstärkend.

Gr. führt noch *Selinum carvifolia* und *sylvestre* an.

Tinctura Oreoselini. (*Sw**)

℞. Florum recentium Oreoselini uncias duas.
Seminum Selini . unciam unam.
Aquae Vitae uncias quatuordecim.
Post aliquot dies infusionis cola.

Reizend, blähungtreibend; in Fällen empfohlen, wo es passend ist, besonders den Magen zu reizen. — Gabe, eine Unze zweimal täglich, nach der Mahlzeit.

Senecio.

Von den Arten dieser Pflanzengattung werden in den Pharmacopöen angeführt:

1) *Senecio vulgaris*, L.; gemeines Kreuzkraut; Seneçon ordinaire (*Gal.*); Common grundsel (*Ang.*); Knaurt (*D.*); Hierba cana (*His.*); Gemeen kruiskruid (*Bel.*); Senecione (*I.*); Przymiotowe ziele (*Pol.*); Tarneirinha, Cardo morto (*Lus.*); Krastownik (*R.*); Stonaert (*Suec.*).

Br. Gal. His. His3. LP. *M. Gr. Re. Sp.*

☉ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherene, *Cass.*) Eine in ganz Europa sehr gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. t. 10. Fl. méd. VI. 324.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Senecionis s. Erigeri) an; es besteht aus einem röhrigen, fast glatten, ästigen Stängel mit sitzenden, abwechselnden, umfassenden, am Rande behaarten, buchtigen, gezähnelten, unregelmäßigen, glatten Blättern und einen sehr schlaffen, endständigen Strauß bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch, der Geschmack ist krautartig, etwas sauer und salzartig.

Nach Finazzi dient ein Eßlöffel des Safts zur Verhütung hysterischer Zuckungen, wenn man ihn vor dem Eintritt derselben reicht.

2) *Senecio Jacobaea*, L.; Jakobskraut, Jakobskreuzkraut; Jacobée (*Gal.*); Ragwoot (*Ang.*); Jacobskruid (*Bel.*).

Gal. *Gr. Re. Sp.*

♃ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VIII. t. 11. *Oed.* Fl. Dan. t. 944.)

Man wendet das Kraut (herba Jacobaeae, Seggrum) an; es besteht aus leierförmigen, doppeltgefiedertgespaltenen, ge-

zähnten, glatten Blättern von unangenehmem, scharfem und bitterem Geschmack.

Tonisch.

S e n n a.

Senna; Séné (*Gal.*); Senna (*Ang.*); Suna (*Ar.*); Sena (*B.*); Sana pat (*Beng.*); Nilaverie (*Cy.*); Senet (*D.*); Sen (*His.*); Suna mukki (*Hin.*); Senne (*Bel.*); Sena (*I.*); Liscia, Senesowe (*Pol.*); Senne (*Lus.*); Amschunatlydivandiva, Buttallapotaka (*Sa.*); Nilaverei, Nilavaghei (*Tam.*); Nayla tungadu, Nela ponna (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp.* Z.

Man wendet unter dem Namen Senna in der Medicin Blätter und Früchte (Folia et Fructus) an.

A. Folia. Die im Handel vorkommenden Sennesblätter sind eine Mischung von Blättern dreier verschiedener Pflanzen:

1) *Cassia obovata*, *Coll.*; *C. Senna* (Decandria Monogynia, L., Leguminosae, *J.*), stumpfblättrige Senna-Cassie; Casse à feuilles obtuses (*Gal.*), ein Strauch Syrien's und Aegypten's. *Hayne* IX. t. 48.) C. obtusata) (Fl. med. VI. 328. *Bert.* Bild. IV. 32 f. 1.) Diese Pflanze liefert die Senna von Sayd, Thebais, die stumpfblättrige Senna, die Senna der Armen, von Aleppo, der Barbarei, die Spanische, Italische (Sena belady, *Ar.*), welche aus eirunden, am Grunde verschmälerten, kurz stachelspitzigen, unten schrägen, mit deutlichen Seitenrippen versehenen Blättchen besteht.

2) *Cassia lanceolata*, *Forsk.*; lanzenblättrige Senna-Cassie; Casse lanceolée (*Gal.*), ein Halbstrauch Nubien's und Sennaar's (Encycl. méth. t. 33. fig. 3.), welcher die Nubische, Bicharische, spitzblättrige, Alexandrinische, Morgenländische, Aegyptische (Alexandrina), Palthische (de la Palthe) und, nach Hayne, auch die Tripolitanische (Senna Tripolitana) (Senna guebelly, Mekky, Lissan alasfour, *Ar.*) Senna liefert, deren Blättchen unten behaart, lanzettförmig und kurz stachelspitzig sind. Unter den Blättern von dieser finden sich auch die von Cassia absus.

3) *Cynanchum Arghel*, *Del.*; Arghel; Argel, Arghel (*Gal.*) ♄ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, J.), eine Pflanze Oberägypten's (*Nect.* Voy. en Haute Egypte t. 3), welche allein von der Französischen Pharmacopöe aufgenommen ist. Die Blätter, unter dem Namen Séné de la pique bekannt, sind eirundlanzettförmig, ganz, ledrig, weißlich, fast sitzend, zwölf bis vierzehn Linien lang und am Grunde regelmäßig, mit einer unten hervorstehenden Mittelrippe ohne Seitenrippen.

Seit dem J. 1821 ist auch eine Sorte Sennesblätter unter dem Namen der Indischen (folia Sennae indicae s. de Mokka, Senna Arabica) im Handel vorgekommen, die sich durch größere Länge, blaß gelblichgrüne Farbe ꝛc unterscheiden. Sie sollen von Cassia elongata, *Lemaire*, nach Hayne von Cassia acutifolia, kommen —

Außerdem findet man noch in der käuflichen Senna Reste von Stielen oder Zweigen, bisweilen auch Bälge oder Früchte, Reste von Blättern, Blüthen ꝛc., fremde Stoffe, und besonders Blätter vom Blasenstrauch (Colutea arborescens), (auch von Coriaria myrtifolia, Periploca graeca, Globularia Alypum und andern Arten Cassia und Colutea.) Ihr Geruch ist ekelerregend, anhaltend, eigenthümlich und sehr widerlich; der Geschmack etwas bitter.

B. Fructus, Folliculi Sennae. Es sind eirunde, längliche, zusammengedrückte, bogenförmig gekrümmte, gelbliche Hülsen oder Bälge ohne ihre vier oder sechs herzförmigen Saamen.

Die Senna enthält, nach Lassaigne und Feneulle, Chlorophyll, eine geringe Menge fettes Oel, Eiweiß, einen gelbfärbenden Stoff, Aepfelsäure, Kali- und Kalksalze und endlich einen eigenthümlichen Stoff, welcher den Grund ihrer Wirkung zu enthalten scheint, das Cathartin (Cathartina, Cathartinum).

Mit starken Säuren, kohlensäuerlichen Alkalien, Kalkwasser, salpetersaurem Silber, essigsaurem Blei, Brechweinstein und dem Aufguß der gelben China darf man sie nicht verbinden.

Es ist ein sehr kräftiges Purgirmittel, dessen Wirkung auf die Verdauungswege fast immer Ekel und Coliken veranlaßt. Man wendet sie selten in Pulver und dann zu einem Scrupel bis zu einer Drachme an.

§. I. Präparate, welche die Senna in Substanz enthalten.

Species purgantes. (*Huf.*)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam.
Natri sulphurici . unciam unam.

Man läßt diese Species in drei Tassen

Waſſer kochen und nimmt von dieſer Abkochung alle Stunden eine halbe Taſſe.

Battleys Green Senna Powder. (*Gr. Re.*)

E Foliis Sennae calefactis donec flavuerint et cum Pulvere Carbonis commixtis.

Pulvis pectoralis. (B°.)

℞. Foliorum Sennae,
Seminum Anisi,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Sacchari crystall.
unc. duas c. dimid.

Von Fritze gerühmt. — Gabe, ein Kaffeelöffel, täglich vier Mal.

Pulvis Liquiritiae compositus s. pectoralis s. Sennae cum Sulphure. (Bor. BorC. Bor4. GalM. Han. Pol. *Au.*)

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Florum Sulphuris,
Seminum Anisi, sing. unc. unam.
Rad. Liquiritiae unc. duas c. dim.
Misce. (BorC. GalM. *Au.*)

℞. Foliorum Sennae,
Rad. Liquiritiae, sing. unc. duas.
Seminum Foeniculi,
Florum Sulphuris, sing. unc. unam.
Sacchari albi . . . semilibram.
Misce. (Bor. Han. HassP. Pol.)

Au. Sennae, Sulphuris, sing. sesquidrachmam, Foeniculi, Liquiritiae et Sacchari Lactis, sing. drachmam; — Bor4. Sennae, Glycyrrhizae, sing. uncias sex, Sacchari libras tres, Anisi uncias duas, Florum Sulphuris quatuor.
Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Pulvis Guajaci cum Senna s. antiictericus. (*Au.*)

℞. Foliorum Sennae,
Rad. Guajaci, sing. . part. aeq.

Gabe, zwei Kaffeelöffel, zwei oder drei Mal täglich. — Soll mit großem Erfolg bei Gelbſucht angewendet worden ſeyn.

Pulvis laxans s. lenitivus tartarisatus s. Sennae compositus. (O. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Pulv. Foliorum Sennae,
— Anisi,
— Sacchari albi,
— Cremor. Tart., sing.
unc. unam.
Misce bene. (O.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari, sing. unc. unam,
Cinnamomi,
Anisi,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Fiat pulvis. (*Sw.*)

Wir. Anisi et Foeniculi, singulorum semidrachmam.

℞. Foliorum Sennae partes sedecim.
Cremoris Tartari partes quatuor.
Foeniculi . . . . partes duas.
Cinnamomi,
Macidis, singulorum partem unam.
Misce. (*Vm.*)

Pulvis pectoralis viridis (*Dulk.*): Fol. Senn, Sacch. alb., sing. drachm. sex, Tart. depur. duas, Sem. Foenic. et Anisi, sing. unam.

Pulvis antiarthriticus purgans s. purgativus s. e Senna s. Sennae compositus, Pulvis Diasennae, Pulvis gregorianus. (Gal. GalM. Lon. LonN. Sar. Suec. Wir. *C. Gr. Re. Va. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Scammonii . . . unciam unam.
Cremoris Tartari uncias quatuor.

Pulverata seorsim deinde misce. (Fenn. Suec.)

℞. Foliorum Sennae,
Cremoris Tartari, sing. unc. duas.
Scammonii . . . . semunciam.
Zingiberis . . . drachmas duas.

Pulveratis scammonio et reliquis seorsim, pulveres commisce. (Lon LonN. *C. Gr. Re. Va.*)

Vm. Sennae, Cremoris Tartari, sing. partes octo, Scammonii duas et unam Zingiberis.

Gr. Fol. Sennae, Cremoris, sing. uncias duas, Caryophyll., Cinnamomi, Galangae, Semin. Ammeos, sing. drachmas duas, Scammonii semunciam; vel: Ammi et galangam omittens, Zingiberis drachmas duas addit.

℞. Foliorum Sennae,
Cinnamomi,
Cremoris Tartari,
Gummi Arabici, sing.
part. quatuor.
Ligni Guajaci,
Sarsaparillae,
Scammonii, singulorum partes duas.

Fiat pulvis tenerrimus. (GalM.)

Gal. *Re.* eandem formulam, Chinae tamen partes duas addendo.

℞. Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Cremoris Tartari,
Mechoacannae, sing. semunciam.
Rhei . . . . . drachmas duas.

Fiat pulvis. (Sar.)

℞. Sennae . . . scrupulos duos.
Cremor. Tart. gr. viginti quinque.
Zingiberis,
Jalapae,
Bacc. Juniperi, sing. gr. quindecim.
Sacchari . . . . . semunciam.

Fiat pulvis. (Wir.)

Pulvis longae vitae s. ad longam vitam. (*Bo. Ca.*)

℞. Fol. Sennae mundat.,
Rasur. Ligni betulini, sing. libram.
Seminum Anisi,
— Portulacae, sing. libras duas.
Ligni Santali albi,
— — rubri, sing. semilibram.

Fiat pulvis. — Gabe, ein Kaffeelöffel auf ſechs Taſſen kochendes Waſſer, welches man mit Zucker verſüßt und Morgens nüchtern trinkt. — Ein mildes Laxirmittel.

Pulvis stomachalis Dörflingensis (*Dulk.*): Rad. Inulae, Calami, Pimpin., Zedoar., Liquir. et Zingib., sing. drachm. duas, Caryophyll., Cardamom. min., Cass. cinn., Piment., Anisi, Cumini, Foenic., Petrosel., Aloës, Rhei, sing. tres, Macid, Nucis mosch., sing. unam, Tart. depur. sesquiunciam, Fol Senn. unc. duas c dimid., Veronic., Centaur. min., Card. bened., Bacc. Junip., sing. scrup. quatuor, Conchar praep. drachm. duas, Sacch. alb. uncias decem, pulv. misce sedulo.

Nodulus purgans. (*Sa.*)

℞. Herb. Trifolii,
— Fumariae, sing. manip. unum.
Rad. Pimpinell. alb. drach. tres.
— Gentianae,
Cascarillae, sing. . semunciam.
Cort. Aurantii Curass. drach. sex.
Seminum Dauci,
— Anethi, sing. . drach. duas.
Rhei . . . . . semunciam.
Foliorum Sennae drachmas sex.
Salis cathartici amari uncias duas.

Bolus purgans. (*Sp.*)

℞. Pulv. laxantis gr. viginti quatuor.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Pilulae tonicae et purgantes. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Radicum Scrophulariarum ambarum, singularum unciam unam.
Hermodactylorum,
Radicis Angelicae,
Turpethi veget., sing. drach. duas.
Scammonii . scrupulos quatuor.
Syr. Rosarum pallid . . q. s. ut fiat massa pilularis. — Gabe bis zwei Drachmen, nöthigenfalls mit Zuſatz von zwanzig Gran mercurius dulcis.

Passulae laxativae, Confectio passulata. (D. Pal. Sar. Wir. *Sp. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquae communis libras quatuor.
Sacchari albi,
Passularum min., sing. libr. unam.
Olei essentialis Citri guttas viginti.

Digere sennam in aqua bulliente et in colatura coque passulas; pulpam per cribrum setaceum trajice, illam cum saccharo ad plumam cocto blando igne ad electuarii consist. inspissa et refrigeratae adde oleum cum sacchari pauxillo contritum. (Sar.)

Addendo hujus electuarii semunciae Pulveris Jalapae drachmam: *Confectio passulata cathartica* (Sar.) obtinetur.

℞ Cinnamomi . . drachmas tres.
Foliorum Sennae . uncias duas.
Passularum minorum,
Sacchari, sing. . libram unam.

Macera sennam in Aquae unciis quatuor; post sufficientem extractionem adde liquidi uncias octo et passulas bene mundatas submergendo, cum saccharo syrupum spissum para; syrupo adhuc calido adde passulas et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

Wir. et *Sp.* Sennae uncias quatuor, Aquae decem, Cinnamomi drachmas duas, Zingiberis albi sesquidrachmam, Sacchari et Passularum minorum, sing. uncias duodecim; — Pul. Sennae uncias octo, Foeniculi semunciam, Cinnamomi drachmas duas, Aquae satis ut sesquilibra colaturae obtineatur, Sacchari ad plumam cocti sesquilibram et Passularum minorum mundatarum tantidem.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Aquae communis uncias decem.
Coque, sub finem addendo
Cinnamomi . drachmas tres.
Colaturam post expressionem coque cum
Sacchari albi . . . libra una.
Syrupum colatum infunde
Passularum minorum librae uni.
Serva. (D.)

Eodem modo praeparatur *Confectio de Prunis s. Diaprunum* (Sar. Wir. *Sp.*) loco passularum Pruna Damascena in Aqua ad mollitiem usque coct. adhibendo.

Electuarium Sennae s. e Senna s. Sennae cum Pulpis s. (*Foliorum*) *Sennae compositum, Electuarium aperiens s. catholicum commune s. Diaprunum s. eccoproticum s. lenitivum, Electuarium Tamarindorum, Confectio Sennae.* (A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor BorC Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalF. Gen. Han. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Suec. Wir. WW. *C. Fi. Gr. Sp. T. Vm.*)

1) Ohne Weinsteinrahm.

℞. Rad. Polypodii querni
unc. quatuor.
Fol. Sennae mund. uncias duas.
— Mercurialis manipulos tres.
Aquae communis . uncias octo.
Macera sennam per horas sex in Aquae bull. unciis duabus et cola; infunde polypodium in reliqua aqua et coquendo dimidium consume; adde deinde folia mercurialis; post brevem ebullitionem exprime et cola; in colatura coque
Prunorum dulc. enucl. uncias sex.
Pulpam per cribrum setaceum trajice et tunc recipe
Hujus Pulpae,
Pulpae Tamarindorum,
— Cassiae,
Conserv. Violarum, sing. unc. sex.
Sacchari albi in Tinct. Sennae sol. et ad syrup. spiss cocti
libras duas.
Coque pulpas et syrupum igne blandissimo et continue agitando ad humidi superflui consumptionem usque; adde conservam et tunc pro quaque libra electuarii refrigerati
Pulv. Sennae mund. sesquiunciam.
Misce bene. (Sar.)

℞. Rad. Polypodii querni unc. duas.
— Liquiritiae . . semunciam.
Herbae Capilli Veneris Monspeliaci,
— Mercurialis, sing. unc. unam.
Florum Violarum . semunciam.
Hordei mundati,
Passularum min., sing. unc. duas.
Jujubarum,
Sebestenarum, sing. unc. unam.
Aquae font. libras duas c. dimid.
Coque ad libras unius liquidi remanentiam et in colatura solve
Pulpae Cassiae,
— Prunorum,
— Tamarindorum,
Sacchari albi, sing. . uncias sex.
Coque ad consist. electuarii et adde
Pulv. Fol Sennae
unc tres c. dimid.
Conservae Violarum uncias sex.
Misce exacte. (Br. *Sp.*)

℞. Uvarum pass. enucl. uncias duas.
Adianti nigri,
Florum Violarum,
Hordei mund., sing. manip. unum.
Jujubarum,
Sebestenarum, singularum no. 20.
Liquiritiae . . . semunciam.
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum, sing. . drach. sex.
Foliorum Sennae,
Polypodii querni, sing. unc. duas.
Mercurialis . semimanipulum
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque ad consumptionem liquidi trientium duorum, cola et in colatura dissolve
Sacchari albi . . . uncias sex.
Coque ad aptam consist. et adde
Pulpae Cassiae,
— Prunorum,
— Tamarindorum,
Conserv Violarum, sing. unc. sex.
Pulv. Fol. Sennae
unc. tres c. dimid.
Misce bene. (Pal.)

℞. Hordei integri,
Radicis Polypodii,
Passularum minorum,
Tamarindorum, sing. uncias duas.
Prunorum Damascenorum,
Jujubarum,
Fol. rec. Scolopendrii, sing.
sesquiunciam.
Liquirit. ras. et contus. unc. unam.
Fol. Mercurialis uncias quatuor.
Coque hordeum, donec dirumpatur, tunc polypodium contusum et denique reliquas substantias in Aquae q. s.; coque itidem seorsim
Foliorum Sennae . uncias duas.
Decocta commixta coque ad unciarum quinque liquidi remanentiam et adde deinde
Sacchari albi libr. duas c. dimid.
In syrupo ad apt. consist. cocto solve
Extracti Cassiae,
Pulpae Tamarind, sing.
unc. novem.
et tunc, commixtis
Pulv. Fol. Sennae unc. quinque.
— Foeniculi contusi,
— Anisi contusi, sing.
drach. duas.
Commisce spathulae ligneae ope. (Gal.)

℞. Liquiritiae . . unciam unam.
Radicis Polypodii,
Sennae mund., sing. unc. duas.
Succi Mercurialis depur. unc. octo.
Infunde, cola leviter exprimendo et in colatura dilue
Passularum min. contus.
unc. quatuor.
Solve deinde in massa
Sacchari crudi teneris
unc. quadraginta.
Cola syrupum calidissimum per pannum et ad consist. roob inspissato adde
Pulpae Prunorum uncias quatuor.
— Cassiae,
— Tamarind., sing.
unc septem.
Ad electuarii consistentiam consume, sub finem, calore diminuto, addendo

Digitized by Google

Semin. Anisi,
— Foeniculi, sing. drach. duas.
Pulvera et parumper cum una pulparum tere. (*Vm.*)

℞. Rad. Polypodii contus. uncias sex.
Aquae . . . . . libras decem.
Coque, sub finem addendo
Foliorum Malvae . unciam unam.
In colatura dissolve
Mellis . . . . . libras novem.
Fiat syrupus spissus, cui adde
Pulpae Prunorum . sesquilibram.
Pulveris Sennae Hispanicae libram unam.
— Anisi . . . uncias duas.
Misce. (His. His§.)

℞. Radicis Polypodii uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quatuor.
Coque ad duorum trientium liquidi circiter remanentiam, adde
Foliorum Sennae . uncias duas et ab igne remove, post refrigerationem cola et in liquido solve
Sacchari albi . . . libras duas et ad syrupi spissi consistentiam consume; syrupo adde
Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum,
— Cassiae, sing. . uncias sex.
Massam, addendo
Fol. Sennae subtiliss. pulv unc. duas
ad requisitam consistentiam redige. (*T.*)
Fi. sub finem addit Foliorum Sennae uncias duas cum dimidia.

℞. Caricarum . . . . uncias sex.
Radicis Liquiritiae uncias duas.
Aquae . . . . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
In syrupo dilue
Pulpae Tamarindorum,
— Prunorum, sing. unc. quinque.
Pulv. Fol. Sennae unc. quatuor c. dim.
— Anisi . . . semunciam.
Misce bene. (Bor. Han. O. Pol.)
Bor4. Caricarum uncias octo ex Aquae libris quatuor ad dimidium coquere, exprimere, colare, decoctum ad uncias duodecim consumere, dissolvere in eo Sacchari uncias sedecim et syrupo immiscere Pulpae Tamarindorum uncias octo, Foliorum Sennae et Anisi stellati ut Bor. absque liquiritia et pulpa prunorum.

℞. Foliorum Sennae . uncias octo.
Coriandri . . . uncias quatuor
Liquiritiae . . . . uncias tres.
Caricarum siccarum libram unam.
Pulpae Tamarindorum,
Pulpae Cassiae,
— Prunorum, sing. semilibram.
Sacchari albi libr. duas c. dimid.
Tere sennam cum coriandro et cribra, separa pulveris uncias decem; residuum cum caricis et liquiritia in Aquae libris (octariis) quatuor ad duas decoque; cola exprimendo, quartam colaturae partem consume, adde saccharum et syrupo pulpas et tunc pulverem immisce. (Am. B Bel. Ed. Gen. Lon. LonN. *C. Gr. Re*)
Gr. praeterea: Caricarum, Pulpae Prunor., sing. libram, reliqua ut antea absque pulpa cassiae. (*Elect. Cassiae Sennae.*)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Tamarindorum uncias duas.
Syrupi Sacchari sesquioctarium.
Coque ad mellis consistentiam et adde
Pulv. Fol. Sennae uncias quatuor et post refrigerationem
Olei ess. Carvi . drachmas duas.
Misce sedulo. (Du.)
Gr. Sennae uncias tres, reliqua ut antea.

℞. Pulpae Prunorum,
— Tamarindorum, sing. unciam.
Pulv. Fol. Sennae . drach. duas.
— Foeniculi . . semunciam.
Misce triturando. (Li.)

℞. Pulpae Cassiae recenter paratae,
— Tamarindor., sing. libram unam.
Pulv. Fol. Sennae unc. duas c. dimid.
Syrupi simplicis uncias triginta.
Misce et balneo maris ad necessariam spissitudinem evapora. (Pm.)

℞. Pulpae Prunorum libram unam.
— Cassiae,
— Tamarindorum, singularum uncias duas cum dimidia.
Pulv. Fol. Sennae unc. quatuor.
— Coriandri . . semunciam.
Syrupi Sacchari . libram unam.
Misce. (Ams.)

℞. Pulpae Tamarindorum libr. unam.
Pulv. Fol. Sennae . unc. quatuor.
— Coriandri . . semunciam.
Syrupi Sacchari . . uncias octo.
Misce bene. (Fenn. GalF. Suec.)

℞. Pulpae Prunorum . libras duas.
Pulv. Fol. Sennae . . unc. octo.
— Coriandri uncias quatuor.
Syrupi Rosarum solutivi . q. s.
Misce. (Lus. Wir.)

℞. Pulv. Seminum Anisi grana sex.
— Fol. Sennae drach. unam.
Pulpae Tamarindorum drach. duas
Syrupi Althaeae . drachmas sex.
Misce ex tempore. (HassP.)

℞. Roob Sambuci . unciam unam.
Pulv. Fol. Sennae drachmas duas.
— Anisi . . semidrachmam.
Misce (Ful.)

Gr. praeterea: Senn. parvae libras quatuor, Coriandri duas, Uvarum decem, Succi Liquirit. libram et uncias octo Prunor., Tamarind., sing. libr. decem, Syr. Sacchari viginti octo; vel: Ficuum libras viginti, Prunor. quatuordecim, Tamarind. tantidem, Cassiae Fist. viginti, Sacch. albi quinquaginta, Succ. Liquir. quatuor et unc. octo, Sennae libras duodecim, Coriandri octo; vel: Ficuum libr. quadraginta novem, Tamarind. viginti octo, Syr. Sacch. quinquaginta sex, Jalap. unam, Eboris usti duas, Senn parv. decem, Coriandri septem; vel: Tamarind. rubr., Prunor., sing. libr. quatuor, Syr. Sacch. viginti, coque bene et adde Sennae libras tres, Coriandri duas.

2) Mit Weinſteinrahm.

℞. Pulpae Tamarindorum partes octo
Syrupi Rhei . . . . partes sex.
Commisce et adde
Pulveris Foliorum Sennae,
— Cremor. Tart., sing. part. unam.
Misce. (Sax.)

℞. Pulpae Prunorum sesquiunciam.
Foliorum Sennae pulveratorum,
Cremor. Tart., sing.
sesquidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Misce. (B*. *Gr.* [*Elect. lenit. pro pauperibus Gr.*])

Ba. Pulpae Tamarindorum partes octo, Sennae, Cremoris Tartari, sing. unam, Syrupi Sacchari quatuor; — D. Pulpae Tamarindorum duodecim, Sennae sex, Cremoris Tartari tres et Syrupi Mannae viginti quatuor; — LH. Pulpae Prunorum vel Pyri uncias sex, Fol Sennae drachmas sex, Cremoris Tartari uncias duas, Olei Anisi scrupulum unum, Syrupi comm. quant. s.; — LP. Pulpam Pyri et loco syrupi communis Mel despumatum indicat, caetera ut LH.

℞. Pulp. Prunorum
part. viginti quatuor.
Fol. Sennae pulv. . . partes tres.
Cremoris Tartari . partem unam.
Mellis puri . . partes duodecim.
Misce. (BorC. WW)

Sp. Pulpae Tamarindorum, Prunorum, sing. partes octodecim, Roob Sambuci duodecim, Sennae sex, quatuor Cremoris Tartari et Mellis q. s.

Alle dieſe Präparate ſind mehr oder weniger purgirend. Man wendet ſie häufiger in Klyſtir als auf eine andere Weiſe an, und in allen Fällen iſt die Gabe nach der verſchiedenen Menge der darin enthaltenen Senna verſchieden.

Electuarii sennae unciam unam pro *Clystere purgante.* (LH.)

Electuarium diatartareum. (B*.)

℞. Sennae mundatae,
Tartari albi cribr. sing. sesquiunc.
Mannae electae,
Sacchari albi, sing. . unc. unam.
Zingiberis,
Anisi,
Cinnamomi,
Galangae, sing. drachmam unam.
Syr. Rosarum solutivi
unc. quinque.

Gabe, eine Unze, vor der Mahlzeit, worauf man vier Unzen Fleiſchbrühe trinkt.

Man kann es auch auf folgende Weiſe bereiten:

℞. Sennae electae . . . uncias sex.
Zingiberis,
Galangae, sing. . drachmas tres.
Infusi Rosarum pallid libr. tres.

Infunde per horas 24 in balneo aquae tepido, in vase tecto, et coque; cola, clarifica et colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias octo.
Cremoris Tartari . semunciam.
Olei ess. Anisi . semiscrupulum.

Misce. — Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Conditum tamarindinaceum. (*Sw*.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Mannae,
Pulp. Tamarind., sing. sesquiunc.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bei Hämorrhoiden und Blutbrechen empfohlen. — Gabe, drei Kaffeelöffel, zwei, drei oder vier Mal täglich.

Man kann auch zwei Drachmen Schwefel zuſetzen, wo dann dieſe Marmelade ſich nicht von der folgenden Latwerge unterſcheidet.

Electuarium antihaemorrhoidale, Confectio Sennae composita. (*Gr. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae,
Florum Sulphuris,
Cremor. Tartari, sing. part. unam.
Mannae . . . . partes sex.
Pulpae Tamarindorum partes octo.
Syrupi Sennae quantum sufficit.

Tere mannam primo cum Syrupi pauxillo, dein cum pulpae parte una, adde pulveres triturando commixtos, tunc reliquam pulpam et syrupi q. s.

Gr. Sulph. sublim., Potass. Supersulphat., sing. unciam unam, Confect.

Sennae quatuor, Zingib. sesquidrachmam, Syrupi simpl. q. s.

Electuarium lenitivum cum Sulphure (*Sp.*). Electuario lenitivo *Sp.* addatur Florum Sulphuris uncia una. — Zu einer halben Unze täglich mehrmals, gegen Krätze empfohlen.

Electuarium mundificans. (*Li.*)

℞. Pulv. Rad. Patientiae unc. tres.
— — Rhei . . semunciam.
— Sassafras . . uncias duas.
— Fol. Sennae drachmas sex.
— Resinae Guajaci,
Flor. Sulphuris lot. . unc. unam.
Mellis despumati . . libras tres.
Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Electuarium e Senna cum Carbone. (*Au.*)

℞. Electuarii e Senna uncias quatuor.
Natri subcarbonici,
Carbonis, sing. . drachmas duas.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen, zwei oder drei Mal.

Electuarium purgans. (*B.*)

℞. Confectionis Sennae,
— Cassiae, sing. unc. duas.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Syrupi Rosarum quantum sufficit.
Gabe, einer Muskatnuß groß, stündlich, bei Verstopfung Schwangerer.

℞. Pulpae Tamarindorum unc. unam.
Foliorum Sennae drachmam unam.
Cremoris Tartari unciam unam.
Mellis despumati quantum sufficit.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Electuarium catholicum s. catholicum duplicatum s. de Rhabarbaro s. diacatholicon s. Rhei compositum, Catholicon duplicatum e Rheo. (Gal. Pal. R. Wir. Wür. *Br. Ca. Pid. Re. Sp. Vm.*)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.
Aquae font. unc. quadraginta octo.
Coquendo parte quarta liquidi consumpta, in colatura dissolve
Pulpae Cassiae,
— Tamarind., sing. unc. quatuor.
Sacchari uncias quadraginta octo.
Coque blando igne ad mellis consistentiam; adde sensim
Pulv. Rad. Polypodii,
— — Rhei, sing. unc. duas.
— — Liquirit. drach. duas.
— Fol. Sennae unc. quatuor.
— Florum Violarum,
— Sem. Anisi, sing. unc. duas.
Misce. (Wir.)

℞. Radicis Polypodii . uncias octo.
Aquae font. uncias nonaginta sex.
Decoque ad dimid. et colaturam cum
Quatuor Seminum frigidorum majorum, singulorum . semuncia.
Seminum Violarum unciis duabus ad emulsionem tere, cola et in liquore dissolve
Sacchari albi unc. quadraginta octo.
Syrupo, coquendo parato paulatim adde
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
Pulv. Rhei,
— Fol. Sennae, sing. unc. quatuor.
— Anisi . . . . uncias duas.
— Liquiritiae . unciam unam.
Misce. (*Sp.*)

Pal. coquere Polypodii semilibram in Aquae octo ad dimidii remanentiam, in colatura dissolvere Sacchari libras quatuor, cum syrupo cocto commiscere Pulpae Cassiae et Tamarindorum, sing uncias quatuor, massae denique addere mixturam pulverulentam e Sennae unciis quatuor, Rhei duabus, Violarum et Anisi, sing. tantidem, Polypodii unciis duabus et quatuor Seminum frigid. maj , sing. semuncia.

℞. Radicis Polypodii contusae semilibram.
— Cichorii . . uncias duas.
— Liquiritiae . unciam unam.
Foliorum Agrimoniae,
— Scolopendrii, sing. uncias tres.
Aquae . . . . . libras sex.
Coque blando igne ad tertiae partis remanentiam; adde
Seminum Foeniculi drachmas sex.
Cola et exprime, colaturam coque cum
Sacchari albi . . libris quatuor ad syrupi spissi consistentiam. Ab igne remotis adde
Pulpae Cassiae,
— Tamarindorum,
Pulv. Rhei,
— Sennae, sing. unc. quatuor.
— Sem. Violarum . unc. duas.
— Liquiritiae rasae,
— Quatuor Seminum frigidorum, sing. unciam unam.
— Sem. Foeniculi semunciam.
Misce sedulo. (Gal. *Ca. Re.*)

℞. Radicis Polypodii . uncias sex.
Herbae Malvae,
— Mercurialis,
— Parietariae,
— Violarum, sing. manip. duos.
Aquae fontanae uncias centum quadraginta quatuor.

Coquendo tertia parte consumpta, in colatura dissolve
Mellis . . uncias nonaginta sex.
Coque ad syrupi consist. et adde
Pulpae Prunorum . . uncias 24.
Pulveris Polypodii,
— Rhei, sing. uncias quatuor.
— Liquiritiae . . semunciam.
— Sennae . . . uncias octo.
— Flor. Violarum unc. quatuor.
— Foeniculi.
— Quatuor Sem. frigid. maj., sing. unciam unam.
— Anisi . . uncias quatuor.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Pulv. Rhei,
— Sennae, sing. drach. duas.
— Foeniculi . . drach. tres.
— Liquiritiae . . semunciam.
Tere cum Syrupi pauxillo et adde
Pulp. Cassiae,
— Tamarind., sing. unc. duas.
Syrupi Polypodii . . . . q. s.
Misce. (*Vm.*)

Br. Commiscere mixturam pulveratam Rhei, Jalappae, Anisi, Foeniculi, sing. unciam unam et Sennae duas cum Pulpae Cassiae duabus, Pulpae Tamarindorum tantidem et Syrupi Polypodii triginta sex.

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Rhei . . . . . semunciam.
Seminum Anisi . drachmas duas.
Pulpae Tamarindorum,
Roob Sambuci, sing. unc. quatuor.
Misce. (R.)

℞. Pulv. Sennae . . . uncias duas.
— Rhei,
— Cremor. Tart., sing. semunciam.
— Anisi . . . drachmas tres.
Pulpae Tamarind. . sesquiunciam.
Mellis despumati . libram unam.
Misce bene. (Wür.)

Pid. eandem formulam sed absque cremore tartari.

Electuarium lenitivum von R. Wür. et *Pid.* unterſcheidet ſich nur durch den Zuſatz der Rhabarber. Es iſt, zu einer halben bis ganzen Unze genommen, purgirend. Auch verordnet man es in Klyſtir.

Clyster purgans. (LP.)

℞. Decocti Specierum anodynarum semilibram.
Electuarii lenitivi unciam unam.
Misce. —

§. II. Präparate, welche den wirkſamen Stoff der Senna ohne das zu ſeiner Ausziehung angewendete Vehikel enthalten.

Extractum Sennae s. Foliorum Sennae (aquosum). (Gal. His. His3. Sar. Wir. *Gr T. Vm.*)

℞. Fol. Sennae mund. . semilibram.
Aquae fontanae . . libras tres.
Digere per horas 24 in loco calido, cola exprimendo et igne blandissimo consume. (Sar. Wir.)

Gal. Macerationes duas succedentes frigidas Sennae librae unius in Aquae libris quatuor et evaporationem colaturae utriusque commixtae in balneo aquae; — His. His3 Macerationem per tres dies et levem bullitionem Sennae librae unius in Aquae libris sedecim et infusionem lentam infuso-decocti sepositione purificati; — *T.* Foliorum libram unam cum Aquae bull. octo per horas 24 infundere; colare cum leni expressione, per pannum vel melius per chartam emporeticam filtrare et ad extracti consist. consumere.

℞. Fol. Sennae mund. et concis. quant. vis.
Superfunde Aqua frigida et macera per horas 12; adde deinde Aquae ferv. duplum frigidae, post refrigerationem cola absque expressione; residuo infunde dimidium ejusdem copiae Aquae ferventis et refrigerata cola; Albuminis ope clarificata evaporent absque ebullitione ad extracti consist. (*Vm.*)

Sal essentiale Sennae. (Gal.)

℞. Foliorum Sennae. . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim.
Macera per horas 24, subinde agitando, et cola; residuum maceretur cum Aquae libris octo et itidem coletur; colaturae commixtae in balneo aquae ad syrupi consist evaporent, quem linearum duarum crassitie supra patinas effusum in balneo aquae vel in furno ad siccum consume et tunc squamas separa.

Extractum Sennae alcoholicum. (Wür.)

℞. Foliorum Sennae,
Alcoholis, sing. . libram unam.
Aquae communis . . libras octo.
Digere blando calore per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, et alcohole destillando separato, residuum ad aptam consist. consume.

Extractum solutivum. (Br.)

℞. Foliorum Sennae,
Rhei, sing. . . . . uncias tres.
Cinnamomi,

Anisi, sing. . . drachmam unam.
Tartari tartarisati sesquidrachmam.
Aquae fontanae . libram unam.
Digere per horas 24 blando calore in balneo aquae, cola levi cum expressione et liquorem ad extracti consist. consume

§. III. Präparate, in denen der wirksame Stoff der Senna mit dem zu seiner Ausziehung angewendeten Vehikel enthalten ist.

A. Auszug durch Bier.

Cerevisia purgans. (*Ca. Vm.*)

℞. Allii . . . . octarios viginti.
Sennae . . . . . uncias duas.
Summit. Centaurii minoris,
— Absinthii, sing. sesquiunciam.
Aloës Socotrinae drachmas duas.
Post sufficientem digestionem cola. (*Ca.*)

℞. Allii octarios quadraginta quinque.
Polypodii quercini libram unam.
Rhapontici,
Sennae mundatae,
Uvarum pass., sing. . semilibram.
Foliorum Cochleariae,
— Salviae, sing. . uncias sex.
Rhei,
Raphani, sing. . . uncias tres.
Fructus Aurant. concis. . no. 4.
Infunde et cola. (*Ca.*)

℞. Rhei . . . . . partes tres.
Coriandri . . . partem unam.
Rhapontici,
Sennae, sing. . . partes quatuor.
Polypodii . . . . partes octo.
Cerevisiae fortis . . partes 256.
Post plures dies macerationis cola absque expressione. (*Vm.*)

Cerevisia antiicterica. (*Vm.*)

℞. Curcumae,
Rhei, sing. . . . . semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Fol. Sennae, sing. . drachm. sex.
Sem. Dauci sylvest. . unc. unam.
Foliorum Absinthii,
— Marrubii,
Flor. Centaurii min., sing. semimanipulum.
Cerevisiae fortis . . uncias 64.
Macera per aliquot dies in cerevisiae octantibus septem et per pannum cola; faeces cum reliqua cerevisia abluе et itidem cola; colaturas commisce.

B. Auszug durch Wein.

Vinum s. Elixir Sennae. (*Succ.*)

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Coriandri,
Foeniculi, sing. . . drach. duas.
Vini Hisp. . libr. duas c. dimid.
Post tres dies digestionis adde
Uvarum pass. enucl. . unc. tres.
Macera per horas 24 et cola exprimendo.

Vinum purgans et tonicum. (*Pie.*)

℞. Fol. Sennae mund. . unc. unam.
Rhei . . . . . drachmas sex.
Caryophyllorum,
Croci, sing. . drachmam unam.
Vini Hispanici . . octarios duos.
Infunde frigide per dies quinque vel sex, saepius agitando et supra faeces relinque.
Bei Krankheiten von Schwäche des Magens. — Gabe, Morgens nüchtern zwei bis vier Löffel.

Vinum antiictericum. (*Sw*. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae,
Cort. Aurant., sing. . part. tres.
Rhei,
Curcumae, singulorum partes duas.
Fol. Absinthii,
— Marrubii, sing. part. unam.
Vini Rhenani . . . partes 256.
Infunde frigide per dies octo, cola leviter exprimendo et filtra. — Tonisch, schwach purgirend. — Gabe, zwei bis vier Unzen täglich drei Mal.

Vinum amarum et diureticum, Vinum aperiens et purgans, Vinum purgans. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Fol. Sennae mund. unc. unam.
Agarici albi . sesquidrachmam.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Radicis Scillae,
— Inulae,
Herbae Marrubii, sing. uncias tres.
Rad. Iridis Flor. . . uncias sex.
Zingiberis . . . scrupulos duos.
Vini . . . . . libras tres.
Infunde, cola et colaturae adde
Tincturae Gentianae drachmas tres.
Misce. (*Ca.*)

℞. Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Agarici albi . drachmas duas.
Corticis Sambuci,
— Ebuli, sing. . uno. unam.
Rad. Scillae,
— Inulae,
— Iridis Flor, sing. semunciam.
Herbae Marrubii manipulum unum.
Zingiberis . . drachmam unam.
Vini . . . . . libras quatuor.
Post sufficientem digestionem cola. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Agarici albi,

Rad. Jalapae,
— Hellebori nigri,
— Iridis Flor., sing. drach. duas.
— Inulae,
— Scillae, sing. unc. duas c. dim.
Corticis Winteri,
— Sambuci,
— Ebuli, sing. . unc. unam.
Vini albi . . . libras quatuor.
Post frigidam infusionem cola. (*Ca.*)

Bo. Iridis, Sennae, sing. uncias duas, Inulae, Scillae, Sambuci, Ebuli, sing. unam, Jalapae, Hellebori, Agarici, sing. drachmas duas, Vini albi libras sex, horae quadrantem ebullitionis et horas 12 infusionis.

Gabe, eine bis zwei Unzen, Morgens und Abends.

C. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Sennae. (*Huf.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.
Post tres dies digestionis cola.

Tinctura Sennae s. Sennae composita s. aromatica, Elixir salutis, Tinctura cathartica. (Am. Ams. B*. Bor4. D. Du. Ed. Gen. Han. Lon. LonN. Lus. Pal. Sax. Succ. Wir. *C. Ca. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . . partes sex.
Cardamomi minoris partem unam.
Aquae Vitae . . . . partes 48.
Infunde frigide per dies octo, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae libram unam.
Seminum Carvi . sesquiunciam.
Cardamomi minoris semunciam.
Alcoholis (0,930) . octarios octo.
Post quatuor dies digestionis cola. (B*. Du. *Gr.*)

Vm. Sennae sesquiunciam, Carvi sesquidrachmam, Cardamomi semidrachmam et Aquae Vitae uncias sedecim; — Gen. Sennae uncias tres, Anisi drachmas tres, Cardamomi drachmam unam et Aquae Vitae libras duas.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Seminum Carvi drachmas tres.
Cardamomi min. . drach. unam.
Passularum min. enucl. unc. quatuor.
Aquae Vitae libr. duas c. dimid
Macera et filtra. (Han.)

Sw. Sennae sesquilibram, Carvi drachmas sex, Cardamomi duas, Passularum uncias octo et Alcoholis (0,930) libras quatuor, — Lon. LonN. *Gr. Re.* Sennae uncias tres, Carvi drachmas tres, Cardamomi unam, Passularum uncias quatuor et Alcoholis (0,930) octarios duos; — Suec. easdem ingredientium quantitates et Alcoholis Aqua diluti uncias triginta duas; — Bor4. Foliorum uncias tres, Passulas majores ut Han., Spiritus Vini Gallici fortioris libras tres, caeterum ut Han. et quatuordecim dierum macerationem.

℞. Extracti Liquiritiae semunciam.
Aquae bullientis uncias quinque.
Dissolve et liquori adde
Foliorum Sennae sesquiunciam.
Anisi . . . . drachmas duas.
Alcoholis . . . uncias quinque.
Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, et cola. (*Sw.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Radicis Jalapae . unciam unam.
Coriandri . . . . semunciam.
Alcoholis (0,935) libr. tres c. dim.
Digere per tres dies, filtra et colaturae adde
Sacchari albi . uncias quatuor.
Dissolve. (B*. Ed. *Gr.*)

Lus. Sennae uncias duas, Jalapae unam, Anisi stellati drachmas duas, Aquae Vitae libras tres cum dimidia, octo dies macerationis et in colatura solvere Sacchari uncias quatuor; — *Gr. Re.* Jalapae libras tres, Fol. Senn. uncias duodecim, Coriand., Anis., Liquir., Enul., sing quatuor, Spir. rect., Aq., sing. congium (*Swinton's Daffy*); vel: Fol. Senn., Rhei, Anisi, sing. libras duas, Rad. Jalap., Carvi, sing. unam, Sant. rubr. uncias octo, Spir. ten. congios decem, Sacch. fusc. libr. quatuor; vel: Rhei libr. quatuordecim, Anisi decem, Senn. parv. octo, Jalapae quatuor, Sant. rubr. tres et unc. octo, Ciner. Russ. duas, Spir. rect. congios triginta octo, Aquae octodecim; vel: Jalap. libras tres, Senn. unam, Anisi unc. sex, Coriand. quatuor, Cort. Aur. sicc. duas, Spir. ten. congios duos; vel: Sennae libras septem, Jalap. quinque, Anisi quatuordecim, Carvi, Foen. c., sing. quatuor, Spir. Frum. cong. duos, Spir. rect. viginti sex, Aquae viginti quatuor, stare per tres septimanas, exprimere, partes supremas cum Aquae cong. duobus lavare et adde Molasses libr. viginti octo; — Am. B*. et *C.* Sennae uncias tres, Rhei unam, Coriandri dimidiam, Carvi tantidem, Cardamomi drachmas duas, Alcoholis (0,930) octarios quatuor cum dimidio et Sacchari uncias quatuor; — *Vm.* Sennae partes quatuor, Jalapae duas, Coriandri unam, Aquae Vitae septuaginta duas et Sacchari octo; — D. Sennae uncias duas, Jalapae semunciam, Alcoholis libras tres, Saccha-

ri albi uncias quatuor absque coriandro.

℞. Foliorum Sennae . partes octo.
Rhei . . . . . partes quatuor.
Coriandri,
Cort. Aurant., sing. part. unam.
Aquae Vitae . . . partes 112.

Infunde frigide per dies octo, exprime et filtra. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Passularum minorum semilibram.
Radicis Inulae,
Coriandri,
Anisi, singulorum unciam unam.
Aquae Vitae . . . libras tres

Macera per dies octo, subinde agitando et cola. (Ams.)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Radicis Inulae,
— Liquiritiae,
— Rhei,
Semin. Anisi,
— Carvi,
— Coriandri, sing unc. unam.
Passularum min. enucl. unc. quatuor.
Subcarbonat. Potassae drach. duas.
Aquae bullientis . libram unam.

Digere et refrigeratis adde
Alcoholis . . . . libras duas.

Stent in digestione adhuc per dies octo, tunc cum expressione colentur. (B*. Wir. *Sw.*)

Sax. infundere Sennae partes tres, Rad. Inulae, Liquiritiae, Rhei, Anisi, Carvi, Coriandri, sing. unam et Subcarbonatis Potassae partem quartam in Aquae bull. duodecim, refrigeratis addere Alcoholis concentrati partes viginti quatuor, digerere blando calore per dies sex, colare exprimendo et filtrare; — *Gr.* Rhei libras quadraginta, Sennae quindecim, Sant. rubr., Carvi, Anisi, Coriand., sing. quinque, Ciner. Russ. uncias octo, Spir. rectif. congios decem, digere per triduum et adde Spir. ten. octoginta et Molasses libr. quadraginta sex.

℞. Foliorum Sennae uncias quatuor.
Radicis Inulae,
— Rhei, sing. . uncias duas.
Subcarb. Potassae sesquidrachm.
Aquae bullientis . . libras tres.

Digere per tres horas in vase tecto, tum recipe
Ligni Guajaci,
Anisi,
Carvi,
Coriandri, singulorum uncias duas.
Aquae Vitae . . . uncias tres.

Infunde frigide per tres dies, cola exprimendo et colaturam cum praemonita commisce. (Pal.)

Ca. Sennae uncias duas, Guajaci unam, Inulae, Anisi, Carvi, Coriandri, Liquiritiae, sing. drachmas sex, Passularum uncias quatuor et Aquae Vitae libras tres; — *Gr. Re.* Fol. Senn. uncias quatuor, Guaj., Enulae, Anisi, Carvi, Coriand., Liquir, sing. unc. duas, Uvar. pass. enucl. octo, Spir. ten. libras sex. (*Daffy's elixir, Dicey's Daffy*); vel: Inulae, Ras. Guaj. Coriand., Rhei, Liquir., Anisi, sing. unc. tres, Uvar. pass. libram unam et uncias octo, Spir. ten. octarios decem.

Alle diese Präparate wirken mehr oder weniger purgirend, je nach der Menge der in ihnen enthaltenen Senna. — Die Gabe ist sehr verschieden, im Allgemeinen von zwei Drachmen bis eine Unze.

Haustus oleosus laxans, Potio laxans oleosa. (*Vm.*)

℞. Tincturae Sennae,
Olei Amygd. dulc., sing. unc. unam.

Tinctura Sennae amara. (*Sw.*)

℞. Foliorum Sennae partes quatuor.
Radicis Gentianae,
Cort. Aurantior., sing. part. unam.
Aquae Vitae part. sexaginta quatuor.

Infunde frigide per plures dies, saepius agitando, tunc exprime leviter et filtra.

Guttae cordiales (Gout cordial) *Warneri.* (Am. B*. *C. Gr. Par.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Coriandri,
Foeniculi, sing. drachmam unam.
Coccionellae,
Croci,
Liquiritiae, sing. semidrachmam.
Passularum min. enucl. semilibram.
Aquae Vitae . . octarios duos.

Infunde per dies sex, saepius agitando et cola; faecibus reaffunde Aquae Vitae octarium unum, post sufficientem extractionem cola et colaturas ambas commisce. (*C.*)

Am. Rheum omittit; — B*. et *Par.* Rhei unciam, Sennae semunciam, Croci drachmam unam, Liquiritiae quatuor, Passularum libram, Aquae Vitae octarios tres et octo dies digestionis; — *Gr.* Rhei, Fol. Senn., Sem. Coriandri, Sem. Foen., Coccin., sing. uncias duas, Rad. Glycyrrh., Croci, sing. unam, Uvarum libras duas cum dimid., Spir rectif. congios duos; — vel: (et *Re.*) Rhei unciam, Fol. Sennae sesqui- (semi- *Re.*) unciam, Croci drachmam unam,

Glyzyrrhizae quatuor, Uvar. pass. libram, Spir. Vin. Gallic. libras tres (*Warner's cordial.*)

Reizend und herzſtärkend, bei den Engländern berühmt. — Gabe, vier oder fünf Löffel in irgend einer Tiſane, alle halbe Stunden. Coxe führt dieſes Präparat unter dem Namen *Tinctura Sennae aromatica* an, welchen es auch in der Americaniſchen Pharmacopöe führt. Seine Formel unterſcheidet ſich kaum von einigen derer, nach welchen das elixir salutis bereitet iſt.

Tinctura s. Elixir Daffyi. (B*. *Ca. Sw.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Rhei . . . . . unciam unam.
Foeniculi,
Baccarum Juniperi,
Guajaci, singulorum semunciam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Aquae Vitae . . . libras duas.

Digere per dies octo, saepius agitando et cola. (B*.)

Sw. eandem formulam, sed Aquae Vitae uncias quinque.

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Radicis Jalapae,
Coriandri,
Cremoris Tartari, sing. semunciam.
Sacchari . . . . . uncias sex.
Aquae Vitae semisextarios (demisetiers) tres.

Digere et filtra. — Gabe, eine bis drei Unzen. (*Ca.*)

Elixir polychrestum purgativum. (Br.)

℞. Fol. Sennae mund. unciam unam.
Rhei . . . . . semunciam.
Corticis Citri,
Kali subcarb., sing. drachmas duas.
Alcoholis . . . uncias decem.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo et colaturae adde
Resinae Jalappae drachmas decem.
Spiritus Cochleariae . uncias sex.

Elixir Raulini. (*Ca.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Rhei,
Summitatum Absinthii vulgaris,
— Chamaedryos,
Radicis Gentianae,
Cort. Aurant. amari, sing. unc. duas.
Cascarillae,
Aloës Socotr., sing. drach. unam.
Aquae Vitae (15°) libras quatuor

Infunde frigide per dies octo ad duodecim et filtra. — Purgirend, bei Scrophelleiden empfohlen. — Gabe, ein Eßlöffel vor der Mahlzeit.

D. Auszug durch Weineſſig.

Acetum laxans s. laxativum. (*Pie*)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Cremoris Tartari . semunciam.
Corticis Citri,
Anisi,
Cinnamomi, sing. semidrachmam.
Aceti . . octarium dimidium.

Infunde per horas 24. — Purgirend, beſonders bei innern Blutflüſſen des Darmcanals empfohlen, um das Blut auszuführen.

E. Auszug durch Molken.

Serum Lactis Weissii (*Bo. Ca. Pie. Ra. Va.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsomensis, sing. semidrachmam.
Summitatum florescentium Hyperici,
— Galii lutei, sing. scrupulum unum.
Florum Sambuci quantum sufficit.

Infunde per horas duodecim in loco calido et cola. (*Pie.*)

Bo. et *Ca.* Galii lutei, Florum Sambuci, Hyperici, Tiliae, singulorum scrupulum unum, Sulphatis Sodae, Folliculorum Sennae, singulorum drachmam unam, Seri Lactis bullientis libram unam et post semihorae vel horae infusionem filtrare; — *Ra.* Summit. Hyperici, Flor. Sambuci, sing. scrupulum, Sennae, Galii lutei, Salis Epsomensis, sing. drachmam, Seri Lactis libram et horas 12 infusionis; — *Va.* Follicul., Sulph. Magn., sing drachm. quatuor, Flor. Samb., Summit. Hyperici, Galii lutei, sing. unam, Seri Lact. clarif. unciam, misce infunde leni igne per horas duas et cola.

Nach Zanetti iſt folgendes die einzige authentiſche Formel:

℞. Radicis Aristolochiae longae,
— Filicis maris,
Calendulae, sing. unc. quatuor.
Foliorum Betonicae,
— Pervincae,
— Verbenae,
Florum Serpylli,
— Tiliae,
— Galii,
— Primulae veris,
— Daphnes Laureolae,
— Hyperici,
Visci querni,
Rad. Patientiae,
— Scrophulariae, sing. unc duas.

Cuncta anni tempore apto collecta,

Digitized by Google

mundata, sedulo siccata atque grossiuscule pulverata exacte commisceantur, tunc adde

Pulv. Fol. Sennae mund. unc. sex
et drach. quatuor.

Gabe, zwei Drachmen mit einer Drachme Bitterſalz, Abends und Morgens zu zwei Gläſern abgeklärten Molken gethan; man ſeiht den Trank vorher durch, trinkt ein Glas und nach zwei Stunden das andere, und in der Zwiſchenzeit einen Aufguß von Capillus Veneris.

Dieſes Präparat galt als ein vorzügliches Mittel zur Vertreibung der Milch; man muß zwanzig und ſelbſt dreißig Tage damit fortfahren; gegen den zehnten oder fünfzehnten Tag verſchreibt man ein gewöhnliches Mittel, welches man am Ende der Behandlung wiederholt.

F. Auszug durch Waſſer.

Infusum Sennae s. Cassiae s. Sennae simplex (*compositum* Lon. *Gr.*) (Am. B*. DD. Du. Ed. Fenn. Lon. LonN. Lus. RG. Suec. *Br. C. Fi. Gr. Ra. Re. T. Va.*)

℞. Fol. Sennae mund. drachmas sex.
Aquae bullientis . semilibram.
Macera per horam unam et cola. (B*. Fenn. Suec.)

DD. et *Ra.* Foliorum unciam unum et duodecim Aquae.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Anisi stellati pulv. drach. unam.
Aquae bullientis uncias sedecim.
Digere per horam unam in vase clauso et post refrigerationem cola. (Lus.)

RC. Anisi vel Foeniculi semunciam, Cremoris Tartari drachmas duas et Aquae libram; — *Fi.* Foliorum uncias sex, Anisi sesquiunciam, Cinnamomi drachmas duas, Aquae bull. libras sex; — *T.* Sennae unciam unam, Anisi drachmas duas, Cinnamomi scrupulum unum, Aquae bull. uncias sex, infusionem per horas octo.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Zingiberis pulverati semidrachmam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Post unam horam macerationis cola. (*Br.*)

Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re. Va.* Sennae sesquiunciam (unciam *Va.*), Zingiberis drachmam et Aquae octarium (libram); — Ed. Sennae drachmas sex, Zingiberis scrupulum et Aquae uncias novem; — Am. Cremoris Tartari drachmas duas addit.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cardamomi min. semidrachmam.
Aquae bullientis quantum sufficit ut colaturae unciae sex obtineantur. Stent in digestione per horam unam et post refrigerationem colentur. (Du.)

Laxirend, in Fällen von hartnäckiger Verſtopfung, oder wenn man eine Ableitung auf den Darmcanal machen will.

Mistura cathartica ammoniata. (*Gr.*)

℞. Olei Menthae viridis
guttas duodecim.
Sacchari purificati drachmas tres.
Tritis simul adjice
Infusi Sennae compositi
uncias septem.
Sodae Sulphatis . unciam unam.
Tincturae Sennae
drachmas quinque.
Spiritus Ammoniae aromat.
drachmas tres.

Eine bis zwei Unzen.

Syrupus Sennae s. Cassiae Sennae. (B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fer. HassP. Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Fol. Sennae mund. uncias octo.
Aquae bullientis libras quatuor.
Macera per horas duas, cola exprimendo et colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat blando igne syrupus. (B. Bel.)

Du. Sennae semunciam, Aquae ferv. libram unam, horas 12 macerationis, Sacchari et Mannae, sing. libram unam.

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Macera per horas quatuor in vase tecto, cola et adde
Sacchari liquidi (melasse)
unc. octo.
Coque leni igne ad syrupi consist. (Ed.)

Fi. Sennae unciam, Aquae bull. libram, infusionem per horas 12 et Sacchari libram; — *T.* Sennae et Aquae easdem quantitates, infusionem ad ebullitionem usque et Sacchari duplum pondus.

℞. Foliorum Sennae,
Aquae frigidae, sing. part. unam.
Macera per tres horas et adde
Aquae bullientis . . partes tres.
Post refrigerationem cola, leviter exprimendo, et adde
Sacchari albi . partes quatuor.
Inspissa et despuma. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae bullientis octarium unum.
Macera per horas duodecim et adde
Mannae,
Sacchari, singulorum libram unam.
Fiat syrupus. (*C. Gr.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Foeniculi contusi unciam unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Post horam unam macerationis, blando calore, cola et adde
Mannae . . . . . uncias tres.
Sacchari . . . . libram unam.
Coque sufficienter. (Lon. LonN. *Gr. Re.*)

Gr. Lon. 1809. Sennae unciam, Foenic. drachmam, Aq ferv. libram, Mannae, Sacch., sing. libram; — Fer. Sennae uncias quatuor, Foeniculi drachmas duas, Aquae bullientis libras duas, Mannae uncias sex et Sacchari libras duas; — Bor4. loco foeniculi Anisi semunciam, digestionem per horas aliquot et in liquoris expressi et colati unciis viginti solvere Sacchari libras tres absque manna, caeterum ut Fer.

Infusum Sennae cum Succo Citri s. citratum. (Gen. Suec. *Va.*)

℞. Foliorum Sennae . drachmas sex.
Aquae bullientis . . semilibram.
Macera per horam unam, cola et colaturae adde
Succi Citri . . . . semunciam.
Misce. (Suec. *Va.*)

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Corticis recentis Citri,
Succi Citri, sing. unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Digere et post refrigerationem cola. (Gen.)

Decoctum Prunorum cum Senna. (A*.)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Prunorum . . . . semilibram.
Aquae . . . . . libras duas.
Digere per noctem inter cineres calidos et cola.
Ein gelindes Laxirmittel, welches von Lieutaud empfohlen wird. Taſſenweiſe.

Syrupus Pomorum s. de Pomis compositus s. solutivus. (Gal. Sar.)

℞. Succi Pomor. ferment.
libras quatuor.
Fol. Sennae mund.
unc. quatuor c. dimidia.
Digere per noctem; altero mane cola exprimendo et adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Clarifica et coque ad syrupi consistentiam. (Sar.)

℞. Fol. Sennae mund. semilibram.
Seminum Foeniculi unciam unam.
Caryophyllorum drachmam unam.
Succi Pomor. Renet. depur.
libr. quatuor.
— — Boraginis,
Succi Pomor. Buglossi, sing.
libras tres.
Infunde per horas 24, tunc leviter coque, cola et exprime; residuum iterum coque cum
Aquae communis libris quatuor.
Ad dimidium evaporata cola exprimendo, colaturas ambas commisce et in iis solve
Sacchari albi . libras quatuor.
Coque ad consistentiam syrupi, quem adhuc ferventem supra
Seminum Foeniculi,
Caryophyllor., sing.
sesquidrachmam linteo inclusa infunde et per horas sex digere. (Gal.)

Decoctum antihaemorrhoidale. (*Vm.*)

℞. Foliorum Sennae unciam unam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Post unam horam infusionis adde
Aquae . . . . uncias sedecim.
Calefac per temporis momentum, cola et colaturae adde
Passularum minorum.
Sacchari crudi, sing. uncias duas.
Anisi . . . . drachmam unam.
Post refrigerationem cola et liquori sepositione depurato adde
Rhei,
Cremor. Tart., sing drach. unam.

Syrupus Sennae compositus. s. de Rhabarbaro s. Rhei cum Senna. (Am. *C. Gr. Sw. Vm.*)

℞. Fol. Sennae mund. uncias duas.
Rhei . . . . . semunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Aquae bull. uncias quatuordecim.
Infunde in vase tecto, post refrigerationem cola et colaturae adde
Mannae . . . uncias quatuor.
Sacchari albi . . uncias viginti.
Despuma et per cribrum setaceum trajice. (*Sw.*)

℞ Rhei,
Sennae, singulorum sesquiunciam.
Cardamomi . . drachmas tres.
Aquae bullient's octarium unum.
Digere per horas viginti quatuor et evaporatione ad dimidium consumptis adde
Sacchari . . . . libram unam.
Fiat syrupus. (Am. *C.*)

Gr. Rhei, Fol. Senn., sing uncias duas c dimid., Cinnam. sesquiunciam, Zingib. semidrachmam, Aquae calid. libr. quatuor, macera per noctem, cola et cum Sacch. libr. duabus in syrupum coque; vel: Rhei, Fol. Sennae, Uvar. pass., sing. unc. quatuor, Zin-

gib. drachm. quatuor, Sacch. alb. libr. novem, Aquae congium.

℞. Syrupi Sennae . partes quatuor.
— Rhei . . . . partes duas.
— Cinnamomi partem unam.
Misce. (*Vm.*)

Infusum Sennae et Tamarindi s. Tamarindi cum Senna s. compositum s. tamarindatum s. tamarindinatum s. cum Tamarindo s. cum Tamarindis. (Am. Du. Ed. Suec. *C. Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Foliorum Sennae drachm. unam.
Tamarindorum . unciam unam
Coriandri . . drachmam unam.
Sacchari . . . . . semunciam.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Macera, subinde agitando, per horas quatuor. (Am. Du. Ed. *C*)

Gr. Coriandri semidrachmam. — *Re.* Coriandri et Sacch., sing. semidrachmam?

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Aquae bullientis . . semilibram.
Macera per horam unam, cola et colaturae adde
Pulpae Tamarindorum semunciam.
Dissolve. (Suec.)

Fi. et *T.* Folia et Pulpam cum Aqua bulliente (omnium copiam eandem ut Suec.) per horam infundere et filtrare.

Aqua s. Potio laxativa s. purgans s. Viennensis, Infusum laxativum simplex s. Viennense, Infusum Sennae compositum sine aromatibus s. Foliorum Cassiae Sennae compositum, Decoctum laxativum Viennense, Infusum Sennae tartarisatum s. cum Manna, Potio Angelica, Ptisana laxativa s. passulata, Infusum catharticum s. Sennae laxativum s. purgans, Tisana regia. (A. Am. An. Ba. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. HassP. LH. Li. Lus. Pal. Pm. RC. Sar. Sax. Suec. *Bo. C. Ca. E. Fi. Gr. ParC. Re. Sa. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne ein Salz.

℞. Foliorum Sennae partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Infunde per semihoram, tunc in infuso dissolve
Mannae . . . . partem unam.
Ham. bis coquere Sennae partes tres in Aquae triginta sex et colaturis ambabus addere Mannae partes octo; — Sax. infundere Sennae partem unam in Aquae octo et addere Mannae partem unam cum dimidia.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Mannae . . . . . uncias duas.
Fructum Citri . . . . no. 1.
Aquae tepidae . . uncias octo.
Infunde per horas duodecim et cola. (Fer.)

Pm. Folior. Sennae drachmas tres, Mannae selectae uncias tres, Aquae font. uncias septem, infunde sennam per horam, mannam lento igne dissolve, solutionem cum Ovi Albumine clarifica et adde Succi Limonis semunciam

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cardamomi min. . drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per semihoram et cola. (*E*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Mannae . . . . unciam unam.
Rhei,
Cardamomi min., sing.
drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horam unam. (*E.*)

℞. Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Aquae communis uncias sedecim.
Digere per horam unam, ignem fere ad bullitionem usque augendo; cola et in unciis quatuordecim colaturae dissolve
Mannae . . uncias quatuor.
Cola, sepone et sedulo decantha. (An.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Passularum minorum semunciam.
Cort. Aurantiorum . scrup. duos.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Ebulliant semel, tunc per sexagesimas decem digesta leni cum expressione colentur. (Ful.)

℞. Sennae . . . . . uncias duas.
Mannae . . . uncias quinque.
Aquae bull. . uncias viginti octo.
Digere, blando calore, per horas sex, cola et colaturae adde
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce bene. (Li.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Anisi stellati . scrupulum unum.
Aquae fervidae . uncias quatuor.
Digere per horam in vase tecto, cola et adde
Mannae electae . . uncias duas.
Solve blando calore, clarifica et cola.
Gabe, auf ein Mal. (LH.)

2) Mit Weinsteinrahm.

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Cremoris Tartari . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Macera per horas sex et cola leviter exprimendo. (Sar.)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Post horae quadrantem infusionis cola exprimendo et in colatura solve
Mannae electae . unciam unam.
Sepone et decantha. (A.)

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Anisi stellati . . semidrachmam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Digere per horam unam, cola et colaturae adde
Mannae . . . . . uncias duas.
Dissolve blando igne, sepone et decantha. (Lus)

RC. Foliorum sesquiunciam, Anisi vel Foeniculi semunciam, Cremoris drachmas duas, Aquae libram, absque manna; — Fer. Sennae drachmas tres, Cremoris Tartari unam, Anisi stellati scrupulum, Aquae uncias sex et Mannae unam; — Am. et *C.* Sennae sesquiunciam, Cremoris Tartari drachmas duas, Zingiberis unam et Aquae bull. octarium; — *Fi. T.* Foliorum drachmas sex, Cremoris unam, Aquae bull. uncias sex, post 1, 5 vel 20 sexagesimas infusionis, filtrare, addere Mannae unciam unam, et clarificare Albuminis ope.

℞. Foliorum Sennae drachmas tres.
Cremoris Tartari drachmam unam.
Passularum min. drachmas tres.
Zingiberis albi scrupulum unum.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horas 24 digestionis cola exprimendo et in colatura solve
Mannae electae . unciam unam.
Clarifica Albuminis ope. (Wir.)

℞. Foliorum Sennae . uncias tres.
Passularum minorum sesquiunciam.
Coriandri . . . drachmas duas.
Cremoris Tartari . . semunciam.
Aquae bull. libr. duas c. dimidia.
Macera per horam, cola exprimendo et colaturae adde
Mannae electae . . uncias octo.
Solutionem iterum cola. (Han.)

HassP. Sennae partes sex, Passularum tres, Cremoris unam, Coriandri dimidiam, Aquae fervidae sexaginta octo et Mannae sedecim; — Pal. Wir. *Ca. Sp.* et *Vm.* eandem indicant formulam, sed Radicis Polypodii drachmas tres addunt.

3) Mit Weinsteinkali.

℞. Foliorum Sennae sesquiunciam.
Zingiberis,
Corticis Citri, sing. drach. unam.
Aquae communis uncias duodecim.
Alcoholis tenuis uncias quatuor.
Macera per dies octo, subinde agitando, cola et singulis unciis tribus adde Mannae unciam unam, vel Tartratis Potassae sesquidrachmam, vel Electuarii Scammonii drachmam. (*Sa.*)

℞. Fol. Sennae
drachm. tres ad quatuor.
Cardamomi min. drachm. unam.
Tartratis Potassae drachmas sex.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Digere per horas duas et colaturae adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Foliorum Sennae . sesquiunciam.
Passularum min. . drachmas sex.
Coriandri . . . drachmas duas.
Tartratis Potassae drach. quinque.
Aquae bull. unc. viginti quatuor.
Post aliquot horas digestionis coque leviter, cola exprimendo et colaturae unciis quatuordecim adde
Mannae . . . uncias quinque.
Cola iterum. (D. Suec.)

Br. Sennae sesquiunciam, Passularum tantidem, Coriandri, Tart. solub., sing. semunciam et Mannae uncias quatuor.

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Corticis recentis Citri,
Tartratis Potassae, sing.
drachm. tres.
Succi Citri . . . . semunciam.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Post refrigerationem cola et colaturae adde
Mannae electae drachmas decem.
Solutionem iterum cola et adde
Aetheris sulphurici . guttas octo.
Misce bene. (Wür.)

4) Mit weinsteinsaurem Natron.

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
Tartari natronati drachmas duas.
Mannae . . . . drachmas sex.
Cola iterum. (Bor.)

Bor4. Tartari natronati semunciam et Elaeosacchari Citri drachmam unam.

5) Mit Glaubersalz.

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Post horam dimidiam cola exprimendo et in colatura solve
Natri sulphurici . drachmas sex.
Mellis puri . . . . semunciam.
Cola iterum. (BorC. WW.)

℞. Foliorum Sennae
Sulph. Sodae, sing.
drachm. quatuor.
Anisi . . . . drachmam unam.

Infusi calidi Cichorii octar. unum. Post horas 12 infusionis cola. (*ParC.*)

℞. Foliorum Sennae,
Sulph. Sodae, sing. . semunciam.
Anisi,
Coriandri, sing. . drach. unam.
Fol. concis. Cerefolii,
— — Pimpinellae, sing. semunc.
Aquae frigidae . . libras duas.
Fruct. Citri in taleolas concis. no. 1.

Macera per horas 20, subinde agitando; cola leviter exprimendo et filtra. (Gal. *Re.*)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Foliorum Sennae,
Sulph. Sodae, sing. drachm. quatuor.
Anisi,
Coriandri,
Cerefolii,
Pimpinellae, sing. pugill. unum.
Aquae bullientis octarium unum.

Infunde per semihoram et cola. (*Bo. Ca.*)

℞. Foliorum Sennae partes quindecim.
— Cichorii . partes decem.
Sulphatis Sodae partes decem vel viginti.
Aquae bullientis quantum sufficit.

Post horas aliquot infusionis cola exprimendo et adde

Aquae Citri aromat. part. triginta.

Misce bene. (GalM.)

℞. Infusi Fol. Sennae uncias octo.
Sulphatis Sodae vel Magnesiae drachmas tres.
Mellis crudi . . drachmas duas.

Liqua. (DD.)

6) Mit Bitterſalz.

℞. Passularum minorum uncias duas.
Foliorum Sennae . . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut libra una decocti vel infusi obtineatur; colaturae adde

Salis cathartici amari semunciam.

Dissolve. (Gen.)

Alle dieſe Aufgüſſe führen, je nach den verſchiedenen Fällen oder der Anwendungsweiſe, gelinder oder ſtärker ab. — Die Gabe iſt je nach den Formeln verſchieden, im Allgemeinen von drei bis ſechs Unzen. Auch die folgenden gehören eigentlich hierher.

Infusum catharticum, Potio purgans s. laxans. (Gal. GalM. Hass. HassP Li. Wür. *Au. Bo. Gr. Huf. Pie. Ra. Re. Sa. Sm. Va.*)

1) Ohne ein Salz.

℞. Foliorum Sennae . semunciam.

Aquae bullientis quantum sufficit ut semilibra colaturae obtineatur. Post horae quadrantem infusionis adde

Tinct. Aurant., (sesquidrachmam HassP.)
Syr. Cerasorum, sing. semunciam.

Misce bene. (Hass. HassP.)

℞. Foliorum Sennae . drachmas sex.

Aquae frigidae quantum sufficit ad humectanda folia. Post horas duas adde

Aquae bullientis quantum sufficit ut exprimendo colaturae unciae sex obtineantur; cola liquorem refrigeratum et adde

Syrupi Sacchari . unciam unam.
Tinct. Cort. Aurantiorum semunciam.

Misce. (*Sw*.*)

℞. Infusi Sennae . . . uncias tres.
Aquae Piperis Jamaic. semunciam.
Syrupi Rhamni . unciam unam.

Misce. (*Sa.*)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Folliculorum Sennae drachm. duas.
Tamarindorum . . semunciam.
Florum Persicae pugillum unum.
Aquae fontanae . vitrum unum.

Infunde. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae drachmam unam
Rhei . . . . semidrachmam.
Florum Persicae . semipugillum.
Dec. Polypodii querni unc. octo.

Coque leviter, cola exprimendo et colaturae adde

Mannae . . . . . uncias duas.

Solutionem iterum cola. (*Pie.*)

℞. Mannae uncias duas cum dimidia.
Follicul. Sennae drachmas duas.
Tamarindorum . drachmas sex.
Florum Persicae pugillum unum.
Cort. Aurant. amari semidrachm.
Coffeae Mokkaënsis drachmas duas.
Aquae fontanae quantum sufficit.

Fiat infusum. (*Pie.*)

2) Mit weinſteinſaurem Kali.

℞. Foliorum Sennae . semunciam.
Foeniculi . . drachmam unam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infusi unciae duae cum dimidia obtineantur; colaturae adde

Mannae . . . . unciam unam.
Cremoris Tartari drachmam unam.

Dissolve. (*Au.*)

℞. Sennae mundatae,
Rhei,
Cremor. Tart., sing. drach. unam.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Coque ad unciarum quatuor colaturam et adde

Mannae . . . . sesquiunciam.

Infusi Flor. Persicae unc. unam.
Misce bene. (*Pie.*)

℞. Corticis Aurantii siccati,
Fol. Sennae, sing. drach. unam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis Seignetti . . drachmas sex.
Aquae communis . uncias octo.
Digere, blando calore, per horam unam et adde
Pulpae Tamarindorum uncias duas.
Cola exprimendo. (*Sa.*)

℞. Sennae,
Tartratis Potassae et Sodae,
singulorum drachmas duas.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Fiat infusum, cujus colaturae, pro re nata, adde Chinae drachmam, Syrupi Florum Persicae unciam vel Jalapae pulveratae grana octo. (*Ra.*)

℞. Rhei . . . . drachmam unam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Salis Seignetti . . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae sex obtineantur; colaturae adde
Mannae . . . . uncias duas.
Dissolve. (*Au.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas sex.
Cortic's recentis Citri,
Tartrat neutr. Potass., sing.
drach. tres.
Succi Citri . . . . semunciam.
Rhei . . . . . drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias octo.
Infunde et post refrigerationem cola; colaturae adde
Mannae . . . drachmas decem.
Solutionem cola et adde
Aetheris sulphurici . guttas octo.
Misce bene. (Wür.)

℞. Infusi Sennae . unciam unam.
Tincturae Sennae,
— Jalappae,
Potassae Tartratis,
Syrupi Sennae, sing. drachmam.
Auf eine Gabe. (*Gr.*)

℞. Infusi Sennae . . uncias duas.
Sodae Tartratis uncias (drachmas?) sex.
Aquae Cinnamomi . semunciam.
Auf zwei Mal. (*Gr.*)

3) Mit Bittersalz.

℞. Folliculorum Sennae,
Sulph. Magnesiae, sing.
drach. duas.
Tamarindorum . . semunciam.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut infusi vitrum unum obtineatur. (*Bo.*)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias tres.
Post horam unam macerationis colaturae adde
Sulphatis Magnesiae drachmas tres.
Tincturae Sennae . semunciam.
Misce bene. (*Sw.*)

℞. Sennae . . . . drachmas tres.
Sulphatis Magnesiae semunciam.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Succi Citri . drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Fiat infusio. (*Ra.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Aquae . . . . vitrum unum.
Infunde per semihoram inter cineres calidos et sub finem adde
Mannae uncias duas cum dimidia.
Essentiae Citri quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

℞. Infusi Sennae compositi
uncias quinque.
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Mannae . . drachmas quatuor.
Magnesiae sulphuricae
drachmas sex.
Gabe, ein Weinglas voll. (*Gr.*) (*Common black draught.*) — *Re.* Infusi unciam, Magnes sulph. drachmas duas; Tinct. Opii guttae aliquot addi possunt.

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Salis Epsomensis drachmas tres.
Florum Persicae . pugillos duos.
Mannae . . . . uncias duas.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat infusio. (*Pie.*)

℞. Folliculorum Sennae,
Salis Epsom., sing. . drach. duas.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Tartari stibiati . . granum unum.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat infusio. (*Pie.*)

℞. Infusi Sennae . . sesquiunciam.
Salis Epsomensis drachmas sex.
Tincturae Jalappae,
— Castorei, sing. drachmam.
— Opii . . . guttas decem.
Auf eine Gabe. (*Gr.*)

4) Mit Glaubersalz.

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Fiat infusio. (Gal M. *Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Sulph. Sodae drach. duas c. dimid.
Mannae . . . . uncias duas.
Infu i vel Dec. Cichorii uncias sex.
Fiat infusio. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Paullulum coque et colaturae adde

Sulphatis Sodae . unciam unam.
Syrupi Ribium . . uncias duas.
Misce. (Li.)

Huf. Sennae drachmas duas, Aquae bull. uncias quatuor, horae quadrantem infusionis, Sulphatis Sodae semunciam et Mannae tantidem.

℞. Sennae mundatae,
Sulph. Sodae, sing. drach. duas.
Aquae bullientis . vitrum unum.
Colaturae adde
Mannae in lacrymis uncias duas.
Syr. Cichorii comp. unciam unam et post refrigerationem
Essentiae Anisi . . guttas tres.
Misce. (*Sm.*)

℞. Foliorum Sennae . uncias duas.
Sulphatis Sodae . drachmas duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Pulv. Jalapae gr. viginti quatuor.
Infunde et colaturae pulverem adde (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Fol. drachm. duas, Sulph. Sod. quatuor, Aquae unc. quatuor, Radic. Jalap. pulv. gr. viginti quinque. — Auf zwei Mal.

℞. Sennae mundatae drachmas duas.
Subcarb. Sodae cryst. semidrachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Infunde frigide per horas 12, cola et adde
Acidi sulph. . . guttas 20—24.
Post effervescentiam adde
Syr. de Cichorio comp. unc. quatuor.
Jalapae pulv. cum duplo Sacchari contritae . . grana 12—24.
Aquae Cinnamomi quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

℞. Foliorum Sennae,
Sulph. Sodae, sing. . drach. duas.
Rhei . . . . semidrachmam.
Mannae . . . . sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat infusum vel decoctum. (*Potio vel Haustus purgans communis decoctione vel infusione paratus.*) (Gal. *Re.*)

(Der Aufguß wird bereitet, indem man die genannten Substanzen acht Stunden lang in fünf Unzen kochendem oder dieselbe Quantität zwölf Stunden lang in kaltem Wasser stehen läßt; die Abkochung, indem man die Rhabarber und Senna mit so viel Wasser kochen läßt, daß die Colatur fünf Unzen beträgt, worin man dann das Salz und die Manna auflöst. Man kann die Abkochung abklären, daß man sie zwei Minuten lang mit einem zu Schaum geschlagenen Eiweiß kochen läßt, indem man der Flüssigkeit, wenn sie in's Kochen kommen will, zwei Drachmen Citronensaft zusetzt, hierauf sie vom Feuer nimmt und filtrirt. Auch kann man Pfeffermünz-, Pomeranzenblüth- und Zimmtwasser zusetzen.)

℞. Folliculorum Sennae drachmas tres.
Rhei . . . . drachmam unam.
Ipecacuanhae . . grana decem.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque et adde
Mannae,
Sulph. Sodae, sing. drach. duas.
Liquorem cola. (*Pie.*)

Selway's prepared Essence of Senna (*Re.*): Infusum Sennae concentratum cum Alcali aliquo.

Infusum catharticum pro clystere, Clyster s. Enema laxans s. purgans. (GalM. *Gr. ParC. Ra.*)

℞. Sennae . . . . . uncias duas.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque et cola. (*Ra.*) — Addere potes Sulphatis Sodae semunciam et Mellis comm. uncias tres vel quatuor

ParC. Sennae drachmas quatuor, Aquae libram et Mellis Mercurialis annuae uncias duas.

℞. Sennae . . drachmas quatuor.
Sulphatis Sodae . drachmas sex.
Aquae . . . quantum sufficit.
Fiat decoctum (GalM.) — Addantur si necesse est Tartari stibiati grana duo vel tria.

Gr. Foliorum Sennae drachmas tres, Salis Glauberi unciam, Aquae ferventis libram, exprime

Clyster s. Enema Sennae (*Va.* Char.): Sennae drachm. duas, Aquae bullientis libram.

Clyster s. Enema purgans (*Va.* Hosp. Ven.): Fol. Sennae drachm. quatuor, Decocti Sem Lini libram, infunde et cola.

Enema purgans pictorum (*Va.* Char.): Sennae semunciam, Aquae libram, coque, cola et adde Sulph. Sodae semunciam, Vini emet. unc. quatuor, misce. Bei Metallkolik.

Enema laxans (*Va.* Hôt. D.): Follic. Sennae semunciam, Specier. emollient. unc. duas, Sulph. Sodae drachm. duas, Aquae bull. q. s., infunde et cola.

Mixtura Sennae composita. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Sennae,
Menthae viridis, sing. unciam unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde, cola et adde
Sulphatis Magnesiae . uncias sex.
Misce. — Zwei bis vier Drachmen.

Potio purgans vermifuga. (*Pie. Sm.*)

℞. Sennae mundatae drachmas duas.

Coffeae tostae pulv. pugillos duos.
Lactis,
Aquae, singulorum quantum sufficit.
Coque et cola. (*Pie.*)

℞. Sennae mund.
drach. duas ad quatuor.
Helminthochortos drachmam unam
Fruct. Citri in taleol. concis. no. 1.
Mannae . . . . . uncias duas.
Aquae bullientis . vitrum unum.
Post 12 horas infusionis cola. (*Sm.*)

℞. Sennae mund. drach. duas ad tres.
Seminis Contra pugillum unum.
Subcarb. Potassae drach. unam.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Post horas duodecim infusionis inter cineres calidos adde
Mannae . . . . uncias duas.
Tartari stibiati . . grana duo.
Cola. (*Pie.*)

Potio purgans camphorata. (DD.)

℞. Infusi laxativi (DD.) uncias duas.
Mixturae camph. acid. uncias sex.
Misce.

Julep diatartareum. (B*.)

℞. Sennae mundatae . uncias sex.
Zingiberis,
Galangae, sing. . drachmas tres.
Infusi Rosarum pallid. libras tres.
Infunde in balneo aquae tepido, per horas 24 in vase tecto, tunc parumper coque; cola, clarifica et adde
Sacchari albi . . . uncias octo.
Cremoris Tartari . semunciam.
Olei Anisi . . semiscrupulum.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus vermifugus et purgans. (*Ca.*)

℞. Sennae mundatae . semilibram.
Seminum Cinae,
Helminthochortos,
Rhei, singulorum uncias quatuor.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Cinnamomi . . . uncias duas.
Sacchari . . libras viginti sex
Gabe, eine bis anderthalb Unzen.

Potio purgans et febrifuga. (*Bo.*)

℞. Chinae,
Folliculorum Sennae,
Cremoris Tartari, sing.
drach. duas.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Flor. Chamomillae pugill. unum.
Aquae . . . . vitrum unum.
Infunde et in infuso solve
Tartari stibiati . granum unum.

Apozema purgans. (Gal. *Ca.*)

℞. Fol. rec. Cichorii,
— — Buglossi,
Fol. rec. Boraginis, sing.
unc. unam.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Fol. Sennae mund. drach. duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde per horam unam, cola et colaturae adde
Syrupi Sennae . unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

℞. Fol. Cichorii,
— Taraxaci,
— Parietariae, sing. unc. unam.
— Sennae . . drachmas tres.
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Pimpinellae,
Cerefolii,
Coriandri, sing. pugillum unum.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque leviter per horae quadrantem, cola et adde
Syrupi Cichorii . . uncias duas.
Misce bene. (*Ca.*)

Glasweise des Morgens bis zur erfolgten Wirkung.

Decoctum pectorale solutivum. (*Vm.*)

℞. Seminum Anisi . semidrachmam.
Radicis Liquiritiae,
Fol. Hyssopi, sing. drach. unam.
— Sennae . . drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias sex.
Infunde frigide, cola exprimendo et adde
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Decoctum anticachecticum. (*Sw. Sy.*)

℞. Rad. et Fol. rec. Cichorii,
— — — Acetosae,
— — — Fragariae,
— — — Calcitrapae,
— — — Violarum,
Flor. Nymphaeae albae, sing.
unc. unam.
Petal. Rosarum rubr. unc. duas.
Radicis Parietariae . semunciam.
Aquae . . . . libras duodecim.
Decoque ad librarum octo remanentiam et liquori bullienti adde
Foliorum Sennae uncias quatuor.
Anisi,
Nitri, singulorum . semunciam.
Post horas infusionis 24 cola.

Einschneidend und blutreinigend, bei Dysurie, Ischurie, kalten Geschwülsten, hartnäckigen venerischen Uebeln, Scropheln und chronischen Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe, acht Unzen nüchtern in vier Tagen und dann alle zwei Tage, drei Wochen hintereinander. Ist der Kr. stark, so kann man bis auf zehen und selbst zwölf Unzen steigen.

Sericum.

Sericum crudum, *Serici folliculi*; Seidenbälglein, rohe Seide; Soie, Cocon de soie (*Gal.*); Capullo de seda (*His.*).

Gal. His. His3. Wir. *G. Gr. Sp.*

Ein eirunder Balg von dichtem, sehr feinem Seidengewebe, meist von schön gelber, bisweilen weißer Farbe, welchen die Raupe des Seidenspinners (Bombyx Mori, L.), eines Nachtfalters (Nocturna, Bombycites, *Latr.*), welcher ursprünglich in Asien zu Hause ist, webt, um sich darin einzupuppen. (*Roes.* Ins. III. VII. IX. *Bert.* Bild. I. 5.)

Serum.

Serum Lactis. *Serum Lactis vaccinum*; Molken; Petit-lait (*Gal.*); Soro (*Lus.*).

Gal. LP. *Va.*

Der seröse, wässerige, von dem Käse und Fett geschiedene Theil der Milch.

Serum Lactis depuratum s. clarificatum. (*Fi. Gr. T.*)

℞. Seri Lactis vacc. rec. libr. unam.
Albumen Ovi . . . . . no. 1.

Coque in vase cupreo, stanno obducto et post despumationem cola.

T. Seri uncias viginti, Albumen Ovi cum seri circiter unciis duabus in spumam conversum, Cremoris Tartari grana aliquot vel Succi Limonum guttas aliquot coquere per pauca momenta et ab igne remotis immergere Corticis Citri vel Limonum frustula aliquot; — *Gr.* Lactis octarios sex, Casei stom. vitul. q. s. stent loco calido per horas aliquot, exprime, adde Albumina Ovorum no. 3 et Cremoris semidrachmam, coque et filtra per chartam.

Serum Lactis pulveratum. (B*. Br)

℞. Sacchari Lactis drachmas duas.
— albi . . unciam unam.
Gummi Arabici semidrachmam.

Misce. — Solve, si requiritur, in Aqua.

Serum Lactis dulce Hoffmanni. (Br.)

℞. Lactis vaccini . . quantum vis.

Evaporet ad siccum in pelvi cuprea stanno bene obducta, blando igne et sub continua agitatione; partem oleosam, pulveri plerumque supernatantem separa, tunc adde Aquae bullientis eandem quantitatem quantum lactis adhibueras; coque parumper, blando igne et filtra.

Serum Lactis praeparatum s. dulce s. sincerum. (B*. Bor4. Fer. Ful. Gal. Hass. His. His3. Li. Lus. Suec. *Gr.*)

℞. Lactis bullientis . libram unam.
Casei stomachi vitulini (présure),
Aquae diluti . drachmam unam.

Coque, cola, adde Albumen Ovorum trium in spumam conversum: ebulliant semel, tunc per linteum trajice. (B*. Fer. Ful. Hass.)

Bor4. Lactis vacc. rec. libras duas, Stomachi vitulini exsicc. et per horas sex Aquae comm. frig. unciis tribus immersi drachmam, una cum aqua maceratione adhibita, expone leni calori et digere, donec coagulatio facta sit; liquorem decantha et cola

℞. Lactis vaccini . partes bis mille.
Casei stomachi vitul. Aquae pauxillo diluti partes duas c. dimidia.

Supra cineres calidos ponantur et simulac lac coagulare coepit, ignem gradatim auge sed non ad bullitionem usque, ita ut pars caseosa magis magisque concrescat, serum deinde alii vasi infunde, coagulum vero craticulae vimineae imponatur, ut serum penitus exstillet, quod priori admisceatur. (Gal. Li. Lus. Suec.)

Gr. Lactis octarios duos, Coaguli semidrachmam in Aquae bull. parvam copiam infusam, mixta et blando calore per aliquot horas exposita, tum expressa; — His. His3. loco coaguli e stomacho vitulino Flores Scolymi Cynarae Cardunculi adhibent.

Serum Lactis dulcificatum. (Bor4.)

℞. Lactis vaccini . . . libras tres.
Coque et sub initio bullitionis adde
Tartari depurati drachmam unam.

Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola et cum
Album. Ovor. in spumam red. q. s. ad albuminis coagulationem usque coque. Colato adde
Concharum praep. quantum ad neutralis. acidi requiritur
et filtra.

Serum Lactis chalybeatum. (Br)

℞. Seri Lactis . . . quantum vis.

Extingue in illo pluries Ferrum rubro-excandescens et filtra deinde.

Serum Lactis vinosum. (Br. Ful. Hass. Li. Lus. *Au. Br. E. Gr. Sa. Sm. Sw.*)

℞. Lactis vaccini . octarios duos.
Vini albi aciduli . uncias octo.

Coque simul, post coagulationem cola et clarifica. (Br. Ful. Hass. *Sm.*)

Li. Lactis partes tres et unam Vini; — *E.* Lactis semioctarium et Vini albi unciam unam ad duas.

℞. Lactis vaccini,
Aquae, singulorum . libras duas.

Vini Rhenani . . sesquiunciam.
Coque simul, cola et post coagulationem clarifica. (*Sw.*)

Gr. Lactis libras duas, Aquae font. unam, coque et adde Vini albi semioctarium

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.
Vini albi . . . . uncias octo.
Coque parumper, cola et Albuminis ope clarifica. (*Sa.*)

Lus. et *Sm.* Lactis uncias octo et Vini libras duas; — *Au.* Seri Lactis libras tres et unam Vini.

Serum Lactis acidum s. clarificatum s. diluens s. tartarisatum. (B*. Bor4. Br. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lus. Suec. *Gr. Ra. Sp. Vm.*)

℞. Lactis vaccini . octarios duos.
Cremoris Tartari scrupulos quatuor.
Coque lac et deinde sal superspargе; ab igne remove et spatulae ope hic et illic ac lente liquorem agitando, sepone, et post refrigerationem per pannum laneum (Flanell) trajice, in colatura Albumen Ovi unius in spumam conversum prope ignem repone et simulac ebulliat, faecibus sepositis superinfunde. (B*. Br. GalM. Hass. *Sp. Vm.*)

LH. Lactis libram, coque et dissolve Cremoris semidrachmam; cola. — Gabe, auf zwei Mal; — Li. Lactis partes octodecim et unam Cremoris Tartari; — Ful. Lactis triginta sex et unam Cremoris Tartari; — HassP. Lactis libras quatuor, Cremoris scrupulos quatuor ad sex, sero colato adde Albumina Ovorum no. 2., ebulliant deinde et filtrentur; — Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed absque conchis; — *Gr.* Lactis sesquilibram, Cremoris sesquiunciam.

Loco cremoris tartari Acetum vel Succus Citri adhiberi potest. (Han. Hass. *Ra.*)

℞. Seri Lactis . . libras quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Cremor. Tart. gr. viginti quatuor.
Subige albumina cum seri pauxillo, adde hujus quod restat, coque et simulac bullire incipiant, cremorem tartari sensim adde, liquorem agitando; tunc cola et filtra. (Gal. His. Lus. Suec.)

His8. Seri libram, Cremoris semiscrupulum, Albumen Ovi unius.

Serum Lactis aluminatum s. aluminosum. (Bor4. HassP. RC. *Fi.*)

Loco cremoris Aluminis crudi pulv. eadem copia adhibetur; — RC. *Fi.* Lactis libram, Aluminis drachmam.

Serum Lactis acetosum. (RC. *Sa. Sw.*)

℞. Lactis vaccini,
Aquae fontanae, sing. libras duas.
Coque et adde
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Postquam coagulum ortum est, cola.
RC. Lactis, Aquae, sing. libram, Acidi acetici impuri unciam; — Aceto substitui possunt subinde Cremoris Tartari drachmae duae vel Vini albi aciduli semilibra vel pro re nata inter coquendum: Fructus Amlycae Indicae si praesto est, sesquiuncia vel Succi antiscorbutici unciae duae.

Serum Lactis compositum. (Bo.)

℞. Seri Lactis acidi
libr. duas. c dimid.
Succi recentis Citri unciam unam.
Conserv. Rosar. vitriol. drach. sex
Misce.

Serum antiscorbuticum. (*Fi.*)

℞. Lactis vaccini rec. libram unam.
Succi antiscorbutici uncias quatuor.
Coque et post coagulationem cola. — Gabe, drei bis ſechs Unzen.

Serum Lactis depurans. (LH.)

℞. Fumariae recentis,
Sarsaparillae, sing. unciam unam.
Aquae . . . . . libram unam.
Coque ad remanentiam
librae dimidiae
ultimis bullitionibus adde
Lactis vaccini . . . semilibram.
Dissolve inter fervendum
Cremoris Tartari semidrachmam.
Cola. — Gabe, auf zwei Mal.

Sesamum.

Sesamum orientale, L.; Geſam; Sèsame d'Orient (*Gal.*)
Am. Gal. His. His8. RC. Wir. *A. C. Gr. M. Re. Sp.*

⊙ (Didynamia Angiospermia, L.; Bignoniaceae, J.) Eine Pflanze Syrien's und Aegypten's (*Burm.* Zeyl. t. 38. f 1.)

Man wendet den Saamen, Geſam; Sesamum; *Σησαμον*; Sésame (*Gal.*); Sesamum (*Ang.*); Sesam (*Bel.*); Sumsum (*Ar.*); Ellu (*Can.*); Tal (*Guz.*); Till (*Hin.*); Kunjid (*Pe.*); Taila (*Sa.*); Yellu (*Tam.*); Nuwulu (*Tel.*) an. Er iſt eirund, gelb, ölig, von ſüßem angenehmem Geſchmack.

Oleum (Seminum) Sesami orientalis. (His. His8 Pal. RC. *Gr. T.*)

℞. Seminum Sesami . quantum vis.

Contunde in mortario et exprime. (His. His3.)

Pal. antequam prelo subjiciantur, semina paullo torrere jubet.

Mit diesem darf ein anderes Oleum Sesami (*Gr.*) nicht verwechselt werden, welches von Myagrum sativum bereitet und zu Salben benutzt wird.

Seseli.

Unter diesem Namen werden angeführt:

1) *Tordylium officinale, L.*; Cretisches Seseli; Seséli de Crète (*Gal.*).

Br. His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Sp. Z.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze Südeuropa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 278.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Tordylii s. Seseli Cretici s. montani) ist lang, dünn, faserig und weiß. — Der Saame ist lang, fast platt, rauh anzufühlen, mit drei hervorstehenden Linien bezeichnet und mit einem weißen Rande versehen. Er hat einen gewürzhaften Geruch und einen eben solchen aber schwachen Geschmack.

Reizend.

2) *Seseli tortuosum, L.*; büschelblättriges Seseli; Séséli de Marseille (*Gal.*); Comino de Marsella (*Lus.*).

Br. Gal. His. His3. Wir. *G. Gr. M.*

♂ oder ♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des südlichen Europa's (*Reyn.* Bot. t. 313.)

Man wendet den Saamen (semen Seseleos Massiliensis) an; er ist langgestreckt, gestreift, grünlich, von gewürzhaftem Geschmack.

3) *Peucedanum Silaus, L.*; Silau, Mattensteinbrech; Séséli des prés, Saxifrage des Anglais (*Gal.*); Meadow solphurwort (*Ang.*); Weld minuin (*D.*); Haair streng (*Bel.*).

Gal. *Gr. Re.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze Südeuropa's. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Seselios pratensis s. Saxifragae Anglicae s. vulgaris) ist groß, dick, oft gabelig und unten mit einem Büschel Haare versehen. — Der Saame ist auf der einen Seite platt, auf der andern gewölbt und mit fünf Streifen bezeichnet. Geruch und Geschmack sind scharf und gewürzhaft.

Gr. führt noch mehrere unter diesem Namen vorkommende Pflanzen an.

Silene.

Von dieser Pflanzengattung finden sich:

1) *Silene Otites, Cand.*; feldliebender Taubenkropf; Silène Otites (*Gal.*); Field campion (*Ang.*).

Br. Wir.

♂ (Decandria Trigynia, L.; Caryophylleae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 518.)

Man wendet das Kraut (herba Viscaginis) an: es besteht aus einem einfachen, klebrigen Stängel mit wenigen Blättern, von denen die untern spatelförmig, die obern lanzett- oder linienförmig sind. Es hat einen adstringirenden und etwas bittern Geschmack.

2) *Silene Virginica, L.*; Virginischer Taubenkropf; Silène de Virginie (*Gal.*). *C. Gr.*

♃ Eine in Virginien einheimische Pflanze.

Die Wurzel welche man anwendet, gilt für ein Wurmmittel.

Simaruba.

Simaruba amara, Aublet, Quassia Simaruba; Simarubarinde, Ruhrrinde; Simarouba (*Gal.*); Simaruba (*His. I.*); Cimarruba, Simarouba (*Lus.*).

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par., Pid. Re. Sp. Va. Z.*

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, *Cand.*) Südamerica's. (*Aubl.* Guian. t. 331. 332. *Lam.* III. gen. t. 343. f. 2. *Desc.* Fl. méd. d. Ant. t. 14. Fl. méd. VI. 327.)

Man wendet die Rinde (cortex Simarubae) an: sie besteht in langen, eingerollten, dünnen, biegsamen, zähen, faserigen, äußerlich gleichsam warzigen, blaßgelben, inwendig gelblichgrauen, geruchlosen Stücken. Sie hat einen bittern Geschmack.

Man nimmt fast immer die der Wurzel, selten die des Stängels.

Sie enthält, nach Morin, Quassiastoff, einen harzigen Stoff, ein flüchtiges Oel, Aluminium, Aepfelsäure, etwas Gallussäure und verschiedene Salze.

Tonisch, bei Wechselfiebern und Schleimflüssen aller Art. — Gabe des Pulvers, von einem Scrupel bis zu einer halben Drachme.

Decoctum Simarubae s. Corticis Simarubae. (B* Ful. GalM. Gen. *Sa. Sw.*)

℞. Corticis Simarubae . semunc. am.
Aquae . . . . quantum sufficit

ut post coctionem librae duae colaturae obtineantur. Coque per horae quadrantem. (GalM.)

B*. Corticis drachmas duas ad semunciam, Aquae libras duas ad remanentiam unciarum octo; — *Sa.* Radicis drachmas duas ad semunciam, Aquae sesquilibram ad librae unius remanentiam; — *Sa.* Radicis drachmas duas, Aquae libras duas ad dimidii remanentiam; — Geu. Rad. drachmas duas et Aquae libram ad unciarum duodecim remanentiam; — Ful. Corticis semunciam et Aquae libram ad octo unciarum remanentiam.

Gabe, eine Unze, alle zwei oder drei Stunden, oder vier Unzen täglich drei Mal.

Infusum Simarubae. (B*. Lon. LonN. *C. Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Corticis Simarubae semidrachmam.
Aquae bullientis . semioctarium.
Macera per horas duas in vase leviter tecto et cola.

T. Simarubae semidrachmam, Aquae bullientis uncias sex. — Bitter, gewürzhaft.

Haustus adstringens, Potio adstringens. (*B. Va.*)

℞. Corticis Simarubae semunciam.
Aquae q. s. (unc. duodecim *Va.*) ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Emuls. gummos. (Mucil G. Arabici *Va.*) . . . uncias duas.
Tincturae thebaicae guttas viginti.

Allmälig zu nehmen, bei sogenannter atonischer Diarrhöe.

℞. Corticis Simarubae . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur. Colaturae adde
Tinct. thebaicae . scrup. unum.
Alcoholis . . . unciam unam.
Aquae Cinnamomi . semunciam.

Wie den vorhergehenden Trank und in denselben Fällen zu nehmen.

Sinapis.

Man findet in den Pharmacopöen:

1) *Sinapis alba, L.;* weißer Senf; Mostrich; Moutarde blanche (*Gal.*)

Bor. D. Du. Ed. Gal. Han. Li. Pal. Wir. *E. G. Gr Re Sp. Va.*

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 92.)

Man wendet die Saamen (semen Sinapis s. Sinapios albae s. Erucae) an; sie sind klein, rund, gelblich, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

2) *Sinapis nigra, L.;* Senf; Moutarde noire (*Gal.*); Mustard (*Ang.*); Sennep (*D.*); Mostaro (*His.*); Mosterd (*Bel.*); Senapa, Senevra (*I.*); Gorczyca czarna (*Lus.*); Mostarda (*Lus.*); Senap (*Succ.*)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.*

⊙ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 416. *Plenck* t. 524. *Hayne* VIII. t. 40. Düss. off. Pfl. XIII. 22. *Bert.* Bild. II. 77. f. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 152.)

Man wendet den Saamen (semen Sinapis s. Sinapios nigrae s. Erucae nigrae) an; er ist sehr klein, rundlich, schwarz, oder schwärzlichbraun, von flüchtigem Geruch und scharfem, bitterem Geschmack.

Beide Arten Saamen sind stark reizend. Man zählt sie zu den antiscorbutischen Mitteln. — Henry und Garrot haben in denselben Schwefelsenfsäure gefunden, welche mit der Schwefelsäure Aehnlichkeit hat, aber sich durch ihre Grundbestandtheile unterscheidet.

Gr. führt außer diesen noch *Sinapis arvensis, dichotoma, ramosa, Sinensis* ꝛc. an.

Die Saamenschaalen des schwarzen Senfs geben ein Oel (Oleum Sinapis (*Gr.*), welches gegen Rheumatismen dient. — S. dichotoma, ramosa, glauca, Sinensis und tori geben süßes Oel.

Unguentum Sinapis. (*Au.*)

℞. Seminum Sinapis . uncias tres.
Olei Amygdalarum . semunciam.
Succi Citri * . quantum sufficit.

Von Frank bei Ecchymosen gerühmt.

Boli ad paralysin s. stimulantes. (*Ca. Sa. Sw. Va.*)

℞. Seminum Sinapis semidrachmam.
Carvi,
Cinnamomi, sing. grana quatuor.
Zingiberis . . . . grana duo.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat bolus. (*Sa.*)

Ca. Sw. Va. omisso zingibere Syrupum Zingiberis loco simplicis.

Zwei Mal täglich, bei Lähmung.

Electuarium Sinapis. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Semin. Sinapis contus.
unciam unam.

Flor. Sulph. lot. drachmas duas.
Syrupi Cort. Aurant. unc. unam.

Electuarium antiscorbuticum. (*Vm.*)

℞. Pulveris Cinnamomi,
— Sinapis, sing. partem unam.
Corticis Aurantiorum,
Extracti Trifolii, sing. partes duas.
Conservae Beccabungae,
— Armoraciae,
— Cochleariae,
— Nasturtii, sing. partes tres.
Misce sedulo.

Cataplasma epispasticum s. irritans s. Sinapis s. Sinapis discutiens s. Sinapeos, Linimentum rubefaciens, Sinapismus communis s. irritans. (Bor4. Br. DD. Du. Fer. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His8. LH. LP. Lon. LonN. LP. Lus. Pm. RC. Sax. WW. *Au. Br. C. Ca. E. Fi. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Seminum Sinapis grossiuscule pulv. (uncias quatuor) q. vis.
Aceti . . . . quantum sufficit ut pasta satis spissa fiat. (DD. Gal. GalM. Han. *Ca. E. ParC. Ra. Va.* Hosp. Paris.)

HassP. Pulveris Sinapis partes quinque, Aceti crudi tres.

Die Quantität des Senfs wechselt von anderthalb bis vier Unzen.

Va. Hosp. Mat. ut majorem vim attingat, Salis Ammoniaci uncia una inspergi potest.

℞. Farinae Sinapis,
Micae Panis, sing. . partes aeq.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta mediocris consistentiae. (LH. LP. Lus. *Br.*)

Sw. et *Vm.* Sinapis partem unam, Fermenti duas et Aceti calidi q. s.

℞. Fermenti,
Farinae Sinapis, sing. partes aeq.
Aceti simpl. vel scill. . . q. s. ut fiat puls spissa. (Sax.)

Ra. Va. Hosp. Ven. Fermenti partes quatuor et unam Sinapis; — *Fi. T.* Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Aceti q. satis.

℞. Fermenti acerrimi . uncias sex.
Seminum Sinapis subtil. pulv. uncias tres.
Salis communis . . semunciam
Aceti optimi . . quantum satis ut fiat sinapismus. (Pm.)

℞. Farinae Sinapis,
— Seminis Lini, sing. semilibram.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Commisce. (Lon. LonN. *Re.*)

Ra. Va. Hosp. Inf. et Char. Cataplasmatis Farinae Lini uncias quatuor et Farinae Sinapis semunciam (*Sinapism. mitigatus*); — Du. et *C.* Sinapis, Micae Panis, sing. semilibram, Aceti q. s. et si requiritur Armoraciae uncias duas; — WW. Farinae secalitiae partes quatuor, Sinapis duas et Aceti q. s.; — Bor4. Farinae Sinapis unciam, Farinae Secalis semunciam, Aceti q. s., ut fiat emplastrum mollioris consist.; — *Sw.* Farinae secalitiae partes duas, Sinapis tantidem et Aquae q. s.; — *Sa.* Farinae triticeae, Farinae Sinapis, sing. partes duas et Aceti q. s.: — RC. Sinapis, Farinae avenaceae, vel triticeae, vel Micae Panis, vel Fermenti, sing. part. aeq., Aceti q. s.

℞. Farinae avenaceae uncias quatuor.
Aceti . . . . . uncias sex.
Coque ad consistentiam cataplasmatis, sub finem addendo
Pulv. Flor. Sambuci uncias tres.
— Semin. Sinapis drach. tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Rad. Armoraciae recent., Sinapis, Aquae q. necessarium et sufficiat ut fiat sinapismus. (*Gr.*)

℞. Fermenti,
Radicis Armoraciae rasae,
Sinapis contus., sing. sesquiunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Misce simul. (Han.)

GalH. et *Sw.* Farinae triticeae partes quatuor, Farinae Sinapis tantidem, Armoraciae unam et Aceti q. s.

℞. Fermenti,
Sinapis, singulorum . uncias tres.
Piperis nigri contusi unc. unam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta. (Hass. HassP.)

Han. Sinapis sesquiunciam, Piperis drachmam, Armoraciae, Fermenti, sing. unciam et Aceti q. s.; — *Ca.* Sinapis semilibram, Piperis, Zingiberis, sing. drachmam et Oxymellis q. s.

℞. Fermenti . . . . uncias duas.
Salis culinaris,
Farinae Sinapis, sing. semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta. (Fer.)

Fi. Fermenti uncias sex, Farinae Sinapis unam, Salis marini semunciam, Aceti fortis q. s.; — *T.* Fermenti uncias quatuor, Sinapis duas, Salis semunciam, Aceti q. s.

℞. Fermenti acris . . sesquiunciam.
Farinae Sinapis . uncias quatuor.
Salis Ammoniaci drachmam unam.
Herb. Rutae contus. semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit ut fiat pasta mollis. (His. His3.)

RC. Farinae avenaceae, vel Micae Panis, Sinapis, sing. uncias duas, Ar-

moraciae sesquiunciam, Salis Ammoniaci semunciam, Aceti q. s.

℞. Fermenti,
Saponis nigri, sing. . drach. duas.
Sinapis,
Herb. Rutae contus., sing. semunciam.
Ceparum contusar. unciam unam.
Salis culinaris . . semunciam.
Aceti . . . . quantum sufficit.
Fiat pasta mollis. (Br.)

LP. Sinapis uncias duas, Micae Panis tantidem, Allii contusi semunciam, Saponis nigri unciam unam, Aceti q. requiritur. (*Cataplasma Sinapis compositum*)

Mustard embrocation for horses (*Re.*): Farinae Sinapis uncias quatuor, Solut. Ammoniae sesquiunciam, Ol. Terebinth. unciam, Aquae q. s. ut f. mistura cremoris consistentiae. — Aeußerlich bei Lungenentzündung.

Oleum Sinapis nigrae (*Re.*) ex epidermide Sinapis nigrae Seminum.

Aqua Sinapis. (Wür.)

℞. Seminum Sinapis . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Macerata per horas 24 et destillentur.

Oleum Seminum Sinapi infusum. (B*.)

℞. Pulveris Sinapis ab oleo expressionis ope liberatae unciam unam.
Olei ess. Rorismarini unc. octo.
Post tres dies digestionis filtra. — In Einreibungen auf gelähmte Theile.

Vinum Sinapios, Collutorium Sinapi. (Wür. *Au.*)

℞. Semin. Sinapis contus. semunciam.
Vini . . . . . libram unam.
Post sex horas macerationis decantha. (Wür.)

℞. Seminum Sinapis unciam unam.
Vini albi . . . . libram unam.
Post sex horas infusionis cola et colaturae adde
Tincturae Cinnamomi uncias duas.
Misce. (*Au.*)

Speichelabsonderung befördernd, auch innerlich bei Wassersuchten.

Serum Lactis sinapinum s. cum Sinapi. (B*. Ful. Hass. Li. Lus. RC. *Gr. Sa. Sw.*)

℞. Lactis vaccini . . . libras duas
Semin. Sinapis contus. unc. duas.
Coque, donec coagulum in fundum vasis descendit et filtra. (B*. Hass. Li. *Gr. Sa.*)

Lus. Sinapis unciam unam, Lactis libras duas; — Ful. Sinapis sesquiunciam, Lactis libras duas.

℞. Lactis vaccini . . libram unam.
Seminum Sinapis unciam unam.
Tritura simul paullatim; adde deinde
Vini Rhenani . quantum sufficit.
Coque, ut in coagulum abeat et cola. (*Sw.*)

RC. Sinapis unciam, Lactis libram, Aceti vel Vini Rhenani quantum sufficit.

Reizend, bei Gliederreißen, Gicht und Lähmung empfohlen. — Gabe, ein oder zwei Pfund, die Nacht über zu verbrauchen.

Cerevisia diuretica. (*Ca. Sa. Vm.*)

℞. Cerevis. Ale dict. octar. quadraginta.
Seminum Sinapis,
Bacc. Juniperi, sing. semilibram
Seminum Dauci . . uncias sex.
Post plures dies infusionis cola. (*Ca.*)

Sa. Sinapis, Bacc. Juniperi, sing unciam, Dauci drachmas tres, Absinthii duas et Cerevisiae octarios octo; — *Vm.* Dauci partem unam, Sinapis duas, Bacc. Juniperi duas et Cerevisiae fortis sexaginta quatuor.

℞. Radicis Armoraciae,
Semin Sinapis, sing. unc. unam.
Baccarum Juniperi,
Subcarb. Potassae, sing. drachm. sex.
Cerevisiae fortis . . libras sex.
Macera frigide per dies quatuor et cola.

Bei Blasencatarrhen und Wassersuchten.

Cerevisia aperiens s. aperitiva. (*Sa. Sw.*)

℞. Sinapis nigrae . unciam unam.
Aristolochiae longae drachmas sex.
Centaurii minoris drachmas duas.
Sabinae . . . drachmam unam.
Cerevisiae levis . octarios octo.
Post quatuor dies macerationis cola.

Cerevisia stimulans. (*Sw.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Sinapis nigrae . . drachmas sex.
Serpentariae Virg. . drach. tres.
Foliorum Rorismarini semunciam.
Cerevisiae levis . . libras octo.
Macera frigide per dies duos et cola.

Gargarisma sialagogum. (*Sp.*)

℞. Aquae Angelicae,
— Hyssopi, sing. uncias sex.
Spiritus Cochleariae semunciam.
— Salis Ammon. scrup. quatuor.
Pulveris Sinapis drachmam unam.
Mellis rosati . uncias quatuor.

Gargarisma adstringens. (*Pic.*)

℞. Seminum Sinapis drachmam unam.
Aceti rosati,
Sacchari albi, sing. unciam unam.
Aquae . . . . . uncias tres.

Collutorium excitans. (B°.)

℞. Pulveris Sinapis sesquidrachmam.
Aceti . . . . . unciam unam.
Aquae fontanae uncias quatuor.

Balneum vel Pediluvium vel Manuluvium sinapinum, irritans. (LH. *Va.* Hosp. Paris.)

℞. Pulveris Sinapis . . uncias tres.
Aquae ferventis quantum sufficit ut fiat pedi- vel manuluvium.

Va. Farinae Sinapis uncias quatuor, Aquae tepidae q. s. — Durch lauwarmes Wasser wird die Wirkung anhaltender.

Whitehead's Essence of mustard (*Gr. Re.*) constat. sec. *Brande* e Camph., Ol. Tereb. et Spir. Rorism. mixta cum Pulv. Sinapis; sec. Dr. *Paris* e Bals. Tolut. et Resina absque sinapi.

Fomentatio sinapisata s. sinapina. (*Va.* Char.)

℞. Farinae Sinapis uncias quatuor.
Aquae fervidae . libram unam.

Statt der Sinapismen, um anhaltender zu wirken.

Unguentum ad perniones. (*Va.*)

℞. Amygd. amar. mund.
uncias quatuor.
Mellis . . . . . uncias tres.
Camphorae in Alcoh. pauxillo sol.,
Farinae Sinapis, sing. drach. duas.
Aluminis calcin.,
Olibani pulv., sing. drach. unam.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.

Misce fiat pasta. — Morgens und Abends die Frostbeule sanft damit einzureiben, nach einigen Augenblicken sie mit lauwarmem Wasser abzuwaschen und sie dann gut zu bedecken.

Sison.

Sison Amomum, L.; Deutsches Amomum; Amome faux (*Gal.*); Field honewort (*Ang.*); Wssecko korenj (*B.*).

Gal. Wir. Wür. *Gr. Re. Sp. Z.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 442.)

Man wendet den Saamen (semen Sisonis Amomi s. Amomi vulgaris) an; er ist klein, grau, gekielt, süß, von gewürzhaftem Geruch und Geschmack.

Reizend, für harntreibend gehalten.

Sison segetum (*Gr.*) gegen schmerzlose Geschwülste.

Sisymbrium.

Sisymbrium Sophia, L.; Sophienkraut; Sagesse des chirurgiens (*Gal.*); Flixweed sisymbrium (*Ang.*); Barbierforstand (*D.*); Talictro (*His.*); Fiekruid (*Bel.*); Talitro (*I.*); Herva Sophiae (*Lus.*); Stiltfrae (*Suec.*).

Gal. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Icon. pl. t. 333.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Sophiae chirurgorum) besteht aus einem runden, ästigen, etwas behaarten Stängel mit abwechselnden, in kleine Läppchen zerspaltenen glatten Blättern. — Der Saame ist sehr klein, eirund, glatt und röthlichbraun. Er hat ebenso, wie das Kraut, einen scharfen und brennenden Geschmack.

Reizend, gegen Scorbut, eben so auch *Sis. amphibium*, *Raphanus aquaticus* (*Gr.*)

Sium.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Sium angustifolium, L.*; schmalblättriger Merk; Berle à feuilles etroites (*Gal.*); Narrow leav'd water parsnip (*Ang.*); Bernera de hoja angusta (*His.*); Smalbladiges wate reppe (*Bel.*).

Gal.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Fl. Austr. t. 67.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit eingeschnittenen, am Grunde fast gehörten Blättern. Es hat einen bituminösen Geruch und einen bittern, etwas scharfen Geschmack.

Reizend, harntreibend.

2) *Sium latifolium, L.*, breitblättriger Merk; Berle à larges feuilles (*Gal.*)

Gal. *Gr.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Moris.* Hist. II. 9. t. 5. f. 1.)

Das Kraut (herba Pastinacae aquaticae), welches man anwendet, besteht aus einem hohlen Stängel mit gefiederten, aus lanzettigen, sägezähnigen Blättchen bestehenden Blättern.

Diese Pflanze wird fast stets statt der vorigen angewendet.

3) *Sium nodiflorum, L.*; knotenblumiger Merk, kleiner Eppich; Berle nodiflore (*Gal.*); Creeping water parsnip (*Ang.*).

Du. *C. Gr. Re.*

2ſ Eine Europäiſche Pflanze. (*Moris.* Hist. II. 9. t. 5. f. 8.)

Man wendet das Kraut an; es beſteht aus einem hohlen Stängel mit einfach gefiederten Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gezähnt ſind.

Harntreibend. — Nach Moriſon iſt der ausgedrückte Saft in verſchiedenen Hautkrankheiten nützlich. Withering gab davon Erwachſenen Morgens drei oder vier Unzen, und jungen Perſonen drei Löffel täglich zwei Mal.

4) *Sium Sisarum, L., Sisarum;* Zuckermerk; Berle Chervi (*Gal.*); Sisara, Chirivia de quaresma (*His.*).

His. His3. *Gr.*

2ſ Eine Pflanze, welche in China zu Hauſe ſeyn ſoll. (*Schk.* t. 69. *Moris.* Hist. II. 9. t. 4. f. 8.)

Die Wurzel beſteht aus mehrern länglichen, gerunzelten, in ein Bündel vereinigten Knollen. — Der Saame iſt eiförmig, glatt und geſtreift.

Dieſe Pflanze ſoll gegen Mercurialkrankheit von Nutzen ſeyn.

5) *Sium Ninsi, L.;* Ninſing, Ninſingmerk; Ninsi (*Gal.*); Ninsiwortel (*Bel.*)

Br. Gal. LP. Wir. *G. Gr. M. Re. Sp.*

2ſ Eine auf den Gebirgen China's wachſende Pflanze. (*Burm.* Fl. Ind. t. 29. f. 1.)

Man wendet die Wurzel (radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsin) an; ſie iſt ſpindelförmig, geringelt, weißlich, hornartig und halbdurchſichtig, oder gelblichbraun, oder undurchſichtig, je nachdem ſie entweder in kochendem Waſſer gebleicht und der Oberhaut beraubt iſt oder nicht. Die Dicke iſt verſchieden, wie eine Schreibfeder oder kleinen Fingers dick. Sie hat einen ſtarken und unangenehmen Geruch und einen anfangs ſüßlichen, hinterher etwas bittern Geſchmack.

Die Chineſen ſchreiben dieſer Wurzel faſt wunderähnliche Kräfte zu, jedoch ſind ſie ſehr beſchränkt, und ſie würde daher mehr unter die Küchengewächſe zu verweiſen ſeyn, übrigens kömmt ſie auch ſelten vor.

Sium berula. (*Gr.*) Blätter eröffnend, harntreibend, gegen Scorbut.

Sodium.

Von dieſem an ſich ſelbſt in der Medicin ungebräuchlichen Metall wendet man folgende Zuſammenſetzungen an:

Protoxydum Sodii, Soda caustica s. pura; kauſtiſche, reine Soda.

§. I. Im flüſſigen Zuſtande.

Lixivium causticum s. Sodae s. Sodae purae s. saponariorum, Soda caustica fluida s. liquida, Liquor Sodae concentratus, Liquor Natri caustici s. Hydratis natrici; Seifenſiederlauge: Lessive des savonniers (*Gal.*).

Bor4. Fer. GalH. GalM. Lus. Sar. *Fi. Gr. Re. Sw. Vm.*

℞. Subcarbonatis Sodae partes duas.
Calcis vivae . . . partem unam.
Coque cum Aquae q. s., cola lixivium et consume, donec vas octo drachmas aquae communis continens drachmas undecim contineat et refrigeratum 36° Ar. indicet.

Bor4. ut liquorem kali caust. parari; — *Fi.* Subcarbonatis partes tres, Calcis duas, caeterum ut potassam causticam.

§. II. Im feſten Zuſtande.

An. Fer. *Br. Fi. Vm.*

℞. Lixivii Sodae caust. quantum vis.
Evaporet in tantum, donec olei instar fluat et gutta una, corpori frigido infusa concrescat; infunde deinde supra laminam marmoream vel in fusorium.

Die kauſtiſche Soda kann ebenſo benutzt werden, wie die Potaſche.

Sapo Cerae s. cereus. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . partes tres.
Liqua et adde
Sodae caust. liq. . partes duas.
Prope ignem relinque, agitare continuando, donec massa in aqua absque decompositione dissolubilis fiat.

Protoxysulphuretum Sodii, Deutoxysulphuretum Sodii, Sulphuretum Protoxydi Sodii, Sulphuretum Sodae, Natrum sulphuratum. (Am. Fer. *Br. C. Fi. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Subcarb. Sodae, sing. . part. aeq.
Liquata simul super igne gradatim aucto supra tabulam marmoream effunde et post refrigerationem in frustula minora diffrange. (Am. Fer. *Br. C. Fi.*)

Sw. Sulphuris partem unam et duas Alcali mineralis.

℞. Sulphuris in baculis partes tres.
Sodae caust.
part. septem c. dimidia.
Mixta liqua in retorta balneo arenae imposita. (*Vm.*)

T. Florum Sulphuris partes duas, Sodae caust. vel Carbonatis Sodae partes quatuor, caeter. ut sulphuret. potassae.

Van Mons nennt dieſes *Sulphuretum*

simplex Sodae. Die Formel zu ſeinem *Supersulphuretum Sodae* iſt folgende:

℞. Sulphuris in baculis
partes tres cum quadrante
Sodae caust. fusae part. quatuor.

Liqua in retorta vitrea balneo arenae gradatim calefaciendo imposita.

Die Eigenſchaften des ſchwefligſauren Natron's oder der natriſchen Schwefelleber ſind dieſelben, als die der kaliſchen. „Der Practiker, ſagen Idt und Chevallier, ſollte dieſes Mittel immer der kaliſchen Schwefelleber vorziehen, da das kohlenſaure Natron hinſichtlich ſeiner Reinheit nur wenig Veränderung zeigt und man daher ſicher iſt, immer ein in ſeiner Zuſammenſezzung ſich gleichbleibendes Präparat zu erhalten, da hingegen die kaliſche Schwefelleber wegen der verſchiedenen Reinheit des käuflichen Kali's von zwölf bis fünf und zwanzig Procent Verſchiedenheiten unterworfen iſt." Man wendet es aber deßungeachtet nur ſehr wenig an.

Aqua antipsorica. (*Vm.*)

℞. Sulphureti Sodae drachm. unam.
Salis Ammoniaci
scrup. duos c. dimid.

Dissolve sales singulos seorsim in Aquae unciis sex, filtra et solutiones commisce.

Lotio ad s. contra tineam. (*Bo. Ca.*)

℞. Sulphureti Sodae . uncias tres.
Saponis medic. sesquidrachmam.
Aquae Calcis
unc. septem c. dimidia.
Alcoholis . . . drachmas duas.

Man ſchlägt alle zwei Tage ein mit dieſer Flüſſigkeit getränktes leinenes Tuch um den Kopf.

Sapo sulphuratus Sodae. (*Vm.*)

℞. Saponis Medullae partem unam.
Sulphureti Sodae . . partes duas.
Alcoholis . . . . . partes sex.

Dissolve et solutionem cola.

Unguentum antipsoricum. (*Sw.*)

℞. Sulphureti Sodae drachmas tres.
Axungiae Porci . sesquiunciam.

Misce triturando.

Linimentum sulphuro-saponaceum. (*Vm.*)

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Sulphuris pulv., sing.
part. unam c. dimidia.
Sulphureti Sodae pulv.
partes quatuor cum dimidia.
Axungiae Porci part. sex c. dimid.

Contere pulveres cum axungia et adde sensim oleum. — In Einreibungen gegen Krätze.

Protoxychloruretum Sodii, Chloruretum Protoxydi Sodii, Chloruretum Sodae, Aqua „Eau de javelle" dicta. (GalF. GalH. *Ma.*)

℞. Subcarbonat. Sodae libr. quinque.
Aquae destillatae . libras viginti.

Infunde liquorem, 12° R indicantem in lagenam, cujus tres quadrantes ab illo solum implentur et torrentem Chlori e mixtura Salis marini libra una, Acidi sulphurici sesquilibra et Aquae tribus librae quadrantibus extricati immitte.

Die Chlorüre iſt ſtark genug, wenn ſie achtzehen Theile ſchwefelſauren Indigo entfärbt.

Man wendet ſie, mit zehen bis fünfzehen Theilen Waſſer verdünnt, zum Verbinden bei Hoſpitalbrand, ausgearteten veneriſchen Geſchwüren, brandigen Wunden, welche ſie ſchnell zum Vernarben bringt, und bei Krebsgeſchwüren an, wo ſie den Geſtank beſeitigt und zu gleicher Zeit die Schmerzen lindert. Alibert benutzt ſie mit Vortheil zum Waſchen freſſender Flechten. Man hat eine tinea favosa damit geheilt, auch iſt ſie mit Erfolg bei häutiger Bräune in Gurgelwaſſer gebraucht worden. Außerdem iſt ſie auch innerlich zu 25 oder 30 Tropfen in einer Pinte Tiſane gegeben worden.

Chloruretum Sodii, Quadrichloruretum Sodii (*B.*), *Chloretum Natrii, Murias Sodae s. natricus, Murias Sodae fossilis, Hydrochloras Protoxydi Sodii, Protohydrochloras Sodii, Sal commune s. culinare s. culinaris, Sal Gemmae vel marinum s. marinus s. niger s. fossilis, Hydrochloras natricus, Hydrochlorinas natricus, Muria, Natrum muriaticum, Sal commune s. communis, Soda muriatica* (*H.*); Küchenſalz, Kochſalz Steinſalz, Seeſalz, ſalzſaures Natron; Chlorure de sodium, Quadrichlorure de sodium, Muriate de soude, Hydrochlorate de protoxide de sodium, Protohydrochlorate de sodium, Hydrochlorate de soude, Sel de cuisine ou de gabelle, Sel gemme ou marin, Soude muriatée (*Gal.*); Salt (*Ang. D. Suec.*); Melh (*Ar.*); Uyah (*Kali.*); Yen (*C.*); Luna (*Cy.*); Nimmuk (*Duk.*); Sal (*His. Lus. Pol*); Lun (*Hin.*); Zout (*Bel.*); Sale (*I.*); Mit (*Mah.*); Garam (*Mal.*); Hemuck (*Pe.*); Lavana (*Sa.*); Uppa (*Tam.*); Lavanum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen Ham. Han. Hass. HassP. His, His3. Li. Lou. LonN. Lus.

O. Pol R. RC. Sax. Suec. Wür. WW. *A. Fi. G. Par. Pid. Re. Sp. T. Va.*).

His3. ex Acidi muriatici libra una, Aquae communis libris octo instillata, additis Carbonatis Sodae libris duabus vel q. s. ad perfectam saturationem praeparare jubet.

Der häusliche Gebrauch des Kochsalzes ist zu häufig und so allgemein bekannt, daß es nicht nöthig ist, hier darüber Näheres anzugeben In der Medicin benutzt man es nur wenig. Doch setzt man es oft zu Fußbädern, um diese reizender zu machen. Zuweilen hat man es auch innerlich bei Krankheiten, welche man von Schwäche herleitete, so wie äußerlich in verschiedenen Hautkrankheiten, besonders Kopfgrind und Krätze, angewendet.

Murias Sodae purificatus s. purus, Sal commune depuratum. (An. Bel. Gal. HassP. His3.)

Sal commune in Aq. communis triplo solvitur et liquori fervido instillatur Sal Sodae depuratae in Aqua solutum, donec non amplius turbetur; sedimento sponte posito, liquorem per chartam bibulam filtra et crystallisationi subjice.

His3. ut sulphatem aluminae purificare.

Murias Sodae exsiccatus s. siccatum, Sal communis decrepitatus. (Du. Ed. His3 *C. Gr. Re.*)

Sal commune uritur supra ignem in vase ferreo vel vitreo (patina fictili non vitreata His3.) leviter tecto, donec decrepitare cessaverit.

Oxymurias s. Chloras Sodae, Chlorum s. Chloretum Natrii, Natrum chloratum s. chlorinicum, Natrum muriaticum oxygenatum; oxydirt salzsaures Natron, Chlornatron. (*Dulk. Re.*)

Paratur transmittendo torrentem Gasis Chlori per Solutionem Muriatis Sodae.

Sacculus resolvens. (*Sm.*)

℞. Salis culinaris,
— Gemmae, sing. unc. unam.
— Ammoniaci drach. quatuor.
Misce.

Pulvis vermifugus. (*E.*)

℞. Salis culinaris . drachmas tres.
Coccionellae . grana quindecim.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle Morgen. — Von Rush empfohlen.

Clysma s. Clyster ad ascarides, Enema vermifugum. (*Sw.*)

℞. Vini rubri . . . . uncias sex.
Salis culinaris . quantum sufficit vel quantum vinum dissolvere potest.

Clysma s. Clyster s. Enema purgans s. salinum. (*B. E. Ra. Va.*)

℞. Salis culinaris . unciam unam.
Tisanae emollient. (Lini) libras duas.
Dissolve. (*Ra. Va.*)

℞. Decocti Hordei . uncias quatuor.
Salis culinaris . . . semunciam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Misce. (*B.*)

℞. Salis culinaris . . semunciam.
Olei Ricini,
Syrupi Sacchari, sing. uncias duas.
Dec. Semin. Lini . octar. unum.
Misce. (Sax.)

Clyster stimulans pro equis. (*Gr.*): Salis communis uncias octo, Olei Lini quatuor, Aquae octarios octo, vel decem, misce. (Veterin.) *Clyster purgans pro equis*: Salis unias 4 ad 8, Aq. calidae octar. 8 vel 12 dissolve; *pro vaccis*: Salis libram, Aquae octarios 10 vel 12, zur Unterstützung der Lariertränke.

Solutio Sodae Muriatis (*Re.*): Muriatis Sodae drachmam, Aquae destill. q. s. ut modo solvatur. — Bestes Erweichungsmittel des Ohrenschmalzes. (Haygarth.)

Clysma s. Clyster s. Enema antispasmodico-resolvens s. antispasmodicum. (*B.*)

℞. Salis culinaris drachmas quatuor.
Olei Lini . . . uncias quatnor.
Infusi Chamomillae . uncias tres.

Pediluvium salinum s. cum Sale communi. (*Va.*)

℞. Salis communis manipulum unum.
Aquae fervidae . . . . . q. s.

Balneum salinum et gelatinosum. (*Va.*)

℞. Salis marini . . libram unam.
Aquae suffic. calefact. libras ducentas.
Adde
Collae Flamant. (in Aq. bull. q. s. sol.) . . . . . libras duas.
Misce. — Bei Scrophelkrankheit sehr nützlich.

Solutio s. Mixtura citro-muriatica s. excitans. (*Bo. Ca. Pie. Sw.*)

℞. Succi Citri . . . quantum vis.
Salis culinaris . quantum sufficit vel quantum succus dissolvere potest. — Broussonet empfahl diese Mixtur bei sogenannten adynamischen Fiebern. — Gabe, stündlich 1 Löffel.

Unguentum Salis marini. (*Sm.*)

℞. Salis culinaris . . sesquiunciam.
Cerati Galeni . . . uncias tres.
Unguenti rosati . unciam unam.
Morgens und Abends in die von tinea befallenen Stellen einzureiben.

Linimentum ad strumam. (RC.)

℞. Fellis Tauri recentis unciam unam.
Muriatis Sodae . . semunciam.
Aquae tepidae . . unciam unam.
Solutioni adde
Olei Olivarum semunciam vel q. s.

Aqua marina s. marina artificialis s. maris arte paranda s. marina arte facta. (B*. Gen. Pm. RC. *Au. Br. Fi. Gr. Sw.*)

℞. Salis culinaris . . semunciam.
— cathartici amari,
Syr. Rhamni cathart., sing.
drachmam unam.
Aquae . . . . . libras duas.
Misce. (Gen.)

℞. Salis culinaris . . uncias decem.
Muriat. Magnesiae drach. decem.
— Calcis . . . uncias duas.
Sulphatis Sodae,
— Magnesiae, sing. drach. sex.
Aquae libr. quinquaginta (congios quinque *Gr.*).
Dissolve (B*. RC. *Gr. Sw.*)

Br. eandem formulam sed absque muriate calcis; — Pm. *Fi.* Aquae libras quinquaginta, Salis marini uncias novem, Muriatis Magnesiae unam, Muriatis Calcis drachmas quatuordecim, Sulphatis Sodae, Sulphatis Magnesiae, sing. sex; — *Au.* Aquae octarios duos, Salis comm. grana viginti quatuor, Sulphatis Magnesiae quatuor, Sulphatis Calcis, Carbonatis Magnesiae, sing. quindecim et torrentem Gasis acidi carbonici in liquorem immittere.

Dieſes Waſſer iſt als ein vortreffliches auflöſendes und ſchmelzendes Mittel empfohlen worden.

Aqua Selterana. (Suec. *Re.*)

℞. Salis culinaris . . grana centum.
Subcarb. Sodae gr. viginti quatuor.
— Magnesiae gr. viginti novem.
— Calcis . gr. septemdecim.
Aquae . . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Re. sec. Gal. Aquae c. Gase acido carb. satur. uncias viginti et dimid., Subcarb. Sodae grana quatuor, Subcarb. Magnes. duo, Muriatis Sodae viginti.

Aqua mineralis acidula. (RC.)

Aquae purae libras quinquaginta, Carbonatis Calcis drachmas duas, Subcarbonatis Magnesiae unciam, Subcarbonatis Sodae drachmas sex, Muriatis Sodae sesquiunciam trajice per solutionem Gasis acidi carbonici pollices cubicos 909 ad 1000.

Aqua Pyrmontana. (Suec.)

℞. Salis culinaris . semiscrupulum.
Sulphatis Magnesiae
grana triginta quinque.
— Calcis . grana triginta sex.
Subcarb. Calcis . gr. quindecim.
Limaturae Ferri . unciam unam.
Aquae . . uncias octoginta duas.
Satura cum Acido carbonico.

Aqua mineralis sulphurata. (RC.)

℞. Aquae purae . libras quadraginta.
Carbon. Calcis . drach. quinque.
Subcarb. Sodae . drach. decem.
Muriatis Sodae drachmas septem.
Salis acidi carbonici,
— hydrogen. sulphurat., singulorum poll. cub. . 900 ad 1000.

Aqua Selterana alia. (Gal. *Vm.*)

℞. Salis culinaris grana viginti duo.
Subcarbonatis Sodae grana quatuor.
— Magnesiae grana duo.
Aquae quintuplo volumine Acidi carb. satur. unc. viginti c. dimid.
Dissolve. (Gal.)

℞. Aquae . . . . . libras tres.
Infunde in lagenam, in cujus fundum, tubi ope intromitte
Acidi hydrochlor. fum.
gr. septuaginta.
Adde deinde, alterum post alterum
Subcarb Calcis . . grana sex.
— Magnesiae . . gr. decem.
Carbonatis neutri Sodae
grana quinquaginta quatuor.
Lagenam bene claude. (*Vm.*)

Aqua Bellilucana (Balaruc). (Gal.)

℞. Salis culinaris sesquidrachmam.
Muriat. Calcis grana octodecim.
— Magnesiae
gr. quinquaginta sex.
Subcarb. Magnesiae gr. unum.
Aquae duplum volumen Gasis acidi carb. contin. unc. viginti duas.

Aqua Borvonensis (Bourbonne les Bains). (Gal.)

℞. Salis culinaris . drachmas duas.
Muriatis Calcis . grana decem.
Aquae dupl. volumen Gasis acidi carb. cont. unc. viginti c. dim.

Liquor Sodae oxymuriaticae s. Natri

chlorici, Subchloruretum Sodae liquidum. (HassP.)

℞. Salis Sodae depur. partem unam.
Aquae destillatae . partes tres.
Immitte ad saturationem usque Acidum Salis dephlogisticatum. Liquorem obtentum Aquae dest. ea quantitate dilutum ut sit ponderis specifici 1,0429 = 7° Ar. Bk. serva in vitris pluribus, unciarum circiter quatuor capacibus etc.

Liquor Natri muriatici s. Salis communis. (Bor4. HassP.) Acidi Salis puri q. libet saturetur cum Liquore Salis Sodae purissimi, fluidum filtratum crystallisationi subjiciatur; crystallorum pars 1 in Aq. dest. 8 solvatur. — Reagens.

Subprotocarbonas Sodii, Subcarbonas Protoxydi s. Deutoxydi Sodii, Subdeutocarbonas Sodii impurum, Subcarbonas Sodae, Soda, Soda cretacea, s. impura aërata s. effervescens, Mephitis Sodae, Creta Sodae, Sal alcali mineralis, Sal Sodae, Alcali minerale fixum, Natron, Natrum, Alcali minerale, Carbonas Sodae, Carbonas Sodae impurus, Subcarbonas Sodae impurus s. impura, Hypercarbonas Sodae, Natrum carbonicum s. subcarbonicum crudum, Subcarbonas natricum, Carbonas Sodae alcalinus s. incompletus, Hypocarbonas Sodae; kohlensaures Natron oder Natrum, Soda, mineralisches Laugensalz; Sousprotocarbonate de sodium, Souscarbonate de protoxide de sodium, Souscarbonate de soude, Soude crayeuse, aërée ou effervescente, Méphite de Soude, Craie de soude, Alcali fixe minéral (*Gal.*).

1) Wie man es im Handel findet.

Soda, Soda impura, Barilla, Carbonas natricum s. Sodae impurum s. communis s. venale, Sal Alcali, Sal Sodae s. Sodae crudum, Alcali minerale crudum, Natrum carbonicum crudum, Subcarbonas Sodae impurus; Soda, Barille; Soude, Barille (*Gal.*).

A. Am. Ams. B. Bo. Bel. Bor. Bor4. Br D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. O. Pm. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Man unterscheidet im Handel vier Arten Soda.

A. Natürliche Soda in feinen Nadeln oder pulverartigen schneeigen Efflorescenzen. Sie ist in Aegypten, in der Wüste von Thaiat, westlich vom Delta und in den Ebenen Oberungarns sehr häufig. (Rochetta Alexandrina.)

B. Die durch Einäscherung einer großen Anzahl von Seepflanzen, besonders solcher zu der Familie der Atripliceen und der Tange gehöriger, wie von Salsola, Chenopodium, Atriplex, Fucus, gewonnene. Sie ist in derben, festen, halbgeschmolzenen, steinharten, bläulichgrauen Massen von salzigem und laugenartigem Geschmack. Sie enthält kohlensäuerliche Soda in sehr verschiedener Menge, schwefelsaure Soda, Seesalz, kohlensauren Kalk, Alaun, Kieselerde und Eisen, bisweilen auch schwefelsaures Kali, salzsaures und selbst Jodkali. Hierher Soda Alicantina s. Alonensis.

C. Die durch Zersetzung des Seesalzes mittelst Bleiglätte gewonnene.

D. Die, welche man durch Calcination des schwefelsauren Natrums mit Kohle und Kreide erhält. Sie besteht aus caustischem Natron, kohlensauerm Kalk, Schwefelkalk mit Ueberschuß der Base und Kohle.

2) Reinigung des käuflichen. *Sodae Subcarbonas, Sal Sodae, Natrum carbonicum depuratum.*

℞. Natri venalis . . quantum vis.
Grossiuscule pulveratum dissolve in Aqua, lixivium vaporando in tantum consume, donec 28 vel 30° Ar. indicet et crystallisationi subjice.

Das Verfahren ist sonst in allen Pharmacopöen fast gleich.

Fi. T. praeterea: Muriatis Sodae libras quinque, Salis Tartari libras tres cum dimidia, Aquae comm. q. s., solve, filtra, crystallisationi subjice, sales adhuc humidos commixtos lento calori expone, quo facto carbonas sodae liquatur, murias potassae vero intactus erit; liquido decanthato, muriatem ablue ad separandum omnem carbonatem et totum fluidum ad siccum consume.

LH. *Gr. Parationem* e Sale Glauberi et Creta, sing. part. aeq. et Pulvere Carbonum parte tertia praescribit, praeterea vero e lixivia ione sodarum factitiarum; — *Gr.* miscere Solutionem Salis Glauberi cum Solutione Calcis in Acido pyrolignoso puro, coquere aliquanto, filtrare, ad siccum vaporare, acetatem obtentum calcinare, denuo in Aqua solvere et crystallisationi subjicere

Das kohlensaure Natron wird bei Scropheln, sogenannten passiven Wassersuchten, Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Harngries und Harnsteinen mit harnsaurer Basis angewendet. — Gabe, von zehen bis zwanzig Gran.

Sodae Subcarbonas exsiccata, Natrum carbonicum depuratum siccum, Carbonas Sodae siccatum s natricus depura-

tus, Sal Sodae depuratum siccum. (Bor4. Du. HassP. LouN. *Gr. Re.*)

Sal Sodae depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expone, donec in pulverem siccum fatiscat etc. (Vergl. vorher das Verfahren von *Fi.*)

Sal Sodae purissimum (HassP.): Terra foliata Tartari cryst. in Aquae dest. copia solvitur, solutio Liquoris Baryt. acet. et Arg. nitr. dilutioris ope depurata et filtrata ad siccum inspissatur et residuum in crucibulo platineo comburitur, carbo residuus cum Aqua dest. elutriatur et lixivium vaporando et refrigerando in crystallos cogitur, quae siccatae serventur. — Reagens.

Liquor Salis Sodae purissimi (HassP.): Salis drach. tres, Aquae dest. unc. unam. — Reagens.

Natrum Succo Citri neutralisatum ut citras kalicus parari potest.

Boli stomachici. (*Sw*. Va*)

℞. Subcarb. Sodae semiscrupulum.
Pulveris arom. scrupulos quatuor.
Syrupi Ch nae . quantum sufficit
ut fiant boli tres.

Pilulae Subcarbonatis Sodae s. Sodae s. lithontripticae. (Am. B*. Ed. RC. *Au. C. E.*)

℞. Subcarb. Sodae sicci part. quatuor.
Saponis duri . . . partes tres
Syrupi simplicis quantum sufficit.

Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, wenigstens zehen Stück alle zwei Stunden.

Am. *C.* et *E.* Subcarbonatis drachmam unam et Saponis semidrachmam ut fiant pilulae quadraginta; — RC. Subcarbonatis semunciam, Saponis oleosi drachmas tres, Syrupi Zingiberis vel simpl. q. s. ut fiant pilulae granorum quinque; — *Va.* Subcarbonatis drach. tres, Sapon. unam, Ol. ess. Carvi gutt. decem, Aquae q. s. (Gabe, zwei bis vier, täglich drei Mal, bei Steinkrankheit.)

Pilulae absorbentes. (*E. Va.*)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Rhei,
Extr. Gentianae, sing
serup. unum.
Mercurii dulcis . . grana tria.

Fiant pilulae viginti. — Gabe, zwei Stück auf einmal, bei Verdauungsbeschwerden.

Unguentum s. Pomatum alcalinum. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Subcarb. Sodae drachmas duas.
Laudani Sydenh. . drach. unam.
Axungiae Porci . unciam unam.

Misce. — Gullerier wandte diese Salbe bei verschiedenen Hautkrankheiten an, bei welchen viel Schmerzen vorhanden waren.

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sulphureti Potassae, sing.
drach. tres,
Axungiae Porci . . uncias tres.

Albert läßt diese Salbe bei tinea täglich in den Kopf einreiben, nachdem er vorher die Krusten mittelst erweichender Umschläge erweicht und zum Abfallen gebracht hat.

Pomatum contra pruriginem no. 4. dictum. (*Va* Hosp. St. Lud.): Subcarb. Sodae drachm. duas, Extr. Op. aquosi grana decem, Calcis extinctae drachmam, Axungiae unc. duas.

Aqua nephritica s. antinephritica. (B*. Ful. Ham. Li.)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas duas.
Aquae Calcis . . . libras duas.

Gabe, zwei oder drei Löffel.

Liquor Natri carbonici. (Bor4.)

Ut reagens; paratio non indicatur.

Aqua Sodae Carbonatis (*Re.*): Carbonas Sodae in Aqua destill. soluta et solutio ad sp. gr. 10, 24. evaporata.

Potio absorbens, Mixtura antacida. (*E. Sw*. Va.*)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari albi, sing. drach. duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Mellis albi . . drachmas duas.

Misce (*Sw*.*)

℞. Subcarb. Sodae scrup. quatuor.
Infusi Gentianae,
Aquae Cinnamomi, sing. unc. tres.
Tincturae Cardamomi semunciam.

Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen Löffel (*E.*)

℞. Subcarb. Sodae drachmam unam.
Sacchari albi . . . semunciam.
Mucilag. Gummi Arab unc. duas.
Aquae . . . . uncias triginta.
Tinct. Piperis Jamaic. unc. duas.

Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. (*Sw.*)

℞. Subcarb. Sodae scrupulos duos.
Rhei . . . . drachmas duas.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Aquae Menthae crisp. unc. octo.

Gabe, zwei Löffel täglich drei Mal. (*Sw*. Va.*)

Infusum amarum cum Natro, Potio digestiva. (*Au.*)

℞. Radicis Gentianae drachmas duas.

Fruct. Aurantior. virid. sesquidrachmam.
Cardamomi minoris semidrachmam.
Subcarb. Sodae drachmam unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.

Post sex horas infusionis cola. — Gabe, ein Löffel täglich drei Mal.

Potio antiscrophulosa. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Subcarb. Sodae semidrachmam.
Tinct. Gentianae semunciam (unciam *Va.*).

Seit 1816 wendet Peschier eine mehr oder weniger starke Auflösung des kohlensauren Natrums gegen Kropf an, z. B. zwei bis vier Drachmen desselben in acht Unzen Wasser; er giebt davon täglich zwei Mal einen Löffel in einem halben Glase Wein oder gewürzten Zuckerwasser. Hufeland verordnet täglich vier Löffel einer Auflösung von zwei Drachmen des Salzes in sechs Unzen Melissenwasser und einer halben Unze Zimmtwasser.

Tisana ad urinam arenosam. (*Sm. Va.*)

℞. Seminum Lini contusorum,
Capilli Veneris Monspeliaci,
Mesembryanthemi crystallini, sing. manip. unum.
Aquae . . . . octarium unum.

Coque per horae quadrantem et colaturae adde

Subcarb. Sodae . scrup. unum.

Va. Mesembryanthemum ommittit.
Den Tag über zu trinken.

Solutio balsamica alkalisata. (*Sw.*)

℞. Subcarbonatis Sodae,
Sacchari,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Balsami Peruviani . semunciam.
— Canad. drachmas decem.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Man vermischt von dieser Auflösung eine Unze mit einer Pinte Wasser und läßt drei oder vier Mal täglich ein halbes Pfund davon nehmen.

Injectio lithontriptica. (*Bo. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Subcarb Sodae drachmam unam.
Saponis . . . . . uncias duas.
Aquae communis uncias duodecim.

Zur Auflösung von harnsauren Blasensteinen empfohlen.

Potio lithontriptica. (*E. Va.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmam unam.
Infusi Quassiae uncias quatuor.
Tincturae Columbo unciam unam.

Viermal täglich einen Löffel voll.

Potio expectorans. (*E.* Hosp. Amer.)

℞. Subcarb. Sodae grana duodecim.
Vini Ipecacuanhae guttas viginti.
Tincturae thebaicae guttas quatuor.
Aquae . . . . unciam unam.

Bei Keuchhusten. — Alle zwei oder drei Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Infusum Quassiae cum Natro, Aqua stomachica. (*Au.*)

℞. Ligni Quassiae sesquidrachmam.
Subcarb. Sodae drach duas c. dimid.
Aquae bullientis . libram unam.

Infunde per horam et cola. — Gabe, täglich zwei bis vier Löffel bei Verdauungsbeschwerden.

Protocarbonas Sodii, Carbonas Protoxydi Sodii, Carbonas Sodae s. natricum, Bicarbonas Sodae s. natricus cum Aqua, Carbonas neutrum Sodae s. Sodae completum, Sodae Carbonas, Sal Sodae perfecte saturatum, Natrum carbonicum perfecte saturatum s. neutrale, Deutocarbonas Sodii, Alkali minerale perfecte saturatum, Natrum carbonicum acidulum; gesättigte luftsaure Soda, gesättigtes kohlensaures Natrum

1) Im festen Zustande.

Am B. Ba. Bel. Bor4. Ed. Fenn. HassP. Li. Lon. LonN. Suec. *C. Fi. Gr. Re. T.*

℞. Subcarb. Sodae purif. part. unam.
Aquae calidae . . partes duas.

Transmitte per solutionem filtratam et refrigeratam Gasis acidi carbonici torrentem et crystallos exinde sponte enatas serva. (Am. B. Ba. Bel. Ed. Fenn. Suec. *C T.*)

Fi. per solutionem Subcarbonatis in lagena Woulfiana torrentem gasis transmittit ad saturationem usque etc.; — HassP. Salis partes duas, Aquae tres, solutioni filtratae torrentem Gasis acidi carbonici extricati e mixtura Cretae albae s. Lapidis calcarei purioris pulverati parte una et dimidia, Aquae communis partibus quatuor, Acidi Vitrioli diluti partibus affusis duodecim; — Bor4. Natri carbonici depurati sesquiunciam, Aquae dest. tres cum dimidia, liquorem immitte in vas librarum decem capax, Gase Acidi carbonici repletum etc.; — LonN. *Gr. Re.* Sodae Subcarbonatis libram, Aquae octarios tres, solutioni Gas ad saturationem completam immitte et ad crystallisandum sepone, crystallos sicca; liquorem reliquum consume cavendo ne calor gradum 120 excedat, ut iterum prodeant crystalli.

℞. Subcarbonatis Sodae libram unam.
Aquae . . . octarium unum.
Solutioni adde
Subcarb. Ammoniaci . unc. tres.
Misce et per tres horas calori 80° C. expone, donec omne ammoniacum sit expulsum et liquorem ad crystallisandum repone. (Am Lon. *C. Fi.*)

Gr. praeterea: Subcarbonatem Sodae cum Furfure calcinare.

2) Im flüſſigen Zuſtande.

Aqua Supercarbonatis Sodae s. Carbonatis Sodae acidula. (B*. Ed. Fenn. Han. Pol. R. RC. Suec. *Gr. Re Sm. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae uncias duas.
Aquae libras (congium *Gr.*, octarios) decem.
Per solutionem transmitte Gas acidum carbon. e mixtura Cretae, Acidi sulph., sing. unc. trium et Aquae trium librarum.

Dieſes Salz, welches man heutzutage viel in Gebrauch zieht, unterſcheidet ſich in therapeutiſcher Hinſicht nicht viel von dem vorhergehenden.

Aqua Sodae, Aqua alcalina gasosa. (Am. *C Ra.*)

℞. Subcarbonatis Sodae drachmas tres.
Aquae . . . . octarios octo.
Solutionem volumine Gasis acidi carbonici decuplo satura. (Am. *C.*)

℞. Subcarb. Sodae grana octodecim.
Acidi hydrochlor semidrachmam.
Aquae . . . uncias duodecim.
Serva in lagena bene obturata. (*Ra.*)

Aqua Carbonatis aciduli Sodae mixta s. artificialis Spatana. (*Gr.*)

℞. Aquae . . . congios quinque.
Carbonatis Calcis drachmas duas.
— Magnesiae unciam unam.
Subcarbonatis Sodae drachmas sex.
Muriatis Sodae . sesquiunciam.
Dissolve et Gas acidum carbon. e Marmoris drachmis duabus transmitte.

Potio febrifuga. (*Ro.*)

℞. Aquae destillatae . uncias octo.
Acidi carbonici quantum sufficit ut sit volumen duplum Aquae; solutioni adde
Subcarbonatis . semidrachmam.
Camphorae . . . grana viginti.
Syrupi Papaveris drachmas sex.

Man läßt die Hälfte davon vier Stunden vor dem Anfall und das Uebrige im Augenblicke des Eintretens deſſelben nehmen. Man muß ſieben oder acht Tage damit fortfahren.

Trochisci alcalini s. digestivi. (GalF. GalH. *Ma. Va.*)

℞. Bicarb. Sodae . . . part. 250.
Sacchari albi . . partes 4,750.
Olei ess. Menthae partes octo.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
Fiant trochisci granorum octodecim. — Gabe, zwei oder drei Stück vor und nach der Mahlzeit bei Stein und Gicht

Va. Bicarb. drachmam, Sacch unc. duas c. dim., Ol. Menth. gutt. tres, Mucilag. G. Tragac. q. s. f. pil no. 72. Loco olei Balsam. Tolut. recipi potest.

Subprotoboras Sodii, Subboras Protoxydi s. Deutoxydi Sodii, Subboras Sodae, Boras supersaturatus Sodae, Biboras Sodae, Boras Sodae cum baseos excessu, Soda boraxata (*H.*), *Boras Sodae* (*B.*), *Borax, Borax crudus s. cruda, Natrum subboracicum, Tinckal, Tincal, Tinkar, Boras Sodae s. Sodae alcalescens s. alcalinum s. alcalinus, Boras supersodicus, natricus cum Aqua, Borax Venetus s. Veneta s. raffinata, Hypoboras Sodae, Subboras natricum, Chrysocolla*; Borax, natürliches Sedativſalz; Sousprotoborate de sodium, Sousborate de protoxide de sodium, Sousborate de soude, Borate sur-saturé de soude, Borate de soude avec excès de base, Soude boratée (H.), Borate de soude (B.), Borax, Borax brut, Tinckal, Tinkar (*Gal.*); Atinkal (*Ang.*); Buruk (*Ar.*); Piger (*Ba. Jav.*); Patterie, Piger (*Mal.*); Boras (*Bel.*); Lansipuscara (*Cy.*); Sohaga (*Duk. Hin*); Borace, Tinkal (*I.*); Chaularya (*Nep.*), Tunkar (*Pe.*); Borax (*Pol. Suec.*); Borax, Tincal (*Lus.*); Tunkana (*Sa.*); Velligarum, Vengarum (*Tam.*).

A. Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. FulGal. GalM. Gen. Ham. Han Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. WW. *A. Fi. G. Gr. Par. Re. Sp. T. Va.*

In hexaëdriſchen, mehr oder weniger abgeplatteten, in diedriſche Pyramiden endigenden, bald farbloſen, bald gelblichen oder grünlichen, ſtets mit einem erdigen, fett anzufühlenden, ſeifenartig riechenden Ueberzug bedeckten Prismen von glaſigem Bruche, mit Ausblühungen überzogen und von ſchwach alkaliſchem Geſchmack.

Borax pura, Borax Sodae purificatus (HassP.) Borax venalis vel crystallisata vel usta ut reagens adhibetur; — His3 ut sulphatem magnesiae depurari vult.

Species Diaboracis. (Wir.)

℞. Boracis Veneti . . semunciam.
Cassiae ligneae,
Croci orientalis, sing. drach. unam.
Rasurae Ligni Sabinae,
Succini albi praep., sing.
semidrachmam.
Ossis Cordis cervini,
Visci querni,
Flor. Cheiri, sing. scrup. unum.

Fiat pulvis. — Mynsicht empfahl diese Species zur Erleichterung der Niederkunft. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis ad partum promovendum. (Pal. Wir.)

℞. Boracis . . . . . semunciam.
Castorei,
Croci, sing. . sesquidrachmam.
Olei Cinnamomi . guttas octo.
— Succini . . . guttas sex.
Misce ut fiat pulvis. (Wir.)

℞. Cassiae ligneae,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Boracis,
Succini albi praep., sing.
drach. unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Olei Cinnamomi . guttas tres.
Misce ut fiat pulvis. (Pal.)

Man schrieb diesem Pulver ehedem denselben Nutzen zu, als dem vorhergehenden. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Mixtura ad partum. (*Sw.*)

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Aq. Chamomill. Rom.
unc. quatuor
Syr. Cort. Aurantior. semunciam.
Succinatis Ammon. liq.
drach. duas.
Laudani Sydenh. semidrachmam.
Gabe, alle halbe Stunden zwei Löffel.

Infusum Salep cum adstringentibus, Potio adstringens. (*Au.*)

℞. Salep . . . drachmam unam.
Aquae bullientis . uncias decem.
Colaturae adde
Extr. Chinae,
— Ligni Campech., sing.
drach. unam.
Boracis . . . semidrachmam.
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Löffelweise zu nehmen, bei chronischer Diarrhöe, besonders aber bei sogenannten asthenischen bösartigen Geschwüren und Schwämmchen.

℞. Salep . . . . drachmas duas.
Seminum Lini . . semunciam.
Aquae bullientis . uncias decem.
Post sufficientem extractionem cola et colaturae adde
Boracis . . . semidrachmam.
Extr. Ligni Campechiensis,
— Chinae, sing. drach. unam.
Syrupi Althaeae . unciam unam.

Löffelweise, in denselben Fällen, wie das vorhergehende.

Linimentum de Borate s. ad aphthas, Mel Boracis s. boraxatum s. Subboracis s. Subboratis Sodae, Linctus de Borace s. ad aphthas, Collutorium boraxatum s. adstringens. (DD. Ed. GalM. Ham. Lon. LonN. Suec. *Au. C. Gr. Pie. Re. Sa. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Boracis . . drachmam unam.
Olei Amygdal. dulc. unc. unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce triturando. (*Sa. Sw.*)

℞. Boracis . . . . partem unam.
Mellis despumati . partes octo.
Misce. (Ed. Ham. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

GalM. Boracis partem unam, Mellis decem; — *Pie.* et *Vm.* Mellis duodecim; — *Au.* Boracis et Mellis, sing. partes aeq.

℞. Boracis drachmam unam vel duas.
Mellis despumati unciam unam.
Extr. Juglandis
drach. unam vel duas.
Misce triturando. (*Sw.*)

℞. Boracis . . . drachmam unam.
Syr. Mororum unc. unam ad tres.
Misce. (*Au.*)

℞. Boracis drachmam unam ad duas.
Mucilaginis Seminum Cydoniorum,
Syr. Mororum, sing. unc. unam.
Misce. (*Sw. Sy.*)

℞. Boracis . . . sesquidrachmam.
Aquae fontanae,
Mellis, singulorum unciam unam.
Misce triturando. (DD. Suec.)

Gargarisma Boracis s. Boracis Sodae s. e Borace s. ad aphthas s. boraxatum s. Subboratis Sodae s. commune s. detersivum, Mixtura boraxata, Liquor ad aphthas. (DD. Gen. Ham. RC *Au. B Ca. E. Gr. Pie. Ra. Re. Sa. Sw. Sy. Va.*)

℞. Boracis . . . . . semunciam.
Aquae . . . . . libram unam.
Mellis flavi . . . . semunciam.

Interdum additur Alcoholis impuri uncia una vel sesquiuncia. (RC.)

Gr. Re. Boracis drachmas duas, Mellis unciam, Aquae Rosarum uncias septem.

℞. Boracis . . . drachmas duas.

Mucilag. Sem. Cydonior. semilibram.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce. (Gen. *Sa.*)

Sw. coquere Seminum Cydoniorum unciam unam in Aquae sedecim ad duodecim, remanentiam et colaturae addere Boracis drachmas tres et Mellis rosati sesquiunciam

℞. Boracis . . . . drachmas sex.
Infusi Salviae . uncias decem.
Mellis despumati . uncias duas.
Misce. (Ham.)

DD. Boracis drachmas duas, Infusi Salviae uncias octo et Mellis unam; — *B.* Boracis scrupulum, Decocti Salviae libram et Aquae Vitae unciam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Aquae,
Tinct. Myrrhae, sing. unc. unam.
Mellis rosati . . . uncias duas.
Misce. (*Ca. Sw.*)

Au. et *Sy.* Boracis unciam, Aquae libram, Tincturae Myrrhae uncias duas et Mellis tantidem; — *E.* Boracis drachmam, Aquae uncias quatuor, Tincturae Myrrhae semunciam et Mellis unciam.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei . sesquilibram.
Syrupi Gummi . unciam unam.
Misce. (*Ra.*)

Va. Mais. de S. Decocti libras duas.

℞. Boracis . . . drachmas duas.
Infusi Rosarum . uncias decem.
Syrupi Mororum . semunciam.
Misce. (*B.*)

℞. Boracis . . . drachmas tres.
Decocti Chinae uncias duodecim.
Mellis . . . . . sesquiunciam.
Misce. (*Ra.*)

℞. Boracis . drachmas duas ad tres.
Mellis . . . . unciam unam.
Extracti Juglandis . semunciam
Alcoholis unciam unam ad duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Misce. (*Sw.*)

℞. Boracis,
Sulphatis Cupri, sing. grana octo.
Tinct. Coccionellae drach. unam.
Aquae . . . . unciam unam.
Spiritus Cochleariae uncias duas.
Syrupi Rubi Idaei . . . q. s.
Misce. (*Pic.*)

℞. Aquae purae uncias viginti duas.
Subboratis Sodae drachmas decem.
Tincturae Catechu unciam unam.
— Capsici annui drachmas duas.
Mellis Rosae . . sesquiunciam.
Misce. — Interdum loco boracis et tincturae catechu adde Acidum muriaticum vel sulphuricum. (*Gr.*)

Collyrium boracicum. (*Au. Va.*)

℞. Boracis . . . semidrachmam.
Sacchari . . drachmam unam.
Aquae Rosarum . uncias duas.

Aqua cosmetica. (*Au.*)

℞. Furfuris Amygdalarum unc. duas.
Aquae Rosarum,
— Flor. Aurant., sing. unc. octo.
Fiat emulsio, cui adde
Tincturae Benzoës drachmas duas.
Boracis . . . drachmam unam.

Subprotophosphas Sodii, Subphosphas Protoxydi s. Deutoxydi Sodii, Subphosphas Sodae, Sal mirabile perlatum, Phosphas Sodae s. natricum, Soda phosphorata, Natrum phosphoricum s. oxyphosphorodes, Alcali minerale phosphoratum, Sal cathartic um Pearsoni s. perlatum. (Am. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. HassP. O. Pm. Pol. Sax. Suec. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Acidi phosphorici partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Mixturae sensim infunde
Solutionis Subcarb. Sodae . q. s. i. e. donec alcali levis excessus adsit; liquor filtratus evaporet, ut crystallos demittat, quas in loco bene sicco serva. (An. B. Bor. D. Han. O. Pol. Sax. *Br. Gr. Re. Sm.*)

Bor4. Natrum carbonicum crudum adhibet; — *Gr.* praeterea: Saturare Solutionem Subcarb. Sodae Acido phosphorico liquido, evaporare et crystallisationi subjicere. (Reagens.)

℞. Supersulphatis Calcis quantum vis.
Subcarbonatis Sodae . . q. s. ad saturandum acidum; liquor clarus post decanthationem evaporet, donec 25° ar. indicet, quo facto crystallisationi subjiciatur. (Am. B. Ba. Bel Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Suec. *C. Vm.*)

℞. Pulv. Cornu Cervi usti albi aut aliorum ossium animalium ad albedinem calcin. libras quinque.
Misce in vase murrhino cum
Aquae communis libris quindecim.
Deinde sub assidua agitatione sensim adde
Olei Vitrioli Nordhusani libras quatuor cum dimidia.
Post duodecim horas adde
Aquae communis fervidae libras quindecim usque viginti et mixtionem, frequenter agitando, per horas 48 super igne digere, cola fluidum per linteum ac residuum bene elotum in prelo laminis ligneis vel stanneis munito exprime. Liquori ob-

tento in aheno stanneo, capace, calefacto, sensim affunde

Liquorem Salis Sodae depuratae concentratum

ad saturationem usque et donec soda paullulum praevaleat, tunc filtretur et residuum eluatur. Filtratum evaporet, donec gutta lapidi insti lata, crystallos exhibeat, tunc ad crystallisandum seponatur; crystallos inter chartam bibulam siccatas statim serva. (HassP.)

Fi. Ossium calcin. libras quinque cum Aquae comm. libris decem in vas ingerere, et bene commixtis addere Acidi sulph. concent. libras tres, per aliquot dies seponere, aliam Aquam addere, colare et filtrare, sedimentum abluere et liquores ad syrupi consist. consumere, novam Aquam affundere, filtrare et denuo ad syrupi consist. consumere, ut refrigeratione crystalli enascantur etc.; — vel: Salis Glauberi libras duas, Ossium calcin. libras duas cum dimidia et Aquae comm. libras quatuor coquere per horam circiter unam, decanthare fluidum, residuum abluere, liquores filtrare et consumere ut crystallisent; — Pm. Ossium pulv. uncias quindecim, Aquae font. uncias triginta, mixtis adde Acidi sulph. venalis uncias novem, fiat lixiviatio, liquorem filtratum Salis Sodae q. s. satura vel ultra, solutionem vapora ut crystallos demittat, quae vaporatio et crystallisatio liquoris repetatur; — *Gr.* Ossa bene usta in Acido nitr. solvere, et solutioni aliam Salis mirab. Glaub. aquosam infundere, quamdiu praecipitatum oritur, filtrare, acidum nitr. destillando separare, abluere, evaporare et crystallisationi subjicere.

T. Solutionem Subcarbonatis Sodae iteratim Phosphati acido Calcis infundere, mixta per aliquot momenta calori modico exponere, praecipitatum filtrando separare, addere solutionis filtratae Subcarbonatis Sodae parvum excessum, consumere ad pelliculam et in crystallos cogere.

Ein mildes Abführmittel. — Gabe, eine halbe bis anderthalb Unzen in Fleischbrühe.

Mixtura Natri phosphorici, Potio laxans. (*Au. Va.*)

℞. Phosphatis Sodae,
Syr. Althaeae, sing semunciam.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Portionenweise ſtündlich zu nehmen.

Phosphas Sodae et Ammoniaci. (Ba.)

℞. Subphosphatis Sodae partes sex.
Liqua, leni igne, in
Aquae dest. calidae part. duabus
in solutione tenentibus
Salis Ammoniaci partem unam.
Solutionem per horas viginti quatuor in loco frigido relinque et crystallos enatas collige atque sicca.

Superprotosulphas Sodii, Supersulphas Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae acidulus s. acidus. (*Sw*. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici,
Aquae, singulorum uncias quatuor.
Mixturae adde
Subcarbonatis Sodae uncias octo.
Filtra et ad crystallisandum repone. — Purgirend. — Gabe, zwei bis ſechs Drachmen.

Protosulphas Sodii, Sulphas Deutoxydi s. Protoxydi Sodii, Sulphas Sodae, Hydrosulphas Sodae (*B.*), *Soda sulphurica* (*H.*), *Soda vitriolata, Alcali minerale sulphuricum s. vitriolatum, Natrum s. Natron sulphuricum s. vitriolatum, Sal catharticum s. mirabile s. mirabilis Glauberi, Sal Placentinus, Sulphas natricus, Vitriolum Sodae;* ſchwefelſaures Natron, Glauberſalz.

1) Wie man es im Handel findet:

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. BorC. Bor4. DD. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Han. HassP. His. His3. Li Lon. LonN. O. Sax. Suec. WW. *C. G. Par. T. Va.*

In langen, ſechsſeitigen, in eine zweiſeitige Spitze endigenden, durchſichtigen, weißen, ausblühenden Prismen von anfangs kühlendem, dann bitterem Geſchmack.

His3. läßt es auf ähnliche Weiſe reinigen wie Sulph. Magnesiae.

2) Im Ganzen bereitet.

A. Ams. An. B Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Lon. LonN. Lus. O. Pm. R. Sar. Wir. *Br. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*

℞. Residui e destillatione Acidi hydrochlorici . . quantum vis.
Dissolve in Aquae pondere triplo, satura liquorem Subcarbonate Sodae (vel Calce pulverata *Gr.*) et filtratum ad crystallisandum sepone (A. Ams. B. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Gen. Han Hass HassP. Lon. LonN. Lus. O. R. Sar. Wir. *Br. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

His3. Residuum igne aperto vehementer calcinare, in Aqua solvere, filtrare et vaporando in crystallos cogere; — Bor4. praeterea Natrum sulphuricum crudum in Aquae s. q. solvere, filtrare et l. a. in crystallos redigere jubet.

℞. Chlorureti Sodii (Salis marini) libr. duodecim.
Acidi sulphurici venalis libras sex.
Sali in olla fictili, aëre libero, iteratim acidum superaffunde, ollam, effervescentia decreta igni impone, mixturam saepe spathula lignea agita et ignem urge usque acidi muriatici evolutio omnino cesset; massam frigefactam Aqua dissolve, filtra, evapora et in crystallos coge, quas Aqua solutas novae crystallisationi subjice. (Pm.)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Dissolve in Aqua et liquori infunde
Acidi sulphurici quantum sufficit ad neutralisandum alcali; solutionem consume ut crystallos demittat. (Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. *Fi.*)

His8. Cinerum Sodae Barilla dictae libram urere igne valido, donec omnis odor sulphureus evanuerit, solvere in Aquae libris octo, filtrare ad remanentiam librarum duarum, vaporare, post bidui aut tridui quietem decanthare, liquori affundere Acidi sulph. aquosi q. s. ad perfectam saturationem, filtrare et ut in sulphatis potassae praeparatione procedere; — *Gr.* Spiritui ammoniacali adde Oleum Vitrioli, sulphatem ammoniae obtentum crystallisationi subjice, cum Sale communi commisce, sal amm. sublimatione separa et sal remanens dissolutum in crystallos coge; — *T.* praeterea ut Sulphatem Potassae parari jubet

Gabe, zu einer bis anderthalb Unzen ein gelind reizendes Abführmittel; zu drei bis fünf Scrupel harntreibend. — Man wendet es auch als eröffnend an.

Sal mirabile Glauberi siccatum. (Bor4. HassP.)

Sal mirabile depuratum crasse tritum solis aut modico fornacis calori expone, donec in pulverem siccum fatiscat et cribra. — Bor4 ut natrum carbonicum depuratum siccum.

Liquor Natri sulphurici s. Salis mirabilis Glauberi. (HassP.) Salis depurati drachmas duas, Aquae destillatae unciam unam. — Reagens.

Potio purgans. (B*. BorC. GalM. Ham. *Au. Ra. Sa. Va.*)

℞ Sulphatis Sodae partes sedecim.
Aquae . . . partes quingentas.
Dissolve. (GalM)

℞. Sulphatis Sodae . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Mellis puri . . . semunciam.
Dissolve. (BorC.)

℞. Sulphatis Sodae . . semunciam.
Nitri . . . . drachmam unam.
Succi Citri . . . sesquiunciam.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.
Aquae Rubi Idaei uncias decem.
Misce. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Sodae . unciam unam.
Sacchari . . . . . semunciam.
Succi Citri . semunc. (sesquiunc.)
Decocti Cruti . octarium unum.
Glaßweiſe ſtündlich. (*Au. Va.*)

℞. Salis Glauberi . unciam unam.
Aquae Menthae piperitae,
Infusi Rhei, sing. . uncias tres.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Misce. (Ham.)

℞. Sennae . . . . drachmas tres.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde et cola. (*Ra.*)

℞. Pulpae Tamarind. sesquiunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut unciae quatuor decocti obtineantur, quarum colaturae adde
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Syr. Rosar. solut. . drach. sex.
Misce. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Sodae . sesquiunciam.
Mannae . . . . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Löffelweiſe. (*Au.*)

℞. Sulphatis Sodae drachmas duas.
— Magnesiae unciam unam.
Infusi Cort. Aurant. uncias octo.
Vini rubri . parvam quantitatem.
Misce. (B*.)

℞. Foliorum Sennae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Infunde per momenta decem, cola et adde
Sulphatis Sodae . . semunciam.
Syrupi Rhamni . unciam unam.
Misce. — Auf ein oder zwei Mal. (*Va.* Hôt. D.) — *Va.* Hosp Ant. Sulphatis drachmas tres.

Clyster s. Enema laxans s. purgans. (LH. Li. *Ra. Sa. Sy. Va.*)

℞. Sulphatis Sodae . unciam unam.
Olei Lini . . . . uncias duas.
Decocti Hordei . . uncias sex.
Misce. (*Sy.*)

℞. Specierum emollient. uncias duas.
Foliorum Sennae . semunciam.
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde et cola. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Aquae libras duas, coquere et addere Sulphatis dictam copiam, caeterum ut antea.

Ra. praeterea (*Va.* Hosp. Mat.): Sennae drachmas duas, Sulphatis semunciam et Decocti emollientis (Semin. Lini) libras duas; vel (*Va.* Hosp Inf.):

Sennae semunciam, Sulphatis tantidem et Aquae libram (*Va.* Hosp. St. Ant. Mellis comm. uncias quatuor addit); — Li Decocti emollientis uncias octo, Oxymellis uncias tres et Sulphatis unam.

℞. Herbae Rutae,
Florum Chamomillae,
— Sambuci, sing. semunciam.
Aquae . . . . libram unam.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Salis Glauberi . drachmas tres.
Oxymellis simplicis,
Olei Chamomill., sing. unc. unam.
Misce. (*Sa.*)

LH. nonnisi quantitatem Salis unciarum duarum pro clystere indicat.

Apozema depurans et tonicum. (*Pic.*)

℞. Radicis Patientiae unciam unam.
— Fragariae . . semunciam.
— Inulae . drachmam unam.
Fol. Cichorii,
— Cerefolii,
— Nasturtii, sing. manip. unum.
Sulphatis Sodae drachmam unam.
Syr. Cichorii comp. drach. unam.
Alle Morgen zu nehmen.

Jus s. Brodium purgans. (*Va.* Hosp. Inf.)

℞. Sulphatis Sodae . unciam unam.
Brodii Herbarum . uncias octo.
Dissolve. — Auf zwei Mal, innerhalb einer halben Stunde.

Decoctum Carnis depurans, Brodium depurativum. (*Pic.*)

℞. Brodii gallinacei octarium unum.
Radicis Patientiae . uncias duas.
Coque per horae semiquadrantem et sub finem adde
Fol. Nasturtii,
— Melissae,
— Primulae veris, sing. manipul.
Cola et adde
Sulphatis Sodae . uncias duas.

Apozema laxans. (Gal. *Ca. Fi.*)

℞. Fol. virid. Cichorii,
— — Buglossi,
— — Boraginis, sing. unc. unam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horae quadrantem, cola et colaturae adde
Sulphatis Sodae drachmas duas.
Syrupi Violarum . unciam unam.
Misce bene. (Gal.)

Fi. Aquae libras duas et uncias octo; caeterum ut Gal.

Lotio ad tineam s. excitans. (*Sw. Va.*)

℞. Sulphatis Sodae . . uncias sex.
Saponis albi . . drachmas tres.
Aquae Calcis . uncias octodecim.
— Vitae . . drachmas sex.

Solutio salina gelatinosa. (*Ca.*)

℞. Aquae . . . . libram unam.
Subcarbonatis Sodae,
Collae Flamand., sing. unc. unam.
Sulphatis Sodae,
Salis culinaris, sing. semunciam.
Petrolei . . . . guttas viginti.

Pulvis cathartico-diureticus. (*Sw*.*)

℞. Tartari stibiati,
Opii, singulorum granum unum.
Sulphatis Sodae . uncias duas.
Gummi Arabici,
Rad. Liquiritiae, sing. drach. duas.
Drei oder vier Mal täglich in einem Glase Wasser zu nehmen.

Sal Guindre. (B*. *Ca.*)

℞. Sulphatis Sodae unciam unam.
Nitri . . . . grana duodecim.
Tartari stibiati . . semigranum.
Purgirend. — Man läßt es in einer Pinte Tisane oder Kräuterbouillon auflösen und am Morgen nehmen.

Aqua resolvens. (*Ca.*)

℞. Sulph. Sodae unc. unam ad duas.
Nitri . . . . . grana decem.
Tartari stibiati . semigranum.
Aquae . . . . . libras duas.

Aqua purgans cum Tartaro emetico, Aqua mineralis. (GalM. *Ra.*)

℞. Sulphatis Sodae . drachmas tres.
Tartari stibiati . . grana tria.
Aquae calidae . uncias decem.

Sal Cheltenhamense (*Re.*): Sulphatis Sodae grana 120, Sulph Magn. gr. 66, Mur. Sodae gr. 10, Sulphat. Ferri gr. ½ misce triturando.

Thomson's Real Cheltenham Salts (*Re.*): e Solutione Sulphatis et Subcarbon. Sodae vaporando.

Potio cathartica. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Sodae,
Mannae in lacr., sing. semunciam.
Tartari stibiati . . grana duo.
Aquae . . . uncias quatuor.
Oxymellis scillitici unciam unam.
Gabe, alle zwei Stunden ein Löffel.

Sal Thermarum Carolinarum. (Bor4.) Paratur evaporatione Aquae mineralis. Constat e Natro sulphurico et carbonico.

Sulphas Sodae et Magnesiae, Sal Astracanensis artificialis (*Sw*.*) *Sulphas Magnesiae et Sodae.* (*Fi. Gr.*)

℞. Supersulphatis Sodae . q. vis.

Aquae tepidae quantum sufficit ad perfectam salis dissolutionem, quam cum Magnesia calcinata saturatam filtra et ad crystallisandum sepone. — Laxirend oder harntreibend, je nach der Gabe. — Gabe, von einer halben bis zwei Drachmen, täglich mehrmals, bis auf eine oder zwei Unzen auf einmal.

Gr. e Lixivio Salis marini crystallisatione obtinetur; vel: solutione Salis Epsom. in Solutione Salis Glauberi.

Protosulphis Sodii, Sulphis Sodae. (*Gr. Vm.*)

℞. Subcarb. Sodae . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Dissolve, satura Gase acido sulphuroso, calefac deinde in balneo aquae tepido et liquorem sepone ut crystallos demittat.

Gr. Salis Glaub. sicc. unc. octo, Pulv. Carbon. duas, Sulphuris unam laevigata in crucibulo per semihoram calefac, refrigerata Aqua dissolve, filtra et crystallisatione sulphitem a sulphate separa, vel: Gas acidum sulphurosum per Solutionem Sodae caust. transmitte.

Protohyposulphis Sodii, Hyposulphis Sodae, Sulphites sulphuratus Sodae. (Gal. *Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae partes octo.
Aquae . . . . partes sedecim.
Solutioni adde
Sulphuris sublimati partem unam.

In liquorem immitte torrentem Gasis acidi sulphurosi, filtra post saturationem, tunc evaporet liquor ut crystalli enascantur. (Gal.)

Vm. transmittere torrentem Gasis acidi hydrosulph. in solutionem Sulphitis Sodae vel torrentem Gasis acidi sulphurosi in illam Hydrosulphatis Sodae.

Protonitras Sodii, Nitras Protoxydi Sodii, Nitras Sodae s. natricum s. cubicum, Nitrum cubicum, Nitrum rhomboidale. (B*. *Gr.*)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Acidi nitrici tenuis . . . q. s.
ad saturandum alcali; solutionem ad crystallisandum sepone; — *Gr.* Solutionem Sodae Subcarbonatis Acido nitr. saturare, evaporare et in crystallos cogere. — Man hat dieſes Salz bei Ruhr empfohlen.

Solutio Nitratis Sodae. (B*.)

℞. Nitratis Sodae . . semunciam.
Gummi Arabici . grana decem.
Aquae . . . . . uncias octo.

Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Hydrosulphas Sodae. (*Vm.*)

℞. Sodae caust. calcin. part. unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Post solutionem torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem immitte et sepositione clarificatum serva.

Balneum sulphurosum. (*Ca.*)

℞. Hydrosulph. Sodae unc. decem.
Solutionis salin. gelat. unc. quatuor.

Man thut es im Augenblicke des Badens in das Badewaſſer.

Protoacetas Sodii, Acetas Protoxydi Sodii, Acetas Sodae, Acetas Sodae crystallisatus, Acetis Sodae, Deutoacetas Sodii, Sal Sodae acetatum, Sal acetosum minerale, Acetas natricum, s. natricus cum Aqua, Alcali minerale acetatum, Natrum aceticum, Soda acetata s. acetosa, Terra foliata mineralis s. Tartari crystallisata. (A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 D. Gal. Han. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sar. *Fi. Gr. Re. Sw. Va. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Sodae quantum vis.
Aceti destillati quantum sufficit ad saturandum alcali; cola liquorem, qui ad pelliculam evaporatus refrigeret ut crystalli enascantur.

Gr. Acidum aceticum Subcarbonate Sodae saturare, filtrare, vaporare etc.

Harntreibend oder cathartiſch, je nach der Gabe; letztere von zwei bis vier Drachmen.

Pilulae antilacteae s. ad repulsionem lactis. (*Bo.*)

℞. Acetatis Sodae drachmas quinque.
Camphorae,
Nitri, singulorum drachmas duas.
Roob Sambuci quantum sufficit.

Fiant pilulae centum viginti. — Gabe, zwei Stück Morgens und zwei Abends.

Pulvis diureticus. (*Au.*)

℞. Acetatis Sodae,
Elaeosacch. Juniperi, sing. drach. tres.
Scillae . . . . . grana sex.
Calami aromatici semidrachmam.
Opii . . . . . grana tria.

Fiant doses sex. — Gabe, täglich drei Stück in Wachholderthee.

Pilulae e Rheo cum Natro acetico s. laxantes. (*Au.*)

℞. Rhei,
Acetatis Sodae,
Fellis Tauri inspiss., sing. drach. unam.

Gummi Arabici semidrachmam. Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, zehen bis funfzehen Stück täglich zwei Mal.

Protomeconas Sodii, Meconas Protoxydi Sodii, Meconas Sodae. (Fer.)

℞. Acetatis Sodae . unciam unam. Tinct. Opii alcoh. unc. quatuor. Digere per dies aliquot, filtra ut crystalli enatae separentur, quae Alcoholis bullientis ope purificentur.

Man hat dieſes Salz als ein ſicheres Mittel gegen Bandwurm empfohlen; es muß aber mit großer Vorſicht angewendet werden, da es, zu einem halben Gran gegeben, ſchon ein heftiges Gift iſt.

Proto-Oleomargaras Sodii.

S. Proto Oleomargaras Potassii.

Solanum.

Wir führen hier an:

1) *Solanum Lycopersicum, L.*; Liebesapfel, Goldapfel; Tomate, Pomme d'amour (*Gal.*); Lovapple (*Ang.*); Elskobsaeble (*D.*); Tomates (*His.*); Appeltje der liefde (*Bel.*); Pomo d'amore (*I.*); Tomate (*Lus.*); Karleksaeple (*Suec.*).

Gal. *Gr.*

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, J.) Eine Südamericaniſche, in Europa cultivirte Pflanze. (*Rumph* Amb. V. t. 154. *Blackw.* t. 133. *Plenck* t. 122.)

Man wendet die Früchte (Mala Lycopersica) an; es ſind runde, verſchiedenlappige, fleiſchige, ſaftige, glatte, glänzende, gelbe oder rothe Beeren, welche in einem ſäuerlichen Fleiſche eine große Anzahl Saamen enthalten.

2) *Solanum Melongena, L.*; Eierfrucht; Aubergine, Melongène (*Gal.*); Eggplunt (*Ang.*); Berinjela (*His.*); Eijerdragende nagtschade (*Bel.*); Melanzana (*I.*); Beringela (*Lus.*).

His. His3. *Be. Gr.*

☉ Eine im ſüdlichen Europa cultivirte Pflanze. (*Plenck* t. 123.)

Man wendet die Frucht (pomum Melongenae s. Mala insana) an; ſie iſt von verſchiedener Geſtalt und Farbe, bald weiß und vollkommen eiförmig, bald langgeſtreckt und violett.

Nährend, lindernd. — Man wendet ſie auf ſchmerzhafte Hämorrhoidalknoten an.

3) *Solanum nigrum, L.*; ſchwarzer Nachtſchatten; Morelle noire (*Gal.*); Black nightshade (*Ang.*); Psy vjno (*B.*); Svineurt, Soebaer (*D.*); Hierba moiro (*His.*); Zwarte nagtschade (*Bel.*); Solano nero, Solatro, Erba morella (*I.*); Psinki ziele (*Pol.*); Herva moira (*Lus.*); Hansletsgras (*Suec.*)

An. Ba. Br. D. Fer. Gal. GalM. Geu. His. His3. LP. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Sp.* Z.

☉ Eine in ganz Europa ſehr gemeine Pflanze. (*Bull.* t. 67. *Blackw.* t. 107. *Plenck* t. 120. *Hayne* II. t. 40. *Zorn* Ic. pl. t. 44.)

Man wendet das Kraut (herba Solani nigri s. vulgaris) an; es beſteht aus einem rundlichen, wehrloſen, äſtigen, glatten Stängel mit eirunden, eckig und ſpitzig gezähnten Blättern. Es hat einen angenehmen, betäubenden Geruch und einen Ekel erregenden Geſchmack.

Die Beeren enthalten, nach Desfosses, ein eigenthümliches Alcaloid, das Solanin (Solaninum, Solanina).

Leicht ſchweißtreibend, äußerlich erweichend und lindernd.

4) *Solanum tuberosum, L.*; Kartoffel; Pomme de terre (*Gal.*); Common potatoe (*Ang.*); Rata inuada (*Cy.*); Jordeable (*D.*); Patata de la Mancha (*His.*); Patata, Pomo di terra (*I.*); Aardappel (*Bel.*); Ziennce jablko (*Pol.*); Batata du terra (*Lus.*); Jordpaeron (*Suec.*); Wal arai kilangu (*Tam.*); Uralay gudda (*Tel.*).

Fer. Gal. *A. Fi. G. Gr. M. Re.*

♃ Eine in America einheimiſche, von Walther Raleigh im Jahr 1584 nach Europa gebrachte Pflanze. (*Bauh.* Prodr. t. 39. *Plenck* t. 121. *Bert.* Bild. II. 56. fig. 2.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Der Gebrauch der Wurzel (Pomaterrestria) in der Küche iſt allgemein bekannt.

In der Medicin wendet man das Stärkemehl an, welches dieſe Wurzel in großer Menge enthält.

Das Kraut gilt für krampfſtillend. Latham empfiehlt das Extract davon.

Solanum incanum. (*Gr.*) Blätter gegen Krebs.

Decoctum narcoticum. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Fol. sicc. Solani nigri unc. duas. Capita Papaveris albi . . no. 4. Aquae . . . . . libras duas. Coque et cola. — Lindernd und beſänftigend, in Bähungen, örtlichen Bädern, Einſpritzungen und Klyſtiren anwendbar.

Oleum Solani nigri. (Gal. His. His3. T.)

℞. Herb. Solani nig. c. Sem. part. unam. Olei Olivarum . . partes tres. Digere per aliquot tempus inter ci-

neres calidos, tunc ad consumptionem humidi usque coque. (His.)

His. Herbae libras tres, Olei octo, macerationem solis calore, aut loco calido, per triduum aut quatriduum et cetera ut antea; — Gal. Foliorum partem unam et duas Olei; — *T.* Herbae uncias duodecim, Olei libras quatuor, digestionem per horas 24, filtrationem olei, expressionem faecum, novam cum aequali Summitatum et Florum copia levem coctionem per aliquot momenta, filtrationem et expressionem et denique sepositionem olei ut clarificetur.

Unguentum Solani. (*Sp.*)

℞. Succi Fol. et Bacc. Solani expr. uncias triginta sex.
Olei Olivar. . . . . unc. 54.
Cerussae . . uncias octodecim.
Lithargyri . uncias triginta sex.
Coque et adde
Cerae albae . . . uncias sex.
Pulveris Olibani . uncias tres

Aqua Solani nigri. (Br. Gal. Pal.)

℞. Herbae Solani nigri partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet dimidia pars. (Br. Pal.)

Gal. Herbae partes quinque in Aquae duodecim cum dimidia submersas, destillando partes decem abstrahere, productum miscere cum Herbae partibus quinque et Aquae decem, destillando iterum partes decem abstrahere et operationem, si necessarium videtur, tertiò repetere.

Faecula s. Amylum Solani tuberosi, Farina Potatoe. (B*. Bel. Fer. Gal. *Fi. Gr. Re. T. Vm.*)

℞. Pomorum terrest. lot. . q. vis.

Raspa, pulpam commisce cum Aquae tanta quantitate ut per cribrum e crinibus textum possit transmitti; liquorem turbidum exinde profluentem in vase porcellaneo (Fajence) excipe, sepone, faeculam lotionibus reiteratis purifica et blando calore loco obscuro sicca.

Fi. Poma terrestria rec rasa in vas Aqua repletum immittere, faeculam ad fundum descendentem pluries lavare et siccare; — *T.* Poma terrestria rasa vel molita Aqua multa super cribro e crinibus confecto tractare etc.

Gelatina ex Amylo Solani tuberosi. (B*.)

℞. Faecul. Solani tuber. unc. unam.
Aquae . . . . libram unam.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Coque sufficienter.

Solanina, Solaninum. (*Gr. Ma.*)

E Succo Baccarum Solani nigri penitus maturarum, cui filtrato adde Ammoniam, filtra, sedimentum ablue, coque in Alcohole, filtra et spiritum destillando abstrahe, quo facto solanina sub pulveris albi forma remanet.

Acetas Solaninae. (*Gr. Re.*)

Ut acetas morphinae paratur. — Zu ¼ Gran ein kräftiges Brechmittel.

Soldanella.

Calystegia (*Convolvulus*) *Soldanella, Röm.* et *Sch.*; Meerkohl, Seekohl, Meerwinde, Meerstrandswinde; Soldanelle, Chou marin (*Gal.*); Seab ndweed (*Ang.*); Sacesnerle (*D.*); Soldanella (*His. I. Lus.*); Zeewinde (*Bel.*); Sjaevinda (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, J.) Eine in Europa am Meeresufer wachsende Pflanze. (*Lob.* Ic. t. 602. *Plenck* t. 93.)

Man wendet das Kraut (herba Soldanellae s. Brassicae marinae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit rundlichen oder nierförmigen, am Grunde herzförmig ausgerandeten, glatten, sehr langgestielten Blättern.

Purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu anderthalb Drachmen.

Sonchus.

Sonchus oleraceus, L.; Kohlgänsedistel, Gemüsehaasenkohl; Laiteron commun (*Gal.*); Common sowthistle (*Ang.*); Svinetistel (*D.*); Corraja (*His.*); Melkdistel (*Bel.*); Sonco (*I.*); Mlezne (*Pol.*); Serrutha (*Lus.*); Mjaelk tistel (*Suec.*).

Br. Gal. *G. Gr. M. Sp.*

☉ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synantherae, *Cass.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 148. *Blackw.* t. 80. 130. *Hayne* I. t. 48.)

Man wendet das Kraut (herba Sonchi laevis et asperi) an; es besteht aus einem ästigen, walzigen, glatten, hohlen Stängel mit abwechselnden, umfassenden, glatten, gewöhnlich schrotsägeförmig, in spitzige, gezähnte Lappen, mit dreieckigem, sehr großen Endlappen, getheilten Blättern. Es hat einen schwach bittern Geschmack.

Sorbus.

In den Pharmacopöen werden angeführt: 1) *Sorbus domestica, L.*; Spierlings-

baum, Eſchröslеinbaum; Cormier (*Gal.*); Sorbo officinale (*I.*)

Gal. Wir. *Be. Br. Gr. Re.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Europa's. (*Jacq.* Austr. V. t. 447.)

Man wendet die Frucht (fructus Sorbi) Corme, Sorbe (*Gal.*) an; es iſt ein kleiner birnförmiger Apfel, welcher drei knorpelige längliche Saamen enthält. Sie iſt anfangs ſehr herbe, wird aber bei anfangender weinſäuerlicher Gährung ſüß, behält jedoch immer etwas Adſtringirendes.

2) *Sorbus aucuparia*, *L.*; Vogelbeerbaum; Sorbier des oiseleurs (*Gal.*); Mountain ash (*Ang.*); Fuglebaer (*D.*); Serbar de cazador (*His.*); Sorbenboom (*Bel.*); Sorbo selvatico (*I.*); Jakszebina (*Pol.*); Serveira brava (*Lus.*); Roenn (*Suec.*)

Br. Fer. Ful. Li. LP. Suec. *Be. Gr. Re. Sp.*

Ein Baum (Icosandria Trigynia, L.; Rosaceae, J.), welcher in ganz Europa wächſt. (*Zorn* Ic. pl. t. 440. *Blackw.* t. 173.)

Man wendet die Früchte (baccae s. poma Sorbi aucupariae s. Fraxini sylvestris) an; es ſind kleine runde, hellrothe, weiche, an der Spitze mit einem Nabel verſehene Beeren, welche drei knorpelige Saamen enthalten. Ihr Geſchmack iſt adſtringirend, ſauer und unangenehm. — Die Vogelbeerſäure (Acidum sorbicum), von welcher er herrührt, iſt nach Labillardière und Braconnot nichts anders als Apfelſäure.

Adſtringirend, harn-, waſſertreibend, antiſcorbutiſch.

Pulpa Baccarum Sorbi. (*T.*)

Fructus sicci coquantur cum Aquae bull. q. s. ad mollitiem usque, et nucleis separatis in mortario contundantur; trajice pulpam per crinium.

Conserva Fructuum Sorbi. (*Fi. T.*)

℞. Fruct. Sorbi non matur. q. vis.
Coque ad mollitiem, tunc cum Sacchari pondere aequali ad conservae consistentiam.

T. Pulpae Sorbium libras quatuor, Syrupi parati cum Liquido Decocti Fructuum et ad plumam evaporati libras sex ad consist. necessariam vaporando redigere.

Roob Sorbi aucupariae. (Ful. Li.)

℞. Bacc. Sorbi auc. contus. libr. octo.
Infunde tantam Aquae quantitatem ut digiti crassitiem tegantur et vase leni igni imposito coque per semihoram, cola fortiter exprimendo, colaturae adde Sacchari libram et blando igne ad consist. requisitam consume.

Kühlend, harntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Unze.

Spigelia.

Von dieſer Pflanzengattung finden ſich:

1) *Spigelia anthelmia*, *L.*; wurmwidrige Spigelie; Spigélie anthelmintique (*Gal.*); Arapabaca (*Br.*); Espigelia (*Lus.*).

Ams. B. Br. D. Fer. Gal. R. Sax. Wir. Würr. *G. Gr. M. Re.*

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Gentianeae, J.) Eine Nordamericaniſche Pflanze. (*Desc.* Fl. Ant. I. 61. *Lam.* Ill. t. 107. *Plenck* t. 88. *Zorn* Ic. pl. t. 469.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae anthelmiae) iſt klein und faſerig. — Das Kraut beſteht aus einem runden Stängel, an deſſen Spitze vier große, wirtelförmig geſtellte Blätter entſpringen.

2) *Spigelia Marylandica*, *L.*; Maryland'ſche Spigelie; Spigelie de Maryland (*Gal.*); Carolina pink, Indian pink, Snaake root (*Ang.*).

Am. Ams. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. His. HisS. Li. Lon. LonN. Lus. R. Sax. Suec. Wir. *Be. Br. C. Gr. M. Re.*

♃ Eine Nordamericaniſche Pflanze. (*Cat.* Carol. 2. p. 78. t. 78. *Plenck* t. 89. *Schk.* t. 37. *Hayne* Term. bot. t. 44. f. 5. *Bigel.* t. 14.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Spigeliae Marylandicae) iſt einfach und faſerig. — Das Kraut beſteht aus einem vierſeitigen Stängel mit gegenüberſtehenden, ſitzenden, eirundlänglichen, ganzen, ſpitzigen, glatten Blättern. Es hat einen häßlichen, betäubenden Geruch und einen bittern, ekelhaften Geſchmack.

Reizend, wurmwidrig, larirend. — Gabe des Pulvers, für Kinder von zwölf Jahren zwölf Gran, für Erwachſene eine Drachme.

Pulvis vermifugus. (*E.*)

℞. Spigeliae Maryland. gr. sedecim.
Mercurii dulcis . . grana octo.
Auf eine Gabe.

Decoctum Spigeliae. (Ful. Würr.)

℞. Herb. Spigel. anthel. manip. duos.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coque et colaturae adde
Succi Citri rec. expr. drach. sex.
Syr. Flor. Persicae . unc. duas.

Aquae . . . . . libras duas.
Gabe, alle sechs Stunden zwei bis drei Unzen für einen Erwachsenen.

Infusum anthelminticum s. Spigeliae anthelmiae. (Am. B*. Ful. *C. E. Sa. Sw.*)

℞. Herb. Spigel. anthelm. semunciam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Macera per horas duas et cola. (*E. Sa. Sw.*)

Am. et *C.* Spigeliae drachmas duas, Aquae semioctarium, et quatuor horas digestionis.

℞. Herbae Spigeliae drachmas tres.
Aquae bullientis uncias quatuor.
Adde colaturae
Olei Rutae . . . . guttas duas.
Misce bene. (Ful.)

Gabe, Abends anderthalb bis zwei Unzen. — Man kann zwei Drachmen Serpentaria zusetzen.

Infusum Spigeliae compositum s. vermifugum. (*E. Gr.*)

℞. Spigeliae Marylandicae semunciam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Mannae . . . . unciam unam.
Foeniculi drach. duas ad quatuor.
Aquae bullientis octarium unum.

Gabe, ein Glas täglich drei oder vier Mal.

℞. Radicis Spigeliae . semunciam.
Foliorum Sennae drachmas duas.
Corticis Aurantii,
Seminum Santonici,
— Foeniculi, sing. drachmam.
Aquae ferventis uncias duodecim.
Macera per bihorium. — Morgens nüchtern ein Weinglas voll, gegen Spulwürmer. (*Gr. Sprague*)

Syrupus Spigeliae. (*Ca.*)

℞. Fol. Spigeliae anthelm. unc. duas.
Sem. Anisi contus. semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Infunde in balneo aquae per horas sex vel septem, cola fortiter exprimendo et adde
Extr. Jalapae gumm. semunciam.
Dissolve, filtra et colaturae adde
Sacchari albi . . . . duplum.

Gabe, zwei Kaffeelöffel täglich für Kinder; für Erwachsene ein Eßlöffel Morgens und Abends in einer halben Tasse Vehikel.

Spinacia.

Spinacia oleracea, L.; Spinat; Epinard commun. (*Gal.*)

Br. Gal. *Be. Gr. M.*

⊙ oder ♂ (Dioecia Pentandria, L.; Atriplicene, *J.*) Eine Pflanze, deren Vaterland nicht bekannt ist; und welche man in Europa in Küchengärten baut. (Encycl. méth. t. 814. *Blackw.* t. 49. f. 2 — 4. *Schk.* t. 324.)

Man wendet das Kraut (herba Spinaciae s. Spinachiae) an; es besteht aus einem geraden, etwas ästigen Stängel mit gestielten, pfeilförmigen, dunkelgrünen Blättern. Sein Geschmack ist fade.

Erweichend.

Spiraea.

Von dieser Pflanzengattung findet man:

1) *Spiraea Filipendula, L.;* Spierstaude, Filipendelwurz, rothe Steinbrechwurz; Filipendule (*Gal.*); Dropwort (*Ang.*); Roed steenbraek (*D.*); Roode steenbreck (*Bel.*); Filipendula (*I.*); Kropidelco mnicysze (*Pol.*); Brudbroed (*Suec.*).

Br. Gal. His. His3. Li. Wir. Wür. *Be. G. Gr. M. Sp.*

♃ (Icosandria Pentagynia, L.; Rosaceae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 394. *Hayne* VIII. t. 30.)

Man wendet die Wurzel (radix Saxifragae rubrae s. Filipendulae) an; sie besteht aus vielen dünnen, mit fleischigen, rundlichen oder länglichen Höckern besetzten Fasern, ist außen dunkelbraun oder schwärzlich und inwendig röthlichweiß, hat bloß im Herbst einen Orangengeruch und einen süßlichen Geschmack, welcher bei'm Trocknen adstringirend und bitterlich wird.

In Rußland wird von den Kosaken der Aufguß der Blätter gegen Bandwurm angewendet.

2) *Spiraea Ulmaria, L.;* Geisbartwurzel, Wiesenkönigin, Sumpfspierstaude; Reine des prés (*Gal.*); Queen of the meadows (*Ang.*); Miaedurn (*D.*); Reyno del prado (*His.*); Reynette (*Bel.*); Regina degli prati (*I.*); Rozia brodka (*Pol.*); Rainha dos prados (*Lus.*); Miaeaert (*Suec.*).

Br. Gal. Gen His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 141. *Hayne* VIII. t. 31. Düss. off. Pfl. t. 6.)

Man wendet die Wurzel, die Blätter und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Barbae caprinae s. Barbulae caprinae s. Ulmariae s. Reginae pratensis) ist walzig, ungleich, mit reichlicher Behaarung versehen, außen schwärzlichbraun, inwendig röthlich oder gelblich, von etwas bitterem und styptischem Geschmack. — Die Blätter sind gefiedert, am Ende mit einem unpaarigen dreilappigen Blättchen, die Blättchen sind abwechselnd groß und klein. — Die Blüthen sind weiß

und haben einen ſchwachen, aber angenehmen Geruch nach bittern Mandeln, welcher ſich bei'm Trocknen verliert und einen ſüßen etwas adſtringirenden Geſchmack.

Gr führt noch *Spiraea salicifolia*, Saamen adſtringirend; und *Sp. tomentosa* an. *Aqua Ulmariae* a *Gr.* indicatur.

S p o n g i a.

Spongia marina, officinalis; Badeſchwamm, Meerſchwamm, Waſchſchwamm; Éponge de mer (*Gal.*); Sponge (*Ang.*); Isfenj (*Ar.*); Esponjas (*His.*); Muaba dul (*Hin.*); Spons (*Bel.*); Spugna (*I.*); Univatta (*J.*); Abermurdeh (*Pe*); Esponja (*Lus.*); Badswamp (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. Has-P. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Br. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Ein faſeriges Geflecht oder vielmehr Filz von verſchiedenen Seekörpern, welche hinſichtlich ihrer Organiſation an den Gränzen des Thierreichs ſtehen.

Man wendet vorzugsweiſe den lappigen Seeſchwamm, Spongia lacinulosa, *Link.* (*Esp.* Pflzth II. t. 15 — 17), Eponge pluchée (*Gal.*), aus dem Mittelländiſchen, dem rothen Meere und dem Indiſchen Ocean an. Er iſt rundlich, platt, kaum lappig, weich, filzig, ſehr löcherig und auf der Oberfläche mit unzähligen Läppchen bedeckt.

Fyſe hat Jod darin gefunden.

Spongia praeparata. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lus. O. Pm. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

1) Ohne Wachs. *Spongia praeparata absque cera, Spongiae compressae.*

℞. Spongiam tener. lotam et mund. no. 1.

Humidam adhuc funiculis circumductis constringe fortiter, gyris funiculi ita contiguis ut nullus intersit spongiae exitus, nodoque facile solubili retine, sicca sedulo et in loco bene sicco serva. (Fer. Gal. GalM. LH. Pm. *Fi. Re. Sw.*)

Bor4. Spongias in frustula oblonga scissas et Aqua fervida humectatas constringere; — His. His3. Spongiam in longos lobos concisam Albumini Ovi immergere antequam funiculis circumstringatur; — *Vm.* Mucilagine Gummi Arabici illam imbibere.

2) Mit Wachs. *Spongia cerata s. praeparata cum Cera, Spongiae ceratae.*

℞. Spongiam tener. sicc. bene lotam et ab omnibus alienis liber. no. 1.

In ceram flavam (vel Empl. Cerae *Re.*) igne liquatam immerge, interpositam deinde laminis duabus stanneis in balneo aquae calefactis comprime et post refrigerationem exime. (A. Ams. An. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fenn Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. LH. Li. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. Fi. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

Man bedient ſich deſſelben, um Fiſtelgänge und natürliche oder widernatürliche Oeffnungen zu erweitern. In die gehörige Form geſchnitten, giebt er die *Turundae intumescentes Gr.*, welche zu den eben angegebenen Zwecken benutzt werden

Spongia dealbata. (*Gr.*)

Spongiam macerando in Acido muriatico dilutissimo omni materia calcarea liberatam per quinque vel sex dies in Aqua frigida, frequenter alia restituenda et spongiam quaque vice bene premendo, tunc vero per septimanam in Acido sulphuroso macera, acidum saepius mutando ablue et Aquae Rosarum vel Florum Aurantiorum odoriferam redde.

S t a c h y s.

Stachys recta, L.; Berufskraut: Crapaudine (*Gal.*); White stachys (*Ang.*); Estaquis recta, Yerba de feridura (*His.*).

His. His3. Wir. *Sp*

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine Südeuropäiſche Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t 359.)

Das Kraut (herba Sideritidis hirsutae) beſteht aus einem vierkantigen, wenig äſtigen, ſchwach behaarten Stängel mit elliptiſchen oder lanzettförmigen, herzförmigen, gekerbten, rauh anzufühlenden Blättern. Es hat einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften Geſchmack.

Reizend, für ein Wundmittel geltend.

S t a n n u m.

Jupiter; Καττιτερος, Σταγγος; Zinn; Etain (*Gal.*); Tin (*Ang Bel D.*); Muster, Resas (*Ar.*); Bedil (*Ebr.*); Caimathar (*Chald.*); Xifilil (*Ind.*); Pazaz (*Sarac.*); Yang seih (*C.*): Runga (*Duk.*); Estanno (*His.*); Kulai (*Hin.*); Stagno (*I.*); Tima (*Mal.*); Urziz (*Pe.*); Cyna (*Pol.*); Estanho (*Lus.*); Olowo (*R.*); Trapu, Ranga (*Sa.*); Tenn (*Suec.*); Tagarum (*Tam.*); Galai (*Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. C. Fi. G. Gr. Par. Sa. Sp. T. Va.*

Ein derbes, faſt ſilberweißes, weiches Metall, welches ſich in Bleche ſchlagen läßt, wenig ſtreckbar, bei 210° ſchmelzbar, nicht flüchtig iſt und durch feuchte Luft nur wenig verändert wird. Spec. Gewicht = 7,291. Wenn man es biegt, läßt ſich ein eignes Geräuſch hören.

Stannum pulveratum s. praeparatum s. granulatum s. raspatum, Limatura s. Limaturae Stanni, Oxydulum Stanni, Pulvis Stanni s. Stanni philosophice praeparatus. (A. Am. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. O. Pal. R. Sar. Suec. Wür. *C. Fi. Gr. Re. Sa. Sw.*)

℞. Stanni Anglici . . quantum vis.
Limae subtilis ope diminue et pulverem cribratum ad usum serva. (Am. Ba. Bor4. Br. Du. Fer. HassP. Pal. *C. Sw.*)

Li. antequam servetur, coquere in Aceto jubet, donec hoc supremum a Subcarbonate Potassae non amplius praecipitatur.

℞. Stanni puri . . . quantum vis.
Fusum in pyxidem ligneam internè hispidam et cretâ detritam ingere, quam clausam vehementer agita; pulverem per cribrum trajice. (A. B. Gal. O. Pal. Sar. Suec. Wür. *Fi. Gr.*)

Gr. praeterea: Stannum in mortario ferreo fusum, dum refrigescit, agitare ut in pulverem abeat, qui per cribrum trajiciatur.

℞. Limaturae Stanni . partes duas.
Cretae pulveratae partem unam.
Contere in mortario. (R.)

Sa. Stanni drachmas tres et Corallii unciam unam.

℞. Stanni foliati,
Sacchari albi, sing . part. aeq.
Contere, per cribrum trajice, coque pulverem in Aquae magna copia et deinde sicca. (An.)

Bel. Sal culinare contundere in mortario calefacto, illi superfundere deinde stannum fusum, pistillo celeriter et fortiter agitando, donec massa sit bene pulverata, tunc lotam et siccatam per cribrum trajicere.

℞. Limaturae Stanni . partes duas.
Oculor. Cancrorum part. unam.
Contunde simul. (Ful.)

Pulvis Stanni factitius. (*Gr.*): Cinerum Stanni libras quatuor, Eboris usti uncias quatuor. Statt der Zinnfeile, bringt aber bisweilen üble Wirkung hervor.

Pulvis fermifugus. (*Ca.*)

℞. Stanni pulverati . unciam unam.
Aethiopis mineralis scrupulos duos.
In ſechs Gaben in Syrup, Theriak und Honig, zwei Mal täglich zu nehmen.

Pulvis Stanni cum Deutosulphate Ferri s. Stanni martiatus s. ferratus s. vermifugus. (LH. *Au. Sa. Sw. Va.*)

℞. Limaturae Stanni drachmas duas.
Sulphatis Ferri . grana quinque.
Contrita in partes quinque divide. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

Bolus e Stanno s. vermifugus. (*Sa. Sw.*)

℞. Pulveris Stanni . semiscrupulum,
Conserv. Cort. Aurant.
scrup. unum.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Electuarium vermifugum. (*Ca. E. Pie. Ra.*)

℞. Stanni pulv. . . drachm. sex ad unciam,
Mellis despumati uncias quatuor.
Gabe, Morgens zwei oder drei Löffel. (*E.*)

℞. Stanni pulverati . unciam unam.
Extracti Artemisiae,
Pulv. Jalapae, sing. drach. unam,
Syr. Cichorii comp. . . . q. s.
Auf zwölf oder fünfzehen Mal in einer halben Stunde Zwiſchenraum, indem man eine Taſſe Kräuterbouillon dazu trinkt. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Stanni pulverati, unciam unam.
Radicis Filicis maris drachmas sex.
Seminum Cinae . . semunciam.
Jalapae,
Sulph. Potassae, sing.
drach unam.
Mellis . . . quantum sufficit.
Gabe, Morgens alle halbe Stunden einen halben Kaffeelöffel voll. (*Au. Ca. Pie.*)

Amalgama Stanni s. Hydrargyri cum Stanno s. Jovis, Pasta Jovis. (Am. His. His3. Wür. *C. Sa.*)

℞. Stanni . . . . . uncias duas.
Mercurii . . . . . uncias tres.
Calefac mercurium in crucibulo, donec in vaporem converti coeperit, infunde stannum seorsim igne liquatum et miscellam in mortario marmoreo agita, Salis comm. pauxillum addendo, ablue deinde bene et in linteo sicca. (His. His3.)

Su. conjungere simul Mercurii drachmas tres et Stanni uncias duas et amalgama, triturando in mortario marmo-

reo, in pulverem redigere; — Am. et C. conjungere simul Stanni partes quinque et duas Mercurii et amalgama terere cum Cretae praeparatae parte una, donec splendorem metallicum penitus amiserit; — Wür. Stanni et Mercurii, sing. unciam unam commiscere et mixturam refrigeratam simul cum Concharum praep. uncia una pulverare.

Pulvis vermifugus. (*Sa.*).

℞. Amalgamatis Stanni semidrachm.
Rhei pulverati,
Antimon. diaphor. non abluti, sing. grana decem.

Zweimal täglich.

Pilulae anthelminticae. (*Sw**.)

℞. Amalgamatis Stanni quantum vis.
Inter cineres calidos impone ut metalla oxydentur, adde
Extracti Absinthii quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum sex. — Gabe, Morgens vier, sechs oder acht Stück.

Electuarium joviale ad taeniam s. vermifugum. (Br. Wür. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Stanni puri,
Mercurii, sing. . unciam unam.
Fiat amalgama, quod cum
Concharum praep. . uncia una in pulverem redige, cui sensim adde
Conservae Absinthii uncias duas.
Syrupi Menthae quantum sufficit ut fiat electuarium. (Br. Wür. *Ca. Sp.*) *Vm.* loco subcarbonatis calcis (conchar.) Magnesiam calcinatam et loco syrupi menthae illum Sacchari adhibet.
Gabe, zwei Drachmen täglich zwei Mal.

Unguentum empiricum Tlaki in tumoribus haemorrhoidalibus s. antihaemorrhoidale. (*B.*)

℞. Limaturae Stanni,
Mercurii, sing. . drachmas duas.
Fiat amalgama, cui adde
Unguenti rosati . unciam unam.
Praecipitati rubri drachmas duas.
Olei Menthae pip. guttas viginti.
Misce triturando.

Cineres Stanni (*Gr.*); Scorias a Stanno modo liquato usque colorem albidum accipiant, calcina; vel: Stannum liqua in Plumbi pari pondere vel sesquiuncia, ignem ad ruborem mixturae auge.

Protoxydum Stanni, Suboxydum Stanni, Stannum suboxydatum s. pulveratum, Pulvis Stanni (B*. Pal. *Gr. Sw. Vm.*)

℞. Stanni puri . . . quantum vis.
In fusione bene aëri aperto expositum, donec totum in pulverem griseum sit conversum, quem tritum cribra. (Pal. *Gr. Sw Vm.*)

℞. Chlorur. Stanni in Aqua soluti quantum vis.
Potassae caust. liq. . . q. sufficit ad praecipitandum et dissolvendum oxydum; filtra solutionem et Acidum hydrochloricum infunde ut oxydum praecipitetur. (B*.)

Wurmwidrig, purgirend, besonders gegen Bandwurm in Gebrauch, aber auch gegen Lungenschwindsucht gerühmt. — Gabe, fünf bis sechs Gran.

Antihecticum Poterii, Bezoarticum joviale, Peroxydum Stanni. (Sar. Wir. *Gr. Sp. Vm.*)

℞. Stanni . . . . unciam unam.
Nitri . . . . . uncias tres.
In crucibulum rubro ardens immissa calcinentur et calx bene abluatur.

℞. Reguli Antimonii partes quatuor.
Stanni subtilis part quinque c. dimidia.
Liquata igne in laminam metalli frigidam effunde et cum Nitri pulverati partibus quindecim commisce; in crucibulum incandescens ingere et mixta fusa que prope ignem adhuc per aliquot tempus retine, tunc refrigerata cum Aqua frigida ablue et blando calore sicca. (*Vm.*)

Wir. et *Sp.* Reguli uncias sex, Stanni duas et Nitri viginti quatuor; — Sar. Reguli sex, Stanni tantidem et Nitri triginta sex; — *Gr.* Reguli, Stanni, sing. partes aeq mixtae cum Nitri triplo deflagrent et bene abluantur.

Ehedem für geeignet gehalten, Blut- und Saamenflüsse zum Stillstand zu bringen und colliquative Schweiße Schwindsüchtiger zu mindern. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends.

Persulphuretum s. Bisulphuretum Stanni, Oxydum nigrum Stanni s. Stanni hydrosulphuretum, Stannum sulphuratum, Stannum praeparatum cum Sulphure, Protosulphuretum Stanni, Sulphuretum Stanni, Aurum mosaicum s. musivum. (An. B*. Fer. Pm. *Br. Ca. Fi. Gr. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Stanni pulverati . . uncias tres.
Sulphuris sublimati unciam unam.
In crucibulum supra carbones ardentes ingesta calefac, donec flamma vivacissima appareat, ab igne remove, obtege crucibulum et massam refrigeratam porphyrisa et cribra. (An. Fer. Pm, *Br. Ca. Fi. Re. T.*)

Vm. Calcinare simul Oxydi Stanni partes septem et Sulphuris in baculis quatuor c. dim.

℞. Chlorureti Stanni . quantum vis. Infunde Hydrosulphatem Potassae liquidum, donec nullum amplius enascatur praecipitatum, quod siccatum ad ruborem usque calefac. (*Sw*. Vm.*)

Gr. Stannum in Acido muriatico dissolve, per Subcarbonatem Sodae praecipita, praecipitatum cum Sulphuris pondere dimidio misce et sublima.

Gr. Limaturae Stanni, Sulphuris, Salis Ammoniaci, sing. partes aequales sublima.

℞. Stanni . . . partes duodecim.
Mercurii . . . . . partes tres.
Florum Sulphuris partes septem.
Salis Ammoniaci . . partes tres.

Tere lenteque calefac, quamdiu Gas acidum sulphuricum evolvatur, calcina deinde fortiter, donec massa squamosa, splendens flava remaneat. (B*.)

Gr. Quatuor ingredientium, sing. partes aequales.

Blaine's powder (*Re.*): Praeparatum e Stanni sulphureto ignotum.

Pulvis vermifugus. (*Sw*.*)

℞. Persulphureti Stanni partes tres.
Mercurii . . . . partem unam.

Tritura ad mercurii extinctionem usque. — Besonders bei Bandwurm empfohlen. — Gabe, von zwei Drachmen bis eine halbe Unze, Morgens in Wermuthconserve.

Oxydum Stanni. (*Gr.*): Stannum in Aqua regia in vase parvo tecto solvere et protinus in Solutione Potassae Subcarbonatis q. s. ad acidum saturandum effundere, filtrare et lavare.

Chloruretum Stanni, Liquor fumans Libavii, Butyrum Stanni, Murias superoxygenatus Stanni, Deutomurias Stanni, Deutohydrochloras Stanni, Murias Stanni s. Oxyduli Stanni. (B*. Ba *Vm.*)

℞. Stanni . . . . partem unam.
Acidi hydrochlor. concentrati partes tres.

Dissolve caloris ope et crystallisationi subjice.

Ein heftiges Purgirmittel. — Gabe, zwei Gran.

Ba. dilutum cum Aquae partibus novem ut reagens ad detegendum auri praesentiam indicat.

Liquor Stanni muriatici, Murias Oxyduli Stanni liquidus. (HassP. sec. Ba.) Limaturae drachmas tres, Acidi Salis sex calore 30° vel 40° solvatur, liquorem saturatum a reliquo stanno defunde et cum Aquae dest. duplo dilutum, clarum serva. — Ut reagens.

Gr Stanni granulati partem unam, Acidi muriatici 25° B. quatuor dissolvere, vaporando in crystallos cogere, redissolvere, cryst. et iterum dissolvere. (*Murias Stanni, Hydrochloras Stanni*) Reagens.

Stitzolobium.

Stitzolobium (*Dolichos*) *pruriens, P.*; Kuhkräze, juckende Faseln; Pois à gratter (*Gal.*); Cowhage (*Ang.*); Kosambiliwail, Dewipaghura (*Cy.*); Klaende baenne (*D.*); Kaunchkurikebinge (*Duk.*); Kiwach (*Hin.*); Jeukboontjes (*Bel.*); Dolico pizzicaule (*I.*); Rawe (*Ja.*); Atmagupta, Kapikachlin (*Sa.*); Punaykalie (*Tam.*); Piliadukugaila (*Tel.*).

D. Du. Ed. Fer. Lon. Sax. Suec. Wir. *A. Be. C. Gr. M. Re.*

Ein Strauch (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Südamerika's. (*Desc.* Fl. Ant. t 49.)

Man wendet die Frucht (Siliqua hirsuta) an, eine zwei bis vier Zoll lange, fast fingerdicke, ledrige, gebogene, überall mit steifen, spröden, stechenden, leicht loszumachenden, glänzenden, braunrothen Borsten (Stitzolobium, setae s. lanugo s. pubes Siliquae hirsutae) besetzte Hülse.

In America betrachtet man es als wurmwidrig. — Gabe, drei bis sechs Gran in einem Syrup.

Electuarium Dolichos s. vermifugum. (*E. Gr.*)

℞. Setar. Siliquae hirs. drach. unam.
Mellis . . . quantum sufficit.

Gr. loco mellis Syrupum adhibet.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll für ein Kind von zwei bis drei Jahren.

Stoechas.

Unter diesem Namen werden angeführt:

1) *Lavandula Stoechas, L.*; Stöchas; Stoechas d'Arabie (*Gal.*); Stoechas (*Bel. D. Suec*); French lavender (*Ang.*); Cantnosa (*His.*); Stecade (*I.*); Rosmarinho (*Lus.*).

Ams. An. B. Br. Fer. His. His3. Wir. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Sp*

Ein kleiner Strauch (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 485.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis purpureae s. Arabicae) an; sie sind dunkelpurpurroth und bilden eine gedrängte eirundlängliche Aehre, über welcher ein Büschel gefärbter Blätter steht. Sie haben, besonders gerieben, einen ange-

nehmen, kampherartigen Geruch; ihr Geſchmack iſt gewürzhaft und bitter.

2) *Helichrysum* (*Gnaphalium*) *arenarium*, *Gärtn.*; gelber Stöchas; Stoechas citrin (*Gal.*).

Br. Gal. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Sp.*

⊙ oder ♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 352.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis citrinae s. Germanicae s. Amaranthi lutei s. Helichrysi an, welche ſtrahlige, eiförmige, citron- oder goldgelbe Köpfchen bilden. Sie haben faſt gar keinen Geruch und einen ſchwach ſtyptiſchen Geſchmack.

3) *Helichrysum* (*Gnaphalium*) *Stoechas*, *Cand.*; gemeines Ruhrkraut; Stoechas de Naples (*Gal.*); Eternal flower (*Ang.*).

Gal. *Gr. Re.*

♄ Eine Südeuropäiſche Pflanze. (*Zorn* Hist. pl. p. 92. t. 279.)

Man wendet die Blüthen (flores Stoechadis Neapolitanae s. citrinae) an; ſie bilden ſtrahlige, faſt walzenförmige, etwa zwei Linien lange Köpfchen und ſind gelb und geruchlos.

Syrupus de Stoechade. (Gal. *T.*)

℞. Spicar. Stoechadis Arab. unc. unam.
Aquae dest. Stoechadis libr. duas.
Digere in balneo Aquae per duas horas et colaturae adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Liqua in balneo aquae et cola per pannum.

Syrupus de Stoechade s. de Stoechade compositus. (Gal. Wir. *Vm.*)

℞. Cinnamomi . . partem unam.
Zingiberis,
Calami, singulorum partes duas.
Foliorum recentium Foeniculi,
— — Rutae,
— — Rorismarini,
— — Salviae,
— — Thymi,
Stoechadis, singulorum partes octo.
Aquae . . . partes quingentas.
Destillent partes septuaginta, cum quibus et
Sacchari albi . . . partibus 128 syrupum in balneo aquae para. (*Vm.*)

℞. Spicar. sicc Stoechadis unc. tres.
Summit. floresc. et sicc. Thymi unc quatuor c. dimid.
— Salviae,
— Rorismar., sing. drach. sex.
Seminum Rutae,
— Foeniculi, sing. drach. 4½.
Cinnamomi,
Zingiberis,
Calami, singulorum drachmas duas.
Aquae communis . libras octo.
Macera per duos dies in vase tecto, tunc liquidi destillatione abstracti semilibrae adde
Sacchari albi . . libram unam.
Residuum exprimendo coletur; colaturae adde
Sacchari albi . libras quatuor.
Fiat coquendo syrupus; syrupum utrumque refrigeratum commisce. (Gal.)

℞. Stoechadis Arabicae uncias duas.
Flor. Rorismarini drachmas duas.
Calaminthae montanae,
Origani,
Thymi, singulorum drachmas tres.
Betonicae,
Salviae, singulorum drachmas duas.
Sem. Anisi,
— Paeoniae, sing. drachm. duas c. dim.
Calami,
Zingiberis, sing. drachmam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Macera per dies duos in loco calido, cola exprimendo et colaturae unciis novem adde
Sacchari albi . uncias sedecim.
Solve semel ebulliendo et cola. (Wir.)
Gabe, eine halbe bis zwei Drachmen.

Oleum Lavandulae Stoechadis s. Spicae verum s. Lavandulae Spicae (*Gr.*) e Floribus et Seminibus.

Storax.

Styrax solidus s. Calamita, Styrax Resina, Styracis s. Styracis officinalis Balsamum, Styrax in massis s. rubra, Thus Judaeorum; Storax, Judenweihrauch; *Στύραξ*; Storax, Styrax solide (*Gal.*); Storax (*An D. Suec.*); Usteruk (*Ar.*); Estoraque (*His. Lus.*); Styrax (*Bel.*); Storace (*I.*).

A Ams. An. B. Ba. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Hass HassP. His His3. LH. Lon. LonN. Lus. O. Suec. Wir. Wür. *A. B. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp Va. Z.*

Man unterſcheidet 1) *Styrax granulata s. in granis*; Storax in Körnern oder Tropfen; Storax en grains, en larmes (*Gal.*), in kleinen, durchſichtigen, glänzenden, etwas fettigen, unter den Zähnen ſich erweichenden Körnern von angenehmem Geruch und harzigem Geſchmack; 2) *Styrax in massis*; Storax in Stücken; Storax en pains (*Gal.*); in röthlichen, wohlriechenden, bisweilen erweichten und eine honigartige Flüſſigkeit gebenden Maſſen von angenehmem Geruch und bitterem, harzigem Ge-

ſchmack. Die erſtere Varietät iſt heutzutage ſehr ſelten; den Alten war ſie unter dem Namen Styrax Calamita oder cannulata, Calamites vera bekannt, welchen ſeitdem auch die zweite führt. Dieſe nennt man Mandelſtorax (Storax amandé), wenn die Stücken die Größe einer Mandel haben. *Styrax Calamita s. in vesicis, Scobs styracina* (*Gr.*), in ſchmierigen auf der Innenſeite marmorirten Blaſen.

Dieſer Balſam ſoll von Styrax officinale, L., kommen, einem Baume (Decandria Monogynia, L ; Ebenaceae, J.) des ſüdlichen Europa's und des Orient's. (*Plenck* t. 341. *Lam.* Ill. t. 369. Encycl. méth. t. 369.) Vielleicht kommt er von Liquidambar orientalis, *Lmk.*

Reizend. — Gabe, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme

Styrax colata s purificata (*Gr. Re.*), bis zum Weichwerden erhitzt und zwiſchen erhitzten Eiſenplatten durchgepreßt.

Storax purificata (*Gr.*), in Weingeiſt aufgelöſ't, ausgepreßt und abgedampft.

Styrax artificialis s. Calamita factitia (*Gr. Re.*): Guaj rasp. libras duas, G. Benz. unc. sex, Sang. Draconis drach. duas, Eboris usti sesquiunciam, Spir. rectif. q. s. et Bals. Peruv. misce.

Styrax colata factitia (*Gr.*): Bals Tolut. libr. sex, Bals. Peruv. unam et unc. octo; vel: G. Benz. libr. octo, Styr. liq. sex, Bals. Tol. tres, Bals. Peruv. duas, Gum. flav. N. S. W. septem, Spir. rect. cong. sex, stent per dies quatuordecim, colentur et destill. ad consist. propriam redigantur; vel: G. Styr libr. tres, Benzoës sex, Bals. Tolut. duas et unc. quatuor, Aloës Socotr. unc. duodecim, Spir. rectif. cong sex, digere per tres aut quatuor dies et adde Bals. Peruv. unc. sex, Ol. Oliv. opt. unc. quatuor.

Strychninum.

Strychnina, Strychna, Strychnium; Strychnin; Strychnine (*Gal.*).

B*. Fer. Gal. *Ca. Fi. Gr. Ma. Re. T.*

℞. Extr. alcohol. Nucis vom. q. vis In Aqua dissoluto adde liquori Acetatem Plumbi liquidum, donec nihil amplius praecipitetur; plumbum ope torrentis Gasis acidi hydrosulph. separa, filtra, coque cum Magnesia, praecipitatum cum Aqua frigida ablue et in Alcohole dissolve; solutionem ad siccum consume. (*Re.* in Alcoholis pauxillo macera, strychninum pulveris formam prae se ferens in Alcohole rectif. bulliente dissolve et vapora.)

T. proponit ad obtinendum strychninum magis album et purum, illud in Aqua cum Acido nitrico leviter acidulata fervida solvere, adhuc bulliens per carbonem animalem filtrare, evaporatione et refrigeratione obtentum strychninum nitricum denuo in Aqua solvere et solutioni Ammonium caust. infundere; praecipitatum exemtum in Alcohole solvere et vaporando in crystallos redigere; — *Gr.* Nucem vom. raspatam ter in Aqua coquere, supremo Acidi muriat. aliquantulum addendo, decoctum ad syrupi consist. evaporare, addere sing. unciis quinque nucis, Calcis vivae rec. unciam unam per pannum colare, sedimentum Alcohole 22° abluere, praecipitatum siccare, et addito Alcohole 36° coquere et quatuor circiter partes quintas vaporare, quo facto alcohole refrigerato, crystalli formantur, quae denuo in Aqua solutae, vaporationi et novae crystallisationi subjectae depurentur.

Ein heftiges Reizmittel und ſehr ſtarkes Gift, von welchem ſchon ein Viertelgran oft einen heftigen Eindruck auf den Menſchen macht. Man wendet es bei Lähmungen an, indem man mit einem Sechszehntheilgran anfängt und allmälig ſteigt.

Pilulae Strychnini. (B*. Fer. GalF. GalH. *B. Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra. Re. T. Va.*)

℞. Strychnini . . . . grana duo.
Conserv. Rosarum semidrachmam.
Fiant pilulae viginti quatuor, argento obducendae. (B*. Fer. GalF. GalH. *Bo. Ca. E. Ma. Pie. Ra. Re. T.*)

B. Strychnini semigranum ad grana sex, Micae Panis, Mellis despum. et Pulv Liquiritiae q. s. ut fiant pilulae quatuor. — Gabe, Morgens alle zwei Stunden ein Stück. Wahrſcheinlich iſt die Formel falſch.

Alcohol s. Tinctura Strychninae, Tinctura Strychnini. (B*. Fer. GalF. *Bo. Gr. Ma. Pie. Ra. Re. T. Va.*)

℞. Strychnini . . . . grana tria.
Alcoholis (36°) . unciam unam.

Gr. Strychninae grana duo cum dimid., Spir. Vini 36° B. unciam; — *T.* Strychnini purissimi semiscrupulum, Alcoholis 36° uncias quatuor.

Gabe, ſechs bis zwanzig (*T.*) bis ſechszig Tropfen.

Mistura Strychnini s. Strychninae, Potio cum Strychnino s. stimulans. (GalF. *Gr. Ma. Pie. Ra. Re.*)

℞. Strychnini . . granum unum.
Aquae destillatae . uncias duas.
Sacchari albi . drachmas duas.

Acidi acetici . . . guttas duas. Eßlöffelweiſe Morgens und Abends.

Rc. Acid. acetic. omittit. 2 Unzen täglich zwei Mal; — *Va.* Sacchari drachm. tres, caet. ut antea.

Pulvis Strychnini. (*B. Va.*)

℞. Strychnini part. grani sedecimam.
Aethiopis martialis . grana sex.
Sacchari . . semidrachmam.
Morgens und Abends zu nehmen.

Va. Strychnini granum, Aethiopis drachm. unam, Sacch. tres f. dos. 6 Morg. u. Ab. 1 Stück.

Strychninum s. Strychnium nitricum, Nitras Strychnini s. Strychninae; ſalpeterſaures Strychnin. (Bor4. *T.*)

℞. Nucum vomicarum . libras octo.
Spiritus Frumenti libras sedecim.
Decoque in vesica destillatoria, donec dimidia pars fluidi destillata fuerit, tum nuces colando separatae siccentur et pulverentur; pulverem bis terve digere cum Spiritus Frumenti q. s., post digestionem semper exprimendo; tincturae destillationi subjiciantur et quod remanet, cum fluido a decocto residuo ad remanentiam librarum duodecim evaporet; adde Plumbum aceticum depuratum in Aquae dest. s. q. solutum, quamdiu praecipitatum efficitur; liquor filtri ope, quantum fieri potest, separatus leni igne ad dimidium evaporet, refrigeratum misce cum Magnesiae ustae unciis duabus et sepone per triduum, sedimentum filtratum edulcoretur, siccetur et in pulverem tritum cum Spiritus Vini alcohol. sextuplo bis terve digeratur, tincturae destillent ad unciarum aliquot remanentiam; strychninum instar pulveris albi conspicuum, filtratione separatum bis terve Spiritu Vini rectif. cum Aquae comm. quantitate aequali diluto ad separationem lixivii adhaerentis usque lava et cum Acidi nitrici dilutioris q. s. neutralisa. Liquorem filtra et blandissimo calore in crystallos redige caute dispensandas

T. Obtinetur, infundendo per vices Acidum nitricum 36° B. cum Aquae pondere quintuplo vel sextuplo dilutum in solutionem Strychnini aquosam, videndo ut sit baseos excessus, evaporare deinde et seponere ut crystalli dejiciantur.

Iſt noch giftiger als das Strychnin. Eben ſo auch die von *Va.* angeführte

Sulphas Strychninae, welche man bisweilen anwendet, wenn ſich der Kr. ſchon an die einfache Strychnin gewöhnt hat. $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{15}$ Gr. mit Roſenconſerve oder in einer Potion.

Strychnos.

Strychnos colubrina, L.; Schlangenholz; Bois de couleuvre (*Gal.*); Snakewood (*Ang.*); Kuchila luta (*Beng.*); Mahapenala (*Cy.*); Widero-pait (*Jav.*); Modira caniram (*Mal.*).

Br. Gal. His. His3. Pal. Wir. *A. Br. G. Gr. M. Sp.*

Ein Baum (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*), welcher auf den Molucken wächſt. (*Rumph* Amb 2. c. 46. t. 37. *Blackw.* t. 403. *Plenck* t. 118.)

Man wendet die Wurzel (Lignum colubrinum) an; ſie beſitzt, wenn ſie alt iſt, eine ſehr große Bitterkeit. Es ſind ſchwere, etwas gelblichweiße, mit einer bräunlichen, runzlichen, höckerigen Rinde bedeckte Stücken, welche gar keinen Geruch haben.

Pelletier und Caventou haben Strychnin darin gefunden.

Man hält ſie für ein ſpecifiſches Mittel gegen den Biß giftiger Thiere; jetzt iſt ſie in Vergeſſenheit gekommen, müßte aber ohne Zweifel mit großer Vorſicht angewendet werden. Boerhaave rühmte ſie gegen Wechſelfieber.

Strychnos potatorum (*Gr.*): Holz und Saamen ſehr bitter, Blüthen aromatiſch, reife Früchte brechenerregend.

Styrax.

Styrax Liquidambar, Styrax liquida, Styrax liquidus, Ambra liquida, Liquidambar; flüſſiger Storax; Styrax liquide, Liquidambar (*Gal.*); Liquide storax (*Ang.*); Tekaucy sstyrax (*B.*); Estoraque liquido (*His.*); Estyrax liquido (*Lus.*); Vloejende storax (*Bel.*); Storax rzadki (*Pol.*).

Ams An. B. Bel Bor. Bor4. Br. D. Fenn Fer. Gal. GalM. Han. HassP His. His3. LH. O. Pol. Sax. Suec. Wir. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Va. Z.*

Man unterſcheidet zwei Balſame dieſes Namens:

1) Den Storax von Louiſiana, Copalmbalſam, Copalmöl (Copalme, Baume ou Huile de Copalme, Copalme de la Louisiane), von honigartiger Conſiſtenz, durchſichtig, röthlichgelb mit der Zeit dunkel- oder ſchwärzlichroth werdend, von ſehr angenehmem Geruch und ſcharfem, gewürzhaftem Geſchmack, und zu einem braunen, ſchwärzlichen und brüchigen Harz verhärtend. Soll von Liquidambar imberbe kommen (*Gr.*).

2) Den gemeinen Storax (Styrax commun), von der Conſiſtenz einer dicken Salbe, röthlich, graulich oder bräunlich, kaum durchſcheinend, von ſtarkem, angeneh-

mem Geruch und ſcharfem und bitterem Geſchmack.

Dieſer Balſam fließt aus dem Styrarbaum, Liquidambar styraciflua, L., einem Baume (Monoecia Polyandria, L.; Amentaceae, J.) Mexico's. (*Blackw.* t. 485. *Plenck* t. 676. *Schk.* t. 307. *Lam.* t. 783. Fl. méd. VI. 331.) Auch erhält man ihn durch Kochen der jungen Triebe dieſer Pflanze oder von Altingia excelsa in Waſſer. (*Gr.*)

Bonaſtre hat darin einen eigenthümlichen harzigen und cryſtalliſirbaren Stoff, welchen er Styracin (Styracinum), Styracine nennt, entdeckt.

Reizend, faſt ausſchließlich zum äußern Gebrauch.

Styrax liquida reducta (*Gr.*): Styracis liq. unc. unam, Bals. Tolut. libr. duas, Spir. rectif. q. s.

Unguentum Styracis resinosum s. e Styrace compositum s. stimulans. (An. B*. Bel. Br. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. LP. Sar. Wir. Wür. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Olei Juglandis . . partes 350.
Styracis . . . . . partes octo.
Liqua blando calore, subinde agitando; sepone, cola et adde
Colophonii . . . . partes 480.
Elemi,
Cerae flavae, sing. . . part. 192
Cola per linteum. (Gal. GalM.)

Gen. Sar. et *Sp* Olei Juglandis libram, Styracis semilibram, Colophonii libram, Elemi et Cerae, sing. semilibram.

℞. Olei Olivar. unc. duas et dimid.
Styracis,
Elemi,
Cerae flavae, sing. . . unc. $7\frac{1}{2}$.
Colophonii . . . uncias duas.
Liqua simul. (B*. Br. Han. Wir.)

Wür. et *Vm.* Olei, Styracis, Elemi, Cerae, sing. partem unam et duas Colophonii; — Suec. Olei unam cum dimidia et reliquarum substantiarum, sing. septem; — HassP. Elemi, Cerae, sing. drachmas quindecim, Colophonii semunciam, Styracis drachmas quindecim, Olei uncias septem cum dimidia.

℞. Terebinthinae uncias quindecim.
Olei Juglandis . uncias undecim.
Elemi,
Cerae flavae, sing. uncias septem.
Liqua leni calore et ab igne remotis adde
Styracis . . . uncias septem.
Evaporet liquidum blando calore. (An. Bel.)

LP. Unguenti Elemi libram unam, Styracis depurati uncias quatuor; — LH. Unguenti Elemi, Styracis, singulorum semunciam, Vitellum Ovi No. 1., Essentiae Terebinthinae drachmas duas.

℞. Axungiae,
Colophonii, sing. . libram unam.
Olei Juglandis uncias quindecim.
Elemi,
Cerae flavae, singulorum uncias sex.
Massae igne liquatae adde
Styracis . . . uncias septem.
Misce sedulo. (*Ca*)

Emplastrum stomachicum s. Styracis stomachicum s. de Styrace. (His. His3.)

℞. Cerae flavae,
Olibani, singulorum libras duas.
Terebinthinae . . libras tres.
Mixtis et liquatis adde
Styracis,
Mastichis,
Ladani, sing. unc. tres et dimid.
Benzoës uncias duas et drachmas duas.
Piperis Jamaic. unc. quatuor c. dim.
Olei Menthae,
— Absinthii, sing. drach. duas.
Misce exacte
℞. Cerae flavae libras duas cum dimidia.
Terebinthinae . . . libras tres.
Tacamahacae . libr. duas et dim.
Styracis,
Mastichis,
Ladani, sing. . . . . unc. $4\frac{1}{2}$.
Benzoës,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing.
drach. octodecim.
Olei Menthae,
— Absinthii, sing. . drach. duas.

Styracem mollefactam cum ladano contunde, cerae pauxillum addendo, liqua cum cera et terebinthina, cola, tum adde pulveres et olea. (His. His3. *Emplastrum Styracis stomachicum Pharmacopoeae Matritensis.*) Si hujus vel praemoniti emplastri semunciam super alutam extendis, irrorando, si praescriptum fuerit, guttulis circiter octo Olei Menthae, *Scutum stomachicum* habes.

Unguentum digestivum. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Unguenti de Styrace libram unam.
Olei Olivarum . . semilibram.
Misce.

Unguentum antiscorbuticum. (*Sm.*)

℞. Ungu. de Styrace unc. quinque.
Balsami Fioravanti unciam unam.
Misce.

Balsamum ad loricandum cadaver conditum. (*Sp.*)

℞. Balsami Peruviani,

Balsami Copaivae,
Styracis, sing. unc. viginti quatuor.
Olei Nucis moschatae uncias octo.
— Lavandulae . uncias duas.
— Thymi . . . semunciam.
Liqua blando igne.

Eau d'Ange destillée. (*Gr.*)

℞. Benzoës . . . . uncias duas.
Storacis . . . . unciam unam.
Cinnamomi . . . drachmam.
Caryophyllorum drachmas duas
Calami . . . . . frustum.
Coriandri integri . grana aliquot (prise).
Aquae . . . . . octarios duos

Eau d'Ange destillée et musquée (*Gr.*): Benzoës uncias quatuor, Storacis duas, Cinnamomi semunciam, Caryophyllorum drachmas duas, Calami frustum, Moschi Folliculi drachmam; destillent; residuum serva.

Eau de mille fleurs (*Gr.*): Aquae Angeli (Eau d'Ange) octarios duos, Moschi grana duodecim vel viginti, vel Moschi Folliculi unciam; addi potest Essentia Ambrae griseae.

Pastilli aromatici. (*Re.*)

℞. Storacis . librae quadrantem.
Benzoës . . . . . libram.
Ladani . . librae quadrantem.
Cerae sig. optimae . . libram.
Adde
Mucilaginis G. Arabici spissioris q. s.
Spiritus Moschi guttas sexaginta.
Misce et in pastillos redige, qui siccentur.

Succinum.

Succinum album et citrinum, Electrum, Ambra flava, Resina Succini; Ἤλεκτρον; Agtſtein, Bernſtein; Succin, Ambre jaune, Karabé (*Gal*.); Yellow amber (*Ang.*); Keraulbehr (*Ar.*); Hambar (*Ba*.); Ambra (*Cy.*); Ambar (*Mal.*); Bernsteen (*D.*); Karuba (*Duk. Pe.*); Sucino (*His.*); Kepur (*Hin.*); Barnsteen (*Bel.*); Ambra gialla, Succino, Carabe (*I.*); Barsztyn (*Pol*.); Alumbre, Ambar (*Lus.*); Jantar (*R*.); Bernsten (*Succ.*); Umbir (*Tam. Tel.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC Bor4. Br. D. Du Ed. Fenn. Fer. Ful Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. C. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. T. Va.*

Ein feſter, mehr oder weniger dunkelgelber, weißer, rother, bisweilen rothbrauner, faſt ſchwarzer, durchſichtiger, durchſcheinender oder undurchſichtiger, bisweilen wolkiger Körper mit muſcheligem, glänzendem Bruche, welcher ſich poliren läßt, nicht ſehr hart iſt leicht bricht, erwärmt einen ſchwachen Geruch verbreitet, erhitzt electriſch wird und mit gelber und grünlicher Flamme brennt, indem er einen dicken Rauch und einen ſtarken, durchdringenden, nicht unangenehmen Geruch verbreitet.

Succinum praeparatum. (His3 *Fi.*)

Succinum pulveratum in mortario porphyreo cum Aqua laevigatur et in pastam tenerrimam redigitur inter chartam siccandam.

His3. in trochiscos redigere, in umbra siccandos jubet.

Pulvis fumalis s. ad suffiendum s. pro suffimigio s. pro suffimento. (BorC. Br. Li. RC. *T.*)

℞. Olibani,
Succini, singulorum partes aequales.
Grossiuscule pulvera. (BorC.)

RC. Substantiarum dict., sing. partes tres, Florum Lavandulae Spicae unam.

℞. Baccarum Juniperi,
Mastichis,
Succini, singulorum uncias quatuor.
Cascarillae . . unciam unam.
Fiat pulvis grossus. (Li.)

T. Benzoës, Succini, Cascarillae, Coffeae tostae, Sacchari albi pulv., sing. part. aeq.

℞. Succini . . . . uncias viginti.
Olibani . . . . uncias decem.
Mastichis . . . uncias quatuor.
Ladani,
Benzoës,
Storacis,
Ligni Rhodii,
Santali citrini, sing. uncias duas.
Petal. Rosar. rubr. unc. quatuor.
Florum Lavandulae uncias tres.
Bacc. Juniperi uncias duodecim.
Fiat pulvis grossus. (Br.)

Tinctura Succini aetherea s. balsamica. (B*. Sax. Suec. Wir. Wür. *Sw. T. Vm.*)

℞. Succini flavi . . uncias duas.
Aetheris sulphurici . libras duas.
Digere per dies quatuor super arenae balneo, blando calore, et cola. (Wür.)

T. Succini drachmas duas, Aetheris sulphurici 56° Ar. unciam macerare per duos dies et sepositione clarificata decanthare.

℞. Succini pulv. et levit. tosti uncias duas.
Alcoholis . unc. septem c. dim.

Post aliquot dies digestionis in vase tecto, filtra et adde

Aetheris sulph. unc. duas c. dim.

Serva. (B*.)

℞. Succini pulv. et levit. tosti unc. unam.

Liquoris anod. min. unc. quinque.

Digere per dies quatuor in vase tecto et cola. (*Siv.*)

℞. Succini gross. pulv. part. unam.

Liquoris anod. min. partes tres.

Macera frigide per dies octo, saepius agitando et filtra. (Sax. *Vm.*)

Suec. Succini unciam unam et Liquoris quatuor; — Wir. Succini unciam unam et Liquoris tres cum dimidia; — Ful. Succini partem unam et Liquoris sex.

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, anticatharrhalisch und auf den Uterus wirkend. — Gabe, funfzehen bis dreißig Tropfen auf Zucker oder in einem Glase Wasser.

Spiritus Succini (*Gr. Re.*): E Succino destillationis ope cf. Acidum Succini.

Tinctura s. Essentia Succini s. alcoholica, Alcohol cum Succino. (Ams. An Bel. Bor. Bor4. Br. Gal. Gen. Han. His3. Li. O. Pal. Pol. Sax. Wir. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Succini albi pulv. unciam unam.

Alcoholis (38°) . . uncias sex

Digere blando calore per tres dies, decantha et residuo infunde

Alcoholis (33°) . . uncias duas

Post duos dies digestionis cola, colaturas misce et filtra. (An.)

℞. Succini albi . . partem unam.

Alcoholis (32°) . . partes octo.

Digere frigide per dies decem, cola exprimendo et filtra (Bel.)

Ams Succini partem unam, Alcoholis (0.835) octo et octo dies digestionis blando calore; — Wir. Succini sesquiunciam, Alcoholis concent. uncias sex et aliquot dies frigidae digestionis; — Pal. Succini unciam unam, Alcoholis concent. octo et aliquot dies digestionis blando calore; — Br. et Li. Succini unciam, Alcoholis libram et octo dies digestionis leni calore; — Gal. Succini unam, Alcoholis (26°) sedecim et sex dies digestionis, tunc seposit onem per dies sex; — Gen. Succini unciam unam, Alcoholis decem et octo dies digestionis; — His3. Succini flavi uncias duas, Alcoholis Vini uncias duodecim et digestionem sufficientem; — *Gr.* Succini uncias quatuor, Spir rectif. octodecim.

℞. Succini pulverati et leviter in pelvi ferrea tosti . partem unam.

Alcoholis concent. partes quatuor.

Post aliquot dies digestionis blando calore in vase clauso et subinde agitando, filtra. (Bor. Bor4. Br. Han. O. Pol. Sax. *Vm.*)

Fi. T. Succini flavi pulv. uncias tres, Alcoholis 30° libram digerere in retorta vitrea foramine parvo instructa, subinde agitando et blando calore, et post sex dies filtrare.

Schwach reizend, gegen Catarrh, balsamisch, nervenstärkend und Wundmittel. — Gabe, fünfzehen bis dreißig, vierzig bis sechszig Tropfen

Julep s. Julapium succinatum. (Gen.)

℞. Tincturae Succini drachmas duas.

Sacchari . . . unciam unam.

Aquae . . . . . uncias sex.

Misce.

Tinctura s. Essentia Succini alcalisata. (Br. Sar. Wir. *Sp.*)

℞. Succini pulverati . uncias duas.

Subcarb. Potassae liq. semunciam.

Fiat pasta, cui siccatae infunde

Alcoholis . . . . uncias octo vel q. s., ut trium vel quatuor digitorum crassitiem tegatur. Post aliquot dies digestionis super arena tepida filtra. (Br. Sar.)

℞. Succini . . . . uncias quatuor.

Subcarbonatis Potassae uncias sex.

Tritura simul et infunde

Aquae Vitae . uncias sedecim.

Post aliquot dies macerationis destillent liquidi circiter unciae octo; evaporent reliqua ad siccum, residuo infunde spiritum primo obtentum et post sufficientem digestionem liquorem filtra. (Wir.)

℞. Pulveris Succini,

Subcarb. Potassae, sing. unc. duodecim,

Alcohol. concent. unc. viginti quatuor.

Spiritui destillato per octo dies in balneo aquae infunde pulverem e

Succini . . . . . unciis octo.

Olei Tartari per deliquium q. s. ut fiat pasta quae deinde siccetur. Filtra (*Sp.*)

Reizend, nervenstärkend, gegen Catarrh und auflösend. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen.

Resina Succini. (Li.)

℞. Succini . . . . . libras duas.

Alcoholis . . . libras quatuor.

Post tres dies digestionis in arenae balneo decantha et residuum itidem cum novo Alcohole tracta, donec hic non amplius coloretur; tincturae com-

mixtae destillent, resina abluta lente siccetur.

Oleum Succini crudum. (Bor4.)

In officinis chemicis paratur. Pond. spec. = 0,886.

Oleum Succini aethereum s. empyreumaticum, Oleum Succini rectificatum s. depuratum, Oleum Succini, Aethereoleum s. Pyroleum Succini. (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li Lon. LonN. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Succini contusi . quantum vis.

In retortam arenaceam luto obturatam immitte, quae tubi ope cum vasto recipiente tubulato communicat; tunc destillationem, igne gradatim aucto, continua, donec nihil amplius prodeat, quo facto oleum infundibuli ope separetur.

Man wendet dieſes Oel nur rectificirt an. Es giebt dazu mehrere Verfahrungsweiſen.

℞. Olei empyreum. Succini q. vis.

In retortam infunde ad dimidium usque inde replendam, destillent, levi sub bullitione, donec oleum magis colore tinctum prodire coeperit. (Ba. GalH. Pal. *Br. Vm.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* duas rectificationes successivas; — Oleum spissum in rectificatione remanens *Balsamum Succini* praebet (*Gr.*); — Pal. tres; — Gen. et Wir. quatuor.

℞. Olei Succini . . partem unam.
Cinerum Lignorum partes duas.

Destillent lente. (Br. Fer. Hass. Li. Pal. Wir. *Pid.*)

℞. Olei Succini,
Carbon. Lignor. s. veget., sing. part. aeq.

Destillent in retorta vitrea. (Fenn. Ful. HassP. Suec.)

℞. Olei Succini,
Carb Lignorum, sing. part. unam,
Aquae . . . . . partes sex.

Destillent lente. (O.)

Sar. Cretam puram vel Cornu Cervi calcinatum; — *T.* Oleum cum mixtura e Pulvere Carbonum et Calcis ad aërem extinctae in globulos redigere, hos cum Aquae quadruplo vel quintuplo olei adhibiti in retortam tubulatam ingerere et in balneo arenae moderato calore destillare.

℞. Olei Succini . . partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Destillent partes quatuor et oleum ab aqua separetur. (Am. B. Bel. Bor. D. Du. Ed. Han. Sax. *C. Sw.*)

Bor4. Oleum Succini crudum cum Aquae font. octuplo destillet, ita ut tertia pars prioris remaneat

RC. Oleum a liquore acido separatum e retorta vitrea Aquae sextuplo addito, destillet, donec trientes duo aquae prodierint; — *Fi.* Oleum in paratione Salis volatilis Succini obtentum, separatum pluries cum Aqua calida lavare, donec omnis saporis aciduli expers sit, et iterum destillare, donec dimidia pars ponderis prodierit.

℞. Olei Succini . . libram unam.
Aquae . . . . . libras sex.

Destillent lente unciae quatuor, quo facto recipiente mutato denuo unciae quinque destillent, quae cum Aqua redestillentur, ita ut unciae tres abstrahantur; commisce productum secundum cum priore ut totum denuo cum Aqua destillet. (Ams.)

His. His3. destillationem Olei cum Aquae partibus duodecim repetere jubent, donec illud perfecte liquidum sit.

Reizend, krampfſtillend, nervenſtärkend, auflöſend, ſchweiß- und harntreibend, Monatsfluß befördernd. — Gabe, fünf bis fünfzehen Tropfen. — Man braucht es nur wenig.

Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Succini. (Pal. Wir.)

℞. Sacchari albi . . unciam unam.
Olei Succini . guttas tredecim.

Misce triturando.

Balsamum Succini. (Wir.)

℞. Olei Succini drachmam unam.
— Nucis mosch. drach. duas c. dimid.

Misce. — Aeußerlich bei Hyſterie und Kopfſchmerz angewendet.

Moschus artificialis s. fictitius, Resina Succini s. Succini balsamica, Oleum Succini oxydatum, Succinum oxygenatum. (Am. B*. Li. O. RC. Suec. *Br. C. Gr. Re. Vm.*)

℞. Olei Succini . . partes duas.
Acidi nitrici . . . partes sex.

Stent in reactione per horas viginti quatuor, tunc cum Aqua frigida lava. (B*. Li.)

Am. et *C.* Olei partem unam et duas Acidi; — O. Acidi quinque; — *Vm.* tres Acidi; — *Re.* Olei unam, Acidi tres cum dimidia; — Suec. *Br. Gr.* quatuor Acidi; — RC. Olei rectif. drachmam unam, Acidi nitrico-nitrosi tres cum dimidia.

Re. Parari potest quoque digestio-

ne Olei cujuslibet animalis destillatione obtenti part. duarum et Acidi nitrici part. unius per dies octo vel decem, et addendo Spir. Vin. rect. part. triginta duarum, denuoque per hebdomadas quatuor digerendo.

Reizend, als Erſatzmittel des wahren Moſchus empfohlen.

Tinctura Moschi artificialis s. Resinae Succini s. Succini balsamica. (B⁺. Li. Suec. *Vm.*)

℞. Moschi artificialis partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.
Dissolve blando calore. (B⁺. Li.)

Suec. Moschi partem unam et septem Alcoholis; — *Vm.* Moschi unam et Alcoholis sedecim.

Reizend, bei Epilepſie empfohlen. — Gabe, vierzig Tropfen.

Tinctura Succini foetida. (Fer.)

℞. Olei Succini rectif. drach. duas.
Subcarbonatis Potassae,
Saponis medic., sing. drach. unam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Post aliquot dies filtra.

Hujus liquoris guttas aliquot Ammoniaco infundendo, aquam *Aquae Luciae* (Eau de Luce) aliquanto similem obtines.

Embrocation for hooping-cough, Roche's (*Gr. Re.*): Ex Oleo Olivarum cum parte dimidia Olei Succini et Caryophyll.

Oleum Succini reductum. (*C. Gr.*): Ol. Succini libr. unam, Petrolei duas.

Potio expectorans. (*E.*)

℞. Olei Succini . guttas octoginta.
Gummi Arabici,
Sacchari, singulorum semunciam.
Tinct. Bals. Tolutani drach. duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Gabe, ein Löffel alle zwei oder drei Stunden, bei krampfhaftem Huſten.

Liquor succinicus anodynus s. anodynus succinatus. (*Sw.*)

℞. Spir. Succini oleosi rectif. sesquilibr.
Acidi sulph. concent. semilibram.
Destillet in retorta vitrea libra una.

— Gegen Epilepſie in Deutſchland gerühmt. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in Wermuth- oder Münzenſyrup.

Linimentum Succini opiatum. (*Re.*)

℞. Olei Succini rectif.,
Tinct. Opii, sing. uncias duas.
Axungiae praeparatae unciam unam.

Bei Krampf und Verrenkungen.

Sulphur.

Sulphur nativum, Sulphur vivum citrinum et nativum griseum; Θειον; Schwefel; Soufre (*Gal*); Sulphur (*Ang.*); Kabrit (*Ar.*); Lew (*C*); Gundaka (*Cy.*); Svolv (*D.*); Gunduck (*Duk*); Azufre (*His.*); Gundhuk (*Hin.*); Schwavel (*Bel.*); Zolfo (*I.*); Gunduk (*Mah.*); Blerong (*Mal.*); Gowgird (*Pe.*); Siarka (*Pol.*); Enxofre (*Lus.*); Sura (*R.*); Gandhaka (*Sa.*); Skafvel (*Suec.*); Gendagum (*Tam.*); Ghendagum (*Tel.*).

A. Am. Ams. An B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Penn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. C. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Va.*

Ein derber, citrongelber, bei'm geringſten Stoß ſehr zerreiblicher Körper mit glänzendem Bruche, welcher in Nadeln oder Octaëdern cryſtalliſirt, ſich ſchmelzen, verflüchtigen und entzünden läßt, geſchmack- und geruchlos iſt, gerieben jedoch einen ſchwachen Geruch verbreitet. Man findet ihn im Handel unter zwei Formen.

1) als Stangenſchwefel (Sulphur citrinum s. in baculis), Soufre en canon (*Gal.*), in walzenförmigen, mehr oder weniger ſchmutzig- oder graulichgelben Stükken, welche faſt immer in ihrer Mitte nadelförmige Cryſtalle enthalten.

2) als Schwefelblüthen (Flores Sulphuris, Sulphur sublimatum), Fleurs de soufre, Soufre sublimé (*Gal.*), in ſehr feinem, ſchön gelbem Pulver.

Sulphur factitium s. citrinum (*Gr.*), aus Italien durch Sublimation oder Ausſchmelzen des Feuerſteins und andrer ſchwefelhaltiger Mineralien erhalten; *Sulphur in rotulis s. rotundum* (*Gr.*) ebendaher. *S. caballinum s. vivum, Sulphuris vivi Recrementa* (*Gr., Re.*), die bei'm Reinigen oder Sublimiren des Schwefels bleibende Schlacke, welche nur in der Thierheilkunde gebraucht wird.

An. Br. Fer. Ful. Hass. HassP. His. His3. Pal. Pm. Sar. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T.* et *Vm.* Flores Sulphuris pharmaceutam ipsum praeparare jubent, sublimando Sulphur venale vel solum, vel antea cum Arenae lotae certa (aequali) quantitate mixtum. Abluere illos deinde bene jubent, ut ab Acido sulphuroso forte inhaerenti liberentur. (*S. sublimatum depuratum s. sublimatum s. Sulphur purificatum* His3.)

Reliquae pharmacopoeae, quae Flores Sulphuris venales indicant, illos antequam adhibeantur, abluere jubent. No-

men deinde accipiunt: *Sulphur depuratum s. sublimatum lotum s. lotum, Flores Sulphuris loti s. depurati.*

Alius, Sulphur purum obtinendi modus, quod deinde *Sulphur praecipitatum, Lac s. Magisterium Sulphuris, Hydras Sulphuris*; Schwefelmilch; Soufre précipité, Magistère de soufre, Hydrate de soufre (*Gal*) nominatur (An. B. Ba. Bel. Bor. Br. D. Fenn. Fer Ful. Gal. Han. Li. Lon. LonN. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C Gr. Pid. Re Sp. Sw*. T. Vm.*), in eo constat, ut Solutio aquosa Sulphureti Potassae vel Sodae (An. T.), vel Sulphureti Calcis (Lon. *C. Re.* Sulph. sublim. libram unam, Calcis recentis duas, Aq. cong. quatuor coquere, filtrare), Aceti destillati vel Acidi hydrochlorici ope decomponatur et praecipitatum sedulo ablutum siccetur; – *Gr.* Sulphuris libram unam, Calcis vel Subcarbonatis Potassae tres coque in Aquae q. s. adde Acidum sulphuricum dilutum, sedimentum ablue etc. (*Lac Sulphuris*); Sulphuris libram unam, Calcis recenter ustae duas coque in Aquae congiis quatuor, filtra, adde Acidi muriatici q. s. et sedimentum ablue, donec saporis sit expers; – Bor4 et HassP. Liquorem e Solutione saturata Sulphuris depurati in Liquore Kali caust. cum Aquae calidae triplo mixtum per horas 24 seponere, tunc decanthatione et filtratione depurato instillare Acidi sulph. diluti quantum ad praecipitandum sulphur requiritur, praecipitatum Aqua tepida ablutum siccare.

Ein Reizmittel, welches je nach der Gabe, und besonders nach dem Subject, als aufregendes, Auswurf beförderndes, Schweiß und Harn treibendes und als Purgirmittel wirkt. Es ist eins der kräftigsten und schätzbarsten Agentien der Materia medica; auch wendet man es unter einer großen Anzahl verschiedener Formen und zur Erfüllung mannichfaltiger Indicationen an. – Gabe des Pulvers, zwölf bis zwanzig Gran, zwei oder drei Mal täglich, als Reizmittel, eine bis zwei Drachmen und mehr als Purgirmittel.

Carburetum Sulphuris.

Alcohol Sulphuris. (*Vm.*)

℞. Sulphureti Ferri pulv. part. 5½.
Carbonis . part. unam c. dimid.
Misce diu triturando, imple partem quartam retortae et destillationem institue ad incandescentiam usque calefaciendo; liquidum in fundo aquae in recipiente contentae existens sepone.

Man hat mit dieser Substanz einige Versuche gemacht; sie scheinen aber keinen Erfolg gehabt zu haben.

Pulvis dentifricius. (*Pie.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Laccae pulveratae . . . q. s.
Fiat pulvis tenerrimus.

Pulvis contra scabiem s. antipsoricus. (Ham. Wür. *Au. Ca. Sw. Va.*)

℞ Sulphuris,
Rad. Liquiritiae, sing. drach. sex.
Camphorae . . semidrachmam.
Gabe, eine halbe Drachme zwei Mal täglich. (*Au. Va.*)

℞. Sulphuris sublimati,
Carbonis Lignorum,
Lateris contusi, sing. . part. aeq.
Fiat pulvis. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris,
Antimonii crudi, sing. semunciam.
Magnesiae . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Florum Sulphuris,
Aethiopis antimonialis,
— miner., sing. . unc. unam.
Fiat pulvis tenerrimus. (Wür.)

℞. Nitri,
Sacchari, sing. . drachmas duas.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Florum Sulphuris sesquiunciam.
Fiat pulvis. (*Sw.*)

Das zweite dieser Pulver dient nur äußerlich, mit etwas Oel vermischt. Die beiden folgenden können sowohl äußerlich, als innerlich angewendet werden. Das letzte wird nur innerlich benutzt.

Pulvis diaphoreticus. (*Huf. Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Flor. Sulphuris drach. quatuor.
Camphorae . scrupulum unum.
Fiant doses duodecim. — Gabe, ein oder zwei Stück täglich in einer Tasse Thee (*Sm. Va.*)

℞. Sulphuris puri . drachmas duas.
— aurati Antimonii,
Camphorae, sing. . grana octo.
Sacchari . . . scrupulos duos.
Gabe, eine halbe Drachme, drei oder vier Mal täglich. (*Huf.*)

Pulvis pleureticus Mynsichti s. antipleureticus. (Wir.)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Dentium Apri,
Maxillar. Lucii, sing. unc. unam.
Florum Papaveris . semunciam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis laxans. (*E. Ra.*)

℞. Florum Sulphuris,

Cremor. Tartari, sing. unc unam.
Sacchari albi . quantum sufficit.
Misce. (*Ra.*)

E. Sulphuris semunciam et Cremoris Tartari unciam unam.

Man vermiſcht dieſes Pulver mit Honig und giebt Kindern etwa einen Kaffeelöffel voll vier oder fünf Mal täglich.

Empfindliche Magen vertragen eine Miſchung von Sulphur praecipitatum und Magnesia, sing. part. aeq. beſſer; man läßt davon täglich vier oder fünf Mal einen Löffel in Milch nehmen. (*E.*)

Pulvis Sulphuris sublimati compositus. (RC.)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, sing. part. duas.
Pulveris Zingiberis vel
— aromatici, vel
Elaeosacchari Carvi, vel
— Foeniculi . partem unam.

Bei Krätze, Hautkrankheiten, Verſchleimung der Lunge, Hämorrhoiden. — Gabe, eine bis zwei Drachmen bei Schlafengehen, mit Syrup.

Pulvis de Sulphure et Scilla s. antiasthmaticus s. incisivus. (Gal. GalM. *Re.*)

℞. Sacchari albi . . . partes tres.
Florum Sulphuris . partes duas.
Scillae siccatae . partem unam.

Pulvis antidysentericus. (*Vm.*)

℞. Florum Sulphuris . partes octo.
Foeniculi . . . partem unam.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. partes sedecim.

Pulvis catharticus absorbens s. purgans absorbens. (*Sw.*)

℞. Subcarbonatis Calcis,
Flor. Sulphuris, sing. unc. unam.

Gabe, zehen bis zwanzig Gran für Kinder; eine halbe bis ganze Drachme für Erwachſene.

Conchae sulphuratae.

℞. Concharum,
Sulphuris depurati, sing.
partes aequales.

Pulvis sulphurosus s. sulphureus s. catarrhalis s. anticatarrhalis. (BorC. Ful. Ham. *Ca. Huf. Va.*)

℞. Florum Sulphuris,
Liquiritiae pulv., sing. drach. sex.
Camphorae . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Florum Sulphuris,
Nitri purificati,
Radicis Liquiritiae,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

Ham. eandem formulam, sed loco nitri Sal Ammoniacum

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Sulph. aur. Antimon.
grana quindecim.
Fiat pulvis. (Ham. *Va.*)

℞. Sacchari . . . . uncias tres.
Rad. Iridis Flor. scrupulos novem.
Flor. Sulphuris . scrup. quatuor.
Croci . . . . drachmam unam.
Gummi Arabici,
Amyli,
Liquiritiae, sing. . scrup. unum.
Fiat pulvis. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris sesquiunciam.
Foeniculi,
Iridis Florentinae,
Liquiritiae, sing. unciam unam.
Foliorum Sennae . drachmas sex.
Fiat pulvis. (*Huf.*)

Gabe, eine oder zwei Drachmen.

Pulvis pectoralis resolvens. (Br. Pal. Wir.)

℞. Specier. Diaereos simplic.,
— Diatragacanthae frig., sing.
semunciam.
Liquiritiae,
Althaeae, sing. . drachmas tres.
Boli Armenae,
Flor. Sulphuris, sing. drach. duas.
Terrae sigillatae sesquidrachmam.
Sacchari cryst. (Candis) albi
unc. sex.
Fiat pulvis. (Pal.)

℞. Radicis Ari,
— Iridis Florentinae,
Antimonii diaphoretici,
Florum Sulphuris,
Cinnabaris nativi,
Ocul. Concror., sing. semunciam.
Fiat pulvis. (Br. Wir.)

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis pectoralis s. pectoralis balsamicus s. expectorans. (B*. Br. Wir. *Bo. Ca. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Rad. Liquiritiae . unciam unam.
— Iridis Flor. . drachm. duas.
Florum Sulphuris . semunciam.
— Benzoës . scrupulum unum.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Olei ess. Anisi,
— — Foeniculi, sing.
guttas decem.
Fiat pulvis. (B*. Br. Wir.)

Sp. Liquiritiae, Iridis, sing. drachmas sex, Sulphuris unciam, Acidi benz. drachmam, Sacchari uncias duas et Oleorum, sing. guttas decem; — *Ca.*

et *Sw.* Liquiritiae, Iridis, sing. drachmas duas, Sulphuris semunciam, Acidi benz. scrupulum, Sacchari uncias duas et Oleorum, sing. guttas decem.

℞. Acidi benzoici . . . grana sex.
Florum Sulphuris grana decem.
Cascarillae . . grana duodecim.
Sacchari crystallisati grana viginti.
Fiat pulvis. (*Pie.*)
Das letztere ist auf eine Gabe.

Pulvis di gambello. (*Fi.*)

℞. Muriatis Sodae,
Sulphuris,
Ciner. Vegetab. non maritim.,
sing. partes aequales.
Pulverata seorsim commisce. — Mit Wasser vermischt, zum Waschen der Hände.

Bolus Sulphuris. (GalM. *Va.*)

℞. Sulphuris loti . . . grana octo.
Mellis . . . quantum sufficit.
Fiat bolus.

Boli antipsorici. (LH. *Va.*)

℞. Florum Sulphuris lotorum semidrachmam.
Extracti Fumariae quantum satis ut fiant boli duo. — Gabe, ein Stück, zwei Mal. (LH.)

℞. Flor. Sulph. lot. drachm. unam.
Saponis medicin. semidrachmam.
Syrupi Gentianae . . . . q s.
M. f. boli no. 9. Ein Stück Morgens und Abends. (*Va.*)

Bolus Sulphuris compositus. (GalM. *Va.*)

℞. Sulphuris loti,
Anisi pulv., sing. . grana octo.
Fol. Sennae pulv. grana quatuor.
Mellis . . . . quantum sufficit,
Fiat bolus.

Boli diaphoretici. (*Ca.*)

℞. Florum Sulphuris,
Cremoris Tartari, sing. scrupulum.
Resinae Guajaci . grana decem.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant boli duo. — Ein Stück Morgens, das andre Abends, bei Hautkrankheiten und chronischen Rheumatismen.

Bo in cystitide lenta. (*B. Va.*)

℞. Florum Sulphuris drachm. unam.
Terebinth. Venetae scrup. duos.
Fiant boli sex. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück — Diese Bissen sollen sich vorzüglich nützlich beweisen, wenn eine Hautkrankheit entweder als Ursache oder als Complication der Krankheit vorhanden ist.

Boli antiasthmatici. (*Ca.*)

℞. Conservae Apii,
Extr. Inulae, sing. drachm. unam.
Florum Sulphuris,
G. Ammoniaci, sing. semidrach.
Oxymellis scillitici . . . q. s.
Fiant boli granorum decem. — Gabe, ein, zwei oder drei Stück fünf oder sechs Mal täglich.

Boli antihaemorrhoidales. (*Ca. Sa. Sm. Va.*)

℞. Florum Sulphuris scrup. quatuor.
Electuarii catholici scrupulos octo.
Fiant boli quatuor. (*Ca. Sm. Va.*)

℞. Florum Sulphuris scrupulos duos.
Electuarii lenitivi drachmas duas.
Syrupi Rhamni cathartici . q. s. ut fiant boli duo. (*Sa.*)
Gabe, Morgens ein Stück.

Rotulae pectorales, Trochisci Sulphuris s. e Sulphure, Tabellae pectorales s. e Sulphure. (Ams. Br. Gal. *Au. Ca. Fi. Gr. Pie. Re. Sm. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . . . partes octo.
Mucilag. G. Tragacanthae q. s. ut fiant tabellae. (Gal. *Re.*) (*Tabell. de Sulph. simpl.*)

Pie. Sulphuris partem unam, Sacchari sex; — Ams. *Pie* et *Sm.* Sulphuris unam et duas Sacchari; — *T.* Quantitates non indicat.

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Sacchari albi . partes duodecim.
Tere sulphur cum sacchari parte una et admisce saccharo reliquo ad plumam cocto. (*Vm.*)

℞. Pulv. Iridis Flor. . semunciam.
— Liquiritiae scrupulos octo.
— Angelicae scrupulos duos.
Florum Sulphuris drachm. unam.
Extracti Inulae,
— Marrubii, sing. scrup. duos.
— Croci . scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Olei ess. Foenic. gutt. quindecim.
Fiant trochisci. (Br.)

℞. Pulveris Liquiritiae,
— Iridis Florentinae,
Flor. Sulphuris, sing. drach. unam.
Croci . . . . . grana decem.
Sacchari albi . . . semunciam.
Mucilag G. Tragacanth. . q. s. ut fiant trochisci ponderis scrupuli dimidii. (*Au.*)

℞. Florum Sulphuris drachmas duas.
Acidi benzoici grana duodecim.
Iridis Florentinae semidrachmam.
Olei Anisi . . guttas duodecim.
Sacch. albi unc. quinque et dimid.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s. ut fiant tabellae (*Tab. de Sulph. comp.*) (Gal. *Ca. Re.*)

Gr. Flor. Sulph. drachm. sex, Fl.

Benz. semidrachm., G. Arab., Radic. Irid Flor., sing. drachm. tres, Bals. Sulph. anis. unam, Sacch. unc. octodecim, Mucil. G. Tragac. q. s.

℞. Pulpae Rad. Althaeae,
— — Consolidae maj., sing. unc. unam.
Florum Sulphuris drachmas duas.
— Benzoës . semidrachmam.
Sacchari in Aqua Liliorum alborum dissoluti . . uncias octo.
Fiant tabellae. (*Pie.*)

℞. Sulphuris praecipitati uncias duas.
Acidi benzoici scrupulum unum.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Mucil. G. Arabici . . . . . q. s.
ut fiant tabellae (290 *Fi.*) (*Sw.*)

℞. Acidi oxalici . . partem unam.
Florum Sulphuris partes sedecim.
Commisce cum
Sacchari lenis caloris ope soluti partibus centum viginti octo.
Fiant tabellae. (*Vm.*)

Morsuli ad scabiem, Tabellae antipsoricae. (*Sp.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Antimonii crudi,
Spec. Imperatoris, sing. drachm. duas.
Amygd. dulc. concis. unc. unam.
Sacch. albi ad glob. cocti uncias octo.
Essentiae Citri . guttas decem.
Fiant morsuli

Opiatum sulphuratum s. cum Sulphure. (GalM. *Ra. Va.*)

℞. Florum Sulphuris . . partes 166.
Mellis albi . . . . partes 350.
Misce sedulo. (GalH.)

Ra. Va. Hosp. Par. Mellis partem unam et tres Sulphuris.

Electuarium Sulphuris (*Gr.*): Flor. Sulph. semunciam, Elect. lenit. uncias duas, Salis Nitri drachm. tres, Syr. Cort. Aurant. q. s. 1 — 3 Drachmen zwei bis drei Mal täglich.

Electuarium Sulphuris compositum (*Gr.*): Flor. Sulph. semunciam, Potass. Supertartr. unc. unam, Confect. Sennae duas, Confect. Piper. nig. sesquiunciam, Syr. Zingib. unciam. — 1 bis 2 Drachmen. (*I. C.*)

Electuarium Sulphuris cum Borace (*Gr.*): Flor. Sulph. unc. unam, Potass. Supertartr. sesquiunciam, Subboracis Sodae semunc., Confect. Sennae uncias duas cum dimid., Syr. Aurant unc. unam vel q. s. — ½ — 2 Drachmen. Bei Krankheiten der tiefern Därme und des Uterus.

Electuarium laxans s. purgans. (*E. Va.*)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Confectionis Sennae sesquiunciam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Gabe, ein Kaffeelöffel Morgens und Abends (drei oder vier Mal täglich. *Va.*)

Electuarium s. Conditum pectorale, Marmelada pectoralis. (*Sm. Sw**.)

℞. Florum Sulphuris,
Foeniculi, singulorum semunciam.
Liquiritiae . . . unciam unam.
Syrupi Rhoeados quantum sufficit.
Misce sedulo. (*Sw**)

℞. Mellis Narbonnensis uncias octo.
Florum Sulphuris,
Radicis Inulae,
Extracti Liquiritiae,
Aquae Rosarum, sing. drach. duas.
Misce. (*Sm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Croci,
Roob Sambuci,
Extr. Liquirit., sing. drach. duas.
Mellis Narbonnensis unc. quatuor.
Misce. (*Sm.*)
Gabe, einer Muskatnuß groß, täglich drei oder vier Mal.

Electuarium antirheumaticum. (B*.)

℞. Resinae Guajaci,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Cremoris Tartari unciam unam.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Nucem moschatam . . . no. 1.
Mellis despumati . libram unam.

Chelsea pensioner (*Gr. Re.*): Guajaci drachmam unam, Rhei duas, Tartratis Potassae, Florum Sulphuris, sing unciam, Nucem mosch. pulv. — Gabe, Abends und Morgens 2 Eßlöffel als purg. u. diaphor. Mittel. — *Gr.* Flor. Sulph. uncias duas, reliqua ut antea.

Opiatum antiphthisicum. (B*. *Pie.*)

℞. Cetacei,
Florum Sulphuris,
Ocul. Cancror., sing. drach. duas.
Conservae Rosarum semunciam.
Mellis Narbonnensis . . . q. s.
Gabe, eine oder zwei Drachmen den Tag über. — Dufresnoy schlägt vor, drei Drachmen Agaricus piperatus hinzuzusezzen, um es wirksamer zu machen.

Looch expectorans. (Han. *Bo. Pie. Sm. Va.*)

℞. Florum Sulphuris drachm. unam.
Sacchari pulverati drachm. duas.
Olei Lini . . . unciam unam.

Syrupi balsamici (Tolut.) sesquiunciam.
Misce. (Han. *Va.*)

℞. Syrupi Violarum . sesquiunciam.
Oxymellis simplicis unciam unam.
Florum Sulphuris semidrachmam.
— Benzoës . grana quindecim.
Misce. (*Bo. Pie.*)

℞. Mellis Narbonnensis,
Pulpae Uvarum, sing. unc. duas.
Flor. Sulphuris,
— Benzoës, sing. drach. unam.
Syrupi Erysimi quantum sufficit.
Misce. (*Pie.*)

Sm. eandem formulam sed loco pulpae uvar. illam Pomor. Renet

Mixtura Sulphuris praecipitati, Potio sulphurata. (*Au. Va.*)

℞. Sulphuris praecip. drachm. duas.
Aquae Foeniculi . . uncias tres.
— Cinnamomi . unciam unam.
Syrupi Opii . . . semunciam.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, bei zuckerartiger Harnruhr und Mercurialkrankheit.

Lotio Sulphuris, Sulphur Wash. (*Re.*)

℞. Sulphuris praecip. . drach duas.
Acetatis Plumbi . . scrupulum.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Misce. — Bei herpes, Morgens und Abends. (B. Bell.)

Tinctura Sulphuris. (Wir.)

℞. Sulphuris . . . sesquiunciam.
Liqua lenti ignis ope in patina fictili et adde sensim.
Subcarbonatis Potassae uncias tres
Ignem auge, ut massa magis liquescat, tunc illam in mortarium calidum effunde et pulveratae infunde
Alcoholis concentrati uncias decem.
Post sufficientem digestionem cola. — Reizend; bei Bruſtkrankheiten, Krätze und ſcorbutiſchen Geſchwüren empfohlen. — Gabe, funfzig bis ſechszig Tropfen in einem paſſenden Vehikel.

Balsamum Sulphuris simplex, Oleum sulphuratum, Oleum Lini sulphuratum, Corpus pro Balsamo Sulphuris, Linimentum e Sulphure, Sulphuretum oleosum fixum. (Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Ed. Ful. Han. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. LP. O. Pal. Sar. Sax. Wir. *Br. Ca. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei Amygd. dulc. . partes sex.
Digere in balneo arenae per aliquot dies et decantha. (Sar. Wir.)

Sp. easdem quantitates, sed loco olei amygd. illud Juglandum; — An. Bel. Bor. D. Fer. Han. LP. O. Sax. et *Vm.* Sulphuris partem unam et quatuor Olei Lini; — Bor4. Sulphuris citrini partes duas, Olei Lini partes octo; — Br. Sulphuris unam et quatuor Olei Amygdal. dulc.; — Ful. *C. Gr.* Sulphuris unam et quatuor Olei Olivarum; — *Pid.* Sulphuris unam et quatuor Olei Juglandis; — Li. Sulphuris unam et quatuor Olei Lini; — *Ca.* Sulphuris unam et tres Olei Juglandis; — Br. Sulphuris unam et Olei Lini duas; — HasP. Florum Sulphuris uncias tres, Olei Lini sesquilibram; — Ams. Ed. Lon. LonN. *Br. Gr. Re. Sw.* Sulphuris partem unam et octo Olei Olivarum; — *Sw.* Sulphuris et Olei Olivarum, sing. part. aeq.; — *T.* Florum uncias tres, Olei Juglandis vel Amygd. dulc. viginti: (*Balsamum Rulandi*) Olei octodecim. (*Fi.*)

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.
Olei Papaveris . . sesquilibram.
Vini generosi . . . semilibram.
Post octo dies digestionis coque ad humidi consumptionem usque. (Pal.)

Balsamum Sulphuris anisatum, Oleum Anisi sulphuratum, Sulphuretum Olei volatilis anisatum. (An. B*. Br. D. Gal. His. His3. Li. LP. Pal. Sar. Wir. *Ca. Fi. Gr. Pie. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei ess. Anisi . partes quatuor.
Digere ex arenae balneo. (An. Br. Gal. His. His3. *Ca. Fi. Pie. T. Vm.*)
Pal. Sar. et Wir. Sulphuris partem unam et sex Olei; — LP. Sulphuris uncias tres, Olei Anisi decem.

℞. Bals. Sulphuris simpl. part. unam.
Olei ess. Anisi . partes quinque.
Misce sedulo. (B*. D. Li.)

Oleum Nucis Juglandum sulphuratum, Balsamum Sulphuris Rulandi. (His. His3.)
Simili modo ut oleum anisi sulphuratum e Sulph. parte una et quatuor Ol. Jugland. paratur.

Emulsio cum Balsamo Sulphuris anisato. (*Va. Vm.*)

℞. Gummi Arabici drachmas duas
Bals. Sulphuris anis. drach. unam.
Mellis Narbonnensis unciam unam.
Aquae Hyssopi . . uncias octo.

Balsamum Sulphuris succinatum, Oleum Sulphuris succinatum s. Succini sulphuratum. (His. His3. Sar. *Vm.*)

℞. Olei Succini rectificati partes sex.
Florum Sulphuris partem unam.
Digere super arena. (Sar. *Vm.*)
His His3. Olei partem unam et qua-

tuor Sulphuris; — *Fi.* Florum unciam unam, Olei quatuor.

Balsamus Vitae Rulandi, Balsamum Sulphuris terebinthinatum, Oleum Terebinthinae sulphuratum. (An. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Han. His. His3. Li. O. Pal. Sar. Suec. Wir. Wür. *Ca. Gr. Pid. T. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Olei Terebinth. . part. quatuor.
Dissolve in balneo arenae. (Fer. His. His3. *Fi. Gr. Vm.*)

Gr. Flor. Sulph. part. unam, Ol. Terebinth. duas; — Br. Pal. Sar. Wir. Wür. *Ca.* Sulphuris unam et Essentiae quinque; — *T.* Florum unam, Olei octo.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Olei Lini . . . . . partes sex.
Dissolve et solutionis part. tribus adde
Ess. Terebinthinae partes octo.
Misce (Suec.)

Am. B. Bel. Bor. Han. et *C.* Balsami Sulphuris simpl. partem unam et tres Essentiae; — *Pid.* quatuor Essentiae; — D. Essentiae octo; — Li. Essentiae quinque; — Fer. Balsami tres et Essentiae triginta duas; — Bor4. Olei Lini sulphurati partem unam, Terebinthinae tres.

℞. Sulphuris . . . . uncias duas.
Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Olei Lini . . . . . libras duas.
Liqua sulphur in oleo, adde essentiam et digere blandissimo calore. (Br. Wir.)

Reizend, ehedem für harntreibend gehalten. — Gabe, sechs bis zwölf Tropfen.

Tinctura Balsami Sulphuris. (*Gr. Re.*)

℞. Balsami Sulph. terebinth. in balneo mariae ad siccum cocti uncias duas.
Aquae Vitae . . libram unam.
Digere. — Brustmittel.

Balsamum aethereum (*Au.*)

℞. Balsami Sulphuris terebinthinati,
Aetheris sulph., sing. semidrachm.
Olei animalis Dippelii guttas sex.

Von Bücking bei colica pituitosa von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zwei bis zehen Tropfen, täglich drei Mal, auf Zucker oder in etwas Wasser.

Ceratum e Sulphure. (*Ra. Sw. Va.*)

℞. Florum Sulphuris uncias quatuor.
Cerati . . . . . libram unam.
Misce. (*Ra. Va* Hosp. Inf.)

℞. Florum Sulphuris,
Bacc. Lauri, sing. . unc. unam.
Butyri recentis quantum sufficit.
Misce triturando. (*Sw.*)

Unguentum Sulphuris s. e Sulphure s. sulphuratum simplex s. ad scabiem, Pomatum Sulphuris s. sulphuratum simplex s. antipsoricum. (Am. Ba. Bor. BorC. Bor4. Du. Ed. Ham. Han. Lou. LonN. Lus. RC. Sax. *Au. C. Ca. Gr. Ra. Re. Sw. T.*)

℞. Florum Sulphuris partem unam.
Axungiae Porci . . partes duas.
Misce triturando. (Bor. BorC. Bor4. Han. Sax. *Ra. Sw.*)

Ba. Sulphuris partem unam et tres Axungiae; — Am. Du. Ed. Lon. RC. *C. Gr.* Sulphuris unam et quatuor Adipis (adde Ess. Limon. vel Ol. Lavand. semidrachm. *Ed. Gr.*); — Lon. *Gr. Re.* Sulphuris sublimati uncias tres, Adipis praep. semilibram; — Ham. Sulphuris unam et Axungiae octo; — *Au.* Sulphuris unciam unam et Axungiae q. s.; — *T.* Florum uncias sex, Axungiae octo, Sebi quatuor.

℞. Sulphuris . . . partem unam.
Unguenti rosati . . partes duas.
Contere. (Lus.)

Gr. Ung. simpl. semilibram, Flor. Sulph. unc. duas, Ess. Limon. scrupulum; vel: sec. Lon. ante 1809: Ung. Adipis suill. semilibram, Flor. Sulph. unc. quatuor.

℞. Olei Juglandis . . semilibram.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Dissolve in balneo aquae et adde
Axungiae Porci . . semilibram.
Cerae flavae . . unciam unam.
Alcannae . . quantum sufficit ad colorandum. Cola per linteum. (*Ca.*)

Sulphuretum saponaceum. (LP.)

℞. Olei communis uncias quatuor.
Saponis albi raspati semunciam.
Sulphuris . . drachmam unam.
In balneo arenae coque ad spissitudinem et refrigeratum serva. — Auflösend, zertheilend; bei verschiedenen Geschwülsten und Verbrennungen. Innerlich bei Vergiftungen, eine halbe bis zwei Drachmen.

Linimentum psoricum, Pomatum s. Unguentum sulphuro-saponaceum s. antipsoricum. (B*. DD. GalH. *Au. Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Florum Sulphuris,
Saponis albi, sing. part. unam.
Aquae purae . . . partes tres.
Dissolve saponem in Aqua, per cribrum trajice et adde sulphur, continue agitando. (GalH. *Ra. Va.*)

℞. Subcarb. Potassae uncias duas.
Aquae bullientis unciam unam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Fiat sapo, cui continue terendo, sensim adde
Florum Sulphuris uncias quinque.
Misce bene. (*Ra.*)

℞. Saponis nigri . . partes duas.
Florum Sulphuris partem unam.
Misce triturando. (DD.)

B°. Sulphuris et Saponis nigri, sing. part. aeq. cum Aquae s. q.

℞. Florum Sulphuris,
Saponis mollis, sing. semilibram.
Radicis Hellebori albi uncias duas.
Nitri . . . . drachmam unam.
Axungiae . . . . sesquilibram.
Misce. (*Au.*)

Lotio sulphuro-saponacea. (*Ra. Va.* Hosp. St. Lud.)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Aquae . . . libras quindecim.
Solutioni adde
Sulphuris pulverati uncias tres.

Unguentum sulphuratum s. Sulphuris s. Sulphuris cum Zinci Sulphate s. Sulphuris compositum s. antipsoricum s. contra scabiem s. ad scabiem s. ad scabiem cum Sulphure sublimato s. Sulphuris cum Helleboro, Pomatum Sulphuris compositum, Pomatum s. Unguentum antipsorisum Jasseri. (A. Am. Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4. D. Ful. Gal. GalM. Han. His. His8. LH. Li. Lon LonN. LP. Pm. Pol. R. Sar. Sax. WW. *Au. Bo. Br. C. Ca. Fi. Gr. Pid. Pie. Ra. Rc. Sa. Sm. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Subcarb. Potassae partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.
Misce triturando. (Gal. *Ca. Sw.*)

Sa. Sulphuris uncias duas, Subcarbonatis semunciam et Essentiae Citri semiscrupulum; — D. Sulphuris, Bacc. Lauri, sing. unciam unam, Radicis Inulae duas, Subcarbonatis semunciam et Axungiae uncias decem; — *Va.* Hosp. St. Lud. Flor. Sulph unc. quinque, Subcarb. Potass. duas, Aquae unam, Ol. Oliv. drach. quatuor.

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci, sing. partes sex.
Axungiae Porci partes sedecim.
Contere. (WW.)

D. et R. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et duodecim Axungiae.

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Oxydi Zinci part. unam c. dimid.
Olei Lauri . . . . partes tres.
Axungiae Porci . . partes sex.
Misce simul. (*Vm.*)

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci,
Olei Lauri, sing. partem unam.
Axungiae Porci . . partes sex.
Contere. (Sax.)

His. His8. Sulphuris partes duas, Sulphatis tantidem, Olei Lauri et Axungiae, sing. quatuor; — B. Bel. et Li. Sulphuris duas, unam Sulphatis, Olei Lauri tres et Axungiae sex; — *Sw.* Sulphuris, Sulphatis et Olei Lauri, sing. part aeq. absque axungia; — Ful. Sulphuris partes duas, Sulphatis unam et sex Axungiae absque oleo; — Bor. Bor4. et Pol. Sulphuris, Sulphatis, sing. duas, et octo Axungiae absque oleo; — A. Sulphuris sesquiunciam, Sulphatis tantidem et Unguenti simpl. libram; — *Rc.* Sulphuris, Sulphatis, sing. unc. duas, Axungiae et Ol. Lauri q. s.

℞. Florum Sulphuris,
Sulphatis Zinci,
Bacc. Lauri, sing. part. unam.
Unguenti rosati partes quatuor.
Misce bene. (Han.)

Sm. Sulphuris, Sulphatis, Bacc. Lauri, sing. unciam unam et Olei Lini q. s.

℞. Florum Sulphuris . uncias duas.
Cerussae pulveratae semunciam.
Praecipitati albi drachmas duas.
Axungiae c. Aqua Rosar. ablut. libram.
Misce bene. (Sar.)

℞. Radicis Lapati aquatici uncias octo.
Fol. Fumariae,
— Lauri,
— Nicotian., sing. semimanip.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coque, postea contunde, cola per cribrum et unciis sex pulpae adde
Florum Sulphuris . semunciam.
Salis mar. decrep. drachmas sex.
Axungiae Porci . . uncias tres.
Misce triturando. (*Bo.*)

℞. Florum Sulphuris . partes duas.
Salis mar. decrep. partem unam.
Axungiae Porci . . partes octo.
Pulveres cum axungia liquata commisce. (GalM.)

Fi. Florum Sulphuris, Salis marini decrepitati, singulorum uncias quatuor, Adipis suilli praeparati sesquilibram, Sevi bovilli uncias sex, Olei essentialis Lavandulae drachmas duas; — Pm. Ingredientium sing. praemonitorum duplicem quantitatem adhibet; — LP. Florum Sulphuris uncias quatuor, Muriatis Sodae subtiliter pulv. duas, Axungiae libram et Olei Lavandulae drachmam; — *T.* Florum libram, Salis uncias sex, Axungiae libras tres, Sebi unam, Olei Lavandulae semunciam.

℞. Florum Sulphuris partes sedecim
Salis Ammoniaci partem unam.
Axungiae Porci partes triginta duas.
Commisce bene. (*Pid.*)

Ams. et B^r. Sulphuris partes octo, Salis Ammon. unam et Axungiae sedecim; — *Ra.* Sulphuris uncias duas, Salis Ammon. drachmam, Axungiae uncias quatuor et Essentiae Citri scrupulum; — *Pic.* Sulphuris uncias duas, Salis Ammon. drachmas duas, Axungiae uncias duas et Olei ess. Flor. Aurant. q. s.; — *Au.* Sulphuris uncias tres, Salis Ammon. drachmas duas et Axungiae Porci q. s. ut fiat unguentum.

℞. Florum Sulphuris partes sexaginta.
Salis Ammoniaci,
Aluminis, sing. . partes quatuor.
Misce. (Gal.)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Pulv. Hellebori albi drach. duas.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Commisce. (An.)

℞. Florum Sulphuris,
Saponis, singulorum semilibram.
Rad. Hellebori nigri unc. duas.
Axungiae libras duas cum dimidia.
Misce sedulo. (Sax.)

Re. Sulphuris uncias duas, Hellebori albi semunciam, Saponis mollis unciam, Axungiae vel Olei Palmae uncias tres, Olei Terebinth. vel Picis liquidae drachmas duas. (*Mange ointment for dogs.*)

℞. Sulphuris . . . . semilibram.
Radicis Hellebori albi uncias duas.
Nitri . . . . drachmam unam.
Saponis mollis vel nigri semilibr.
Axungiae Porci . sesquilibram.
Misce. (Han. HassP. Lon. LonN. *Gr. Re.*)

LH. *Sw.* Sulphuris libram, Hellebori albi uncias tres, Nitri sesquiunciam, Saponis libram unam et Axungiae tres; — *Gr.* Adipis praep., Ol. Palmae, Sulph. vivi, Rad. Helleb. albi, sing. part. aeq. (*Jackson's itch ointment.*)

℞. Florum Sulphuris unciam unam.
Praecipitati albi,
Acidi benzoici, sing. drach. unam.
Olei essentialis Citri unciam unam.
Acidi sulphurici grana sedecim.
Nitri . . . . drachmas duas.
Axungiae . . . . semilibram.
Axungiae liquatae reliquas substantias, continue ad refrigerationem usque agitando, admisce. (Am. *C.*)

℞. Axungiae Porci uncias octodecim.
Olei rosati . . . . uncias sex.
Florum Sulphuris uncias novem.
Pulv. Caryophyllorum,
— Granorum Paradisi,
Pulv. Zingiberis, sing.
sesquiunciam.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Axungiae Porci . libram unam.
Extracti Fellis Tauri uncias duas.
Florum Sulphuris,
Aloës hepaticae,
Colocynthidis, sing. semunciam.
Olei Absinthii . drachmas tres.
Axungiae leni igne liquatae admisce reliqua. (*Br.*)

℞. Succi Elaterii . partem unam.
Coagulet blandi caloris ope, tunc faeculam separatam et exstillatam commisce cum
Olei Olivarum . parte dimidia.
Butyri . . . . partis quadrante, et supra ignem relinque, donec humidum consumptum sit; contunde deinde et adde
Cerae . . . . partis decimum.
Extracti Fellis,
Galbani, sing. partis nonagesimum.
Massae semiconcretae deinde adde
Scammonii,
Aloës,
Colocynthidis,
Cort. Mezerei, sing. . part. $\frac{1}{50}$.
Euphorbii,
Myrrhae,
Piperis longi,
Zingiberis, sing. . . part. $\frac{1}{100}$.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Pic.*)

℞. Florum Sulphuris drach. unam.
Pulpae Rad. Patientiae unc. unam.
Axungiae Porci . uncias duas.
Succi Citri . . cochlearia duo.
Misce sedulo.

℞. Florum Sulphuris,
Benzoës, singulorum uncias duas.
Butyri recentis quantum sufficit.
Misce triturando.

Unguentum stimulans. (LH.)

℞. Carbonis pulverati . semunciam.
Florum Sulphuris unciam unam.
Cerati simplicis uncias duas c. dimid.
Misce.

Unguentum s. Pomatum contra tineam. (*Bo. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Florum Sulphuris,
Carbonis pulv., sing. uncias duas.
Fuliginis pulverati,
Chinae pulv., sing. unc. unam.
Cerati . . . quantum sufficit.
Contere et bene misce.

Emplastrum resinosum sulphuratum

s. *Guillermi servitoris s. sulphuratum.* (His. His3.)

℞. Resinae Pini,
Colophonii, sing. . libras duas.
Cerae flavae . . libram unam.
Terebinthinae . . uncias octo.
Mixturae liquatae et colatae adde
Pulv. Zingiberis . sesquiunciam.
— Baccarum Lauri,
— Sulphuris,
— Anisi,
— Pulegii,
— Olibani,
— Croci,
— Mastichis, sing. unc. unam.
— Piperis Jamaic. uncias duas.
Misce exacte.

Swietenia.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Swietenia Mahagony, L.*; Mahagoniholz; Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles (*Gal.*).

D *Br. G. Gr. M. Re.*

Ein großer Baum (Decandria Monogynia, L.; Meliaceae, J.) Südamerica's. (*Plenck* t. 326. *Hayne* I. t. 19 *Cat.* Carol II. t. 20.)

Man wendet die Rinde des Stamms und der Zweige (cortex ligni Mahagoni), an; es sind fast platte, fußlange, rauhe, graubraune Stücke; die von den Zweigen ist gerollt, handlang und kürzer, außen hellweißlichgrau, inwendig dunkelrothbraun; sie hat keinen Geruch, aber einen sehr adstringirenden, etwas bittern Geschmack. — Das *Extractum Mahagoni* wird durch Abkochung bereitet. (*Gr.*)

2) *Swietenia febrifuga, Roxb.*; Fieberbaum; Mahagon fébrifuge (*Gal.*); Bark of the red wood tree (*Ang.*); Rohun (*Beng.*); Swamy (*Can.*); Patranga (*Sa*); Schemmarum, Vumae marum (*Tam.*); Soimido (*Tel.*).

D Du. *A. C. G. Gr. Re.*

Ein Baum der Küste Coromandel. (*Roxb.* Pl. Corom. I. t. 17. *Hayne* I. t. 20.)

Man wendet die Rinde (cortex Soymidae, Drymis aromatica) an; sie kommt in Stücken von verschiedener Größe, von meist einem bis zwei Fuß Länge, auf einen bis acht Zoll Breite und von mäßiger Dicke vor, hat eine dünne, rauhe, aschgraue, einigermaaßen punctirte Oberhaut und ist feuerroth; bricht leicht, ist aber übrigens hart und der Politur fähig. Sie hat einen angenehmen, schwach gewürzhaften Geruch und einen sehr bittern, adstringirenden und etwas balsamischen Geschmack.

Fiebermittel. — Gabe des Pulvers, ein Scrupel.

T.

Tacamahaca.

Zwei Harze führen in den Pharmacopöen diesen Namen:

1) *Tacamahaca*; Hackundtack, Takamahakharz; Tacamahaca ordinaire (*Gal.*); Takamahaka (*B.*); Hak og tak (*D.*); Tacamaca (*His. Lus.*); Taccamacca (*I.*).

Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. LP. O. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. T. Z.*

In unregelmäßigen Massen, welche aus aneinanderklebenden Stücken zu bestehen scheinen, von gelblicher oder grünlicher Farbe, innerlich halbdurchscheinend, außen mit wellenförmigen, weißlichen, graulichen Binden; sie lassen sich leicht zerreiben und haben einen gewürzhaften, terpentinartigen Geruch und keinen besonders merkbaren, nach einiger Zeit scharf werdenden Geschmack.

Außer dieser Sorte, welche gemeiner Takamahak (Tacamahaca communis s. in sortis), Tacamahaca commun ou en sorte (*Gal.*), genannt wird, kennt man noch eine andere, Tacamahaca sublimis s. in testa, Tacamahaca sublime, angélique ou en coques, in Tropfen oder kleinen Körnern, außen von weißlichgrauer, innen von gelblicher oder röthlicher Farbe.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in die Rinde von Fagara octandra, L. (Octandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, J., einem Baume Südamerica's und, wie behauptet wird, auch Madagascar's (*Jacq.* Am. t. 71. fig 1 — 3.) macht. Man hat es fälschlich von Populus balsamifera, L., einem Baume (Dioecia Octandria, L.; Amentaceae, J.) des Nordens beider Continente (*Pall.* Pl. Ross. I. t. 41. *Plenk* t. 714.) hergeleitet, welcher ein wohlriechendes Harz, den sogenannten Focotbalsam (Balsamum Focot) oder das Nordamericanische Takamahak, Balsamum Populi (*Gr.*), Baume Focot, Tacamahaca de l'Amérique septentrionale, liefert, wenn dieser (Tacamahaca Mauritiana s. vera) nicht vielleicht, wie Einige meinen, von Calophyllum Inophyllum, L., einem Baume (Pentandria Monogynia, L.; Guttiferae, J.),

Ostindien's (*Rheede* Hort Malab. 4. t. 38.) kömmt. Die Nuß von letzterm Baum liefert ein Oel, welches bei Rheumatismen benutzt wird.

2) *Balsamum Mariae s. viride s. Calaba, Oleum Mariae, Balsamum Sti. Thomae, Calaba*; Marienbalsam; Tacamahaca de l'ile Bourbon, Baume vert, Baume Marie, Baume de Calaba (*Gal.*); East indian balsam (*Ang.*); Balsamo de Maria. (*His.*)

His. Hss. *Gr*

Eine weiche, klebrige, dunkelgrüne, starkriechende, salbenartige Masse, welche langsam an der Luft verhärtet.

Dieses Harz fließt aus Einschnitten, welche man in den Stamm und die Zweige von Calophyllum Calaba, *Jacq.*, einem Baume (Polyandria Monogynia, L.; Guttiferae, J.) der Antillen, macht (*Jacq.* Amer. t. 165.); *Balsamum viride* (*Gr.*) kommt von Chloroxylon verticillatum aus Peru.

Reizend, auflösend.

Oleum Tacamahacae. (Wir.)

℞. Tacamahacae . partem unam.
Arenae alb. lot. part. unam c. dim.

Destillent super balneo arenae, e retorta vitrea; oleum a liquore acido cum illo transeunte separatum rectificetur.

Emplastrum stomachicum s. de Tacamahaca s. tacamahacinum s. de Crusta Panis. (Br. Ful. Pal. Sar. Sax. Wir. *Au. Fi. Sp.*)

℞. Tacamahacae . . . uncias tres.
Gummi Carannae drachmas sex.
Balsami Peruviani,
Terebinthinae, sing. sesquiunciam.

Liqua blando igne. (Sar.)

℞. Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae . unciam unam.

Liqua et mixturae semirefrigeratae adde

Pulv. Tacamahacae unc. quatuor.
— Balsami Peruviani,
Olei ess. Menthae crisp., sing. drachmas duas.
— — Caryophyll. drach. unam.

Misce bene. (Sax. Wir. *Sp.*)

Ful. Cerae sesquilibram, Terebinthinae semilibram, Tacamahacae, Nucis mosch., sing. uncias tres, Balsami Peruv. semunciam et Olei Menthae crispae drachmas duas; — *Vin.* Cerae partes sexaginta quatuor, Terebinthinae octo, Tacamahacae triginta duas, Olei Caryophyllorum unam, Olei Nucis mosch. duas et Balsami Peruviani duas.

℞. Galbani,
Tacamahacae,
Cerae flavae,
Asae foetidae,
Cumini,
Terebinthinae, sing. . part. aeq.

Fiat emplastrum. (*Au.*)

℞. Tacamahacae . . unciam unam.
Mastichis,
Storacis Calamita, sing. semunciam.
Macidis,
Nucis moschatae,
Caryophyll., sing. drach. unam.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Olei ess. Carvi,
— — Menthae, sing. gutt. viginti.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Terebinthinae . . uncias duas

Fiat emplastrum. (Br.)

℞. Crustae Panis tostae uncias duas.
Tacamahacae . . unciam unam.
Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Olei Menthae, sing. semunciam.
Cerae flavae . . . . uncias sex.
Terebinthinae,
Olei Mastichis,
— Cydoniorum, sing. unc. unam.

Fiat emplastrum. (Pal. Wir. *Sp.*)

Man legt dieses Pflaster auf die Oberbauchgegend, um Erbrechen und Diarrhöe zu hemmen, auch um Luft fortzutreiben, und gegen Krankheiten, welche man von Schwäche des Magens abhängig glaubt.

Tamarindus.

Tamarindus indica, L.; Tamarinden-, Sauerdattelbaum; Tamarinier (*Gal.*)

Am Ams. An. B. Ba. Bel. Bor Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Ham. Hass HassP. His. Hss. Li. Lon. LonN LP. Lus. O. Pol. R Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Va.* Z.

Ein schöner Baum (Triandria Monogynia, L; Leguminosae, J.) Ostindien's. (*Blackw.* t. 201. *Lam.* Ill. t. 25 *Plenck* t. 31. *Descourt.* Fl. méd. d. Ant. t. 226 Düss. off. Pfl. VII. t. 11. Fl. méd. VI. 338.)

Man wendet die Früchte

Tamarindi, Fructus Tamarindorum; Tamarinden, Sauerdatteln; Tamarins (*Gal.*); Tamarind (*Ang.*); Umblie (*Ar. Duk. Hin.*); Tamaryndy, Indyanske daktyle (*B.*); Tamalaki (*Band.*); Cayme (*Co.*); Mahasi ambala (*Cy.*); Tamarin (*D. Suec.*); Tamarindo (*His. I. Lus.*); Tamarinde (*Bel.*); Kamal (*Ja.*); Heghka (*Mal.*); Tumiri hindi (*Pe.*);

Amlika, Tintili (*Sa.*); Pullie (*Tam.*); Chinta punddo (*Tel.*)

an. Es ſind längliche, etwas zuſammengedrückte, drei bis fünf Zoll lange, geſchloſſene Hülſen von graubrauner Farbe, welche mit einem dicken Fleiſch angefüllt ſind, in dem mehrere ſehr große, glänzende, eckige und zuſammengedrückte Saamen liegen. Sie werden entweder unbereitet verſchickt (Tamarindi fructus naturalis) oder nach Entfernung der Schaale zur Erhaltung des Marks, Syrup (Tamarindi rubri s. praeparati) oder Salz (Tamarindi nigri) hinzugethan. Das Fleiſch oder Mark (Tamarindi Pulpa) iſt von weicher, ſchlüpfriger Beſchaffenheit, ſchwärzlichbraun, und hat einen weinartigen Geruch und einen angenehmen, mit der Zeit ekelerregenden Geſchmack.

Es enthält, nach Vauquelin, Satzmehl, Zucker, Gallerte pectiſche Säure, Schleimharz, Citronenſäure, Weinſtein, Weinſteinſäure und Aepfelſäure.

Pulpa Tamarindorum s. Tamarindi s. Tamarindi extracta. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Ful. Gal. Han. Hass. HassP. LH. LP. Lus. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. Wür. *Fi. Gr. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Tamarindorum . . quantum vis.
Tritura cum Aqua ut in massam homogeneam redigantur, quam deinde in cribro setaceo, spathulae ope tere; pulpam trajectam spatulae argenteae ope separa et in olla chartâ tecta serva. (An. B. Bel. *Gr. Vm.*)

Fi. Medullam cum Seminibus Aquae pauxillo humectatam per cribrum setaceum trajicere et consumere; — Ams. et Gal. Tamarindos cum Aqua bull triturare; — Lus. illos ante ebullitiones in Aqua mollefacere.

℞. Tamarindorum . . quantum vis.
Tritura cum Aquae bull. pauxillo, cola per cribrum setaceum, vaporando ad mellis consist inspissa, adde Sacchari partem sextam et nova evaporatione ad consist. pulpae redige. (Bor. Han. LH. O. Pol. Sax. *Sw.*)

Br. Hass. Pal. Wir. et *Pid.* Pulpae partes duas et unam Sacchari; — D. R. et Wür. Pulpae tres et unam Sacchari; — *Sp.* Pulpae quatuor et unam Sacchari; — Fenn. Pulpae viginti quatuor et unam Sacchari; — LP. Pulpae libram unam, Sacchari uncias sex; — Bor4. HassP. Fructus in Aquae communis pari quantitate macerare et per cribrum trajicere, pultem ad mellis consist. vaporare et unicuique librae addere Sacchari uncias duas.

℞. Tamarindorum contus. . q. vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Coque per tempus aliquot, cola per pannum; singulis colaturae libris adde Limaturae Ferri semunciam, sepone per horas 24, decantha partem limpidam, immerge laminam ferream politam et quando nulla cupri particula hujus superficiei adhaeret, liquorem ad mellis consist. consume; adde deinde pro libra una decocti Sacchari albi uncias tres et ad consist. pulpae consume. (Ful. Li.)

Laxirend, kühlend, fäulnißwidrig, Alcalien neutraliſirend. — Gabe, von zwei Drachmen bis zwei Unzen.

Conserva Tamarindorum. (Lus. *T.*)

℞. Pulpae Tamarind. partem unam.
Sacchari albi pulverati partes duas.
Misce exacte.

T. Pulpae libram unam, Sacchari uncias quatuor; vel: Pulpae uncias sedecim, Syrupi Violarum duodecim, Sacchari uncias tres.

Infusum Tamarindorum. (*Ca. Va.*)

℞. Tamarindorum unc. unam ad duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per decem sexagesimas et cola absque expressione.

Potio laxans. (*Ca.*)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Commisce et colaturae adde
Mellis despumati unciam unam.

Infusum Tamarindorum compositum. (Br. Lus.)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, singularum sesquiunciam.
Cort. Aurantior. drachmas duas.
Aquae bullientis . . uncias octo.
Digere ut pulpa et manna solvantur et cola (Lus.)

℞. Tamarind. a. semin. liber. semilibram.
Elaeosacchari Citri unciam unam.
Succi Citri . . . . semunciam.
Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras octo.
Infunde et cola. (Br.)
Laxirend.

Decoctum Tamarindi s. Tamarindorum. (An. B*. Ful. Gal. *Fi. Re. T. Va. Vm.*)

℞. Tamarindorum . . uncias duas.
Aquae communis . . libras tres.
Coque per horae quadrantem et cola. (*Ra.*)

T. Pulpae uncias duas, Aquae libras duas; — *Re. Va.* Tamarindorum un-

cias duas vel tres, Aquae octarium (libras duas *Va.*).

℞ Tamarindor. unc. unam vel duas
Aquae communis . . libras duas.

Coque per horae semiquadrantem; cola absque expressione et adde

Syrupi Capilli Ven. unciam unam.

Misce bene. (Gal. *Fi.*)

B*. Tamarindorum unc. duas, Aquae libras quatuor, coctionem ad trium remanent. et Syrupi Rubi Idaei sesquiunciam.

℞. Tamarindorum . unciam unam.
Passularum minorum uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut colaturae unciae sedecim obtineantur; ebulliant aliquoties, tunc absque expressione colentur. (*Vm.*)

Au. Tamarindorum uncias duas, Passularum quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, ut librae duae colaturae obtineantur.

℞. Pulpae Tamarindorum unc. duas.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque ad quartae partis consumptionem et adde

Nitri . . . . . drachmas tres.
Roob Ribium . . sesquiunciam.

Misce bene. (Ful.)

Glasweiſe.

Decoctum Tamarindi compositum. (Wür. *Sw*. Va.*)

℞. Tamarindorum,
Passular. min., sing. uncias tres.
Aquae bullientis quantum sufficit ut ebulliendo librae tres colaturae obtineantur; adde

Tartari stibiati . . semigranum.
Syrupi Mororum . sesquiunciam.

Misce. (*Sw*. Va.*)

℞. Tamarindorum . . uncias sex.
Cremoris Tartari drachmas tres.
Aquae fontanae quantum sufficit ut ebulliendo libra una colaturae obtineatur, cui calidae adde

Foliorum Sennae,
Rhei, sing. . . sesquidrachmam.

Post horas quatuor digestionis in liquore solve

Mannae electae drachmas decem.

Cola et adde

Aetheris sulphurici . guttas sex.

Misce bene. (Wür.)

Gabe, ſtündlich zwei bis vier Unzen.

Serum Lactis tamarindinatum s. temperans. (Bor4. Han. Li. *Au. B. Sw. Va.*)

℞. Lactis vaccini . . libras duas.
Tamarindorum . . uncias duas.

Coque et post coagulationem cola. (Han. *Sw.*)

Li. et *Au.* coquere Seri Lactis partes quatuor cum una Tamarindorum et colare; — *B.* Pulpae sesquiunciam et Lactis q. s. ad obtinendas duas colaturae libras; — *Va.* Pulpae unciam, Seri libram; — Bor4. ut serum lactis dulcificatum sed loco tartari Pulpae unciam et absque conchis.

Säuerlich, angenehm kühlend und gelind laxirend.

Serum Lactis antiscorbuticum. (*Pal. Bo.*)

℞. Acetosellae,
Betonicae, sing. manipulum unum.
Caryophyll. rubr. manip. dimid.
Tamarindorum . sesquiunciam.
Seri Lactis clarificati libras tres.

Infunde per horam unam, blando calore, et adde colaturae

Syrupi Limonum,
— Violarum, sing. sesquiunciam.

Misce. (*Bo.*)

℞. Tamarindorum . . semunciam.
Acetosellae, . sesquimanipulum.
Betonicae,
Cerefolii, sing. semimanipulum.
Seri Lactis . . . . libras tres.

Infunde blando calore per horam unam sed absque bullitione; cola exprimendo et adde

Syrupi Succi Citri,
— Rubi Idaei,
— Violarum, sing. unc. unam.

Misce. (Pal.)

Gabe, eine Unze alle halbe Stunden.

Potio s. Mixtura laxans, Potio purgans, Tisana laxans s. purgans. (Ful. Ham. LP. *B. Pie. Sm. Va.*)

℞. Tamarindorum . . uncias tres.
Aquae . . . . unciae duodecim.

Decoque ad unciarum decem remanentiam et colaturae adde

Mannae . . . . . uncias duas.

Cola iterum. (Ham. *Va.*)

℞. Pulpae Tamarindor. unc. unam
Aquae . . . . . quantum sufficit ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde

Cremoris Tartari . unciam unam.

Auf zweimal zu nehmen. (*B.*)

℞. Pulpae Tamarindor. sesquiunciam.
Sulphatis Sodae . unciam unam.
Aquae bullientis . uncias novem.

Solutioni adde

Syrupi Mannae . unciam unam.

Misce bene. (Ful.)

℞. Tisanae communis (LP.) libram unam.

Ultimis coctionibus adde

Mannae,

Tamarindorum, sing. sesquiunc.
Colaturae adde
Sulphatis Sodae . unciam unam.
Gabe, 4 Unzen, drei Mal. (LP.)

℞. Pulpae Tamarindorum,
Mannae, singularum uncias duas.
Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Cola solutionem. (Ful.)

℞. Tamarindorum . unciam unam.
Santali citrini . drachmam unam.
Mannae uncias duas cum dimidia.
Aquae . . . . . uncias novem.
Colaturae adde
Tinct. Ipecacuanh. aquos. unciam.
Misce. (*Pic.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas sex.
Salis Prunellae . drachmas duas.
Tamarindorum . uncias quatuor.
Aquae . . . . octarium unum.
Coque per semihoram et adde colaturae
Syrupi Violarum . uncias duas.
Misce sedulo. (*Sm.*)

℞. Tartari solubilis drachmas duas.
Sennae mundatae drachmas tres
Tamarindorum . unciam unam.
Liquiritiae . . . drachmas duas.
Fruct. Citri c. Cortice part. dimidiam.
Cerefolii . . manipulum unum.
Scammonii Monspel. gr. septem.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde per horas duodecim et cola cum expressione. (*Pic.*)
Glasweise zu nehmen.

Electuarium laxativum s. Tamarindorum. (Pal. Wir. *Fi. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Pulpae Tamarind. unc. quatuor.
— Uvarum,
— Prunorum,
Fol. Sennae, sing. sesquiunciam
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Cinnamomi,
Foeniculi, sing. . drachmas duas.
Olei ess. Nucis mosch. guttas decem.
Syrupi solutivi quantum sufficit.
Fiat electuarium. (Wir.)

℞. Foliorum Sennae . . uncias sex.
Foeniculi . . . drachmas duas.
Vini albi,
Aquae, singulorum . libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam, exprime et adde
Pulpae Prunorum,
— Uvarum,
— Tamarind., sing. semilibram.
Cremoris Tartari unciam unam.
Foliorum Sennae . uncias tres.
Olei ess. Anisi,
Olei ess. Nucis mosch., sing. semidrachmam.
Misce sedulo. (Pal.)

℞. Cremoris Tartari drachmam unam.
Sennae . . . . drachmas tres.
Mannae uncias tres cum dimidia.
Pulpae Cassiae,
— Tamarind., sing. sesquiunc.
Syrupi Violarum quantum sufficit.
Misce (*Vm.*)

℞. Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Foliorum Sennae sesquidrachmam.
Nitri,
Sulphuris, sing. . drachmas tres.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Misce. (*Sw.*)

Sy. eandem formulam indicat sed absque senna.

℞. Pulpae Tamarind. c. Sacchari aeq. quantitate commixtae,
Cremor. Tartari, sing. libr. unam.
Conserv. Prunor. simplicis libras duas.
Misce. (*Fi.*)
Gabe, eine halbe bis eine Unze.

Tamarix.

Von dieser Pflanzengattung findet man;

1) *Tamarix Germanica, L.*; Deutscher Tamariskenbaum; Tamaris d'Allemagne (*Gal.*).

Ams. Fer. Wir. Wür. *Gr. Sp.*

Ein Baum (Pentandria Trigynia, L.; Portulaceae, *J.*) Deutschland's. (*Pall.* Fl. Ross II. t. 80.)

Man wendet die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (cortex Tamarisci s. Tamarisci Germanici s. Tamaricis) des Stammes, und besonders der Wurzel, ist außen grau oder braungrau, inwendig gelb und röthlich, ungleich, rissig. Sie hat einen angenehmen balsamischen Geruch und einen sehr adstringirenden, etwas bittern Geschmack. — Die Blätter sind sitzend, linienlanzettförmig und dachziegelförmig.

2) *Tamarix Gallica, L.*; Französische Tamarisken; Tamaris de France (*Gal.*); French tamarisk (*Ang.*); Taray (*Ar.*); Fransche tamarisk (*Bel.*); Tamarisco (*I.*); Tamarqueira (*Lus.*).

An. B. Br. Fer. Gal His. His3. *Be. Br. G. Gr. M. Re.*

Ein Strauch des südlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 312.)

Man wendet ebenfalls die Rinde und die Blätter an.

Die Rinde (cortex Tamarisci s. Tamarisci Gallici) ist dünn, gerollt, außen braun, inwendig hellgelb und hat einen bittern, etwas adstringirenden Geschmack. — Die Blätter sind lanzettförmig, sehr

klein, spitzig, umfassend und dachziegelförmig.

Tonisch, aber jetzt wenig in Gebrauch, ehedem zu den eröffnenden Mitteln gezählt.

Tamus.

Tamus communis, *L.*; Jungferwurzel; Schmeerwurzel, Schmeerwurzschwarzrebe; Sceau de Notre Dame, Vigne noire, Bryone noire (*Gal.*); Common tamus (*Ang.*).

Gal. *G. Gr. Re.*

4 (Dioecia Hexandria, L; Alismaceae, *J.*) Eine in dem südlichen Europa wachsende Pflanze. (*Blakw.* Herb. t. 457. *Lamk.* Ill. t. 817. *Schk.* t. 327.)

Man wendet die Wurzel (radix Tami s. Tammi s. Bryoniae nigrae) an; sie ist rund, höckerig, auswendig schwarz, inwendig weiß. Ihr Geschmack ist scharf und etwas unangenehm.

Man betrachtet sie als harntreibend.

Tanacetum.

Tanacetum vulgare, *L.*; Rainfarrn; Tanaisie (*Gal.*); Tantay (*Ang.*); Wratje (*B.*); Rheinfan (*D.*); Tanaceto (*His*); Tanaceto, Erba pennina (*I*); Reinevaren (*Bel.*); Wratycz (*Pol.*) Athanasia, Tanasia (*Lus.*); Renfana (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3 Li. LP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi G. Gr. M. Pid. Re. Sp.* Z.

4 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t 464. *Plenck* t. 611. *Hayne* II. t. 6. Düss. off. Pfl. t. 12. Fl. méd. VI. 329.)

Man wendet das Kraut, die Blüthen und die Saamen an.

Das Kraut (herba Tanaceti s. Athanasiae) besteht aus einem gestreiften, walzenförmigen, ästigen Stängel und großen, abwechselnden, gestielten, ebenen, glatten Blättern, von denen die untern doppelt gefiederte, dreilappige, fast sitzende, schmale, linienförmige, spitzige, etwas herablaufende Blättchen besitzen. Der Geschmack ist gewürzhaft, brennend und bitter. — Die Blüthen (flores Tanaceti) bilden strahlige Köpfchen, sind glänzend gelb und haben einen balsamischen, bittern Geschmack — Die Saamen sind klein, länglich, etwas gekrümmt, tief gefurcht und am obern breitern Ende mit einem kleinen Rande versehen. Ihr Geschmack ist bitter und kampherartig.

Der Geruch ist stark und balsamisch; der der Blüthen unangenehm, kampherartig und gewürzhaft.

Reizend, harntreibend, Wurmmittel — Gabe des Pulvers, zwanzig bis vierzig Gran.

Tanacetum Balsamita (*Gr.*): Blätter magen-, herzstärkend, auf den Uterus wirkend und angeblich gegen Opiumbetäubung, Saamen wurmtreibend; *Tanacetum annuum*, *Heliochrysum*, emmenagogisch, gegen Rheumatismen.

Conserva Tanaceti, *Confectio Florum Tanaceti sicca.* (Ful. Sar. *Vm.*)

℞. Fol. Tanaceti contus. part. unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere et in balneo aquae liquare fac. (*Vm.*)

Sar. Florum et Sacchari, sing. part. aeq.

℞. Flor. Tanaceti absque calycibus partem unam.
In sartaginem cupream, lento igne, ingere, injice sensim
Sacchari ad glob cocti part duas
Agita, donec massa bene sit siccata et hoc repete, donec flores penitus sint saccharo tecti. (Ful.)

Pulvis Tanaceti compositus (Suec. *Re.*)

℞. Summitatum Tanaceti,
Seminum Cinae,
Gummi Guttae,
Nucis vomicae,
Sulphatis Ferri, sing. drach. unam.
Pulverata seorsim commisce.

Species nervinae pro cucuphis. (Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Menthae piperitae,
— Rutae,
— Serpylli,
— Majoranae,
— Thymi,
— Salviae,
— Sabinae,
— Melissae,
Bacc. Juniperi, sing. . unc. duas.
Flor. Rosarum rubrarum,
— Lavandulae, sing unc tres.
— Tanaceti . uncias quatuor.
Baccarum Lauri . uncias duas.
Cardamomi minoris unciam unam.
Anisi,
Carvi, singulorum sesquiunciam.
Macidis . . . . semunciam.
Concisa et contusa misce.

Extractum Tanaceti aquosum. (Br. Ful. HassP. Li. Sar. Sax. Wir. *Gr. T. Vm.*)

℞. Herbae Tanaceti . libram unam
Aquae fontanae . . libras sex

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad extracti consist. consume. (Br. Ful. Wir.)

Li. coquere Herbae libram unam cum octo Aquae per horam et exprimere; residuo Aquae frigidae pauxillum superfundere et itidem exprimere, tunc colaturas ambas commixtas consumere.

℞. Herbae Tanaceti . partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, commisce ambos liquores et post 24 horarum sepositionem ad aptam consist. consume. (Sax.)

℞. Herb. Tanaceti contus. libr. octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillando Aquae uncias circiter duas abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et coquendo ad tertiam partem redige; liquorem clarificatum et colatum ad electuarii consist. consume, et huic nonnisi tepido Aquam destill. affunde. (Sar.)

Fer coquere Herbae libram unam in Aquae tribus, colaturam Albuminis ope clarificare et sufficienter consumere.

℞. Foliorum Tanaceti quantum vis.

Contusa cum Aquae pauxillo, diu terendo commisce; cola cum expressione et postquam coagulaverit, faeculam sepone; infunde deinde residuo blando calore succum limpidum, cola exprimendo, iterum clarifica et liquorem vaporando ad extracti consist. redige, adde faeculam et denuo calefac, donec massa consist. necessarium acquisiverit. (*Vm.*)

HassP. ut extractum cardui benedicti, centaurii minoris etc.; — *T.* Tanaceti libram unam, Aquae bull. octo per horas 24 infundere, colare leviter exprimendo, filtrare et ad extracti consist. inspissare.

Gabe, ſechs bis zwanzig Gran.

Extractum Tanaceti alcoholicum. (Wür.)

℞. Summitatum Tanaceti,
Alcoholis, singulorum libram unam.
Aquae communis . libras octo.

Digere, blando calore, per tres dies, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, et alcohole destillando separato, residuum ad aptam consist. consume.

Linimentum vermifugum. (*Vm.*)

℞. Faecul. virid. rec. Tanaceti part. unam.
Axungiae Porci part. unam c. dim.

Liqua leni calore, lava in Aqua calida, decantha et tunc iterum iterumque fundendo et decanthando Aquam quam fieri potest consume.

Infusum Tanaceti. (B*.)

℞. Herbae Tanaceti . semunciam.
Aquae bullientis . uncias decem.

Infunde et cola. — Ausdünſtung beförderud. — Gabe, alle zwei Stunden eine Taſſe. — Der Aufguß mit Milch in Klyſtir gegen Ascariden.

Enema ad ascarides, Clyster vermifugus. (*Sw.*)

℞. Herbae Tanaceti . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Coquendo ad unciarum sex remanentiam consume.

Tinctura Tanaceti. (Ful.)

℞. Summit. Tanaceti partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post tres dies digestionis, blando calore, cola exprimendo. — Gabe, dreißig bis ſechszig Tropfen.

Essentia contra vermes s. vermifuga. (Br. *Vm.*)

℞. Herbae Tanaceti,
— Absinthii,
— Centaurii minoris,
Rad. Gentianae, sing. semunciam.
Florum Tanaceti,
Seminum Cinae,
Myrrhae elect., sing. drach. duas.
Spiritus Menthae . libram unam.

Digere, exprime et filtra. (Br.)

℞. Fol rec. Tanaceti . part. unam.
Radicis recentis Inulae,
Rhei,
Santolinae, singulorum partes tres.
Vini Maderani . . partes duas.
Aquae Vitae . . partes viginti.

Infunde frigide per dies octo, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Oleum Tanaceti aethereum, Aethereoleum Tanaceti. (A. Ams. An. B. Bel. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. O. R. Sax. Suec. Wür. *Br. Gr. Pid. Re. Sw. T.*)

℞. Herb. Tanaceti c. Flor. . q. vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Ams. B. Bel. Fenn. Fer. R. Suec. *Br.*)

Ful. et Li. Herbae partem unam et tres Aquae; — *Sw.* Aquae quatuor; — D. Aquae sex; — Han. HassP. O. et Sax. octo Aquae; — A. duodecim Aquae; — Gal. Herbae quinque et septem Aquae; — An. Herbae tres et decem Aquae;

— *T.* Herbae unam, Aquae bull. pondus duplum.

℞. Herb. Tanaceti . . partes 25.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post tres dies macérationis destillent. (Br. Hass. *Pid.*)

℞. Herbae Tanaceti . quantum vis.
Aquae dest. Tanaceti . . q. s.
Destillent. (Wür.)

Bor4. Oleum venale indicat. Pond. spec. = 0,932.

Aqua Tanaceti. (A. Wür. *Pid.*)

℞. Herb Tanaceti c. Flor. part unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Destillent et oleum ab aqua separetur. (Wür.)

A. Herbae partem unam et duodecim Aquae; destillent partes quatuor; — *Pid.* Herbae partem unam et Aquae octo; destillent partes quatuor.

Tapioka.

Faecula Tapioka; Panis Cassaviensis; Cassavabrodt, weißer Sago; Tapioca, Pain de Cassave, Sagou blanc (*Gal.*).

Am. Fer. His. His3. *C. G. Gr. Re. T.*

Eine stärkemehlartige, körnige, weiße oder graulichte Substanz in eckigen, unregelmäßigen Stücken von verschiedener Größe, an der Oberfläche etwas mehlig, aber durchsichtig oder halbdurchsichtig.

Es ist der ausgewaschene und getrocknete Satz des ausgepreßten Safts der Wurzel von Janipha Manihot, *K.*, einem Strauche (Monoecia Decandria, L.; Euphorbiaceae, *J.*) der heißen Gegenden America's. (*Plnk.* Alm. t. 205. fig. 1.)

Wird als nährendes Mittel, in Gallerte, mit Zuckerwasser oder Bouillon längere oder kürzere Zeit gekocht, angewandt.

Auch aus Kartoffelstärkemehl wird eine Art Tapioka bereitet.

Gelatina Tapioka. (*Gr. Re.*)

Faeculam per noctem in Aqua macerare, tunc lente usque perfecte clara fiat coquere et addere Succum et Corticem Limonum, Vinum, Saccharum et Cinnamomum ad libitum.

Taraxacum.

Taraxacum Dens Leonis, Desf., Leontodon Taraxacum, L.; Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Pappenkraut; Pissenlit (*Gal.*); Dandelion (*Ang.*); Plesska (*B.*); Laevetand (*D.*); Diente de leon (*His.*); Paapenkruid (*Bel.*); Dente di leone (*I.*); Wolowe oczy, Swini mlecz (*Pol.*); Taraxaco, Dente de leao (*Lus.*); Lejontand, Maskrosor (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va.* Z.

♃ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Bull.* t. 217. *Blackw.* t. 1. u. 501. *Plenck* t. 593. *Schk.* t. 219. *Hayne* II. 4. Düss. off. Pfl. II. 21. *Zorn* Ic. pl. t. 69.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Taraxaci s. Dentis Leonis) ist walzig, lang, fingerdick, bisweilen ästig, behaart, außen schwarzbraun, inwendig weiß und enthält einen Milchsaft. Sie hat keinen Geruch, aber einen bittern, süßen und etwas salzigen Geschmack. Getrocknet verliert sie ihre Bitterkeit. — Das Kraut (herba Taraxaci) besteht aus einer Rose langer, wie benagter, gezähnelter, glatter, hellgrüner Blätter ohne Geruch und von einem bittern Geschmack.

Species viscerales pro clysmate Kaempfii. (*Dulk.*)

℞. Herbae Taraxaci,
Radicis Taraxaci,
— Valerianae,
— Graminis,
Marrubii albi,
Chamomillae vulg., sing. unc. unam.

Succus Taraxaci. (Hass. Sar. Wür. *T.*)

℞. Herb. et Rad. rec. Taraxaci q. vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, et succum sepositum filtra. (Hass.)

Wür. addere Succi librae cuique Alcoholis drachmam; — Sar. clarificare eum in balneo aquae.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Decoctum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (An. B*. *Gr. Re.*)

℞. Radicis Taraxaci . uncias duas.
Aquae . . libras (octarios) duas.
Decoque ad dimidii circiter remanentiam et liquorem sepositum decantha. (An. *Gr.*)

B*. Radicis sesquiunciam, Aquae libras tres et decoctionem ad tertiae partis remanentiam; — *Re.* Rad. et Fol. recent. uncias quatuor, Aquae libras quatuor, coque ad libram, exprime liquorem et cola.

Harntreibend, einschneidend. — Gabe, ein Pfund täglich.

Decoctum Taraxaci compositum s. resolvens. (B*. DD. *Sw.*)

℞. Radicis Taraxaci . uncias quatuor.
Herbae Trifolii . . semunciam.
Aquae purae . . . . uncias 48.
Decoque ad dimidii aquae remanentiam, exprime fortiter et colaturae refrigeratae adde
Salis Ammon. depur. drach. duas, vel
— Sedlitzensis unciam unam.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. (DD.)

Sw. Herbae et Radicis sesquilibram, Graminis tantidem, Aquae libras sex ad trium remanentiam, et colaturae addere Oxymellis semilibram, Sulphatis Potassae drachmas sex et Aetheris sulph. alcohol. guttas viginti quinque; — B*. Graminis, Rad. Taraxaci, Rad. Cichorii, sing. uncias duas et dimidiam, Aquae q. s. ut libra una colaturae obtineatur et huic addere Syrupi Quinque Radicum aper. uncias tres, Sulphatis Potassae drachmas duas et Liquoris anod. min. guttas viginti quinque.

Von Stoll in viertägigen rebellischen Wechselfiebern, Verstopfungen der Unterleibseingeweide, Gelbsucht und Gallensteinen empfohlen. — Gabe, ein halbes Pfund vier bis sechs Mal täglich.

Decoctum resolvens s. aperiens. (Ful. Ham. *Sw. Vm.*)

℞. Rad. Taraxaci,
— Graminis, sing. unc. duas.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde
Sulphatis Potassae . semunciam.
Oxymellis . . . . uncias duas.
Misce. (*Sm. Vm.*)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras duas.
Decoque ad dimidium et colaturae adde
Cremoris Tartari unciam unam.
Boracis . . . . drachmas tres.
Mellis glyzyrrhizati uncias duas.
Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci . uncias duas.
Aquae fontanae . libram unam.
Decoque ad dimidium et adde colaturae
Extr. Chelidonii maj drach. duas.
Tartari stibiati . . grana duo.
Dissolve. (Ham.)

℞. Radicis Taraxaci uncias quatuor.
Cremoris Tartari,
Boracis, singulorum semunciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Decoque ad dimidii remanentiam et colaturae adde
Mellis despumati . uncias duas.
Misce bene. (Ful.)

Decoctum tonicum cichoraceum. (LH.)

℞. Radicis Cichorii,
— Taraxaci, singularum drachmas tres.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque ad . . . . libram unam et ultimis bullitionibus adde
Centaurii minoris drachmam unam.
Cola et in refrigerato dissolve
Sulphatis Potassae drachmas quatuor.

Gabe, vier Unzen, zwei Mal.

Extractum s. Mellago s. Inspissamentum s. Extractum liquidum Taraxaci s. Leontodontis Taraxaci. (A. Ams. B Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Fenn. Fer Ful. Gal. Han. Hass. HassP. His His8. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pm. Pol. R. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Gr. Pid. Re. Sw. Vm.*)

℞. Herbae recentis Taraxaci q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae (vaporis LH.), sub finem spathulae ope continue agitando, inspissa. (Br. Gen. His. His8. LH. Lus.)

D. et *Sw.* contundere Radicis et Herbae libras duas, addere Aquae libras sex, exprimere succum et illum postquam semel ebullivit, ad syrupi spissi consist. consumere; — Bor4. Radicum libras duodecim contundere, Aquae libras novem sensim addendo, succum exprimere et subsidendo depuratum ad separationem substantiae albuminosae decoquere, tunc colatum ad mellis consist. redigere; — LP. ut extractum cicutae.

℞. Radicis Taraxaci,
Herbae Taraxaci, sing. libras octo.
Contunde in mortario lapideo, exprime succum, coque sedimentum cum Aquae duplo, exprime et ambos liquores commixtos, post horas 12 sepositionis ad syrupi consist. consume. (Li.)

℞. Herb. et Rad. Taraxaci part. unam.
Aquae bullientis . partes octo.
Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; liquores commixti post sufficientem sepositionem decantha et blando igne ad extracti consist. consume. (Han.)

Suec. Radicem cum Aquae duplo paullulum, tunc cum nova Aqua coquere et ambos liquores vaporationi in balneo aquae subjicere; — Fenn. et

Ful. eundem agendi modum indicant, sed primum cum Aquae partibus sex et per horae quadrantem coquere; — *Br.* priorem bullitionem per horas duas continuare; — HassP. Herbam et Summitates cum Aquae q. s. in pultem redigere et in dolio per horas 12 seponere etc. ut extractum cardui benedicti.

℞. Rad. et Herb. rec. Taraxaci libr. unam.
Aquae purae . . libras decem.
Coque per horas duas, cola exprimendo, liquorem sepone et per pannum colatum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams.)

R. coquere Herbae et Radicis partem unam in Aquae duabus vel tribus, colare exprimendo et liquorem filtratum sufficienter consumere; — Du. Hass. et *Pid.* coquere Herbae et Radicis partem unam in Aquae tribus, colare exprimendo et liquorem blando igne consumere; — A. Coquere Radicis et Herbae partes aeq. in Aquae q. s. et decoctum decanthatum ad extracti liquidi consist. inspissare; — Bor. O. Pol. et Sax. contundere Radicis libras duodecim, Aquae sex sensim addendo, exprimere succum, illum postquam semel ebulliverit, per pannum colare et ad mellis consist. inspissare; — His. Radicem (His3. Folia) coquere in Aquae q. s. et decoctum decanthatum, continue agitando, lente consumere; — Wür. bullitionem per horam continuare et decoctum ad mellis spissi consist redigere; — An. coquere per horae quadrantem Radicis et Herbae libras duas in Aquae decem et decoctum decanthatum inspissare; — Lon. LonN. *C. Gr. Re.* coquere post horas 24 macerationis Radicis libram unam in Aquae octariis octo ad quatuor remanentiam et colaturam vaporando consumere; — Ba. coquere Radicis et Herbae partem unam cum Aquae sex per horae quadrantem et colaturam consumere; — Fer. coquere Radicis libram unam cum Aquae tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere; — Bor4. Taraxacum cum Aquae ferv. decuplo per horas 36 infundere, liquorem exprimendo separare, residuum cum quintuplo Aquae ferv. infundere, exprimere et liquores inspissare; — LP. ut extractum rhei.

℞. Herbae et Radicis recentium Taraxaci . . . . . libras duas.
Aquae bullientis . libras decem.
Digere per horas viginti quatuor, tunc per unam coque; decantha post refrigerationem et herbam exprime, liquores ambos commixtos et sepositione depuratos ad aptam usque consist. consume. (B. Bel.)

℞. Rad. siccat. Taraxaci . . q. vis.
Macera in Aqua frigida, tunc bis digere in Aqua fervente, clarifica liquores commixtos Albuminis ope et ad extracti consist. consume. (*Vm.*)

Pm. Herbae siccatae libram unam, Aquae ferventis libras duodecim, infunde per horas sex, cola et valde exprime, liquorem decanthatum et ad libras quatuor evaporatum cum Albumine Ovi clarifica et per pannum trajectum balnei maris ope ad extractum inspissa; — HassP. Mellaginem cum Extracto et Aquae q. s. ad syrupi spissioris consist. redactis parare jubet.

T. Succum cum Aquae modica quantitate commixtum Albuminis et caloris ope clarificare et inspissare.

Schwach reizend oder tonisch, bei Stokkungen im Unterleibe und Wassersuchten sehr gerühmt. Das flüssige und syrupartige Extract wendet man zu einem Löffel mehrmals täglich an.

Pilulae resolventes. (*Sm.*)

℞. Extracti Taraxaci,
Saponis albi, sing. unciam unam.
Liq. Terrae fol. Tart. . . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. — Gabe, vier bis sechs Stück täglich zwei Mal.

Elixir resolvens s. aperitivum. (Ful. Ham.)

℞. Extr. Taraxaci . drachmas tres.
— Chelidonii maj. drach. duas.
Aquae Menthae crispae uncias octo.
Dissolve. (Ham.)

Ful. Extracti Taraxaci drachmas sex, Extracti Chelidonii majoris duas, Aquae dest. uncias sex et duas Aquae Menthae pip.

Löffelweise.

Terebinthina.

Man belegt mit diesem Namen im Allgemeinen bloß folgende vier Harzsubstanzen:

1) *Terebinthina Cypria s. Chia s. pistacina s. vera, Resina Terebinthinae s. liquida Pistaciae Terebinthi*; Cyprischer Terpentin; Térébenthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de térébinthe (*Gal.*); Cyprian turpentine (*Ang.*); Terebinto di Cipro (*I.*)

Ba. Fer. Gal. GalM. LH. Lon. LonN. Wir. *Re. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sa Sp. T.*

Eine sehr dicke, klebrige, durchsichtige Substanz von grünlichcitrongelber Farbe,

angenehmem Geruch und einem balsamischen Geschmack ohne Bitterkeit und Schärfe.

Sie fließt von Pistacia Terebinthus, L., einem kleinen Baume (Dioecia Pentandria, L; Terebinthaceae, J.) des Archipels. (*Blackw.* Herb. t. 478. *Plenck* t. 709.)

2) *Terebinthina communis s. vulgaris s. Pini sylvestris s. pinea, Balsamum nativum Pini sylvestris, Resina Pini;* gemeiner Terpentin; Térébenthine commune, de Bordeaux ou de pin (*Gal.*); Common turpentine (*Ang.*); Ratinge ruime (*Ar.*); Almindelig terpentin (*D.*); Trementina comun (*His.*); Gemeen terpentin (*Bel.*); Trementina commune (*I.*); Kota (*N.*); Zungbarie (*Pe.*); Tjok terpentin (*Suec.*)

Am. An. B. Bel. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Ham. Han. HassP. LH Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. B. C. G. Gr. M. Par. Re. T.*

Eine syrupartige, weißliche, trübe, consistente Flüssigkeit von unangenehmem Geruch und scharfem, bitterm und widerlichem Geschmack.

Dieses Harz kommt von Pinus sylvestris, L., einem Baume (Monoecia Monadelphia, L; Coniferae, J.) des nördlichen Europa's (*Blackw.* t. 190. *Plenck* t. 677. *Schk.* t. 380. Fl. méd. V. 272.), von Pinus maritima, *Lam.*, einem andern Baume aus denselben Gegenden, (*Duham* t. 28. no. 2. t. 29. no. 4. *Zorn* Ic. pl. t. 526.) und von P. cembra. — P. palustris liefert den Carolinischen Terpentin.

3) *Terebinthina laricea s. larigna s. laricina s. Veneta, Balsamum s. Resina Laricis s. liquida Pini Laricis, Terebinthina s. Balsamum nativum;* Venetianischer Terpentin; Térébenthine de mélèze ou de Venise (*Gal.*); Venice turpentine (*Ang.*); Venedisk terpentin (*D. Suec.*); Terementina (*Lus.*); Trementina de Venecia (*His. I.*); Terpentyna modrzewowa (*Pol.*)

A. Ams. An. B Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Suec. Wir. WW. *B. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Dieses Harz ist sehr flüssig, durchsichtig, etwas grünlich von Farbe, von starkem, nicht unangenehmem Geruch und brennendem, scharfem und bitterem Geschmack.

Man erhält es durch Anbohren des Stamms von Larix Europaea, *Cand.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.), welcher auf den Alpen gemein ist. (*Blackw.* Herb. t. 477. *Lamk.* t. 785. *Plenck* t. 681.)

4) *Terebinthina abiegna s. abietina s. Argentoratensis, Resina Abietis, Oleum Abietis;* Strasburger Terpentin; Térébinthine de sapin ou de Strasbourg (*Gal.*); Strasburgh turpentine (*Ang.*); Trementina de abeto (*His.*); Olio d'Abezzo (*I.*).

An. Gal. GalM. HassP. His. His3. LH. Li. Pm. *Be. C. Fi. G. Gr. Par. Re. Sp. T.*

Ein sehr flüssiges, durchsichtiges oder etwas trübes Harz von starkem Geruch und scharfem, sehr bitterem Geschmack.

Man zieht es von Abies pectinata, *Cand.*, einem Baume (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.), welcher in der Schweiz wächst. (*Blackw.* t. 203. *Plenck* t. 682. *Lam.* Ill. 785. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 528.)

Resina Abietina Lon. 1720 *Gr.* von Pinus picea durch Einschnitte, ist nicht so fein als der Straßburger Terpentin. — Terpentin liefern außerdem noch Clusia alba und rosea, Helianthus annuus und tuberosus, welcher letztere statt des Straßburger Terpentins verkauft wird.

Der Terpentin ist, wie alle Harze, ein kräftiges Reizmittel, dessen Wirkung beim innern Gebrauch, in gewisser nach den Individuen verschiedener Gabe, nicht auf die Verdauungsorgane allein sich beschränkt, sondern sich auf eine größere oder geringere Zahl andrer Organe verbreitet, je nachdem sie entweder durch Sympathie mit jenen in Verbindung stehen oder der Terpentin nach der Einsaugung wirkt. Zu diesen secundären Wirkungen gehören die auf die Urinwerkzeuge, aber auch, wie man erst später beobachtet hat, auf die Athemwerkzeuge und das Gefühlsorgan oder die Nerven. Man wendet ihn bei'm Tripper, besonders chronischem, bei weißem Fluß, alten Blasencatarrhen, chronischen Brustcatarrhen und Nervenschmerzen an.

Der Terpentin besteht hauptsächlich aus zwei Substanzen, einem Harze und einem flüchtigen Oele. Die Wirkung ist verschieden, je nachdem beide mit einander vereinigt, oder jede einzeln angewendet werden. Vorzüglich kräftig wirkt das Oel, dann der Terpentin, dann der harzige Stoff.

§. I. Präparate, welche den Terpentin in Substanz enthalten.

A. In einer alcoholischen Flüssigkeit aufgelöst.

Tinctura s. Essentia Terebinthinae, Balsamum vulnerarium commune. (Gal. *Gr. Vm.*)

℞. Terebinthinae clarae part. unam.
Alcoholis (26°) . partes quatuor.

Digere per dies sex, subinde agitando et cola.

Gr. Spiritum rectificatum. (*Baume's vulneraire.*)

Solomons Balm of Gilead (*Re.*): Spir. Frumenti, Tinct. Cardamom., Terebinth. et fortasse Tinct. Canthar.

B. Präparate, welche den Terpentin mit einer wäſſerigen Flüſſigkeit vermiſcht enthalten.

Lac terebinthinaceum, Emulsio Terebinthinae s. terebinthinacea s. terebinthinata cum Terebinthina, Lac diureticum. (B*. *Gr. Pie. Sa. Sw. Va. Vm.*)

℞. Terebinthinae Chiae sesquiunciam.
Cum Aqua Vitae bene lotam in mortario marmoreo commisce cum
Vitello Ovi . . . . . no. 1.
addendo sensim
Aquae Parietariae uncias duodecim
ut fiat emulsio. (*Pie. Va.* Hosp. Monspel.)

℞. Gummi Arabici . drachmas tres.
Aquae . . . quantum sufficit
ut fiat mucilago spissa, quam contere cum
Terebinthinae . drachmis duabus
addendo sensim
Aquae purae . . uncias novem.
Syrupi Sacchari . sesquiunciam.
Fiat emulsio. (*Sw*.*)

Vm. Gummi drachmam unam, Terebinthinae duas, Aquae uncias octo, Syrupi unam.

℞. Terebinthinae Chiae
drachmas duas.
Sacchari albi . . unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Emulsionis Amygdalarum
uncias quatuor.
Misce bene. (*Gr.*)

℞. Terebinthinae Chiae drach. duas.
Contere cum Vitelli Ovi q. s., addendo
Julapii communis . uncias octo.
Misce bene. (*Va.*)

B*. Terebinthinae semunciam, Vitellos Ovorum duorum, Syrupi Althaeae uncias duas et Aquae vel Vini albi, pro arbitrio, uncias octo.

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Mucilag. Gummi Arab semunciam.
Contere, sensim addendo
Mellis albi . . . sesquiunciam.
Aquae Juniperi . uncias novem.
Spirit. Nitri dulc. drach. unam.
Misce. (*Sw*.*)

Ein Reizmittel, welches man bei chroniſchen Blaſen- und Harnröhrenkrankheiten geprieſen hat. — Gabe, täglich zwei bis vier Löffel.

℞. Terebinthinae drachmam unam.
Mucil. G. Arab. drachmas quatuor.
Contere et adde
Aquae Petroselini,
— Fragariae, sing. uncias duas.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Misce. — Löffelweiſe alle 2 Stunden, bei chroniſchen Blaſencatarrhen ꝛc. (*Va.*)

Looch leniens balsamicum s. terebinthinatum. (*Sp.*)

℞. Pulv. G. Tragacanth. gr. sedecim.
Tisanae communis . semunciam.
Fiat mucilago, cui sub continua agitatione adde
Syrupi Althaeae,
Olei Amygd. dulc., sing.
drach. unam.
Terebinth. c. Vitello Ovi trit.
scrupulum.
Tisanae pectoralis unc. tres c. dim.

Potio s. Aqua terebinthinata. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Venet. lib. quatuor.
Myrrhae . . . unciam unam.
Tritura, sensim addendo
Aquae . libras viginti quatuor.
Sepone et liquorem decanthatum in lagenis duodecim serva.

In Krankheiten der Urin- und Reſpirationswege, Hautkrankheiten, beſchwerlicher Menſtruation, weißem Fluß, Hyſterie, in der Eiterungsperiode der Blattern ꝛc. empfohlen. — Man wendet dieſe Potion ebenſo an, wie das Theerwaſſer. — Bisweilen ſetzt man mit Vortheil eine Unze kohlenſaure Potaſche zu.

Mixtura diuretica. (*Bo. Pie.*)

℞. Terebinthinae drachmam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde sensim
Aquae Petroselini,
— Fragariae, sing. uncias tres.
Mellis Narbonnensis semunciam.
Syrupi Althaeae unciam unam.

Löffelweiſe täglich vier Mal. — Barthez benutzte dieſe Mixtur häufig.

Mixtura balsamica. (*Bo.*)

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde
Extracti Rhei,
Salis Prunellae, sing. drach. unam.
Infunde sensim
Infusi Liquiritae uncias decem.
Syrupi Althaeae unciam unam.

Boerhave gab dieſe Mixtur bei Gonorrhöe. — Gabe, ein Löffel alle halbe Stunden.

Mixtura terebinthinata. (B*. *Sa.*)

℞. Terebinth. Argentor. drach. tres.

Contere cum Vitelli Ovi q. s. et adde sensim
Infusi spissi Sem. Lini libr. unam.
Fiat emulsio. (*Sa.*)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Aquae destillatae . uncias octo.
Contere et adde
Tincturae Benzoës drachmas duas.
Misce bene. (B*.)

Dethardinq empfahl letztere Einsprizzung bei Schwerhörigkeit und Taubheit. Die andere wird bei weißem Fluß gerühmt.

Clyster terebinthinatus, Enema Terebinthinae s. terebinthinatum. (B*. GalM. LP. RC. *Gr. Re. Sa. Sp. Sw.*)

℞. Terebinthinae Venet. semunc. ad unciam.
Tere cum Vitelli Ovi vel Mucilaginis alicujus q. s. et adde sensim
Aquae font. uncias sex ad octo.
Misce bene. (B*. GalM.)

℞. Terebinth. Venet. unciam unam.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Decocti Hordei . . uncias sex.
Misce sedulo. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae in Vitello Ovi solut. semunciam.
Decocti Althaeae . uncias octo.
Olei communis . . semunciam.
Misce. — Bei Ruhr, Askariden, Mastdarmgeschwüren (LP.)

℞. Terebinthinae Venetae . q. vis.
Vitelli Ovorum quantum sufficit.
Decocti Hordei . . uncias sex.
Mellis vel Electuar. lenit. drach. sex.
Fiat emulsio. (*Sa.*)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Decocti Hordei, vel
Infusi Sem. Lini uncias decem.
Olei Lini . . . unciam unam.
Interdum Tincturae Opii guttae quinquaginta adduntur. (RC.)

℞. Terebinthinae communis semunciam.
Vitellum Ovi . . . . no. 1
Infusi Lini . drachmas decem.
Misce. (*Gr.*)
Re. Aquae tepidae uncias decem loco infusi.

℞. Terebinth. c. Vitello Ovi trit. semunciam.
Decocti emollientis uncias decem.
Olei Seminum Lini unciam unam.
Commisce terendo. (*Sp.*)

℞. Terebinth. Venet. c. Vitello Ovi trit. drachmam ad semunciam.
Decocti emollientis libram unam.
Olei Seminum Lini,
Syr. Rhamni cathart., sirg. unciam
Misce bene. (*Sw.*)

Bei Verstopfung, Nierenentzündung, Ischurie von Steinen, Nieren- und Blasencolik empfohlen.

Clyster Terebinthinae s. leniens. (*Au. Sm. Va.*)

℞. Terebinthinae drachmam unam.
Vitellum Ovi recentis . no. 1.
Contere in mortario et adde
Theriacae . drachmas quatuor.
Commisce deinde totum cum
Lactis calidi . unciis quatuor.

Van Swieten wendet dieses Klystir an, um Koliken und Tenesmus, welche mit den Diarrhöen Schwindsüchtiger verbunden sind, zu beruhigen. Auch hat man es mit Erfolg bei sogenannten Darmschwindsüchten, d. h. solchen, welche die Folge hitziger oder chronischer Darmentzündung sind, angewendet. (*Sm.*)

Au. Lactis uncias octo, Terebinthinae cum Vitello Ovi tritae semunciam, Theriacae tantidem et Mellis rosati unciam unam.

Fi. Clyster balsamicus cum Opio s. Enema terebinthinatum cum Opio: Opii puri granum, Terebinthinae semunciam, Lactis sex, Vitellum Ovi unius, vel Gummi Arab. eandem quantitatem quam terebinthinae.

Clyster adstringens. (*Sm.*)

℞. Terebinthinae comm drach. quatuor.
Olei Lini . . . . uncias duas.
Vitelli Ovi rec. drachmas duas.
Tere in mortario, sensim addendo
Aquae Calcis . . . uncias sex.

Von Wintringham in denselben Fällen verordnet, wie das vorige.

Clyster balsamicus adstringens. (*Bo. Pic.*)

℞. Flor. Chamomillae manip. duos.
Lactis . . . quantum sufficit.
Coque ad unciarum octo remanentiam et adde
Terebinth. c. Vitello Ovi trit. drach. tres.
Mellis rosati . . unciam unam.
Misce bene. (*Bo.*)

℞. Croci,
Hyperici, sing. pugillum unum.
Lactis . . . quantum sufficit.
Coque simul et colaturae adde
Terebinth. c. Vitello Ovor. duor. trit. semunciam.
Theriacae . . drachmas duas.
Misce. (*Bo. Pic.*)

Dieses Klystir kann in denselben Fällen nützlich seyn, wie die vorhergehenden.

Injectio terebinthinacea. (*Au.*)

℞. Terebinthinae . . uncias duas.
Vitelli Ovi . . unciam unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Alcoholis . . . . semunciam.
Aquae . . . . uncias novem.
Misce.

℞. Saponis medicinalis unciam unam.
Terebinthinae . . semunciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Tincturae Benzoës drachmas tres.
Misce sedulo.

C. Präparate, welche den Terpentin mit fetten Körpern vermiſcht enthalten.

Mixtura adstringens. (B*. *Va.*)

℞. Terebinthinae Venetae,
Balsami Copaivae,
Olei Succini rectif., sing.
part. aeq.

Bei Blennorrhöe und Pollutionen empfohlen. — Gabe, dreißig bis ſechszig Tropfen, täglich drei Mal, mit einem Kaffeelöffel Zucker, indem man zugleich ein halbes Glas guten Wein trinkt.

Conditum nephreticum, Marmelada antinephritica. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae scrupulos quatuor.
Olei Amygdal. dulc. unc. duas.
Contere et adde
Roob Junip. absque sacch.
unc. quatuor.
Oculor. Cancri porphyris.
semunciam.

Bei chroniſcher Nierenentzündung von Nutzen. — Gabe, zwei Drachmen mehrmals täglich.

Unguentum terebinthinatum. (A.)

℞. Unguenti simplicis uncias novem.
Terebinthinae . . libras duas.
Liqua blando igne et agita ad refrigerationem usque.

Sparadrap commune (A. GalM. Pal. *T. Vm.*)

℞. Terebinthinae . partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Cerae flavae . . . partes octo.
Liqua simul in balneo aquae et supra fascias linteas extende. (GalM.)

Vm. Terebinthinae partem unam, Sebi vervecini unam cum dimidia et Cerae albae quatuor; — A. Cerae flavae uncias sex, Sebi vervecini duas, Axungiae unam cum dimidia et Terebinthinae tantidem; — Pal. Cerae albae semilibram, Sebi cervini uncias quatuor, Terebinthinae sesquiunciam et Olei Rosarum q. s.; — *T.* Olei Amygdalar. dulc. unciam unam, Cerae albae duas, Terebinthinae Venet drachmas duas.

Unguentum lenitivum s emolliens. (Gen. *Sw.*)

℞. Mucilaginis alicujus libram unam.
Butyri recentis . . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi consumptionem usque et adde
Terebinthinae Venet. unc. unam.
Adduntur interdum librae cuique hujus unguenti Essentiae Terebinthinae unciae tres et Opii drachma una. — Bei Milchknoten, Nierenſchmerzen, Iſchurie und Gelenkſteifigkeit empfohlen.

Gen. Olei Olivarum libras tres cum dimidia, Cerae flavae unam, Colophonii semilibram et Terebinthinae uncias tres.

Dieſe Salbe hat große Aehnlichkeit mit einigen der für die Bereitung des unguentum althaeae oder mucilaginis angeführten Formeln.

Charta ad cauterium. (*Ca.* B*.)

℞. Terebinthinae purae,
Cerae albae, sing. sesquiunciam.
Cetacei . . . drachmam unam.
Liqua in balneo aquae, tunc supra chartam bene laevigatam extende.

Pisa pro fonticulis. (B*. *Gr.*)

℞. Terebinthinae Venetae . q. vis.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Pulv. Rad. Curcumae unc. unam.
— — Iridis semunciam. (B*.)
Gr. Cerae libram, Curcumae uncias octo, Iridis quatuor, Terebinthinae q. s.

Unguentum depilatorium. (*Sw.*)

℞ Terebinth. Venet. drach. decem.
Resinae Pini . . unciam unam.
Liqua et in Aqua frigida serva. — Man nimmt davon etwas zwiſchen die befeuchteten Finger, faßt die Haare und reißt ſie in einem raſchen Zuge aus.

Emplastrum Gratia Dei. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. partes novem.
Liqua simul et adde
Terebinthinae . partes quinque, tunc momento, quo massa concrescere coepit
Pulveris Olibani . . partes tres.

Unguentum terebinthinatum s. Balsami et Olei Laricis, Balsamum Frahmii, Linimentum digestivum. (B*. Ba. *Sw. Vm.*)

℞. Cerae flavae . . partem unam.

Liqua blando igne et adde, mixta seorsim
Terebinthinae Venetae,
Essent. Terebinth., sing. partem unam.
Misce bene. (B*. Ba. *Vm.*)
Sw. Essentiae partem unam, Terebinthinae et Cerae, sing. quatuor.
Bei alten Fußgeſchwüren viel gerühmt.

Linimentum antihaemorrhoidale. (*Ca*)

℞. Terebinthinae Venetae,
Mellis Narbonnensis,
Olei Olivarum, sing. unc. unam.
Misce triturando.

Digestivum liquefactum. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae clarae uncias duas.
Vitelli Ovi . . . unciam unam.
Tere, sensim addendo
Mellis . . . . . uncias duas.
Aquae fontanae . uncias quatuor.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Von Plenck in Einſpritzungen bei Fiſteln angewendet.

Unguentum s. Pomatum leniens et balsamicum. (*Sm.*)

℞. Aquae Vitae,
Amyli triticei,
Sacchari albi,
Albuminis Ovi recentis,
Terebinthinae,
Olei Olivarum.
Mellis albi, sing. unciam unam.
Melli et terebinthinae mixtis adde deinde sensim, continue agitando, reliquas substantias.
Bei Geſchwüren, Excoriationen und Wunden, welche heftige Schmerzen verurſachen, empfohlen.

Balsamum s. Linimentum Arcaei, Unguentum Amyridis elemiferae s. Arcaei s. balsamicum s. digerens balsamicum s. basilicum s. digestivum flavum s. Elemi s. Elemi compositum s. Elemi et Terebinthinae s. Resinae flavae s. Resinae Elemi s. Gummi Elemi s. Sebi Arcaei s. de Terebinthina et Adipibus. (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. LP. Pal. Pol. R. Sar. Sax. Wir. *Br. Ca. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Terebinthinae . uncias sedecim.
Elemi . . . . . libras duas.
Resinae Pini libr. duas c. dimidia.
Olei Olivarum . . sesquilibram
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Liqua simul. (Fer.)
℞. Terebinthinae Venetae,
Elemi,
Servi cervini, sing. . uncias duas.
Olei Hyperici . . unciam unam.
Ligni Santali rubri drach. unam.
Liqua igne lenissimo elemi in terebinthina, adde sensim sevum et oleum simul liquata et admisce lignum pulveratum. (Sar. Wir.)
℞. Terebinthinae,
Elemi, singulorum . partes sex.
Liquefac blando igne, saepius agitando; remove ab igne et adde sensim
Sebi cerv. ad ignem liq. partes sex.
Olei Hyperici . . . partes duas.
Per pannum laneum (Flanell) transmissa in mortario ad perfectam refrigerationem usque tere (Li.)
A. Ams. An. Ba. Bel. Bor. Bor4. HassP. O. Pol. et Sax. Terebinthinae, Elemi, Axungiae et Sebi vervecini, sing. part. aeq.; — Lus. et *C.* Terebinthinae uncias decem, Elemi libram, Olei uncias duas et Sebi libras duas; — LH. Sebi libras duas, Elemi, Terebinth., sing. sesquilibr., Axungiae Porci libram unam; — Gal. GalM. *Fi. Gr.* et *T.* Terebinthinae, Elemi, sing partes tres, Axungiae duas et Sebi quatuor — His. His3. Terebinthinae, Elemi, Axungiae, sing. quinque et Sebi sex; — R. Terebinthinae, Elemi, sing. sex, Axungiae octo et Sebi quatuor; — Terebinthinae, Elemi, sing. unam cum dimidia, Axungiae unam et duas Sebi; — Ful. Hass. et Pid. Terebinthinae, Elemi, Sebi cervini, sing. tres et Olei Hyperici duas; — *Sp.* Terebinthinae, Elemi, sing. sex, Sebi cervini novem et duas Olei Hyperici; — Br. et Pal. Terebinthinae, Elemi, sing. sex, Sebi hircini duas et Olei Hyperici, sing. unam.
℞. Terebinthinae,
Elemi, sing. . . . . partes sex.
Sebi vervecini . . partes decem.
Liqua simul. (Lon. *Br.*)
Gr. Sevi libr. duas, Elemi unam, Tereb. comm. uncias decem; — An. Terebinthinae, Elemi, sing. partem unam et Sebi vervecini duas; — Gen. Terebinthinae quatuordecim, Elemi duodecim et Sebi vervecini viginti quatuor; — LonN. Terebinthinae vulgaris, Elemi, sing. uncias decem, Sebi libras duas, Olei Olivarum uncias duas; — LP. Elemi, Terebinthinae, sing. semilibram, Sevi libras duas, Axungiae unam, absque oleo; — *Gr. Re.* Elemi libram, caeterum ut LonN.
℞. Terebinthinae Venetae uncias sex.

Olei Olivarum . . drachmas sex.
Adde mixturae liquatae ex
Elemi,
Sebi vervecini, sing. . unciis sex.
Cerae flavae . . . drachmis sex.
Misce bene. (Du.)

Gr. Elemi libram unam, Cerae albae semilibram, Adipis praep. libr. quatuor (absque terebinth.?); — Sevi libr. septem, Elemi tres, Terebinth. comm. duas, Ol. Oliv. Genoens. unam.

Reizend, in der chirurgiſchen Praxis ſehr in Gebrauch und eine der beſſern Salben. — Die zweite Formel iſt die des Erfinders.

Unguentum Elemi cum Aerugine. (*Re.*)

℞. Unguenti Elemi compos. semilibram.
Lente liquato admisce
Aeruginis cum Olei pauxillo mixti drachmam.

Bei fauligen Geſchwüren.

Linimentum Elemi. (*Re.*)

℞. Ungt. Elemi comp. . uncias sex.
Olei Olivarum uncias duodecim.
Misce. — Zur Unterhaltung des Ausfluſſes nach Blaſenzügen oder bei Ophthalmie auf die Augenlider.

Balsamum vulnerarium. (B*. Wir.)

℞. Terebinth. Venet. sesquiunciam.
Elemi . . . . . semunciam.
Mixturae liquatae adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
— Cerae . . scrupulos duos.
Misce. (Wir.)

℞. Terebinthinae Venetae
Elemi, singulorum sesquiunciam.
Sebi hircini . . . uncias duas.
Balsami Tolutani unciam unam.
Fiat unguentum. (B*.)

Gebrauch, wie bei der vorhergehenden Salbe und kaum davon in der Wirkung verſchieden.

Unguentum Terebinthinae camphoratum. (GalM.)

℞. Bals. Arcaei . . . . partes 150.
Camphorae . . . partem unam.
Contere sedulo.

Balsamum Arcaei liquidum, Digestivum Plenckii. (*Ca. Sp. Vm.*)

℞. Balsami Arcaei,
Vitelli Ovi, sing. unciam unam.
Tritura bene et adde
Aquae Vitae . . . uncias octo.
Misce et serva. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae clarae,
Mellis comm., sing. uncias duas.
Vitelli Ovi . . . unciam unam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Misce triturando. (*Ca.*)

℞. Balsami Arcaei . . partes duas.
Petrolei rectificati partem unam.
Contere. (*Vm.*)

Zeitigend. — Man kann dieſen Balſam in Einſpritzungen anwenden.

Thibaut's balsam (*Gr.*): Myrrh., Aloës, Sang. Dracon., sing. drachmam, Spir. rect. uncias sex, dissolve, adde Flor. Hyper. perfor. pugillum, macera per horas 24, exprime et liquori expresso adde Terebinthin. Chinae semunciam. Aeußerlich bei leichten Wunden; innerlich harntreibend. ½ Dr. bis 2 Unzen bei Gonorrhöe.

Unguentum digestivum s. digestivum simplex s. luteum, Unguentum Terebinthinae s. de Terebinthina s. de Terebinthina et Ovorum Vitellis, Balsamum terebinthinatum. (BorC. D. Ful. Gal. Hass. HassP. Li. Pm. R. WW. *Br. Fi. Pid. Ra. T. Va.*)

℞. Terebinth. Venet. libram unam.
Vitellos Ovorum . . . no. 0.
Misce. (R.)

℞. Terebinthinae Venetae libram unam.
Vitellos Ovorum . . . no. 12.
Misce bene et adde
Mellis rosati . . . semilibram.
Serva. (WW.)

℞. Terebinthinae . . . semilibram.
Vitellos Ovorum . . . no. 14.
Tritura et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
Misce bene. (Hass. *Pid.*)

HassP. Terebinthinae Venetae semilibram, Vitellos Ovorum duorum, Olei Hyperici cocti uncias duas; — Gal. Terebinthinae partes duas, Vitelli Ovi unam et Olei Hyperici infusi q. s. ut unguentum diffluens obtineatur; — Li. Terebinthinae libram unam, Vitellos Ovorum no. 8 et Olei Olivarum uncias tres; — *T.* Terebinthinae uncias quatuor, Vitellos no. 4., Olei Hyperici q. s.

℞. Terebinthinae Venetae,
Olei Olivarum, sing. libram unam.
Cerae albae . . . semilibram.
Liqua et ad perfectam refrigerationem usque agita (*Br.*)

Pm. Cerae albae uncias octo, caeterum ut antea; — *Fi.* Olei, Terebinthinae, sing. libras duas cum dimidia, Cerae albae, libram et uncias octo; — BorC Cerae partes duas, Terebinthinae tantidem et Axungiae Porci sex.

℞. Terebinth. Venet. . drach. duas.
Cerae flavae . sesquidrachmam.
Liqua blando calore et adde

Essent. Terebinth. drachmas duas.
Misce bene. (D.)

℞. Terebinthinae Venetae semunciam.
Mellis rosati . . unciam unam.
Olei Hyperici . drachmas tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce bene. (Ful.)

℞. Balsami Arcaei . unciam unam.
Cerati . . . . . uncias duas.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Misce (*Ra.*)

Va. Hosp. Paris. Bals. Arcaei uncias duas, Olei Oliv. unc. duas et Vitellis Ovor. no. 2.

Reizend, zum Verbinden der Wunden und Geschwüre, zur Belebung der Vitalität der Oberfläche.

Unguentum digestivum aloëticum s. myrrhatum s digestivum animatum s. digestivum compositum. (Bor. Bor4. Br. Ful. Han. Li. O. Pal. Pol. Sax. Suec. Wir. *Pid. Ra. Sp. Sw. Va. Vm.*)

1) Mit Aloë.

℞. Aloës . . . . partem unam.
Mellis rosati . . partes quatuor.
Contere et adde
Terebinth. clarae (Venetae) partes duodecim.
Olei Hyperici . . . partes tres.
Misce bene. (Bor. Han. *Vm.*)

Bor4. eandem formulam sed loco olei hyperici Oleum Olivarum.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Mellis crudi . . uncias quatuor.
Tincturae Aloës . . uncias tres.
Vitellos Ovorum . . . . no. 4.
Misce exacte (Pol.)

℞. Terebinthinae . . uncias duas.
Olei Hyperici . . . semunciam.
Misce et tunc cum
Vitello Ovi . . . . . no. 1
in emulsionem redige, cui sensim adde
Tinct. Aloës,
— Myrrhae, sing. sesquidrach.
Misce bene. (*Vm.*)

2) Ohne Aloë.

℞. Terebinthinae Venetae semilibram.
Vitellos Ovorum . . . . no. 4
Tritura simul et adde
Pulveris Myrrhae drachmas sex.
Olei Olivarum . . sesquiunciam.
Misce bene (Suec.)

℞. Terebinth. Venet. uncias novem.
Olei Myrrhae . . sesquiunciam.
Adde
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Misce sedulo. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae Argent. unc. octo.
Vitellos Ovorum . . . . no. 4.
Tritura simul et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam
Pulv. Olibani,
— Myrrhae, sing. drach. tres.
Misce bene. (Br. Wir. *Pid. Sp*)

Pal. Terebinthinae libram unam, Vitellos Ovorum no. 3, Olei Hyperici uncias tres et Pulverum amborum, sing. semunciam; — Sax Terebinthinae partes quatuor, Vitelli Ovi q. s., Olei Hyperici partem unam et Pulverum amborum, sing. partis octantem; — *T.* Unguento digest. simpl. Myrrham, Olibanum et Mastichem, sing. scrupulos quatuor addere.

℞. Terebinthinae . . semilibram.
Vitellos Ovorum . . . . no. 4.
Tere exacte et adde
Olei Hyperici . . sesquiunciam.
Pulveris Myrrhae,
— Olibani, sing. drachm. tres.
Croci in Alcohole macerati q. s. ut massa colorem flavescentem praebeat. (O.)

℞. Balsami Arcaei . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Commisce bene. (*Ra.*)

℞. Balsami Arcaei,
Ung. Styracis, sing. drach. duas.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Essent. Terebinth. unciam unam.
Misce sedulo. (*Ra. Va* Hosp. Paris)

Ful. Unguento digestivo simpl. Myrrhae et Olibani, sing. drachmas duas addere; — Li. Unguenti simplicis drachmae cuique Myrrhae et Olibani, sing. grana quatuor addit. — Vis detersiva unguenti augetur, addendo Unguentum aegyptiacum (Gal.) vel Aeruginem. (*Sw.*)

Unguentum digestivum opiaceum. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞ Ung. digestivi simpl. unc. quatuor.
Laudani liq. Sydenh. unc. unam.
Commisce bene. — Loco laudani Opii pulv. drachmae duae addi possunt.

Va. Hosp. Paris. Laudani drachmam, cujus loco Opii pulv. drachmae duae recipi possunt.

Unguenta digestiva veterinaria (*Gr. Re.*): Axungiae Porci, Terebinth. colat, sing. uncias quatuor, Aeruginis vel Vitrioli viridis unam.

Balsamum Locatelli s. Italicum s. Italicum rubrum. (Ams. B*. Br. Ful. GalH. Gen. Li. Pal. Sar. Sax. Wir. *Fi. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . libram unam.
Terebinthinae,
Cerae flavae, sing. . semilibram.
Ligni Santali rubri unciam unam.

Liqua ceram in olei pauxillo, adde reliquum olei et terebinthinam, tunc lignum pulveratum et agita ad refrigerationem perfectam usque. (Gen.)

Re. Axung. porc. uncias tres, Resinae flavae, Olei Olivarum, sing. unam, Terebinthinae Venetae sesquiunciam, Cerae flavae semunciam, Sanguinis Draconis tantidem; vel resina et axungia omissis Alcannae Radicem vel Santalum rubrum ad colorandum, et Conservam Rosarum; — *Gr.* Ol. Olivar libr. unam, Terebinth. Venet. semilibr., Santali rubri vel Sang. Draconis drachmas sex

℞. Terebinthinae . partes quatuor.
Ligni Santali rubri partem unam.

Digere per horam super cinere calido in vase tecto; tunc liqua seorsim

Cerae flavae . . . partes sex.

Adde

Olei Olivarum . partes duodecim tunc lignum et resinam. Prope ignem relinque iterum per horae quadrantem, cola fortiter exprimendo et momento quo massa refrigescere coepit, adde

Balsami Peruviani partem unam.

Agita, donec balsamum concreverit. (*Vm.*)

℞. Cerae flavae . . uncias quatuor.
Olei Olivarum . . . uncias sex.

Liqua blando igne et adde

Terebinthinae Venetae uncias sex.
Ligni Santali rubri . semunciam.

Cola et adde

Balsami Peruviani drachmas duas.

Serva. (B.)

Ams. Cerae uncias quatuor, Olei et Terebinthinae, sing. sex, Ligni et Balsami, sing. unam; — Pal. Cerae uncias sex, Olei novem, Terebinthinae quinque, Ligni q. s. et Balsami drachmas sex.

℞. Olei Olivarum . . uncias sex.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Vini Maderani . uncias quinque.

Coque blando igne ad consumptionem humidi usque et adde

Terebinthinae Venetae uncias sex.
Balsami Peruviani drachmas duas.
Ligni Santali rubri . semunciam.

Serva. (Wir. *Sp. T.*)

GalH. *Fi.* Cerae uncias sex, Olei novem, Vini Hispanici duas, Terebinthinae novem, Ligni Santali rubri unam et Balsami Peruviani (drachmam?) unam cum dimidia.

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Vini Maderani . . libram unam.
Terebinthinae Venetae uncias octo.

Coque blandissimo igne ad humidi consumptionem usque et adde

Balsami Peruviani,
Sanguinis Draconis,
Storacis Calamita, sing. unc. unam.

Agita ad perfectam refrigerationem usque. (Sar.)

℞. Cerae flavae . . partem unam.
Olei Olivarum
part unam cum dimidia.

Mixturae liquatae adde

Terebinth Venetae
part. unam cum dimidia.

Adde ab igne removendo

Bals. Peruv. nigri
partis sedecimum.
Kino . . . partis duodecimum.

Serva. (Br. Sax.)

℞. Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae flavae . . sesquiunciam.

Liqua lente et adde

Terebinthinae . . . uncias tres.

Ab igne remove et adde, continue agitando,

Balsami Copaivae . semunciam.
Kino . . . . . drachmas tres.

Serva. (Tul. Li.)

Aeußerlich als balsamisches, austrocknendes und Wundmittel. Heutzutage braucht man es nur noch wenig.

Balsamum Genovevae, Unguentum Terebinthinae camphoratum. (Gal. *Ca. Fi. Vm.*)

℞. Vini rubri,
Olei Olivarum, sing. libras tres.
Cerae flavae,
Aquae Rosarum, sing. semilibram.
Ligni Santali rubri uncias duas.

Coque per horam dimidiam, spathulae ligneae ope agitando et adde

Terebinthinae Venetae
libram unam.

Commisce exacte et massae paullulum refrigeratae adde

Camphorae pulveratae uncias duas.

Cola et post aliquot horas sepositionis exprime. (*Ca.*)

℞. Cerae flavae . . . semilibram.
Olei Olivarum . . libram unam.

Liqua et mixturam per horam unam prope ignem relinque cum

Ligni Santali rubri unciis duabus

Adde deinde

Terebinthinae . . libram unam.

Cola fortiter exprimendo et massae fere refrigeratae adde

Camphorae pulv drachmas duas.

Agita ad perfectam refrigerationem usque (*Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . . partes 384.
Cerae flavae . . . . partes 64.
Ligni Santali rubri . partes 14.
Terebinthinae . . . partes 128.

In digestione relinque leni calore et paullo antequam refrixerint, adde

Camphorae . . . partes duas
Misce bene. (Gal.)

Fi. Olei libras quatuor, Cerae uncias octo, Santali duas, Terebinthinae sedecim, Camphorae drachmas duas.

Man empfahl dieſe Salbe ehedem bei geriſſenen Wunden, Geſchwüren und ſelbſt Brand.

Balsamum Chironis. (GalH.)

℞. Olei Olivarum . . uncias sex.
Terebinthinae . . uncias duas.
Cerae flavae . . unciam unam.
Radicis Alcannae quantum sufficit.
Calefac, tunc succedentim adde
Bals Peruv. nigri sesquidrachm.
Camphorae pulv. grana duodecim

Iſt wenig von den vorigen verſchieden und heutzutage eben ſo vergeſſen.

Balsamum pectorale. (*Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Olei Amygd. dulc., sing. drach. octodecim.
— Hyperici . . uncias duas.
Cetacei . . . . . semunciam.
Sanguinis Draconis,
Extracti Opii aquosi,
Bals. Peruviani, sing. drach. duas.
Butyri . . . . sesquiunciam.
Misce sedulo.

Meibom ließ bei drohender Lungenſchwindſucht zehen bis funfzehen Tropfen täglich nehmen; ob er das Uebel verhütet hat?

Sparadrap de Emplastris. (Gal.)

℞. Empl. communis,
— Diachyli gummosi,
— Cerae flav., sing. part. quindecim.
Liquata simul in balneo aquae supra fascias e tela textas extende.

Emplastrum ad s. contra apoplexiam. (Wir. *Sp.*)

℞. Terebinthinae Venet. drach. tres.
Galbani,
Opopanacis, sing. drachmas duas.
Radicis Pyrethri,
Piperis longi,
Castorei, sing. drachmam unam.
Olei Succini . scrupulum unum.
Fiat emplastrum. (Wir.)

℞. Olei Juglandis uncias duodecim.
Terebinthinae,
Resinae Pini, sing. unc. quatuor.
Colophonii . . uncias duodecim.
Cerae flav. unc. sexaginta quatuor.
Liquatis simul adde
Pulv. Succini,
— Tacamahacae,
Pulv. Gummi Carannae,
— Sandaracae, sing. sesquiunc.
— Olibani,
— Mastichis,
— Storacis,
— Benzoës, sing. unc. unam.
— Rad. Cyperi rotundi,
— — Pyrethri,
— — Angelicae,
— — Iridis Flor., sing. semunciam.
Misce bene et massae semirefrigeratae adde
Axungiae Castoris,
Camphorae, sing. . drach. duas.
Olei ess. Macidis,
— — Majoranae,
— — Caryophyllorum,
— — Ligni Rhodii,
— — Lavand., sing. scrup. duos.
— — Salviae,
— — Rorismarini,
— — Chamomillae,
— — Succini, sing. gutt. duodecim.
Misce sedulo. (*Sp.*) — Ehedem wandte man dieſes Pflaſter bei Schlagfluß und Lähmung auf den abgeſchornen Kopf an.

Balsamum viride. (Pal.)

℞. Herbae Lavandulae cum Floribus,
— Salviae,
— Hyssopi,
— Majoranae,
— Thymi,
— Carvi cum Semine,
— Menthae aquaticae,
— — crispae,
— Plantaginis,
— Rorismarini,
— Leontopodii,
— Virgaureae,
Flor. Chamomillae,
— Rosar. rubr., sing. semunciam.
Olei Olivarum,
— Rosarum, sing. libras duas.
— Lini . . . libram unam.
Infunde seorsim et adde deinde
Terebinthinae,
Sagapeni, singulorum libram unam.
Olibani . . . . . semilibram.
Digere in balneo aquae, cola fortiter exprimendo et massae semirefrigeratae adde
Olei Lavandulae,
Essentiae Terebinthinae,
Petrolei, sing. . uncias quatuor.
Post aliquot dies decantha. — Ehedem innerlich und äußerlich als reizendes, reinigendes und zuſammenklebendes Mittel.

D. Präparate, welche den Terpentin mit trocknen Subſtanzen gemiſcht enthalten.

Pilulae cum Terebinthina s. diureticae s. balsamicae aperientes. (DD. Gen. *Ca. E. Pie. Sm. Sw.*)

℞. Guajaci . . drachmam unam.
Terebinthinae . quantum sufficit ut fiant pilulae quindecim. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal. (*E.*)

℞. Terebinthinae . semidrachmam.
Balsami Tolutani scrupulos duos.
Oculorum Cancri quantum sufficit.
Fiant Pilulae trium granorum. (Gen.)

℞. Terebinthinae communis,
Rhei pulv., sing. drachmas duas.
Fiant pilulae granorum duorum. (DD.)
Gabe, fünf Stück auf einmal.

℞. Gummi Arabici . . semunciam.
Aquae . . . quantum sufficit ut fiat mucilago, cui adde
Terebinthinae . . drachmas sex ut fiat emulsio spissa; adde
Pulveris aperientis quantum sufficit ut fiant pilulae quinque granorum. (*Sw*.*)
Gabe, drei Stück täglich vier Mal. — Man kann nöthigenfalls ſtatt des Terpentins Copaivabalſam nehmen.

℞. Terebinthinae . drachmas duas.
Liquiritiae pulveratae . . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Ca. Sm.*)

Dieſe verſchiedenen Pillenmaſſen, von denen die dritte von de Haen iſt, ſind vorzüglich als harntreibend geprieſen worden

Boli antigonorrhoici. (*Pic. Sm.*)

℞. Terebinth. Venet. scrupulum unum ad duos.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Pulveris Liquiritiae quantum sufficit ut fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle ſechs Stunden. — Dieſe Biſſen unterſcheiden ſich von den vorhergehenden Pillen nach de Haen's Formel nicht. — Sie ſind von Aſtruc.

Pilulae Terebinthinae s. adstringentes. (*Gr. Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Terebinthinae Venetae uncias duas.
Extracti Rhei . drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Fiant pilulae quatuor granorum. — Gegen Leukorrhöe und Blennorrhöe. — Gabe, neun Stück täglich auf drei Mal.
Gr. Terebinth. Chiae drach. duas, Rhei unam, Bals. Copaiv. q. s.; vel: Tereb. Chiae, Olibani, sing. drachm. unam, Bals. Copaiv. q. s. — Toniſch, adſtringirend, 3 oder 6 täglich 2 oder 3 Mal bei Gonorrhöe.

Pilulae traumaticae. (Ful.)

℞. Terebinthinae Venetae,
Succi Liquiritiae,
Extr. Millefolii, sing. drach. unam.
Pulv. Mastichis,
— Olibani, sing. semidrachmam.
Fiat massa pilularis. — Gabe, zehen bis zwanzig Gran.

Pilulae balsamicae. (*Ca.*)

℞. Terebinthinae Chiae,
Cetacei, singulorum semunciam.
Myrrhae . . . drachmas duas.
Olibani pulverati quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden bei Lungenſchwindſucht.

Pilulae balsamicae terebinthinatae. (*Fi.*)

℞. Terebinthinae coctae unciam unam.
Olibani,
Mastichis, sing. . drach. duas.
Cum terebinthina liquata reliqua commisce ut fiant pilulae granorum sex, quae Pulvere Liquiritiae conspergantur. Gabe, ein Scrupel bis Drachme.

Pilulae resolventes. (*Pic. Sm.*)

℞. Terebinthinae . . guttas viginti.
Extracti Liquiritiae drachmas duas.
Saponis albi drachmas quatuor.
Syrupi quinque Radicum . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Pie. Sm.*) — Gabe, drei Stück auf einmal, täglich drei Mal, bei Gallenſteinen.

℞. Terebinthinae . scrupulos duos.
Extr. Rhei . . drachmam unam.
— Taraxaci . drach. quatuor.
Saponis albi . . drachmas duas.
Syrupi Quinque Radicum . q. s.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sm.*) — Gabe, wie bei der vorigen Formel, in Unterleibsſtockungen
Beide Formeln ſind von Tronchin.

Pilulae contra s. ad taeniam. (*Au. Va.*)

℞. Terebinth. Venet. drach. unam.
Saponis jalapini semidrachmam.
Extracti Hyoscyami grana quatuor.
Mercurii dulcis . . grana octo.
Fiant pilulae granorum duodecim. — Hufeland ließ davon alle drei Stunden vier Stück nehmen und zwei oder drei Tage damit fortfahren.

Trochisci Cypheos, Cyphoides Galli. (Pal. *Sp.*)

℞. Terebinthinae Chiae drachmas sex.
Pulpae Uvarum unc. duas c. dim.
Bdellii . . . . . semunciam.

Myrrhae,
Ligni Aloës,
Croci,
Cinnamomi,
Nardi Indicae,
Cassiae ligneae, sing. drach. unam
Schoenanthi . . drachmas tres.
Calami aromatici drachmas duas.
Mellis . . . . uncias quinque.
Vini Graeci . quantum sufficit.
Misce sedulo. (*Sp.*)

℞. Uvarum Passarum,
Terebinth. coct, sing. unc. tres.
Schoenanthi,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Calami aromatici drachmas novem.
Cinnamomi . drachmas quatuor.
Bdellii,
Nardi Indicae,
Cassiae ligneae,
Cyperi rotundi,
Bacc. Juniperi, sing. drach. tres.
Asphalti drach duas c. dimidia.
Croci . . . drachmam unam.
Mellis,
Vini Cretici, sing. . . . q. s.

Dissolve bdellium, myrrham et terebinthinam in vino, redige liquorem ad mellis consist., commisce residuum et mel cum uvis diu simul trituratis et adde reliquas substantias subtilissime pulveratas, trochiscos in loco umbroso sicca. (Pal.) — Diese Trochisken kommen mit zum Mithridat.

§. II. Präparate, welche ausschließlich oder doch vorzüglich Terpentinöl enthalten.

Aethercoleum s. Spiritus s. Alcohol s. Oleum Terebinthinae s. Terebinthinae aromaticum, Oleum volatile s. aethereum Pini s. Laricis, Spiritus Olei Terebinthinae aethereus, Essentia Terebinthinae Oleum essentiale s. Epyretum Terebinthinae.

1) Wie man es im Handel findet.

Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. D Du. Ed. Fenn. GalM. HassP. Li. Lon. LonN. R. RC. Suec. *C. G. M. Par. Sp. Va.*

Eine farblose Flüssigkeit von unangenehmem, sehr starkem Geruch und scharfem, brennendem Geschmack. Specif. Gewicht 0,870.

Man erhält von Pinus Mughus ein ähnliches Product, aber grünlich von Farbe und angenehmem Geruch, das *Oleum templinum.*

Rectificatur s. depuratur (*Oleum Terebinthinae rectificatum s. volatile Pini purissimum*) Oleum venale destillationis cum Aqua ope ab An. Ba. Fenn. et *Br.* Olei partem unam et duas Aquae; — HassP. Aquae tres; — Du. Ed. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Aquae quatuor; — *Fi.* Aquae sex; — Bor4. Aquae octo; destillent ad tertiae olei partis remanentiam.

Van Mons bemerkt, daß bei einer ähnlichen Rectification ein Theil des Oels zersetzt wird, daß sich Essigsäure erzeugt, mehr oder weniger Rückstand bleibt und daß das Oel immer weniger in Alcohol auflöslich wird. Dr. Nimmo läßt es dadurch reinigen, daß er acht Theile desselben mit einem Theile sehr starken Alcohol schüttelt, wobei der Alcohol die Unreinigkeiten anzieht; man gießt ihn dann weg und setzt frischen Alkohol hinzu, bis das Oel ganz geschmack- und geruchlos wird. Das auf diese Weise erhaltene Oel ist sehr rein, hält sich aber leider nicht lange.

2) Durch den Apotheker bereitet:

A. An. Bor. Br. Du. Fer. Ful. Gen. Han. Hass. His. His3. Li. Lon. ante 1809. Lus. O. Pal. Pm. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Pid. Sw. Vm.*

℞. Terebinthinae Venetae,
Aquae comm., sing. pondus aeq.

Immitte in cucurbitam vitream supra arenae balneum; luto affixâ galeâ destillent et oleum ab aqua separetur. (*Vm.*)

A. Bor. Han. O. Pol. R. et *Sw.* Aquae et Terebinthinae quantitatem relativam non indicat; — Am. et *C.* Terebinthinae partes quinque et quatuor Aquae; — Hass. Suec. Wür. et *Pid.* Terebinthinae unam et tres Aquae; — Ful. Li. Pal. Sax. et Wir. Terebinthinae unam et quatuor Aquae; — Br. Gen. Pm. Sar. et *Fi.* Terebinthinae unam et Aquae sex (*Oleum volatile Terebinthinae ad usum artis veterinariae* Pm.); — Lus. Terebinthinae quinque et Aquae sex; — His. His3. Terebinthinae unam et Aquae quadraginta.

Implendo per duas partes retortam vitream lutatam cum Terebinthina liquefacta et ignis reverberarii ope destillando, primo prodibit phlegma acidum (*Acetum* vel *Spiritus Terebinthinae*), tunc *Oleum volatile*, nova destillatione depurandum et in fine *Oleum densum empyreumaticum.* (*Fi.*)

Gr. sec. Lon. destillando absque aqua.

Das Terpentinöl ist reizender als der Terpentin selbst, und wird unter denselben Umständen empfohlen und angewendet.

Oleum Terebinthinae aethereum (*Gr.*) ex Oleo essentiali absque aqua in vitro destillatum.

A. Präparate, welche das Terpentinöl in Aether aufgelöst enthalten.

Aether terebinthinatus. (*Ca. Sw*. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici,
Alcoholis rectif., sing. part. aeq.
Misce sensim et aetherem destillando separa; infunde ei
Essentiae Terebinthinae . q. s. ad saturandum; agita bene, per unum diem sepone et destillationi subjice. (*Vm.*)

℞. Alcoholis . . . . libras duas.
Essent. Terebinthinae semilibram.
Misce et adde sensim
Acidi nitr. concent. libras duas.
Destillet blando calore dimidia pars. (*Ca. Sw*.*)

Sowohl äußerlich als innerlich bei Gallensteinen, Gelbsucht, Leberverstopfungen, Rheumatismen. — Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, oder in einem mit Zucker versetzten Eigelb.

Linimentum Terebinthinae aethereum. (*Vm.*)

℞. Essent. Terebinthinae . q. vis.
Spiritus Nitri dulcis . . . q. s. ad oleum agitationis ope solvendum.

Gebrauch, wie beim vorigen.

Mixtura resolvens. (B*. DD. *Au. Ca. Pic.*)

℞. Essent. Terebinthinae part. unam.
Aetheris sulphurici . partes tres.
Dissolve. (B*. *Au.*)

DD. et *Ca.* Essentiae partem unam et duas Aetheris; — *Pic.* Essentiae duas et Aetheris tres; — *Ca.* praeterea Essentiae unam et Aetheris quatuordecim.

Von Durande gegen Gallensteine empfohlen. — Gabe, von zwei Scrupel bis eine Drachme täglich, in Molken oder Fleischbrühe.

Mixtura diuretica. (*Ca.*)

℞. Essent. Terebinthinae unc. unam.
Alcoholis Cochleariae semunciam
Acidi hydrochlorici,
— nitr. alcoholis., sing. drach. tres.
— succinici,
Elixir propriet., sing. drach. duas

Gabe, vier bis fünfzehen Tropfen in weißem Wein, mehrere Tage hinter einander.

B. Präparate, welche das Terpentinöl in alcoholischen Flüssigkeiten aufgelöst oder mit ihnen gemischt enthalten.

Vinum diureticum. (*Pic.*)

℞. Essent. Terebinthinae drach. duas.
Succi Citri . . unciam unam.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Auf einmal zu nehmen.

Spiritus antiictericus. (B*. Gen. *Au.*)

℞. Essent. Terebinth. sesquiunciam.
Alcoholis . . . . semilibram.

Destillent blando calore et oleum producto supernatans separatum servetur. — Gabe, fünf Tropfen auf Zucker.

Tinctura Spiritus Terebinthinae Vauquelini (*Gr.*): Spir. Tereb. mens uncias quinque, Spir. Vini 36° B. mens. unciam unam.

Lotio terebinthinata. (B*.)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Alcoholis, sing. uncias quatuor.
Camphorae unc. (drach.) quatuor.

Heberden und Niemann rühmen sie bei phthiriasis alter Leute.

Liquor vulnerarius, Essentia s. Tinctura vulneraria Stahlii, Balsamum vulnerarium. (B*. Ful. Wir. *Sp.*)

℞. Essent. Terebinthinae part. unam.
Tincturae Myrrhae partes duas.
— Succini . partes quatuor.
Digere in loco calido.

Ehedem in Einspritzungen bei Behandlung fistulöser Geschwüre und zum Verbinden von Wunden und Geschwüren sehniger (blanches) Theile. — Kann das balsamum Commendatoris sehr gut ersetzen.

Balsamum Fioravanti, Alcohol terebinthinatum compositum. (B. Gal. GalM. *Br. Fi. Sp. T. Vm.*)

℞. Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. partem unam.
Myrrhae,
Galbani,
Styracis liquidae, sing. part. duas.
Baccarum Lauri . partes tres.
Terebinth. Venet. part. quatuor.
Alcoholis (10°),
Aquae, sing. . . . partes ℔16.

Destillent partes centum et octo et productum servetur. (B.)

℞. Bacc. rec. Lauri unc. quatuor.
Elemi,
Tacamahacae, sing. unciam unam.
Galbani,
Olibani,

Myrrhae,
Gummi Hederae, sing. unc. tres.
Styracis liquidae . uncias duas.
Ligni Aloës . . . uncias tres.
Galangae minoris,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Zedoariae,
Zingiberis,
Dictamni albi,
Aloës Socotrinae,
Succini, singulorum unciam unam.
Alcoholis . uncias nonaginta sex.
Digere per dies aliquot, tunc adde
Terebinthinae . uncias sedecim.

Destillent. — Spiritus transiens nomen *Balsamum Fioravanti spirituosum* gerit. Residuum, leni igne in retorta destillatum, oleum flavum suppedit, *Balsamum Fioravanti oleosum*. Augendo ignem, magma nigrum et empyreumaticum, *Balsamum Fioravanti nigrum* obtinetur. (*Sp.*)

Fi. Terebinthinae uncias sedecim, Elemi, Tacamahacae, Succini, Galbani, Myrrhae, sing. tres, Aloës Socotrinae unam, Styracis liquidae duas, Baccar. Lauri rec. quatuor, Galangae, Zedoariae, Zingiberis, Cinnamomi, Caryophyllorum, Nucis mosch., sing. sesquiunciam, Foliorum Dictamni Cretici unam, Alcoholis 24° libras octo; destillent fluidi librae sex cum dimidia; — Balsamum *oleosum et nigrum* ut antea obtinentur.

℞. Terebinthinae . . . partes 516.
Elemi,
Tacamahacae,
Succini,
Galbani,
Myrrhae, sing. . . . partes 96.
Styracis liquidae . . partes 61.
Foliorum Dictamni,
Aloës, sing. partes triginta duas.
Bacc Lauri rec. part. . . 128.
Galangae,
Zedoariae,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. partes . 48.
Alcoholis (22°) partes tricies mille.

Macera per dies sex, tunc in balneo aquae destillent partes bis mille quingentae. (Gal. GalM.)

℞. Terebinthinae . . partes octo.
Baccarum Lauri,
Myrrhae, sing . . . partes tres.
Styracis liquidae . partes duas.
Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Cinnamomi, sing. partem unam.
Aquae Vitae . . . . partes 216.

Destillet quarta circiter pars. (B°. *Br. Vm.*)

Reizend, ehedem sehr berühmt, als analeptisches, nervenstärkendes, gegen Nierenleiden wirksames, harntreibendes, giftwidriges, antihysterisches, Wund- und blähungtreibendes Mittel betrachtet,

Linimentum cum Balsamo Fioravanti. (*Va.* Hosp. Inf: Balsami et Olei Oliv., sing. unc. duas, Alcoholis camph. unam, Ammon. liq. drachmam.

Aqua Anhaltina, Spiritus Anhaltinus, (B°, Br. Han. Pal. Sar. Wir. *Ca. Sp. Vm.*)

℞. Terebinthinae . . semilibram.
Olibani . . . . unciam unam.
Ligni Aloës pulverati uncias tres.
Granorum Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Cubebarum,
Cinnamomi, sing. drachmas sex.
Croci Austriaci
drach. duas c. dimid.
Seminum Foeniculi,
Bacc. Lauri, sing. . semunciam.
Alcoholis . . . libras quinque.

Post sex dies digestionis destillent in balneo aquae. (Pal.)

Sp. Oleum producto supernatans separare et pro arbitrio Moschi grana quindecim in nodulo inclusa immergere.

℞. Fol. Rorismarini unciam unam.
Herbae Rutae,
Seminum Foeniculi,
Bacc. Lauri, sing. . semunciam.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi, sing. drachmas sex.
Mastichis . . . uncias duas.
Terebinthinae Venetae semilibram.
Alcoholis rectificati libras quinque.

Post sex dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.

Destillent in balneo aquae librae quinque. (Br.)

℞. Radicis Galangae minoris,
Flor. Rorismarini, sing.
drachmas sex.
Seminum Foeniculi,
Bacc. Lauri, sing. unciam unam.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Mastichis, sing. . drachmas sex.
Olibani . . . . unciam unam.
Terebinthinae Venetae semilibram.

Alcoholis rectificati . libras sex.
Post sex dies digestionis adde
Aquae purae . . libram unam.
Destillent in balneo aquae libras quinque. (Ham. Sar. Wir.)

℞. Baccarum Lauri,
Sem. Foeniculi, sing. semunciam.
Cinnamomi,
Cubebarum,
Galangae minoris,
Caryophyllorum,
Mastichis,
Nucis moschatae,
Rorismarini, sing. drachmas sex.
Olibani . . . . uncias quatuor.
Aquae Vitae uncias nonaginta sex.
Aquae . . . . . uncias 288.
Destillent spiritus unciae octoginta et hoc productum denuo destilletur cum
Terebinthinae . unciis quatuor.
Aquae unciis centum sexaginta ut spiritus unciae sexaginta obtineantur. (*Vm.*)

Die Formel von *Ca.* iſt falſch und wird daher hier übergangen.

Dieſes Waſſer unterſcheidet ſich kaum von dem balsamum Fioravanti und hat dieſelbe Wirkung, wie dieſer. Es iſt ein magenſtärkendes, blähung- und urintreibendes Mittel. Man wendet es ebenfalls äußerlich in Einreibungen auf den Unterleib, um Erbrechen und Diarrhöe zu ſtillen, oder in die Glieder bei Lähmung, an. — Gabe, ſechszig Tropfen und mehr.

Balsamus Schauerianus. (B*. Br. *Sp.*)

℞. Terebinth. Venet. sesquiunciam.
Galbani . . . drachmas novem.
Rad. Consolidae majoris,
— Fraxinellae, sing. drach. sex.
— Imperatoriae,
Mastichis, sing. . . semunciam.
Radicis Calami aromatici,
— Galangae,
Storacis Calamita,
Olibani,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Benzoës, sing. . . drachmas tres.
Nucis moschatae,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Santali albi,
Cardamomi minoris,
Camphorae,
Ligni Aloës, sing. drachmas duas.
Radicis Caryophyllatae,
— Inulae,
Aloës hepat., sing. drach. unam.
Myrrhae . . . semidrachmam.
Rad. Angelicae grana quindecim.
Alcoholis concentrati libras octo.
Post sufficientem digestionem destillent in balneo aquae ad siccum.

Auch dieſer Balſam hat Aehnlichkeit mit dem Fioravantiſchen, und iſt ebenfalls reizend, auflöſend, ſchmelzend und Wundmittel. Ehedem rühmte man ihn beſonders bei Quetſchungen und Ekchymoſen, in Einreibungen.

Balsamum vitae album, Spiritus balsamicus. (Wir.)

℞. Olibani,
Myrrhae,
Galbani, sing. . . uncias tres.
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Galangae,
Zedoariae,
Zingiberis, sing. . unciam unam.
Baccarum Lauri uncias quatuor.
Terebinth. Venet. unc. duodecim.
Alcoholis . . . libras duodecim.
Post sufficientem digestionem destillent in balneo aquae. — Dieſer Balſam, welcher nicht viel von dem Fioravantiſchen verſchieden iſt, gilt für magenſtärkend, harn-, blähungtreibend, nervenſtärkend, ſowohl äußerlich als innerlich; im letztern Falle iſt die Gabe vierzig bis ſechszig Tropfen.

Aqua contra gonorrhoeam. (Wir.)

℞ Terebinth. Venet. . unc. decem.
Rad. Iridis Flor. . uncias duas.
Herb. sicc. Menthae piperitae uncias tres.
— — Dictamni Cret unc. unam.
Sem. Agni casti,
— Rutae, sing. unc. duas et dimid.
Vini albi . . . . libras decem.
Destillet in balneo aquae dimidia pars. — Dieſes Waſſer hat ebenfalls Aehnlichkeit mit dem Fioravanti'ſchen Balſam. Hoffmann gab es bei Gonorrhöe und Leukorrhöe zu vier Löffel täglich, auf zwei Mal.

Elixir aromaticum adstringens. (*Bo.*)

℞. Florum Lamii albi libram unam.
Flor. Rosarum pallid. unc. duas.
Summit. Rorismarini unc. unam.
Seminum Urticae . uncias octo.
Foliorum Plantaginis uncias duas.
Glandes Quercus . . . no. 24.
Radicis Bistortae . uncias duas.
Vini albi . . . . libras octo.
Post horas 24 infusionis adde
Terebinth. Venet. uncias quatuor.

Destillent in balneo aquae ad siccum, producto adde
Subcarb. Potassae . unc. unam.
Roob Sambuci . uncias quatuor.
Sacchari albi . . libram unam.
Reizend, gegen Leukorrhöe gerühmt. — Gabe, Morgens nüchtern zwei oder drei Unzen.

C. Präparate, welche das Terpentinöl mit wässerigen Flüssigkeiten vermischt enthalten.

Clyster terebinthinatus, Enema Olei Terebinthinae s. terebinthinatum. (B*. *E. Gr. Ra. Va.*)

℞. Essent. Terebinth. . unc. unam.
Contere cum Vitello Ovi unius, sensim addendo
Aquae fontanae . . uncias octo.
Misce bene. (B*.) — Von Groß gegen Askariden gerühmt.

℞. Olei Terebinthinae . semunciam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contritis adde
Mucilaginis Avenae uncias decem.
Misce. (*Gr.*)

℞. Essent. Terebinthinae unc. unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Dec Capit. Papav. . unc. octo.
Von Récamier bei nervösem Leibesweh gerühmt (*Ra Va.* Hôt. D.)

℞. Essent. Terebinth. sesquiunciam.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Solut. Gummi Arab. octar. unum.
Misce. (*E.*)

Linimentum diureticum. (B*. Han. *Ca.*)

℞. Essent. Terebinthinae semunciam.
Tere cum Vitello Ovi unius et adde sensim
Aquae Menthae pip. . uncias sex.
Misce bene. (B*. Han.)
Ca. Essentiae unciam unam et Aquae Menthae tres.
In Einreibungen auf die Inguinalgegend bei sogenannter krampfhafter Ischurie.

Julep diureticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Essent. Terebinthinae
gutt. quindecim.
Millepedum pulv. semidrachmam.
Succi Summit. Asparagi
unciam unam.
Decocti Asparagi,
Aquae Herniariae, sing. unc. tres.
Syrupi Capilli Ven. drachmas sex.
Bei Ischurie, Rheumatismus und Gicht. — Auf zwei Mal, Morgens und Abends.

Looch terebinthinatum. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Essent. Terebinthinae drach. tres.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Contere et adde
Syrupi Menthae . . uncias duas.
— Florum Aurantiorum,
— Aetheris, sing. unc. unam.
Tinct. Cinnamomi semidrachmam.
Von Récamier bei Nervenschmerzen angewendet. — Gabe, täglich drei Löffel. — Zuweilen setzt man, zur Verhütung des Erbrechens, eine Drachme Laudanum zu.

Potio anthelmintica s. contra taeniam. (*Ca. Va.*)

℞. Essentiae Terebinthinae unc. tres
Mellis . . . . . drachmas sex.
Aquae dest. Menthae drach. tres.
Auf drei Mal den Tag über.

Emulsio Olei Terebinthinae s. terebinthinata. (B*. *Gr. Vm.*)

℞. Essent. Terebinth. drach. unam.
Contere cum Vitello Ovi unius vel cum Mucil. Gummi Arab. drach. duabus et adde sensim
Aquae communis unc. sex ad octo.
Misce bene. (B*.)

℞. Essent. Terebinthinae semunciam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Fiat emulsio, cui adde
Mellis albi . . . . uncias duas
et Aquae quantum satis ut fiat potio unciarum sex. (*Vm.*)
Gabe, ein Löffel täglich mehrmals.

℞. Olei Terebinthinae rectificati
scrupulum.
Sacchari albi . . unciam unam.
Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Emulsionis Amygdalarum
uncias quatuor.
Bei Nierenschmerzen. (*Gr.*)

Aqua cosmetica. (Pal.)

℞. Albuminis Ovorum rec. in Aqua ad duritiem cocti . libr. duas.
Terebinthinae Venetae semilibram.
Mellis . . . . . uncias octo.
Styracis . . . . unciam unam.
Benzoës . . . drachmas duas.
Aquae Rosar. pallid. unc. decem.
Destillent in balneo aquae ad siccum.

Potio diuretica. (*E.*)

℞. Essent. Terebinth. gutt. centum.
Gummi Arabici,
Sacchari albi, sing. drach. unam.
Aquae Menthae uncias quatuor.
Gabe, vier oder fünf Löffel täglich.

Potio diuretica s. stimulans (*E. Va.*)

℞. Essent. Terebinthinae
guttas 120 (drachm. *Va.*)
Gummi Arabici,
Sacchari, sing. . drachmas duas.

Tincturae Opii guttas sexaginta.
— Lavand comp. drach. duas.
Aquae Menthae uncias quinque.
Gabe, ein Löffel alle zwei Stunden.

D. Präparate, welche das Terpentinöl mit zuckerhaltigen Körpern vermiſcht enthalten.

Pulvis terebinthinatus, Elaeosaccharum s. Oleosaccharum Terebinthinae. (B*. *Au.*)

℞. Essent Terebinth. scrup. unum.
Acidi pyrotartarici grana decem.
Sacchari albi . quantum sufficit ad saturandum. Tere ut fiat pulvis.
Von Goeze gegen Bandwurm gepriesen. — Gabe, drei Mal täglich, in kaltem Waſſer. — Man führt dann mit Gummi Gutti ab.

Electuarium s. Opiatum terebinthinatum. (Gen. *Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Essent. Terebinthinae drach. duas.
Pulv. Gummi Arab. sesquiunciam.
Sacchari pulverati . semunciam.
Syrupi Flor. Aurant. unc. unam
Von Récamier bei Neuralgien angewendet. — Gabe, den dritten Theil täglich, auf drei Mal, zwiſchen zwei Oblaten. (*Ra.*)

℞. Essent. Terebinthinae semunciam.
Mellis . . . . . unciam unam.
Liquiritiae pulveratae . . q. s.
Misce exacte. (Gen.)

Conditum febrifugum, Marmelada febrifuga. (*Sw**.)

℞. Essent. Terebinthinae drach. duas.
Terebinthinae purae sesquiunciam.
Misce triturando cum Vitello Ovi unius et adde
Terebinthinae (Mellis?) unc. duas.
Gegen Bandwurm. — Gabe, ein Kaffeelöffel Morgens und Abends.

Bolus antiarthriticus. (Sar.)

℞. Essent. Terebinthinae guttas 24.
Mellis electi grana triginta sex.
Misce.

Linctus Olei Terebinthinae, Electuarium Terebinthinae, Mel terebinthinatum, Mixtura Terebinthinae. (B*. *E. Gr. Ra. Sw. Va.*)

℞. Essent. Terebinthinae semunciam.
Contere cum Vitello Ovi unius et adde
Mellis albi . . . . uncias tres.
Misce. (*Sw.*)

℞. Essent. Terebinthinae drach. duas.
Mellis crudi
unc. unam (quatuor *Va.*)
Misce. (B*. *E. Gr. Va.* Hôt. D.)
Von Home bei rheumatiſchem Lendenweh empfohlen; von Récamier in allen Neuralgien angerathen; letzterer nimmt, ſtatt des reinen Honigs, Roſenhonig zu einer bis vier Unzen. — Gabe, drei Löffel täglich.

E. Präparate, welche das Terpentinöl mit fetten Körpern gemiſcht enthalten.

Potio vermifuga. (*B.*)

℞. Essent. Terebinth. . drach. duas.
Olei Juglandis . . sesquiunciam.
Auf eine Gabe.

℞. Essent Terebinth. drach. quinque.
Olei Juglandis . . uncias tres.
Auf eine Gabe.

Oleum anthelminticum s. contra taeniam. (B*.)

℞. Olei Terebinthinae partes quatuor.
— Cornu Cervi partem unam.
Destillent mixturae trientes duo.
Neurohr will dieſes Oel zu zehen bis hundert Tropfen mit Erfolg gegen Bandwurm angewendet haben.

℞. Olei Terebinthinae . partes tres.
— Cornu Cervi partem unam.
Destillent tres quadrantes.
Chabert ließ es zu einem bis zwei Kaffeelöffel Morgens und Abends, oder in Klyſtir und zu zwei Kaffeelöffeln in einer ſchleimigen Abkochung nehmen. Bremſer gab es Morgens und Abends zu zwei Kaffeelöffeln in einem Wenig Waſſer (wohl zu ſtark, beſonders im Anfange). Chabert wollte mir dem Terpentinöl nur den Geſchmack des Hirſchhornöls verſtecken; es war aber wohl das Hauptingrediens darin.

Linimentum terebinthinatum s. Terebinthinae. (Am. Lon. LonN. *C. Gr. Ra. Re. Va.* Hôt. D.)

℞. Essent. Terebinth . semioctarium.
Liqua et adde
Cerati Resinae . libram unam.
In Einreibungen auf an Rheumatismen leidende Theile. (Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Essent. Terebinthinae unc. unam.
Olei Chamomillae . uncias duas.
Laudani Sydenh. . drach. unam.
Von Récamier bei Neuralgien angewendet. (*Ra. Va.*)

Oleum acusticum.

℞. Olei Terebinthinae
guttas quadraginta.
— Amygdalarum . semunciam.
Bei Taubheit von verhärtetem Ohrenſchmalz auf Baumwolle in den Gehörgang gebracht. (*Maule.*)

Oleum de Tribus. (*Vm.*)

℞. Olei Terebinthinae,
— Lavandulae,
— lateritii, sing. . part. aeq.
Misce.

Oleum Petrae vulgare. (*Gr.*): Ol. Terebinth. unc. octo, Petrol. Barb. quatuor, Ol. Rorism. drachm. quatuor; — vel: Ol. Tereb. libr. quinque, Asphalt. unc. duodecim, Ol. laterit. octo; — vel: Ol. Tereb. libr. quinque, Ol. laterit. veri unc. octo.

Unguentum digestivum veterinarium (*Gr. Re.*): Ung. Resin. flav. unc. quatuor, Ol. Tereb., Praecipit. rubri, sing. unam.

F. Präparate, welche das Terpentinöl mit Säuren gemiſcht enthalten.

Balsamum narcoticum. (*Vm.*)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi sulph. fum., sing. part. aeq.
Commisce sensim; post refrigerationem massam cum Aqua calefac et lava, donec nihil acidi libri remaneat.

Achard fand, daß das Terpentinöl mit Schwefelſäure ſich verbinden läßt, und daß dadurch eine beſondre Subſtanz, die ſogenannte ſaure Seife *Sapo acidus*, Savon acide, entſteht, welche in Alcohol und in Waſſer ganz löslich iſt. Dieſe Seife bildet die Baſis des folgenden Balſams.

Unguentum ad fistulas equorum (*Gr.*): Olei Vitrioli unciam unam, Ol. Terebinth. duas, Terebinth., Axung. Porci, sing. tres.

Balsamum adstringens s. ischaematicum. (Br. Ful. *Au. Ca. Pie. Sp. Vm.*)

℞. Acidi sulphurici drachmas decem.
Infunde guttatim
Essentiae Terebinthinae semunciam.
Cessatâ effervescentia et refrigerato liquore adde caute
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Serva. (Br.)

Pie. et *Sp.* Acidi, Essentiae, sing. semunciam et Alcoholis uncias tres; — *Ca.* Acidi semunciam, Essentiae uncias quatuor et Alcoholis tres.

℞. Terebinthinae clarae partes duas.
Acidi sulph. concent.
part. duas et dim.
Misce sensim in mortario vitreo in balneo aquae tepido; post refrigerationem per plures vices adde
Alcoholis . . . . partes octo.
Sepone per aliquot dies, decantha et serva. (*Vm.*)

Ful. et *Au.* Terebinthinae partes tres, Acidi sulph. quinque et Alcoholis rectif. viginti quatuor.

Reizend, abſtringirend, bei Blutſpucken empfohlen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel in einem paſſenden Getränk.

Camphora artificialis. (*Vm.*)

℞. Salis comm. pulv.
part. quinque c. dim.
In retortam ingesto infunde
Acidi sulph. concent. part. quinque.
Gas exinde evolutum tubi ope in lagenam transmitte continentem
Essent. Terebinthinae part. decem.
Stent in frigida reactione per plures dies, tunc blandissime calefac, continue lagenam fasciis linteis Aqua frigida humefactis circumdando; gase transire cessante, apparatu refrigerato liquidum decantha, partem concretam exstillare fac et inter chartam josephinam pressam in lagena clausa serva.

Liquor Camphorae artificialis. (*Vm.*)

℞. Camphorae artific. lot. part unam.
Alcoholis rectificati . partes sex.
Dissolve frigide.

Linimentum sulphuricum. (*Re.*)

℞. Olei Olivarum
drach. duas c. dimid.
Acidi sulphur.
guttas quadraginta quatuor.
Olei Terebinthinae unciam unam.
Bei örtlichen Schmerzen.

Sapo s. Liquor s. Spiritus arthriticus Pottii, Linimentum excitans s. resolvens, Spiritus Salis terebinthinatus. (B*. LH. Li. Sax. Wür. *Ca. Sw.*)

℞. Salis communis pulverati,
Essent. Terebinth., sing. unc. duas.
Infunde sensim et caute
Acidi sulph. concent. unc. unam.
Mixturam destillationi in balneo aquae subjice. (B*. Li. Sax. Wür.)

Ca. et *Sw.* Acidi hydrochlorici partem unam et duas Essentiae; — LH. Acidi muriatici drachmam unam, Olei Terebinthinae unciam unam.

Die Salzſäure reagirt faſt eben ſo auf das Terpentinöl wie die Schwefelſäure. Sie bildet damit zwei verſchiedene Zuſammenſetzungen; eine, welche weniger Säure enthält, iſt der künſtliche Kampher, von dem oben die Rede war; die andere, mehr Säure enthaltende iſt, nach Houton-Labillardière's Beobachtung, flüſſig; letztere bildet die Baſis des liquor arthriticus.

Guestonian Embrocation for rheumatism (*Gr.*): Ol. Olivar., Ol. Terebinth., sing. sesquiunc., Spir. Vitriol. drachm. tres.

Lotus ad rheumatismum, Linimentum antirheumaticum. (*Sp.*)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi hydrochlor., sing.
unc. unam.
Aquae Vitae camph. uncias sex.
Misce.

Resolvens s. Fundans Richardi. (*Vm.*)

℞. Essentiae Terebinthinae,
Acidi hydrochlor. concent., sing.
part. unam.
In retortam immitte, agita saepius mixturam et post unum vel duos dies infunde
Alcoholis . . . . partes octo.
Destillent partes octo; in producto solve
Camphorae . partem dimidiam.

Balsamum ad s. contra perniones, Linimentum sulphurico-terebinthinatum. (GalH. RC. *Bo. Ra.*)

℞. Balsami Fioravanti uncias quatuor.
Acidi hydrochlor.
gutt. triginta duas.
Misce exacte.

Ra. Olei Olivarum uncias duas, Balsami Peruviani drachmam, Cetacei, Cerae albae, Acidi hydrochlor., sing. drachmas duas et Aquae purae sex.

℞. Olei Olivarum . partes quinque.
— Terebinthinae partes duas.
Acidi sulphurici partem dimidiam.
Misce. (*Ca.*)

GalH. Olei partes centum sexaginta, Essentiae sexaginta quatuor et sedecim Acidi; — RC. Olei Olivarum uncias quinque, Olei Terebinthinae duas, Acidi sesquidrachmam.

In Einreibungen Morgens und Abends auf Theile, wo Frostbeulen entstehen wollen. — Auch bei Quetschung, Verbrennung, Insectenstichen ꝛc. (RC.)

G. Präparate, welche das Terpentinöl mit Alkalien verbunden enthalten.

Sapo Starkeyanus s. Tartari s. tartareus s. chemicus pro casu externo s. Potassae terebinthinaceus s. tartareus Starkeyi, Corrector Starkeyi s. Opii, Sapo Olei volatilis Terebinthinae et Potassae s. ex Oleo Terebinthinae volatili et Potassa. (Br. Fer. Ful. Gal. Hass. His. His3. Li. LP. Sar. Wir. Wür. *Au. Fi. Gr. Pie. Re. Sp. Sw.*)

℞. Subcarb. Potassae . . . q. vis.
Calcina fortiter, massam adhuc calidam in mortarium calefactum immitte, pulvera et ei infunde, bene triturando, Terebinthinae Venetae pauxillum; addere terebinthinam per partiunculas drachmae circiter unius continua, donec absorberi cessaverit; dissolve deinde massam in Alcohole concentrato, sepone et filtra liquorem, qui tunc lente evaporet. (Ful. Li.)

Br Sar. et Wir. calcinare Subcarbonatem Potassae per horam unam vel duas, pulverare, infundere deinde guttatim Essentiae Terebinthinae q s., evitando ne aër accedat, totum deinde in cavam seponere, addere post aliquot tempus Olei calidi pauxillum et ita continuare, donec alcali absorbuerit Essentiae circiter pondus triplum.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci,
Essentiae Terebinthinae,
Terebinth. Venet., sing. part. aeq.
Tritura sal in mortario marmoreo pistilli vitrei ope, addendo primum essentiam et deinde resinam; mixturam, apta consist. acquisitâ, porphyrisa. (Gal. *Fi. Re.*)

Gr. Re. Subcarbonatem cum Oleo Terebinth. per longum tempus, Aquae pauxillum addendo, triturare.

℞. Terebinthinae comm. unc. unam.
Liqua in vase fictili et adde
Potassae caust. liq. . semunciam.
Agita subinde, donec mixtura saponis consistentiam acceperit. (His. His3.)

Pie. Potassae siccae uncias tres, Aquae duas et quatuor Essentiae Terebinthinae.

℞. Potassae causticae unciam unam.
Liquatae blandissimo igne adde
Essentiae Terebinthinae uncias tres.
Agita bene ut perfecte commisceantur. (Hass. Wür. *Sp.*)

Fer. LP. et *Sw.* Potassae partes decem et octo Essentiae.

℞. Terebinthinae . unciam unam.
Essent. Terebinthinae semunciam.
Olei Amygdalarum dulcium,
Lixivii Saponar., sing. unc. unam.
Misce. (*Au.*)

Diese Seife verdankt ihren Namen dem Vermögen, welches ihr zugeschrieben wurde, die schädlichen Eigenschaften des Opiums, der Nieswurz und andrer ähnlicher Substanzen zu verbessern. Balsamisch, reizend, eröffnend, harntreibend, krampfstillend, besonders bei Gonorrhöe und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, acht bis zwölf Gran, in einem wässerigen Vehikel oder in Pillen.

H. Präparate, welche das Terpentinöl mit Seife verbunden enthalten.

Balsamum saponaceum terebinthinatum s. vitae externum, Linimentum stimulans, Sapo terebinthinatus s. ex Oleo Terebinthinae volatili et Potassa, Spiri-

ius Saponis compositus, *Balsamum Terebinthinae*, *Balsamum Saponis*.

1) Ohne Alcohol.

℞. Saponis Veneti sicci part. sedecim.
Essent. Terebinthinae partes 32
Solutioni adde
Subcarb. Potassae liq. part. tres.
Misce bene. (BorC. Ful. Hass. Li. Wür.)

Br. Saponis, Essentiae, sing. partes viginti quatuor et unam Subcarbonatis; — B⁴. Bor. Bor4. D. Han. HassP. et Sax., Saponis, Essentiae, sing. sex et unam Subcarbonatis; — B⁶. secundum *Tueden*, Saponis octodecim, Essentiae quindecim et unam Subcarbonatis; — *Sp.* Saponis novem, Essentiae octodecim et unam Subcarbonatis; — Wür. et *Sw.* Saponis quatuor, Essentiae octo et unam Subcarbonatis.

℞. Saponis rasi . . . partes duas.
Olei Terebinthinae . partes tres.
Triturando dissolve et adde
Potassae caust. calcin.
part. unam c. dim.
dissolutae in
Aquae . . . . parte dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Saponis albi . . partes quatuor.
Camphorae . . . partem unam.
Contere, sensim addendo
Essent. Terebinthinae part. sedecim.
Solutionem serva.

2) Mit Alcohol.

℞. Saponis Medullae partes quatuor.
Terebinthinae . partem unam.
Tincturae Sodae partes quatuor.
Dissolve in balneo aquae tepido, in vase clauso et cola. (*Vm.*)

℞. Saponis albi,
Essent. Terebinthinae, sing.
part. unam.
Contere et adde
Alcoholis . . . . partes octo.
Digere in Aqua tepida, sepone per dies aliquot et soluta filtra. (Hass. Li. Wir. *Pid. Vm.*)

Solutio Saponis in Essentia, seorsim praeparata a pluribus pharmacopoeis (Hass. *Pid.*) *Corpus pro Balsamo Saponis* apellatur.

℞. Camphorae pulv. partem unam.
Alcoholis rectif. partes sedecim.
Solutioni adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Digere blando igne et adde
Essent. Terebinthinae part. unam.
Misce agitando. (DD.)

℞. Subcarb. Potassae sesquiunciam.
Aquae font. unc viginti quatuor.
Solutioni adde
Essent. Terebinthinae unc. tres.
Saponis Veneti . . uncias duas
Spiritus Juniperi . uncias duas.
Olei Cubebarum . . uncias tres.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Saponis,
Essent. Terebinth., sing.
semilibram.
Solutioni adde
Alcoholis Serpylli libras quatuor.
Ammoniaci liq. unc. duas ad octo.
Misce bene. (*Sw.*)

Sa. Saponis unciam, Essentiae semilibram, Alcoholis Serpylli uncias quinque et Ammoniaci drachmas duas ad unciam.

℞. Saponis Medullae partem unam.
Alcoholis ammoniac. part. quatuor.
Essent. Terebinthinae part. octo.
Spiritus Serpylli . . partes 64.
Solutionem filtra. (*Vm.*)

Mehrere dieser Formeln haben Aehnlichkeit mit dem Opodeldok, dem übrigens hinsichtlich der Wirkungs- und Anwendungsart der balsamus vitae externus sehr nahe steht. — Reizend, schmelzend, auflösend. — Aeußerlich bei Curationen und zur Vertreibung mancher Geschwülste.

Fomentatio resolvens. (Ful. Ham Li. *Sp.*)

℞. Balsami vitae externi part. unam.
Aquae comm. part. viginti quatuor.
Dissolve.

Balsamum Basvillianum. (B⁶. *Au.*)

℞. Essent. Terebinthinae unc. tres.
Subcarb. Potassae sesquunciam.
Saponis Alicantini rasi uncias duas.
Aquae destillatae . sesquiunciam.
Spiritus Juniperi . uncias duas.

Dieser Balsam ist kaum von dem balsamus vitae externus verschieden, besonders wenn dieser nach *Sp*'s Formel bereitet ist. Noch weniger unterscheidet er sich von dem folgenden.

Liquor nervinus Pereboomii. (B⁶. Han. *Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae partes tres.
Saponis Alicantini partes quatuor.
Contere et humecta cum
Aquae purae . partibus duabus.
Admisce sensim
Essent. Terebinthinae partes sex.
Olei Cajeput . partem unam.
Adde deinde pluribus vicibus
Aquae tepid. part. quadraginta sex.
Post plures dies filtra. (*Vm.*)

B⁶. et Han. Subcarbonatis Potassae partes tres, Saponis quatuor, Aquae quadraginta, Essentiae sex, Olei Cajeput unam et Spiritus Juniperi quatuor.

Reizend, äußerlich bei Lähmung angewendet.

Linimentum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Camphorae . scrupulum unum.
Essent. Terebinthinae drach. duas.
Solutioni adde
Saponis nigri . . unciam unam.
Unguenti nervini . semunciam.
Cumini pulverati drachmas duas.
Salis C. C. succin. gr. quindecim.

Von Home in Einreibungen bei langwierigen rheumatischen Affectionen, besonders ischias, empfohlen.

§. III. Präparate, welche den harzigen Theil des Terpentins ausschließlich oder vorzugsweise enthalten.

Der harzige Bestandtheil des Terpentins stellt sich unter verschiedenen Formen dar, welche im Allgemeinen von seiner größern oder geringern Reinheit abhängig sind und unter denen einige von verschiedenen Pharmacopöen in ihre materia medica gestellt werden. Die letztern sind:

1) *Pix s. Resina Burgundica, Pix abietina, Resina s. Pix alba, Resina Abietis humida s. alba humida, Pini Abietis Resina sponte concreta, Pix arida s. abietina:* Burgundisches, weißes Pech oder Harz; Poix blanche, Poix de Bourgogne (*Gal.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T. Va.*

Man erhält es, wenn man den gemeinen, an der Oberfläche der Einschnitte verhärteten Terpentin schmelzt und so geschmolzen durch ein Strohbett filtrirt. Auch die *Resina Pini nativa* (*Gr.*) von Pinus sylvestris gehört hierher.

2) *Resina Pini communis s. communis s. alba*; gemeines Pech, Fichtenharz; Poix résine; Résine commune (*Gal.*).

Du. Ed. HassP. *Gr. Va.*

Man bereitet es, indem man das vorhergehende schmelzen oder geschmolzenes Colophonium stark mit einem Viertel weißem Pech in Wasser kochen läßt, wodurch es seine Durchsichtigkeit verliert und eine schmuzziggelbe Farbe erhält. Es unterscheidet sich kaum vom vorigen und wird fast in allen Pharmacopöen damit verwechselt.

Abietis Resina, Resina Abietis sicca, Thus foemininum s. vulgare, Olibanum vulgare (*Gr.*), kömmt von Pinus Abies.

3) *Colophonium, Colophonia, Resina flava s. nigra s. Resina Pini fusa, Pix Graeca*; Colophonium, Geigenharz, griechisches Pech; Colophane, Arcanson, Poix sèche (*Gal.*).

Ams. B. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lus. O. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. T. Va.*

Der Rückstand, welcher nach der Destillation des gemeinen Terpentins, um ihn zu rectificiren, erhalten wird, welchen man dann schmelzen und ruhig wieder erkalten läßt.

4) *Terebinthina cocta, Resina flava s. Pini oleo volatile deprivata*; gekochter Terpentin, gelbes Harz; Térébenthine cuite (*Gal.*).

A. Bor. Bor4. Br. Du. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. O. Pal. Pol. Sax. Wir. Wür. *Br. Gr. Re. Siw*. Vm.*

Er unterscheidet sich vom Colophonium nur dadurch, daß er Wasser enthält und von dem gemeinen Pech durch die größere Menge desselben, welche in ihm enthalten ist. Man gewinnt ihn, indem man entweder das bei der Destillation des Terpentins mit Wasser, um das Oel zu bereiten, in dem Kolben Zurückbleibende sammelt oder einen Theil Terpentin mit drei oder vier Theilen Wasser kochen läßt, bis die Masse, in kaltes Wasser gegossen, einen etwas weichen Teig darstellt.

Gal. *Re.* in pilulas granorum sex, in Aqua servandas redigere. (*Pilulae de Terebinthina.*) 1—4 Stück bei Gonorrhöe, taenia ꝛc. Man kann Copaiva und Rhabarber zusetzen.

5) *Pix solida s. atra s. nigra s. navalis s. vegetabilis s. arida s. sicca, Resina Pini empyreumatica solida, Palampissa*; schwarzes Pech, Schiffspech; Poix noire (*Gal.*)

Ams. B. Ba. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Man erhält es durch abwärtsgehende Verbrennung des Stroh's, welches zum Filtriren des gemeinen Terpentin's benutzt wurde.

Es ist zum Theil durch das Feuer verändertes und mit Kohle vermischtes Harz, hat also Verwandtschaft mit dem Theer; es ist aber weit unreiner und scheint keine Essigsäure zu enthalten.

Innerlich wendet man nur den gekochten Terpentin an; er gilt als balsamisches und harntreibendes Mittel, welches, besonders bei rebellischer Gonorrhöe, Gicht und hartnäckigen Rheumatismen, zu einer halben Drachme, mehrmals täglich in Gebrauch ist.

Die übrigen Arten dienen besonders zum äußern Gebrauch.

A. Präparate, welche gekochten Terpentin enthalten.

Conditum corroborans, Marmelada adstringens. (*Sw*.*)

℞. Terebinthinae coctae unc. unam.
Misce in mortario calefacto exacte cum
Balsami Copaivae . . semuncia.
Adde deinde
Mucilag. G. Arab. . unc. unam.
Conserv. Rosar. rubr. unc. quatuor.
Gabe, zwei bis drei Drachmen, täglich drei Mal, bei veralteten Gonorrhöen.

Pilulae e Terebinthina s. diureticae roborantes s. stimulantes ad gonorrhoeam. (B*. BorC. Sar. Wir. *Au. Sp. Sw. Sy.*)

℞. Terebinthinae coctae drach. duas.
Pulveris Rhei drachmam unam.
Fiant pilulae triginta. (*Sy.*) — Gabe, vier bis sechs Stück, Morgens und Abends.

℞. Terebinthinae coctae uncias duas.
Rhei pulverati . unciam unam.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*) — Gabe, wie bei den vorhergehenden.

℞. Terebinthinae coctae,
Saponis, sing. . drachmam unam.
Pulveris Rhei . . . semunciam.
Fiant pilulae granorum duorum. (B*. BorC.) — Gabe, zehen bis funfzehen Stück, Morgens und Abends.

Au. Terebinthinae coctae, Saponis, sing. semidrachmam, Rhabarbari drachmam.

℞. Terebinthinae coctae unc. unam.
Rhei . . . . . drachmas duas.
Succini albi,
Mastichis,
Liquiritiae,
Ossis Sepiae, sing. drach. unam.
Terebinthinae Venetae . . q. s.
Fiat massa pilularis. (Sar.)

℞. Terebinthinae coct. sesquiunciam.
Succini,
Mastichis,
Olibani
Succi Liquiritiae,
Rhei,
Ossis Sepiae,
Boli Armenae, sing. drach. duas.
Fiat massa pilularis. (Wir.)

℞. Terebinthinae coct. sesquiunciam.
Boli Armenae,
Ossis Sepiae, sing. . semunciam.
Succini,
Mastichis, sing. . drachmas duas.
Rhei . . . . drachmam unam.
Syrupi balsamici quantum sufficit.
Fiat massa pilularis. (*Sp.*) — Die drei letztern Formeln sind mit Recht verlassen. — Gabe, ein Scrupel, täglich drei Mal, bei Tripper.

Pilulae adstringentes. (*Sm.*)

℞. Terebinthinae coctae,
Sanguin. Draconis, sing.
drachm. duas.
Terebinthinae clarae . . . q. s.
Fiant pilulae quatuor granorum — Gabe, drei Stück täglich, auf drei Mal, bei Gonorrhöe.

℞. Terebinth. coct. drach. quatuor.
Succini . . . . . drach. duas.
Ossis Sepiae . drachmam unam.
Resinae Guajaci scrupulos quatuor.
Balsami Copaivae quantum sufficit.
Fiant pilulae centum quinquaginta. — Gabe, zwölf Stück täglich auf drei Mal, bei Leukorrhöe und Gonorrhöe.

Pilulae balsamicae Junckeri. (B*. *Au. Sp.*)

℞. Mastichis,
Myrrhae, sing. . partem unam.
Terebinthinae coctae,
Succini flavi, sing.
part. unam c. dimid.
Jalapae pulveratae . partes tres.
Extr. Fumariae,
— Cardui benedicti,
— Absinthii,
— Cochleariae, sing. part. duas.
Fiat massa pilularis. (B*.) — Diese von Junker mitgetheilten Pillen wurden ehedem für emmenagogisch angesehen.

℞. Terebinthinae coctae semunciam.
Saponis rasi . . unciam unam.
Resinae Jalappae,
Extr. Aloës aquosi,
— Centaurii minoris,
— Gentianae, sing. drach. tres.
Fiant pilulae granorum duorum. (*Sp.*) — Man gab ehedem bis zu vierzig Stück.

Unguentum contra perniones. (*Sw.*)

℞. Terebinthinae coctae,
Butyri Cacao, sing. . unc. tres.
Liquatis simul, blando igne, adde
Balsami Peruviani semidrachmam.

Ceratum oleo-resinosum. (*Sw*.*)

℞. Cerae albae,
Terebinth. coct., sing. part. unam.
Olei Olivarum . . partes duas.
Liqua leni igne, cola et ad perfectam usque refrigerationem agita. — Zum Verbinden leichter Excoriationen von Nutzen.

Sparadrap adhaesivum. (*Gr. Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae,

Cerae albae, sing. part. aequales.
Liqua et super telam vel chartam extende. (*Vm.*)

℞. Terebinthinae coct. part. unam.
Emplastri simplicis partes tres.
Liqua et ut antea extende. (*Vm.*)

℞. Emplastri Diachyli . . libram.
Resinae flavae . uncias quatuor.
Terebinthinae comm. semunciam
(aestatis temp. drachm. duas.)
Liqua etc. (*Gr.*)

Balsamum Fourcroyi. (*Ca.*)

℞. Olei Olivarum . libras quatuor.
Pulv. Radicis Angelicae,
— — Scorzonerae,
— Hyperici,
— Bacc. Hederae, sing.
uncias duas.

Coque blandissimo igne, macera per noctem, altero mane ad ignem repone et oleo bullire incipienti adde
Theriacae,
Croci,
Extract. Juniperi, sing.
drachm. duas.
Aloës . . . . drachmam unam.

Coque, cola, per aliquot horas sepone, et ad ignem repositis adde
Terebinthinae . . uncias decem.

Coque, donec nullus terebinthinae amplius odor exhaletur; ab igne deinde remove et adde
Pulv. Olibani,
— Storacis,
— Benzoës, sing.
sesquidrachmam.

Misce, donec penitus refrixerint, per duos vel tres dies sepone ut subsideant, cola per pannum gossypinum (Serviette) et in lagena serva. — Gegen Hautriſſe, Geſchwüre, Froſtbeulen, Rheumatismen und Verrenkungen, in Einreibungen oder Umſchlägen.

B. Präparate, zu denen das eigentliche Harz kommt.

Fumigatio resinosa. (*Sm.*)

℞. Resinae communis,
Cerae flavae, sing partes aeq.

Immitte in vas fictile craticulae impositum vel supra lampadem a spiritu vini alitam.

Dieſe Räucherung hat man bei Lungenſchwindſucht empfohlen. — Bei manchen chroniſchen Catarrhen mit reichlichem eiterartigem Auswurf.

Unguentum contra tineam. (GalH. *Ca.*)

℞. Farinae Tritici . partes quinque.
Aceti . . . partes quadraginta.

Fiat pasta; adde mixturam igne liquatam et colatam de
Picis Burgundicae,
— nigrae, sing. partib. quatuor.

Misce exacte. (GalH.)

Ca. Farinae, Picis Burgundicae et nigrae, sing. partes quinque et Aceti triginta.

Auf ein Stück Leder geſtrichen auf den kranken Theil gelegt und nach zwölf Stunden wieder abgenommen.

Cera arborea, Ceratum citrinum s. nigrum s. Resinae s. Resinae flavae s. Resinae Pini s. Resinae Pini Burgundicae resinosum, Emplastrum adhaesivum s. adhaerens (ad usum artis veterinariae) s. commune attrahens s. cereum s. Cerae s. citrinum s. Cerae terebinthinatum s. Picis s. piceum s. adhaesivum s. Picis navalis s. sticticum s. simplex s. roborans, Unguentum flavum s. Resinae albae s. resinosum s. simplex. (A. Am. Ams. B. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pal. Pm. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Gr. Huf. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Resinae Pini . . partem unam.
Sevi ovilli . . . . partes duas.
Cerae flavae . . . partes tres.
Liquata simul cola. (*Vm.*)

Ed. *C. Gr.* Resinae albae (flavae) partes duas, Sebi duas et Cerae tres (*Emplastrum simplex s. cereum*); — Am. Ed. *C. Re.* Resinae albae partes quinque, Axungiae octo et Cerae flavae duas (*Unguentum s. Ceratum resinosum*); — Lon. LonN. Wür. *C. Gr. Re.* et *Sw.* Resinae flavae partem unam, Sevi et Cerae flavae, sing. tres (*Emplastrum commune s. Cerae*); — *Gr. Re. Sp.* Resinae, Cerae flavae, sing. duas (tres *Gr. Re.*) et Sevi unam (*Emplastrum attrahens*); — Du. *Gr.* Resinae albae duas, Axungiae quatuor et Cerae unam (*Unguentum Resinae albae*); — *Gr.* Axungiae part. quatuor, Resinae albae, Cerae flavae, sing. unam (*Ungt. resinosum*); — *Sw.* Resinae sedecim, Sevi unam et Cerae sex, vel Resinae sedecim, Sevi unam et Cerae decem (*Emplastrum adhaesivum s. roborans*); — Bor4. Resinae Burgundicae, Cerae flavae, sing. semilibram, Adipis suilli libras octo (*Ung. Resinae Pini Burgundicae*).

℞. Axungiae Porci . . libras octo.
Rad. Curcumae pulv. unc. duas.
Aquae . . . . uncias quatuor

Coque lente ad humidi usque consumptionem adde
Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. semilibram.

Liquefacta cola. (Bor. Sax. *Unguent. flavum.*)

℞. Resinae Pini . partes octodecim.
— Burgund. part. viginti octo.
Cerae flavae . . partes viginti.
Liqua leni igne. (*B.*)

Vm. Picis nigrae partes quatuor cum dimidia, Resinae Pini quinque et Cerae flavae sex; — Ams. Resinae Pini duodecim, Picis Burgundicae quatuordecim et Cerae decem; — Sax. Resinae Pini novem, Picis Burgundicae quatuordecim et Cerae decem. (*Empl. Picis s. piceum*).

℞. Resinae Pini . . partes quatuor.
Cerae flavae . partem dimidiam.
Terebinthinae . . . partes duas.
Liqua simul. (*Vm.*) *Unguentum simplex s. Ceratum Resinae.*

Sw. Picis Burgundicae partes triginta duas, Cerae et Terebinthinae, sing. unam (*Empl. piceum*); — *T.* Resinae uncias novem, Cerae sesquilibram, Terebinthinae uncias sex (*Empl. s. Cerat. citrin.*); — *Vm.* Resinae Pini partem unam cum dimidia, Cerae flavae tres et unam Terebinthinae (*Empl. citrinum*).

℞. Resinae Pini . . uncias sedecim.
Cerae flavae . . uncias decem.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Massae liquatae adde
Pulveris Curcumae drachmas tres.
Misce bene. (*Sp.*) (*Empl. citrinum.*)

℞. Resinae Pini,
Cerae flavae,
Picis nigrae, sing. part. duodecim.
Sevi hircini part. unam c. dimid.
Liqua et cola. (D. DD. Wür.) *Emplastrum piceum s. sticticum.*

Li. Resinae Pini, Picis Burgundicae, sing. partes sex, Cerae flavae quatuor et Sevi cervini duas (*Empl. piceum s. adhaesivum*); — Pm. Resinae Pini, Picis navalis, Terebinthinae, Colophoniae, Boli rubrae subtiliter pulv., sing. uncias tres. (*Emplastrum adhaerens ad usum artis veterinariae.*)

℞. Resinae Pini part. viginti quatuor.
— nigrae . . partes sedecim.
Cerae flavae . . . partes octo.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua simul. (Fenn. Suec.) *Emplastrum Picis.*

Vm. Resinae Pini partes sex, Picis nigrae duodecim, Cerae flavae tres et Terebinthinae unam. (*Ceratum nigrum.*)

℞. Resinae Pini . . . partes octo.
Cerae flavae . . partes quatuor.
Sevi . . . . . partes duas.
Terebinthinae . . partem unam.
Liqua et cola. (Ful. Hass. Li. *Pid.*) *Empl. citrinum s. cereum s. attrahens, Ceratum citrinum s. Resinae Pini*; — HassP. Resinae albae libram unam, Cerae citrinae duas, Sevi vervecini, Terebinthinae Venetae, sing. semilibram.

A. Bor. et Bor4. Resinae Pini partes duas, Cerae flavae quatuor, Sevi et Terebinthinae, sing. unam (*Ceratum s. Empl. citrinum*); — Han. et Sax. Resinae Pini partes duas, Cerae quatuor, Sevi unam et unam Terebinthinae (*Ceratum s. Empl. citrinum, Cera arborea*); — *Vm.* Resinae Pini partes quatuor, Cerae tres, Sevi et Terebinthinae, sing. unam (*Ceratum adhaesivum*); — *Huf.* Resinae partes sex, Cerae quatuor, Sevi duas et unam Terebinthinae (*Empl. citrinum*); — Fer. Cerae sedecim, Resinae quatuordecim, Sevi duodecim et tres Terebinthinae (*Ceratum citrinum*); — *Gr.* Lon. 1745. Ung. basil. fl. semilibram, Cerae flavae unciam (*Ceratum citrinum*): vel: Ung. Resinae fl. semilibram, Cerae flavae unciam.

℞. Resinae Pini part. viginti quatuor.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Sevi ovilli . . . . partes octo.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua et adde
Pulv. Rad. Curcumae part. unam.
Misce bene. (Bor. Br. O. Pal. R. Wir. Wür.) *Empl. s. Ceratum citrinum.*

℞. Picis navalis,
Resinae Pini,
Sevi ovilli,
Terebinthinae, sing. partes duas.
Cerae flavae . . . partes tres.
Liqua simul. (B*.) *Empl. Picis navalis s. sticticum Hamburgense.*

℞. Olei Olivarum.
Terebinthinae,
Resinae Pini, sing. . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Cera et resina in oleo ignis ope solutis et percolatis, terebinthinam affunde. (Pm.)

℞. Cerae flavae . . . libram unam.
Resinae Pini . . . semilibram.
Sevi ovilli . . . uncias quatuor.
Olei Olivarum,
Terebinthinae, sing. uncias duas.
Rad. Curcumae pulv. drach. duas.
Liqua et cola. (Fenn.) *Empl. Cerae terebinthinatum s. citrinum.*

Einige dieser Formeln haben viel Aehnlichkeit mit der Basilicumsalbe, entweder in Ansehung der Beschaffenheit und der Zahl der Bestandtheile oder in Ansehung der verhältnißmäßigen Menge derselben zu einander.

Emplastrum Flos Unguentorum dictum. (*Gr.*)

℞. Resinae flavae,

Terebinthinae communis,
Cerae flavae,
Sevi ovilli, sing. . . semilibram.
Olibani . . . . uncias quatuor.
Terebinthinae Chiae
uncias duas c. dimidia.
Myrrhae,
Mastichis, sing. . unciam unam.
Camphorae . . drachmas duas.
Vini albi . . . . sesquilibram.
Coque ad consistentiam emplastri.

Praeterea: Resinae flavae libras sedecim, Cerae flavae, Sevi, sing. sex, Picis Burgundicae duas. — Eitermachend, wärmend.

Emplastrum Picis compositum, Unguentum Abbatiae du Bec. (Lon. LonN. *C. Ca. Gr. Re. Vm.*)

℞. Resinae Burgundicae libras duas.
Olibani (Resin. Abiet. *Re.*)
librain unam.
Resinae Pini,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.
Olei Nucis mosch. unciam unam.
Liqua picem, ceram et resinam et adde olibanum, tunc oleum. (Lon. *C. Gr. Re.*)

Vm. Picis Burgundicae partes quatuor, Resinae Pini, Picis nigrae, sing. duodecim, Cerae flavae quatuor et Olei Nucis mosch. unam; — *Ca.* Axungiae, Picis Burgundicae, sing. libram unam, Cerae flavae uncias decem, Resinae Pini, Picis navalis, sing. quinque et Olibani drachmas decem; — LonN. *Gr.* Picis libras duas, Abiet. Resinae unam, Resinae flavae, Cerae flavae, sing. uncias quatuor, Olei Myristicae expr. unam, Olei Olivarum, Aquae, sing. fluid. uncias duas, coquendo obtinetur; — *Gr.* Picis Burgund. libras sex, Cerae flavae tres, Resinae flavae octo, Axungiae Porci septem, Terebinthinae comm., Olei Palmae, Olei Lini, sing. unam. (Röthend, reizend, bei Kopfweh auf die Schläfe oder Stirn.)

Emplastrum defensivum viride. (Br. Wir.)

℞. Cerae flavae . . libram unam.
Resinae Pini . . . uncias duas.
Sevi hircini . . . . uncias sex.
Terebinthinae . . unciam unam.
Pulv. Herb. Leontopodii unc. sex.
Misce — Addere potes, ut colorem magis saturatum obtineas, libras cuique Indigo pulverati scrupulum unum.

Br. Leontopodio Rutam substituit.

Emplastrum contra rachitidem. (B*.)

℞. Resinae Pini . . unciam unam.
Cerae flavae . . . semunciam.
Olei empyr. Tartari drach. unam.
Liqua simul — Man will dieſes Pflaſter bei Rachitis der Kinder mit Erfolg gebraucht haben; es wird auf das Rückgrat gelegt.

Sparadrap resinosum. (*Vm.*)

℞. Resinae Pini
Terebinthinae, sing. part. unam.
Cerae albae . . partes quatuor.
Liqua simul et supra pannum e tela vel chartam extende.

Emplastrum Andreae a s. de Cruce s. Resinarum glutinans s. Picis et Resinae. (GalM. His. His3. *Ca. Re. Vm.*)

℞. Picis albae . . . partes octo.
Elemi . . . . . partes duas.
Terebinthinae,
Olei laurini, sing. partem unam.
Liqua et cola. (GalM *Ca. Re. Vm.*)

His. His3. Picis partes sedecim, Elemi quinque, Terebinthinae, Olei Olivarum, sing. duas et Cerae albae unam.

Emplastrum maturans. (*Sw.*)

℞. Resinae Pini . . . semilibram.
Emplastr. de Gummi-Resinis
libram unam.
Liqua simul.

Balsamum Terebinth. vulgare. (*Gr.*): Resinae nigrae, Ol. Terebinth., sing. part. aeq.

Unguentum basilicum s. tetrapharmacum s. Picis s. Picis empyreumaticum s. piceum compositum s. regium s. Terebinthinae resinosum s. Picis et Cerae s. Terebinthinae et Picis.

1) *Unguentum basilicum flavum s. pallidum, Unguentum Resinae flavae, Ceratum Resinae s. citrinum s. Resinae flavae, Unguentum emolliens s. aureum s. citrinum.* (Ams. Bor. Bor4 D. DD. Fenn. Ful. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. LP Lus. O. Pol. R. Sar. Sax. Suec. Wir. *Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Colophonii,
Cerae flavae, sing. partem unam.
Olei Olivarum . . partes tres.
Liqua simul. (Ams.)

Lus. Trium substantiarum part. aeq.; — LH. Resinae flavae, Cerae flavae et Olei part. aeq.; — LP. Resinae flavae et Olei, sing. libras quatuor, Cerae flavae tres; — Lon. LonN. *Gr. Re.* Resinae flavae, Cerae flavae, sing. libram unam et Olei octarium unum. (*Ung. Resinae flavae et Ceratum Resinae*); — *Gr.* sec. Lon.

ante 1745. Resin. fl. semilibram, Sevi ovill. unc. quatuor, Terebinth. Arg. duas (*Cerat. citrinum.*)

℞. Olei Palmae,
— Lini. sing. . . libras duas.
Cerae flavae . . . semilibram
Resinae flavae . . sesquiunciam.

Liqua lente. (Ams.) *Unguentum emolliens.*

℞. Colophonii,
Cerae flavae, sing. partem unam.
Axungiae Porci,
Olei Olivarum, sing. part. quatuor.

Liquefac blando igne. (Ful.)

Sw. Colophonii, Cerae, sing. partem unam, Axungiae et Olei, sing. sex.

℞. Colophonii,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Sevi hircini, sing. . partes duas.
Olei Olivarum . . partes tres.

Liqua simul et cola. (His. His3.)

Sw. et *Vm.* Quatuor priorum substantiarum partem unam et Olei duas.

℞. Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae, sing. part. unam.
Olei Napi . . . partes duas.

Liqua lente et cola. (DD.)

℞. Olei Olivarum . libras quatuor.
Seminum Foenu graeci
uncias quatuor.

Infunde leni calore per horas 24; per linteum trajectae colaturae adde
Cerae flavae . uncias quindecim.
Resinae Pini . . . uncias sex.
Terebinthinae purae uncias duas.

Modico igne liqua, iterum cola et identidem agita donec frigescat. (*Unguentum cum Cera, Terebinthina et Resina Pini ad usum artis veterinariae* loco ung. de alth. Pm.)

℞. Colophonii,
Cerae flavae,
Sevi ovilli, sing. partem unam.
Axungiae Porci . . partes tres.

Liqua et adde, ab igne removendo,
Terebinthinae partem dimidiam.

Misce bene. (Bor. D. Han. Hass. O. Pol. Sax.)

Bor4. HassP. loco axungiae Oleum Olivarum: — R. Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, sing. partem unam et quatuor Axungiae; — Fenn. et Suec Colophonii, Cerae, Sevi, Terebinthinae, sing. tres et Olei duodecim; — Li. Resinae Pini, Cerae, Sevi, Terebinthinae, sing. unam et quinque Olei; — Gen. Colophonii, Picis Burgundicae, Cerae flavae, sing. partes duodecim, Terebinthinae tres et Olei Olivarum quatuordecim; — *Gr.* Ol. Olivar., Cerae flav., Resinae fl., Picis Burgund., sing. libram unam, Terebinth. comm. unc. tres.

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Terebinthinae . . libram unam.
Cerae flavae,
Colophonii, sing. uncias septem.
Mastichis,
Olibani, singulorum uncias duas.
Croci . . . . drachmas duas.

Liqua ceram, colophonium, mastichem, terebinthinam in oleo et mixturae semirefrigeratae adde olibanum et crocum pulverata. (Sar.)

Wir. Olei libras duas cum dimidia, Cerae flavae semilibram, Terebinthinae uncias duas, Colophonii, Resinae Pini, sing. semunciam, Mastichis, Olibani, sing. et Croci drachmam.

2) *Unguentum basilicum nigrum s. Picis nigrae s. Resinae nigrae.* (Ams. Au. B. Ba. Bel. Br. Gal. GalM. HassP. His. His3. Lon. LonN. Pal. Sar. Wir. *Br. Gr. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Picis nigrae,
Colophonii,
Cerae flavae, sing. partem unam.
Olei Olivarum . partes quatuor.

Liqua simul picem et colophonium, adde ceram et oleum et per linteum trajice. (Ams. B. Ba. Bel. Gal. GalM. Sar. *Re. Sp.*)

Lon. LonN. *Gr. Re.* Picis, Colophonii, Cerae, sing. uncias novem, et Olei octarium unum. — Praecip. rub. drachma hujus ung. unciae bene additur. (*Re.*)

℞. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Axungiae Porci, sing. part. unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Liqua simul (*Au. Sw*. Vm.*)

His. His3. Quatuor priorum substantiarum (loco tamen axungiae Sebum hircinum) partes duas et Olei tres.

℞. Picis nigrae,
Resinae Pini,
Cerae flavae,
Terebinthinae, sing. part. unam.
Olei Olivarum . . partes octo.

Liqua simul. (*Br.*)

Br. praeterea: Picis nigrae, Colophonii, Terebinthinae et Olei, sing. part. aeq.; — *Fi.* Quatuor priorum substantiarum et Sevi ovilli, sing. partem unam, Olei duas.

℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini,
Colophonii,
Picis nigrae,
Terebinthinae, sing. . unc. tres.
Olei Olivarum . libram unam.

Liqua et adde
Pulveris Olibani . sesquiunciam.
Misce bene. (Br. HassP. Wir.)

Sw. Picis nigrae, Colophonii, Cerae flavae, sing. semilibram, Olei sesquilibram, Terebinthinae uncias tres et Olibani unam.

℞. Cerae flavae . . uncias duas.
Croci . . . . scrupulos duos.
Mastichis,
Myrrhae,
Picis navalis,
Sevi,
Olibani, sing. . drachmas duas.
Colophonii,
Terebinthinae, sing. semunciam.
Olei Olivarum . . uncias tres.
Fiat unguentum. (Pal.)

Unguentum fuscum. (Br. Wir.)

℞. Olei communis . sesquilibram.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Colophonii,
Picis navalis, sing. uncias duas.
Mastichis,
Terebinthinae, sing. unc. unam.
Liqua et colaturae refrigeratae adde
Pulv. Galbani,
— Sagapeni,
— Olibani, sing. . unc. unam.
— Aristoloch. rotund. semunciam.
Misce sedulo.

Cataplasma suppurativum. (*Va.* Hôt. D.)

℞. Unguenti basilici unc. dimid. ad unam.
Cataplasm. emoll. libram unam.
Zur Beförderung der Eiterung in entzündlichen Geschwülsten.

Linimentum resinoso-terebinthinatum (RC.): Ung. resinosi, Ol. Terebinth., sing. part. aeq.

Linimentum ammoniato-terebinthinatum (RC.): Ol. Olivar. part. quatuor, Ol. Terebinth., Aquae font., Ammon. liq., sing. unam. Interdum additur Solutionis Saponis aequa portio et Tinct. Canthar. part. duae. — Bei Lähmung, rheumatischen und Gelenkschmerzen.

Emplastrum adhaesivum s. adhaerens s. simplex agglutinans s. glutinans Lithargyri s. Protoxydi Plumbi s. Oxydi Plumbi semivitrei cum Resina s. cum Resina Pini s. resinosum s. commune s. cum Resina s. Resinae s. polychrestum s. commune adhaesivum s. commune cum Resina s. simplex s. lithargyricum cum Resina Pini s. Oxydi Plumbimucilagineum compositum s. Diachylum magnum, Ceratum resinosum. (Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. His. His3. Lon. LonN. LP. Lus. Pm. Pol. RC. Sax Suec. WW. *Au. Br. C. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Olei Olivarum libras septuaginta novem.
Lithargyri libr. quadraginta sex et unc. octo.
Resinae flavae . libras sedecim.
Fiat emplastrum. (*Gr.*)

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Lithargyri . . . libram unam.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Coque lente, continue agitando et subinde Aquae pauxillum affundendo, ad consistentiam emplastri; adde deinde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Terebinthinae comm. uncias duas.
Misce bene. (Fenn. Suec.)

Ba. coquere Lithargyri partes octo in Axungiae duodecim et addere Resinae P.ni partes sex et Picis nigrae tres.

℞. Emplastri simplicis . partes sex.
Liqua blando calore et adde
Picis albae (Resinae flavae Du. Lon. *Gr. Re.*) partem unam.
Misce exacte. (Ams. B. Bel. Du. Gal. Gen. Lon. LonN. Lus. *Gr. Re. Vm.*)

Br. Emplastri partes octo et unam Resinae; — Am. Ed. RC. *C. Gr.* Emplastri quinque et Resinae unam; — R. Wir. et *Sp.* Emplastri duas et unam Resinae: — *Gr. Re.* Diachyli simpl. libram, Resinae flavae drachmas sex (*Baynton's adhesive plaster*); — Bor4. Emplastri Lithargyri simpl. partes duas, Terebinthinae coctae unam, liqua et misce; — Du. Emplastri partes septem et unam Terebinthinae coctae; — *Vm.* Emplastri quinque et Terebinthinae coctae unam; — Fer. Emplastri simpl. sex, Emplastri Cerussae unam et Resinae Pini tantidem; — *Fi.* Cerati Diapalmae libram, Cerati Cerussae, Resinae Pini, Terebinthinae, sing. uncias duas; — *Au.* Emplastri Picis et Colophonii, sing. partes aeq.; — Pm. Emplastri simpl. uncias quatuor, Picis Burgund. unam, massam s. a. liquatam in magdaleones conforma

℞. Emplastri simpl. . . partes 24.
Picis Burgundicae . partes sex.
Terebinthinae . partem unam.
Liqua. (Hass.)

Bor. Han. Pol. et *Vm.* Emplastri partes viginti quatuor, Picis duodecim et unam Terebinthinae; — HassP. Terebinthinae partem dimidiam, caeterum ut Bor.; — LP. Emplastri simpl. libras tres, Resinae flavae semi-

libram, Terebinthinae optimae uncias tres; — *Sw.* Emplastri sedecim, Picis quatuor et unam Terebinthinae; — Sax Emplastri duodecim, Picis sex et unam Terebinthinae; — Ful. Emplastri quatuor, Resinae sedecim et quatuor Terebinthinae; — *Pid.* Emplastri sex, Resinae duodecim et Terebinthinae quatuor; — LH. Emplastri libras duas, Resinae Pini semilibram, Terebinthinae sesquiunciam; — *Re.* Emplastri Lithargyri vel Diachyli libram, Resinae flavae uncias quatuor, Terebinthinae semunciam.

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Resinae Pini . . libram unam.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Liqua. (WW.)

℞. Emplastri simpl. . . partes 38.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Liqua et adde
Terebinthinae . . . partes tres.
Axungiae Porci . partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis sesquilibram.
Unguenti Althaeae,
Olei Olivarum, sing. uncias sex.
Terebinthinae . . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Misce bene. (Br.)

℞. Emplastri simplicis . libras sex.
Ichthyocollae in Aquae Vitae unciis duabus dissolutae semunciam.
Oesypi . . . . uncias quatuor.
Resinae Pini,
Cerae flavae, sing. uncias quatuor.
Terebinthinae . . . semilibram.

Liqua simul resinam, ceram et terebinthinam, adde emplastrum liquatum, tunc oesypum cum ichthyocolla tritum et ad humidi totius evaporationem calefac. (His. His3.)

Unguentum Lithargyri resinosum martiale s. agglutinans martiale. (Sax.)

℞. Colophonii . . . . partes sex.
Terebinthinae . partes quatuor.
Liqua et adde
Pulveris Mastichis . partes duas.
Croci Martis . . partem unam.
Malaxa cum
Emplastri simpl. partib. duodecim.

Unguentum ad fistulas equorum (*Gr. Re.*): Ung. basil. flavi uncias quatuor, Olei Tereb. unam, Aeruginis semunciam.

Emplastrum roborans s. stypticum. (Ful.)

℞. Emplastri adhaes. (Ful.) unc. duas.
Liqua et adde
Camphorae pulveratae,
Olei essent. Carvi, sing. drach. unam.
Misce sedulo.

Teucrium.

Von dieser Pflanzengattung findet man:

1) *Teucrium Chamaedrys, L.*; Gamander, Gamanderlein; Germandrée commune, petit Chêne (*Gal.*); Garmander (*Ang.*); Kamanderle, Ozanka mensij (*B.*); Camedrio (*His.*); Camedrios, Herva Carvalhinha (*Lus.*); Gamanderlyn (*Bel.*); Camedrio, Erba Querciola, Calamandrina (*I.*); Ozanka (*Pol.*); Ekegraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. BorC. Br. Du. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. LH. Li. LP. Lus. Pm. R. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp.* Z.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Pflanze des gemäßigten und südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 180. *Plenck* t. 477. *Hayne* VIII. 4. Fl. méd. III. 188.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Chamaedryos s. Trissaginis s. Querculae minoris) an; es besteht aus einem viereckigen, dünnen, behaarten Stängel mit entgegengesetzten, gestielten, eirunden, glatten, oben graugrünen, unten blässern, tiefgekerbten Blättern und 2 oder 3 purpurrothen, kurzgestielten, in den Achseln der obern Blätter entspringenden Blüthen. Es hat einen sehr schwachen, gewürzhaften Geruch, welcher sich durch Trocknen verliert, und einen mäßig bittern, etwas styptischen Geschmack.

Reizend.

2) *Teucrium flavum, L.*; Gelber Gamander; Germandrée jaune (*Gal.*); Yellow flowered shrubby garmander (*Ang.*).

His. His3. *Gr.*

♄ Eine Pflanze Spanien's und Italien's. (*Lob.* Icon. 490. 1.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Teucrii flavi) an: es besteht aus einem behaarten Stängel mit eirunden, unten gekerbten, an der Spitze ganzen Blättern und gelben, seitenständige Trauben bildenden Blüthen. Es hat einen bittern Geschmack.

Reizend.

Extractum Chamaedryos. (Gal. GalM. Pm Sar.)

℞. Summit. Chamaedryos . q. vis.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Infunde, cola et blando igne ad extracti consistentiam consume. (Gal. GalM.)

Pm. Summitat. libram unam, Aquae ferv. duodecim, infunde per horas sex, cola et valde exprime, liquorem decantha et ad libras quatuor evaporatum, Albumine clarificatum et per pannum trajectum balnei maris ope ad extracti consist. redige.

℞. Herb. Chamaedryos rec. contus. libr. octo.

Macera per tres dies in alembico et destillatione uncias circiter duas aquae abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et post sex horas digestionis coquendo ad tertiae partis remanentiam consume, clarifica liquorem et cola; tunc ad electuarii consist. evaporato tepido solum aquam destillatam adde. (Sar.)

Decoctum Chamaedrys s. Chamaedryos amarum. (His. His3.)

℞. Summit. Chamaedryos semunciam.
— Absinthii,
— Centaurii min., sing. drach. duas.
Aquae purae . . . libras duas.
Decoque ad dimidii remanentiam et sub finem adde
Flor. Chamomillae drach. duas.
Foliorum Sennae sesquiunciam.

Man läßt oft die Senna, durch welche die sonst bittere und tonische Abkochung laxirend wird, weg. — Gabe, vier bis sechs Unzen.

Infusum Chamaedryos. (Gal. GalM. *Sp.*)

℞. Herbae Chamaedryos unc. unam.
Aquae bullientis octarium unum.
Infunde. (GalM. *ParC.*)

℞. Fol. rec. Chamaedryos unc. unam.
Aquae bullientis . libras duas
Infunde et colaturae adde
Syr. Capilli Ven. aut Mellis unc. unam.
Misce. (Gal.)

3) *Teucrium Chamaepitys*, *L.*; Schlagkraut, Feldcypresse, Erdweihrauch; Ivette commune (*Gal.*); Ground pine (*Ang.*); Ywa, Polnj cypris (*B.*); Camepiteos, Pinillo oloroso (*His.*); Veldcypress (*Bel.*); Camepizio (*I.*); Iwinka, Piznowa (*Pol.*); Chamepite (*Lus.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. Fer. Ful. Gal. Gen. His. His3. Li. Pm. R. Sax. Wir. Wür. *Be. br. G. Gr. M. Sp. Z.*

⊙ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 528. *Plenck* t. 475. *Hayne* VIII. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 120.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Chamaepityos s. Ivae arthriticae s. Chamaemori) an; es besteht aus einem ästigen, behaarten Stängel mit bis über die Hälfte in drei linienförmige Lappen getheilten Blättern und einzelnen, gelben, stiellosen, in den Achseln der obern Blätter sitzenden Blüthen. Es hat einen harzigen und schwach balsamischen Geruch, welcher sich bei'm Trocknen verliert. Der Geschmack ist scharf, bitter und styptisch.

Tonisch, magenstärkend.

4) *Teucrium Iva*, *L.*; Bisamginsel; Ivette musquée (*Gal.*).

Gal.

⊙ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Cav.* II. t. 120.)

Man wendet das Kraut (herba Ivae s. Chamaepityos Monspeliacae) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit ganzen, bloß an der Spitze mit zwei Zähnen versehenen Blättern. Es hat einen starken, harzigen, etwas moschusartigen Geruch, besonders bei großer Hitze, und einen bittern Geschmack.

Extractum Ivae. (Sar.)

℞. Herbae Ivae (arthriticae) recentis et contusae . . . libras octo.

Digere per tres dies in alembico, tunc destillationis in balneo aquae ope aquae uncias duas abstrahe; residuo infunde Aquae triplum et coctione ad tertiae partis remanentiam consume, clarifica et cola liquorem, cui ad electuarii consistentiam evaporato et nonnisi tepido aquam adde.

5) *Teucrium Marum*, *L.*; Amberkraut, Katzenkraut; Marum (*Gal. Lus.*); Lathymo (*Ca.*); Kocicj korenj (*B.*); Maro contuso (*His.*); Maro, Erba gatta (*I.*); Ambrowe ziele (*Pol.*); Katgraes (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. Han Hass. HassP. His. Li. LP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ Eine Pflanze, welche im südlichen Europa und in der Levante wächst. (*Blackw.* t. 47. *Plenck* t. 474. *Hayne* VIII. 2. *Zorn* Ic. pl. t. 60.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Mari veri s. Syriaci) an; es besteht aus dünnen, filzigen Aesten mit kleinen, eirundlanzettigen, gestielten, oben graulichgrünen, unten weißfilzigen Blättern und purpurrothen, einzeln in den Achseln der obern Blätter, aber genähert stehenden und so eine lange, nach einer Seite gewendete Traube bildenden Blüthen. Es hat einen sehr gewürzhaften und durchdringenden Geruch und einen brennenden, scharfen, gewürzhaften, etwas bittern Geschmack

Reizend, Ausdünstung befördernd, harn-

treibend, emmenagogiſch, Bruſt- und Niesmittel. — In Pulver, zehen bis dreißig Gran.

Tinctura Mari veri aetherea. (B*. O.)

℞. Herbae Mari,
Liquoris anod. min., sing. uno. unam.
Alcoholis concentrati uncias tres.
Digera per dies quatuor temperatura depressa in vase tecto, saepius agitando et filtra. — Reizend, bei Lähmungen gerühmt und da anwendbar, wo der Aufguß der Pflanze Ekel erregt. — Gabe, vierzig Tropfen.

Aqua vulneraria s. styptica Clementina s. aromatica composita cum Acido acetico, Aqua del carcerato di Roma. (Fer. *Fi.*)

℞. Succi Majoranae,
— Saniculae,
— Verbenae,
— Sedi majoris,
— Pimpinellae albae,
— Millefolii,
— Bryoniae, sing. uncias tres.
Mari . . . . uncias quatuor.
Salis culinaris,
Subcarb. Potassae, sing. uno. sex.
Cremoris Tartari uncias quatuor.
Aloës . . . . . sesquiunciam.
Aceti . . . . . libram unam.
Post horas 24 digestionis destillent ad siccum, residuum pulveratum producto adde, novae destillationi subjice et sic ter repete.

Fi. Succi Saniculae, Verbenae, Betonicae, Sedi majoris, Millefolii, sing. uncias septem, Mari, Serpylli, sing. tres, Cremoris quatuor, Aloës unam, Aceti libram; productum tribus destillationibus obtentum per Pulverem Carbonis recens paratum filtra.

Gabe, bis zu einer halben Unze.

6) *Teucrium Creticum, L.*; Cretiſcher Gamander; Polium de Crète (*Gal.*).

Gal. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

4 Eine Pflanze Creta's und Aegypten's. (*Alp.* Exot. p. 103 t. 102.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et summitates Teucrii s. Polii Cretici s. Rorismarini stoechadis facie) an; es beſteht aus einem vierkantigen Stängel mit ſitzenden, ganzen, lanzettförmigen Blättern und violetten, geſtielten, je zu drei in achſelſtändige Trauben vereinigten Blüthen. Es hat einen ſtarken, gewürzhaften, angenehmen Geruch und einen ſehr bittern Geſchmack.

7) *Teucrium montanum, L.*; Bergpolei; Polium de montagne (*Gal.*).

Gal. *Gr. Re.*

4 Eine Pflanze des ſüdlichen Europa's. (*Zorn* Ic. pl. t. 362.)

Man wendet die Spitzen (summitates Polii montani) an; ſie beſtehen aus weißlichfilzigen Zweigen mit lanzettförmigen, ganzen, an den Rändern eingerollten, unten filzigen Blättern und weißlichen oder gelblichen, faſt ſitzenden Blüthen, welche faſt eine endſtändige rundliche Traube bilden. Sie haben einen ſehr angenehmen Geruch und einen bittern Geſchmack.

8) *Teucrium Scordium, L.*; Knoblauchsgamander, Scordienkraut, Lachenknoblauch; Germandrée d'eau (*Gal.*); Watergamander (*Ang.*); Plany neb wodnj cesnek (*B.*); Scordio, Erba d'odor d'aglio (*I.*); Laegsurt (*D.*); Scordio (*His.*); Waterbock (*Bel.*); Czosnkowe ziele (*Pol.*); Escordio, Scordio (*Lus.*); Gamander (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor‡. Br. D. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Sp. Z.*

4 Eine in ganz Europa wachſende Pflanze. (*Blackw.* t. 475. *Bull.* t. 205. *Plenck* t. 476. *Hayne* VIII. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 36.)

Man wendet das Kraut (herba Scordii s. Chamaedrys aquaticae) an; es beſteht aus einem behaarten, äſtigen Stängel und eirunden, länglichen, ſitzenden, gekerbten oder gezähnten Blättern. Gerieben hat es einen knoblauchartigen und balſamiſchen Geruch, welcher nach dem Trocknen weniger merklich iſt und einen bittern, ſcharfen und etwas ſtyptiſchen Geſchmack.

9) *Teucrium Scorodonia, L.*; falſches Scordienkraut; Scordium faux (*Gal.*).

Gal. Wir. *G. Gr.*

4 Eine Europäiſche Pflanze. (*Bull.* Herb. t. 301.)

Man wendet das Kraut (herba Scorodoniae s. Salviae sylvestris s. agrestis) an; es beſteht aus geſtielten, herzförmigen, gezähnten und gerunzelten Blättern.

Reizend, toniſch, Ausdünſtung befördernd.

Conserva Scordii. (His. His3.)

℞. Fol. rec. Scordii . part. unam.
Contunde in mortario marmoreo, cum pistillo ligneo, addendo sensim
Sacchari pulverati . partes duas.

Extractum Scordii. (Br. Pal. Sar. Wir.)

℞. Herbae Scordii . libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad aptam consist. consume. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . libras octo.
Digere per tres dies in alembico, destillando deinde uncias circiter duas abstrahe, residuo triplum Aquae infunde, coquendo partes duas consume, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consist. consume et huic nonnisi tepido Aquam dest. adde. (Sar.)
Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Aqua Scordii. (Br. Gal. Pal. Sar. *Gr.*)

℞. Herb. Scordii floresc. part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars et denuo supra novam herbam destilletur. (Sar.)

Gal. Herbae partes quinque et Aquae viginti; destillent partes decem; — Br. Herbae partem unam et Aquae tres; destillet dimidia pars; — Pal. Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium; — *Gr.* parationem non indicat.
Gabe, eine bis drei Unzen.

Syrupus Scordii s. de Scordio. (Gal. His3. Wir. *Fi.*)

℞. Herbae Scordii uncias quatuor.
Aquae bullientis . libram unam.
Infunde per noctem; exprime deinde, clarifica et in novem unciis colaturae solve
Sacchari albi . uncias sedecim.
Fiat syrupus. (Wir.)

His3. Herbae siccatae uncias duas, Aquae libras duas, infunde, colaturae adde Sacchari clarificati et ad soliditatem cocti libras quatuor, syrupum cola.

℞. Herb. sicc. Scordii . unc. unam.
Aquae dest. Scordii libras duas.
Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto, cola, filtra et colaturae adde
Sacchari albi . . . . duplum.
Liqua in balneo aquae et cola per pannum. (Gal. *Fi*)
Gabe, eine halbe bis eine ganze Unze.

Infusio anthelmintico-incitans, Infusum vermifugum. (*B.*)

℞. Foliorum Scordii . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae octo infusi obtineantur. Colaturae adde
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Löffelweise.

Mixtura anthelmintico-incitans, Potio vermifuga. (*B.*)

℞. Helmintochortos drachmas duas.
Foliorum Scordii . semunciam.
Aquae . . . . quantum sufficit ut unciae decem infusi obtineantur; colaturae adde
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Syrupi Cinnamomi . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

Decoctum antisepticum. (*Ca.*)

℞. Fol. Scordii,
— Alliariae,
— Marrubii albi, sing. unc. duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Coque et adde
Oxymellis scillitici . semilibram.
Aceti theriacalis . unciam unam.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Reizend, bei fauligen Krankheiten mit beschwerlicher Expectoration empfohlen.

Fomentum aromaticum. (*Au.*)

℞. Herbae Scordii,
Flor. Chamomillae, sing. unc. unam.
Aquae bullientis . . libras tres.
Coque parumper et adde colaturae
Aquae Vitae camph. unc. quatuor.

Tinctura s. Essentia Scordii. (Br. Pal. Wir.)

℞. Herbae Scordii . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Post tres dies digestionis colaturam infunde in
Herbae Scordii . uncias duas.
Macera denuo per aliquot tempus, exprime et filtra. (Pal. Wir.)
Br. digerere Scordii unciam unam in Alcoholis concentrati quatuor.
Reizend, für giftwidrig und Ausdünstung befördernd gehalten. — Gabe, sechszig Tropfen.

Essentia alexipharmaca Stahlii. (Br. Li. Pal. Wir. *Ca. Sp.*)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
— Vincetoxici,
— Carlinae, sing. sesquiunciam.
— Angelicae,
— Imperatoriae,
— Inulae, sing. unciam unam.
Herbae Scordii . . uncias tres.
Alcoholis libras duas cum dimidia.
Digere, exprime et filtra. (Br. Wir.)
Pal. et *Sp.* Pimpinellae sesquiunciam, Vincetoxici tantidem, Carlinae semunciam, Angelicae, Imperatoriae, Inulae, sing. unciam; sed *Sp.* Scordii uncias sex et Alcoholis libras duas, Pal. scordium omittens, Alcoholis libram unam indicat.
Die Formel von *Ca.* ist verstümmelt und wird daher nicht besonders angeführt.
℞. Rad. Angelicae,
— Imperatoriae,
— Inulae, sing. , semunciam.

Rad. Carlinae . drachmas duas.
— Vincetoxici,
— Pimpinellae alb., sing. drach. tres.
Herbae Scordii . . uncias duas.
Alcoholis . . . libram unam.
Post duos dies digestionis, blando calore, cola exprimendo.

Reizend, tonisch, magenstärkend, blähungtreibend, harntreibend und Ausdünstung befördernd. — Gabe, vierzig bis fünfzig Tropfen.

Essentia alexipharmaca temperata Stahlii. (Wir. *Sp.*)

℞. Rad. Pimpinellae albae,
— Vincetoxici, sing. unc. tres.
Herbae Scordii . uncias duas.
Alcoholis . . . libras tres.
Post sufficientem extractionem filtra, spiritus trientem destillando in balneo aquae abstrahe et reliquum serva. (Wir.)

℞. Tinct. Pimpinellae albae,
— Vincetoxici, sing. unc. unam.
— Scordii . . uncias duas.
Misce. (*Sp.*)

Reizend, weniger kräftig als das vorhergehende. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Essentia de Scordio composita, Diascordium liquidum, Tinctura Scordii composita. (Sax. Wir. *Vm.*)

℞. Herbae Scordii . . uncias duas.
Corticis Citri . unciam unam.
Myrrhae electae,
Rad. Gentianae, sing. drach. sex.
— Angelicae,
— Vincetoxici,
— Levistici,
— Zedoariae,
— Contrayervae,
— Tormentillae,
— Valerianae, sing. semunciam.
Succini,
Ligni Aloës, sing. drachmas tres.
Croci drachmas duas cum dimidia.
Florum Sambuci drachmas duas.
Opii . . . . drachmam unam.
Fiat e toto pulvis, cui infunde
Spiritus Juniperi . . libras tres.
Digere blando calore, in vase clauso, et filtra. (Wir.)

℞. Herb. sicc. Scordii part. unam.
— Cardui bened. part. dimidiam.
Rad. Angelicae partis quadrantem.
Alcoholis . . . . partes octo.
Post dies octo digestionis in vase tecto, cola exprimendo et filtra. (Sax.)

℞. Foliorum Scordii partes quatuor.
Foliorum Cardui benedicti partes duas.
Radicis recentis Angelicae partem unam.
Aquae Vitae partes triginta duas.
Infunde frigide per plures dies, cola exprimendo et filtra. (*Vm.*)

Reizend, giftwidrig, schmerzstillend und magenstärkend. — Eine Unze enthält etwa zwei Gran Opium.

Elixir balsamicum spirituosum Hoffmanni. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Herbae Scordii . unciam unam.
— Centaurii minoris,
Corticis Aurantiorum,
Myrrhae electae,
singulorum sesquiunciam.
Radicis Zedoariae,
Nucis moschatae,
singulorum drachmas tres.
Ligni Aloës . sesquidrachmam.
Croci . . . drachmam unam.
Succini . . . . drachmas tres.
Alcoholis . . . . sesquilibram.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo, filtra liquorem et adde
Olei Cardamomi,
— Caryophyllorum,
singulorum guttas decem, dissolutas in
Alcoholis ammoniacalis uncia una.

Reizend, ehedem als giftwidrig, anticatarrhalisch, magenstärkend gerühmt und besonders von Hoffmann bei chronischen Diarrhöen empfohlen. — Gabe, sechszig Tropfen, täglich zwei Mal.

Species e Scordio sine Opio (*Gr.*): Boli Arm. s. Gall. uncias quatuor, Scordii duas, Cinnamomi sesquiunciam, Styracis Calam. col., Rad. Torment., Bistort., Gentian., Fol. Dictam. Cret., Galb. colat., Gummi Arab., Rosar. rubr., sing. unciam, Pip. longi, Zingib., sing. semunciam.

Thalictrum.

Thalictrum flavum, L.; Wiesenrautenheilblatt, Wiesenrautenwurz; Pigamon jaune, Rue des prés, Fausse rhubarbe, Rhubarbe des pauvres (*Gal*); Common meadow rue (*Ang.*); Kneppauden (*D.*); Waterruid (*Bel.*); Wrzodowiec (*Pol*); Torrvaeckgraes (*Suec.*).

Br. Gal. Gen. *Cr. Gr. M. Re. Sp.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Ranunculaceae, *J.*) Eine in Europa auf Wiesen sehr gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 406.)

Man wendet die Wurzel (radix Thalictri flavi s. magni s. Pseudorhabarbari s. Rhabarbari pauperum) an; sie ist frisch hellbraun, nach dem Trocknen dunkelbraun, inwendig gelb und voll eines süßlichen, hintennach bitter und scharf schmeckenden Saftes. Speichel, Excremente und Urin werden dadurch gelb gefärbt.

Purgirend. — Gabe, eine bis zwei Unzen.

Gr. führt noch *Thalictrum minus*, *aquilegifolium*, *angustifolium*, von denen Wurzel und Kraut bitter, purgirend, harntreibend, bei alten Geschwüren und Gelbsucht nützlich; *Th. majus*, von welcher die Wurzel ebenfalls statt der Rhabarber gebraucht wird, an.

Thapsia.

Thapsia Asclepium, *L.*; schmalblättrige Thapsie; Thapsie Asclepion (*Gal.*); Narrow leav'd carrot (*Ang.*); Tapsia, Comino rostico (*His.*).

His. His3. *Gr.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Mor.* Hist. t 18.)

Wurzel und Saamen, welche man anwendet, sind reizend und gelten für auflösend

Oleum Tapsiae s. Thapsiae antirheumaticum s. del Frayle. (His. His3.)

℞. Radicis Thapsiae,
Foliorum Rorismarini,
Vini rubri,
singulorum libram unam.
Olei Olivarum . libras quatuor.

Post quatuor dies digestionis coque ad consumptionem humidi usque et cola.

Thea.

Thea viridis, *L.*; Thee; Thee (*B. Bel. Suec.*); Tea (*Ang.*); Cha (*Ar. G. Duk. Pe.*); The (*D.*); Te (*His. I.*); Te, Cha (*Lus.*); Tjao (*Ja*); Fjcha (*R.*).

Br. Fer. Gal. His. His3. LP. *A. Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein Strauch (Polyandria Monogynia, L.; Aurantiaceae, *J.*) China's. (*Blackw.* t. 352 et 51. *Plenck* t. 427. et 26. *Hayne* VII. t. 28. 29. 27. Düss. off. Pfl. VIII. t. 2. 1. 3. *Bert.* Bild. I. 46. f. 2. Fl. méd. VI. 339.)

Die Blätter, welche man anwendet, sind grün, etwas glänzend, hart, glatt, eirundlanzettförmig oder elliptisch, am obern Theile mit Sägezähnen versehen, am Grunde ganz mit mittelmäßig langen Stielen, getrocknet und eingerollt, entweder der Länge nach oder mehr auf sich selbst; bisweilen, wenn sie geschnitten sind, zeigen sie sich in kleinen, länglichen oder rundlichen, grünlichen, runzlichen Stücken von sehr angenehmem, gewürzhaftem Geruch und einem bittern, etwas styptischen Geschmack.

Im Handel kommen viele Sorten Thee vor, von denen die vorzüglichsten den Namen Hayfan-, Schulang-, Perlthee, poudre à canon, saot-chaon oder Bouy- und Pekaothee führen; die beiden letztern sind weniger geschätzt und kommen von Thea Bohea, L., welche man als eine bloße Varietät von Th. viridis betrachtet.

Reizend, Ausdünstung befördernd. — Gabe, eine oder zwei Drachmen auf die Pinte kochendes Wasser.

Ein Extractum Theae (*Gr.*) kommt aus China.

Injectio Theae. (*Re.*)

℞. Theae virid. bon. drachm. unam.
Aquae bullientis . . uncias sex.

Infunde usque refrixerit et exprime. — Gutes Linderungsmittel im ersten Stadium der Gonorrhoe.

Thlaspi.

Wir führen hier folgende Arten an:

1) *Thlaspi campestre*, *L.*; Feldtäschelkraut; Thlaspi champêtre (*Gal.*)

Gal. *Gr. Re.*

♂ (Tetradynamia Siliculosa, L.; Cruciferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 409.)

Man wendet den Saamen (semen Thlaspeos) an, er ist rundlich, platt, dunkelbraun und von scharfem, brennendem Geschmack.

2) *Thlaspi arvense*, *L.*; Bauernsenf, Ackertäschelkraut; Thlaspi des champs (*Gal.*); Penny cress (*Ang.*); Penjzek aneb sedlska horvice (*B.*); Pengeurt (*D*); Wilde mosterd (*Bel.*); Penninge graes (*Suec.*).

Br. Gal. Wir. *Be. Br. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Man wendet den Saamen (semen Thlaspeos) an; er ist sehr klein, rundlich und etwas platt und hat einen starken, knoblauchartigen Geruch und einen etwas scharfen und bittern Geschmack.

3) *Thlaspi Bursa pastoris*, *L.*; Täschelkraut, Taschenkraut, Hirtentasche, Hirtentäschelkraut; Bourse à pasteur (*Gal.*); Shepherd's burse (*Ang.*); Bolsa de pastor (*His.*); Bearsjes kruid (*Bel.*).

Br. Gal. Gen. His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Re. Sp.*

☉ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 5. *Plenck* t. 516. *Zorn* Ic. pl. t. 138.)

Man wendet das Kraut (herba Bursae pastoris s. Cancri s Sanguinariae) an; es besteht aus einem Büschel fiederspaltiger Wurzelblätter und hat einen faden, etwas kohlartigen Geruch und einen scharfen, adstringirenden Geschmack.

Ein schwach adstringirendes Mittel, welches nur wenig in Gebrauch ist.

Thymus.

In den Pharmacopöen werden angeführt:

1) *Thymus alpinus*, *L.*; Alpenthymian, Alpenquendel; Thym des Alpes (*Gal.*); Alpine thyme (*Ang.*).

Br.

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, *J.*) Eine auf den Alpen wachsende Pflanze. (*Jacq.* Flor. Austr. I. t. 97.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Clinopodii montani) an; es besteht aus einem rundlichen, ästigen Stängel mit gestielten, rundlichen, stumpfen, etwas sägezähnigen und hohlen Blättern und hat einen sehr angenehmen, gewürzhaften Geruch und Geschmack.

2) *Thymus mastichina*, *L*; Mastix-Thymian; Thym cilié, Marjolaine sauvage (*Gal.*); Mastic thyme (*Ang.*); Mejorana silvestre (*His.*).

His. His3. *Gr.*

♄ Eine Pflanze Spanien's und Italien's. (*Blackw.* Herb. t. 134.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Mastichinae Gallorum s. Mari s. Mari vulgaris) an; es besteht aus einem walzigen Stängel mit kurzgestielten, eirunden, ganz kurz sägezähnigen, auf beiden Seiten glatten Blättern und wirtelförmig gestellten weißen Blüthen. Es hat einen angenehmen Geruch und Geschmack.

3) *Thymus vulgaris*, *L.*; gemeiner Thymian; Thym commun (*Gal.*); Garden thyme (*Ang.*); Wlaska neb kzjmska materj dausska (*B.*); Thymian (*D.*); Tomillo (*His.*); Gemeen thym (*Bel.*); Timo (*I.*); Tymian, Szmer wloski (*Pol.*); Tomilho (*Lus*); Timjan (*Suec.*).

Ams. An. B. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Fer. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.* Z

♄ Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t. 221. *Plenck* t. 489. *Zorn* Ic. pl. t. 458.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Thymi vulgaris s. hortensis) an; es besteht aus einem walzigen, wenig ästigen, sehr behaarten Stängel, an welchem kleine gegenüberstehende, stiellose, an den Rändern etwas zurückgerollte, schmale, fast stumpfe, unten etwas behaarte, oben graugrüne Blätter sitzen; die purpurrothen, gedrängte, von Deckblättern begleitete Köpfe oder Aehren an der Spitze der Zweige bildenden Blüthen haben einen angenehmen, starken, gewürzhaften Geruch und einen brennenden, gewürzhaften Geschmack

4) *Thymus Serpyllum*, *L.*; Quendel, Feldkümmel, wilder Thymian; Serpolet (*Gal.*); Mother of thyme (*Ang.*); Materj dausska (*B.*): Wild thymian (*D.*); Serpol (*His.*); Wild tym (*Bel.*); Sermolina, serpillo (*I.*); Macierzanka (*Pol.*); Serpao (*Lus.*); Schadownik (*R.*); Backtimian (*Suec.*).

A. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3 Li. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Wir. Wür. WW. *Be. Br. G. Gr. M Pid Re. Sp.* Z.

♄ Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 418. *Plenck* t. 490. Fl. méd VI 326.)

Man wendet das blühende Kraut (herba et flores Serpylli) an; es besteht aus einem ästigen, etwas behaarten Stängel mit kleinen, fast sitzenden, an den Rändern behaarten, eirunden oder lanzettförmigen Blättern und sehr kurzen, achselständigen, gestielten, büschelweise stehenden Blüthen, welche in sehr kurze Aehren und oft auch in eine Art endständigen Kopf vereinigt sind. Der Geruch ist angenehm, der Geschmack bitter und balsamisch.

Infusum Thymi. (GalM.)

℞. Summitatum Thymi,
Liquirit. rasae, sing. drach. duas.
Aquae bullientis quantum sufficit, ut colaturae octarius (litre) obtineatur.

Oleum Thymi aethereum s. essentiale, Aethereoleum Thymi. (Ba. Bor4. Br. D. Gal. Han. HassP. Pal. Sar. Sax. *Gr. Re.*)

℞. Herb. floresc. Thymi. part. quinque.
Aquae . . . . partes septem.
Destillent. (Gal.)

D. Florum partem unam et Aquae sex; — Han. HassP. et Sax. Aquae octo; — Ba. Aquae novem.

℞. Herb. floresc. Thymi partes 25.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Post tres dies fiat destillatio. — Gabe, zwei bis vier Tropfen.

Bor4. Oleum venale. Pond. spec. = 0,902.

Oleum Serpylli aethereum, Aetheroleum Serpylli. (A. Ba. Br. Han. Pal. Sax. *Gr.*)

℞. Herb. floresc. Serpylli part. unam.
Aquae purae . . . partes octo.
Destillent. (Han. Sax)

Ba. Serpylli partem unam et Aquae novem; — A. Aquae duodecim.

℞. Herb. floresc. Serpylli
part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.

Salis culinaris . . . partes tres.
Post tres dies macerationis fiat destillatio. (Br. Pal.)

Aqua Thymi. (Gal. Wür.)

℞. Herbae floresc. Thymi
part. quinque.
Aquae . . . . . partes viginti.
Destillent partes decem. (Gal.)
Wür. Herbae partem unam et Aquae sex. — Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Serpylli. (Sar. *Gr.*)

℞. Herb. floresc. Serpylli part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia denuo destillent supra novam herbam.
Gr. Serpylli manipulos duos, Aquae octarios duos, destillent in balneo aquae.

Spiritus s. Alcohol Thymi. (*Br. Gr.*)

℞ Herbae florescentis Thymi libram unam (et uncias duas *Br.*)
Aquae Vitae . . . libras octo.
Destillent tres quadrantes. — Gabe, eine halbe bis eine Drachme.

Spiritus aromaticus. (Li.)

℞. Herbae Thymi . . uncias tres.
— Mari . . . unciam unam.
Radicis Zedoariae,
Carvi, singulorum . uncias duas.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Post horas 24 macerationis adde
Aquae . . . . . libras octo.
Destillent lente librae octo.

Spiritus Serpylli. (A. Bor. Bor4. Br. D. Ful. Han. Hass. HassP. Li. Pal. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Pid. Sw.*)

℞. Herbae floresc. Serpylli
partem unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies destillet dimidia pars. (Bor. Br. Han. Hass. Pal. Pol Sax. Wir. *Pid.*)
Li. Herbae partem unam et sex Alcoholis; destillet dimidia pars; — D. et Ful. Herbae partem unam et sex Alcoholis; destillent trientes duo et denuo supra partem novae Herbae dimidium destilletur; — Wür. Herbae sesquilibram et decem Alcoholis; productum supra uncias tres novae Herbae denuo destilletur; — Sar. Herbae partem unam et quatuor Alcoholis; denuo supra novam Herbam destilletur.
℞. Herb. rec. Serpylli . part. unam.
Alcoholis (0,910)
part. quatuor c. dimidia.
Aquae . . . . . partes sex.
Post horas 24 destillent partes quatuor. (0,913). (A.)
Vm Serpylli partem unam, Aquae Vitae quatuor, Aquae duodecim; destillent partes tres cum dimidia; — *Sw.* Herbae partes duodecim, Alcoholis sex et Aquae duas; destillent partes sex; productum supra partes duodecim Herbae recentis, cum Aquae duabus infunde et destillando partes sex abstrahe; — Bor4. HassP. Serpylli libram unam, Spiritus rectif. quatuor, Aquae q. s.; post macerationem per 24 horas destillent librae quatuor.

Aqua benedicta Serpylli s. Serpylli composita. (Sar. Wir. *Sp.*)

℞ Herb. floresc. Serpylli
manipulos quatuor.
Florum Chamomillae,
Summit. Saturejae,
— Thymi, sing. manip. unum.
Vini . . . . . libras sex.
Post tres dies macerationis destillet dimidium; in producto infunde
Calami aromatici,
Cassiae ligneae,
Cinnamomi,
Macidis, singulorum semunciam.
Post horas 24 destillent ad siccum. (Sar.)
℞. Herbae florescentis Serpylli
libras duas.
— — Saturejae,
— — Thymi,
Flor. Chamomillae, sing.
uncias duas.
Cinnamomi . . . . . uncias tres.
Macidis . . . . . semunciam.
Vini albi . . libras octodecim.
Stent in digestione per duos dies, tunc lente librae octo destillent. (Wir.)
℞. Rad. Zedoariae,
— Galangae, sing. drach. unam.
— Paeoniae . . sesquiunciam.
Herbae Serpylli . manipulos sex.
— Foeniculi manip. quatuor.
— Verbenae,
— Melissae,
Flor. Tiliae,
— Liliorum Convallium,
— Lavandulae,
— Rorismarini, sing.
manip. duos.
Cubebarum . drachmam unam.
Cinnamomi . . semidrachmam.
Macidis,
Nucis mosch., sing. drach. duas.
Visci querni . . sesquiunciam.
Vini generosi . . . uncias 192.
Destillent. (*Sp.*)
Kopfschmerz lindernd, herzstärkend, blä-

hungtreibend, Menstruation befördernd. — Gabe, eine halbe bis eine Unze.

T i l i a.

Tilia Europaea, L.; Linde; Tilleul (*Gal.*); Limetree (*Ang.*); Ljpa (*B.*); Lind (*D. Suec.*); Linde (*Bel*); Tilio (*His.*); Tiglio (*I.*); Tilia (*Lus.*); Lipo (*Pol.*).

Ams. An. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. HassP. His. His3 LP. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G Gr. M. Re. Sp.* Z.

Ein Baum (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, J.), welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 47. 48. *Blackw.* t. 469. *Plenck* t. 424. Düss. off Pfl. IV. t. 18. *Bert.* Bild. V. 68. f. 1. *Zorn.* Ic. pl. t. 287.)

Man wendet die Blüthen (flores Tiliae) an; sie sind gelblich und haben einen sehr angenehmen, bei'm Trocknen sich großentheils verlierenden Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Krampfstillend, schwach die Ausdünstung befördernd, besonders wenn viel wässeriges und sehr warmes Vehikel genommen wird.

Conserva Florum Tiliae. (Sar.)

℞. Florum Tiliae . partem unam.
Sacchari ad glob. cocti part. tres.
Serva.

Infusum Tiliae. (Gal. GalM. *ParC. Ra. Va*)

℞. Florum Tiliae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. (GalM. *Ra. Va.* Hosp. Par.)

Va. Pugillum unum ad duas, Aquae bull. libras duas.

℞. Infusi Florum Tiliae libras duas.
Aquae Flor. Aurant. uncias duas.
Misce. (*Ra.*)

℞. Florum Tiliae . drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Post infusionem per horae quadrantem cola et colaturae adde
Syrupi Althaeae . uncium unam.
Misce bene. (Gal.)

ParC. Florum, Liquiritiae, singulor. drachmas duas et Aquae bull. octarium unum.

Schwach krampfstillend. Gemeiniglich setzt man zum ersten dieser Aufgüsse etwas Sauerhonig oder syrupus tartaricus und versüßt ihn mit Gummisyrup, bisweilen auch mit syrupus diacodion. Der zweite wird von Chaussier bei nervösen Affectionen mit hysterischem Krampf empfohlen. Oft setzt man zwei Drachmen liq. Hoffm. zu. Beide müssen heiß genommen werden.

Infusum Tiliae aurantiatum. (*Va.* Hosp. Mat.)

℞. Infusi Tiliae . . . il bras duas.
Aquae Flor. Aurant. uncias duas.
Adduntur saepius:
Aetheris sulphurici drachmae duae.
Misce. — Heiß kleine Tassenweise.

Aqua Tiliae, Aqua Florum s. ex Floribus Tiliae. (Ful. Gal. Gen. O. Pal. Pm. Sar. Sax. Wür. *Fi. Gr. Sw.*)

℞. Florum Tiliae . . partes duas.
Aquae . . . . quantum sufficit.
Destillent partes viginti. (*Sw.*)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Gal. et Sar. Florum partem unam et Aquae quatuor; destillet dimidia pars; — Pm. Florum libras duodecim, Aquae quadraginta octo, eliciantur Aquae librae viginti quatuor; — Wür. Florum partem unam et Aquae sex; — Sax. Florum partem unam et Aquae viginti; destillent trientes duo; — O. Florum partem unam et Aquae triginta; destillent partes viginti; — Gen. Florum partes quatuor et Aquae q. s.; destillent partes sex; — *Fi.* Florum tres, Aquae quindecim; destillent partes sex.

℞. Florum Tiliae . . . partes tres.
Aquae . . . partes duodecim.
Floribus in saccum cucurbitae medio ita suspensum ut aquam non attingat, immissis, destillent absque bullitione aquae partes sex.

Gr. parationem non indicat.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

T o r m e n t i l l a.

Tormentilla erecta, L.; Tormentillwurz, Blutkraut, Feigwarzkraut, Siebenfingerkraut; Tormentille (*Gal.*); Tormentil (*Ang. Bel. D.*); Natrznjk, Trzene korenj (*B*); Tormentilla (*His. I. Lus*; Korze ziele pepawy (*Pal.*).

A. Am Ams. An. B Ba. Bel. Bor. Bor4. Br Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Re. Sp.* Z.

4 (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* II. 48. *Blackw.* t. 445. *Plenck* t. 411. *Schk* t. 136. Düss. off. Pfl. VI. t. 2 *Zorn.* Ic pl. t. 358)

Man wendet die Wurzel (radix Tor-

mentillae sylvestris s. officinalis s. Heptaphylli s. Septifolii) an; sie ist knotig, fingerdick, länglich, mit zahlreichen Fasern besetzt, außen rothbraun, inwendig blaßroth oder gelblichbraun, bisweilen gefleckt und geruchlos; ihr Geschmack ist stark adstringirend und etwas bitter.

Adstringirend. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis eine Drachme.

Pulvis Tormentillae compositus s. e Bolo compositus sine Opio s. adstringens. (Gen. *Gr.*)

℞. Terrae sigill. (Boli Armen. s. Gall. *Gr.*) . . . . . uncias sex.
Cinnamomi . . uncias quatuor.
Tormentillae,
Gummi Arabici, sing. uncias tres.
Piperis longi . . . semunciam.

Nöthigenfalls setzt man den acht und vierzigsten Theil Opium zu. *Gr.* Opii colati drachmas tres addendo: *Pulvis e Bolo compositus cum Opio.*

Extractum (Radicis) Tormentillae. (A. Ams. An. B Ba. Br. His. His3. Li. Lus. Pm. RC. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi.*)

℞. Rad. Tormentillae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque; cola exprimendo et colaturam ad aptum consist. consume. (Br. Pal. Wir.)

Sar. Liquoris coquendo tertiam partem consumere, colare et evaporando inspissare; — Pm. Radicis uncias sex cum Aquae ferventis libris sex per tres horas infundere, cum expressione colare, decanthare et liquorem cum Albumine Ovi clarificatum balnei maris ope ad extracti consistentiam inspissare.

℞. Rad Tormentillae partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor, tunc liquores commixti, per horas 24 sepositi ad aptam consist. evaporent. (An. Li.)

B. Horas 24 digestionis et duas bullitionis cum Aquae partibus decem, deinde novam bullitionem cum Aquae partibus octo; — Ams. Coctionem primam cum viginti, secundam cum quindecim partibus Aquae, quaque vice ad dimidii remanentiam; — His. His3. Digestionis horas 24 et duas bullitionis primum cum partibus decem, deinde cum nova quantitate Aquae ad dimidii remanentiam.

℞. Radicis Tormentillae quantum vis.
Aquae . . . . quantum sufficit.

Radice pluribus ebullitionibus sequentibus penitus extracta, liquores commixti post decanthationem ad extracti consist. evaporent. (A.)

Wür. unam bullitionem per horas duas indicat; — Ba. Radicis partem unam post horas 24 macerationis coquere primum cum octo, deinde cum quatuor partibus Aquae; — RC. Radicis q. vis, Aquae octuplum ad dimidium decoquere, exprimere, filtrare et ad mellis spissioris consist. redigere; — *Fi.* duas bullitiones, primam cum Aquae sextuplo, secundam cum nova Aqua, donec decoctum saporis expers evadat.

Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae adstringentes. (*Ca.*)

℞. Extr. Tormentillae drach. unam.
Mastichis . . . drachmas duas.
Gummi Arabici . . semunciam.
Terebinthinae coctae . . . q. s.

Fiant pilulae granorum quatuor. — Von Quarin am Ende von Gonorrhöe empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück Morgens und Abends.

Aqua Tormentillae. (Pal.)

℞. Rad. Tormentillae partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.

Destillet pars una cum dimidia.

Essentia traumatica. (Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Tormentillae,
Herb. Saniculae, sing. semunciam.
— Roris Solis,
Flor. Hyperici,
— Rosar. rubr., sing. drachm. duas.
Sanguinis Draconis,
Mumiae Aegyptiacae,
Catechu,
Myrrhae, sing. . drachmas tres.
Santali rubri . . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Post tres dies digestionis blando calore, exprime et filtra. (Wir.)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Flor. Rosarum rubrarum,
— Hyperici, sing. drach. duas.
Ligni Santali rubri,
Mumiae Aegyptiacae,
Sanguinis Draconis, sing. unciam unam.
Catechu,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Nucis moschatae drachmam unam.
Alcoholis . . . . uncias viginti.

Post sufficientem digestionem filtra. *Sp.*)

Adſtringirend, zur Stillung von innern Blutflüſſen und Diarrhöen empfohlen. — Gabe, fünfzig bis ſechszig Tropfen.

Tinctura Tormentillae. (Bel.)

℞. Rad. Tormentillae partem unam.
Alcoholis (15°) . . partes octo.
Macera frigide per dies sex, cola exprimendo et filtra. — Adſtringirend.

Tinctura Extracti Tormentillae. (RC.): ut tinctura kino.

Decoctum Tormentillae s. Radicis Tormentillae. (B*. *Gr. Va.*)

℞. Radicis Tormentillae semunciam.
Aquae fontanae . sesquilibram.
Coque et cola. — *Va.* Radicis drachmas duas ad quatuor, Aquae libras duas. — Adſtringirend. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel.

Gr. Radicis unciam, Aquae dest. sesquioctarium ad octarium decoquere et colare. — Bei colliquativer Diarrhöe.

Decoctum adstringens. (LH. Sar. *Fi. Sw. Vm.*)

℞. Radicis Tormentillae,
Corticis Quercus,
— Granati, sing. drach. duas.
Aquae,
Lactis, sing. . . . libram unam.
Coque per horae quadrantem, sub finem addendo
Cinnamomi . . drachmas duas.
Post refrigerationem cola. (*Fi. Sw. Vm.*)

℞. Corticis Granati,
Tormentillae, sing. drachm. unam.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque ad remanentiam librae unius, sub finem addendo
Simarubae pulveratae drachmam unam.
Cola et adde
Syrupi Opii . . unciam unam.
Gabe, drei Unzen zwei Mal. (LH.)

℞. Radicis Tormentillae,
Florum Granati siccatorum,
Cort. Granati, sing. semunciam.
Chinae . . . . unciam unam.
Aquae fontanae quantum sufficit ut post ebullitionem librae duae colaturae obtineantur. (Sar.)

Bei Diarrhöe und Blennorrhöe empfohlen. — Gabe, zwei Unzen, drei oder vier Mal täglich. — Wenn man den Zimmt weglässt, ſo kann die Abkochung auch als Klyſtir oder Einſpritzung angewendet werden.

Tisana adstringens. (*Ca. Pie. Sp.*)

℞. Rad. Tormentillae drachmas sex.
Aquae fontanae libras duodecim.
Coque per semihoram, in fine addendo
Rad. Consolidae maj. drach. sex.
— Liquiritiae . . semunciam.
Cola. (*Sp.*)

Pie. Tormentillae uncias tres, Aquae libras triginta quatuor, Consolidae uncias tres et Liquiritiae uncias duas.

℞. Rad. Tormentillae,
— Graminis, sing. semunciam.
Corticis Granati,
Berberidis,
Rhois, singulorum drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi drach. tres.
Aquae . . . . . octarios tres.
Decoque ad duorum octariorum remanentiam et colaturae adde
Mellis . . . . . uncias duas.
Cola. (*Pie.*)

℞. Aquae bullientis . . libras duas.
Petal. sicc. Rosar. rubrarum semunciam.
Radicis Tormentillae,
— Bistortae, sing. unc. unam.
Coque radices, petala solum infundendo, cola et colaturae adde
Syrupi Granati . sesquiunciam.
— Gummi . . unciam unam.
Acidi sulph. tenuis guttas viginti.
Misce. (*Ca.*)

Mixtura pro diarrhoea. (*Gr.*)

℞. Olei Cinnamomi . . guttas octo.
Sacchari albi . . drachmas duas.
Misce et adde
Decocti Tormentillae uncias sex.
Pulveris Cretae comp. cum Opio drachmas duas.
Tincturae Ratanhiae semunciam.
Misce. — Täglich 3 Mal eine halbe Unze.

Praeterea: Copaibae drachmas duas, Mellis despumati drachmas sex; misce et adde gradatim Decocti Tormentillae uncias sex, Tincturae Ratanhiae unciam, Tincturae Opii guttas quadraginta. ½ — 1½ Unze 2 oder 3 Mal täglich; vel: Decocti Tormentillae uncias sex, Tinct. Cubebae drachmas decem, Tinct. Catechu tres, Syrupi Papaveris unciam; misce ½ — 1½ Unze täglich 3 Mal.

Gargarisma adstringens. (LH. *Sa.*)

℞. Radicis Tormentillae uncias duas.
Aquae . . . . quantum sufficit ut post semihoram bullitionis colaturae libra una obtineatur, cui adde
Mellis rosati . . sesquiunciam.

Spiritus Sulphuris per campanam guttas decem.

℞. Foliorum Agrimoniae manipulum.
Tormentillae . . drachmas duas.
Coque per pauca momenta in
Aquae . . . . . sesquilibra.
Cola et adde
Roob Mororum . unciam unam.

Tragacantha.

Tragacanthae Gummi; Τραγάκανθα; Traganth, Tragant; Gomme adragant (*Gal.*); Tragant (*Bel. D*); Gom of goatstorn, Tragacanth (*Ang.*); Ka-ira, Samaghulkatad (*Ar.*); Kattira (*Duk.*); Tragacanto, Alquitira (*His.*); Dragante (*I.*); Guma dragant (*Pol.*); Alcatria (*Lus.*); Vadomocottay pisin (*Tam.*).

Am. Ams. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. LH. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Va.* Z.

In dünnen, gedrehten und wurmförmigen Fäden oder in zusammengerollten Lappen. Es ist graulichweiß, undurchsichtig, etwas zähe, schwer zu pulvern, ohne Geruch und von einem faden und schleimigen Geschmack.

Es fließt von mehreren Arten Astragalus, wie A. verus, *Oliv.*, *Voy.* d. l'emp. Othom. t. 44. Düss. off. Pfl. XI. t. 256.; A. gummifer, *Lab*, und A. Creticus, L, *Bert.* Bild. I. 99. f. 2, welche sämmtlich im Orient wachsen, aus.

Es besteht, nach Guibourt, aus einer in Wasser löslichen, aber ganz vom Arabischen Gummi verschiedenen und noch einer andern unlöslichen Substanz.

Man wendet es fast nur an, um Pulver mit Wasser zu mischen oder manchen Präparaten die Form zu geben.

Pulvis mucilaginosus s. Tragacanthae compositus (Gen. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

℞. Gummi Tragacanthae semunciam.
Amyli,
Sacchari albi, sing. drach. duas.
Divide in partes octo. (Gen.)

℞. Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
Amyli, singulorum sesquiunciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Fiat pulvis. (Lon. LonN. *C. Gr. Re. Va.*)

Mucilago Astragali Tragacanthae s. Gummi Tragacanthae s. Tragacanthae. (A. Ams. An. Ba. Bel. Du. Ed. Ful. HassP. Li. Lus. Sar. Sax. *Br. C. Fi. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. G. Tragacanthae partem unam.
Aquae frigidae . . partes octo.
Digere per horas 12, tere et cola. (Ful. Lus.)

Gr. macerare per horas viginti quatuor, terere et per pannum trajicere; — Li. Aquae partes duodecim; — *C.* viginti; — Du. triginta duas; — An. triginta sex; — Ba. et Sax. sexaginta; — *Sw.* et *Vm.* sexaginta duas; — A. ducentas quadraginta; — Sar. quantum sufficit; — HassP. Aquae quadraginta octo

℞ G. Tragacanthae partem unam.
Aquae bull. partes quatuordecim.
Contere. (B. Bel.)

Gr. Aquae partes quatuor; — Ams. sedecim; — Ed. *Re.* triginta duas; — *Br.* quantum sufficit; — *Fi.* Tragacanthae drachmas duas, Aquae tepidae uncias tres cum dimidia.

Potio gummosa. (*Sp.*)

℞. Tragacanthae . . grana decem.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.

Solutio mucilaginosa. (*Sw.*)

℞. Mucil. G. Tragacanth. unc. duas ad tres.
Aquae bullientis . libram unam.
Syrupi Althaeae unciam unam.
Gabe, drei bis vier Unzen, täglich mehrmals, bei Husten, Dysurie, Nierenentzündung, Gonorrhöe.

Liquor ophthalmicus anodynus. (Pal.)

℞. G. Tragacanthae . drach. duas.
Mucil. Sem. Psyllii drach. tres.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis, sing. . q. s. ut fiat liquor mediocris consistentiae.

Potio oleosa. (*Ra.*)

℞. Olei Amygdalar. dulc. semunciam.
G. Tragacanthae . grana decem.
Aquae . . . . . uncias duas.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Misce.

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syr. Sacchari, sing. sesquiunciam.
G. Tragacanth. grana quindecim.
Aquae Flor. Aurant. drach. quatuor.
— Lactucae . uncias quatuor.
Misce.

Electuarium Diatragacanthae s. Gummi Tragacanthae. (*Sp.*)

℞. Aquae Paeoniae . uncias duas.

Aquae Menthae,
— Melissae,
Syrupi Rhoeados,
Sacchari pulv., sing. unc. unam.
G. Tragacanth. pulv. drach. duas.
Zur Stillung von Kolikschmerzen bei Kindern.

Linctus leniens, Looch simplex. (Gal. *Ra. Sm. Sp.*)

℞. Gummi Tragacanthae grana sex.
Emuls. Amygdalar. dulc. unc. quatuor.
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Contere. (*Ra.*)

℞. G. Tragacanthae semidrachmam.
Sacchari pulverati unciam unam.
Infusi Rhoeados . . uncias sex.
Contere et adde
Aquae Flor. Aurant. unc. unam.
Misce bene. (*Sm.*)

℞. G. Tragacanthae pulv. gr. sedecim.
Olei Amygdalar. dulc. semunciam.
Sacchari puri . . unciam unam.
Aquae purae . . . uncias tres.
— Flor. Aurant. drach. duas.
Misce triturando. (Gal.)

℞. G. Tragacanthae grana sedecim.
Tisanae communis . semunciam.
Fiat mucilago, cui, agitando continue, adde
Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althaeae, sing. unc. unam.
Tisanae pectoralis unc. tres c. dim.
Misce bene. (*Sp.*)

Looch crocatum s. cum Croco et Pistaciis s. viride. (Gal. *Gr. Re. Vm.*)

℞. Syrupi Violarum unciam unam.
Tincturae Croci . guttas viginti.
Aquae communis uncias quatuor.
Pistaciarum sicc. drachmas sex.
Fiat emulsio, quam sensim infunde in mixturam e
Pulv. G. Tragacanth. granis sedecim.
Olei Amygdalar. dulc. semuncia.
Diu tritura, sub finem addendo
Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
Misce bene. (Gal. *Re.*)

Gr. Syr. Violarum unciam, Pistaciarum drach. quatuor, Infusi Croci guttas quindecim, Aquae Rosae unc. quatuor, G. Tragacanthae grana sedecim, Olei Amygd. drachmas quatuor, Aquae Flor. Aurant. drachmas duas.

℞. Croci . . . . . grana sex.
Aquae fervidae quantum sufficit ut infusi unciae sex obtineantur; cola exprimendo et adde
G. Tragacanthae grana sedecim.
Olei Amygdalar. dulc. semunciam.
Amygdalas excorticatas . no. 15.
Syrupi Violarum . sesquiunciam.
Fiat emulsio. (*Vm.*)

Species Diatragacanthae frigidae. Pulvis gummosus s. Specierum Diatragacanthae s. e Tragacantha s. Tragacanthae compositus. (Ams. An. B. Ba. Br. Ful. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pal. Sar. Wir. *Fi. Gr. Pid Re. Sp. Vm.*)

℞. Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
Sacchari albi, sing. partes aeq.
Fiat pulvis. (B. Bel.)

℞. Gummi Tragacanthae,
Radicis Althaeae,
Sacchari albi, sing. uncias duas.
Fiat pulvis. (*Pid.*)

℞. Gummi Tragacanthae,
— Arabici,
Amyli, singulorum unciam unam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Fiat pulvis. (Ams. Lon. Lus.)

LonN. *Gr. Re* Cujusque trium priorum substantiarum sesquiunciam, Sacchari uncias tres.

℞. Gummi Arabici . uncias duas.
— Tragacanthae,
Rad. Liquiritiae, sing. semunciam.
Sacchari albi . . uncias duas.
Fiat pulvis. (O.)

℞. G. Tragacanthae . unc. unam.
— Arabici . . . . semunciam.
Amyli . . . . drachmas duas.
Liquiritiae . drachmam unam.
Sacchari albi . . sesquiunciam.
Fiat pulvis. (An.)

Sar. G Tragacanthae unciam unam, Amyli, Liquiritiae, sing. drachmas duas, Gummi Arab. quinque et si necesse videtur drachmae cuique pulveris addere Seminum Papaveris albi grana decem et Seminum Cucumeris tantidem; — Li. G. Tragacanthae uncias duas, Gummi Arabici unam, Liquiritiae et Amyli, sing. semunciam; — *Fi.* G. Tragacanthae uncias duas, Gummi Arabici unam, Amyli, Radicis Liquiritiae, sing. drachmas sex, Sacchari albi uncias tres; — *Gr.* sec. Lon. ante 1788 G. Tragacanth., Arab., Rad Alth., Amyli, Rad. Liquirit., Sacch. albi, sing. semunciam.

℞. Sacchari cryst. flavi drach. duas.
Radicis Althaeae,
Gummi Tragacanthae,
Amyli, sing. . drachmam unam.
Olei essentialis Anisi guttas sex.
Misce. (Ful.)

℞. Rad. Liquiritiae partem dimid.
Amyli . . . . partem unam.
Amygdalar. dulc. excortic.,

Gummi Arabic', sing. partes tres.
Tragacanthae . partes 4½.
Sacchari cryst. part. septem c. dim.
Fiat pulvis. (*Vin.*)

℞. Pulveris Gummi Tragacanthae,
— — Arabici,
— Sacchari albi, sing. part. duas.
— Liquiritiae partem unam.
Misce. (*Sa.*)

℞. Gummi Tragacanthae uncias duas.
— Arabici drachmas decem.
Amyli . . . . . semunciam.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Fiat pulvis. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Gummi Tragacanthae uncias duas.
— Arabici drachmas decem.
Amyli . . . . . semunciam.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Quatuor Seminum frigid maj., sing. drachmas duas.
Seminum Papaveris drachmas tres.
Fiat pulvis. (Pal.)

Gabe, zwei Scrupel für einen Erwachsenen.

Bolus pectoralis. (*Sa.*)

℞. Spec. Diatragacanth scrup. unum.
Cetacei . . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.

Bolus pectoralis adstringens. (*Sa.*)

℞. Spec. Diatragacanthae,
Elect. Scordii, sing. semidrachmam.
Syrupi Papaveris quantum sufficit.

Tabellae Diatragacanthae s. gummosae. (Sar.)

℞. Spec. Diatragacanth. sesquiunciam.
Sacchari albi . . libram unam.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s.
Fiant tabellae.

Trochisci bechici rubri. (Pal. Wir.)

℞. Specierum Diatragacanthae,
Boli Armenae, sing. unc. unam
Sacchari albi . . libram unam.
Mucil. G. Tragacanthae . q. s.
Fiant trochisci.

Pulvis anonymus. (Wir.)

℞. Sem. Papaveris albi drach. duas.
— Portulaccae,
— Cydoniorum,
— Malvae,
— Gossypii, sing. sesquidrachmam.
— Ciceris . semidrachmam.
Cinnamomi,
Gummi Tragacanthae,
Amyli, singulorum drachmas duas.
Succi Hypocistidis,
Boli Armenae,
Cornu Cervi usti,
Rasur. Eboris, sing. semidrachm.
Sacchari crystallisati uncias sex.
Misce ut fiat pulvis.

Gabe, eine bis zwei Drachmen bei alten Catarrhen.

Pastilli de Portugal (*Re.*): Aq. Angel. cum Mucilag. G. Tragac. c. Aq. Flor. Aur. parat. mixta et Ambra gris. in Aq. Milleflor. solut. addita.

Pastilli de Rosa (*Re.*): ut praemoniti sed loco aq. flor. aurant. cum Aq. Rosar. et loco ambrae cum Petalis Rosar. parati.

Tragopogon.

Tragopogon pratense, *L.*; Bocksbart, Wiesenbocksbart; Salsifis, Barbe de bouc (*Gal.*); Salsefi (*Ang.*); Salsifi (*His.*); Salsifica (*I.*); Sersifim (*Lus.*).

Br. Fer. Gal. Wir. *Gr.*

♂ (Syngenesia Polygamia Aequalis, L.; Syantherene. *Cass.*) Eine in Europa überall auf Wiesen wachsende Pflanze. (*Bull.* t. 209. *Schk.* t. 214. *Pienck* t. 589. *Zorn* Ic pl. t. 179.)

Man wendet die Wurzel (radix Tragopogi s. Barbae hirci) an; sie ist lang, walzig und weißlich, und hat einen süßen Geschmack.

Statt ihrer nimmt man oft die von Tragopogon porrifolius, L. (*Oed.* Fl. Dan. t 797), porreblättriger Bocksbart; Salsifis cultivé, Salsifis blanc.

Sie kommt bisweilen mit zu Brustabkochungen.

Trapa.

Trapa natans, *L.*; Wassernuß; Macre flottante, Châtaigne d'eau, Noix d'eau (*Gal.*); Water caltrops (*Ang.*); Svaemmende hornnoed (*D.*); Castana de aqua (*His.*); Waternooten (*Bel.*); Tribulo aquatico (*I.*); Orzahi wodoe (*Pol.*); Abrolho dos charcos (*Lus.*); Vatnnoet (*Suec.*).

Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

⊙ (Tetrandria Monogynia, L.; Onagrariae, J.) Eine in stillen Wassern Europa's gemeine Pflanze.

Man wendete ehedem die Früchte (fructus Tribuli aquatici, Nuces aquaticae) als abstringirendes und die Blätter als auflösendes Mittel an. Beide sind aber heutzutage nicht mehr in Gebrauch.

Tremella.

Tremella Auricula Judae, Pers.; Peziza Auricula; Holderſchwämmchen, Judasohr; Oreille de Judas (*Gal.*); Jew's ear (*Ang.*); Bezowa hauba (*B.*); Judasoor (*Bel.*).

Br. Gal. Lus. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Re. Sp.* Z.

Ein Pilz (Auricula Judae s. Fungus Sambuci), welcher an faulen Bäumen wächſt. (*Zorn* Ic. pl. t. 500.)

Er hat eine ohrförmige Geſtalt und eine grünlichgraue Farbe.

Ehedem wendete man ihn, in Milch oder Weineſſig gekocht, gegen Bräune an.

Trifolium.

Unter dieſem Namen ſind angeführt:

1) *Trifolium pratense, L.*; rother Wieſenklee; Trèfle des prés (*Gal.*); Purple trifoil (*Ang.*); Raedklever (*D.*); Roedknepling (*Suec.*).

Gal. Wir. *Gr.*

♃ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 93.)

Man wendet das blühende Kraut (herba cum floribus Trifolii pratensis s. purpurei s. Trifolii s. Loti herbae sylvestris) an; die Blätter deſſelben ſind dreiblätrig, die Blättchen eirund, ganz, behaart, oft mit einem weißen oder ſchwarzen Flecke gezeichnet; die Blüthen roth und bilden rundliche, ſtumpfe, von häutigen Deckblättern umgebene Aehren.

Wird für etwas laxirend gehalten.

2) *Menyanthes trifoliata, L.*; Waſſerklee, Fieberklee, Bitterklee; Trèfle d'eau, Trèfle des marais (*Gal.*); Common back-bean (*Ang.*); Horky. Wodnj getel (*B.*); Bukkeblade, Beskeklaever, Gedeklov (*D.*); Trifolio palustre (*His.*); Water drieblad (*Bel.*); Trifoglio fibrino, aquatico (*I.*); Vidra fu (*M.*); Troglist (*Pol.*); Trevo d'agua, Trifolio fibrino (*Lus.*); Trilistnik (*R.*); Vattnkloefver (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va.* Z.

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Lysimachiae, J.) Eine Europäiſche Pflanze. (*Bull.* t. 131. *Blackw.* t. 474. *Plenck* t. 87. *Hayne* III. 14. *Bert.* Bild. VII. 27. f. 2. Fl. méd. V. 284.)

Man wendet das Kraut (herba Trifolii s. Trifolii fibrini s. aquatici s. palustris s. paludosi s. antiscorbutici) an; es beſteht aus einem Büſchel langſtieliger, je aus drei glatten, eirunden, ſtumpfen, ganzen, am Rande etwas wellenförmigen Blättchen gebildeter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich bittern Geſchmack.

Bitter, toniſch, magenſtärkend, die Menſtruation befördernd. Beſonders hat man es gegen Scorbut, Gicht und Wechſelfieber angewendet.

Conserva Trifolii fibrini. (Ful.)

℞. Fol. Trifolii fibr. contus. et per cribrum traject. part. unam,
Sacchari albi pulverati partes duas.
Contere simul.

Thea amara, Species pro thea amara. (D. DD. *Vm.*)

℞. Rasurae Ligni Guajaci,
Baccarum Juniperi,
Fol. Sennae,
— Trifolii fibr., sing. part. aeq.
Concisa et contusa misce (D. *Vm.*)

℞. Foliorum Trifolii fibrini,
— Sennae,
Radicis Bardanae,
Bacc. Juniperi, sing. unc. unam.
Concisa et contusa misce. (DD.)

Succus Trifolii fibrini. (Hass. Sar.)

℞. Herb. Trifolii aquat. rec. q. vis.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, sepone succum et filtra.

Sar. clarificare in balneo aquae jubet — Gabe, zwei bis drei Unzen.

Syrupus de Menyanthe trifoliata s. Trifolio fibrino. (Gal.)

℞. Succi Trifolii fibrini bullitione clarificati et colati,
Sacchari albi, sing. . part. aeq.
Coque, blando igne, ad syrupi consistentiam.

Syrupus de Menyanthe s. Trifolio compositus. (Br°.)

℞. Succi Trifolii fibrini recenter expressi . . . . . partes duas.
Succorum rec. express. Lactucae, Sonchi, Cichorii et Nasturtii, sing. partem unam.

Post aliquot horas sepositionis ut faecula desideat, commisce, clarifica, filtra et adde liquori
Sacchari albi . . . . duplum.
Liqua in balneo aquae.

Extractum Trifolii fibrini (aquosum), Succus concretus Trifolii. (A. Ams. An. B. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. LH. Li. LP.

Lus. O. Pal. Pm. Pol. Sar. Sax. Wir. Wür. *Fi. Pid. T. Vm.*)

℞. Fol. rec. Trifolii fibr. . q. vis.

Succum expressum et clarificatum in balneo aquae ad consist. extracti vaporando consume. (Gal. Lus.)

℞. Fol. rec. Trifolii fibr. . . q. s.

Contunde in mortario et exprime succum, qui absque despumatione in tantum evaporet, donec quarta pars Folior. Trifolii fibr. siccator. sufficiat ad ei extracti spissitudinem praebendam. (B.)

℞. Fol. rec. Trifolii fibr.
libr. duodecim.

Contunde in mortario ferreo, sensim addendo Aquae libras sex et exprime succum, qui semel ebulliat et tunc colatus leni calore ad mellis consist. evaporet. (Han. O.)

℞. Fol rec. Trifolii fibr. libr. unam.
Aquae frigidae . . libras decem.

Macera per duos dies, subinde agitando; cola, sepone et decantha liquorem, tunc vaporando ad consist. requisitam inspissa. (Pol.)

℞. Fol. Trifolii fibr. partem unam.
Aquae communis . partes octo.

Macera per horas 24, tunc coque per horae quadrantem et cola fortiter exprimendo; residuo deinde cum Aquae partibus quatuor cocto, liquores ambos commisce et post horas viginti quatuor sepositionis ad aptam consist. vaporando inspissa. (Sax.)

℞. Foliorum recentium Trifolii fibrini,
Aquae frigidae, sing. part unam.

Macera per horas 12, tunc adde
Aquae bullientis . . . duplum ponderis massae totius. Post refrigerationem cola, clarifica Albuminis ope, supra ignem impone et simulac liquor spissescere coepit, per pannum cola et continue agitando, probe consume. (*Vm.*)

℞. Fol. Trifolii fibr. libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.

Digere per dies quatuor in loco calido, coque parumper, cola exprimendo et colaturam vaporando ad extracti consist. inspissa. (Br. Li. Pal. Wir.)

℞. Herbae Trifolii fibr. libram unam.
Aquae purae . . libras decem

Coque per horas duas, cola exprimendo, sepone liquorem et per pannum colatum vaporando in tantum consume, donec massa non amplius digitis adhaereat. (Ams. Gen.)

Hass. et *Pid.* coquere Trifolii partem unam in Aquae sex, exprimendo colare et liquorem post sepositionem per horas 24 decanthatum vaporationi subjicere; — Wür. coquere Folia per horam unam in Aquae q. s. et liquorem decanthatum ad mellis spissi consist. consumere; — An. coquere per horae quadrantem Foliorum libras duas in Aquae decem et liquorem decanthatum consumere; — Fer. coquere Herbae partem unam in Aquae tribus et decoctum Albuminis ope clarificatum consumere; — LP. ut extractum rhei.

℞. Herbae Trifolii fibr. part. unam.
Aquae bullientis . partes octo.

Coque leviter per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coque in Aquae partibus quatuor et itidem cola; liquores commixti et post sufficientem sepositionem decanthati ad extracti consist. evaporent. (Bor. D. Han.)

A. Herbam pluribus coctionibus sequentibus penitus extrahere, liquores commiscere et decanthatos in balneo aquae vaporando consumere; — Fenn. coquere illam per horae quadrantem cum Aquae partibus sex, tunc secundo cum nova Aqua et liquores ambos commixtos in balneo aquae vaporando consumere; — Bor. Herbam cum Aquae ferv. decuplo per horas 36 seponere, liquorem exprimendo colare, residuum cum Aquae fervidae quintuplo infundere, post refrigerationem exprimere, liquores consumere; — *T.* ut extractum sennae; — LH. ut extractum absinthii.

℞ Fol. Trifolii fibr. contus.
libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillando uncias circiter duas Aquae abstrahe; residuo infunde Aquae triplum, coquendo ad trientis remanentiam redige, clarifica et cola liquorem, vaporando ad electuarii consist. inspissa et huic nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)

HassP. ut extractum cardui benedicti etc.; — Pm. *Fi.* ut extractum cichorii.

Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme.

Extractum Trifolii fibrini alcoholicum. (Ful.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
Aquae Vitae, sing. libram unam.
— purae . . . libras octo.

Post tres dies digestionis cola exprimendo, destillando alcoholem abstrahe et reliqua probe inspissa.

Extractum amarum. (RC.)

℞. Herbae Absinthii,
— Trifolii fibrini,
Rad. Gentianae, sing. . . q. vis.

Coque, exprime et consume. — Ga-

be, zehen bis dreißig Gran. — Stärkend, Verdauung befördernd.

Elixir amarum vinosum. (Ham.)

℞. Extr. Trifolii fibrini semunciam.
Vini albi . . . . uncias duas.
Dissolve.

Elixir antiscorbuticum. (Ful.)

℞. Extr. Trifolii fibrini,
— Fumariae,
— Graminis, sing. semunciam.
Aq. Chamomillae uncias decem.
— Cochleariae comp. uncias quatuor.
Acidi sulphurici semidrachmam.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura Trifolii aquatici foetida, Potio hydragoga. (*Au.*)

℞. Extracti Trifolii fibrini semunciam.
Aceti scillitici . . uncias duas.
Tinct. Asae foet. . semunciam.
Gabe, zwanzig Tropfen täglich drei Mal.

Infusum Menyanthis s. Menyanthidis s. Trifolii fibrini. (GalM. *Sa. Sw. Va.*)

℞. Fol. Trifolii fibr. unciam unam.
Aquae bullientis . libram unam.
Macera per horas duas et cola.
Va. Fol. unciam, Aquae libras duas. — Bitter, tonisch. — Gabe, vier Unzen zwei Mal täglich. (*Sm.*)
℞. Foliorum Menyanthidis semunciam.
Radicis Zingiberis scrupulos duos.
Aquae ferventis . semioctarium.
Macera per bihorium. — Eine bis zwei Unzen mit Spir. Aeth. nitr. ℥j-jj, bei Rheumatismen, Gicht und Hautaffectionen. (*Gr.*)

Infusum ad s. contra hemicraniam. (*Sm.*)

℞. Fol. Trifolii fibr. scrup. duos ad drachmam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Infunde per horas 12, cola et adde
Syrupi Valerianae . uncias duas.
Täglich auf 3 Gläser zu nehmen.

Decoctum Trifolii fibrini. (*Va.*)

℞. Herb. Trifolii fibr. unciam unam.
Aquae . . . . . libras duas.

Vinum Trifolii fibrini s. excitans. (*Au.*)

℞. Herb. rec. Trifolii fibrini semunciam.
Seminum Sinapis unciam unam.
Vini rubri . . . . libras tres.
Post sufficientem digestionem filtra. — Glasweise, bei Verdauungsbeschwerden und Wassersuchten.

Tinctura s. Essentia Menyanthis s. Trifolii fibrini. (Br. D. DD. Ful. Han. Li. Wir. *Pid. Sw.*)

℞. Herb. sicc. Trifolii fibr. part. unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.
Post tres dies digestionis exprime et filtra. (D. DD. Ful. Li.)
Pid. Herbae partem unam et Alcoholis quinque; — Han. sex Alcoholis.
℞. Herb. Trifolii fib. unc. quatuor.
Alcoholis . . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et liquorem infunde supra
Herbae Trifolii fibrini uncias duas.
Digere denuo, exprime et filtra. (Br. Wir.)
℞. Herb. Trifolii fibr. libram unam.
Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Macera per dies duos et cola exprimendo. (*Sw.*)
℞. Spiritus Trifolii fibrini libras tres.
Extr. Trifolii fibr. sesquidrachmam.
Dissolve.
Bitter, magenstärkend, antiscorbutisch, fieberwidrig. — Gabe, fünfzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura diuretica. (DD.)

℞. Aceti scillitici . . semunciam.
Essent. Trifolii fibr. drach. duas.
Misce.
Piderit Extracti semunciam, Aceti scill. uncias duas, Tinct. Aurantiorum vel Juniperi semunciam.
Reizend, bitter, harntreibend. — Gabe, sechszig Tropfen.

Tinctura s. Essentia amara. (B^a. Br. Li.)

℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Tanaceti, sing. semunciam.
Radicis Angelicae,
— Pimpinellae albae,
— Gentianae,
Gummi Hederae,
Succini flavi, sing. drach. unam.
Aquae Vitae . uncias duodecim.
Macera per dies aliquot et cola. (B^a. Br.)
℞. Herbae Trifolii fibrini,
— Scordii,
— Tanaceti, sing. unc. quatuor.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Post horas 12 digestionis trajice per linteum, abjice aquam et faecibus infunde
Alcoholis . . . . . libras duas.
Adde deinde

Fruct. Aurantii virid. contus. unc. unam.

Digere per dies quatuor, exprime leviter et filtra. (Li.)

Bitter, toniſch. — Gabe, vierzig bis ſechszig Tropfen.

Spiritus Trifolii fibrini. (Wir. *Sw.*)

℞. Herb. rec. Trifolii fibr. part. sex.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
— purae . . partem unam.

Destillet pars una cum dimidia et denuo supra novam herbam destilletur. (Wir.)

Sw. miscere Herbae libras duodecim. Alcoholis sex et Aquae tres et destillare libras sex, productum infundere supra Herbae recentis libras duodecim, addere Aquae libras duas et denuo destillando libras sex elicere.

Triosteum.

Triosteum perfoliatum, *L.*; Baſtardbrechwurzel; Trioste perfolié (*Gal.*); Feverroot, Bastard ipecacuanha, Tinkerweed (*Ang.*).

Am. Br. *C. Gr.*

♄ (Pentandria Monogynia, L.; Caprifoliaceae, *J.*) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Dill.* Elth. t. 293. f. 378.)

Die Rinde der Wurzel, welche man anwendet, bewirkt Purgiren und bisweilen Erbrechen.

Tripela.

Trioplitana terra; Trippel, Trippelerde; Tripoli (Gal.).

Br. Wir. *G. Gr. Re. Sp.*

Eine harte, rauh und trocken anzufühlende Subſtanz von weißer, gelber, rother, grüner oder brauner Farbe. Die geſchätzteſte Trippelerde, die ſogenannte Venetianiſche, kommt von Corfu: ſie iſt ſchieferartig, durchlöchert und gelblichroth.

Turpethum.

Convolvulus Turpethum, *L.*; Turpethrinde; Turbith (*Gal.*); Square stalked bind-weedroot, Indian Jalap (*Ang.*); Turbit (*B. His.*); Teori (*Beng.*); Trasta walu (*Cy.*); Tikura (*Duk.*); Dukhkulmi, Niswut (*Hin.*); Turbith (*Bel.*); Tassia (*I.*); Athapsia (*Lus.*); Triputu (*Sa.*); Schevadie vayr (*Tam.*); Tegadu vayru, Tella tagada vayru (*Tel.*).

Ams. An. Br Fer. Gal. His. His3. Wir. *A. Be. Br. G. Gr. M. Sp. Va. Z.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Convolvulaceae, *J.*) Eine Pflanze Ceylan's und Malabar's. (*Blackw.* Herb. t. 397. *Pleuck* t. 105.)

Man wendet die Wurzel (radix Turpethi albi s. vegetabilis) an; ſie iſt lang, dick, holzig, äſtig, von der Dicke eines Fingers und darüber. Sie hat eine dicke, derbe, außen grauliche, inwendig weißliche Rinde, unter welcher eine weiße, mehr löcherige Subſtanz liegt. Sie kömmt in vier bis fünf Zoll langen Stücken zu uns. Bloß die Rinde iſt wirkſam, das Mark beſitzt faſt gar keine Kräfte. Sie hat keinen Geruch; der Geſchmack iſt anfangs faſt unmerklich, wird aber dann ſehr ſtark widerlich.

Ein draſtiſches Purgirmittel, welches ſelten für ſich allein angewendet wird. *Decoctum Turpethi* 1 bis 2 Drachmen auf 2 Pfd. Waſſer. Glasweiſe, von Zeit zu Zeit bis zum Erfolg. (*Va.*)

Extractum Turpethi. (Wir.)

℞. Radicis Turpethi libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; macera et tunc parumper coque residuum in Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope, liquores ambos commisce et alcohole destillando separato, quod reliquum est ad extracti consist inspissa.

Resina Turpethi a *Gr.* indicatur.

Pulvis Diaturpethi compositus (*Gr.*), Rad. Turpethi, Jalap., Hermodact., Tart. vitriol., sing. part. aeq.

U.

Ulmus.

Man wendet in der Medicin an:

1) *Ulmus fulva*, *Mich.*; rauhblättrige Ulme; Orme d'Amerique (*Gal.*); Rough leav'd elmtree, red elm, slippery elm (*Ang.*).

Am. *C. Gr.*

Ein Baum (Pentandria Digynia, L.; Amentaceae, *J.*) Nordamerica's.

Man wendet die innere Rinde, welche ſchleimig und erweichend iſt, an.

2) *Ulmus campestris*, *L.*; Ulme, Rüſter; Orme pyramidal (*Gal.*); Elme, Elmetree (*Ang.*); Alm (*D. Suec.*); Ol-

mo (*His. I. Lus.*); Olm (*Bel.*); Kora wiazowa (*Pol.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. Li. Lon. LonN. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *Br. C. Gr. Re. Sp.*

Ein großer Baum Europa's. (*Schk.* t. 57. *Plenck* t. 72. *Lam.* Ill. t. 185. *Hayne* III. 15.)

Man wendet die innere Rinde der Zweige (cortex Ulmi interior) an; sie ist glatt, dünn, röthlichbraun und geruchlos und hat einen bittern adstringirenden, etwas scharfen und sehr schleimigen Geschmack, wenn man sie länger kaut. Man hat sie bei Hautwassersucht, Hautkrankheiten, Scropheln, Scorbut und Wechselfiebern gerühmt. Man gewinnt hiervon das *Gummi Ulmi, Ulminum* (*Gr.*)

Extractum Ulmi. (A.)

℞. Corticis Ulmi interioris . q vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Corticem pluribus coctionibus successivis penitus extrahe; liquores commisce, decantha et vaporando in balneo aquae consume.

Infusum Ulmi. (Am. B*. *C.*)

℞. Corticis Ulmi concisi unc. unam.
Aquae bullientis octarium unum.

Macera per horas 12, in vase tecto, saepius agitando et cola.

Decoctum Ulmi s. Ulmi campestris. (B*. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. RC. *C. Gr. Re. Sa. Sw. Sy. T.*)

℞. Cort. Ramor. Ulmi inter. unc. quatuor.
Aquae libras (octarios) quatuor.

Coque ad dimidii remanentiam.

RC Corticis unciam, Aquae libram ad sesquilibram; — *T.* Corticis uncias tres, Aquae libras quatuor, ad dimidii remanentiam.

Bei Aussatz und andern Hautkrankheiten empfohlen. — Gabe vier bis acht Unzen zwei oder drei Mal täglich.

Decoctum Ulmi compositum. (LP.)

℞. Corticis Ulmi (livrilho) unc. duas.
Stipitum Dulcamarae unciam unam.
Liquiritiae . . . . semunciam.
Aquae . . . . . libras tres.

Coque corticem cum stipitibus in aqua ad duas libras et sub finem adde liquiritiam. — Bei veralteten Hautkrankheiten. — Gabe, vier bis sechs Unzen, zwei oder drei Mal täglich

Decoctum diaphoreticum. (*B.*)

℞. Cort. Ulmi interioris unc. duas.
Patientiae . . . unciam unam.
Aquae . . . quantum sufficit ut librae tres colaturae obtineantur. — Bei chronischen Exanthemen in Gebrauch.

U r i n a.

Urina hominis (*Gr. Pharm. Sicil.*) Eröffnend, bei Gelbsucht. Morgens 1 bis 2 Unzen.

Urina Vaccae (*Gr.*) Eröffnend und purgirend.

U r t i c a.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Urtica urens, L.*; kleine Brennnessel, Eiternessel; Ortie brûlante (*Gal.*)

An. Ba. Br. Fer. Gal Li. *Br. Gr. M. Re.*

☉ (Monoecia Tetrandria, L.; Urticeae, *J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 739. *Bull.* t. 233. *Plenck* t. 661.)

Man wendet das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Das Kraut (herba Urticae minoris) besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, tiefgezähnten und mit sehr stechenden Haaren besetzten Blättern. Es hat einen bitterlichen Geschmack. — Die Blüthen sind grün und in kurze, achselständige, fast sitzende Trauben vereinigt. — Der Saame ist eirund, glänzend und hellbraun.

2) *Urtica dioica, L.*, große Brennnessel; Ortie dioique (*Gal.*); Common nettle (*Ang.*); Kopruca puliwa neb weltsj (*B.*); Stor braendenelde (*D.*); Ortiga mayor (*His.*); Groote brandenatel (*Bel.*); Ortica (*I.*); Pokrzywa (*Pol.*); Ortiga major (*Lus.*); Brennaetsla (*Suec.*).

Ams. Ba. Br. D. Fer. Gal Gen. Huss. His. His3. Wir. Wür. *Be. Gr. M. Re. Sp* Z.

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 365.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Urticae majoris) ist lang, linienförmig, ästig, außen bräunlich, inwendig weißlich. — Das Kraut besteht aus einem vierkantigen Stängel mit gestielten, herzförmigen, spitzigen, sägezähnigen, mit vielen sehr stechenden Haaren besetzten Blättern.

3) *Urtica pilulifera, L.*; römische Brennnessel; Ortie romaine (*Gal.*).

Bel. Wir. *Gr. M. Sp.*

☉ Eine Pflanze des mittägigen Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 321.)

Man wendet den Saamen (semen Urticae Romanae s. piluliferae) an; er ist rundlich, platt, schwärzlichbraun, dem Leinsaamen ähnlich, aber kleiner.

Succus Urticae. (*T.*)

Herbam contundendo in mortario lapideo in pultem redige et succum exprime.

Inspissamentum Urticarum, Extractum Urticae. (His. HisS. *T.*)

℞. Fol. et Stipit. Urticae . q. vis.
Contunde in mortario marmoreo et exprime succum, qui sepositione depuratus in balneo aquae ad spissi mellis consist evaporet (His. HisS.)

T. Succum cum Aqua dilutum et Albuminis calorisque ope clarificatum ad extracti consistentiam inspissare.

Syrupus de Urtica s. Urticarum. (Gal. His. HisS.)

℞ Succi Urticae coct. depur. et col., Sacchari albi, sing. part. aeq
Coque blando calore ad syrupi consistentiam. (Gal.)

His. HisS. Succi Urticae et Sacchari albi part. aeq cum Aquae q. s. clarificare et coquere ad consist. syrupi.

Dieser Syrup wird als harntreibend betrachtet.

Uva Ursi.

Arbutus Uva ursi, L.; Bärentraube; Bousserole, Raisin d'ours (*Gal.*); Trailing bearberry (*Ang.*); Miaelnebaer, Mealbär riis (*D.*); Gayub, Uba de orso (*His.*); Beerendruif (*Bel*); Uva d'orzo (*I.*); Niedwiedziego, Grona, BoroTkowe (*Pol.*); Uva de Urseo ursina (*Lus.*); Miaelonris (*Suec.*)

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. HisS. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sp. Z.*

Ein Strauch (Decandria Monogynia, L.; Ericineae, J.) Europa's. (*Oed.* Fl. Dan. t. 38. *Hayne* IV. 20. *Blackw.* t. 592. *Plenck* t. 340. *Bigel.* I. t. 6.)

Man wendet die Blätter (folia s. herba Uvae Ursi) an; sie sind kurzgestielt, eirundlänglich, stumpf, glatt und lebrig. Sie haben einen schwachen, balsamischen Geruch und einen bittern und angenehmen Geschmack.

Ein reizendes und harntreibendes Mittel dessen Arzneikräfte ganz besonders übertrieben worden sind. — Gabe des Pulvers, ein bis zwei Scrupel.

Pulvis anticalculosus. (B*.)

℞. Olei ess. Cort. Aurant. gutt. sex.
Sacchari albi . . . semunciam.
Fiat elaeosaccharum, cui adde
Pulv. Uvae Ursi . semunciam.
— Gummi Arab. drach. duas.
Gummi Jalapae drachmam unam.
Gabe, eine Drachme täglich oder alle zwei Tage. — Von Quarin bei Nierenkolik empfohlen.

Pulvis Uvae Ursi s. diureticus. (*Au.*)

℞. Herbae Uvae Ursi scrup. unum.
Elaosacch. Foeniculi gr. quinque.
Divide in doses duodecim. — Gabe, drei oder vier Stück täglich.

Pulvis lithontripticus. (*E.*)

℞. Herbae Uvae Ursi,
Chinae, singulorum drachmas duas.
Opii . . . . . grana tria.
Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich und zwei Unzen Kalkwasser hinterdrein.

Infusum Uvae Ursi. (*Gr.*)

℞. Foliorum Uvae Ursi
drachmas duas.
Aquae ferventis . semioctarium.
Macera per horas tres. — Mit kohlensauren Alkalien, Bilsenkraut oder Opium bei Krankheiten der Harnorgane; mit verdünnter Schwefelsäure und digitalis bei denen der Respirationswerkzeuge.

Mistura Infusi Uvae Ursi cum Digitale (Gr.): Infusi Uvae Ursi uncias septem cum dimidia, Acidi sulphurici diluti drachmas duas, Tincturae Digitalis drachmam, Syrupi Papaveris drachmas tres. Misce. — Bei chronischer Entzündung des Larynx, der Luftröhre und der Schleimmembran der Urinwege.

Mistura Infusi Uvae Ursi composita (*Gr.*): Infusi uncias septem cum dimidia, Potassae Carbonatis drachmas duas, Extracti Conii grana viginti, Extracti Papaveris grana viginti quinque, Syrupi Zingiberis drachmas tres. Misce. 1 bis 1½ Unzen, bei chronischen Krankheiten der Harnwege.

Decoctum Foliorum Uvae Ursi. (B*. *Au.*)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Decoque ad unciarum octo remanentiam. — Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel. (B*)

℞. Foliorum Uvae Ursi semunciam.
— Theae . drachmam unam.
G. Senegalensis . unciam unam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Coque et adde colaturae
Mellis . . . . drachmas sex.
T. ut decoctum ulmi.

Gabe, ein Löffel vier bis sechs Mal täglich.

V.

Vaccae Stercus.

Fimus Vaccae; Kuhmiſt

Wird bisweilen von dem gemeinen Manne empiriſch als Cataplasm gegen Hämorrhoiden angewendet; auch mit irgend einem fettigen Stoff vermiſcht, als Cataplasm gegen rothlaufartige Geſchwülſte.

Aqua Florum omnium. (Wir. *Gr. Sp.*)

℞. Vaccae Stercoris recentis et mense Junio (Maio *Gr.*) collecti partem unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Stercore in sacco linteo incluso, destillatio ita instituatur, ut pro libra quaque materiae stercoralis aquae sesquilibra prodeat. — Aeußerlich als cosmetiſches, innerlich als Gichtmittel, bei Kolik, Harnſteinen und Unterdrückung der Urinabſonderung.

Gr. All-flower water iſt ein Infuſum von friſchem Kuhmiſt in kaltem Waſſer; zu ½ Pinte gegen Verſtopfung und als toniſches aperiens.

Vaccinium.

Von dieſer Pflanzengattung findet man:
1) *Vaccinium Myrtillus, L.*; Heidelbeere; Airelle, Myrtille, Raisin des bois (*Gal.*); Common blue berry (*Ang.*); Myrtus, Gahody cerne, Wranj oka (*B.*); Blaebar (*D.*); Mirtillo, Arandano (*His.*); Blaaw bessen (*Bel.*); Mirtillo (*I.*); Borowkiczarna (*Pol.*); Blabeer (*Suec.*).
Ams. Br. Fenn. Ful. Gal. His. His3. Li. R. Suec. Wir. *Be. Br. Gr. M. Pid. Sp.* Z.

Ein kleiner Strauch (Octandria Monogynia, L.; Ericineae, *J.*) des nördlichen Europa's. (*Blackw.* t. 463. *Plenck* t. 298. *Hayne* II. t. 7. Düss. off. Pfl. VI. t. 11. *Zorn* Ic. pl. t. 81.)

Man wendet die Früchte, Beeren (baccae Myrtilli) an; ſie ſind von der Größe einer Erbſe und enthalten einen dunkelrothen Saft. Ihr Geſchmack iſt ſüß, ſauer und etwas adſtringirend.

Sie ſind ſchwach ſtyptiſch, kühlend und antiſcorbutiſch.

2) *Vaccinium Oxycoccos, L.*; Moosbeere; Canneberge des marais (*Gal.*); Cranberry (*Ang.*); Tranebaer (*D.*); Vacernia lagonusa (*His.*); Veen bessen (*Bel.*); Ossicocos (*I.*); Canaberga (*Lus.*).
D. Fenn. Gal. R. RC. Suec. Wir. *Be. Gr. M. Sp.*

Ein kleiner Strauch des nördlichen Europa's. (*Oed.* Fl. Dan. t. 80. *Hayne* IV. t. 18.)

Man wendet die Beeren (baccae Oxycocci) an; ſie ſind eiförmig, roth, purpurroth punctirt, mit einem rothen Safte angefüllt und von ſehr ſaurem Geſchmack.
Kühlend, antiſcorbutiſch.

3) *Vaccinium Vitis Idaea, L.*; Preißelbeere, Mehlbeere, rothe Bernitzbeere; Canneberge ponctuée (*Gal.*); Red bilberry (*Ang.*); Tyttebaer (*D.*); Arandona de frato encarnado (*His.*); Vossebessen (*Bel.*); Vite del monte Ida (*I.*); Lingon (*Suec.*).
D. Ful. Gal. Li. R. Suec. *Be. G. Gr.*
Ein kleiner Strauch des nördlichen Europa's und der Alpen. (*Hayne* IV. t. 19. Düss. off. Pfl. V. t. 14. *Zorn.* Ic pl. t. 87.)

Man wendet die Früchte (baccae Vitis Idaeae) an; es ſind runde, ſchön rothe Beeren von ſaurem und etwas bitterem Geſchmack. — Die Blätter galten lange Zeit als lithontripticum und werden noch heutzutage den harntreibenden Mitteln beigezählt. Sie ſind ſchwach adſtringirend.

Gr. führt außerdem noch an: V. uliginosum, glaucum, meridionale, macrocarpum (Oxycoccos erythrocarpus) etc.

Succus e Baccis Myrtillorum. (Ful. *Pid. T.*)

℞. Bacc. Myrtillorum matur. q. vis.
Contusas per aliquot dies in cavam sepone; exprime deinde succum et adhuc per aliquot dies in cava relinque, cola et in lagenis longicollibus penitus replendis a strato olei tectum in loco frigido serva.
T. Baccas inter manus conterere, succum ad locum frigidum seponere, filtrare, cuique librae Sulphitis calcarei grana sex addere et servare.
Säuerlich, zu einigen Unzen als Zuſatz zu Mixturen; ſtatt des Weineſſigs zu gebrauchen.

Succus e Baccis Oxycocci s. Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Baccarum Oxycocci quantum vis.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat blando calore syrupus.

Succus Oxycocci cum Nitrate Potassae. (RC.)

℞. Nitratis Potassae unciam unam.
Succi Oxycocci . libram unam.
Misce solvendo. — Si libet, duas vel tres uncias Tincturae Calami uti-

liter addes. — Gabe, eine Unze bis ein halbes Pfund in getheilten Dosen täglich; bei Scorbut und scorbutischer Ruhr.

Roob Myrtillorum s. Vaccinii Myrtilli. (Ful. Li. *Sw.*)

℞ Baccarum Myrtilli quantum vis. Contunde in mortario, sepone per dies aliquot, exprime succum et eum, igne ardente, cum Sacchari quadrante ad mellis consistentiam usque consume.

Im nördlichen Europa statt des roob mororum gebraucht.

Roob Oxycocci s. Vaccinii Oxycocci. (R. *Sw.*)

℞. Baccarum Oxycocci quantum vis. Contunde in mortario, sepone per tres dies et exprime succum, qui cum Sacchari quadrante blando igne ad consistentiam mellis coquatur. (*Sw.*)

R. RC Sacchari libram unam pro sex Succi.

Säuerlich, kühlend; statt des roob mororum zu gebrauchen. — Gabe, bis eine Unze.

Gelatina Oxycocci (*Re.*): Succi express. partes duas, Gelatinae Cetacei concentr. unam, misce, adde Saccharum, coque et exprime.

Roob Baccarum Vitis Idaeae s. Vitis Idaeae. (Ful. Li. Sax. *Sw.*)

℞. Bacc Vitis Idaeae . . . q. vis. Contunde in mortario, sepone per tres dies, exprime succum et sepone, qui decanthatus, blando igne cum Mellis quadrante ad consist. mellis coquatur. (Ful. Li. *Sw.*)

Sax. Sacchari partem unam et sedecim Succi.

Säuerlich, kühlend, kann ebenfalls statt des roob mororum benutzt werden

Syrupus Myrtilli s. Myrtillorum. (Br. Ful. His. His3. Pal. Suec. Wir. Wür. *Pid.*)

℞. Succi Bacc. Myrtill. rec. expr. libram.
Sacchari albi . . . libras duas.
Dissolve blandi caloris ope (Suec.)

His. His3. Succi libras duas et uncias duas, Sacchari libras quatuor; — Br. Pal Wir. Wür. et *Pid.* Succi uncias decem, Sacchari sedecim; — Ful. Cujusque partes aequales.

Syrupus adstringens Jouberti. (*Pie.*)

℞. Bacc. Myrtillor. drach. triginta.
Berberidis,
Foliorum Rhois,
Balaustiorum, sing. drach. viginti.
Fruct. Mespili,
Fruct. Sorbi immat., sing. unc. tres.
Succi Granati,
— Cydoniorum, sing. libr. duas.
Coque simul et colaturae adde
Sacchari albissimi libras quinque.
Adde
Santali citrini . semunciam, vel
Cinnamomi . . drachmas duas.

Syrupus Baccarum Oxycocci. (B*. Suec.)

℞. Succi Oxycocci . libram unam.
Sacchari albi . . . libras duas.
Fiat blando calore syrupus.

Valeriana.

Wir führen hier besonders an:

1) *Valeriana Phu, L.*; großer Baldrian; Grande valériane (*Gal.*); Garden valerian (*Ang.*); Kozltjk velsij (*B.*); Storbaldrian (*D.*).

Br. D. Fer. His. His3. Suec. Wir. *Be. G. Gr. M.*

♃ (Triandria Digynia, L.; Valerianeae, *J.*) Eine Pflanze der gemäßigten Theile Europa's. (*Blackw.* Herb. t. 250. *Plenck* t. 28. *Hayne* III. t. 35.)

Man wendet die Wurzel (radix Phu s. Valerianae majoris) an; sie ist dick, lang, runzelig, faserig, außen blaßbraun, inwendig weißlich, und hat einen widerlichen Geruch und einen unangenehmen, bittern und scharfen Geschmack.

2) *Valeriana officinalis, L.*; gemeiner Baldrian; Valériane sauvage (*Gal.*); Officinal valerian, Wild valerian (*Ang.*); Kozlik obecky (*B.*); Baldrian, Aeienrod valerian, Vildnardus, Valandsrod, Venderod, Vendmosrod (*D.*); Valeriana (*His. L. Lus*); Wilde valerian (*Bel.*); Kozlki, Koztkowy (*Pol.*); Balderjan (*R.*); Ulvendeirot (*Suec.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Hass. HassP His. His3. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pm. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *Be. Br. C. G. Gr. M. Par. Pid. Re. Sa. Sp. Z.*

♃ Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Hayne* III. 32. *Blackw.* t. 271. *Plenck* t. 27. Düss. off. Pfl. VII. t. 10. *Lam.* Ill. t. 24. fig. 1. Fl. méd. VI. 343.)

Man wendet die Wurzel (radix Valerianae minoris s. sylvestris) an; sie ist außen gelblich, inwendig weißlich, besteht aus vielen länglichen Fäserchen, ist frisch fast geruchlos, bekommt aber nach dem Trocknen einen übeln, durchdringenden, eigenthümlichen Geruch und hat einen scharfen und bittern Geschmack.

Sie enthält, nach Trommsdorf, ein

flüchtiges, kampherartiges, grünliches Oel, Schleimharz, Satzmehl, Harz und einen eigenthümlichen Stoff.

Ein sehr kräftiges Reizmittel, welches besonders auf das Nervensystem wirkt und welches man vorzüglich in Nervenkrankheiten anwendet; auch hat man es als Fiebermittel benutzt. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme bis eine Unze und selbst mehr, zwei oder drei Mal täglich.

Valeriana montana (*Gr.*), Wurzeln gewürzhaft, bei Hysterie und Epilepsie; V. Locusta und rubra.

§. I. Präparate, welche den Baldrian in Substanz enthalten.

Species antispasmodicae. (Wür. *Huf. Pid.*)

℞. Radicis Valerianae uncias tres.
Fol. Aurantiorum . uncias duas.
Herbae Millefolii unciam unam.
Concisa misce. (Wür. *Pid.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Caryophyllatae,
Herbae Menthae piperitae,
Fol. Aurantior., sing. part. aeq.
Concisa misce. (*Huf.*)
Gabe, zwei Kaffeelöffel zum Aufguß.

Pulvis nervinus s. antispasticus s. epilepticus s. roborans antispasmodicus s. antispasmodicus s. Valerianae aromaticus. (B. BorC. DD. Ful. GalM. Ham. *Au. B. Huf. Sm. Va.*)

℞. Radicis Valerianae,
Fol. Aurantii, sing. drach. duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae partes viginti.
Cinnamomi . . . partes tres.
Fiat pulvis. (GalM.)

Va. Valerianae drachmam, Cinnamomi grana duodecim; — *Au.* Valerianae drachmas duas, Cinnamomi scrupulum et Elaeosacchari Valerianae sesquidrachmam.

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Ligni Quassiae . . semunciam.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Rad. Valerianae scrupulum unum.
Camphorae . . granum unum.
Pulvera. (DD.)

℞. Radicis Valerianae semidrachmam.
Cinnamomi . . grana quinque.
Elaeosacch. Valerianae scrupulum.
Fiat pulvis. (BorC.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Sacchari albi, sing. drach. duas.
Olei Valerianae . . guttas sex.
Fiat pulvis. (Ham.)

℞. Oculorum Cancri,
Rasurae Cornu Cervi,
Radicis Valerianae,
Visci querni, sing. . partes aeq.
Fiat pulvis tenerrimus. (B*. *Huf.*)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
— Paeoniae . drachmas duas.
Rasurae Cornu Cervi drach. tres.
Olei Nucis moschatae grana tria.
Sacchari . . . . uncias tres.
Fiat pulvis. (*Sm.*)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Tartari tartar., sing. drach. duas.
Fiat pulvis. (Ful.)

℞. Rad. Valerianae . drach. unam.
Fol. Aurantii . scrupulum unum.
Salis Ammoniaci . grana duo.
Olei Cajeput . guttas quatuor.
Fiat pulvis. (B*.)

℞. Valerianae . . semidrachmam.
Subcarbonatis Magnesiae,
Salis Ammoniaci, sing. grana tria.
Olei Cajeput . . guttas duas.
Fiat pulvis. (B*. *Au.*)

℞. Valerianae . drachmam unam.
Iridis Florentinae sesquidrachmam.
Liquiritiae . . drachmas duas.
Anisi . . . . semidrachmam.
Croci . . . . . grana octo.
Subcarb. Magnesiae drachmam.
Fiat pulvis. (*Au.*)

℞. Valerianae . . unciam unam.
Florum Zinci . scrupulum unum.
Moschi . . . . grana decem.
Fiat pulvis. (*B*)
Im Allgemeinen ist die Gabe aller dieser Pulver zwanzig Gran.

Pulvis anthelminticus. (*Au.*)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
— Jalapae,
Sulphureti Mercurii nigri,
singulorum drachmam unam.
Gabe, von Zeit zu Zeit einen Kaffeelöffel.

Boli ad epilepticos s. Valerianae. (GalM. *Ra. Sa. Sw. Va.*)

℞. Radicis Valerianae partes decem.
Cinnamomi . . . partes tres.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiat massa. (GalM.)

℞ Radicis Valerianae semidrachmam.
Syrupi Sacchari sesquidrachmam.
Commisce. (*Sa.*)
Sw. Syrupum Florum Aurantiorum adhibet; — si requiritur, Castorei grana decem, vel Oxydi Ferri nigri septem adduntur.

℞. Radicis Valerianae grana viginti.
Sulphatis Potassae . grana duo.
Syrupi Cort. Aurant. . . q. s.
Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

Pilulae Valerianae.

℞. Radicis Valerianae pulveratae,
Extracti Valerianae, sing.
drachm. unam
Olei Valerianae . guttas decem.
Misce fiant pil. pond. grji. — Fünf bis funfzehen Stück.

Pilulae antispasmodicae s. antiepilepticae. (*Ca. Ra. Sm. Va.*)

℞. Valerianae . . . drachmas sex.
Galbani,
Sagapeni, sing. sesquidrachmam.
Asae foetidae . drachmam unam.
Fiant pilulae trium granorum. (*Ca.*)

℞. Valerianae . . grana triginta.
Castorei . . . grana quatuor.
Oxydi Zinci . . grana viginti.
Syrupi Sacchari quantum sufficit.
Fiant pilulae tres. (*Ra. Va.* Hôt. D.)
— Von Dupuytren angewendet.

℞. Butyri Cacao drachmas quatuor.
Acetatis Potassae,
Valerianae, sing. drachmas duas.
Castorei . . drachmam unam.
Cinnabaris . scrupulum unum.
Syrupi Florum Aurantiorum q. s.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

℞. Valerianae . . unciam unam
Limaturae Ferri,
Catechu,
Cascarillae, sing. drachmas duas.
Syrupi Chinae quantum sufficit.
Fiant pilulae trium granorum. (*Sm.*)

Conditum epilepticum, Electuarium antispasmodicum s. antiepilepticum. (LP. *Fi. Sm. Sw*. Va.*)

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Subcarb. Magnesiae drach. duas.
Syrupi Paeoniae quantum sufficit.
Misce. (*Sm.*)

℞. Radicis Valerianae,
Fol. Aurantii, sing. . drach. sex.
Syrupi Absinthii quantum sufficit.
Misce. (*Sw*. Va.*)
Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

℞. Corticis Salicis . drachmas sex.
Radicis Valerianae,
Fol. Aurantii, sing. drachmas duas.
Sulphatis Cupri ammoniac.
scrup. unum.
Misce ut fiat cum Syrupo communi electuarium. (LP.) — Gabe, eine Drachme alle drei Stunden. — Interdum Opium addere convenit.

℞. Pulv. Chinae,
— Valerianae,
— Fol. Aurantii, sing. unciam.
Mellis despumati uncias novem.
Gabe, von zwei bis vier Drachmen. (*Fi.*)

Electuarium anthelminticum. (B*. Ham. Han. R. WW.)

℞. Sulphatis Potassae,
Rad. Jalapae,
— Valerianae, sing drach. unam.
Oxymellis scillitici uncias quatuor.
Misce. (B*. R.)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
— Jalapae . scrupulos duos.
Seminis Cinae . drachmas duas.
Mellis Liquiritiae . uncias tres.
Misce. (Ham.)

℞. Seminis Cinae . unciam unam.
Valerianae,
Jalapae, sing. . drachmas duas.
Sulphatis Potassae . semunciam.
Oxymellis scillitici uncias quinque.
Misce. (Han.)

WW. Valerianae sesquidrachmam, Jalapae drachmam, Seminis Cinae semunciem, Sulphatis drachmas duas, Oxymellis scill. sex et Mellis despumati q. s.

Gabe, eine bis zwei Drachmen für Kinder, eine halbe Unze für Erwachsene, täglich vier Mal.

Linctus vermifugus, Looch vermifugum. (*Sa.*)

℞. Pulv. Valerianae . drach. unam.
Olei Olivarum . unciam unam.
Subige bene.

Potio antiepileptica. (*Bo.*)

℞. Aquae Cerasorum nigrorum,
— Tiliae,
— Flor. Aurant, sing.
unc. duas.
Pulv. de gutteta,
— Valerianae, sing. semidrach.
Syr. Kermetis veget. drach. tres.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Potio excitans et antispasmodica. (*Pie.*)

℞. Rad. Valerianae . . grana 24.
Liq. anod. Hoffm. gutt. triginta.
Aquae Menthae,
— Cinnam. hordeat., sing.
unc. duas.

Mistura antispasmodica. (*Gr.*)

℞. Radicis Valerianae
scrupulum unum.
Tincturae Valerianae ammoniatae,
— Castorei, sing. drachmam.
Misturae Camphorae
drachmas duodecim.
Auf eine Gabe, täglich drei Mal.

§. II. Präparate, welche nur den wirk-

ſamen Stoff des Baldrians enthalten.

A Auszug durch Waſſer.

Infusum Valerianae. (Am. B*. BorC. Du. Ham. GalM. RC. WW. *C. Gr. Huf. ParC. Ra. Re. Sa. Sw. Va.*)

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias septem.
Digere per horam et post refrigerationem cola. (Am. Du. *C. Gr. Re.*)

Ra. Va. Char. et Hôt. D. Radicis unciam et Aquae libras duas; — B*. DD. et RC. Radicis unciam et Aquae libram (interdum adduntur Aetheris sulph. alcoholis. drachmae duae, vel Tinct. arom., vel Tinct. Calami semuncia RC.); — Ham. Radicis unciam et Aquae q. s. ut colaturae unciae octo obtineantur; — BorC. et WW Radicis sesquiunciam et Aquae sesquilibram; — *ParC.* Valerianae, Liquiritiae, sing. drachmas duas et Aquae octarium; — *Huf.* Valerianae semunciam et Aquae q. s. ut unciae octo infusi obtineantur; — *Va.* drachm. unam ad quatuor, Aquae libras duas.
Reizend, nervenſtärkend, Ausdünſtung befördernd. — Gabe, alle Stunden einen bis zwei Löffel.

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Post duas horas macerationis colaturae adde
Spir. Lavand. comp. drach. sex, vel
Tinct. Valerianae ammon. drach. tres.
Misce. (*Sa. Sw.*)

Syrupus Valerianae s. Valerianae Radicis. (Ham. *T. Va.*)

℞. Radicis Valerianae uncias octo.
Aquae bullientis . . libras tres.
Infunde per horas aliquot, cola et colaturae unciis viginti adde
Sacchari albi . libras quatuor.
Fiat syrupus. (Ham. *Va.*)
T. Aquae bull. libras duas, horas 12 infusionis et Sacchari libras quatuor.

Infusum Valerianae compositum s. fortius s. tonico-nervosum. (DD. *Au. Gr. Va.*)

℞. Rad. Valerianae,
— Calami, sing. unciam unam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Aquae bullientis uncias duodecim.
Digere ad refrigerationem usque, cola fortiter exprimendo et colaturae adde
Essent. Trifolii fibr. drach. tres.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce bene. — Gabe, eine halbe Unze. (DD.)

℞. Radicis Valerianae semunciam.
Aquae ferventis . semioctarium
Macera per horas duas, cola et adde
Spiritus Lavandulae compositi,
Syrupi Aurantii, sing. semunciam.
Gabe, eine halbe bis zwei Unzen täglich 3 Mal, bei Hyſterie und andern Nervenleiden. (*Gr.*)

℞. Rad. Valerianae drach. duas ad sex (tres *Va.*).
Aquae bullientis . uncias octo.
Infunde et colaturae refrig. adde
Aq. Cinnamomi simpl. unc. duas.
Liquoris Hoffmanni drachmas duas.
Syrupi cujuslibet unciam unam.
Misce. (*Au. Va.*) — Gabe, alle zwei Stunden oder ſelbſt ſtündlich einen Löffel.

℞. Radicis Valerianae drachmas duas.
Aquae bullientis unciam unam.
Infunde et colaturae adde
Aquae Cinnamomi unciam unam.
Millepedes viventes . . no. 50.
Post horas 12 digestionis super arenae balneo, cola exprimendo et adde
Syr. Cort. Aurant. . unc. unam.
Tincturae Opii . . guttas sex.
Misce et momento quo uteris adde Gasis hydrogenii puri pollucem cubicum. — Man hat dieſen Trank bei Amauroſe empfohlen. (*Au.*)

Infusum excitans. (LH.)

℞. Radicis Valerianae,
Foliorum Aurantii,
Florum Arnicae, sing. drach. unam.
Infunde
Aquae fervidae . . libra una.
Cola. — Gabe, drei Unzen zwei Mal.

Infusum nervinum. (*Sa.*)

℞. Radicis Valerianae sesquiunciam.
Decocti Chinae . . libras duas.
Infunde et colaturae adde
Syrupi Chamomillae sesquiunciam.
Camphorae c. Mucil. G. Arab. trit. gr. viginti.
Misce.

Clyster anthelminticus, Enema anthelminticum.

℞. Herbae Absinthii,
Rad. Valerianae, sing. unc. unam.
Tanaceti,
Cort. Aurantior., sing. semunciam.
Man gießt auf zwei Eßlöffel dieſes Pulvers ein Pfund kochendes Waſſer, läßt es eine Nacht lang ziehen und ſeiht und drückt es dann aus. Dieß iſt für zwei Klyſtire, zu deren jedem man einen Löffel Hirſchhornöl ſetzt. — Von Bremſer gerühmt.

Potio antispasmodica. (*Sm.*)

℞. Visci querni,
Rad. Valerianae,
— Paeoniae, sing. drach. duas.
Foliorum Aurantii pugillum unum.
Aquae . . . . octarium unum.
Decoque ut quarta pars consumatur.

Potio excitans. (GalM. *Au. B. Va.*)

℞. Valerianae drach. duas c. dim.
Aquae . . . quantum sufficit ut decocti unciae quatuor obtineantur; colaturae adde
Syrupi Sacchari . unciam unam.
Tinct. Cinnamomi grana decem.
Misce. (GalM.)

Va. Tincturae semidrachmam, caetera ut antea.

℞. Valerianae . . drachmam unam.
Decocti Chinae quantum sufficit ut infusi unciae octo obtineantur; colaturae adde
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Tincturae thebaic. guttas triginta.
Misce bene. (*B.*)

℞. Camphorae . scrupulum unum.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Solutioni adde
Extracti Valerianae drachmas sex.
Aquae Menthae pip. uncias sex.
Laudani Sydenh. . drach. unam.
Gabe, alle zwei oder drei Stunden einen halben Löffel.

Extractum Valerianae aquosum s. frigide paratum (A. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. Du. Ful. Gal. Han. His. His3. Li. Pm. Sax. Suec. *Fi. Gr. Pid. Re.*)

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
In pannum laneum involutae Aquam fervidam infunde, donec haec saporis expers prodeat; liquorem deinde lente ad extracti consist. consume. (Ful.)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Macera per horas 24 et cola exprimendo; sepone per horas 2, decantha et ad consist. requisitam inspissa. (Ba.)

℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae frigidae . libras quatuor.
Macera per horas 24, subinde agitando et cola; residuum itidem cum nova Aqua maceratum coletur; tunc colaturae commixtae ad extracti consist. evaporent. (Gal.)

Bor. Han. et Sax. duos dies macerationis in Aquae partibus duodecim, evaporationem ad sextam usque partem, filtrationem et evaporationem in balneo aquae; — Bor4. Radicis libram, Aquae dest. q. s. ut aqua ad pollicem usque emineat, macerare per horas 48, saepius agitando, et liquorem exprimere, hanc operationem bis terve repetere, liquores etc. ad mellaginis consist. inspissare, massam refrigeratam Aquae dest. ea quantitate diluere ut filtrari possit, tunc liquorem in balneo vaporis iterum ad mellaginis consist. inspissare.

℞. Radicis Valerianae libram unam.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco calido, tunc parumper coque, cola exprimendo et colaturam ad extracti consistentiam consume. (Br.)

Pid. coquere Radicis libram unam in Aquae octo et dimidium consumere.

℞. Rad. Valerianae pulv. uncias sex.
Aquae bullientis . . libras tres.
Post horas 24 digestionis in loco calido, cola exprimendo et liquorem ad aptam consist. consume. (Du. *Gr.*)

Pm. Valerianae uncias sex cum Aquae ferventis libris sex per horas tres infundere, cum expressione colare, decantare et liquorem cum Albumine Ovi clarificatum balnei maris ope ad extracti consistentiam redigere.

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae bullientis . . partes octo.
Coque leviter per ½ horam et cola exprimendo; residuum coquatur cum Aquae partibus quatuor et itidem coletur; tunc liquores ambos commisce, post sufficientem sepositionem decantha et ad extracti consist. consume. (An. Fer. *C.*)

A. Radicem pluribus coctionibus repetitis penitus extrahere, liquores commiscere, post sufficientem digestionem decantare et in balneo aquae consumere; — Suec. Valerianam cum Aquae duplo, tunc secundo cum nova Aqua decoquere et liquores ambos commixtos in balneo aquae consumere; — B. digerere illam per horas 24 et per duas coquere in Aquae partibus decem et residuum denuo coquere per horas duas cum Aquae novae partibus decem; — Ams. coquere illam primo cum vigenti, deinde cum quindecim partibus Aquae, qualibet coctione ad dimidias partes redigendis; — His. digerere Radicem per horas 24 et tunc coquere per duas cum Aquae partibus decem et residuum cum nova Aquae quantitate ad dimidium decoquere; — *Fi.* Radicis libram unam cum Aquae pluv. duodecim in alembico per horam coquere, post refrigerationem colare et exprimere, fluidum clarissimum decantare et ad remanentiam partis sextae, tunc ad extracti consistent. consumere.

T. ut extractum trifolii fibrini; — *Extractum siccum* (*T.*) ut extractum siccum chinae.

Gabe, von einem Scrupel bis eine Drachme.

A. Auszug durch Bier.

Cerevisia antispasmodica. (*Vm.*)

℞. Radicis Valerianae partes quinque.
Fol. Rorismarini,
— Salviae, sing. part. unam et d m.
Serpentariae Virgin. partem unam.
Cerevisiae fortis . . partes 128.

Post octo vel decem dies macerationis cola.

Cerevisia cephalica. (*Ca. Sa.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Sinapis . . . . drachmas sex.
Rorismarini . drachmas quatuor
Serpentariae Virg. drachmas tres.
Cerevisiae . . . octarios octo.

Macera per duos dies et cola. (*Sa.*)

Ca. Valerianae uncias decem, Sinapis sex, Rorismarini tres, Salviae tantidem, Serpentariae duas et Cerevisiae octarios quadraginta.

C. Auszug durch Wein.

Infusum Valerianae vinosum, Vinum Valerianae. (B*.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Vini albi . . . libram unam.

Digere per horas 24 et cola. — Gabe alle Stunden oder zwei Stunden einen Löffel.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura s. Essentia Valerianae sylvestris s. officinalis (simplex) s. Radicis Valerianae. (A. Am Ams. An. Bel. Bor. Bor4. Br. DD. Du. Ful. Han. HassP. LH. Lon. LonN. Pm. Pol. Sax. *Br. Gr. Huf. Re. Sw. Vm.*)

℞. Rad. Valerianae sylv. sicc. concis. unc. duas.
Alcoholis 0,910) libram unam.

Post sufficientem digestionem filtra. (A. Ams. *Huf.*)

LH. Radicis et Alcoholis 20° easdem quantitates, sed digestionem per quatriduum; — An. Valerianae partem unam et Alcoholis 20° sex; — Pm. Easdem quantitates ut An. sed macerationem per dies sex; — B. et Bel. Alcoholis 15° sex; — Am. Du. Lon. LonN. *C. Gr. Re.* Radicis uncias quatuor et Alcoholis (0,930) octarios duos; — *Vm.* Radicis partem unam et sex Aquae Vitae; — Br. quinque Alcoholis; — Bor. Bor4. Han. et Pol. Radicis uncias quinque et Alcoholis (Spiritus Vini rectificatis.) libras duas; — Sax. Radicis partem unam et quatuor Alcoholis; — DD. et *Sw.* sex Alcoholis; — LP HassP. Radicis uncias quatuor, Spiritus Vini rectif. libras duas; — *T.* easdem quantitates, sed Alcoholem 25° et digestionem per octiduum.

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Aquae Chamomillae uncias sex.
Alcoholis . . . . uncias duas.

Post sufficientem infusionem cola exprimendo. (Ful.)

Reizend, krampfstillend, nervenstärkend, wurmtreibend und Ausdünstung befördernd. — Gabe, dreißig bis sechzig Tropfen.

Extractum Valerianae alcoholicum. (B. D. HassP. Li. Pol. Wür.)

℞. Radicis Valerianae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis libras novem.

Digere per horas 12, cola exprimendo, alcoholem destillando separa et residuum ad aptam consist. consume. (Pol.)

B. HassP. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — D. Radicis partem unam, Alcoholis duas et quatuor Aquae.

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
Alcoholis . . quantum sufficit ut quatuor digitorum crassitiem tegatur.

Digere in loco calido et decantha; coque per horam unam in Aqua et cola exprimendo; tincturam consume ad mellis consist. usque, colaturam in fine addendo et continue agitando, ut massa sit homogenea neque grumosa. (Li. Wür.)

Tinctura Valerianae camphorata. (Ham.)

℞. Rad. Valerianae sylv. unc. duas.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis . . . uncias octo.

Digere ad perfectam extractionem usque et cola.

Tinctura s. Essentia Valerianae composita. (Br. Wir. *Pid. Vm.*)

℞ Rad. Valerianae,
— Serpentar. Virg., sing. unc. unam.
Camphorae . drachmam unam.
Alcoholis . . . . uncias octo.

Post sufficientem digestionem exprime et filtra. (Br. Wir. *Pid.*)

℞. Rad. Valerianae unciam unam.
— Serpentar. Virg. semunciam.
Aquae Vitae . . . uncias octo.

Infunde, tunc exprime, filtra et colaturae adde

Camphorae . drachmam unam.

Solutionem serva. (*Vm.*)

Reizend, giftwidrig, auf den Uterus und gegen Epilepſie wirkſam. — Gabe, vierzig bis ſechszig Tropfen.

Tinctura antispasmodica et tonica. (*Pie.*)

℞. Radicis Valerianae,
Pulv. Chinae, sing. drach. duas
— Ipecacuanhae grana triginta.
Decocti bull. Capit. Papav. albi contus. . . . uncias sedecim.

Infunde per horas 24 in vase tecto et adde demde

Syr. Hederae terrest. unc. unam.

Reizend. — Gabe, ein Eßlöffel täglich drei Mal.

Tinctura nervina (nervalis) et tonica. (*Ca. Vm.*)

R. Radicis Valerianae,
Herb. Menthae pip. sesquiunciam.
Castorei . . . unciam unam.
Croci . . . . semidrachmam.
Essent. Menthae . drach. unam.
Alcoholis . . . . libras duas.

Digere, cola exprimendo et filtra. (*Ca.*)

℞. Castorei . . . . partes duas.
Croci . . . . . partem unam.
Aquae Vitae,
— Menthae pip., sing. part. viginti.

Infunde frigide per plures dies et adde

Radicis Valerianae partes duas.

Post aliquot dies exprime fortiter et filtra. (*Vm.*)

Reizend, bei Leiden von Schwäche und Magenkrampf. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen.

Aqua hysterica (*Gr.*): Tinct. Valer. semunciam, Ol. Puleg. gutt. duodecim, Ol. Rutae tres, Spir. Vin. rectif., Aquae, sing. libram, misce. — Krampfſtillend, emmenagogiſch.

Tinctura s. Essentia Valerianae ammoniata s. volatilis. (Am An. B*. Bor. Bor4. D. Du. Ed. Gen. Han. LH. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. Wür *C. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Rad. Valerianae sylv. part. unam.
Alcoholis ammoniacalis partes sex.

Digere frigide per plures dies in vase tecto, subinde agitando et cola deinde. (B*. Bor. Bor4. D. Gen Han. O. Pol. RC. Sax. Wür. *Sw.*)

Du. Radicis uncias duas et Alcoholis ammoniac. octarium; — Ed. Radicis uncias quatuor et Alcoholis ammoniac. octarios duos cum dimidio; — *Vm.* Radicis partem unam et octo Alcoholis ammoniac.

℞. Radicis Valerianae uncias quatuor.
Tinct. aromat. ammon. octar. duos.

Post quatuordecim dies frigidae macerationis cola. (Am. Lon. LonN. *C. Gr. Re.*)

Lus. Radicis uncias quatuor, Tincturae libras duas cum dimidia et octo dies macerationis; — LH. Tinct. Valerianae libram, Ammoniaci liq unciam, Olei vol. Limonis et Nucis mosch., sing. drachmam, et digestionem per tres dies; — LP. Valerianae uncias quatuor, Alcoholis viginti, Ammoniaci liq. octo, Ol. vol. Rorismarini drachmas duas et macerationem per dies sex.

℞. Rad. Valerianae pulv. unc. duas.
Solutionis Subcarbonatis Ammoniaci alcoholicae libram unam.

Macera per dies octo, vas saepius agitando et cola. (Suec.)

℞. Valerianae gross. pulv. sesquiunciam.
Alcoholis (30°) uncias quatuor.
Ammoniaci liquidi (19°) unc. duas.

Macera per dies sex in vase tecto, subinde agitando, tunc cola frigide et filtra (An.)

Gr. Radicis libram, Spir. Cornu Cervi septem, Spirit. Vini rectif. libram.

Ein Reizmittel, welches man in mehreren krampfhaften Krankheiten, beſonders bei Epilepſie und Hyſterie empfohlen hat. — Gabe, ein halber Scrupel, eine bis drei Drachmen in einem paſſenden Vehikel, z. B. Milch oder Hafergrütze. — Niemann ſchlägt als ein milderes Mittel eine Miſchung aus: Subcarbonatis Ammoniaci liq. pars una, Tinct. Valerianae alcohol. simp. partes duae, vor.

Tinctura ammoniacea Valerianae composita. (*Pie. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae uncias duas.
Olei ess. Citri . drach. unam.
Caryophyllorum semidrachmam.
Spir. Salis Ammoniaci semunciam.
Alcoholis . . . uncias sedecim.

Digere in balneo aquae per duos vel tres dies et filtra. (*Pie.*)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Caryophyllorum,
Macidis, sing. drachmam unam.
Cort. rec. Citri sesquidrachmam.
Tinct. aromat. ammoniac. unc. 24.

Post aliquot dies frigidae reactionis exprime et filtra.

Reizend, gegen Epilepſie empfohlen. —

Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen in einem Baldrianaufguß.

Aqua acustica Ludovici. (Pal. *Sp.*)

℞. Radicis Valerianae,
— Levistici,
Herbae Rorismarini,
Florum Lavandulae, sing.
semunciam.
Baccarum Lauri,
Castorei,
Camphorae, sing. drachm. duas.
Spiritus Juniperi . libram unam.
Post quatuor dies macerationis adde
Ammoniaci liquidi . semunciam.
Olei Juniperi . semidrachmam.

Man bringt einige Tropfen davon auf Baumwolle in den Gehörgang ein.

E. Auszug durch Aether.

Tinctura Valerianae aetherea s. anodyna, Tinctura antispasmodica Keupii, (B*. Bor. Bor4. Fenn. Ham. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. RC. Sax. Suec. WW. *Au. Br. Ca. Pic. Sw. T. Vm.*

℞. Rad. Valer. gross. pulv. unc. unam.
Liquoris anod. min uncias octo.

Digere frigide per dies tres in vase tecto et filtra. (B*. Bor. Bor4. Fenn. Han. Pol. Sax *Sw.*)

Hass. Valerianae uncias duas et Liquoris anodyni libram; — *Pic.* Radicis uncias octo, Liquoris sesquilibram; — *Vm.* Radicis partem unam et decem Liquoris; — *Br.* Radicis uncias tres, Liquoris libram et digestionem blando calore; — Ham. Li. O. et *Ca.* Radicis partem unam et quatuor Liquoris; — HassP. Valerianae unciam unam, Liquoris sex; — RC. Radicis unam et Aetheris sulph. octo; — *T.* Valerianae drachmas duas et Aetheris 56° unciam per duos dies macerare.

℞. Rad. Valerianae pulv. unc. unam.
Alcoholis concentrati uncias sex.

Digere blando calore in vase tecto et colaturae filtratae adde

Aetheris sulphurici drachmas duas.

Commisce bene. (Suec. WW.)

Au. Valerianae uncias sedecim, Alcoholis viginti et Acidi sulph. duodecim.

Reizend, bei sogenannten nervösen Krankheiten, insbesondere Convulsionen, Krämpfen und Hysterie empfohlen — Gabe, ein bis vier Scrupel drei oder vier Mal täglich in einer Tasse Melissen- oder Pfefferminzthee.

Tinctura Valerianae camphorata s. Valerianae aetherea camphorata. (*Au.*)

℞. Camphorae . . semidrachmam.
Tinct. Valerianae aethereae
drachm. tres.

Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in anomaler Gicht.

Tinctura anodyna. (B*.)

℞. Radicis Valerianae unciam unam.
Cort. Aurantii Curass. drach. duas.
Aetheris sulphurici uncias quatuor.

Digerantur blandissimo calore per dies octo et sub finem leviter ebulliant. — Reizend, krampfstillend. — Gabe, vierzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura antispasmodica. (B*.)

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari, sing. unciam unam.
Liquoris anod. min. . uncias sex.

Post sex dies digestionis filtra.

Riemann hat diese Formel auf folgende Weise verändert:

℞. Radicis Valerianae,
Herbae Mari, sing. . semunciam.
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Acidi sulph. Aqua diluti
drach. unam.

Digere blando calore per horas quatuor.

Reizend, krampfstillend, gegen Epilepsie. — Gabe, ein Kaffeelöffel in Wein.

Elixir antispasmodicum. (Ful. *Sw*. Vm.*)

℞. Tincturae Valerianae uncias duas.
Liquoris anod. min. drachm. duas.

Misce et in illis dissolve

Camphorae pulv. drachm. unam.

Serva. (*Vm.*)

℞. Radicis Valerianae,
Rad. Serpentar. Virg., sing.
unciam unam.
Alcoholis . . uncias duodecim.

Post sufficientem infusionem cola exprimendo, filtra et adde

Aetheris sulphurici . uncias duas.
Camphorae . drachmam unam.

Dissolve. (*Sw*.*)

℞. Camphorae . drachmam unam.
Aetheris sulphurici uncias duas.

Solutioni adde

Extracti Valerianae unciam unam.
Aquae Chamomillae . uncias sex.

Misce. (Ful.)

Gabe, ein bis zwei Scrupel täglich mehrmals.

F. Auszug durch Destillation.

Oleum Valerianae aethereum, Aethereolum Valerianae. (A. Ba. Bel. Bor. Bor4. Han. Hass. HassP. Li. O. Pol. R. Sax. *Sw. T.*)

℞. Radicis Valerianae quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.

Destillent. (Bel. R.)

Sw. T. Radicis partem unam et quatuor Aquae (*T.* post macerationem per unum diem, dimidium destillando abstrahere et super novam materiam cohobare); — Bor. Bor4. Han. HassP. O. Pol. et Sax. Radicis partem unam et Aquae octo; — Ba. Aquae novem; — A. Aquae duodecim.

℞. Radicis Valerianae partes quatuor.
Aquae . . . . partes sedecim.
Post tres dies macerationis adde
Salis culinaris . partem unam.
Destillent. (Hass.)

℞. Radicis Valerianae . libras sex.
Alcoholis . . . libram unam.
Post duos dies adde
Aquae . . . libras octodecim.
Destillent (Li.)

Oleosaccharum s. Elaeosaccharum Valerianae. (A. Bor. Bor4. Han. HassP.

℞. Sacchari albi . drachmam unam.
Olei ess. Valerianae . grana tria.
Tritura simul. (A.)

Bor. Bor4. et Han. Sacchari unciam et Olei guttas viginti quatuor; — HassP. Sacchari drachmas duas, Olei guttas tres.

Aqua Valerianae. (A. B*. Ba. Br. Gal. Han. Hass. HassP. Li. Pol. Sax. *Fi. Vm.*)

℞. Radicis Valerianae partem unam.
Aquae . . . quantum sufficit.
Post horas 24 destillent sex (Hass.) vel septem (Han.) partes.

Br. Radicis partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Gal. *Fi.* Radicis partem unam et quinque Aquae; destillent partes duae; — *Vm* Aquae decem; destillent partes duae; — A. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Pal et Sax. Aquae duodecim; destillent partes novem; — B*. et Ba. Aquae octodecim; destillent partes decem; — HassP Valerianae libras tres, Aquae q. s.; destillent librae viginti quatuor.

℞. Radicis Valerianae . libras duas.
Aquae . . . . libras duodecim.
Radicem in saccum include, medio cucurbitae ita suspensum ut aquam non attingat et destillando libras sex abstrahe. (Li.)

Aqua Valerianae composita, Spiritus Valerianae compositus. (*Pid.*)

℞. Radicis Valerianae uncias novem.
— Levistici . . uncias tres.
Herbae Pulegii . . uncias duas.
— Sabinae . . unciam unam.
Aquae fontanae,
Alcoholis, singulorum libras octo.

Post duos dies digestionis destillent librae octo.

Valerianella.

Valerianella olitoria, Dufr.; Gemüserapunzel; Doucette, Mache (*Gal.*).

Gal. *Be.*

☉ (Triandria Monogynia, L.; Valerianeae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze.

Man wendet das Kraut an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit länglichen, sitzenden, ganzen oder kaum gezähnten Blättern, welcher aus einer Rose ähnlicher, ausgebreiteter Wurzelblätter hervorkommt. Der Geschmack ist fade.

Erweichend.

Vanilla.

Vanilla aromatica, Sw.; Vanille; Vanille (*Gal.*); Vanilla (*Ang.*); Wanylie (*B.*); Vagnilla (*His.*); Banilje (*Bel.*); Vaniglia (*I.*); Tlilxachitl (*Me.*); Waniliia (*Pol.*); Vanilj (*Suec.*).

An. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fenn. Fer. Gal Han. HassP. His. His8. LP. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp Va Z.*

Eine rankende Schmarotzerpflanze (Gynandria Diandria, L.; Orchideae. *J.*) Südamerica's (*Blackw.* t. 590. *Plenck* t. 646. Fl. méd. VI 345.)

Man wendet die Früchte (siliquae Vanillae s. Vanillae s. Vanigliae s. Banillae s. Araci aromatici) an: es sind vier bis acht Zoll lange, zwei bis drei Linien breite, gerade, am Grunde gekrümmte, walzenförmige, gefurchte, glänzende, zusammengedrückte, in eine Art gestieltes Wärzchen endigende Schooten von schwärzlichbrauner Farbe, mit zwei dicken, leicht brechenden, obgleich nicht besonders weichen Klappen, welche in einem weichen braunen Mark sehr viele rundliche, schwärzliche, glänzende Saamen enthalten. Der Geruch ist stark und angenehm, der Geschmack brennend und beißend.

Reizend. — Gabe des Pulvers, von fünfzehn Gran bis zu einer Drachme. Aufguß 1 bis 2 Drachmen auf 2 Pfund Wasser. (*Va.*)

Pulvis Vanillae. (Gal. GalF. GalH.)

℞. Vanillae in frustula parva concisae partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contundendo in mortario ferreo in pulverem subtilissimum redige, quem per cribrum setaceum trajice; quod supra cribrum remanet, denuo contunde, donec cribrari possit.

GalF. et GalH. Sacchari partes quatuor.

Vakaka s. Wakaka Indorum. (*Ca. Gr.*)

℞. Sacchari pulverati uncias quatuor.
Cacao mund. pulv. sesquiunciam.
Sacchari Vanillae pulverati
semunciam et drachmas duas.
Pulv. Cinnamomi,
— Orleanae, sing.
drachm. unam.

Misce. — Gabe, ein Eßlöffel in Milch, Chocolade oder Suppe.

Gr. Vanillae unc. unam, Sacchari albi quatuor; contere.

Syrupus Vanillae. (*Br*. Va. Vm.*)

℞. Vanillae pulv. . partes quatuor.
Gummi Arabici . partem unam.
Aquae . . . . . partes sex.

Tritura simul ut fiat emulsio, cola fortiter exprimendo et colaturae adde syrupum refrigeratum e
Sacchari albi . . . partibus 22.
Aquae . . . partibus duodecim.
Liqua blando calore in mixtura
Sacchari albi partes viginti duas.

℞. Vanillae electae . . uncias duas.
Sacchari albi uncias septemdecim.
Aquae fluvialis . uncias decem.
Alcoholis (21°) . drachmas sex.

Vanillam in frusta minora concisam porphyrisa, saccharum et alcoholem sensim addendo ut fiat pasta mollis et homogenea; in retortam immitte cum reliquo sacchari et aquae; adde Albumen Ovi unius, balneo aquae immitte per horas 18 vel 20, subinde agitando, sepone deinde per unum diem et per pannum cola.

Va. Sacchari libram, reliqua ut antea.

Tinctura Vanigliae s. Vanillae. (B*. HassP. Sax.)

℞. Vanillae . . . . partem unam.

Digere blando calore per dies octo. (Sax.)

B*. secundum *Pfaff* Vanillae partem unam et Alcoholis sex; — HassP. Vanillae unam et Spiritus rectif. octo; digere per quatriduum; tinctura pondus unciarum sex habeat.

Reizend, nervenstärkend und analeptisch. — Gabe, vierzig Tropfen in Wein.

Alkermes liquidum, Alcohol cum Coccionella compositum. (Fi. *Vm.*)

℞. Ambrae griseae scrupulum unum.
Caryophyllorum semidrachmam.
Cinnamomi . . drachmas duas.
Vanillae,
Coccionellae, sing. . semunciam,
Aquae Vitae . . . libras tres.

Infunde per dies duos in balneo aquae tepido, filtra deinde et in liquore balnei aquae ad 60° R. ope calefacto solve mixturam e
Sacchari albi . . libris tribus.
Mellis Narbonnensis . libris sex.

Syrupum postquam clarus prodiit, decantha et per pannum laneum cola.

Fi. Caryophyllorum, Vanillae, sing. drachmas duas, Cinnamomi, Coccionellae, sing. semunciam, Aluminis de Rocca scrupulum, Alcoholis 24° libras tres c. dimid., Aquae Flor. Aurant. libras duas, Aquae Cinnamomi lacteae libram unam, Sacchari quinque.

Aqua Vanillarum (*Siliquarum*) a *Gr.* indicatur.

Aqua Vanillae. (B*.)

℞. Vanillae . . . . libram unam.
Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Aquae . . . libras duodecim.

Post horas 24 digestionis destillet dimidia pars.

Spiritus Vanillae. (B*.)

℞. Vanillae . . . . . uncias sex.
Subcarb. Potassae sesquiunciam.
Alcoholis . . . . . libras sex.

Post horas 24 macerationis adde
Aquae . . . . . libras sex.

Destillent lente librae sex.

Variolaria.

Variolaria orcina, Ach.

Von dieser Pflanze, doch besonders von Roccella tinctoria, *Cand.*, einem Cryptogam, welches auf den Felsen der Canarischen Inseln, des grünen Vorgebirgs und des Archipels wächst (*Pluk.* Alm. t. 255. f. 6.), bereitet man die Orseille,
Roccella; Orseille (*Gal.*).
Ba. Du. Gal *Be. C. G. M. Re.*
einen festen, dunkelvioletrothen Färbeteig von starkem unangenehmem Geruch; der von der zweiten Pflanze ist von besserer Qualität.

Veratrinum.

Veratria, Veratrina, Sabadillina; Veratrin; Veratrine (*Gal.*).
Fi. Gr Ma. Re. T.

℞. Granorum Sabadillae quantum vis.

Alcoholis bullientis ope penitus extrahe, filtra statim et post refrigerationem denuo filtra; colaturam ad consist. extracti consume, in Aqua solve, solutionem filtra et vaporando lente consume; praecipitatum inde exortum separa, colaturae Acetatem Plumbi li-

quidum infunde, praecipitatum nova filtratione separa, torrentem Acidi hydrocyanici per liquorem transmitte, denuo filtratum vaporatione concentra, per Magnesiam tracta, praecipitatum formatum Alcohole bulliente penitus extrahe et tincturas alcoholicas vaporando ad siccum consume.

Gr. Semina in Alcohole bulliente digerere, filtrare adhuc bullientem, fere ad siccum destillare, in Aqua frigida destillare, filtrare, lente vaporare, addere solutionem Acetatis Plumbi, et post filtrationem per liquorem clarum transmittere Gas hydrogenium sulphuratum, filtrare, aliquanto vaporare, addita Magnesia calcinata denuo filtrare, sedimentum in Alcohole bulliente digerere, filtrare, et evaporare, donec substantia subflava remaneat, quae dissolvendo in Alcohole et addendo Aquam alba reddatur; — *Re.* Semina Alcohole tractare, tincturam vaporare, residuum per Aquam tractare, liquorem filtrare, veratrinum Carbonatis Potassae ope praecipitare et praecipitatum in Aqua lavare.

Ein heftiges Reizmittel und fürchterliches Gift, welches in der Gabe zu einem Viertelgran purgirt.

Solutio (Sulphatis) Veratrini. (Ma. Va.)

℞. Sulphuris Veratrini granum unum.
Aquae destillatae . uncias duas.

Alcohol s. Tinctura Veratrini s. Veratrinae. (Gr. Ma. Re. Va.)

℞. Veratrini . . . grana quatuor.
Alcoholis . . . unciam unam.

Gabe, zehen, fünfzehen, zwanzig und fünf und zwanzig Tropfen in einer Potion. — Aeußerlich in Einreibungen bei Gicht, Hautwassersucht, innerer Wassersucht und Leukophlegmatie.

Pilulae Veratrini. (Ma. Va.)

℞. Veratrini . . . . semigranum.
Gummi Arabici,
Syrupi Gummi, sing. . . . q. s.
Fiant pilulae sex grani unius.

Va. Gummi Arab. scrupulum, caeterum ut antea. — Gabe, anfangs eine, bis auf drei Stück täglich gestiegen.

Unguentum s. Pomatum Veratrini. (Ma. Re. Va.)

℞. Veratrini . . . grana quatuor.
Axungiae Porci . unciam unam.

In Einreibungen bei chronischen Rheumatismen, Hautwassersucht und Gicht.

Verbascum.

In den Pharmacopöen werden angeführt:

1) *Verbascum Thapsus*, *L.*; Wollkraut, Königskerzenkraut: Bouillon blanc (*Gal.*); Great mullein (*Ang.*); Diwizna (*B.*); Kongelys (*D.*); Gordolobo (*His.*); Wollekruid (*Bel.*); Verbasco (*I.*); Dziewanna ziele (*Pol.*); Barbasco, Verbasco branco (*Lus.*); Kungsljis (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li LP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Würt. WW. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♂ Pentandria Monogynia, L.; Solaneae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 3. *Schk.* t. 42. *Plenck* t. 109. *Zorn* Ic. pl. t. 197.)

Man wendet die Blätter und die Blüthen an.

Die Blätter (folia s. herba Verbasci albi s. Thapsi barbati) sind lanzettförmig, auf beiden Seiten stark filzig, gezähnt und weich. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern und schwach styptischen Geschmack. — Die Blüthen (flores Verbasci) sind gelb, sehr groß, und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen, schleimigen Geschmack.

Erweichend

Man kann statt desselben auch das Verbascum phlomoides, L. (*Gal.*), eine Europäische Pflanze (*Lob.* Ic. 560. 661), nehmen, dessen Blätter eirundlänglich, spitzig die untern in einen geflügelten Stiel verdünnt, die obern herzförmig ausgerandet, und dessen Blüthen gelb oder weiß sind.

Auch V. Blattaria, Blattaria (*Gr.*) besitzt dieselben Eigenschaften.

Nach Morin's Analyse gaben die Blüthen ein gelbliches ätherisches Oel, einen fetten, der Oelsäure ähnlichen Stoff, Phosphorsäure, Aepfelsäure, uncrystallisirbaren Zucker Schleimharz, Chlorophyll, gelbes Harz und Salze.

2) *Verbascum nigrum*, *L.*; schwarze Königskerze, schwarzes Wollkraut; Bouillon noir (*Gal.*).

Gal. *Gr. M.*

♃ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 25.)

Man wendet die Wurzel und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Verbasci nigri) ist ästig, wenig behaart, außen hellbraun, inwendig gelblichbraun. — Die Blüthen sind gelb, sehr klein, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Erweichend.

Extractum Verbasci (albi). (Wür.)

℞. Flor. sicc. Verbasci . . q. vis.
Alcoholis . . quantum sufficit.

Digere blando calore, in vase tecto, et decantha liquorem; novum Alcoholem adde, donec non amplius tingatur: tincturis commixtis trientes duo in balneo aquae destillent et reliqua ad mellis consistentiam evaporent.

Decoctum Verbasci (albi) anodynum s. compositum, Fotus anodynus. (His. Hi3.)

℞. Fol. Verbasci albi,
— Malvae, sing. sesquiunciam.
Seminum Lini . . uncias duas.
Capit. Papav. albi drachm. unam.
Aquae . . . . libras quatuor.

Coque per horae quadrantem. — Besonders äußerlich in Waschungen angewendet.

Oleum Verbasci (albi). (Br. Wir. Wür.)

℞. Flor. Verbasci albi . part. unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Digere per tres dies igne leni, tunc coque ad humidi consumptionem et exprimendo cola. (Ful. Wür.)

Br. et Wir. Florum et Olei partes aequales et octo dies digestionis.

Lindernd, schmerzstillend, in Fällen von Hämorrhoiden und Frostbeulen empfohlen.

Verbena.

Man findet in den Pharmacopöen:

1) *Verbena officinalis, L.*; Eisenhart, Eisenkraut; Verveine commune (*Gal.*); Vervaine, Holy herb (*Ang.*); Wrbynka (*B.*); Ma pien-tsao (*C.*); Jernurt (*D.*); Verbena (*His. I. Lus.*); Yzerhard (*Bel.*); Zelezník (*Pol.*); Schelesnik (*R.*); Jaernaert (*Suec.*)

An. Fer. Gal. Gen. His. His3. Li. Wir. Wür. *Br. G. Gr. M. Sp. Z.*

☉ oder ♂ (Diandria Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Fl. méd VI. 346.)

Man wendet das Kraut (herba Verbenae) an; es besteht aus einem vierseitigen, harten, einfachen oder in einige gegenüberstehende, sehr ausgebreitete Zweige getheilten Stängel mit entgegengesetzten, gestielten eirundlänglichen, etwas runzligen, mit einigen kurzen Haaren besetzten, tief in ungleiche, stumpfe, ganze Lappen, von denen der Endlappen größer ist, getheilten Blättern. Es hat keinen Geruch und einen etwas bittern und adstringirenden Geschmack.

Die Wurzel rings um den Hals getragen, soll gegen scrofulöse und scorbutische Affectionen gut seyn.

2) *Verbena triphylla, L.*; dreiblättriges Eisenkraut: Verveine citronelle (*Gal.*); Yerba luisa (*His.*).

Fer. Gal. His. His3. *Br. Re.*

♄ (Decandria Monogynia, L.; Verbenaceae, J.) Eine Pflanze Chili's.

Man wendet die Blätter (folia Aloysiae) an: sie sind dreizeilig und verbreiten einen angenehmen, citronähnlichen Geruch.

Extractum Verbenae. (*T.*) E succo expresso cum Aquae modica quantitate diluto et evaporato.

Verbena Jamaicensis. (*Gr.*) Saft zu 1 bis 2 Eßlöffel cathartisch, gegen Obstructionen, emmenagogisch.

Veronica.

Von dieser Pflanzengattung finden sich:

1) *Veronica Beccabunga, L.*; Bachbungen, Bachbohnen, Wasserbungen; Grand Beccabunga, Véronique cressonée (*Gal.*); Brooklime (*Ang.*); Lemmike, Ledmye, Bekbung (*D.*); Becabunga (*His.*); Bakkebom (*Bel*); Becabunga (*I*); Patocznik (*Pol.*); Beccabunga (*Lus.*); Baekabunga (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Fer. Ful. Gal. Gen. His. His3. RC. Wir. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Diandria Monogynia, L.; Rhinantheae, J.) Eine in Europa an dem Ufer von Bächen wachsende Pflanze. (Fl. méd. II 60.)

Das Kraut (herba Beccabungae, Anagallis aquatica *Gr.*) besteht aus einem walzenförmigen, unten röthlichen, oben grünen, saftigen Stängel mit entgegengesetzten kurzgestielten, eirunden, glatten, etwas fleischigen, kleingezähnten Blättern. Man wendet es nur frisch an.

Reizend, antiscorbutisch.

2) *Veronica Anagallis, L.*; Wasserliebender Ehrenpreis; Petit Beccabunga (*Gal.*); Long leav'd brooklime (*Ang.*); Anagalide (*His.*).

Gal. His. Hi3.

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 903.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Anagallidis aquaticae) an: es besteht aus einem aufrechten Stängel mit lanzettförmigen, spitzigen, gezähnten Blättern und seitlichen blauen Blüthentrauben. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern, scharfen Geschmack.

Reizend.

Man giebt beide Pflanzen im Aufguß, eine bis zwei Hände voll auf die Pinte Wasser.

3) *Veronica officinalis, L.*: Ehrenpreis; Véronique officinale, Véronique male (*Gal.*); Male speedwell (*Ang.*)

Weronyka (*B.*); Oerenpriis (*D.*); Veronica (*His. I. Lus.*); Gemeene oerenprys (*Bel*); Przetacznik (*Pol.*); Erupris (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bor. Bor4. Br. D. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. HassP. His. His3. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sp. Va. Z.*

♃ (Diandria Monogynia, L.; Pediculariae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. VI. 345.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Veronicae s. Veronicae maris s. Betonicae Pauli) an; es besteht aus einem walzenförmigen, behaarten Stängel mit gegenüberstehenden, sehr kurzgestielten, eirunden, stumpfen oder etwas spitzigen, am Grunde verschmälerten, rauhen, behaarten, wie chagrinartigen, sägezähnigen Blättern. Es hat keinen Geruch, der Geschmack ist etwas bitter und schwach styptisch.

Schwach tonisch, antiscorbutisch. — Gabe des Saftes, eine bis zwei Unzen.

4) *Veronica Teucrium, L.*; Brustthee-kraut, Erdbathengel; Veronique teucriette (*Gal.*).

♃ Eine Europäische Pflanze. (*Lob.* Ic. t. 473.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Veronicae teucriifoliae) an; es besteht aus eirunden, runzligen, gezähnten, stumpfen, von einem runden, behaarten Stängel getragenen Blättern und hellblauen, lange Trauben bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern, adstringirenden Geschmack

5) *Veronica Virginica, Willd.*, Virginischer Ehrenpreis; Véronique de Virginie (*Gal.*).

Am. *C. Gr.*

Man wendet die Wurzel an, deren Arzneikräfte noch nicht genau bekannt sind.

Gr. führt noch *Veronica spicata, montana, arvensis* und *V. Chamaedrys, Chamaedrys sylvestris* an.

Conserva Beccabungae. (Wir. *T.*)

℞. Herb. Beccabungae c. Flor. part. unam.
Sacchari albi pulv. . partes duas.
Contunde bene simul.

T. Herbam recentem cum Sacchari parte aequali in pulpam redigere et hanc cum Sacchari in dimidio pondere Aquae cocti libris duabus commiscere.

Conserva Veronicae. (Wir.)

℞. Herb. Veronicae rec. contus. partem unam.
Sacchari . . . . . partes duas.
Contere.

Succus Beccabungae. (Wür. *T.*)

℞. Herbae Beccabungae quantum vis.
Contunde in mortario lapideo, exprime fortiter, sepone succum, decantha et in lagenis serva, cuique librae liquoris Alcoholis drachmam unam addendo.

Succus Veronicae. (*T.*) Simili modo ut succus beccabungae paratur.

Species pectorales s. pro The s. pro Thea. (Li. R. *Ca. Pid.*)

℞. Radicis Graminis sesquiunciam.
Herbae Millefolii . uncias duas.
— Veronicae . . uncias tres.
Concisa misce. (*Pid.*)

℞. Herb. Farfarae,
— Veronicae, sing. unc. quatuor.
Rad. Liquiritiae,
— Polypodii, sing. uncias duas.
— Althaeae . unciam unam.
Foeniculi . . . drachmas sex.
Concisa et contusa misce. (Li.)

℞. Fol. Veronicae,
— Hederae terrestris,
— Tussilaginis,
— Scabiosae, sing. unc tres.
— Melissae,
— Salviae, sing. semunciam.
Concisa misce. (*Ca.*)

℞. Florum Chamomillae vulgaris,
Herbae Veronicae, sing. part. sex.
Foliorum Salviae . partes duas.
Concisa misce. (R.)

Aqua Beccabungae. (A. Sar.)

℞. Herb. Beccabungae contus. partem unam.
Aquae . . . . . partes duas.
Destillent tr'entes duo. (Sar.)

℞. Succi depur. Beccabungae q. vis.
Destillent fere ad siccum (A.)
Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae. (Gal. Pal. *T.*)

℞. Herbae Veronicae partes quinque.
Aquae . . . . partes viginti.
Destillent partes decem. (Gal.)

Pal. Herbae partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — *T.* Herbae partem unam, Aquae quatuor; destillet dimidium.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Veronicae vinosa. (Br. Wir. *Sp.*)

℞. Herb. Veronicae c. Flor. libr. tres
Vini albi . . . . libras octo.
Post aliquot dies macerationis destillet dimidia pars.

Infusum Veronicae. (GalM. *Ra.*)

℞. Florum Veronicae . semunciam.
Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola (*Ra.*)

℞. Florum Veronicae partes centum.
Liquiritiae rasae . . partes octo.
Aquae bullientis quantum sufficit.
Infunde et cola. (GalM.)

Extractum Beccabungae. (Sar.)

℞. Herb. rec. Beccabungae . q. vis.
Contunde in mortario, exprime succum et in balneo aquae ad extracti consistentiam inspissa.

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Extractum Veronicae. (Br. Sar. Wir. *T.*)

℞. Herbae Veronicae libram unam.
Aquae fontanae . . . libras sex.
Macera per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper, cola exprimendo et colaturam ad extracti consist. consume. (Br. Wir.)

℞. Herb. Veronicae rec. contus. libras octo.
Macera per tres dies in alembico, tunc destillatione in balneo aquae uncias circiter duas Aquae abstrahe; residuo triplum Aquae infunde, coque ad tertiae partis remanentiam, clarifica et cola liquorem, ad electuarii consist. vaporando redige et illi nonnisi tepido Aquam destillatam adde. (Sar.)
T. ut extractum verbenae

Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Syrupus de Veronica. (Wir.)

℞. Herbae Veronicae . uncias sex.
Aq. Veronicae alcoh. dest. libr. unam.
Infunde in loco calido, cola fortiter exprimendo et in liquore solve
Sacchari albi . uncias sedecim.

Gabe, eine halbe bis zwei Unzen.

Syrupus pectoralis. (Li.)

℞. Specier. pectoral. (Li.) unc. octo.
Caricarum . . uncias quatuor.
Aquae . . . . libras quinque.
Coquendo tertiam partem consume, cola exprimendo et colaturae adde
Sacchari albi . . libras quatuor.
Solutionem, postquam semel vel bis ebulliverit, cola.

V i c i a.

Von dieser Pflanzengattung findet man:

1) *Vicia sativa, L.*; Futterwicke: Vesce commune (*Gal.*).
Gal. *Gr. Re.*

⊙ (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, *J.*) Eine ursprünglich in der Levante einheimische, in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 522.)

Man wendet den Saamen (semen Viciae) an; er ist schwarz und zusammengedrückt.

2) *Vicia* (*Ervum*) *Ervilia*, *Cand.*: Erve; Ers (*Gal.*); Ervilia, Tare (*Ang.*); Erve (*D.*); Erven (*Bel.*); Ervilha (*Lus.*); Erwa (*Succ.*).
Fer. LP. Wir. *Br. Gr. M. Re. Sp.*

⊙ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Blackw.* Herb t. 208. f. 3.)

Man wendet den Saamen (semen Ervi s. Orobi) an; er ist etwas platt, braun, geruchlos und von einem angenehmen, etwas bittern Geschmack.

Das Mehl wird bisweilen zu erweichenden Breiumschlägen genommen.

V i n c a.

In den Pharmacopöen werden angeführt.

1) *Vinca major, L.*; großes Sinngrün; Pervenche majeure, Grande Pervenche (*Gal.*).
Gal. *Gr. Re.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Apocyneae, *J.*) Eine Pflanze des mittägigen Europa's (Nouv. Duh. I. 14.)

Man wendet das Kraut an; es besteht aus eirunden, am Rande schwach behaarten, am Grunde herzförmig ausgerandeten Blättern

2) *Vinca minor, L.*; Sinngrün; Pervenche mineure, petite Pervenche (*Gal.*); Small pervincle (*Ang.*); Vingraen (*D.*); Pervinca (*His. I. Lus.*); Vinkoorde (*Bel.*); Barwinck (*Pol.*).
Br. Gal. His. His3. Wir. *Be. Gr. M. Pid. Re. Sp.*

♃ Eine in einem großen Theile Europa's gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 67.)

Man wendet das Kraut (herba Vincae s. Vincae Pervincae s. minoris s. Pervincae s. Clematidis s. Daphnoidis) an; es besteht aus einem dünnen und rankenden Stängel mit eirundlänglichen, glatten, glänzenden, kurzgestielten Blättern. Es hat keinen Geruch; der Geschmack ist bitter und adstringirend.

Beide Pflanzen sind schwach adstringirend

Infusum Pervincae Petalorum (*Gr.*) e Petalis et Aqua bulliente. Reagens,

V i n u m.

Οἶνος; Wein; Vin (*Gal.*); Wine (*Ang.*); Khumar (*Ar.*); Winny (*B.*)

Scherab unghury (*Duk.*); Vino (*His. I.*); Draghka mud (*Hi.*); Mey (*Pe.*); Wino (*Pol.*); Vinho (*Lus.*); Mada, Madira (*Sa.*); Win (*Suec.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. Hi3. Li. Lon. LP. Lus. O. Pol. RC. Sax. Suec. *A. Be. C. Gr. M. Par. Sa. T. Va.*

Eine rothe oder weiße Flüssigkeit, welche man durch Gährung des Weintraubensafts oder Weinmosts erhält.

Der Wein besteht aus Wasser, Alcohol, Schleim, Essigsäure, Weinsteinkali, weinsteinsaurem Kalk und färbenden Stoffen, deren verschiedene Mengenverhältnisse zu einander die fast unzähligen Verschiedenheiten dieser Flüssigkeit hervorbringen, welche man im Handel antrifft.

Die Wirkungsart des Weines auf den Organismus ist sehr verschieden, je nachdem Alcohol, Zucker, Essigsäure oder Kohlensäure in demselben vorherrscht. Da man aber in der Therapie nur solche Weine anwendet, welche viel Alcohol oder mehr oder weniger herbes Wesen besitzen, wie der Bordeauxwein (Vinum Bordegalense s. Burdegalense), der Burgunder (V. Burgundicum), der Madera (V. Maderanum), der Alicantewein (V. Alicantinum), der Xeres (V. Xeres s. Xerense), der Malagawein (V. Malacense s. Hispanicum), der Ungarische (V. Hungaricum), der Rheinwein (V. Rhenanum), der rothe und weiße Franzwein (V. Gallicum rubrum et album), so wirken sie meist zugleich tonisch und erregend. Doch wendet man den Wein selten für sich allein an, sondern er dient in den meisten Fällen als Vehikel andrer Substanzen, deren Wirkung kräftiger ist oder dafür gehalten wird.

Cataplasma exsiccans. (Fer. *Fi.*)

℞. Farinae Lupini . . uncias octo.
— Secalis . uncias quatuor.
Vini albi . . . libras quatuor.
Coque sufficienter.

Cataplasma excitans resolvens. (LH.)

℞. Farinae Secalis (páo) uncias quatuor.
Mellis puri . . . uncias duas.
Vini albi . . . . sesquilibram.
Fiat blando igne cataplasma.

Injectio Vini rubri. (*Re.*)

℞. Vini Port. . . uncias duodecim.
Aquae purae . . uncias quatuor.
Misce. — Zur Radicalcur der Hydrocele. (Earle.) A. Cooper wendet eine starke Einspritzung von Zinc. sulph. an.

Lotio vinosa, Fomentatio vinosa. (GalM. *Ra. Va.*)

℞. Vini rubri . . . libram unam.
Mellis . . . . . uncias duas.
Dissolve (*Ra. Va.* Hosp. Inf.)

℞. Tincturae aromaticae part. unam.
Vini rubri . . . partes viginti.
Misce. (GalM.).

Va. Hôt. D. Flor. Rosar. rubr. unciam, Vini rubri libram (*Fomentatio Rosarum vinosa* Char.) — vel: Vini rubri libram, Foliorum Salviae unciam. (*Fomentatio vinosa cum Salvia. Va.* Char.) Addendo Alcoh. camph. unc. octo, *Fomentationem vinosam alcoholicam* ejusd, hospit. et loco salviae eandem copiam Baccarum Juniperi sumendo, *Fomentationem Baccarum Juniperi vinosam* hospit. Char. obtinebis.

Injectio irritans. (*Va.* Hosp. Paris.)

℞. Vini calidi . . . . libras duas.
Alcoholis 36° . . . . . q. s.
Bei der Operation der Hydrocele zu Einspritzungen.

Balsamum Samaritanum. (*Co. Pie. Sp.*)

℞. Vini generosi,
Olei Olivarum, sing. . part. aeq.
Misce exacte.

Posca Galeni, Potio s. Limonada vinosa s. Limonata vinosa alcoholica. (*E. Ra. Sm. Sp. Va.*)

℞. Vini . . . . . partes tres.
Aquae . . . . . partes duas.
Leviter coque. (*Sp.*)

℞. Vini Hispanici,
Aquae fontanae,
Syrupi Ribium, sing. drach. duas.
Misce. (*Sm.*)

℞. Vini albi
Aquae, sing. . . libram unam.
Alcoholis,
Syrupi tartarici, sing. unc. unam.
Misce. (*Ra.*)
Va. Hôt. D. Syr. tart. unc. duas.

℞. Glaciei contusae mensuram (Untertasse) dictam.
Vini Maderani cochl. maj. (Eßlöffel).
Aq. Cinnam. hord. cochl. minus (Kaffeelöffel).
Sacchari pulverati . quantum vis.
Misce. (*Sm.*)

℞. Vitellum Ovi . . . . . no. 1.
Olei Cinnamomi . guttas viginti.
Vini albi,
Aq. Cinnamomi, sing. guttas tres.
— purae . . . . uncias duas.
Sacchari . . . drachmas duas.
Misce. (*E.*)

Man giebt von letzterer Potion drei Löffel auf einmal.

Syrupus cordialis. (Pm.)

℞. Vini Malvatici . . . libras duas.
Sacchari pulverati libras quatuor
Fiat syrupus, cui adde
Aquae Cinnamomi simplicis sesquiunciam.

Viola.

In den Pharmacopöen sind angeführt:

1) *Viola odorata, L.*; Märzveilchen; Violette de Mars (*Gal.*); Sweet violet (*Ang.*); Manischor (*Arm.*); Fiola wonna neb modra (*B.*); Kiet-tuong-hoa (*C.*); Martsfioler (*D.*); Violetta (*His.*); Benefe (*Lus.*); Tamme viool (*Bel.*); Viola (*I.*); Fiolki (*Pol.*); Par hutschjaa (*R.*); Aekta fioler (*Suec.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. His. His3 LH. Li. O. Pol. R. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

♃ (Syngenesia Monogamia, L.; Violaceae, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (Fl. méd. VI. 369.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Violariae s. Martiae) besteht aus vielen büschligen Fasern und hat einen scharfen, widerlichen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem Strauß herzförmiger, fein gekerbter, grüner, graugrüner, stumpfer oder etwas spiziger Wurzelblätter. Es ist geruchlos und hat einen krautartigen, schleimigen, etwas bittern Geschmack. — Die Blüthen besitzen die ihnen eigenthümliche blaue Farbe, verlieren bei'm Trocknen ihren angenehmen Geruch und haben einen bittern, etwas schleimigen Geschmack. — Der Saame ist klein, rundlich und weißlich.

Die ganze Pflanze ist mehr oder weniger reizend, Ekel und Erbrechen erregend.

2) *Viola canina, L.*; Hundsveilchen; Violette sauvage (*Gal.*); Dog's violet (*Ang.*); Wilde fioler (*D.*); Wilde Viool (*Bel.*); Skogsfioler (*Suec.*)

Gal. *M. Gr. Re.*

♃ (Pentandria Monogynia, L.; Violaceae, *J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Curt.* Fl. Lond. t. 103.)

Die Wurzel (radix Violae caninae) ist scharf und ekelerregend.

3) *Viola pedata, L.*; Violette digitée (*Gal.*).

Am *C. Gr.*

♃ Eine Nordamericanische Pflanze. (*Pa.* Fl. Amer p. 171.)

Das Kraut, welches man anwendet, besteht aus einem Büschel handförmiger, kammförmig gezähnter, mit Nebenblättern versehener Blätter.

Aqua Violarum. (Fer. Pal. Sar.)

℞. Florum Violarum partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post horas sex destillent partes duae. (Sar.)

Pal. Florum partem unam et Aquae tres; destillet pars una cum dimidia; — Fer. Florum partes tres et sedecim Aquae; destillent partes octo.

Julapium Violarum, Julep violatum. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Sacchari albi libr. duas c. dimid.
Aquae Violarum . uncias viginti.
Ebulliant semel, tunc colentur.

Emulsio violata s. Violarum. (Wir. *Sp.*)

℞. Amygdalarum dulc. unc. unam.
Seminum Violarum drachmas duas.
— Papaveris albi semidrachmam.
Aq Violarum,
— Nymphaeae,
— Lactucae, sing. uncias tres.
Emulsioni adde
Syrupi Violarum unciam unam.

Succus Violarum. (His. His3. Sar.)

℞. Flor. Violar. a calic. liber. q. vis.
Contunde in mortario fictili vel marmoreo, cola exprimendo, succum in locum frigidum sepone et post aliquot tempus partem limpidam decantha.

Tabellae violatae s. Violarum. (Sar.)

℞. Succi Violarum . . uncias tres.
Sacchari pulverati . libras duas.
Pulv. Iridis Flor. unciam unam.
Fiant tabellae.

Conserva Violarum. (His. His3. Pal. Sar. Wir. *Fi. T.*)

℞. Flor. rec. Violar. . part. unam.
Sacchari albi . . partes duas.
Contere simul. (Pal. Wir.)

Sar. *Fi.* Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo tritorum in Sacchari clarificati partes tres injicere et unam ebullitionem; — His. His3. Contundere Petalorum partem unam, addere Syrupi spissi partes duas et lente ad aptam consist. usque evaporare; — *T.* ut conservam rosarum, praeterea et *Conservam siccam* cum Petalorum siccorum parte una, Sacchari quinque et Aquae Violarum q. s. confer cons. rosar.

Infusum Violarum. (Sar. *ParC. Ra. T.*)

℞. Florum Violarum drachmas duas.

Aquae bullientis . libras duas.
Infunde et cola. (*Ra.*)

℞. Florum Violarum . libras duas.
Aquae bullientis . libras octo.
Digere per horas octo et cola leviter exprimendo; operationem novies cum novis Floribus repete. (Sar.)

T. 1) easdem quantitates, sed digestionem per horas duodecim; — praeterea: 2) Aquae pondus duplum, digestionem per horas 24 et bis repetere infusionem cum novis Floribus.

℞. Florum Violarum,
Liquiritiae, *sing.* drachmas duas.
Aquae bullientis octarium unum.
Post refrigerationem cola. (*ParC.*)
Bei Bruſtentzündungen empfohlen.

Mel Violarum. (Pal. Pm. Sar. Wir.)

℞. Florum Violarum mundatorum,
Aquae bullientis, *sing.* libras sex.
Macera per horas 24, cola exprimendo et colaturae adde
Mellis albi . . . . libras sex.
Coque despumando ad syrupi spissi consistentiam. (Pal. Wir.)

℞ Succi depurati Violarum,
Mellis comm., *sing.* . part. aeq.
Coque simul, despuma, cola et ad syrupi consistentiam redige. (Sar.)

Pm Syrupi Mellis libras sex, Succi defaecati Violarum libras tres. Lento igne in syrupum redige.

Ehedem wendete man dieſen Honig beſonders in Klyſtir, zu anderthalb bis zwei Unzen, an.

Syrupus Violarum s. Violae odoratae s. Petalorum Violarum (*recentium*) *s. Violae s. coeruleus.* (Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4 Br. Du. Ed. Fer. Ful. Gal Gen. Han. Hass. His. His3. Li. LP. O. Pal. Pm Pol. R. Sar. Wir Wür. *C. Fi. Gr. Rc. Sw. T Vm.*)

℞. Petalorum rec. Violarum unc. octo.
Aquae bullientis uncias sedecim.
Digere per horas 24, blando calore; cola levissima expressione et partibus octo liquoris adde
Sacchari albi . partes quindecim.
Fiat syrupus. (Ams.)

B. et Bel. Petalorum uncias octo, Aquae bull. viginti, horas sex macerationis et Sacchari libras tres; — Sar. Infusi partes duas et unam Sacchari; — Ba Petalorum partem unam, Aquae tres, 12 horas infusionis et colaturae parti uni addere Sacchari partes duas; — Gal Petalorum libras quatuor, Aquae octo, horas 12 infusionis et Sacchari duplum colaturae; — *Sw.* Petalorum partem unam, Aquae duas, infusionis horas 24 et Sacchari partes quinque pro tribus colaturae; — His. His3 LP. Petalorum libram unam, Aquae duas, octo horas infusionis et quatuor libras Sacchari; — Hass. Petalorum uncias octo, Aquae viginti, horas sex infusionis et Sacchari libras tres; — Bor. et Han. easdem quantitates, sed horas 12 infusionis; — Pm. Petalorum, Aquae ferv., *sing.* part. aeq., infunde per tres horas, cola cum expressione, faecibus delapsis, liquorem limpidum decantha et in eo dissolve Sacchari pulv. duplicem illius succi quantitatem; — Bor4. O. et Pol. Petalorum uncias octo, Aquae libras duas, 12 horas macerationis et pro unciis viginti colaturae Sacchari libras tres; — Wür. Violarum libram unam, Aquae tres et septem Sacchari; — Ed. *C. Rc.* Violarum partes duas, Aquae octo, horas 24 macerationis et Sacchari partes quindecim vel q. s.; — *Gr.* Lon. ante 1745. Flor. libr. unam, Aq. bull. duas c. dim. infunde per diem, exprime et in liquoris octar. duobus solve Sacch. libr. quatuor; — Du. Violarum libras duas, Aquae quinque et Sacchari uncias viginti novem; — R. Violarum libram unam, Aquae tres et Sacchari duplum colaturae; — Ful. Violarum uncias duodecim, Aquae bull. uncias octodecim et 12 horas digestionis; alias horas 12 macerationis liquoris expressi cum unciis sex Petalorum recentium et Sacchari contusi uncias duodecim; — Fer. *Fi.* Violarum libram unam, Aquae tantidem, duos dies digestionis et Sacchari libras duas; — *T.* Infusum [*T.* 1)] cum Sacchari libris quindecim ad syrupi consist. redigere.

His, His3. *Syrupus Violarum communis:* Violarum libram unam, Aquae bull. libras quatuor, infunde per horas quatuor et in colatura solve Sacchari libras sex.

℞. Sacchari albi . libras quatuor.
Aquae fontanae quantum sufficit.
Coque ad syrupi spissi consistentiam et infunde in
Petal. rec. Violarum . libr. duas.
Macera per tres dies in vase tecto, coque deinde leviter et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

℞. Petal. Violarum rec. mund.
libr. unam.
Contere in mortario lapideo et infunde
Aquae bullientis uncias octodecim.
Post horas 24 digestionis cola exprimendo et colaturae unciis viginti adde
Sacchari albi uncias triginta duas.
Coque lente. (Br. Pal. Wir.)

An. Violarum in pastam redactarum libram unam, Aquae libras duas, 24

horas digestionis et Sacchari libras tres cum dimidia; — Li. Florum libram unam contundere, calidae digestioni subjicere per horas 12 in Aquae libris tribus, et cum libra una hujus infusi et Sacchari pulverati unciis viginti syrupum parare.

℞. Petalorum Violarum quantum libet.
Aquae frigidae . . . . . q. s.

Macera per horas quatuor, sicca deinde flores, in linteo fortiter movendo, contunde et in pastam redactis infunde

Aquae frig. pondus illis aequale; tunc

Aquae bullientis aequale pondus.

Post refrigerationem cola leviter exprimendo, sepone, decantha et partibus quatuor colaturae adde

Sacchari albi . . partes septem.

Dissolve absque bullitione (*Vm.*)

Syrupus e Succo Violarum (*Gr.*): Succi Flor. libr. unam, Sacch. duas vel ultra; coque ad syrupum.

Syrupus Violarum solutivus. (Wir. *T.*)

℞. Flor. Violarum mund.
unc. quatuor.
Fol. Sennae mund. . unc. duas.
Aquae font. bull. . libram unam.

Digere per noctem in loco calido; altero mane exprime et colaturae unciis novem adde

T. Syrupum solutivum cum Infuso [*T.* 2)] parare jubet.
Sacchari albi . uncias sedecim.

Oleum Violarum. (Br. Sar. Wir.)

℞. Flor. Violarum mund.
part. unam c. dim.
Olei Olivarum . . partes tres.

Post duos dies digestionis in balneo aquae cola exprimendo et digestionem cum novis Floribus repete. (Sar.)

℞. Florum Violarum,
Olei Olivarum, sing. . part. aeq.

Coque lente ad humidi consumptionem usque et cola exprimendo. (Br. Wir.)

Virga aurea.

Solidago Virgaurea, L.; Goldruthe, Heidenwundkraut; Verge d'or (*Gal.*); Saracens woundwort (*Ang.*); Swalnjk prostrednj, Wysokytrans (*B.*); Heidensche woudkruid (*Bel.*).

A. Ams. Br. Du. Ful Gal. Gen. His. His8. Li. Wir. Wür. *Be. C. Gr. M. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua. Synantherae *Cass.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 383.)

Das Kraut (herba Virgae aureae s. Consolidae saracenicae s. Solidaginis saracenicae) besteht aus einem behaarten, ästigen Stängel, dessen untere Blätter elliptisch, die obern lanzettförmig sind. Es hat einen bittern, styptischen und etwas gewürzhaften Geschmack.

Harntreibend.

Gr. führt noch *Solidago odora*, blähungtreibend, nervenstärkend, als Thee gebraucht, an.

Extractum Virgae aureae. (Wür.)

℞. Herbae Virgae aureae . q. vis.

Coque per horam in Aquae communis q. s., cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, qui ad mellis spissi consistentiam evaporet.

Viscum.

Viscum album, L.; Mistel; Gui blanc (*Gal.*); Mistel (*Ang. Suec.*); Dubowe melj (*B.*); Fugleliim (*D.*); Visco (*His.*); Marentakken (*Bel.*); Vischio (*I.*); Jemiel (*Pol.*); Visgo (*Lus.*).

A. Ams. Ba. Bor. Br. Fer. Gal. Gen. Han. His. His8. Li. O. Pol. Sax. Wir. Wür. *Be. Br. Fi. G. Gr. M. Re. Sp. Z.*

Ein Schmarotzerhalbstrauch (Dioecia Tetrandria, L; Lorantheae, *J.*), welcher in ganz Europa wächst. (*Blackw.* t. 184. *Plenck* t. 703. *Hayne* IV. t. 24. Düs. off. Pfl. II. t. 14. *Zorn* Ic. pl. t. 54.)

Man wendet die Stängel (Viscum quernum s. querceum s. lignum Visci s. Loranthi Europaei) an; sie sind holzig, walzenförmig, fast vom Grunde an in zahlreiche Gabelzweige getheilt, von hellgrüner oder schwach gelblicher Farbe. Der Geruch ist schwach und eigenthümlich unangenehm; der Geschmack widerlich, etwas herbe und schleimig; beide verlieren sich bei'm Trocknen. Die Beeren purgiren.

Adstringirend, Ekel und Brechen erregend, seit lange gegen Epilepsie berühmt. — Gabe des Pulvers, eine halbe bis ganze Drachme, drei oder vier Mal täglich, in Syrup. Colbath verbindet es mit Stinkasand, Hufeland und Tissot mit Baldrian.

Pulvis antispasmodicus infantum. (*Au. Huf.*)

℞. Oculorum Cancrorum,
Cornu Cervi raspati,
Radicis Valerianae,
Visci albi, sing. partes aequales.

Bei Diarrhöe, Erbrechen und schwerem Zahnen der Kinder empfohlen. — Gabe, ein halber Scrupel. (*Huf.*)

℞. Visci querni,
Rad. Paeoniae,
— Fraxinellae, sing.
drach. duas c. dim.

Ligni Aloës,
Oculor. Cancror., sing.
drach. unam.
Succini albi . . semidrachmam.
Carbonis . . . drachmas duas.

Extractum Visci albi aquosum. (Fer.)

℞ Stipit. Visci querni . libr. unam.
Aquae . . . . . libras tres.

Coque, cola exprimendo, colaturam Albuminis ope clarifica et lentae vaporationi subjice.

Extractum Visci albi vinosum. (Sar.)

℞. Stipitum Visci . libram unam.
Vini albi gen libr. quinque ad sex.

Post tres dies digestionis super arenae balneo cola fortiter exprimendo; residuum coquatur cum novi Vini q. s ad dimidii usque consumptionem, quo facto liquores ambo commixti lente ad extracti consist. evaporent.

Decoctum Visci albi. (B*. T.)

℞. Visci . unciam unam ad duas.
Aquae fontanae . octarios duos.

Decoque ad dimidiae partis remanentiam.

T. Visci uncias tres, Aquae libras quatuor. — Bei Epilepsie empfohlen.

Decoctum antivenereum Mustani. (*Fi.*) Sarsaparillae unciam unam, Ligni Visci, Cornu Cervi raspati, Antimonii crudi, Pumicis, sing. semunciam, Aquae comm. libras tres ad dimidium decoquere Gabe: auf einen Tag in kleinen Quantitäten.

Decoctum del Pomponaccio (*Fi.*). Sarsaparillae, Ligni Visci, sing. uncias duas, Sulphureti Antimonii, Pumicis pulv, sing. sesquiunciam, Aquae comm. libras 24 Antimonium cum pumice in nodulum inclusa cum reliquis substantiis in Aquam demersa coquantur ad dimidium et colentur. Gabe, sechs Unzen bis ein Pfund.

Vitis.

Vitis vinifera, L.; Weinstock; Vigne (*Gal.*); Vine (*Ang.*); Inub (*Ar.*); Otrik (*Arm.*); Kmen winny (*B.*); Putao (*C.*); Sur medan (*Ca.*); Well mudika gheddie (*Cy.*); Wuntrae (*D.*); Ungur (*Duk. Pe.*); Vid (*His.*); Dakh (*Hin.*); Wyngaard (*Bel.*); Vite (*I.*); Buangur (*Ma.*); Winna macica (*Pol.*); Videira (*Lus.*); Winegrad (*R.*); Drakscha (*Sa.*); Winstock (*Suec.*); Kodimundrie pullum, Dividatsi pullum (*Tam.*); Drachupundu (*Tel.*)

Ein Strauch (Pentandria Monogynia, L., Viniferae, *J.*), welcher wahrscheinlich aus Asien stammt. (*Blackw.* t 155 *Schk.* t. 49. *Jacq.* Ic. rar. t. 50. *Zorn* Ic. pl. t. 276.)

Man wendet die Weinranken mit den Blättern und die Früchte an.

Die Blätter sind groß, anfangs oben behaart, unten filzig und weiß, dann fast glatt, am Grunde herzförmig, mit drei oder fünf eingeschnittenen spitzigen Lappen. — Man hält sie für stärkend. — Die Früchte, *Uvae*; Weintrauben, Rosinen; Raisins (*Gal. Ang.*); Zibib (*Ar. Mal.*); Vebitcha mudika gheddie (*Cy.*); Kischmisch (*Duk. Hin.*); Pasas (*His.*); Rozynen (*Bel.*); Mewur (*Pe.*); Uvas passadas (*Lus.*); Russin (*Suec.*); Dividatsi palavuttil (*Tam.*).

His. His3. *G. Gr. M.*

sind bekannt genug. Die unreifen heißen *Omphacium*, *Agresta*; Verjus (*Gal.*). Sie haben dann einen sauren und adstringirenden Geschmack. Man wendet sie selten an, und stets in Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt zu seyn scheinen.

Reif ist ihr Geschmack süß und zuckerig. Der ausgepreßte Saft giebt den Most, Mustum; Moût (*Gal.*). Unter dieser Gestalt gehören sie weniger der eigentlichen Medicin an. Häufiger bedient man sich ihrer in der Sonne getrocknet. Man unterscheidet zwei Sorten getrockneter Weinbeeren:

1) *Passulae majores*, *Uvae passae s. siccatae*, *Zibebae*; große Rosinen, Zibeben; gros Raisins, Raisins de caisse (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gen. Ham. Hass. His. His3. Lon. Lus. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *Be. C. G. Gr. M. Pid. Re. Sp.*

Man findet davon mehrere Varietäten.

A. Smyrnaer oder Damascener Rosinen; Raisins de Smyrne, de Damas (*Gal.*); fast so groß, wie kleine Pflaumen, länglich, zusammengedrückt, runzlich, bräunlichgelb.

B. Französische oder Spanische; Raisins de France, d'Espagne (*Gal.*), kleiner und dicker und von bräunlicher Farbe.

C. Calabrische; Raisins de Calabre (*Gal.*), dick, dunkelgefärbt und etwas klebrig

2) *Passulae minores s. Corinthiacae s Corinthiaceae s. Uvae minores Corinthiacae*; kleine Rosinen, Corinthen; petits raisins, Raisins de Corinthe (*Gal.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Br. D. Fer. Ful Gen. Ham. Hass. Lus. R. Sax. Suec. *Be. G. M. Pid. Sp.*

Sie sind schwarz, von der Größe kleiner Linsen und ohne Kerne.

Die getrockneten Weinbeeren oder Rosinen sind erweichend.

Pulpa Passularum. (Br. Pal. Wir. Wür. *T.*)

℞. Passularum minorum quantum vis.
Aquae . . . quantum sufficit.
Coctione mollefactis passulis, pulpam per cribrum e crinibus confectum trajice, adde aquam decocti et totum ad aptam consist. vaporando consume. (Gal. *T.*)

Br. Pal. et Wir. Pulpae addere Sacchari dimidium; — Wür. Sacchari trientem.

Roob s. Sapa Uvarum. (Gal. Sar. Wür.)

℞. Succi Uvarum . . quantum vis.
Coque modico igne, ad mellis consistentiam. (Gal. Sar.)

℞. Succi Uvarum depur. libr. unam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Coque simul ad mellis consist. (Wür.)

Decoctum Passularum majorum, Potus Uvarum siccarum. (B*. *Au. Gr.*)

℞. Passular. min. lot. enucl. unc. quatuor.
Aquae fontanae . . libras tres.
Coquendo tertiam partem consume et cola. (B*.)

Gr. Aquae octarios tres, coquere ad tres et exprimere.

℞. Passularum min. uncias quatuor.
Hordei mundati,
Liquiritiae, singulorum semunciam.
Aquae . . . . . libras sex.
Coque et colaturae refrigeratae adde
Syrupi Succi Citri . uncias duas.
Misce. (*Au.*)

Syrupus Uvarum. (A.)

℞. Succi Uvarum rec. expr. libr. centum.
Coque in vase cupreo stanno obducto, donec spuma nulla amplius prodeat, tunc ab igne removendo et continue agitando, sensim adde
Cretae pulveratae . libram unam vel q. s. ad saturandum acidum. Sepone per horas 12 in loco frigido, decantha succum clarum et coque, despumando, ad syrupi spissitudinem.

Species hechicae. (Br. Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Passularum min. unciam unam.
Siliquae dulcis,
Jujubarum, sing. . drachmas sex.
Dactylorum . . . uncias duas.
Caricarum pinguium,
Hordei mundati, sing. unc. unam.
Liquiritiae,
Capilli Ven. Monsp., sing. semunciam.
Hyssopi . . . drachmas duas.
Concisa misce. (Br. Wir. *Sp.*)

Pal. eandem formulam sed loco siliquae Sebestenas indicat.

Succus Agrestae s. Omphacii, Omphacium. (Gal. His. His3. Sar. *T.*)

℞. Omphacii . . . quantum vis.
Contunde in mortario lapideo vel porphyreo, cola per pannum, sepone succum, decantha et in lagena longicolli sub strato olei serva.

T. ut succum myrtillorum. — Angenehm sauer, in allen Fällen, wo säuerliche Mittel angezeigt sind.

Syrupus Omphacii s. Agresti s. Agrestae s. Succi Agrestae s. de Agresta. (Gal. His. His3. Lus. Pm Sar. Wir. *T.*)

℞. Succi Agrestae rec., depur. et filt. libr. duas
Sacchari libras tres cum dimidia.
Liqua blando calore. (Gal.)

Wir. Succi sesquilibram et Sacchari libras duas; — Pal. Succi libras quinque et tres Sacchari; — Pm. Omphacii defaecati libras duas, Sacchari quatuor; — His. His3. Succi libram unam et duas Sacchari; — Suec. Succi et Syrupi communis q. s. ut fiat vaporatione in balneo aquae syrupus; — *T.* Succi libras quatuor, Sacchari septem et si placet addere Oleosacchari Limonum vel de Cedro pauxillum.

Unguentum s. Pomatum adstringens. (*Bo.*)

℞. Omphacii . . . . uncias octo.
Unguenti rosati . libram unam.
Cerae flavae . uncias quatuor.
Coque ad liquidi aquosi consumptionem, post refrigerationem faeces separa, denuo liquefac et Essentiam Rosarum adde.

Extractum Vitis Pampinorum. (Bor4.) Ut extractum aconiti, calendulae etc.

X.

Xanthium.

Xanthium strumarium, L.; Kropfklette, Kropfbetterlaus, Kliffen; Lampourde, Petit Glouteron, Petite bardane (*Gal.*); Lesser burdock (*Ang.*); Gaaseskreppe (*D.*); Lampazo pequeno (*His.*); Kleine Klissen (*Bel.*); Lappola minore (*I.*);

Bardane menor (*Lus.*); Spetsborre (*Suec.*)

Br. Gal. Lus. Wir. *Gr. M. Sp.*

⊙ (Monoecia Pentandria, L.; Synantherene, *Cass.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 269.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Xanthii s. Bardanae s. Lappae minoris) besteht aus einem kantigen, ästigen Stängel, abwechselnden, gestielten, fast rundlichen, herzförmigen, gezähnten, buchtigen, etwas lappigen, behaarten, scharf anzufühlenden, am Grunde dreinervigen Blättern. — Der Saame ist klein, länglicheirund, an beiden Enden spitzig, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, röthlich und steckt in einer festen, länglichen, an der Spitze eingeschnittenen, außen mit Spitzen besetzten Hülle.

Der Geruch ist angenehm, der Geschmack scharf und bitter.

Ehedem wendete man den Saft zu sechs Unzen gegen Kropf an.

Xantorrhoea.

Xantorrhoea hastilis s. Acarois resinifera, Palmen aus Neu-Süd-Wales, liefern das

Gummi flavum s. Gummi Resinae Acaroidis.

Gr.

welches gegen Ruhr und äußerlich zur Vereinigung der Ränder großer und gefährlicher Wunden benutzt wird.

Z.

Zantorrhiza.

Zantorrhiza apiifolia, l'Her.; Gelbwurz; Zanthorrhize à feuilles d'ache (*Gal.*); Yellow root, Parsley l'eav'd yellow root, Shrub yellow root (*Ang.*).

Am. *C. Gr Re.*

Ein kleiner Strauch (Pentandria Monogynia, L.; Ranunculaceae, J.) Virginiens. (*L'Her.* St. nov. p. 79, t. 38.)

Die Wurzel ist länglich, von der Stärke des kleinen Fingers, mit vielen kleinen Fasern besetzt und gelb. Sie hat einen bittern Geschmack.

Zanthoxylum.

Zanthoxylum clavatum, fraxineum, Clava Herculis, L.; Zahnwehholz; Clavalier à feuilles de frêne, Frêne épineux (*Gal.*); Prickly ash, Toothach-tree (*Ang.*).

Am. *C. Gr. Re.*

Ein Baum (Dioecia Pentandria, L.; Terebinthaceae, J.) der Antillen.

Die Rinde, welche man anwendet, ist braun und scharf; sie dient gegen Zahnschmerzen. Die Tinctur benutzt man in America bei chronischen Rheumatismen.

Zea.

Zea Mays, L.; Mais, Türkischer Waizen; Mais, Blé d'Espagne, Blé d'Inde, Blé de Turquie (*Gal.*); Indian korn (*Ang.*); Tyrkisk korn (*D.*); Mais (*His.*); Mays (*Bel.*); Gran turco (*I.*); Maiz, Milho de Turquia (*Lus.*); Turkisk korn (*Suec.*).

Gal. *Gr. Re.*

⊙ (Monoecia Triandria, L.; Gramineae, J.) Eine in America einheimische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 547.)

Man wendet den Saamen (semen Mays) an: er ist rundlich, eckig, von der Größe einer gewöhnlichen Erbse, außen goldgelb, innen weiß und glänzend.

Mehlig, nährend.

Zedoaria.

Radix Zedoariae; Zittwerwurzel, Zittweringwer, Gittwerwurzel; Zédoaire (*Gal.*); Zedoary (*Ang.*); Judwar, Bar (*Ar.*); Bhuchampa, Junglie huldie, Bun huldie (*Beng.*); Cycwar (*B.*); Nagai mio (*Ca.*); Kaha, Wulkaha (*Cy.*); Amhie huldie (*Duk.*); Zedoaria (*His. Lus.*); Nirbisi (*Hin.*); Bokzedoar (*Bel.*); Matan kua (*Malab.*); Cytwar (*Pol.*); Bhu champaka, Nirvischa, Vanaharidra (*Sa.*); Sittwer (*Suec.*); Castarie munjel (*Tam.*); Castorie passapu (*Tel.*).

Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Br. Du. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham Han. HassP. His. His3. LH. Li. LP. O. Pol. R. Sax. Suec. Wir. Wür. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Pid. Re. Sa. Sp. Va.* Z.

Man unterscheidet zwei Sorten Zittwer.

1) *Zedoaria longa, Z. flava*, langer Zittwer, einige Zoll lang, fingerdick, runzlig, knotig, außen graulich, inwendig bräunlich

2) *Zedoaria rotunda*, runder Zittwer, einen Zoll lang mit rauher, runzliger, mit Fasern bedeckter Oberfläche

Der Zittwer kommt in harten, weißli-

chen, von der Oberhaut entblößten Stükken zu uns. Er iſt gewürzhaft, ſcharf und beißend.

Er enthält viel Satzmehl und ein weſentliches kampherartiges Oel.

Der lange Zittwer wird allgemein für die Wurzel von Amomum Zedoaria, *Willd.*, angeſehen, einer Pflanze 4 (Monandria Monogynia, L., Amomeae, J.) Oſtindien's (Fl. méd. VI. 349.). Was den runden anlangt, ſo ſind einige Schriftſteller, unter andern Ainslie und Guibourt, der Meinung, daß er von Kaempferia rotunda, L., abſtamme. Andere, z. B., Mérat, glauben, beide ſeyen bloße Spielarten der Wurzel einer und derſelben Pflanze, durch Oertlichkeit und Art des Wachsthums bedingt.

Reizend, toniſch, magenſtärkend — Gabe des Pulvers, von einem halben Scrupel bis zur halben Drache.

Extractum Zedoariae. (Br. Pal. Sar. Wir. *T.*)

℞. Radicis Zedoariae libram unam.
Alcoholis libras quinque ad sex.

Post sufficientem extractionem cola exprimendo; residuum digere, tunc coque parumper cum Aquae libris tribus, clarifica decoctum Albuminis ope; liquores commisce et alcohole destillatione separato, residuum lenta vaporatione consume. (Br Pal. Wir.)

℞. Zedoariae . . . libram unam.
Vini albi gen. libr. quinque ad sex.

Digere per tres dies super arenae balneo, tunc residuum coque cum novi Vini q. s. ad dimidii remanentiam; liquores commixti lente ad extracti consist. evaporent. (Sar.)

T. Zedoariae libram unam, Aquae bullientis octo, infunde per horas 24, filtra et consume.

Tinctura s. Essentia Zedoariae. (Ams. Br Han.)

℞. Radicis Zedoariae partem unam.
Alcoholis (0,907) . partes octo.

Digere per dies octo et filtra. (Ams.)

Br. Radicis partem unam et quinque Alcoholis; — Han. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas.

Reizend. — Gabe, ſechzig Tropfen täglich zwei Mal.

Tinctura Zedoariae composita, Essentia carminativa Wedelii. (B*. Br. Han. Pal. Sax. Wir. *Ca. Sp.*)

℞. Rad. Zedoariae uncias quatuor.
— Carlinae,
— Calami,
— Galangae, sing. unc. duas.
Florum Chamomillae Romanae,
Seminum Anisi,
— Carvi, sing. . unc. unam.
Caryophyllorum,
Bacc. Lauri, sing. drachmas sex.
Macidis . . . . . semunciam.
Corticis Aurantiorum unciam unam.
Spir. Cort. Citri libr. quatuor et dim.
— Nitri dulcis unc. duas c. dim.

Infunde per dies sex, exprime et filtra. (B*. Br. Han Sax. Wir. *Sp.*)

℞. Rad. Zedoariae . unciam unam.
— Carlinae,
— Galangae, sing. semunciam.
Corticis Aurantiorum,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Florum Chamomillae Romanae,
Caryophyllorum,
Baccarum Lauri,
Acori veri, sing. sesquidrachmam.
Macidis . . . drachmam unam.
Spiritus Corticis Citri libras duas.
Acidi nitrici . . . semunciam.

Post sufficientem digestionem filtra. (B*. Pal.)

℞. Rad. Zedoariae . unciam unam.
— Carlinae,
— Calami aromatici,
— Galangae, sing. semunciam.
Florum Chamomillae,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Cort. sicci Aurant., sing. drach. duas.
Baccarum Lauri,
Caryophyll., sing. sesquidrachmam.
Macidis . . drachmam unam.
Spiritus Citri . . libram unam.
Acidi nitrici drachmas quinque.

Reizend, magenſtärkend, blähungtreibend, Menſtruation befördernd und harntreibend. — Gabe, eine halbe bis ganze Drachme.

Tinctura bezoardica. (Pal. Wir. *Sp.*)

℞. Radicis Zedoariae,
— Serpentariae Virginicae,
— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
Baccarum Juniperi,
Corticis Citri,
Myrrhae, singulorum drachmas sex.
Spir. Flor. Sambuci rectif. libr. unam.

Post sufficientem digestionem cola exprimendo et liquori adde
Spiritus Tartari . . uncias sex.
— Vitrioli . . uncias duas.
Camphorae . . . semunciam.

Digere, filtra et serva. (Pal. Wir.)

℞. Rad. Zedoariae . uncias duas.
— Angelicae,
— Pimpinellae albae,
— Valerianae,
— Vincetoxici,
— Calami arom., sing. unc. unam.
— Costi Arabici,
Corticis Citri recentis,
Bacc. Juniperi, sing. unc. duas.
Myrrhae . . . . uncias tres.
Herb. Scordii . . sesquiunciam.
— Melissae,
— Millefolii,
— Rutae, sing. . . . unc. 72.
Camphorae . . unciam unam.
Theriacae . . . libram unam.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Post octo dies digestionis adde
Aquae fontanae . . libras duas.
Destillentur; tunc recipe
Hujus Spiritus . . libras duas.
Spiritus Tartari . . semilibram.
Acidi sulphurici . . uncias tres.

Misce, adde Succum Baccarum Paridis ad colorandum et filtra. (Wir. *Sp.*)

Reizend, ehedem bei fauligen Fiebern empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme.

Oleum Zedoariae aethereum, *Aethereoleum Zedoariae.* (Br. Pal. Wir. *T.*)

℞. Zedoariae . . . . partes sex.
Aquae . . partes triginta sex.
Salis culinaris . partem unam.

Post quatuor vel quinque dies macerationis destillatio fiat et oleum in fundo recipientis subsidens eximatur.

T. ut oleum valerianae.

Aqua Zedoariae vinosa. (Br. Wir.)

℞. Zedoariae . . . partem unam.
Vini generosi . partes duodecim.
Destillet dimidia pars. (Wir.)

℞. Zedoariae . . . . uncias sex.
Vini . . . . . libras tres.
Alcoholis,
Aquae, singulorum sesquilibram.
Destillent librae quatuor. (Br.)

Aqua Zedoariae anisata. (Pal. Sar. Wir. *Pid.*)

℞. Zedoariae . . . . uncias sex.
Anisi . . . . . uncias tres.
Corticis Citri . . uncias duas.
Alcoholis . . . . . libras sex.
Destillet dimidia pars. (*Pid.*)

Pal. Sar. et Wir. Zedoariae uncias sex, Anisi uncias tres, Corticis Citri unam et Vini albi libras octo; post octo dies infusionis destillet dimidia pars.

Zibethum.

Zibetha; Zibeth; Civette (*Gal.*); Civet (*Ang.*); Zibeto (*His.*); Sivet (*Bel.*); Zibetto (*I.*); Algalia (*Lus.*).

Br. Gal. His. His3. LP. Wir. *Br. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Eine halbflüssige, salbenartige, weißliche oder gelbliche, an der Luft braun und sehr dick werdende Substanz von sehr starkem Geruch, welche von Drüsen abgesondert und in einem zwischen After und Geschlechtstheilen des Zibeththiers, Viverra Zibetha, L., eines nagenden Säugthiers Asien's und Africa's, befindlichen Beutel abgesetzt wird.

Reizend, krampfstillend. — Gabe, fünf bis sechs Gran.

Essence of civet (*Gr. Re.*): Zibethi unciam, Spiritus rectif. octarium.

Essence royale (*Gr. Re.*): Ambr. gris. scrupulos duos, Moschi unum, Zibethi grana decem, Ol. Cinn. guttas sex, Ol. Lig. Rhod. tres vel quatuor, Kali praep. semidrachmam, contere et adde Spir. Ros., Aq. Flor. Aur., sing. sesquiunciam. — Angebliches Aphrodisiacum zu einigen Tropfen in syrop. capill.

Zincum.

Stannum indicum; Zink; Spiauter; Zinc (*Gal.*); Zinc (*Ang.*); Pisyuen (*C.*); Sungbusrie (*Duk.*); Zinco (*I. Lus.*); Cynk (*Pol.*); Spiagter (*R.*); Tutunagum (*Tam.*).

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel Bor. Bor4 Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lon. LonN. Lus. O. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. *A C. Fi. Gr. Pid. Re. Sp T.*

Ein derbes, bläulichweißes, blättriges, sehr streckbares, aber eher zu Blechen zu schlagendes als zu Draht ziehbares Metall, welches die Feile fettig macht und daher nicht sehr hart, schon bei Rothglühhitze schmelzbar ist, sich verflüchtigen läßt, mit sehr heller Lichtentwickelung brennt und auf feuchte Luft nur eine sehr schwache Wirkung ausübt. Specif. Schw. = 6,8 — 7,1.

Zincum purum; reines Zink. (HassP. His3.)

Vel laminatum vel fundendo et moduli ferrei aurichalcive canaliculati infusorii ope in cylindros formatum.

His3 Zincum liquefacere, quo fluat, virga ferrea fortiter agitare, alternatim Sulphuris plura frustula, Sebi pauciora injicere et scorias removere, donec sulphur libere totum comburatur.

Chloruretum Zinci.

Murias s. Butyrum Zinci. (B*.)

℞. Acidi hydrochlor. puri unc. tres. Injice sensim Zincum granulatum donec nihil amplius dissolvatur, solutionem unciis tribus Aquae dilue, filtra liquorem et ad siccum consume.

Adſtringirend, Brechen erregend.

Liquor Zinci muriatici s. Muriatis zincici paratur e Zinco Indico, a ferro libero et Acido muriat. concent., addendo acido in vitro amplo contento prioris tantum, donec portiuncula postrema, vase calefacto non amplius solvitur. Solutio cum Aquae aequali quantitate diluta coletur. — Parari quoque potest liquor monitus solutione Zinci chlorici (Butyri Zinci) in Aqua. — Aetzmittel mit 15 Theilen Waſſer noch mehr verdünnt, als Waſchwaſſer oder Salbe, als Hautreiz, zur Erzeugung eines Ausſchlags; von Papenguth bei hartnäckigen ſcrophulöſen Hohlgeſchwüren; Hauke wandte beide Formen, nach Umſtänden, bei veralteten, atoniſchen, ſyphilitiſchen, ſcrophulöſen und herpetiſchen Geſchwüren an.

Aether Zinci, Solutio Muriatis s. Hydrochloratis Zinci aetherea. (B*. *Vm.*)

℞. Hydrochlor. Zinci sicci semunciam.
Alcoholis absoluti unciam unam.
Aetheris sulphurici uncias duas.

Post aliquot dies decantha. — Krampfſtillend. — Gabe, vier bis acht Tropfen, täglich zwei Mal.

Cyanuretum Zinci, Hydrocyanas Zinci. (B*. *Ma. Re.*)

℞. Hydrocyanatis Potassae . q. vis. Injice solutioni salis hujus Sulphatem Zinci, donec nullum amplius praecipitatum provocetur, quod siccatum ad ruborem usque obscurum calcina.

Das Product iſt ein Gemiſch von blauſaurem Zink und Potaſſium. — Man hat es bei nervöſer Cardialgie gerühmt. — Gabe, von einem Viertel- bis zu anderthalb Gran in einem Trank, Löffelweiſe.

Zincum hydroiodicum oxydatum, Hydriodas zincicus.

E Iodi et Zinci, sing. part. aeq. vel Zinci 20, 28 et Iodi 76, 52 paretur.

Collyrium Hydriodatis zincici s. Zinci Iodatis: Hydriodatis grana quindecim, Aq. dest. unc. sex. — Von Proust bei ſcrophulöſen Augenentzündungen empfohlen. — *Re.* Iodatis grana quatuor, Aq. dest. eandem copiam.

Unguenti Zinci Iodidis s. ad strumam (*Ure.*): Joditis zincici drachmam, Axungiae unciam. — Ein oder zwei Mal täglich einzureiben.

Pulvis Cyanureti Zinci s. antispasmodicus. (*Ma. Va.*)

℞. Cyanureti Zinci granum dimidium.
Magnesiae calcin. grana quatuor.
Cinnamomi . . . . grana tria.

Alle vier Stunden zu nehmen.

Va. Cyanureti semidrachmam?, Magnes. calcin. scrup. unum, Cinnamomi grana octodecim misce et divide in part. sex. Alle 4 Stunden 1 Stück, bei nervöſen Leiden des Magens.

Protoxydum Zinci, Oxydum s. Oxodes Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

A. Wie man es im Handel findet.

1) *Nihil album, Pompholix;* weißes Zinkoxyd.

B. BorC. Br. Fenn. Sax. Suec. Wir. Wür. *Gr. Par. Sp. T.*

In wolligen, ſehr weißen und leichten, geſchmack-, geruchloſen und in Waſſer unlöslichen Flocken, welche ſich bei'm Verbrennen des Zinks in freier Luft bilden.

2) *Tutia, Tuthia, Tutia Alexandrina, Botrytis, Cadmia, Cadmia factitia, Nihilum griseum, Oxydum zincicum griseum, Oxydum Zinci sublimatum s. semivitrificatum s. impurum praeparatum;* Tutie, graues Zinkoxyd; Cadmie des fourneaux (*Gal.*).

Am. An. B Bel. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Han. Hass. HassP. His. His3. Lon. Lus. O. Sax. Suec. Wir. Wür. *C. Fi. Gr. Re. Sp. T. Va.*

In dicken, derben, ſchweren, aſchgrauen, harten, ſchwer brechenden, narbigen und rauhen Schuppen, welche ſich in den Rauchfängen der Oeffen erzeugen, wo man Bleierze, die Schwefelzink enthalten, ſchmilzt.

Es iſt das Protoxyd, mit fremden Stoffen gemiſcht.

Tutia praeparata, Protoxydum Zinci impurum. (*Fi.*) Tutiam excandescentem in Aquam frigidam injice; bis vel ter repetendo, pulvera et cum Aqua laevigatam in pastam redige, quam sicca.

His3. fere eandem agendi rationem adhibet.

3) *Calamina, Calaminaris Lapis, Carbonas Zinci impurus s. impura, Carbonas zincicum terrestre s. Oxydi Zinci, Carbonas Zinci aluminosus, Oxydum Zinci nativum, Zincum terrestre, Cadmia fossilis, Zincum oxydatum calaminare* (*H.*), *Hydrosilicas Zinci* (*B.*); natürliches Zinkoxyd, Galmeiſtein; Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire,

Zinc oxydé calaminaire (*H.*), Hydrosilicate de zinc (*B.*).

Am. Ams. An. B. Bel. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Ham. Hass. HassP. His. Li. Lon. LonN. Lus. O Sax Suec. Wir. Wür. *C. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

In unregelmäßigen, schweren, weißlichen, graulichen oder röthlichen Stücken. Beudant's Benennung ist sehr bezeichnend, da es in der That ein Wasserstoffzinksilicat ist, welches zufällig Eisenoxyd, Alaunerde und kohlensauren Kalk beigemischt enthält.

Oxycarbonas Zinci impuri praeparatus, Lapis calaminaris praeparatus, Calamina praeparata (RC *Re.*) torrefaciendo Oxycarbonatem impurum, ut carbonas calcis paratur.

His3. praeparationem ut Tutiae adhibet.

B. Im Ganzen bereitet.

1) Auf trocknem Wege. *Flores Zinci, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. Zinci s. Zinci album s. Zinci per se s. Zinci sublimatum, Oxydum Antimonii sublimatum, Oxodes Zinci album, Calx Zinci, Zincum oxydatum album s. calcinatum.*

A. Am. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor4. Br. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3 Li. Lon. LonN. LP. Lus. Pal. Pm. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. *Br. C. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*

℞. Zinci . . . . . quantum vis.

In crucibulum amplum et profundum immitte, prunis superponendum, ignem ad fusionem metalli et donec flammam emittat auge; crucibulum deinde alio, obverse imposito, tege et floccos in hoc concrescentes collige.

Lapis calaminaris diaphoreticus. (*Gr.*): ℞. Lapidis calaminaris uncias quatuor, Acidi nitrici libram, dissolve, decantha, destillando ad siccum redige, pulvera et residuum ablue. — Schweißtreibend, 10 bis 50 Gran.

Zinci Oxydum (Lon. *Gr. Re.*): Sulphatis Zinci uncias duodecim, Aquae destillatae octarium, dissolve, adde Liquoris Ammoniae q. s., praecipitatum ablue et sicca.

Magisterium Lapidis calaminaris, Oxydum Zinci hydrateum (*Gr.*): Lapidem calaminarem in Acido muriatico dissolve et Aqua Ammoniae Subcarbonatis praecipita; praecipitatum ablutum sicca. — Brechenerregend, cathartisch, 3 bis 8 Gran.

2) Auf feuchtem Wege. *Magisterium Zinci, Zincum praecipitatum, Zincum oxydatum via humida paratum;* Zinkpräcipitat; Magistère de zinc (*Gal.*)

Am. Bor. Bor4. D. Fer. Gal. Han. Li. O. Sax *Fi. T. Vm.*

℞. Sulphatis Zinci . . quantum vis.

Dissolve in Aquae q. s. et in solutionem sensim infunde Subcarbonatem Potassae vel Sodae, donec non amplius eliciatur praecipitatum, quod lotum siccetur

Das Product ist Zinksubcarbonat; Gal. spricht zweimal davon als *Oxydum Zinci per praecipitationem* und *Carbonas Zinci.* Durch viertelstündiges Calciniren des Präcipitats, welches *Sax.* anwendet, wird es gelb und nicht völlig rein.

℞. Zinci sulph. sicc. partes novem.
Kali nitrici . . . partem unam.

Mixta in crucibulo ure donec solutio portiunculae exemtae filtrata additis tinctura gallarum et liquore ammonii caust. praecipitatum album nec tempore in colorem violaceum vergens demittat. Post refrigerationem massam remanentem a crucibulo separatam et tritam cum Aquae fervidae decuplo misce et saepius agitando digere, ut solubile solvatur et ferrum separetur. Filtra et liquori limpido adde Natrum carbonicum depuratum in Aquae communis q. s. solutum quamdiu praecipitatum producitur, quod bene edulcoratum et siccatum excandescat in crucibulo tecto, donec portiunculae cum aqua mixtae acidum quodlibet affusum nullam afficiat effervescentiam, tum adhuc calidum in vitrum ingestum serva (Bor4.)

Das Zinkoxyd wird äußerlich als adstringirendes, innerlich als krampfstillendes und Brechmittel angewendet. Man empfiehlt es bei Epilepsie, Hysterie und Neuralgien. — Gabe, von sechs Gran bis eine halbe Drachme. — Man giebt es auch in Pillenform.

Pulvis Zinci oxydati albi s. antispasmodicus. (Ful. *Au.*)

℞. Florum Zinci . grana duodecim.
Sacchari . . drachmam unam.

Divide in sex partes. — Gabe, Morgens und Abends ein Stück, bei Keuchhusten und convulsivischen Krankheiten der Kinder. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . . granum unum.
Laudani Sydenhami guttam unam.
Sacchari . . scrupulum unum.

Alle drei Stunden, bei Krämpfen der Kinder. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . drachmam unam.
Opii . . . . . grana decem.
Chinae,
Foeniculi, sing. . unciam unam.

Divide in partes quinquaginta. —

Gabe, alle zwei Stunden ein Stück, bei Keuchhusten. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . . . grana tria.
Scillae pulveratae,
Sulph. aur. Antimon., sing. semigranum.
Subcarb. Magnes. drach. unam.
Divide in partes sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei rheumatischem krampfhaftem Asthma. (*Au.*)

℞. Florum Zinci . grana duodecim.
Opii . . . . . grana tria.
Extr. Chinae. flav. aquosi drachmam.
Elaeosacchari Anisi drachmas duas.
Pulvera et divide in partes duodecim. (Ful.)

Pulvis stomachicus. (*B.*)

℞. Florum Zinci . . granum unum.
Magnesiae calcinatae scrup. unum.
Alle zwei Stunden, bei Verdauungsbeschwerden.

℞. Florum Zinci . grana quatuor.
Colombo . . . grana triginta.
Divide in partes quatuor. — Gabe, alle drei Stunden ein Stück.

Collyrium siccum s. adstringens. (LH. *Ca. Ra. Va.*)

℞. Tutiae (Oxydi Zinci),
Sacchari cryst., sing. semidrachmam.
Fiat pulvis tenerrimus. (LH. Hôt. D. et Hosp. Ven. *Ra. Va.*)

℞. Tutiae,
Iridis Florentinae,
Sacchari cryst., sing. part. aeq.
Fiat pulvis tenerrimus. (*Ca.*)

Pulvis cephalicus niger. (Li.)

℞. Florum Zinci . drachmam unam.
Pulv. Visci,
— Carbonis, sing. unciam unam.
Gabe, fünfzehn bis zwanzig Gran für ein Kind von einem Jahre.

Pulvis Calaminae cum Myrrha. (*Re.*)

℞. Calaminae praepar.,
Myrrhae, sing. . partes aequales.
Misce. — In schmerzlose Geschwüre zu streuen zur Beförderung der Vernarbung.

Pulvis antistrumosus. (*Au. Sm.*)

℞. Oxydi Zinci . . uncias quatuor.
Ossis Sepiae,
Testar. Ovor., sing. uncias duas
Telae laneae scarlatinae (drap d'écarlate) . . . sesquiunciam.
Combure simul in vase clauso et residuum pulvera. (*Sm.*)

Au. Oxydi semunciam, Testarum drachmas duas et Telae sesquidrachmam.
Gabe, achtzehen Gran, täglich zwei Mal für einen Erwachsenen. — Dieses Mittel wird von Dehaen empfohlen.

Boli diaphoretici sedantes s. antispasmodici. (LH. *B.*)

℞. Florum Zinci,
Extr. Aconiti, sing. grana quatuor.
Sulph. Antimon. aur. grana duo.
Liquiritiae pulveratae,
Mellis, sing. . . . . q. s.
Fiant boli quatuor. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei Hüftweh, Veitstanz, Hysterie, Rheumatismen und chronischer Gicht.

℞. Valerianae,
Foliorum Aurantii, sing. semidrachmam.
Oxydi Zinci . . . . grana duo.
Syrupi communis quantum satis ut fiant boli duo. — Gabe, ein Stück, täglich zwei Mal. (LH.)

Pilulae lenientes s. sedantes. (Gen. *B. E.*)

℞. Florum Zinci . scrupulos duos.
Conservae Cynorrhodontis . q. s. ut fiant pilulae viginti quatuor. (Gen. *E.*)

℞. Florum Zinci . . . grana octo.
Extracti Aconiti . . grana sex.
Fiant pilulae sex. — Gabe, ein Stück alle vier Stunden. (*B.*)
Diese Pillen werden bei Epilepsie, Veitstanz und chronischen Exanthemen empfohlen.

Collyrium adstringens. (*Sw.*)

℞. Florum Zinci . drachmam unam.
Mucil. Sem. Cydoniorum c. Aqua Rosarum praeparati unc. decem.
Contere simul.

Lotio e Zinco et Cupro composita s. adstringens. (*Au. E. Sp. Sw.*)

℞. Florum Zinci . grana duodecim.
Sulphat Cupri gr. tria ad quatuor.
Mellis rosati . drachmam unam.
Aquae Calcis . . . uncias duas.
Zum Verbinden venerischer Geschwüre empfohlen. (*E. Sp. Sw.*)

℞. Florum Zinci . . unciam unam.
Aq. Flor. Sambuci sesquiunciam.
Thuessink rühmte dieses Präparat bei pustulösem Erysipelas. (*Au.*)

Collyrium resolvens. (*Pie. Sp. Va.*)

℞. Oxydi Zinci . . granum unum.
Aquae Plantaginis unciam unam.
Gut umgeschüttelt anzuwenden. (*Va.* Hosp. Inf.)

℞. Tutiae . . . . semidrachmam.

Aloës . . . drachmam unam.
Aquae Rosarum,
— Foeniculi,
— Euphrasiae, sing. unc. unam.
Misce. (*Pic.*)

Sp's folgende Formel, welche er unter dem Namen *Aqua ophthalmica* anführt, enthält ſicher kein Atom Zink.

℞. Tutiae praeparatae,
Caryophyllorum,
Sacchari cryst., sing. unc. unam.
Camphorae,
Aloës, sing. . . sesquidrachmam.
Vini Hisp. unc. quadraginta octo.
Aquae Rosar. albar. . uncias sex.
— Chelidonii,
— Foeniculi,
— Euphrasiae,
— Rutae, sing. . uncias duas.

Post quatuordecim dies macerationis in sole, decantha.

Aqua ophthalmica usualis. (Br.)

℞. Aquae Rosarum,
— Foeniculi, sing. uncias quinque.
Tutiae praeparatae drachmas sex.
Acetatis Plumbi sesquidrachmam.
Camphorae . drachmam unam.
Sulphatis Zinci . scrupulos duos.
Misce exacte et serva.

Ceratum Calaminae s. calaminare s. Lapidis calaminaris s. Carbonatis Zinci impuri s. epuloticum s. e Zinco, Collyrium Nihili s. zincicum s. e Zinco, Unguentum calaminare s. Lapidis calaminaris s. e Lapide calaminari s. Carbonatis Zinci impuri s. Oxycarbonatis Zinci impuri s. Oxydi Zinci s. Oxydi Zinci impuri s. nativi s. de Nihilo s. Tutiae s. Zinci s. griseum s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum album s. Diapompholigos, Pomatum Oxydi Zinci. (Am. Ams. B Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gal. Gen. Ham. Han. HassP. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. RC. Sax. *Au. Br. C. Ca. E. Fi. Gr. Huf. Pic. Re. Sp. T. Sw.*

℞. Olei Olivarum . . partes duas
Cerae flavae . . partem unam.
Liquatis et mixtis adde
Calaminae pulv. . partem unam.
Agita ad refrigerationem usque. (Am. B*. Han. Lon. Lus. *C. Gr. Sw.*)

Ful. Olei partes duodecim, Cerae sex, et Calaminae quatuor cum dimidia; — Ams. Olei duas, Cerae unam; — *Ca.* Olei sex, Cerae albae unam et unam Calaminae; — LP. Olei libram unam, Oxydi uncias tres, Cerae albae quatuor; — RC. Adipis suilli semi libram, Cerae flavae, Calaminae, sing. unciam, Olei Napi semunciam; — LonN. *Re.* Calaminae, Cerae flavae, sing. semilibram, Olei Olivarum octarium. (*Turner's cerate.*)

℞. Axungiae Porci part. triginta duas.
Cerae albae . . . partem unam.
Liquatis adde
Tutiae . . . . . partes octo.
Misce exacte. (Lus.)

℞. Cerati (Cetacei) . . partes octo.
Oxydi Zinci . . . partem unam.
Tere et sedulo misce. (B. Bor. Han. HassP. O. Pol. Sax.)

Du. *Gr.* Cerati partes duodecim et Oxydi Zinci unam cum dimidia; — Du. Ed. *C. Gr. Re.* Cerati quinque et unam Oxydi; — Gen. Cerati duodecim et Oxydi unam; — *Au.* Oxydi drachmas duas et Unguenti rosati unciam unam; — Bor4. Zinci oxydati drachmam unam, Unguenti simplicis drachmas; — *Gr.* Lon. 1788. Tutiae praep. q. pl., Linim. Cerae alb. q. s.; vel: Flor. Zinci unc. unam, Linim. simpl. sex.

℞. Axungiae Porci . . . partes sex.
Oxydi (Flor.) Zinci partem unam.
Misce triturando. (Fenn. Lon. *C. Gr. Re.*)

Pic. Axungiae partes duas et unam Oxydi; — Pal. Adipis anserini duas et unam Oxydi; — Ham. Axungiae tres et unam Oxydi; — Ful. Butyri tres et unam Oxydi; — *Br.* et *Sw.* Axungiae quatuor et unam Oxydi; — *Pic.* Butyri quatuor et Oxydi unam; — Am. Br. et *C.* Axungiae quinque et Butyri unam; — An. et Bel. Axungiae octo et Oxydi unam; — Li. Axungiae tres, Butyri recentis sex et unam Oxydi; — *Huf.* Axungiae octo et Oxydi unam; — *E.* Butyri sex et unam Oxydi; — *Gr.* 1745. Tutiae quant. placet, Axung. Viper. q. s. vel Lon. ante 1745. Tutiae praep. drachm. duas, Lap. calamin. unciam, Ungt. rosac. sesquilibram.

℞. Oxydi Zinci . . partem unam.
Butyri in Aqua Rosarum loti,
Unguenti rosati, sing. partes duas.
Misce exacte. (Gal.)

℞. Axungiae Porci . . . partes 24.
Matris Perlarum,
Corallii rubri, sing. part. unam.
Tutiae,
Nihili albi, sing. . . partes duas.
Misce sedulo. (*Sp.*)

Fi. T. Cerae flavae, Olei Rosarum, sing. uncias sex, Cerussae duas, Tutiae porphyr. unam, Sulphureti Plumbi tantidem, Olibani semunciam. (*Unguentum Tutiae.*) Si. loco tutiae Flores

Zinci vel potius Carbonatem Zinci per praecipitationem adhibes, *Unguentum vel Ceratum Diapompholigos* nominatur.

Unguentum Nihili s. Nihili ad oculos s. ophthalmicum s. Zinci, Pomatum Oxydi Zinci camphoratum. (Br. D. Pal. Wir. *Sw. Vm.*)

℞. Oxydi Zinci . . unciam unam.
Camphorae . scrupulum unum.
Axungiae Porci . . uncias sex.
Misce triturando. (D.)

℞. Axungiae . . . . uncias sex.
Olei Amygdal. dulc. uncias tres.
Cerae albae . . . uncias duas.
Liquatis adde
Oxydi Zinci . . . uncias tres.
Camphorae c. Oleo trit.
drachm. tres.
Misce exacte. (*Sw**)

Vm. Olei Amygdalarum dulc. unciam, Axungiae, Cerae, sing. semunciam. Calaminae sesquiunciam, Tutiae drachmas duas et Camphorae semidrachmam.

℞. Tutiae praeparatae,
Nihili albi, sing. unciam unam.
Corallii rubri,
Nacrae Perlarum, sing.
semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Axungiae Porci . libram unam.
Misce triturando. (Br. Pal. Wir.)

Unguentum s. Pomatum antihaemorrhoidale, Unguentum desiccativum, Ceratum Hufelandi, Pomatum contra intertriginem. (B*. *Au. Ca. Pie. Re.*)

℞. Florum Zinci,
Pulv Lycopodii, sing. drach. unam.
Cerati . . . . . semunciam.
Contere. (*Au. Pie.*)

B*. Oxydi, Lycopodii, sing. drachmam et Unguenti rosati uncias quatuor; — *Ca.* Oxydi, Lycopodii, sing grana triginta sex et Cerati Cetacei albi unciam.

℞. Florum Zinci,
Pulv. Lycopodii, sing.
gr. quindecim.
Axungiae Porci . . semunciam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis, sing. . q. s.
Triturando exacte misce. (*Pie.*)

℞. Oxydi Zinci . . drachmas duas.
Submur. Hydrarg. drachm. unam.
Axungiae recent. . . . unciam.
Misce. (*Re.*)

Cerutum s. Unguentum exsiccans s. ophthalmicum s. ad ambusta. (B*. Han. *Bo. Ca. Gr.*)

℞. Olei Olivarum . . uncias octo.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Liquatis adde
Boli Armenae . . unciam unam.
Florum Zinci . . . semunciam.
Misce bene. (Han.)

℞. Olei Olivarum . uncias quatuor.
Cerae albae,
Calaminae, sing. . unciam unam.
Acetatis Plumbi drachmas duas.
Fiat ceratum. (*Bo.*)

℞. Tutiae,
Acetatis Plumbi,
Calaminae, sing. scrupulos duos.
Camphorae . . . grana quatuor.
Unguenti rosati quantum sufficit.
Tritura simul. (B*.)

Gr. Tutiae, Lapid. calamin., sing. drachm. sex, Plumbi usti, Camph., sing. duas, Myrrh., Sarcocoll., Aloës, Vitriol. alb., sing. unam, Butyri recent. unc. duodecim, Cerae alb. duas.

Unguentum rubrum desiccativum (*Gr.*): Ol. comm libr. duas, Cerae flav. unc. duodecim, Boli Armen., Colcoth. sing. unc. sex, Lap. calam. quatuor, Litharg., Ceruss., sing. sex c. dimid., Camph. semunciam.

Unguentum ophthalmicum Sloani s. rubrum. (*Sp.*)

℞. Tutiae . . . . unciam unam.
Haematitis . . scrupulos duos.
Aloës . . . . grana duodecim.
Margaritar. praep. . gr. quatuor.
Axungiae Viperarum . . . q. s.
ut fiat unguentum.

Unguentum oculare Keiseri s. ophthalmicum viride. (Ams.)

℞. Tutiae . . . . . semunciam.
Camphorae . drachmam unam.
Aeruginis . . grana duodecim.
Axungiae Porci . . uncias duas.
Misce.

Unguentum oculare album s. ophthalmicum album. (*Vm.*)

℞. Oxydi Zinci . . drachmas tres.
Mercurii dulcis . semidrachmam.
Camphorae . scrupulum unum.
Cerae albae . . drachmas duas.
Butyri Cacao,
Olei Amygdal. dulc., sing.
unc. unam.
Misce triturando.

Unguentum ophthalmicum (LH.): Oxydi Zinci scrupulum unum, Calomelanos semiscrupulum, Axungiae Porci, Unguenti rosati, singulorum drachmas duas.

Linimentum Tutiae (*Re.*): Tutiae drachmam, Mellis Rosar. q. s.

Pommade divine (*Re.*): Medullae bo-

vinae sesquilibram, Calaminae, Benzoës, Storacis, Rad. Irid. Florent, sing. unciam, Cinnamomi sesquiunciam, Nucis moschatae drachmam.

Unguentum ad ophthalmias scrophulosas (*Va* Hosp. Inf.): Oxydi Zinci gr. quindecim, Calomel. duodecim, Camph. octo, Butyri rec. drachmas duas, But. Cacao semidrachm. Wie ein Stecknadelskopf groß alle 2 oder 3 Tage bei Schlafengehen, auf den Rand der Augenlider.

Emplastrum griseum s. de Lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus Chirurgorum. (Ams. B*. Bor4. Br. D. DD. Ful. Han. Li. Pal. Sax. Suec. Wir. Wür. *Sp. Vm.*)

℞. Calaminae . . . libram unam.
Lithargyri . . . . semilibram.
Olei Olivarum . . sesquilibram.
Coque, continue agitando. (B*. Ful.)

℞. Emplastri simplicis sesquilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum, sing. unc. novem.
Liquatis adde
Calaminae pulveratae sesquilibram.
Misce bene. (Ams.)

℞. Emplastri simplicis,
Calaminae pulv., sing. sesquilibram.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Sevi hircini,
Terebinthinae, sing. sesquiunciam.
Liquefac et misce exacte. (D.)

Suec. et *Vm.* Emplastri simpl., Calaminae, sing. libras duas, Cerae uncias quinque, Sevi sesquiunciam et Terebinthinae tantidem.

℞. Emplastri simplicis . uncias sex.
Liqua et adde
Calaminae pulveratae uncias duas.
Pulv. Mastichis,
— Olibani, sing. drach. unam.
Misce bene. (Sax.)

℞. Emplastri simplicis libram unam.
Olei Olivarum . uncias quinque.
Liqua et adde
Pulv. Calaminae uncias quatuor.
— Myrrhae,
— Olibani, sing. drach. duas.
Misce exacte. (Han.)

Li. Emplastri simpl. uncias decem, Olei Olivarum octo, Calaminae sex, Mastichis unam et Olibani dimidiam.

℞. Olei Napi . . uncias octodecim.
Calaminae . . uncias duodecim.
Lithargyri . . . . uncias sex
Cerae flavae . . unciam unam.
Liqua et exacte misce. (DD.)

℞. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singulorum semilibram.
Olibani . . . . . semunciam.
Mastichis . . . unciam unam.
Olei Olivarum quantum sufficit.
Fiat emplastrum. (Wür.)

Bor4. Empl. Cerussae, Empl. Lithargyri simpl., sing. uncias duodecim, Lapidis calaminaris, Olibani, Mastichis, sing. semunciam.

℞. Cerae . . . . . uncias tres.
Sevi cervini . . uncias quatuor.
Terebinthinae . . sesquiunciam.
Liqua et adde
Pulv. Calaminae,
— Lithargyri, sing. sesquiunc.
— Tutiae,
— Mastichis,
— Olibani, sing. semunciam.
Camphor. c. Olei pauxillo tritae drachmam.
Misce sedulo. (*Sp.*)

Br. et Wir. Cerae uncias tres, Sevi quatuor, Terebinthinae unam cum dimidia, Calaminae unam, duas Lithargyri, Tutiae, Mastichis, Olibani, sing. dimidiam, Myrrhae drachmas duas et Camphorae unam cum dimidia; — Pal. Cerae, Sevi, sing. uncias octo, Terebinthinae sex, Calaminae quatuor, Lithargyri, Cerussae, sing. tres, Tutiae, Mastichis, Olibani, Myrrhae et Camphorae, sing. semunciam.

Emplastrum Diapompholigos s. zinci-co-plumbicum. (Ams B*. Br. Fenn. Han. Sax. Suec. Wir. *Sp. Vm.*)

℞ Emplastri grisei partes sedecim.
Plumbi usti . . partem unam
Liqua et misce bene. (Sax.)

℞. Olei Solani partes triginta quatuor.
Cerussae . . . partes decem.
Coque et adde
Cerae . partes triginta quatuor.
Plumbi usti . . . partes sex.
Pompholigis,
Olibani, singulorum partes quatuor.
Misce exacte. (*Sp.*)

Br. et Wir. Olei Solani libras duas cum dimidia, Cerussae sesquiunciam, Cerae albae uncias triginta, Plumbi usti sesquiunciam, Pompholigis et Olibani, sing. quatuor; — *Vm.* Olei Olivarum partes sex, Cerussae decem, Cerae octo, Resinae Pini unam, Plumbi usti duas, Pompholigis et Tutiae, sing. tantidem.

℞. Olei Olivarum . . semilibram.
Cerae flavae . . libram unam.
Liqua et adde
Plumbi usti . . . semilibram.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Pompholigis . . . uncias tres.
Olibani . . . . sesquiunciam.
Misce sedulo. (Fenn. Suec.)

B. Olei partes septem, Cerae duodecim, Plumbi usti sex, Cerussae quatuor, tres Pompholigis et Olibani unam cum dimidia; — Ams. Olei triginta, Cerae triginta sex, Plumbi usti duodecim, Cerussae octo, Pompholigis sex et Olibani duas cum dimidia; — Han. Olei quindecim, Cerae sedecim, Plumbi usti, Cerussae, sing. tres, Pompholigis, Olibani, sing. duas.

Emplastrum saturninum, *Emplastrum saturninum Mynsichti.* (Pal. Wir.)

℞. Sevi hircini,
Cerae albae, sing. sesquiunciam.
Terebinthinae . drachmas sex.
Liqua et adde
Pulv. Plumbi usti . uncias duas.
— Calaminae,
— Cerussae, sing. semunciam.
— Nihili albi,
— Tutiae, sing . drach. duas.
— Myrrhae,
— Mastichis,
— Olibani, sing. drach. unam.
— Aloës,
— Camphorae,
— Nitri, sing. semidrachmam.
Misce. (Pal.)

Wir. Sevi, Cerae flavae, sing. uncias quinque, Terebinthinae, Plumbi usti, sing. duas, Calaminae, Cerussae, sing. semunciam, Pompholigis, Tutiae, sing. drachmas duas, Myrrhae, Mastichis, Olibani, Aloës, Nitri, sing. drachmam unam et Camphorae semidrachmam.

Unguentum Diapompholigos s. Pompholigis s. exsiccans s. ad ambusta s. Lapidis calaminaris s. Lapidis calaminaris saturninum. (Br. O. Pal Sar. Wir. *Gr. Sp. T. Vm.*)

℞. Unguenti nutriti unc. triginta duas.
Calaminae pulv. uncias quatuor.
Misce exacte. (O.)

Gr. Cerati Calamin. unciam, Extr. Saturni drachmam.

℞. Camphorae . drachmam unam.
Cerussae . . . . semunciam.
Cerae flavae,
Calaminae, singulorum uncias duas.
Olei Olivarum . uncias quinque.
Tere cerussam et calaminam cum olei pauxillo, adde reliquum olei ceram in solutione tenens, tunc camphoram cum olei pauxillo tritam et ad refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

℞. Olei Solani . . uncias sedecim.
Cerae . . . . uncias quinque.
Liqua lente et adde
Pulv. Cerussae . . uncias duas.
— Pompholigis,
— Plumbi usti,
Pulv. Olibani, sing unc. unam.
Misce. (*Sp.*)

T. Cerae flavae, Olei rosati, sing. uncias sex, Cerussae duas, Florum vel Carbonatis Zinci unam, Plumbi usti unam, Olibani dimidiam.

℞. Olei rosati . . . libras duas.
Succi Bacc Solani unc. quatuor.
Coque ad humidi consumptionem et adde
Cerae albae . . . uncias sex.
Pulv. Cerussae . . uncias duas.
— Plumbi usti,
— Tutiae,
— Olibani, sing. . unc. unam.
Misce exacte. (Sar.)

Br. et Wir. Olei rosati uncias sex, Succi Solani, Cerae, sing. quatuor, Plumbi usti, Pompholigis, Olibani, sing. unam; — Pal. easdem quantitates, sed Cerae uncias tres et loco plumbi usti Cerussae uncias duas

Ceratum Lapidis calaminaris (LP.): Lapidis calaminaris libram unam, Olei Olivarum duas, Cerae flavae unam, Minii drachmas sex, Camphorae tres.

Unguent. exsiccans (*Dulk.*): Olei Olivarum libras tres, Cerae flavae unam, Boli Armenae, Calaminae, sing. semilibram, Lithargyri, Cerussae, sing. uncias sex, Camphorae drachmas sex, fiat s. a. ung.

Unguentum Calaminae compositum s. exsiccans rubrum Acrelii. (Fenn. Suec.)

℞. Calaminae,
Lithargyri,
Cerussae, singulorum semilibram.
Minii,
Acetatis Plumbi, sing. uncias tres.
Sevi hircini . . . libram unam.
Olei Lini . . . . uncias octo.
Liqua sevum, adde oleum, tunc pulveres et massae refrigeratae
Camphorae pulv. drachmas tres.

Ammoniuretum Zinci. (*Vm.*)

℞. Acetatis Zinci liquidi quantum vis.
Infunde sensim Ammoniacum liquidum, donec nullum amplius provocatur praecipitatum, quod lotum et siccatum in Ammoniaci quam minima quantitate solve, filtra, lente consume et crystallisationi subjice.

Vitriolum album s. Goslariense s. Zinci, Sulphas Zinci s. zincicum, Zincum oxydatum sulphuricum s. sulphuricum, Gilla Vitrioli s. Theophrasti, Sal vomitorium Vitrioli, Chalcantum album: weißer Vitriol, Zinkvitriol.

1) Wie man ihn im Handel findet.

Vitriolum album s. Zincum sulphuri-

cum s. vitriolatum venale, Sulphas zincicus venalis.

Am. Ams. B. Bel. BorC. Bor4. Br. D. DD. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Han. Hass. HassP. His. His3. Li. Lus. R. Suec. Wir. Wür. WW. *C. Fi. Gr. Par. Pid. Sa. Sp. T. Va.*

2) Reinigung des käuflichen.

℞. Vitrioli albi . . quantum vis.

Calcinatum in Aqua dissolve et pluribus crystallisationibus subjice. (Gal.)

Wir. eundem agendi modum indicat, calcinationem tamen omittens; — Ful. Li. Wür. *Gr.* dissolvere Salis libram unam in duabus Aquae bull., liquorem in digestione relinquere per sex horas cum Zinci granulati drachmis sex, tunc consumere et crystallisationi subjicere; — His3. ut sulphatem aluminae.

3) Bereitung.

A. An. B. Ba. Bel. Bor. Bor4. Du. Ed. Fenn. Fer. Han. HassP. His. His3. Lon. LonN. O. Pm. Pol. RC. Sax. Suec. *Br. C. Fi. Re. Sw. T. Vm.*

℞. Acidi sulphurici (20°) . . q. vis.

In capsula vitrea balneo arenae immitte, calefac leviter, adde sensim Zincum granulatum, liquorem Aquae pauxillo dilue, satura, consume et in crystallos coge.

Bor4. Pm. Acidum sulph. crudum cum Aquae comm. partibus quinque dilutum indicant; — *Fi.* et *T.* Acidi concentrati partem unam et Aquae sex vel septem; — LonN. *Gr. Re.* Zinci uncias quatuor, Acidi uncias sex, Aquae dest. octarios quatuor; misce, finita effervescentia cola, coque ad pelliculam et sepone ut fiant crystalli; — HassP. Zinci Indici in frustula comminuti vel granulati libram unam in Acidi Vitrioli q. s. dissolvere, liquorem saturatum filtrare et vaporationi subjicere, donec vitriolum album secerni incipiat, adde re deinde Acidi Nitri uncias duas, et post aliquot ebullitiones admiscere Florum Zinci sesquiunciam; liquorem tunc cum Aquae dest. partibus quatuor diluere, denuo per semihoram coquere, filtrare, ad pelliculam consumere et in crystallos cogere, quod toties repetendum est, quoties crystalli formantur, quas loco tepido cito siccatas serva.

Man wendet dieses Salz theils äußerlich als adstringirendes, theils innerlich als tonisches und adstringirendes Mittel zu einem bis fünf Gran, zwei oder drei Mal täglich, und als Brechmittel zu zehen bis zwanzig Gran in destillirtem Wasser an.

Pilulae expectorantes s. adstringentes. (*E. Par. Va.*)

℞. Sulphatis Zinci semiscrupulum.
Conservae Rosarum . . . q. s.
Fiant pilulae viginti. — Gabe, ein Stück täglich drei Mal, bei Keuchhusten und Lungenschwindsucht. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana decem.
Myrrhae . . sesqui- (semi- *Va.*) drachmam.
Confectionis Rosarum . . q. s.
Fiant pilulae viginti. — Wie die vorigen, bei Keuchhusten von Nutzen. (*E. Par. Va.*)

Pilulae Zinci (*Re.*): Sulphatis Zinci drachmas duas, Terebinth. comm. q. s. ut fiant pil. no. 60. — Bei Gonorrhöe und Leukorrhöe.

Solutio Sulphatis Zinci aquosa simplex. (Am. B*. RC. *Au. C.*)

1) Zum innern Gebrauch.

℞. Sulphatis Zinci . . grana duo.
Aquae Chamomillae uncias tres.
Dissolve. — Gabe, ein Löffel täglich zwei oder drei Mal.

Wyllie wendet bei bösartigen Fiebern alle zwei oder drei Stunden einen Löffel einer Auflösung von neun Gran schwefelsaurem Zink in sechs Unzen Aqua Sambuci an. Mosely empfiehlt ebenfalls gegen chronische fieberlose Ruhr eine Auflösung von drei Drachmen schwefelsaurem Zink und zwei Drachmen Alaun in einer halben Unze Lavendelgeist und einer Pinte Wasser, zu vier bis sechs Drachmen in Wasser gegeben, und dieses selbst bisweilen nach drei Stunden wiederholt.

Am. und *C.* haben eine ähnliche Formel:

℞. Ligni Quassiae drachmam unam.
Sulphatis Zinci . . grana octo.
Aquae . . . . semioctarium.
Post duodecim horas macerationi scola.

2) Zum äußern Gebrauch.

A. In Gestalt von Collutorium.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae destillatae . uncias sex.
Solutioni adde
Mellis crudi . . unciam unam.
Misce (B*.)

℞. Sulphatis Zinci grana quindecim.
Infusi Salviae . . . uncias sex.
Dissolve. (*Au.*)

RC. Sulphatis scrupulum unum, Aquae ferventis sesquiunciam.

B. In Gestalt von Collyrium.

Aqua ophthalmica s. ophthalmica adstringens s. vitriolica s. Sulphatis Zinci s. e Vitriolo Zinci s. vitriolica camphorata s. Zinci vitriolata cum Camphora, Aqua Vitrioli albi, Solutio Sulphatis Zinci s. zincici, Mixtura Zinci Sulphatis, Collyrium vitriolicum s. e Zinco sulphurico s. Vitrioli albi s. Zinci Sulphatis s. e Vitriolo albo s. Zinci, Col-

lyrium cum Zinci Sulphate s. adstringens s. detergens s. detersivum. (Am. B*. BorC. DD. Ed. Gal. GalM. Ham. LH. Lus. RC. Sar. Suec. WW. *Au. Bo. C. Ca. Gr. ParC. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. T. Va.*)

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.
Aquae partes ducentas quadraginta.
Dissolve. (BorC. DD. WW.)

GalM. Salis partem unam et Aquae ducentas; — Lus. Suec. *Re. Sp. Va.* Char. Aquae nonaginta sex; — DD. Aquae sexaginta quatuor; — Am. et *C.* Sulphatis grana duodecim et Aquae semioctarium; — *ParC.* Sulphatis grana quatuor ad sex et Aquae uncias sex; — *Va.* Sulphatis granum unum ad quinque, Aq. anciam.

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.
Aquae partes ducentas quadraginta.
Dissolve. (B*.)

Man kann das Doppelte Waſſer nehmen und nöthigenfalls zwei Drachmen Quittenſchleim zuſetzen.

Ham. Salis partem unam et Aquae trecentas viginti; — *Ra. Va.* Aquae centum viginti; — *Ra.* et *Sw.* Salis partem unam et Aquae nonaginta sex; — *Gr.* Vitrioli albi grana decem, Aquae Rosarum uncias octo; — *Sa.* et *Sw.* Salis partem unam et Aquae quadraginta octo; — *Au.* Salis granum, Aquae Rosarum unciam et Mucilaginis Seminum Cydoniorum drachmam; — LH. Aquae destillatae uncias sex, Sulphatis grana tria, Mucilaginis Gummi Arabici semunciam.

℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Infusi Sambuci . libram unam.
Dissolve. (*Ra.*)

Ra. praeterea: Sulphatis granum et Aquae Plantaginis unciam; — *Va.* Hosp. Inf. Sulphatis grana quinque, Infusi Sambuci uncias quatuor; — Am. et *C.* Sulphatis drachmas duas, Spiritus Lavandulae uncias duas et Aquae uncias sex (*Mixtura Zinci Sulphatis (C.)*; — Sar. Vitellum Ovi coctione concretum eximere, Sulphatem Zinci ingerere et liquorem post aliquot tempus profluentem commiscere cum Aquae Rosarum et Plantaginis, sing. unciis sex; — *Au.* Sulphatis grana tria dissolvere in Aquae Rosarum cum Albumine Ovi unius subactae sesquiuncia; — *Gr.* Vitrioli albi semidrachmam, Albumen Ovi unius, Aquae Rosarum uncias quatuor.

℞. Sulphatis Zinci grana quinque.
Aquae Plantaginis uncias quatuor.
Mucil. Sem. Cydonior. semunciam.
Dissolve. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana sedecim.
Aquae . . . . . uncias octo.
Acidi sulphurici Aquae diluti guttas sedecim.
Dissolve sal in aqua et adde acidum. (Ed. RC. *C. Re.*)

LP. Sulphatis grana sex, Aquae uncias octo, Acidi diluti guttas duodecim; interdum Camphorae in Alcohole sol. grana aliquot addere convenit.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae Rosarum . . libras duas.
Alcoholis 22° . . unciam unam.
Dissolve. (Gal.)

T. Sulphatis, Sacchari raff., sing. scrupulum unum, Aquae Rosarum uncias quatuor, Spiritus Vini guttas quatuor vel sex.

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Camphorae . . grana quatuor.
Aquae Euphrasiae,
— Rosarum,
— Plantaginis, sing. unc. unam.
Dissolve. (*Bo.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana viginti.
Alcohol. camph. . . unc. unam.
Aquae destill. . . . unc. octo.
(*Va* Guy's Hosp.)

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Aquae destillatae . uncias sex.
Mucil. Cydoniorum unc. unam.
Aquae Vitae camph. gutt. duodecim.
Misce. (*Sw.*)

℞. Vitrioli albi . . semidrachmam.
Camphorae . . . uncias duas.
Aquae bullientis . libras duas.
Dissolve et filtra. (*Gr.*)

Praeterea loco camphorae Spiritus camphorati semidrachmam, caeterum ut antea; vel: Vitrioli albi semidrachmam, Spiritus Camphorae sesquidrachmam, Aquae ferventis uncias duas, Aquae Rosarum uncias quatuor; — *Re.* Sulphatis grana quindecim, Camphorae decem, Aquae bullientis uncias sex (*Collyrium Zinci Sulphatis camphoratum*).

C. In Geſtalt von Bähung oder Waſchung (*Lotio, Fomentatio Zinci Sulphatis*). (B*. *Au. Re. Sw. Sy. Va.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana duo.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Dissolve. (*Sy.*)

B*. Sulphatis drachmam et Aquae unciam; — *Au.* Sulphatis drachmas tres et Aquae unciam; — *Re.* Sulphatis semidrachmam, Aquae octarium; praeterea: Sulphatis libras duas, Aquae bull. octarios sex (Art. Veterin.); — *Va.* Sulphatis drach. unam ad duas, Aq. destill. libr. duas.

℞. Sulphatis Zinci,
Aquae Vitae camph., sing. semunciam.
— bullientis . . libras duas.

Dissolve (*Sw. Sp.*)

D. In Einſpritzung. *Injectio Sulphatis Zinci s. adstringens.* (B*. DD. His. His3. *Sw. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci . granum unum.
Aquae . . . . unciam unam.
Dissolve. (B*. His. His3. *Re.*)

Re. Interdum Acetas Plumbi additur et loco aq. dest. Aq. Rosar. adhibetur; — B*, praeterea: Salis grana triginta quinque et Aquae uncias quatuor; vel Salis scrupulum unum ad semidrachmam et Aquae unciam.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aquae camphoratae uncias duas.
— purae . . . libras duas.
Dissolve. (*Sw. Sy.*)

Injectio adstringens. (*B.*)

℞. Aquae Plantaginis . uncias sex.
Laudani Sydenhami guttas triginta.
Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Mucil. Gummi Arab. unc. unam.

Bei Blennorrhöe. (*B.*)

℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Boli Armenae . scrupulos duos.
Gummi Arabici drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.

Bei Gonorrhöe. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana decem.
Gummi Arabici drachmas duas.
Tincturae Opii drachmam unam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Bei Genorrhöe. (*E.*)

Injectio adstringens anodyna. (LH.)

℞. Aquae Rosarum . . uncias sex.
Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi, singulorum grana sex.
Opii . . . . . grana quatuor.
Mucil. Gummi Arab. unc. unam.

Häufig wird das Opium auch weggelaſſen

Gargarisma adstringens. (*E.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Mellis . . . . . semunciam.
Tincturae Myrrhae,
Aquae Vitae, sing. unciam unam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Fomentatio adstringens, Fomentum tonico-adstringens. (*B. Va.*)

℞. Dec. Cort. Granati libras quatuor.
— Chinae . . . libras duas.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Tinct Opii . unc. (drachm. *Va.*) unam.

Bei äußern Hämorrhoiden und Blennorrhöe der Scheide.

Collyrium resolvens, Liquor ophthalmicus detersivus. (Pal. *Ca. Sm.*)

℞. Rad. Iridis Flor. pulv drach. tres.
Sulphatis Zinci sesquidrachmam.
Aq. Rosarum,
— Plantaginis, sing. sesquilibram.
Digere per dies duos et cola. (Pol.)

℞. Iridis Florentinae,
Sulph. Zinci, sing. semidrachmam.
Sacchari crystall. . scrup. duos.
Aquae Rosarum . libram unam.
Digere per tres dies et cola. (*Ca. Sm.*)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 2.
Aquae Rosarum . libram unam.
Tritura simul et adde
Sulphatis Zinci . grana 12—24.
Dissolve. (*Sm.*)

Injectio sedativa adstringens. (*Ca. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana sex.
Oxydi Plumbi grisei grana viginti.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce agitando. (*Ca.*)

Sy. Sulphatis grana octodecim, Pulveris Cerussae compositi grana sexaginta et Aquae Tiliae vel Rosarum uncias duodecim.

Collyrium adstringens. (*Au. B. C. Gr. Pic. Va.*)

℞. Sulphatis Zinci . grana viginti.
Tutiae . . . . semidrachmam.
Aquae Rosarum,
— Plantaginis, sing. unc. tres.
Misce. (*Pic.*)

℞. Aquae Rosarum . . uncias tres.
Sulphatis Zinci . . grana tria.
Laudani Sydenh. . scrup. unum.
Misce. (*B. Va.*)

Va. loco laudani Extracti Opii grana duo; — *Gr.* Vini Opii drachmas duas, Zinci Sulphatis semiscrupulum, Aquae Rosarum, Aquae purae, sing. uncias sex.

℞. Sulphatis Zinci,
Boli Armenae, sing. . uncias duas.
Camphorae . . . semunciam.

Man vermiſcht eine Drachme dieſes Pulvers mit vier Unzen Roſenwaſſer. (*Au. C.*)

Aqua ophthalmica. (*Sp.*)

℞. Sacchari cryst. albi unc. unam.
Rad. Iridis Flor. drachmas tres.
Tutiae praeparata,
Sarcocollae,
Sulphatis Zinci,
Aloës, sing. . drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulum unum.
Aquae Euphrasiae,
— Foeniculi,
— Rosarum, sing. uncias octo.
Vini Hispanici . . . uncias 24.

Post quatuordecim dies infusionis solis calore, decantha.

Aqua s. Liquor s. Injectio adstringens s. Sulphatis Zinci aluminosa, Liquor Aluminis compositus, Solutio Zinci aluminosa, Injectio ad leucorrhoeam, Aqua aluminosa Bateana s. Batiana, Solutio vitriolica s. Supersulphatis Aluminae et Potassae composita, Aqua styptica, Errhinum haemastaticum. (DD. Fer. His. His3. LH. Lon. LonN. LP. Lus. RC. *Au. B. Ca. E. Pie. Re. Sa. Sw*.*)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis calcin., sing. semunciam.
Aquae purae libras (octarios) duas.
Dissolve. (DD. Lon. LonN. LP. RC. *Au. C. Ca. Re. Sw*.*)

LH. Aluminis, Sulphatis, sing. ut antea, Aquae ferv. libras duas cum dimidia; — *Ca.* praeterea: Salium, sing. quantitatis antea dictae dimidium; — Fer. et Lus. Salium, cujusque semunciam et Aquae bull. libras duas cum dimidia; — *Sa.* Salium, sing. drachmam et Aquae libram; — *E.* Sulphatis sesquidrachmam, Aluminis semidrachmam et Aquae bull. semioctarium.

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis, singulorum semunciam.
Aquae Rosarum . libram unam.
Solutionem filtra. (His. His3.)

℞. Sulphatis Zinci,
Aluminis, sing. drachmam unam.
Succi Urticae . uncias quatuor.
Dissolve. (*Pie.*)

℞. Sulphatis Zinci semidrachmam.
Aluminis . . drachmam unam.
Boracis . . . . grana quatuor.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Dissolve. (*Pie.*)

℞. Dec. Cort. Quercus unc. decem.
— Cynorrhodontis uncias sex.
Sulphatis Zinci drachmam unam.
Aluminis . . sesquidrachmam.
Solutioni adde
Alcoholis . . . drachmas duas.
Tinct. Opii aquos. semidrachmam.
Misce. (*B.*)

Abſtringirend, äußerlich gegen Ekchymoſen, Geſchwüre, Hautübel, leichte Blutflüſſe und chroniſche Schleimflüſſe. — Gabe, ein Löffel für einen Erwachſenen, Morgens nüchtern.

Lotio Aluminis. (*Gr.*)

℞. Aluminis,
Aceti destillati,
Vitrioli albi, sing. . semunciam.
Aquae . . . . . libras duas.

Bei Froſtbeulen.

Collyrium tonicum. (*Bo.*)

℞. Rutae recentis,
Flor. Arnicae, sing. manip. dimid.
Baccarum Juniperi drachmas duas.
Ipecacuanhae . grana triginta.
Vini albi . . uncias duodecim.

Stent in infusione per horas 24 inter cineres calidos; tunc adde colaturae
Sulphatis Zinci . granas viginti.
Salis Ammoniaci guttas triginta.

Aqua d'Alibour. (*Ca. Sm. Vm.*)

℞. Sulphatis Zinci uncias duas et drachmam unam cum dimidia.
Sulphatis Cupri drachmas quinque.
Camphorae drach. duas c. dim.
Croci . . . drachmam unam.

Post horas 24 digestionis filtra. (*Ca.*)

Ca. praeterea sub titulo: *Aquae ad oculos d'Yvel:* Sulphatis Zinci drachmas tres, Sulphatis Cupri unam, Camphorae scrupulos duos, Croci grana viginti et Aquae octarium unum.

℞. Aquae . . . . . octarios duos.
Sulphatis Zinci . . uncias duas.
— Cupri . drachmas quatuor.
Camphorae . drachmam unam.
Dissolve. (*Sm.*)

℞. Foliorum Rutae . . partes sex.
Aquae ferv. partes quatuordecim.

Post semihoram infusionis colaturae adde
Sulphatis Zinci . partes quatuor.
— Cupri . . partem unam.
Aq. Vitae camph. partis quadrant.
Dissolve. (*Vm.*)

Vm. hanc formulam sub titulo: *Collyrium de Saint-Jerneron* indicat.

Collyrium Stierncronense s. Decoctum Rutae zincatum s. Aqua ophthalmica Ohdelii. (B+. et Suec.) Rutae partes duas, Aquae triginta sex, ad dimidium redigendas et Colaturae unciis duodecim addere Sulphatis Zinci unciam, Sulphatis Cupri drachmas tres et Aquae Vitae camph. semidrachmam.

Lapis vulnerarius externus. (Ful.)

℞ Aluminis,
Sulphatis Zinci, sing. uncias sex.
Acetatis Cupri,
Salis Ammoniaci, sing.
drach. unam.

Misce triturando, liqua, prope ignem relinque ad perfectam desiccationem usque et sub finem adde
Croci . . . . semidrachmam.

Dieſes Präparat iſt zum Reinigen, Austrocknen und Kräftigen von Geſchwüren empfohlen worden.

Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhales ex relaxatione, Collyrium molle. (Br. Ful. *Pie.*)

℞. Sulphatis Zinci . partem unam.

Butyri recentis . partes septem. Contere simul. (Ful.)

Br. Sulphatis partem unam et Butyri sex; — *Pie.* Sulphatis unam et quatuor Butyri.

Unguentum s. Pomatum virginale, Pomatum Comitissae. (*Ca.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmas quatuor.
Foliorum Myrti,
Rhois, singulorum drachmas tres.
Gallarum,
Nucum Cupressi,
Cort. Granati, sing. drach. duas.
Unguenti rosati quantum sufficit.
Misce triturando.

Linimentum Zinci Sulphatis. (*Re.*): Zinci Sulphatis scrupulum, Axungiae praep. semunciam. — Bei ſchmerzloſer Augenentzündung auf die Augenlider.

Pulvis ad s. contra maculas corneae. (*Pie.*)

℞. Tutiae praeparatae,
Sacchari crystallisati,
Sulphatis Zinci,
— Cupri,
Acetatis Cupri,
Mercurii dulc., sing. drach. unam.
Fiat pulvis.

Pulvis Nucum Cupressi restrictivus s. adstringens. (His. His3.)

℞. Boli Armenae . drachmas duas.
Radicis Bistortae,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Baccarum Myrti,
Nucum Cupressi,
Sulphatis Zinci,
Thuris, singulorum unciam unam.
Fiat pulvis tenerrimus.

Pilulae emeticae. (*Gr. Re.*)

℞. Sulphatis Zinci scrupulum unum.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut f. pil. pond. gran. quinque. — Als Bolus, auf eine Gabe, mit Chamillenthee bei phthisis ꝛc.

Acetas s. Acetis Zinci, Zincum acetatum s. aceticum.

1) In feſter Geſtalt.

℞. Florum Zinci . . quantum vis.
Aceti destillati quantum sufficit ad solvendum caloris ope oxydum. Filtra et vaporationi subjice ut crystallos demittat.

2) In flüſſiger Geſtalt. (*Liquor s. Solutio Zinci Acetatis, Solutio Acetitis Zinci*)

Am. B*. D. Ed. *Br*. C. E. Gr. Re. Sw. Sy. Vm.*

℞. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi, sing. drach. unam.
Misce in mortario vitreo et adde
Aquae bullientis . . uncias tres.
Post refrigerationem filtra. (*Sw.*)

Br.* commiscere solutiones duas, unam e Sulphatis Zinci granis viginti in Aquae unciis tribus, alteram Acetatis Plumbi granorum viginti in Aquae praemonita, quantitate et filtrare; — Am. et B*. Sulphatis Zinci grana duodecim, Acetatis Plumbi grana sedecim et Aquae semioctarium (auch als *Collyrium Zinci Acetatis* Am.); — B*. Ed. *C. Gr. Re.* Sulphatis Zinci drachmam, Acetatis Plumbi scrupulos quatuor, Aquae uncias viginti, solve seorsim sales quemque in Aquae unciis decem, commisce solutiones et praecipitato deposito filtra; — *Gr.* Zinci sulph. grana viginti quatuor, Plumbi Superacetatis triginta duo, solve seorsim quodque in Aquae dest. unciis quatuor, misce solutionem et post aliquot tempus filtra.

℞. Oxydi Zinci . . . quantum vis.
Acidi acetici . quantum sufficit, ad solutionem oxydi. Solutionis guttis viginti adde Aquae uncias quatuor. (*Sy.*)

Man wendet die eſſigſaure Zinkflüſſigkeit in Geſtalt von Collyrien oder Einſpritzungen gegen Blennorrhöe an.

Vm. conterere proponit Sulphatis Zinci grana duodecim et Acetatis Plumbi semidrachmam et addere Aquae Rosarum uncias sex (*Aqua ophthalmica*); — *E. Re. Collyrium adstringens s. Zinci Sulphatis cum Plumbi Acetate*: Sulphatis Zinci, Subacetatis Plumbi, sing. grana sex, solve in Aquae Rosarum unciis quatuor. — *Re.* Salium grana octo et Aquam destillatam.

Beſſer würde es ſeyn, das trockne eſſigſaure Salz unmittelbar in Roſenwaſſer, z. B., einem Scrupel von demſelben in acht Unzen Waſſer, aufzulöſen, wie

Collyrium Zinci Acetatis (*Re.*): Acetatis semidrachmam, Aquae dest. unc. duodecim.

Man findet bei Ellis (*E.*) eine *Injectio adstringens* gegen Gonorrhöe, welche aus acht Gran eſſigſaurem Zink und vier Unzen Roſenwaſſer beſteht. Auguſtin (*Au.*) führt eine ähnliche Einſpritzung an, welche er, nach den Engländern, in demſelben Falle rühmt; ſie beſteht aus einer Auflöſung von acht bis zehen Gran eſſigſaurem Zink in vier bis ſechs Unzen deſtillirtem Waſſer; — *Re.* eine *Injectio Zinci Acetatis*: Acetatis grana decem, Aq. dest. uncias sex. — Bei Gonorrhöe. *Pie.* ein *Collyrium* aus anderthalb Drach-

men ſchwefelſaurem Zink, zwei Scrupel eſſigſaurem Blei, vier Unzen Aqua Plantaginis und eben ſo viel Roſenwaſſer.

Aqua ophthalmica alba Danica s. antiophthalmica. (*Au. Sp.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam.
Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae . scrupulum unum.
Aquae Rosarum uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (*Sp.*)

Au. Sulphatis Zinci scrupulum, Subacetatis Plumbi semidrachmam, Aquae Vitae camph. drachmas duas et Aquae dest. uncias duodecim.

Collutorium adstringens s. e Zinco compositum. (*Sp. Sw.*)

℞. Trochisc. albor. Rhazis drach. unam.
Sulphatis Zinci . semidrachmam.
Acetatis Plumbi semiscrupulum.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce. (*Sp.*)

℞. Sulphatis Zinci . . grana octo.
Acetatis Plumbi liquidi guttas octo.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce et adde, si requiritur, Aquae camphoratae unciam unam. (*Sw.*)

Injectio ad blennorrhoeam s. adstringens. (*Bo. Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci drachmas duas.
Acetatis Plumbi scrupulos quatuor.
Camphorae . . sesquiscrupulum.
Extr. Opii aquosi scrup. unum.
Aquae Rosarum . libras 2 ad 4.
Dissolve. (*Sy.*)

℞. Sulphatis Zinci,
Acetatis Plumbi,
Aluminis, sing drachmam unam.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Rosarum,
— comm, sing. uncias octo.
Dissolve. (*Bo.*)
Zwei- oder dreimal täglich einzuſpritzen.

Tinctura Acetatis Zinci, Acetas Zinci dilutum. (B^e. Du. *C. Rc.*)

℞. Sulphatis Zinci,
Acetat. Potassae, sing. unc. unam.
Contere et adde
Alcoholis libram (octarium) unam.
Macera per hebdomadem, subinde agitando et filtra.
In Collyrien und Einſpritzungen bei Blennorrhöe anzuwenden.

Zingiber.

Amomum Zingiber, L.; Ζιγγιβερις; Ingwer, Imber, Ingber; Gingembre (*Gal.*); Siwe (*Amb.*); Ginger (*Ang.*); Zingebil, Zingebil rutb (*Ar.*); Zazzor (*B.*); Jahetuh (*Ba.*); Sohi (*Baud.*); Ada (*Beng.*); Sonty (*Can.*); Inghuru, Ammu Inghuru (*Cy.*); Ingever (*D.*); Gengibre (*His.*); Sont, Udruck (*Hin.*); Gember (*Bel.*); Zenzero (*I.*); Jai aking, Dschey (*Jav.*); Alia (*Mal.*); Zungebil, Zungebil tur (*Pe.*); Jembier (*Pal.*); Gengibre (*Lus.*); Sunthi, Ardraka (*Sa*); Ingefaera (*Suec.*); Sukku, Injie (*Tam.*); Sonti, Ullum (*Tel.*); Wuraka (*Ternat.*); Gora (*Tidor.*).

A. Ams. An. B. Ba. Bel. Bor. BorC. Bor4. Br. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Ful. Gal. GalM. Gen. Ham. Han. Huss. HassP. His HisS. LH. Li. Lon. LonN. LP. Lus. O. Pal. Pol. R. RC. Sax. Suec. Wir. Wür. WW. *A. Be. Br. C. Fi. G. Gr. M. Par. Pid. Rc. Sa. Sp. Z.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Amomeae, J.) Eine Pflanze Oſtindien's, welche man auch in America baut. (*Jacq.* Hort. Vind. Vol. I. t. 75. *Rheede* Hort. Malab. XI t. 12. *Plenck* t. 1. Dict. d. Sc. nat. cah. VI. *Rumph, Amb.* V. t. 66. f. 1.)

Die Wurzel (radix Zingiberis s. Zinziberis) erſcheint unter zwei Varietäten im Handel:

1) Als ſchwarzer oder gemeiner Ingber (Zingiber commune s. nigrum s. vulgare), Gingembre noir ou commun (*Gal.*); er iſt etwa zwei Zoll lang, dick, feſt, hornartig, äußerlich gelblichgrau oder weißlich, innerlich röthlichgelb oder bräunlich.

2) Als weißer Ingber (Zingiber album), Gingembre blanc (*Gal.*); er hat ein mehr holziges Anſehen, iſt höckerig und derb und hat äußerlich eine gelblichweiße oder weißlichgraue, inwendig eine röthlichgelbe Farbe. Dieſe Verſchiedenheiten hängen von der Bereitungsart ab; die erſte Sorte wird in kochendem Waſſer weiß geſotten und dann am Feuer oder in der Sonne getrocknet, die zweite wird, nach Abziehung der Oberhaut, bloß an der Luft getrocknet. Der Geruch iſt durchdringend, angenehm und kampferartig, der Geſchmack gewürzhaft, ſcharf und brennend.

Der Ingwer enthält ein flüchtiges Oel, einen ſtickſtoffhaltigen Stoff, eine thieriſche, mit dem Osmazom verwandte Subſtanz, Eſſigſäure, eſſigſaures Kali, Satzmehl, Schleimharz ꝛc.

Reizend, magenſtärkend, blähungtreibend, Speichelabſonderung befördernd. — Gabe des Pulvers, von fünf Gran bis zu einer halben Drachme.

Radix Zingiberis trita reducta (*Gr.*): Zingib. libr. 56, Fabar. libr. 28, Arenae (box dust) tantidem, Capsici libr. 1.

Radix Zingiberis condita (*Re.*) kommt aus Oſtindien.

Pulvis Zingiberis (*Re.*) Radix pulverata.

Species Diamargaritae calidae. (Wir.)

℞. Rad. Zingiberis . . semunciam.
— Doronici,
— Zedoariae,
— Behen albi,
— — rubri, sing. drach. tres.
— Pyrethri drachmam unam.
Seminum Apii,
Cardamomi majoris et minoris,
Nucis moschatae,
Macidis,
Piperis longi,
— nigri, sing. . drach. tres.
Cinnamomi . drachmas quinque.
Mastichis,
Margaritar. orient., sing. semunciam.

Fiat pulvis. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Julep pectorale. (*Pic.*)

℞. Mellis purif. cochlear majus (Eßl.).
Zingib. pulv. cochlear minus (Kaffeelöffel).

Commisce cum
Aquae cochlearibus 2 vel 3.

Electuarium pectorale, *Marmelada stimulans s. pectoralis.* (*Sm. Va.*)

℞. Zingiberis pulv. cochlear min.
Mellis Narbonnensis uncias sex.

Misce. — Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich, bei Huſten mit reichlichem Auswurf.

Confectio aromatica. (*Vm.*)

℞. Zingiberis conditi . partes sex.
Cort. Aurantior. condit. part. quatuor.
Nucis moschatae partem unam.
Syr. Caryophyll. rubr. . . q. s.

Opiatum stomachicum. (*Ca. Pic.*)

℞. Zingiberis conditi . uncias duas.
Limonum conditorum,
Caryophyll. condit., sing. unc. unam.
Opiati Salomonis . semunciam.
Nucum moschatarum conditarum,
Cinnamomi, sing. drachmas tres.
Cascarillae . . semidrachmam.
Olei ess. Caryophyll scrup. duos.
— — Cinnamomi gutt. decem.
Syr. Caryophyllor. rubr. . q. s.

Aphrodiſiacum. — Gabe, einen bis drei Scrupel.

Morsuli stimulantes. (*Sm. Sp.*)

℞. Zingiberis . . . drachmas duas.
Croci orientalis drachmam unam.
Moschi,
Caryophyll., sing. semidrachmam.
Mastichis . . . drachmas tres.
Ambrae griseae grana duodecim.
Sacchari . . . . semilibram.

Fiant morsuli drachmae unius. (*Sm.*)

℞. Cinnamomi . . drachmas duas.
Nucis moschatae drachmam unam.
Caryophyllorum scrupulos duos.
Macidis . . . scrupulum unum.
Zingiberis . . . drachmas sex.
Sacchari . . . uncias sedecim.

Fiant morsuli. (*Sp.*)

Syrupus Zingiberis s. Amomi Zingiberis. (Am. Ams. B. Bel. Bor4. Du. Ed. Fenn. Ful. Gen. Han. Li. Lou. LonN. Lus. RC. Suec. Wür. *C. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Zingiberis pulverati uncias duas.
Aquae bullientis . . libras tres.

Digere per horas 24 in vase tecto, Cola et adde
Sacchari albi . . . libras sex.
Ad syrupi consistentiam redige. (B.)

Das Verfahren iſt überall ganz oder doch faſt daſſelbe, jedoch wechſeln die Mengenverhältniſſe unendlich, nämlich:

Lus. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras quatuor, horas sex infusionis et Sacchari q. s.; — Bor4. Han. Zingiberis uncias duas, Aquae sedecim, horas quatuor infusionis et Sacchari libras duas; — Wür. Zingiberis uncias tres, Aquae libras tres et Sacchari libras septem cum dimidia; — Fenn. Suec. Zingiberis unciam, Aquae libram, horas sex infusionis et Sacchari q. s.; — Ed. Zingiberis drachmas sex, Aquae libram, 24 horas infusionis et Sacchari uncias viginti duas; — Du. Zingiberis uncias quatuor, Aquae octarios tres, 24 horas infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — Lon. LonN. *C. Gr. Re. Va.* Zingiberis uncias duas, Aquae octarium, 24 (4) horas infusionis et Sacchari libras duas; — *Gr.* Zingiberis uncias tres, Aquae bull libras quatuor, Sacchari septem cum dimidia; — Ams. Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, 24 horas infusionis et pro colaturae libris quatuor Sacchari libras quindecim; — Gen. Zingiberis uncias quatuor, Aquae libras duas cum dimidia, 24 horas infusionis et Sacchari libras quinque; — *Sw.* Zingiberis uncias tres, Aquae libras quatuor, 24 horas infusionis et Sacchari libras septem cum dimidia; — *Vm.*

Zingiberis partem unam, Aquae tepidae octo et Sacchari duodecim; — Ful. et Li. Zingiberis unciam, Aquae bullientis libram et Sacchari tantidem; — Am. Zingiberis uncias tres, Aquae bull. uncias quatuor et Sacchari libras septem cum dimidia; — RC. Zingiberis sesquiunciam, Aquae bull. libras duas, Sacchari puri libras tres cum dimidia et 24 horas macerationis; — *T.* Zingiberis uncias octo, Aquae bull. libras duas, infusionem per horas 12 et Sacchari libras quatuor.

Gabe, von einer Drachme bis zur halben Unze.

Syrupus Zingiberis (*vinosus*) (Lon. ante 1745. *Gr.*): Zingib. unc. tres, Vini albi libram, infunde calide per dies tres, cola et adde Sacch. sesquilibram.

Candied ginger (*Re.*): Radicis subt. rasae unciam, Sacchari subt. pulv. libram, Aquae q. s. ad liquandum, igni lento impone, ut paene bulliat, tunc adde Sacchari libram, agita ut spissescat, ab igne remove etc.

Tinctura Zingiberis s. *Amomi Zingiberis.* (B*. Du. Ed. Han. Lon. LonN. *C. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Zingiberis . . . uncias duas.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.

Post dies octo vel quatuordecim infusionis cola. (B* Du. Lon. LonN. *Re.*)

Re. Zingiberis uncias quatuor suadet; — Ed. Radicis uncias duas et Alcoholis (0,935) libras duas cum dimidia; — *C.* Radicis uncias duas et Alcoholis (0,930) libras duas; — *Gr.* sec. Lon. ante 1824 *Sw.* Radicis unciam et Alcoholis (0,935 Spir. ten.) libram; loco spir. ten Spiritum rectif. adhibendo, *Oxley's concentrated Essence of Jamaica ginger* habes; — *Vm.* Radicis partem unam et Spiritus Sacchari octo; — Han. Radicis uncias quinque et Spiritus rectificati libras duas.

Reizend, gewürzhaft. — Gabe, sechszig Tropfen täglich zwei Mal. — Auch soll diese Tinctur die Zahnschmerzen lindern, wenn man damit getränkte Baumwolle in die hohlen Zähne bringt.

Elixir de Mitié. (*Ca.*)

℞. Zingiberis . . . . semunciam.
Cinnamomi,
Piperis longi,
Galangae min., sing. drach. duas.
Nucis moschatae,
Caryophyllor., sing. drach. unam.
Cardamomi minoris scrup. unum.
Alcoholis . . . . . uncias sex.

Reizend, magenstärkend. — Gabe, zwei bis vier Drachmen.

Oleum Zingiberis aethereum, *Aethereoleum Zingiberis.* (Br. Wir)

℞. Zingiberis . . . . partes sex.
Aquae purae partes triginta sex.
Salis culinaris . . partem unam.

Digere per dies quatuor vel quinque, destillationem institue et oleum in fundo subsidens collige.

Acetum Zingiberis (*Gr.*): Zing. unciam, Aceti octarium per dies quatuordecim macerare et exprimere; mehr in der Küche.

Zirconium.

Eine Substanz, welche man als ein Metalloxyd betrachtet und wovon man in der Medicin nur folgende Zusammensetzung angewendet hat:

Silicas Zirconii, *Hyacinthus*; Hyacinth; Hyacinthe (*Gal.*); Jacintho orientale (*His.*).

His. Hisz. Wir. *G. Sp.*

Ein sehr harter glasartiger, nicht schmelzbarer Stein von orangengelber Farbe.

Quinque Lapides pretiosi. (Wir.)

℞. Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Carneoli,
Smaragdi, sing. partes aequales.

Misce et pulvera. — Eine ganz wirkungslose Mischung, welche man schon seit lange aus allen rationellen Vorschriften verbannt hat.

Nachträge.

Electuarium dentifricium (*Maury*): Mellis opt. libr. unam, Alumin. ust. unc. duas, Extr. Chin. unc. unam, Ol. Menth. pip., Ol. Cinnam., sing. semunc., Ess. Ambrae c. Moscho et Ess. Ros. drachm. duas; melli coctione ad trientes duos consumpto et cum Alcanna colorato extractum admisce et per pannum teneris texturae exprime; massae tepidae alumen et penitus refrigeratae essentias admisce.

Liquor Ammonii oxalici (*Dk.*): Solut. Salis Acetos. Liq. Amm. caust. ope neutralisata et filtrata. — Reagens.

Pulvis antarthriticus Wepferi (Wir): Lumbric. terrestr. exsicc. sesquiunciam, C. C. philos. praep., Ras. Eboris, Ocul. Cancror., Cinnab., sing. drachm. duas, Antim. diaphor simpl. semunc., Nitri cryst. drach. sex, Sacch. alb. sesquiunciam, Olei Nucist. semiscrup. — 1—2 Scrupel bis 1 Drachme.

Sapo Antimonii resinosus cum Ammoniaco Kaempfii: e Hepate Antim., Natro, Jalapa et Ammoniaco.

Fomentum commune tepidum (RC.): Vesica bovilla vel suilla ad dimid. Aq. tepida repleta, vel pannus laneus porosus, Aq. fervidae immersus, deinde expressus parti effectae admovendus.

Pilulae Argenti Nitratis fusi (RC.): Nitratis gr. quinque, Extr. Liquir. scrup. unum; f. pil. no. 20 aeq. — Bei Epilepsie ꝛc. Anfangs eine bis zu sechs allmälig, oder bis Ekel entsteht.

Aqua toffana (*C.*): Arsenici albi, Kali praep., sing. part. aeq., Aq. Cymbalariae q. p. erzeugt Auszehrung. —

Kali arsenicosum (*Dlk.*): tractando Arsen. alb. cum Solut. Kali carbon. caloris ope, filtrando et ad siccum evaporando.

Natron arsenicosum, *Hepar Arsenici mineralis*. Coctione Acidi arsenicosi cum Lixivio minerali caust. — *Liquor Natri arsenicosi*, *Solutio arsenicalis natrosa* simili modo ut liq. kali arsenicosi.

Massa Pilularum visceralium Kaempfii (*Dlk.*): Extr. Tarax. semunc., Extr. Millef., Card. bened., Arnicae, sing. drach. duas, Ammon. (As. foet.), Kali acet., G. Hederae, sing. semunciam, Rhei pulv. drach. duas; f. massa in pil. pond. gr. duor. dividenda.

Mistura vel Solutio Asae foetidae (RC.): As. foet. drach. duas, Aq. font. vel Menth. crisp. vel Foenic. unc. octo, solve. Bei Keuchhusten, Dyspepsie, Amenorrhoe, Bleichsucht ꝛc. 1 oder 2 Unzen 2 oder 3 Mal täglich. Addendo Acetat. Ammon. liq. unc. quatuor, Tinct. Digit., Tinct. arom., sing. semunciam, habes *Mixturam Rogersi*, bei Wassersucht, Asthma, Schleimschwindsucht, Blutspucken. ꝛc.

Oleum Filicis, *Extractum Filicis oleoso-resinosum* (*Dlk. Ma.*): Extractione Pulveris Filic. rec. Aetheris vel Alcoholis ope; si per alcoholem extrahitur,

extractum alcoholicum deinde per Aetherem tractari potest. — *Extractum Filicis aethereum*: Radicis pulv. unciam unam, Aeth. sulph. octo; vas occlusum sepone, saepius agitando, donec liquidum colorem flavescentem acceperit; liquido defuso, operationem repete. Liquores commixti et colati destillatione aetheris ad partem quartam redacti in balneo aquae ad extr. consist. rediee. Bei Bandwurm, die eine Hälfte der Doſis (30 – 36 Tr.) Abends, die andre den folgenden Morgen und 2 Stunden nach dieſer 2 Unzen Ricinusöl, um den Wurm abzuführen. Sollte eine Wiederholung nöthig ſeyn (ein ſeltener Fall), ſo giebt man den nämlichen Abend und folgenden Morgen die erſte Doſis.

Massa Pilularum Schmidtii contra taeniam (*Dlk.*): As. foet., Extr. Gramin. sing. drach. tres, Gutti, Rhei, Jalap., sing. duas, Ipecac., Herb. Digit., Sulph. aur., sing. gr. decem, Hydr. mur. mit. scrup. duos, Ol. Filic. aeth., Ol. Anisi, sing. gutt. quindecim. F. pil. gr. duor — Zur Vorbereitung der Cur folgende Mixtur: Rad. Valer. drachm. sex, Fol. Sennae duas, para infusum; colaturae unciarum sex adde Natri sulph. drach. tres, Syr. Mannae unc. duas, Elaeosacch. Filicis drach. duas. Misce.

Lotio evaporans (*Cooper*): Liq. Plumbi S. Acet. dil. unc. septem, Spir. Vini ten. unam. Misce, f. lotio. Bei Hodenentzündung.

Pilulae Hydrargyri cum Antimonii Tartrate (*Cooper*): Pil. Hydrarg. gr. duo, Antim. Tart. grani quadrantem vel Extr. Colocynth. comp. gr. tria, Ipecacuanh. gr. duo. F. pilula. Bei Vergrößerung und Verdickung der Hoden nach Entzündung derſelben, jede Nacht 1 Stück.

Solutio antipsorica cum Chlorureto Calcariae (*Ma.*): Chlorureti Calcis unc. tres, Aquae destill. libram, solve et filtra. — Von Derheims gegen scabies empfohlen. Man wäſcht damit Arme und Beine. Sechs bis acht Tage ſind zur Heilung hinreichend.

Solutio Chlorureti Calcis alcoholisata: Chlorureti sicci drach. tres, Aq. destill. unc. duas, chloruretum tere in mortario vitreo pistilli lignei ope, adde partem aquae, sepone, decantha liquorem clarificatum, adde novam aquam, tritura, sepone et tertio cum reliqua Aqua ablue, decantha, liquores decanthatos commisce, filtra et adde Alcoholis 36° unc. duas et Ol. ess cujusl. aliquot guttas. Von Chevalier zur Verbeſſerung des Athems; man thut ½ Kaffeelöffel in ein Glas Waſſer und bürſtet das Zahnfleiſch damit mittelſt einer Schwammbürſte. Auch dient ſie, um den Geruch von Tabaksrauch zu benehmen. Angelot in Briançon giebt folgende Formel: Chlorureti grana sedecim ad triginta, Solut. Gummi unc. unam, Syr. Cort. Aurant. drach. quatuor, welche er in Waſchung gegen die ſo häufigen Zahnfleiſchgeſchwüre der Soldaten anwendet.

Trochisci Chlorureti Calcis pro desinfectione halitus (*Chevalier*): Chlorureti Calcis drach. septem, Sacch. vanillati tres, G. Arab. quinque, f. trochisci gr. 15 ad 18. Zwei oder drei Stück ſind hinreichend, den übeln Tabaksgeruch zu benehmen; vel: Chlorureti sicci gr. viginti quatuor, infunde sensim Aquam ad solutionem necessariam, sepone, decantha et filtra, et cum Sacch. pulv. unc. una, G. Tragacanth. drach. duabus et hujus solutionis q. s. fiat pasta, de qua formentur trochisci gr. 18 ad 20. 1 oder 2 Stück ſind hinreichend; — vel: (*Deschamps*): Chlorur. Calc. sicci drach. duas, Sacch. unc. octo, Amyli unam, G. Tragac. drach. unam, Carmini gr. tria; f. trochisci gr. trium. Wie die vorigen, 5 bis 6 Stück binnen 2 Stunden.

Pulvis dentifricius (*Deschamps*): Chlorur. Calc. sicci gr. quatuor, Corallii rubri drach. duas. Man taucht eine neue, ſchwach befeuchtete Zahnbürſte in das Pulver, und bürſtet die Zähne damit ab, nach wenigen Tagen bekommen ſie ihre natürliche weiße Farbe wieder.

Mistura Chinae officinalis (RC.): Cort. pulv. unciam, Extr. Liquir. drachmam, vel Mucil. G. Arab. unc. duas, Aq. font. libram, Tinct. Cinch. offic. unciam, vel Tinct. arom. semunciam; si opus, Acidi sulph. dil. drachm. duas addito.

Unguentum ad cancrum (*Carmichael*): Ferri oxydulati arsenic. drachm. unam, Ferri oxydul. phosphor. duas, Ung. Cetacei sex. Bei offenem Krebs mittelſt eines Pinſels aufzutragen, und nicht auf die ganze Oberfläche anzuwenden, wenn ſie ſehr groß iſt.

Massa Pilularum resolventium Schmuckeri (*Dlk.*): Galbani, Sagapeni, Sapon. medic., Pulv. Rhei, sing. sesquidrachm., Tart. emet. in Aq. dest. sol. gr. sedecim; f. pil. gr. trium.

Gas sulphurosum s. sulphuricum, Aër vitriolicus. Deflagratione lenta Sulphuris etc. obtinetur. In Ermangelung oder bei zu großer Koſtbarkeit andrer ſaurer Gasarten als Antimiasmaticum benutzt.

Tinctura Menthae crispae (An. *Vm*): Herb. part. unam, Alcoholis 20° octo, digere per triduum et filtra.

Unguentum Oxynitratis Hydrargyri et Ammoniae (RC.): Merc. solub. Hahnem. part. unam, Adipis suill. part. duodecim.

Hydrargyrum terebinthinatum, Mercurius terebinthinatus: Hydrarg. part. unam, Terebinth. unam cum dimidia. — Bei Waſſerſucht in Pillen. — *Pilulae Suboxydi Hydrargyri* (RC.): Hydrarg. unc. unam, Terebinth semidrachmam, tere ad globulor. disparitionem, adde, si opus, Mucil. G. Arab. et cum Pulv. Rad Liquir. vel Amyli pil. 80 aeq. forma. 1 oder 2 Stück Morgens und Abends. — *Pilulae mercuriales Barbarossae*: e Hydr. terebinth, Aloë, Agarico albo et Rheo.

Hydrargyrum oxydulatum nigrum purum, Oxydum hydrargyrosum (*Dlk*): Liquoris Hydrarg. nitr. oxydul. q. libet instilla Kali caust. tantam quantitatem, ut kali sufficienter praevaleat; praecipitatum filtri ope separatum Aqua destillata fervida bene ablue et leni calore sicca.

Unguentum acre (HassP.): Mercur. Sublim. corros., Butyri Antimon., sing. partem unam, Unguenti irritantis quatuor.

Mercurius Zinci. Mercurius terebinth. cum Oxydulo Zinci. In veneriſchen und krampfhaften Uebeln und Wurmkrankheiten.

Alcohol Nucis vomicae (*Ma.* 1829): Alcoholis 36° unciam unam, Extracti Nucis vom. sicci grana quatuor.

Spiritus ad paralysin (*Ma*): Alcoholis Nucis vomicae unciam unam, Ammoniaci concentrati drachmas duas. — In Einreibungen auf gelähmte atrophiſche Theile.

Oleum Terrae (Wir.) in nervorum affectibus externe adhibendum.

Liquor Natri hydroiodinici (HassP.): Natri hydroiodinici sesquidrachmam, Aquae destill. unc. unam; solutionem filtra. — Reagens.

Sulphur iodatum, Iodetum Sulphuris. Massa sublimatione Vaporum Iodi et Sulphuris obtenta. Neuerdings bei chroniſchen Hautausſchlägen, beſonders psoriasis, lepra vulgaris, favus mit Nutzen angewendet, in Salbenform, 1 bis 2 Scrupel auf die Unze Fett.

Emplastrum Thuris compositum (*C.*): Picis Burgund. semilibram, Sanguinis Draconis unc. tres, Empl. Lithargyri libr. tres.

Unguentum resinosum (RC.): Terebinth. part. septem, Colophonii, Adipis suilli, sing. part. unam; vel: Adipis suilli, Colophonii, Cerae flavae, Olei Olivarum, sing. part. aeq.; vel: Adip. suill. part. octo, Colophonii quinque, Cerae flavae duas.

Julapium aluminosum (*Kapeler. Va.*): Aluminis drach. unam ad duas, Aq. comm. uncias quatuor, Specier. bechic. pulv. gr. viginti, G. Arab. gr. triginta, Syrupi Sacchari uncias duas. Misce. Löffelweiſe alle Stunden bei Metallkolik ſehr nützlich.

Aqua mineralis Doct. Marc (*Va.*): Sulphatis Ferri drach. unam, Aquae libras duas. Dissolve. Alle 2 Stunden während der Apyrexie mancher Wechſelfieber ein halbes Glas.

Aqua Globuli (Eau de boule) (*Va.* Hosp. Inf.): Tartratis Ferri et Potass. drachm. duas, Aq. bull. libr. duas. Dissolve. Als tonicum bei cachectiſchen, kränklichen Kindern.

Pulvis febrifugus (*Cleghorn. Va.*): Chinae gris. semunciam, Magnes. sulph. drachm. sex, misce et divide in partes quatuor. Während der Apyrexie alle 2 Stunden 1 Stück.

Electuarium stomachicum (*Alibert. Va.*): Chinae pulv. drach. duas, Rob Sambuci sesquiunciam. Misce. Eine Drachme mit etwas rothem Wein verdünnt.

Pulvis Sulphatis Chininae (*Va.*): Sulphat. Chinin. gr duodecim, Sacch. alb. pulv. semidrachmam. M. divide in partes sex. Zwei bis sechs Stück in gleichen Zwischenräumen in Oblate eingewickelt oder mit einem kleinen Löffel Honig.

Pulvis Chininae et Morphinae (*Ma. Va.*): Sulphat. Chinin. gr. duo ad sex, Sulph. Morphin. gran. dimid. ad unum. M., divide in partes quatuor.

Pulvis Chininae emetisatus (*Va.* Hosp. Ital.): Tart. emet. gr. tria, Sulphat. Chinin. decem. Misce, divide in part sex. Während der Apyrexie mancher Wechselfieber alle 2 Stunden 1 Stück mit Vortheil, wo das schwefelsaure Chinin allein nichts half.

Boli febrifugi (*Va.*): Sulphat. Chinin. gr. octo, Extr. Chinae gr. duodecim, Syr. Cort. Aurant. q s. M., f. boli tres. Alle 3 Stunden 1 Stück. (Hosp. Ital.): Sulph. Chinin. scrupulum, Micae Panis, Liquirit. pulv., Mellis, sing. q. s. M., f. boli octo. 2 bis 6 Stück täglich.

Pilulae Sulphatis Quininae (*Va.*): Sulphat. Quinin. gr. viginti, Extr. Gentian., Pulv. Liquirit., sing. q. s. M., f. pil. no. 10. 2 bis 8 Stück und mehr in gleichen Zwischenräumen während der Apyrexie.

Potio Sulphatis Quininae (*Va.*): Aq. dest. Lactucae unc. tres, Aq. Cinnam. semunciam, Sulphat. Chinin. gr. duodecim, Syr. Cort. Aurant. unc. unam. Misce. 4 bis 8 Löffel täglich alle 2 Stunden. Statt des Chininsalzes kann man 2 bis 4 Drachmen Alcohol Quinin. (*Ma.*) nehmen.

Pilulae Salicinae (*Va.*): Salicinae, Extr. Gentianae, sing. gr. duodecim, Pulv. Liquirit. q. s. ut fiant pil. no. 6. Alle 2 Stunden 2 Stück bei Wechselfiebern.

Vinum Aquifolii (*Rousseau. Va.*): Fol. Aquifol. pulv. drach. duas, Vini albi unc. sex, infunde. Auf eine Gabe.

Pilulae Gentianini (*Va.*): Gentianini gr. tria, Conservae Rosar., Pulv. Liquirit., sing. q. s. ut fiant pil. no. 6. Alle Stunden ein Stück.

Remedium antiphthisicum (*Cottereau. Va.*): Chlori liquidi purissimi guttas quinque, decem, quindecim et progressive ad sexaginta infunde in lagenam, tubulis duobus vel tribus instructam et continentem Aquae 30° C. circiter uncias sex. Das sich entwickelnde Gas athmet so der Kr. mit Wasserdunst vermischt, mittelst eines krummen, in das Wasser getauchten Rohrs ein. Man läßt das Gas täglich 6 bis 7 Mal, jedesmal 5 bis 6 Minuten lang, einziehen.

Lotio excitans et caustica (*Alibert. Va.*): Chlori liquidi partes duas, Aquae unam. Misce. Mittelst eines Charpiepinsels auf manche hartnäckige Flechten.

Gargarisma desinfectans (*Ma. Va.*): Chlorureti Calcis gr. sedecim ad triginta, Solut. Gummi unciam, Syr. Cort. Aurant. drachm. quatuor. Vortheilhaft gegen Geschwüre des Zahnfleisches.

Enema Cubebae (Hosp. de Perfect *Va.*): Pulv. Cubeb. drachm. sex, Decocti Althaeae unc. sex. Gegen Blennorrhagie.

Injectio contra blennorrhagiam (Hosp. Angl. *Va.*): Cubebarum unc. unam, Aquae bull. libr. unam, infunde, cola et adde. Extracti Belladonnae scrupulum. Gegen Leukorrhöe mit Nutzen angewendet.

Enema cum Balsamo Copaivae (Hosp de Perf. *Va.*): Bals. Copaiv. drachm. quatuor, contere cum Ovi Vitello et adde Camphorae gr. quatuor, Extr. Op. aquos. gr. unum, Aquae Gummi unc. quatuor. Misce. Bei Gonorrhöe, sowohl hitziger als chronischer.

Syrupus Asparagi Conorum (*Va.*): Succi Conor. Asparagi depur. et filtr. libr. unam, Sacch. albi unc. triginta. Fiat in balneo mariae syrupus. ½ bis 1 Unze bei Herzklopfen ꝛc.

Acidum caincicum (*Va.*) Der wirksame Stoff der Cainkawurzel wird, wie die Präparate der Wurzel und die Wurzel selbst, bei Wassersuchten, zu 5 bis 10 Gran in Pillen täglich mehrmals, angewendet.

Aquae minerales ioduratae (Hosp. St Lud. *Va.*): no. 1 Iodi tres grani quadrantes, Iodur. Potass. sesquigranum, Aq dest. unc. octo; no. 2. Iodi gran. unum, Iodureti duo, Aq. unc. octo; no. 3. Iodi quadrantes quinque, Iodureti gr. duo cum dimid., Aquae unc. octo. Von Lugol bei Scrofeln. Man giebt

anfangs 6 dann 8 Unzen von dem Waſſer no. 1 täglich auf zwei oder drei Mal; nach 14 Tagen giebt man 8 Unzen von no 2 täglich und nach vier Wochen eben ſo viel von no. 3.

Solutio iodurata (*Lugol. Va.*): Iodi scrupulum unum, Iodureti Potassii duos, Aq. dest. unc. septem. Dissolve. 6 Tropfen täglich 2 Mal in einem halben Glaſe Zuckerwaſſer, jede Woche ſteigt man um 2 Tropfen, bis 30 oder 36.

Solutiones ioduratae ad usum externum (Hosp. St. Lud. *Va.*): no. 1. Iodi gr. duo, Iodur. Potass. quatuor, Aq. dest. libram; no. 2. Iodi gr. tria, Iodureti sex, Aq. libram; no. 3. Iodi gr. quatuor, Iodureti octo. Aq. libram. Dissolve. In Waſchungen, Collyrien und Bähungen bei ſcrophulöſen Affectionen und in Einſpritzungen in Fiſtelgänge, in die Naſenhöhle ꝛc.

Solutio iodurata rubefaciens (Hosp. St. Lud. *Va.*): Iodi drach. quatuor, Iodureti Potassii unciam, Aq. dest unc. sex. Dissolve. Zur Aufregung der Thätigkeit in ſcrofulöſen Geſchwüren. Auch bereitet man örtliche Bäder damit, indem man zu einer gehörigen Menge lauwarmem Waſſer ſo viel davon zugießt

Cataplasma ioduratum (Hosp. St. Lud *Va.*): Cataplasm. emoll. q. p. Solut. iodurat. rubef. q. s. Misce. Sehr warm auf Drüſengeſchwülſte, weiße Geſchwülſte ꝛc. anzuwenden.

Iodum causticum (Hosp. St Lud. *Va.*): Iodi, Iodureti Potassii, sing. unc. unam, Aq destill. unc. duas. Dissolve. Zur Belebung ſcrofulöſer Geſchwüre, zum Betupfen von Narben, wenn die solut. iodur. rubef. nicht mehr wirkſam iſt.

Unguenta iodurata (Hosp. St. Lud. *Va.*): no. 1. Iodi gr. duodecim, Iodureti Potassii scrup. quatuor, Axung. pur. unc duas; no. 2. Iodi gr. octodecim. Iodureti drach. duas, Ax. unc. duas; no. 3. Iodi gr. viginti unum, Iodureti drach. duas c. dimid., Axung. unc. duas; no. 4. Iodi scrupulum, Iodureti drach. duas cum dimid., Ax. unc duas Misce exacte. Zum Verbinden ſcrofulöſer Geſchwüre und zu Einreibungen auf Geſchwülſte von gleicher Natur.

Potio iodurata (*Va.*): Acidi Boruss. medic. gutt. decem ad duodecim, Solut. Hydriodat. Potass. gutt. quindecim, Aq. Lactucae unc. quatuor, Syr. Althaeae unc. unam. Misce. Alle Stunden 1 Kaffeelöffel mit Nutzen bei manchen Lungenübeln.

Unguentum cum Iodureto Plumbi (*Va.*): Iodureti Plumbi drachmam, Axungiae unciam, Olei ess. Citri q. s. Misce. In Einreibungen und zum Verbinden ſcrofulöſer Geſchwüre.

Solutio Bromi aquosa (*Va.*): Bromi semidrachmam, Aquae dest. sesquiunciam. Vier bis fünf Tropfen und mehr in einem halben Glaſe reinen Waſſers gegen Scrofeln und Kropf.

Pilulae antivenereae (*Va.* Hosp. Monsp.): Chlorur. Auri et Sodii semigranum, Extr. Saponariae drachmam, G. Arab. pulv. q. s. ut f. pil. no. 30. Ein bis acht Stück täglich.

Pulvis Chlorureti Auri et Sodii (*Ma. Va.*): Chlorureti Auri et Sodii gr. unum, Iridis Flor. pulv gr. duo. Misce exacte, divide in partes quindecim. Auf jede Einreibung ein Theil.

Linimentum Nucis vomicae (*Ma. Va.*): Alcoholis Nucis vomic. unc. unam, Ammon. liq. drachm. duas. Misce.

Potio cum Strychnina (*Ma. Va.*): Strychnin. pur. gr. unum, Sacch alb. drachm. tres, Acidi acet. gutt. duas, Aq. dest. unc. duas. Misce. Kaffeelöffelweiſe Morgens und Abends, allmälig bis zu 3 oder 4 Kaffeelöffeln geſtiegen.

Apozema contrastimulans Laennec (*Va.* Hosp. Char.): Tart. emet. gr. sex, Infusi Folior. Aurant. lib. unam, Syr. simpl. unc. duas. Misce. Zu drei Unzen alle 2 Stunden bei hitzigen Lungenentzündungen. ꝛc.

Pilulae anticatarrhales (*Va.*): Tart. emet., Opii, sing. gr. tria, G. Tragacanth. decem, Conserv. Rosar. q. s. ut fiant. pil. no. 50. Morgens und Abends 2 Stück bei chroniſchen Lungencatarrhen.

Tabellae purgantes cum Oleo Lathyridis (*Va.*): Ol. Lathyrid. gutt. quadraginta, Pastae Chocolat. drachmam, Sacch semidrachm., Amyli gr. duodecim. Misce fiant S. A. tabellae gr 9. (Ol. gutt. 3 quaeque). Ein ſehr bequemes Purgirmittel. Kindern 1, Erwachſenen 2 oder 3 Stück.

Potio cum Oleo Lathyridis (*Va.*): Ol. Lathyridis gutt octo, G. Arab. pulv. drachm. unam, Sacch. duas, Aq. destill. unc. tres. Misce. 1 oder 2 Löffel alle Stunden bis zur abführenden Wirkung.

Mixtura vermifuga (*Va.*): Filicis mar. unciam unam, Aquae novem, coque ad duorum trientium remanentiam, cola et post refrigerationem adde Aetheris sulph. drachm., Syr. Absinthii unciam. Misce. Stündlich löffelweise.

Tinctura Gemmarum Filicis aetherea (*Peschier. Va.*): Gemmarum Filicis maris unc. duas, Aetheris sulph. q. s. Macera per tempus aliquot et decantha. 8 bis 30 Tropfen in Pillen mit einem Extract, so daß jede Pille einen Tropfen enthält.

Enema Filicis (*Va.* Char.): Filicis maris drachmam, Aquae libram, coque et cola.

Liquor Ammonii oxalici (Bor5.): Solutio Salis Acetosellae in Aqua destillata neutralisetur Solutione Ammoniaci caustici, filtretur etc.

Inhalatio iodinica (*Scudamore*): Iodinae puriss. gr. octo, Potass. Hydriodat. puriss. gr. quatuor, Alcoholis semidrach., Aq. dest unc. quinque cum dimidia. Misce. Am besten theilt man die Dosis für jede Inhalation in zwei Theile und läßt für die erste Hälfte der Zeit (die ganze beträgt 15 oder 20 Minuten) zwei Dritttheile, und für die andere Hälfte das übrige Dritttheil verwenden. Im Anfang verordnet man nicht unter 1 Drachme für jede Inhalation, selten ist es nützlich, über 6 Dr. zu steigen. Scudamore gebraucht fast beständig mit jeder Inhalation 20 bis 30 Tr. der tinct. cicut. concentr., welche die Eigenschaft hat, die Wirkung der Jodine zu mildern. Diese Inhalationen sind ein gutes Unterstützungsmittel der Cur bei Abzehrung.

Linimentum Opii camphoratum (*Bow*): Opii drachmam, Linimenti camph. c. unciam. Digere per dies aliquot. Aeußerlich zum Einreiben auf Rücken und Brust bei bronchitis und angina laryngea der Kinder.

Unguentum Iodinae opiatum (*Lemasson*): Iodinae gr. quindecim, Kali iodin. drachmam, Laudani Rouss., Axung. recent., sing. unc. duas. Misce exacte. Bei ulcerirenden Scropheln zum Verband.

Solutiones kali iodici ad balnea (*Béral et Durozier*): Die Tabelle rechter Seite zeigt die Mengenverhältn. des Jod's und Jodkali's in den Bädern auf das Litre Wasser.

No.	1.	Iodi	scrup.	1.	Kali iod.	scr.	2.	
—	2.	—	—	2.	—	—	—	4.	
—	3.	—	—	3.	—	—	—	6.	Aquae uncias
—	4.	—	—	4.	—	—	—	8.	viginti pro
—	5.	—	—	5.	—	—	—	10.	sing. in la-
—	6.	—	—	6.	—	—	—	12.	gena.
—	7.	—	—	7.	—	—	—	14.	
—	8.	—	—	8.	—	—	—	16.	

No.	1.	Iodi	gr.	0,10.	Kali iod.	gr	0,20.	
—	2.	—	—	0,20.	—	—	—	0,40.	
—	3.	—	—	0,30.	—	—	—	0,60.	Aquae octa-
—	4.	—	—	0,40.	—	—	—	0,80.	rios (litres)
—	5.	—	—	0,50.	—	—	—	1,00.	240 pro quo-
—	6.	—	—	0,60.	—	—	—	1,20.	libet.
—	7.	—	—	0,70.	—	—	—	1,40.	
—	8.	—	—	0,80.	—	—	—	1,60.	

Die Solutionen No. 1 u. 2 passen für das Alter von 4—8, No. 3 und 4 für das von 8 und 12, No. 5 und 6 für das zwischen 12 u. 20 und No. 7 u. 8 für Erwachsene zwischen 20 und 52 Jahren. Damit die Bäder unter einem geringern Volumen dieselbe verhältnißmäßige Wirksamkeit erhalten, was durchaus nothwendig ist, muß man nothwendig die Quantität der Jodkalisolution im Verhältniß zu der des Wassers vermindern. — In Betreff der angezeigten Gaben für ein gewöhnliches Bad von 240 Litres Wasser und einer Flasche Jodkalisolution hat man für ein Bad von 120 Litres oder für ein Kind nur die halbe Flasche der Solution nöthig. Die Badewannen müssen von Holz seyn.

Acidum hydrocyanicum medicinale (*Thom. Clark* in Lond. Med. Gaz. Mai 1831.): Acidi tart. gr. 72, Kali cyanic. gr. 32, Aq. dest. unc. unam; solve acidum aqua in lagenula unciae capaci, ingere kali, obturaculo statim occlude paulisper digiti ope retinendo, agita lagenulam in aquae balneo frigido ut ardor oriens deprimatur; reactione finita lagenulam per hor. 12 ad locum umbrosum et frigidum sepone ut cremor formatus praecipitetur, et liquorem defusum in lagenula loco frigido et obscuro serva. Wohlfeil und gleichförmig.

Balneum cum Hydriodate Ferri (*Pic.*): Ferri hydriod. unc. duas, Aquae q. s. Fortschreitend bei Erwachsenen die Gabe um eine halbe Unze zu vermehren.

Chocolata cum Hydriodate Ferri (*Pic.*): Ferri hydriod. drach. duas c. dimid., Chocolat. vanill. libram. Mit einer halben Tasse anzufangen und bis eine ganze zu steigen.

Aqua Hydriodatis Ferri (*Pic.*): Hydriodatis semunciam, Aquae libras duas. In Clyſtiren, Einſpritzungen, Waſchungen mehrmals des Tages.

Unguentum cum Hydriodate Ferri (*Pic.*): Hydriodatis sesquiunciam, Axungiae unc. unam. Morgens und Abends, einer Haſelnuß groß, bei weißem Fluß und Fällen von amenorrhoea in den obern Theil der Schenkel einzureiben.

Tinctura Hydriodatis Ferri (*Pic.*): Hydriodatis drach. duas, Alcoholis, Aquae purae, sing. unc duas Dieſelben Indicationen.

Vinum Hydriodatis Ferri (*Pic.*): Hydriodatis drachm quatuor c. dim., Vini Bordegalens. libram. Gegen weißen Fluß, Scrophelkrankheit für Erwachſene Abends und Morgens 1 Eßlöffel voll.

Syrupus Lactis (*Braconnot.*): Lactis recentis octarios (litres) duos cum dimidio coque et adde Acidi muriat. diluti parvam quantitatem; sero defuso, coagulum cum Natri subcarb. grammatibus (grammes) quinque contritum cum Sacchari pari quantitate syrupum coque. Der dadurch erhaltene Syrup iſt gleichartig, läßt ſich, ohne ſauer zu werden, aufbewahren, und giebt, mit Waſſer verdünnt, eine der friſchen Milch ähnliche Flüſſigkeit und ein angenehmes Getränk.

Pulvis ad mammillas (*Gavarret.*): G. Arab elect. grammata 500, Bals. Peruv. 32, Semin. Cydonior. 48, Sacch. Lactis 96, Rad. Alth. 64, Coccinellae q. s. ut colorem rubrum suppeditet.

Unguenta ad scabiem: 1) Sulph. sublim part. duas, Potass. Subcarb. unam, Axung. octo. Morgens und Abends auf alle krätzige Stellen einzureiben, und dabei eine bittere und leicht toniſche oder kühlende Diät, je nach Alter und Conſtitution des Kr., und täglich oder alle 2 Tage ein einfaches Bad zu brauchen. Mittlere Dauer der Behandlung 12 Tage. (Hosp. St. Lud.) 2) Acidi sulphur. gramm. 250, Axung. 50, misce.

Fomentationes calidae extemporaneae: Sacculus Floribus Chamomillae repletus tempore, quo cataplasma adhibendum est, Spiritu Vini ita superfunditur ut flores penetrentur, quo facto luce admota spiritus accenditur; igne extincto sacculus abdomini applicari potest.

Mixtura anticholerica (*Guersent*): Julep gummosi unc. octo, Aeth. sulph. alcoholis drachm. duas, Acidi sulph. tantidem. Löffelweiſe in der Froſtperiode mit äußern Revulſivmitteln.

Linimentum anticholericum (*Jadelot*): Olei Camph. unc. unam, Tinct. Canth. drach. unam, während der Froſtperiode.

Prophylacticum anticholericum (*Wilhelmi* Pharmacop. antichol.): Vini opt. de Medoc, Pontacii s. Toceuri l br. duas, Caryophyll. arom., Cinnam., Cort Chinae non pulv., sing. unciam cante leni calori exponuntur, donec sapiunt aromata; tunc colatis et refrigeratis adde Camphorae drach. unam in Spir. Vini semuncia solutam. Serva. Nach Ausbruch der Cholera Morgens nüchtern 2 und des Tags über zwiſchen der Mahlzeit 1 Eßlöffel voll. (Auf St. Domingo)

Tinctura prophylactica ad choleram: Absinth., Cort. Aurant., Rad. Angelic., Zingib., sing. semunciam, Caryophyll. arom. drach. duas, concisa et contusa infunde Spir. Vini rectificatiss. lib. tribus, sepone in vase exacte clauso per unum ad tres dies, cola et serva. Vier bis ſechs Loth dieſer Tinctur werden mit 1 Quart Kümmelbranntwein vermiſcht. Ehe man ſich zu einem Kranken begiebt, nimmt man davon, je nach der Gewöhnung an geiſtige Getränke, 1 oder 2 Kaffee- oder Eßlöffel. (Von der Preuß. Behörde verordnet.)

Acetum prophylacticum: Herb. Absinth., Rorism., Salviae, Menth. crisp., Rutae hortens., sing. gr. viginti duo, Flor. Lavand. semidrach., Spicar. Allii, Cinnam. acuti, Calam. arom., Caryophyll. arom., Moschi, sing. gr. octo, concisa et contusa probe misceantur et infundantur calore justo in vase clauso per hor. 12. Aceti Vini unciis quatuor, cum expressione forti colatis et filtratis adde Camph. in Spir. Vini solut. gr. sedecim. Den Mund auszuſpülen, Schläfen und Lenden einzureiben, öfters daran zu riechen oder in die Naſe zu ziehen.

Guttae prophylacticae (*Krüger-Hansen*): Tinct. aromat. unc. unam, Tinct. Opii simpl. drachmam, Mixt. oleoso-balsam. drachm. duas. Beſonders bei ſchwachem Magen in ſeltenen kleinen Gaben

Cerevisia prophylactica: 1) Cerevisiae amarae libr. 50, Sacch. alb. 4, Chin. flav. unc 4, Ch. gris., rubrae, sing. unc. 2, Cinnam. drach. 2, Nuc mosch. No. 1 Täglich ½—1 Flasche als Präservativ gegen Cholera. 2) Rad. Gentian unc. 5, Cort Citri 3, Cinnam. drachm. 1, Cerevis. amar. s. Anglic. lib. 16. Infunde frigide per dies tres et cola. Morgens und Abends ein gewöhnliches Bierglas voll.

Potio muriatica mitior: Acidi mur., Spir. muriatico-aeth., sing. semidrach., Aq. dest unc. 6, Syr. Alth. unc. duas c. dimid. Von Dr. Reich in Berlin als Präservativ gegen Cholera empfohlen.

Decoctum Diosmae crenatae: Folior. Diosm. unciam, coque cum Aq. font. q. s. ut colatura unc. octo obtineatur. Alle Stunden 1 Eßlöffel. Von Clarus und Cerutti gegen Cholera empfohlen. Im nöthigen Falle kann man Liq. C. C. succin., Schwefeläther ꝛc. zusetzen.

Mixturae anticholericae (*Hope.*): Acidi nitr. fumant drach. unam, Aq. Menth. pip., vel Mixt. camphorat Pharm. Lond. unc. unam. Tinct. Op. simpl. gutt. quadraginta. Misce. Alle 3—4 Stunden den vierten Theil in einer Tasse dünnen Hafergrützschleims. 2) Acid. nitr. fum. scrup duos, Extr. Op. puri gr. quinque, Aq. font. destill. unc. duas, Syr. Cinnam. semunciam. M. Stündlich 1 Eßlöffel voll in Hafergrützschleim. Aeußerlich Bedecken des Leibes mit trocknen heißen Tüchern, Wärmflaschen an die Füße, Haferschleim in kleinen Portionen als Getränk. Bowes empfiehlt: Acidi nitr. fum. drachm. ½—1, Decoct. Columbo ex drachm. 2 aut unc. 1½ parat. unc. quatuor. Misce. Alle halbe bis ganze Stunden ein Eßlöffel voll.

Pulvis anticholericus (*Leo*): 1) Magist. Bismuthi gr. 3, Sacch. alb. 10 Dentur doses tales no. 12. Alle 2—3 Stunden 1 Stück in einem leichten Melissenaufguß. 2) Mag. Bism gr. 2—4, Pulv Rhei tosti 3, Sacch. alb. 10. Dentur tales doses no. 12. Alle 3—4 Stunden 1 Stück. Als Einreibung: Spir. Angelic. comp. unc. sex. Liq. Ammon. caust. unam. Misce. Alle 3—4 Stunden einzureiben. 3) (*Goldberg*): Mag. Bism. gr duo, Opii puri gr. ½. Sacch. alb. semidrach. Dentur doses no. 6. Alle 2 Stunden 1 Pulver. Im Anfange der Krankheit, später: Magist. gr. 6, Camphor. 2, Sacch. alb. drachmam. Divide in part. 6. aeq. Alle 2 Stunden 1 Stück.

Cerevisia sinapisata anticholerica: Semin. Sinap. pulv. drach. sex, Rad. Valer concis. unc. unam, Serpent. Virg. drachm. tres, Herb. Rorism. semunciam, Cerevis. amarae libr octo. Macera frigide per dies duos et cola. Mit Zucker vermischt Weinglasweise zu trinken.

Pulvis anticholericus (*Krajewsky*): Zinci oxyd. albi, Cast. Moscov., Extr. Opii aquos, sing. gr. sex, Extr. Nucis vom., Rad. Ipecac., sing. gr. dimid., Camph. tritae gr. duodecim, Arrow Root semidrachm. Misce exactissime ut f. pulv., dividatur in partes 12 aeq. Bei Diarrhöe, Poltern im Leibe, Angst in der Herzgrube, Uebelkeiten, oder gar Erbrechen, sogleich 1 Stück mit Wasser oder Pfeffermünzthee zu nehmen, und 1 oder mehrere Tassen dieses Thees nachzutrinken und im Bette den Schweiß abzuwarten; wird das erste Pulver weggebrochen, so nimmt man sogleich ein zweites, und wenn nach 1 Stunde das Uebel noch nicht vorüber ist, ein drittes. Kinder unter 14 Jahren nehmen ½, Kinder unter 4 Jahren jedesmal ¼ Pulver. Zum Getränk Zimmt und Nelken mit heißem Wasser aufgegossen, mit Arrowmehl und Rothwein zugesetzt, kalt oder warm zu trinken.

Electuarium gingivale s. opiatum ad dentes (*Fi*)· Corall. rubr. praep. unc. quatuor, Oss. Sepiae subtiliss. pulv, Pulv. Cinnam.. sing unc. unam, Coccionellae subtil. pulv. semunciam, Mellis depurati unc. decem, Alumin. Rocc. pulv. semidrachmam, Olei essent. Caryophyll. gutt. quatuor.

Andromeda mariana (*C*). Das um die Blätterstiele und die Saamen herumsitzende Pulver ist ein starkes Niesmittel. Decoct bei Zehenkrätze (toe-itch) in America mit Nutzen gebraucht.

Rotulae Calami aromatici. Ex Oleo et Saccharo.

Oleum Jecinoris s. Liquor hepaticus Mustelae fluviatilis; Aalquappenleberthran. Die aus der eingeschnittenen fetten Leber von Gadus Lota erhaltene Flüssigkeit, welche als eine ranzige Fettigkeit zu uns gebracht wird, von De Haen gegen Hornhautflecke, von Beer in einer Salbe mit rothem Präcipitat, weißem Vitriol und ungesalzener Butter gebraucht.

Mures marini (Wir.) gegen blinde Hämorrhoiden.

Oleum pyro-carbonicum (aus der Braunkohle durch trockne Deſtillation gewonnen) von Lucas bei Gicht, Hyſterie, Hypochondrie, Lähmung, Magenkrampf, Kolik, Lungenſucht ꝛc empfohlen. *Pilulae*: G. Ammon., Galb., Guaj., Aloës, Saponis, sing. unc. unam, Olei pyro-carb duas.

Pyrothonid, Liquor pyro-oleosus ex panno vegetabili paratus (*Ranque*), aus leinenem, hanfenem oder wollnem Zeuge durch Verbrennen bereitet, äußerlich beſonders bei chroniſchen Augenentzündungen, Mutterblutflüſſen, weißem Fluß, Tripper und Froſtbeulen in Einſpritzungen, Waſchwaſſern, Umſchlägen ꝛc.

Tinctura cyanurata (*Parent*): Extr. Buxi unciam et drach. (gros) quatuor, Extr. Aconiti, Hydrochlorat. Ammoniaci, sing drach. tres, Ol. Anisi vel Sassafras scrupulum, Cyanureti Mercur. gr. octodecim, Aquae unc. quatuordecim, Alcoh. rectif. 38° unc. decem. F. S. A. tinct., quae filtrata praebeat libram et unc. octo. Eine halbe bis ganze Unze täglich, mit 1 Kaffeelöffel Morgens und Abends in ½ Glaſe Zucker- oder Gerſtenwaſſer, Queckentrank ꝛc. anzufangen.

Pilulae cyanuratae (*Parent*): Aus denſelben Subſtanzen und in denſelben Gaben als die Tinct. cyanurata, Waſſer und Alkohol ausgenommen. Man macht aus der Maſſe 400 Pillen. Sechzehn Stück ſind gleich einer Unze Tinctur. Zu Anfang Morgens und Abends jedesmal 2 Stück.

Pilulae Cyanureti Mercurii (*Parent*): Cyanureti porphyris. gr. sex, Opii crudi gr. duodecim, Micae Panis drachmam, Mellis q. s. F. S. A. pil. 96. ($\frac{1}{16}$ Cyanuret. und $\frac{1}{4}$ Gr. Opium jede.)

Solutio cyanurata (*Parent*): Cyanureti gr. sex ad decem, Aq. destill. libram. ($\frac{3}{4}$ Gr. Opium jede.)

Gargarisma cyanuratum (*Parent*): Cyanureti gr. decem, Decocti tenuis Semin. Lini vel Rad. Alth. libram. Dissolve.

Pomatum cyanuratum (*Parent*): Cyanureti gr. duodecim, Axungiae unciam. Misce exactissime pulverata. (Die vorſtehenden ſechs Präparate ſ. Archiv. gén. de Méd. Juill. 1832.)

Oleum Asphalti (*Dulk*) destillatione sicca obtinetur.

Pilulae narcoticae (*Par.*): Extr. Hyosc. scrup. 1, Camph. gr. 8 Spir. rectif. gutt. 2. Fiant pil. no. 12, jede Nacht 3 Stück. — *Aliae:* Extr. Conii et Hyosc., sing. gr. 3. f. pil. Täglich 2 mal ein Stück.

Haustus narcoticus (*Par.*): Tinct. Op. gutt. 15, Syr. Papav. drachm. 2. Spir. Cinn. dr. 1, Aq. pur. sesquiunciam. Bei Eintritt der Hitze in Wechſelfiebern. (*Lind.*)

Emplastrum anodynum (*Par. Bree.*): Opii puri, Camph, sing. dr. ½, Empl. Litharg. dr. 2. Auf die Bruſt.

Enema opiatum Hartmanni (*Par.*) v. Clyster leniens, II. 279.

Haustus anodynus (*Par.*): Mist. Camph. unc. 1, Spir. Aeth. comp. dr. ½, Tinct. Op. gutt. 10, Syr. Papav. dr. 2. Bei'm Schlafengehen zu nehmen.

Pilulae narcoticae s. lenientes. s. anodynae (*Par*): Opii puri gr. j, Pil. Galb. comp gr. 5. F pilula. Bei Schlafengehen. — *Aliae:* Op. gr. j, Pil. Aloës c. Myrrh. gr. iv. F. pil Bei Schlafengehen; — Op. gr. 2., Extr. Aloës spicat. gr. xx. F. massa in pil 3. divid Ein Stück.; — Op. gr. j, Extr. Aloës spic. griij, Extr. Gentian. gr. v. F. pil. no. 2 Auf eine Gabe.

Pilulae in typho (*Par*): Op. puri grjj, Confect. aromat. dr. β. F. massa in pil. 8 div. 1 Stück alle 4 Stunden.

Haustus leniens s. anodynus (*Par.*): Op. duri contriti gr. iv infunde prope ignem per horam in Aq. bull. unc. iiβ. Liquoris colati unc. j adde Acid. nitr. dilut. gutt. x. Tinct. Aloës comp. dr. j.

Fomentum anodynum s. Conii (*Par. Collin*): Folior. Conii exsicc. unc. j, Aq. octar iβ coque ad oct. ij et cola. Bei Krebs-, veneriſchen und übelausſehenden Geſchwüren; man taucht wollene Tücher in das warme Decoct, drückt ſie dann aus und legt ſie auf den leidenden Theil; öfters zu erneuern.

Cataplasma Conii (*Par.*): Fol. Conii sicc. unc. ij, Medullae Panis unc. vj, Aq. oct iβ. Coque ut f. catapl.

Haustus pectoralis (*Par.*): Extr. Conii, Hyosc., sing. gr. v. Mucil. Acac. dr. ij. Optime contritis adde Liq. Ammon. Acet., Aq. pur., sing. unc. β, Syr. Rhoead. dr. j. Alle 4 Stunden bei Reizung der Lungen.

Bolus moschatus s. antispasmodicus (*Par.*): Moschi gr. xv, Camph. gr. v, Spir. rectif. gutt. ij, Confect. Ros. Gall. q. s.

Mixtura antihysterica (*Par.*): Asae foet. drach. j terendo cum Aquae Menth. pip. unc. iβ sensim instillata optime commisce et adde Tinct. Valer ammon. dr. ij, Tinct. Cast. dr. iij, Aeth. sulph. dr. j. Alle 2 Stunden 1 großen Löffel voll.

Haustus carminativus (*Par.*): Mixt. Camph. unc. j, Spir. Ammon. foet. dr. β

Haustus antispasmodicus (*Par.*), v. Mist. antispasm. II. 701.

Mistura in tussi convulsiva (*Par. Pearson.*): Tinct. Opii gutt. vj, Vini Ipecac. drachm. j, Aq. pur. unc. j, Syr. simpl. dr. iij, Sodae Subcarbonat. gr xxiv. Für ein Kind den sechsten Theil alle 4 bis 6 Stunden.

Enema antispasmodicum (*Par.*): ut illud II. 229. monitum, omisso tamen Ammoniaco et G. Arabici scrupulo uno. (*Wall.*)

Electuarium antispasmodicum (*Par. Mead.*) ut illud a B*. Ful. *Sw.* (510.), sed Valerian. dr. iij.

Haustus antispasmodicus (*Par.*): Tinct. Digit. gutt. x—xv, Mist. Camph. drach. x, Tinct. Calumbae dr. j. Zweimal täglich, bei Herzklopfen mit großer Nervenreizbarkeit.

Haustus tonicus s. roborans (*Par.*) ut Infusum roborans (454). Tinct. Cascarillae drachm. ij; — vel: Infusi Quassiae drach. x, Tinct. Calumb. dr. j, Tinct. Ferri Muriat. gutt. x. Täglich zur Mittagsstunde.

Bolus tonicus (*Par.*): Ferri Subcarbonat. gr. v—x, Pulv. Valer. dr. β, Syr. Zing. q. s.

Mistura carminativa (*Par.*): Mist. Camph. unc. j, Spir. Aeth. sulph. dr. ij, Tinct. Cardamom. comp. unc. β, Spir. Anis. dr. vi, Ol. Carvi gutt. xij, Syr. Zingib. dr. ij, Aq. Menth. pip. unc. vβ. Bei Blähungskolik zwei Eßlöffel.

Bolus diureticus (*Par.*): Canthar. pulv. gr. j, Ammoniae Subcarb., Confect. arom., sing. gr. v, Syrupi q. s. ut f. bolus; alle 4 bis 6 Stunden mit dem haustus Infusi Armoraciae comp.

Linctus Olei Terebinthinae (*Par.*) ut ille II. 667 ab *E. Gr.* etc. indicatus, sed Pulv. Rad. Glycyrrh. q. s. addendo.

Haustus in diarrhoea (*Par.*): Mist. Cretae unc. iβ, Tinct. Opii gutt. xv, Tinct. Catechu dr. j. Nach jedem flüssigen Stuhle zu nehmen.

Pilulae adstringentes (*Par.*): Aluminis contriti, Nuc. mosch. pulv., sing. gr. v, Extr. Gentian. q. s. ut f. pil. no. 2.

Gargarisma aluminosum (*Par.*): Infus. Ros. comp. unc. iijβ, Alumin. pulv. gr. x, Oxymellis dr. iij.

Pilulae adstringentes (*Par.*): Plumbi Acet. gr. iij, Op. pur. gr. j, Extr. Conii gr. x, F. pil. 3. Ein Stück zwei Mal täglich mit einem haust. Acidi acet. comp. zu nehmen.

Haustus adstringens (*Par.*): Infusi Cuspar. unc. j, Tinct. Catech. dr. j, Pulv. Ipecac. gr. x.

Bolus emeticus (*Par.*): Zinci Sulph. scr. j, Conf. Ros. canin. q. s. Mit etwas Chamillenthee zu nehmen, und nach jedesmaligem Erbrechen einige Tassen lauwarm zu trinken

Haustus antihaemorrhagicus (*Par.*): Tinct. Ferri Muriat. gutt. x, Aq. pur. unc. j. Alle 3 Stunden zu nehmen, bei Mutterblutfluß.

Injectio adstringens. (*Par.*): Cort. Querc. dr. vj coque per horae part. sextam cum Aq. dest. unc. x et colat. unciis iv adde Inf. Lini tantidem. Bei Mutterblutfluß mit irritabelm Zustand der Scheide.

Haustus emeticus (Par.): Antimon. tartariz. gr. j, Vini Ipecac. dr. ij, Aq. pur. unc. iß.

Mistura emetica (Par.): Pulv. Ipecac. dr. β, Antimon. tart. gr. j, Tinct. Scill. dr. j, Aq. destill unc. vijß. Sogleich 4 und dann alle 10 Minuten 2 Eßlöffel, bis Erbrechen erfolgt.

Mistura cathartica (Par.): Magnes. Sulph., Sodae Sulph. sing. dr. iij, Aq. Menth. virid. dr. vß, Vin. Antimon. dr. j. Zwei Eßlöffel täglich drei Mal

Pilulae catharticae (Par.): Extr. Colocynth. comp. dr j, Opii pur. gr. iij, Ol. Nuc. mosch. gutt. iv. F. pil. no. 12. Alle 2 Stunden 2 Stück, bis zweimal Stuhlgang eintritt.

Mistura cathartica (Par.): Magnes. Sulph., Sodae Sulph., sing. unc. β, Ferri Sulph. gr. v, Mist. Camph. unc. vijß. Täglich 2 mal 2 Eßlöffel.

Bolus cathartica (Par.): Rad. Jalap. contrit. gr. xv, Hydrarg. Submur. gr. v, Confect. Ros. canin. q. s.

Electuarium catharticum s. purgans (Par.): ut illud ab *E. Va.* II. 637 indicatum, sed loco syrupi sacchari Syr. Rosarum. Bei Hämorrhoiden, einer Muskatnuß groß drei oder vier Mal täglich, bis der Leib gehörig offen ist.

Haustus purgans (Par.): Ol. Ricin. unc. β, Vitell. Ovi q. s., contritis adde Syr. Papav. dr. ij. Tinct. Opii gutt. v, Aq. destill. unc. j. Alle 3 oder 4 Stunden in der Bleicolik.

Pilulae catharticae (Par.): Pil. Hydr., Aloës spicat., sing. scr. j. F. pil. no. 6. Bei Schlafengehen zwei Stück.

Aqua laxans Youngii (Par.): v. II. 488 ubi pro Cryst. Tart. unc. tres et Aq. drachm. octo legi necesse est Cryst. Tart. dr. iij, Aq. unc. 8.

Haustus cathartica (Par.): Rhei gr. xv, Potass. Supersulph. gr. x, Aq. Cinnam. unc. j. — Sodae tart. dr. ij, Sod. Carbonat. scrup. j, Aq. pur. unc. iß. Mit einem Eßlöffel Limonienſaft während des Aufbrauſens, täglich Morgens, zu nehmen.

Mistura cathartica (Par.): Sodae Carbonat. dr. ij, Ferri Sulphat. gr. iij, Magnes. Subcarb. dr. j, Aq pur. oct. β, Acidi sulph. dil. dr. x. Infundatur primum lagenae aqua, deinde immittantur salina et denique acidum, quo facto lagena illico obturetur et in loco frigido servetur.

Pulvis cathartica (Par.): Cambogiae contrit. gr. iij, Sacch. purif. scrup. j. Tere optime ut f. pulvis. Alle 3 Stunden zu nehmen, bis gehörige Leibesöffnung erfolgt.

Electuarium catharticum (Par.): Potass. Supertart. unc. ij, Ferri tart. dr. iij, Zingib. scrup. j, Syr. simpl. q. s. Zwei Drachmen täglich drei Mal; — Confect. Sennae unc. ij, Ferri tart. scrup. ij. Einer Muskatnuß groß zu nehmen.

Electuarium emmenagogum (Par.): Myrrh. pulv. scrup. j, Ferri ammon. gr. v, contere et adde Zingib. q. s. Einer Muskatnuß groß täglich zwei Mal.

Mixtura emmenagoga et antispasmodica (Par.): v. Mist. emmenagogam p. 694.

Haustus diureticus et stimulans (Par.), v. Mixturam diureticam II. 402.

Pulvis diureticus (Par.): Scillae sicc. gr. xij, Nitri, Sacch. purif, Cinnam., sing. dr. j. Divide in part. 6 aeq. 2 Mal täglich 1 Stück.

Pilulae diureticae (Par.): Scill. sicc. gr. iv, Fol. Digit gr. x, Merc. dulc. gr. vj, Myrrh. scrup. j, As. foet. dr. β, Extr. Gent. q. s. F. pil. no. 15. Ein Stück Abends und Morgens. — Sodae Carbonat. sicc. dr. j, Saponis duri scrup. iv, Ol. Junip., Syr. Zingib. q. s. f. pil. no. 30. Täglich 3 Stück gegen Nierenſtein. (*Beddoes.*)

Pulvis diureticus (Par.): Potass. Supertartr. dr. j, Scill. sicc. gr. iij, Zingib. gr. v. Alle 6 Stunden ein Pulver.

Haustus diureticus (Par.): Tinct. Ferri Muriat. gutt. xv, Inf. Quass. unc. j. Alle 3 Stunden — Tinct. Lyttae gutt. x, Spir. Aeth. nitr. dr. j, Mist. Camph. dr. xij, Sy. Zingib. dr. j. Dreimal täglich.

Pilulae diaphoreticae (Par.), v. Pil. Sulphureti Potass. II. 396.

Pulvis diaphoreticus (Par.): Pulv. Ipecac. comp. gr. xv, Pulv. Tragacanth. comp. scrup. ij. Divide in partes 4 aeq. Stündlich ein Pulver. — Pulv. Ipe-

cac. comp. gr. xv, Pulv. Antim. gr. ij. Bei Schlafengehen mit lauwarmem Thee zu nehmen.

Bolus diaphoreticus (*Par.*): Guajaci Res. gr. x, Pulv. Ipec. comp. gr. v, Confect. Ros. q. s. ut f. bolus. Bei Schlafengehen. — Guajaci Res. gr. x, Antim. tart., Opii puri, sing. gr. j, Syr. q. s. ut f. bolus. Zweimal täglich. — Camphorae, Pulv. Antim., sing. gr. iij, Opii pur. gr. j, Confect. aromat. q. s. Bei Schlafengehen.

Mixtura antirheumatica (*Par.*): Guajaci Res., G. Acaciae, sing. dr. ij, bene contritis adde Tinct. Op. dr. β, Pulv Cinch. dr. j, Tinct. Cinch. dr. ij, Decoct. Cinch. unc. 8. Täglich 2 mal ½ Tasse.

Pulvis diaphoreticus (*Par.*): Extr. Aconiti, Antimon. Sulphuret., Praecipitati, sing. gr. j, Magnes. Carbonat. scrup. β. — Pulv. Antim. gr. iij, Potass. Subcarb. gr. v, Anthemid. Flor. exsicc. scrup. j. Alle 6 Stunden 2 oder 3 Tage lang.

Pulvis Myrrhae expectorans (*Par.*): Myrrh. dr. β, Sacch. pur. unc. β, contere optime. In getheilten Gaben täglich in einem passenden Vehikel.

Mixtura expectorans (*Par.*), v. p. 331.

Pulvis expectorans (*Par.*): Scillae sicc. gr. viij, Ipecac. gr. v, Camph. scrup. j, Pulv. Antimon. gr. vj, Sacch. purif. dr. j. Tere in pulverem in part. 4 aeq. divid. Zweimal täglich ein Pulver mit Gerstenabkochung.

Mixtura expectorans et antispasmodica (*Par.*): Mixt. G. Ammon., Aq. Cinnam., sing. unc. iβ, Syr. Tolut. unc. β, Tinct. Cast. dr. ij, Tinct. Op. gutt. v. Ein Eßlöffel zuweilen, nach Umständen, bei Keuchhusten ꝛc.

Mixtura expectorans (*Par.*): Mist. Amygd. unc. j, Vini Ipecac. gutt. x, Potass Carbon. gr. x, Succi Limon. dr. iij. Während des Aufbrausens.

Pulvis expectorans (*Par.*): Myrrh. gr. xij, Ipecac. gr. vj, Nitri dr. β. Pulv. misce et divide in part. 4 aeq. Alle 4 Stunden 1 Stück.

Haustus expectorans (*Par.*): Tinct. Scill. gutt. x, Acid. nitr. dil. gutt. vj, Extr. Hyosc. gr. iij, Aq. pur. unc. jβ. Alle 3 Stunden. (*Bree.*)

Potio s. Emulsio expectorans (*Par.*): Acid. nitr., G. Ammon., sing. dr. j, Aq pur. unc. iv, acid. c. aq. commixtum c. ammon. in emuls. tere. Ein mäßiger Löffel mit einer lindernden Flüssigkeit zu nehmen.

Pilulae sialagogae (*Par.*), v. Pil. Muriat. Hydr. oxydati (RC.) II. 188.

Potus refrigerans (*Par.*), v. Decoctum refrigerans, 789.

Lotio refrigerans (*Par.*): Ammon. Muriat. dr. ij, Acid. acet dil. unc. ij, Spir. Camph. unc. β. — *Aliam* v. Mixturam refrigerantem II. 362. sed loco spir. rect. Spirit. tenuioris unc. β.

Epithema refrigerans (*Par.*): Liq. Ammon. Acet. unc. vj, Spir. Rorism. unc. ij, Aq. pur. octar. j. Auf den geschornen Kopf.

Mixtura antacida absorbens (*Par.*): Liq. Potass. dr. ij, Liq. Calcis unc. vj. Bei Säure einen oder zwei reichliche Eßlöffel mit Rindfleischbrühe.

Pulvis contra cardialgiam (*Par.*): Magnes. Subcarbonat., Sodae Subcarbonat., sing. gr. xv, Zingib. gr. iv, Rad. Liquirit. gr. xv.

Pilulae antacidae (*Par.*): Ammon. Subcarb. gr. v, Extr. Rhei gr. viij. F. pil. no. 2.

Haustus lithontripticus (*Par.*): Magnes. Subcarb scrup. j, Infus. Columb. unc. j, Tinct. Columb. dr. j.

Haustus in calculo (*Par.*): Sodae Subcarb. gr. x, Mist. Amygd. unc. j, Bals. Copaiv. (mucilag. ope mist.) dr. β, Tinct. Opii gutt. v. Bei Steinschmerzen. — Infus. Rosar. unc. iβ, Magnes. Sulphat. dr. j, Tinct. Columb dr. ij. — Decoct. Hord. comp. unc. iβ, Acid. mur. gutt. v. Dreimal täglich.

Pulvis in calculo (*Par.*): Magnes. Subcarb. gr. x, Ipecac. gr. j, Sodae Subcarb. gr. v. Mit einem schicklichen Vehikel zu nehmen und eine Tasse Chamillenthee nachzutrinken.

Electuarium anthelminticum (*Par.*): Stanni Limat. unc. iij, Confect. Ros. Gall. unc. β, Syr. q. s. Täglich früh ein Eßlöffel, und drei Mal zu wiederholen, worauf der Kr. einen Purgirtrank nimmt.

Bolus contra taeniam (*Par.*): G. Gutt. gr. viij, Hydrarg. Submuriat., gr. v, Mucil. G. Acac. q. s. Früh Morgens zu nehmen.

Pulvis anthelminticus (*Par.*): Ferri Subcarb. scrup. j. Mit einem etwas dicken Vehikel mehrere Tage des Morgens.

Enema camphoratum (*Par*): Camphorae (Alcoh. solut.) dr. j, Ol. Olivar. dr. ij. Jede dritte Nacht bei Schlafengehen auf drei Mal, dann eine Nacht um die andere, vier Mal hinter einander, wenn es nöthig, gegen Ascariden.

Suppositorium anthelminticum (*Par.*): Aloës spicat. gr. x, Sapon. duri dr. j. Nach einer Stuhlausleerung einzubringen.

Mixtura demulcens (*Par.*): ut ea a *Vm.* 201 indicata, sed Acaciae Gummi dr. iij, Aq. dest. unc. vj et Syr. Rhoead. unc. β. Zwei Eßlöffel täglich drei oder vier Mal. — Ol. Amygd. dr. vj, Liq. Potass. gutt. L., Aq. Ros. unc. viiβ.

Haustus demulcens et febrifugus (*Par.*): Mist. Amygd. unc. j, Potass. Carbonat. gr. x, Syr. Rhoead. dr. j. Mit einem Löffel Limonienſaft während des Aufbrauſens.

Electuarium demulcens (*Par.*): Cetacei dr. ij, Pulv. Tragacanth. comp. dr. j, Syr. Papav., Syr. Tolut., sing. dr. ij, Confect. Ros. dr. vj, Potass. Nitrat. dr. β. Einer Muskatnuß groß zu nehmen.

Mixtura demulcens (*Par.*): Cetacei dr. ij, Vitelli Ovi dimid., Syr. unc. β, Aq. Cinnam. unc. ij, Aq. destill. dr. iv. Häufig einen reichlichen Eßlöffel.

Enema Amyli (*Par.*): Amyli drach. iij, Aq. ferv. unc. iv, solve pro enemate et adde, si opus fuerit, Tinct. Opii dr. β.

Mixtura hydrocyanica (*Par.*): Acid. hydrocyan. dilut. gutt. v, Mist. Amygd. unc. iv, Syr Tolut. dr. j. Alle 3 Stunden ein reichlicher Eßlöffel; — vel: Acid. hydrocyan. dil. gutt. xij, Tinct. Digit. dr. β, Aq. Cinnam. unc. vβ. Alle 4 Stunden ein reichlicher Eßlöffel.

Lotio hydrocyanica (*Par.*): Acid. hydrocyan. dr. j, Aq. Ros. unc. iβ. Gegen Hautausſchläge.

Guttae anodynae s. Morphiae Acetatis (*Par*): ut illae II. 223, sed Acetatis gr. xij, Acidi acet. dil. gutt. v.

Guttae iodatae (*Par.*): Tinct. Iodini gutt. v, Aq. destill. unc. j. Zehn Tropfen täglich drei Mal.

Haustus Chininae Sulphatis (*Par.*): Quinae Sulphatis gr. ij, Acid. sulph. dilut. gutt. ij, Aq. destill. unc. j. Zwei oder drei Mal täglich.

Suppositorium catharticum (*Par.*): Elaterii gr. j - ij, Saponis duri gr. viij contrita cum vehiculo apto a Dr. Paris maxime laudatum.

Remedium ad aures Taylori (*Par.*) Allium sativum in Oleo Amygd. infusum et Alkannae Radice tinctum.

Emplastrum stimulans et rubefaciens (*Par.*): Saponis unc. j, Empl. Plumbi dr. ij. Liquefac et fere refrigeratis adde Muriat. Amm. dr. β. Auf die Bruſt bei Lungenaffectionen, Rheumatismen der Bruſtmuskeln, beſonders bei alten Leuten. Es muß friſch bereitet angewendet und alle 24 Stunden erneuert werden.

Crême de noyau (*Par.*): Amygd. amar. decorticat. unc. j, Spir. ten. octar. β, Sacch. unc. iv, interdum coccinella additur.

Almond paste (*Pasta Amygd.*) (*Par.*): Amygd. amar. decort. unc. iv, Albumen Ovi unius, Aq. Rosae et Spir. rectif., sing. part. aeq.

Antipertussis (*Par.*): Remedium Sulphat. Zinci maxime continens.

Gowland's Lotion (*Par.*): Sublimati gr. circiter iβ in Emulsion's Amygd. unc. j solut. Hoc Sal in Spir. Rorism. solutum itidem ut cosmeticum venditur.

Norton's drops (*Par.*) e Solutione Sublimati corr. constant.

Ward's white drops (Par.): Solutio Sublimati in Acido nitrico cum alia e Carbonate Ammoniae mixta; vel: Solutio ejusdem cum illo Carbonate.

Marsdens antiscorbutic drops (*Par.*): Solutio Sublimati in Infuso Gentianae. — *Green's drops* sublimatum basi habent; — *Salomon's Anti-Impetigines*: Solutio Sublimati.

Spilsburry's antiscorbutic drops (*Par.*), v. II. 188. sed *Par.* Sublim. unc. ij et Spir. ten. octarium.

Syrupus Cuisinier (*Par.*), v. II. 551. cui Sublimatus additur.

Aromatic lozenges of steel (*Par.*), v. Troch. chalyb. aromat.

Unguentum antipsoricum Batemanni (*Par.*) (cf. II. 404.): Subcarb. Potass. unc. β, Aq. Ros. unc. j, Ol. Bergamott. dr. β, Sulph. sublim., Axung., sing. unc. xj.

Essence of coltsfoot (*Par.*): Bals. Tolut., Tinct. Benz. comp., sing. part. aeq., Spir. Vin. rectif. duplum. Bruſtmittel!?

Balsam of horehound (*Par.*), v. Bals. Marrubii.

Grindle's cough drops (*Par.*). Praeparatio c. Opio, elixirio paregorico similis.

Steer's Opodeldoc (*Par.*), v. 167 formulam *Re.* ubi legendum: Sapon. unc. j, Spir. rectif. unc. viij, Camph. unc. iiiβ, Ol. Rorism. dr. β etc.

Lisbon diet drink, *Decoctum Lusitanicum* (*Par.*): Sarsaparill. concis., Rad. Chinae, sing. dr. j, Nuc. Jugland. cort. sicc. no. 20, Antimon. Sulphuret. unc. iij, Lapid. Pumic. pulv., Aq. dest. libr x.

Guy's powder of Ethiopia (*Par.*): Stannum purum raspat., Mercurius, Sulphur sublimatum contrita.

Storey's worm cakes (*Par.*): Calomel cum Jalapa in pastillos red. et Cinnabare tinct., v. II. 158.

Concentrated solution of charcoal (*Par.*): Tinctura Catechu sub hoc nomine venditur.

Chelsea pensioner (*Par.*), v. II. 637. ubi Mellis libra una ut f. elect. addendum est.

Walker et Wessel's Jesuit Drops (*Par.*): Tinct. praeparata e Guajaco, Bals. Copaiv., et Ol. Sassafras c. Spiritu Vini.

Efflorescence of real Cheltenham Salts (*Par*): Sal Cheltenham. (II. 95 616. Aqua crystall. privat.) — *Efflorescence of Real magnesian Cheltenham Salts* ex Aquis Chalyb. Magnes. Spad. praep. constat secund. Phillips e Sale Eps. cum Magnesiae et Muriat. Magnes. vel Sodae parva copia.

Corn plaster (*Par.*) ut 629. sed Cerae uncias novem?

Davidson's Remedy for cancer (*Par.*): Acidum arsenicosum et Pulvis Lupuli.

Plunkett's Ointment (*Par.*) constat ex Acido arsenicoso, Sulphure, Floribus Flammulae et Cotula foet. cum Albumine Ovi unius in pastam redactis. Auf ein Stück Schweinsblaſe geſtrichen auf die krebſige Oberfläche zu legen.

Delcroix's poudre subtil (*Par.*) e Calce viva et Arsenici Sulphureto cum Pulvere quodam vegetabili constare videtur. Um überflüſſige Haare in 10 Minuten zu vertilgen.

Peter's pills (*Par.*), Aloës, Jalap., Scamm., Gutti, sing. dr. ij, Calomel dr., v. 112.

Hoopers Pills (*Par.*): Pil Aloës c. Myrrh., Sulphat. Ferri, et Canella, cum Eboris usti certa quantitate.

Dutch drops, *Haerlem drops* (*Par.*): Ol. Terebinth. redestillatione rectificatum (Balsam. Terebinth.) basi habet; vel: Mixtura ex Ol. Tereb., Tinct. Guaj., Spir. Nitr. aeth. et parva quantitate Ol. Ambrae et Caryophyll.

Eaton's styptic (*Par.*) Constat maxime e Solutione Sulphatis Ferri alcohol.

Wilson's Tincture for the gout (*Par.*). Est Infusum Colchici, v. 585. 586.

Hunt's economical breakfast powder (*Par.*). Secale tostum coffeae substitutum.

Edinburgh ointment (*Par*) constat maxime ex Helleboro albo et Muriate Ammoniae.

Essence of bitter almonds (*Par,*): Ol. Amygd. amar. part. j, Spir. rectif. part. vij. Als Parfüm.

Whitehead's Essence of Mustard (*Par.*): Ol. Terebinth., Camphora, Spir. Rorism., cum Pulv. Sinap. parva quant. — *Whitehead's Essence of Mustard Pills* (*Par.*). Bals. Tolut. cum Resina!

Selway's prepared Essence of Senna (*Par.*). Est Infusum Sennae compositum, cum Alkali conjunctum.

Essence of Spruce (*Par.*) e Pino Larice, v. Essentia Pini II. 341. — *Cerevisia Pini Laricis* II. 341

Essential Salt of bark (*Par.*) sub hoc nomine venditur Extractum Chinae praeparatum macerando corticem in Aqua frigida et infusionem lentissime vaporando.

Essential Salt of Lemons (*Par.*): constat e Cremore Tartari et Superoxalate Potassae. Um Eiſenflecke aus Linnen zu bringen.

Everlasting pills (*Par.*) Ex Antimonio metallico constabant.

Godbold's Vegetable Balsam (*Par.*): Essentiae Vegetabilium 42 variorum separatim in syrupis servandae et tunc cum G. Dragon, G. Guaj., G. Arab. et G. Canad. in Aceti destill. duplo solutis, Styracis in Spir. Vin. soluti certa quantitate et Oleo Cinnam. commixtae per annos tres seponendae et tunc primum adhibendae. Gegen Schwindſucht und aſthmatiſche Beſchwerden.

Godfrey's cordial (*Par*): Sassafras unc. ix, Sem. Carvi, Coriand., Anis., sing. unc. j, infunde in Aquae octar. vj, ad iv decoque, adde Theriacae (treacle) libr. vj, coque totum per pauca momenta et refrigeratis adde Tinct Opii unc. iij.

Godfrey's Smelling Salts (*Par.*): Resublimatione Subcarbonatem Ammoniae comm. cum Sale Tartari et Spir. rectif. certa quantitate.

Golden Spirit. of Scurvy Grass (*Par.*): Solutio G. Gutt. in Spir. Armorac. comp.

Greenough's Tincture for the teeth (*Par.*): Amygd. amar. unc ij, Lig. Brasil. et Cassiae Bacc., sing. unc. β, Rad. Irid. Flor. dr. ij, Coccinell., Sal. Acetosell., Alumin., sing. dr. j, Spir. rectif. octar. ij, Spir. Armorac. unc. β.

Ruspini's Tincture for the teeth (*Par.*): Rad. Irid. Flor. unc. viij, Caryophyll. unc. j, Spir. rectif. octar. ij, Ambrae gris. scr. j.

Scouring drops (*Par*): Ol. Terebinth. c. Oleo aliquo fragrante odoris causa commixt.

Dr. Chiltick's Remedy for the stone (*Par.*): Alkali fixum in Brodio vitulino.

Lynch's Embrocation (*Par.*): Oleum Oliv. cum Essent. Bergam. et aliis impraegnat. et Rad Alcann. tinct.

Maddens vegetable essence (*Par.*). Infus. Ros. comp. c. Acidi majore copia.

Matthew's Injection (*Par.*): Tinct. Cantharid. diluta. Ehemals bei Maſtdarmfiſtel berühmt.

Mock Arrack (*Par.*): Spir. Sacchari mens. quart, Acid. benzoic. scrup. ij.

Moseley's Pills (*Par.*) e Rhabarb. et Zingib., v. II. 475.

Norris's drops (*Par.*): Solutio Antimonii tart. in Spir. rectif. aliquo vegetabili tincta.

Pectoral Balsam of Liquorice (*Par.*): Constat maxime ex Elixirio paregorico, Oleo Anisi impraegnato.

Tolu Lozenges (*Par.*): Sacch. unc. viij, Cremor. Tart. unc. j, Amyli dr. ij, Tinct. Bals. tolut. dr. j, Mucil. G. Tragac. q. s.

Refined Liquorice (*Par.*): Extract. Liquir. purum c. G. Arab. pondere dimidio lente evaporatum et in cylindricam formam redactum.

Remedium odontalgicum (*Par.*): Solutio Camph. in Oleo Terebinth. (dr. ij, pro unc. j.)

Struve's Lotion for hooping-cough (*Par.*): Antimon. tart. unc. j, Aquae unc. ij, solut. adde Tinct. Canth. unc. j.

Patent Seidlitz powders (*Par.*). Pulveri Seidlitz. p. 29 indicato similis, excepto quod Acidi tart. gr. xxxv adhibeantur. Sales in charta alba, Acidum in coerulea occlusum venduntur.

Sodaic powders (*Par.*): Carbonat. Sodae dr. β, charta coerulea occlus., Acidi tart. gr. xxv charta alba. cf, Pulverem Sodae tart. p. 28. Dieſe Pulver erfordern ½ Pinte Waſſer.

Smellome's ointment for the eyes (*Par.*): Aerugin. subtil. pulv. dr. β, cum Oleo trit. et cum Ung. Basil. flavi unc. j commixt.

Mrs. Stephen's Remedy for the Stone (*Par.*): Calx calcinatione testarum ovorum et cochlearum praeparata cum Sapone in pilulas redacta. Zugleich wurde ein Decoct aus Chamillen, Fenchel, Peterſilie und Klettenwurzel, und wenn Schmerzen ſtattfanden, ein Opiat angewendet.

Lithontripticum Sennerti (*Par.*): Salis Tart. unc. j in Aq. Petroselin. octar. j soluta et Cortice Aurantior. flavo colore praedit.

Virgin's Milk (*Par.*): Solutioni Aluminis saturatae adde Extracti Goulardi partem tertiam et agita; v. II. 357.

Ward's red drops (*Par*): Solutio vinosa Antimonii tartaris. concentrata.

Radix Cahincae s. Caincae, Raiz preta, Caincawurzel (Bor. 5.); von Chiococca anguifuga, *Mart.*, einem Braſiliſchen Strauche. Es iſt eine lange, dicke, wenig äſtige, holzige, der Länge nach runzlige, außen braunſchwarze, inwendig weißliche Wurzel von gewürzhaftem, ſüßlichbittern Geſchmack und gewürzhaftem Geruch. Man hat ſie beſonders in Waſſerſuchten und hyſteriſchen Zufällen empfohlen und giebt ſie entweder im Aufguß, 2 Drachmen mit 1 Pfund Waſſer, ein- oder zweimal täglich eine Theetaſſe voll oder in Decoct, 2 Dr. mit 1½ Pfd. Waſſer bis auf 8 Unzen eingekocht, 1 bis 2 Eßlöffel zwei bis viermal täglich.

Unguentum Aeruginis s. Damascenum. (*Fl. T.*): Aeruginis porphyris. unc. ij, Ol. Olivar. q. s., Ung. resinos. semifus. unc. xvj; *Fl.* Ung. libr. j. Aerug. unc. βj, Ol. q. s. Wie das Ung. aegyptiacum gebraucht.

Register.

(II. deutet auf den zweiten Theil.)

A.

Abelmoschus, 1.
Abies balsamea, 1.
— pectinata, II. 642.
— picea, 2.
Abrotanum foemineum, II. 542
— hortense, 4.
— mas, 4.
— montanum, II. 542.
Absinthium, 4.
— alpinum. 294.
— maritimum, 4.
— Ponticum, 4.
— Romanum, 4.
— vulgare, 4.
Absynthium, 4.
Acacia. 14.
— Aegyptiaca, 15.
— Arabica, 15.
— Catechu, Italica, II. 448.
— Germanica, 14. 15. II. 447.
— nostras, 14. 15. II. 447. 448. 449.
— vera, 15.
— vulgaris, 15. II. 447.
Acaciae Gummi, 766.
Acanthium vulgare, 442.
Acanthus, 15.
— mollis, 15.
Acarois resinifera, II. 719.
Acemella, 65.
Acetabularia Mediterranea, 781.
Acetas Aluminae, 152.
— ammoniacalis, 185.
— Ammoniaci s. Ammoniae, 185.
— — aquosus, 185.
— — dilutus, 185.
— — fortior 185.
— — liquid., 185.
— — solut., 185.
— — — dilutus, 185.
— — tenuior, 185.
— Barytae, 337.
— calcicus, 390.
— Calcii Protoxydi, 390.
— Calcis, 390
— Chinini. 539.
— Cinchonini, 556.
— Cupri, 630.
— — cum baseos excessu, 627.
— — brutus, 627.
Acetas Cupri crudum, 627.
— — crystallisatus, 630
— — Deutoxydi, 630.
— — imperfectum, 627.
— — mellitus, 617.
— — neutrum, 630.
— cupricus, 630.
— — cum Aqua, 630.
— Deutoxydi Potassii, II. 420.
— Ferri, 697.
— — alcoholisatus, 697.
— — liquidus, 697.
— — Peroxydi, 697.
— — Protoxydi, 697.
— — Tritoxydi, 697.
— ferricus, 697.
— Hydrargyri, II. 211.
— hydrargyrosus, II. 211.
— Kali, II. 420.
— kalicum s. kalicus, II. 420.
— Lixiviae, II. 420.
— — solutus, II. 422.
— Mercurii, II 211.
— Morphei, II. 223.
— morphicus, II. 223.
— Morphii, II. 223.
— Morphinae, II. 223.
— natricus, II. 617.
— — cum Aqua, II. 617.
— Oxydi Ferri liq. 698.
— Plumbi, II. 358. 365. 366.
— — crystallis., II. 365.
— — in crystall. concret, II. 366.
— — acidulus siccus, II. 365.
— — — solutus, II. 365.
— — cum baseos excessu, II. 358.
— — depuratus, II. 366.
— — dilut. alcoholisat., II. 361.
— — liquidus, II. 358. 369.
— — — cum Alcohole, II. 361.
— — neutrum, II. 365.
— — Protoxydi, II. 365.
— — solutus, II. 369.
— plumbic. crystallis., II. 365.
— — crudus, II. 358.
— — cum Aq. depurat. II. 366.
— Potassae, II. 420.
Acetas Potassae aquosus, II. 421.
— — liquida s. liquidus. II. 421.
— Protoxydi Calcii, 390.
— — Potassii, II. 420.
— — Sodii, II. 617.
— Quininae, 539.
— Sodae, II. 617.
— — crystallis., II. 617.
— Solaninae, II 619
— superplumb aquos., II. 358.
— Zinci, II. 733.
— — dilutum, II. 734.
Acetis Ammoniae, 185.
— — liquidus, 185.
— Hydrargyri, II. 211.
— kalicum s. kalicus, II. 420.
— Lixiviae, II. 420.
— Plumbi, II 365.
— — liquida, II. 358.
— Potassae, II. 420.
— — liquida, II. 421.
— Sodae, II. 617.
— Zinci, II. 733.
Acetosa nostras, 15.
— officinalis, 15.
— pratensis, 15.
— rotundifolia. 15.
Acetosella. 16.
Acetosellae Sal, II. 425.
Acetositas Citri s. Limon., 573.
Acetum. 17.
— acerrimum, 19.
— acetosum, 17.
— — camphoratum, 400.
— alliatum, 100.
— Allii, 100.
— — compos., 100.
— anthosatum, II. 506.
— antimephitic., 100.
— antisepticum, 100. 217.
— Armoraciae, II. 464.
— aromat., 100. 217. 309. II. 22. 116. 506.
— — alliat., 100.
— — extemporaneum, II. 424.
— Belladonnae, 315.
— Berlinense, 217.
— bezoardicum, 217. II. 116.
— — Sylvii, 215.
— Calendulae Flor., 393.
— Camphorae antisept., 100.
— camphoratum, 399.
— Capsici spirituos., II. 343.

Acetum Caryophylli, 645.
— chalybeatum, 697.
— Cochleariae Armoraciae, II. 464.
— Coffeae, 585.
— coffean. extempor., 585.
— Colchici, 586.
— colchicum, 586.
— colchiticum, 586.
— commune, 17.
— concentratum, 20.
— — Westendorfii, 19.
— Convallariae maj, 602.
— crudum, 17.
— Cyperi longi aromat., 637.
— dentifricium, II. 455.
— destillatum, 17.
— — concentrat., 20.
— Digitalis saccharatum, 650.
— Dracunculi, 294.
— dulcificatum, 75.
— Ellebori nigri, 781.
— Ferri, 697.
per frigus concentr., 17 20.
— gelu concentr., 17.
— glaciale, 20.
— Hellebori nigri, 781.
— — albi, 781.
— Hispalense, 637.
— hystericum, 466.
— Lavandulae, II 61.
— — compos., II. 61.
— laxans, II. 588.
— laxativum, II. 588.
— Lithargyri, II. 358 359 369.
— lithargyrites, II. 359.
— maravillianum, 100.
— martiale, 697.
— medicatum, 217.
— Myrrhae, II. 240.
— Naphae, 560.
— Nicotianae, II. 248.
— odoratum, II 116. 506.
— odoriferum, II. 116.
— opiaceum, II. 258.
— Opii, II. 258
— Papaveris errat., II. 324.
— Piperis Jamaic., II. 343.
— — longi spiritnos., II. 343
— — nigri et albi, II. 343.
— Plumbi, II. 359
— — concentrat., II 358. 359.
— plumbicum, II. 358
— Primulae veris, II. 447.
— prophylacticum, 217. II. 743.
— Pseudo-Narcissi, II. 242.
— purificatum, 17.
— pyrolignosum, 18.
— purum concentr., 17.
— quatuor latronum, 100. II. 61.
— — — compos., 101.
— radicale, 19.
— radicatum, 19.
— Rhoeados, II. 324.
— Rorismarini, II. 506.
— Rosae, II. 499.
— Rosarum, II. 499.
— — compos., II. 499.
— rosatum, II. 499.
— Rubi Idaei, II. 516.
— rutaceum, II. 519.
— Rutae II. 519.
— — camph rat., II. 520.
— — compos., 466.
— Salviae, II. 530.
— Sambuci, II. 536.
— sambucinum, II. 536.
— Saturni, II 359.
— — concentr., II. 358.
— saturninum, II. 358. 359.
— Scillae, II. 569.
Acetum Scillae maritimae, II. 569.
— Scillites alcohol., II. 569
— scilliticum, II. 569.
— stillatum, 17.
— Terebinthinae, 19. II. 662.
— theriacale, II. 5.
— tunicae, 645.
— Veratri, 781.
— Vini, 17.
— — camphorat., 399.
— — concentr., 19.
— — destillat, 17.
— — glaciale, 20.
— — purum concentr. 17.
— — radicale, 19.
— Westendorfii, 19.
— Zingiberis, II. 736.
Achillea Ageratum, 731.
— atrata, 731.
— Millefolium, II. 215.
— moschata, 731.
— nana, 731.
— nobilis, II. 449.
— Ptarmica, II. 449.
— vulgaris, II. 215.
Achmella, 65.
Achras mammosa, 570.
Acidi muriatici correctio, 32.
— nitrici correctio, 49.
— sulph correctio, 57.
Acidum aceti, 17. 20.
— — forte, 20.
— aceticum, 17. 19.
— — aromatico-camphorat, 400.
— — aromaticum, II. 61. 506.
— — camphoratum, 400.
— — concentratum, 19. 20
— — debile s. dilutum, 17.
— — dilut. et vulnerar., II. 530.
— — fortius, 19.
— — impurum, 17.
— — odoratum, II. 506
— — purum, 19. 20
— — cum Scilla, II 569.
— — scilliticum, II. 569.
— — tenue, 17.
— Acetosellae, 52.
— acetosum, 17.
— — destillat., 17.
— — camphorat., 399.
— — forte, 17.
— aereum, 27.
— amylicum, 202.
— anemonicum, 208.
— antimonicum, 229. 234.
— arsenicale, 289.
— arsenicosum, 287.
— — liquidum, 287.
— — vitreum, 287.
— arsenicum, 289.
— arseniosum, 287.
— azoticum, 47.
— Benzoës, 24.
— benzoicum, 24.
— — impurum, 24.
— boracicum, 26.
— Boracis, 26.
— Borussicum, 36
— — alcoholicum, 37.
— cainicum, II. 740.
— camphoricum, 400.
— carbonicum, 27.
— — liquidum, 27.
— — c. Ferro, 684.
— carbonosum, 52.
— carthamicum, 446.
— citricum, 31.
— — concretum, 31.
— cretaceum, 27.
— ellagicum, 716.
Acidum formicicum, 19. 709.
— Gallarum s. gallosum, 7[illegible]
— hydriodicum, II. 9.
— hydrobromicum, 355.
— hydro-carbonic., 52.
— hydrochloricum, 32.
— hydrochloro-nitric., 274.
— hydrocyanicum, 36.
— — alcoholic., 37.
— — au quart, 37.
— — dilutum, 38.
— — Caillaud, 38.
— — — spirit. aquos. 38.
— — Gay-Lussac., 36.
— — sec. Gea Pessina, 3[illegible]
— — Harlesii, 38.
— — Ittneri, 37.
— — Kelleri 37.
— — medicin., II. 742.
— — sec. Planchii met. 36.
— — — Scheelii, 36.
— — Vauquelini, 36.
— — Rustii, 38.
— — vegetabile, 43.
— hydroiodicum, II. 9.
— hydromuriaticum, 32.
— hydro-sulphurat., 43.
— hydro-sulphuric., 43.
— — liquidum, 44.
— hydrothionicum, 43.
— — liquidum, 44
— iodicum, II. 8.
— iodosum, II. 8.
— kramericum, II. 468.
— laccicum, II. 49.
— Ligni pyro-oleos., 18.
— Lignorum, 18.
— Limonum, 31.
— manganesicum, II. 100.
— marinum, 32.
— — fumans, 32.
— — — dephlogist., 540.
— menispermic., 578.
— muriatic., 32
— — alcoholisat, 35.
— — concentrat, 33.
— — crudum, 32.
— — dephlogist., 540.
— — depuratum, 32. 33
— — dilutum, 34.
— — liquidum, 34.
— — nitroso-oxygenat. 274.
— — oxygenatum, 540. 54[illegible]
— — — liquidum, 541.
— — — ad contagia, 54[illegible]
— Nitri, 47 48.
— — concentr., 48.
— — fumans, 48.
— nitrico-muriat., 274.
— — nitros. concentr., 28
— nitricum, 47 48
— — alcoholisat, 51 [illegible]
— — aromat, 50.
— — crudum, 47.
— — Deutoxydo Azoti repulat., 48. 49
— — depuratum, 49.
— — Steinacheri, 49.
— — dilutum, 49
— nitro-muriat, 274.
— — — dilutum, 274.
— nitroso-nitric., 48.
— — oxymuriat., 274.
— nitrosum, 48 51.
— — alcoholisat, 77.
— — dephlogisticat, 47.
— — depurat., 48
— — dilutum, 49.
— — liquidum, 48.
— oleo-ricinicum, II. 491.
— oxalicum, 52.

d by Google

Acidum oxymuriaticum, 541.
— phosphaticum, 55.
— Phosphori, 53
— — fusum s. glaciale, 54
— phosphoricum, 53.
— — depuratum, 54.
— purum, 54.
— phosphorosum, 55.
— Prussicum, 36.
— — medicinale, 37.
— pyro-aceticum, 18.
— pyrolig. s. pyrolig. crudum, 18.
— pyrolign rectif., 19.
— pyrotartaric., 55.
— rheumicum, II. 473.
— ricinicum, II. 491.
— sabadillicum, II. 521.
— Sacchari, 52.
— saccharinum, 52.
— Salis culinaris, 32.
— — dephlogist., 540.
— — marini, 32.
— — oxygenat., 540. 541.
— sorbicum, II 620.
— stearo-ricinic., II. 491.
— stibiosum et stibic., 229.
— Succini, 56.
— succinicum, 56.
— — crudum, 56.
— — crystallisatum, 56.
— — depurat., 56.
— — liquidum, 56.
— sulphuricum, 57
— — alcoholic., 60.
— — alcoholisat., 60. 82.
— — Anglicum, 57.
— — aquosum, 58.
— — aromat., 419.
— — — alcoholis., 419.
— — concentr., 57.
— — — rectif., 57.
— — crudum s. venale, 57.
— — dephlogist., 57.
— — defaecat., 57.
— — sulphuricum depurat., 57.
— — dilutum, 58.
— — fumans album, 57.
— — Germanicum, 57.
— — purum, 57.
— — purissimum, 57.
— — retificatum, 57.
— — tenue, 58.
— Sulphuris volatile, 61.
— sulphurosum, 61.
— — aethereum, 83.
— Tartari, 62
— — crystallis., 62.
— tartaricum, 62.
— — crystallis., 62.
— tartarosum, 62.
— uricum, 65.
— Vitrioli, 57.
— — cum Alcoh. arom., 419.
— — alcoholisat. 60.
— — aromat., 419.
— — defaecat., 57.
— — dephlogist., 57.
— — depurat, 57.
— — dilutum, 58.
— — purissimum, 57.
— — rectificatum, 57.
— — vinosum, 60.
— vitriolicum, 57.
— — aquosum, 58.
— — tenue, 58.
— — vinosum, 60.
— zooticum, 36.
— zootinicum, 36.
Acipenser Huso, 719.
— Ruthenus, 719.
— stellatus, 719.
Acipenser Sturio, 719.
Acmella, 65.
Aconita, 66.
Aconitinum, 66.
Aconitum, 65.
— Anthora, 65
— Cammarum, 65.
— elatum, 65.
— Meyeri, 65.
— Napellus, 65.
— Neomontanum, 66.
— Neubergense, 65.
— racemosum, 68.
— Stoerkeanum, 65.
— strictum, 65.
— tauricum, 65.
— variegatum, 65.
— vulgare, 65.
Acor acetic. crystallinus, 20
— benzoicus, 24.
— boracicus, 26.
— succineus, 56.
— Sulphuris condensat., 57.
— — merus, 57.
— tartaricus, 62
Acorus adulterinus, II. 19.
— Calamus, 369.
— palustris, II. 19.
— vulgaris, II. 19.
Actaea, 68.
— racemosa, 68.
— spicata, 68.
Acte II. 535.
Acus Veneris, 659.
Adeps, 68
— Anseris, 69.
— Anguillae, 69.
— Cantharid. medicat, 434.
— — — alius, 429.
— cetaria, 69.
— Cortice Daphnes Gnidii medic., 639.
— Coturnicis, 69.
— Hominis, 69.
— Mur. Hydr. oxygen. medic., II. 180.
— Nitrate Hydrarg. medicatus, II. 204.
— Ovis Arietis, 69.
— Pavonis, 69
— praeparat., 69.
— Rosarum, II. 500.
— Subcarbonate Plumbi medicat. — Ung. Ceruss.
— Tart. stib. medicat., 259.
— suillа s. suillus, 69.
— — praep., 69.
— Suis Scrotae purif., 69.
— Vulpis, 69.
Adhatoda, 70.
Adiantum 70.
— album, 70. 310.
— aureum, II. 388.
— Canadense, 70.
— Capillus Veneris, 70.
— caudatum, 72
— fragile, 71.
— melanocaulon, 71.
— nigrum, 71.
— pedatum, 70.
— rubrum, 71.
— trapeziforme, 71.
— villosum, 71.
Adiowaen, Semina, 155.
Adipocera cetosa, 479.
Admella, 65
Aegagropilus, s. Aegagropila, 392.
Aër dephlogisticatus, II. 315.
— fixus, 27.
— hepaticus, 43.
— inflammabilis, 718.
— mephiticus, 27.
— purus, II. 315.
— vitis, II. 315.
Aeris Flores, 630.
Aerugo, 627.
— Aeris, 630.
— crystallisata, 630.
— praeparata, 628
Aes ustum, 618. II. 351. 352.
— viride crystallisat., 630.
Aesculus, 72.
— Hippocastanum, 72.
Aether aceticus, 74.
— — c. Cantharide, 427.
— — alcoholicus, 75.
— — alcoholisat., 75
— — ammoniacalis, 161.
— — ferrat. Klaproth., 698.
— aceticus martialis, 693.
— acetosus, 74.
— alcoholisat. muriat. 76.
— — nitricus, 79.
— ammoniacalis, 164.
— antiodontalg., 300.
— chloruricus, 77.
— cupricus, 625.
— cypriacus, 625.
— hydrochloricus, 76.
— — alcoholisat., 77.
— iodinicus, II. 8.
— ioduratus, II. 8.
— martialis, 692.
— mercurialis, II. 186.
— muriaticus, 76. 77.
— — alcoholicus, 76.
— — alcoholisatus, 77.
— — spurius, 77.
— nitricus, 77. 79. 80.
— — alcoholisat. s. alcoholicus, 79. 80.
— nitrosus 77. 78.
— oleo sulphurosus, 83.
— phosphoratus, II. 336.
— phosphoricus, 80.
— phosphoro-phosphoricus, II. 336.
— spirituosus, 82.
— sulphurico-ferrat., 692.
— — nitricus, 78.
— sulphuricus, 81.
— — acidus, 60.
— — alcalis. Digit., 652.
— — cum Alcohole, 82.
— — cum Alcohole aromat., 419.
— — alcoholicus, 82.
— — alcoholisato-camphorat., 398.
— — alcoholisatus, 82.
— — camphorat. aquosus, 398.
— — c. Deutoiodureto Mercurii, II. 194.
— — ferratus, 692.
— — ioduratus, II. 8.
— — oxydul. ferrar., 692.
— — phosphoratus, II. 336.
— — rectificatus, 82.
— terebinthinatus, II. 663.
— Vitrioli aquosus, 83.
— vitriolicus, 81.
— Zinci, II. 722.
Aethereoleum Absinthii, 5.
— Anethi, 211.
— Angelicae, 212.
— Anisi, 222.
— Anthos, II. 507.
— Artemisiae, 293.
— Aurantii, 558.
— Basilici, 338.
— Buxi, 307.
— Calami, 371.
— Cardamomi, 442.
— Carvi, 447.
— Cascarillae, 452.
— Caryophyll. arom., 450.
— Cassiae cinnamom., 467.

Aethereoleum de Cedro, 569.
— Cerefolii, 484.
— Chaerophylli, 484.
— Chamaemeli, 486.
— Chamomillae, 486.
— Chenopod anthelm., 497.
— Cinnamomi, 407.
— — Ceylanici, 407.
— Citri, 569.
— Coriandri, 604.
— Cubebarum, 614.
— Cumini, 616.
— Dictamni, II 311.
— Foeniculi, 208.
— Galbani, 358.
— — compos., 359.
— Hyssopi, 802.
— Juniperi Baccar., II. 42.
— — Ligni, II. 42.
— Lavandulae, II. 61.
— Ligni Rhodii, II. 74.
— Limonum, 569.
— Macidis, II. 233.
— Majoranae, II. 311.
— Meliloti Florum, II. 109.
— Melissae, II. 112.
— Menthae, II. 120.
— Millefolii, II. 217.
— Monardae, II. 221.
— Nucistae, II. 233.
— Origani, II. 311.
— Petroselini, 273.
— Peucedani, II. 333.
— Pimentae, II. 344.
— Piperis Jamaic., II. 344.
— Pulegii, II. 450.
— Rorismarini, II. 507.
— Rosarum, II. 500.
— Rutae, II. 520
— Sabinae, II. 42.
— Salviae, II 530.
— Santali albi, II. 541.
— — citrini, II. 541.
— Sassafras, II. 554.
— Saturejae, II. 554.
— Serpylli, II. 684.
— Succini, II. 632.
— Tanaceti, II. 648.
— Terebinthinae, II. 662.
— Thymi, II. 684
— Valerianae, II. 706.
— Zedoariae, II. 721.
— Zingiberis, II. 736.
Aethiops alcalisatus, II. 131.
— antimonialis, II. 143.
— — Huxhami, II. 143.
— auripigmentalis, II. 138.
— Cupri, 623.
— graphiticus, II. 139.
— martialis, 675.
— mineralis, II. 141. 155.
— — auratus, II. 144.
— — Harrisii, II. 142.
— — oxydulatus, II. 142.
— — reductus, II. 144.
— — praecipitatus, II 155.
— — tritur et triturat. duplus, II. 142.
— narcoticus, II. 141.
— Plummeri, II. 166.
— saccharatus, II. 130.
— per se, II. 145.
— vegetabilis, 427. II. 258.
Aethusa Cynapium, 544.
— Meum, II. 215.
Aetites, 678.
Agallochum, II. 72.
Agaricum 85.
— praeparatum, 86.
Agaricus, 85.
— albus s. alb. praeparat. 85. 86
— chirurgorum, 86.
— mineralis, 379.
— muscarius, 152.
Agaricus quernus, 86.
— — praeparat., 86.
— trochiscatus, 86.
Agathophyllum, 86.
— aromaticum, 86.
Agava, 87.
Agave, 86.
— Americana, 86.
Agedoides, II 79.
Ageratum, 732.
Agnus castus, 87.
Agresta, II. 717.
Agrimonia, 87.
— Eupatoria, 87.
Ajuga, 87.
— Genevensis, 87.
— pyramidalis,
— reptans, 88.
Alabastrites, 389.
Alabastrum, 389.
Alamum, 295.
Albedo Corticum Citri, 569.
— — Aurant., 557.
Album Argenti, II. 354.
— Cerussae, II. 354.
— Ceti, 379.
— graecum, 387.
— de Krems, II. 354.
— Plumbi, II. 354.
Albumen aluminos., 149. II. 315.
— Ovi, II. 314.
Alcahest Glauberi, II. 401.
Alcali ammoniacale, 170.
— — spirit, 159.
— Ammoniacum acetat., 185.
— — caust., 155.
— — fluidum, 155.
— — spirituos., 159.
— — succinatum, 190.
— causticum, II. 391.
— fixum tartarisat., II. 427.
— — vegetab. impur., II. 398.
— Lignor. depurat., II. 398.
— minerale, II. 608.
— — acetatum, II. 617.
— — crudum, II. 608.
— — crystallis., 608.
— — depurat. II. 608
— — fixum, II. 608.
— — perfecte saturat., II. 610.
— — phosphorat., II. 613.
— — sulphuric., II. 614.
— — tartarisat., II. 435.
— — vitriolat., II. 614.
— phlogisticat., 40.
— Tartari, II. 399.
— — Aceto saturat., II. 420.
— vegetabile, II. 399.
— — aërat., II. 398. 399.
— — — crudum, II. 398.
— — c. Aceto, II. 420.
— — causticum, II. 391.
— — crystallis., II. 405.
— — perfecte saturat., II. 405.
— — salito - dephlogisticat., II. 419
— — tartarisatum, II. 427.
— — vitriolatum, II. 406.
— volatile acetatum, 185.
— — aëratum, 170.
— — ammoniacale, 170.
— — anisatum, 160.
— — aquosum, 172.
— — causticum, 155.
— — concretum, 171.
— — crudum, 170.
— — dulce, 170.
— — depuratum, 171
— — fluidum, 155.
— — fluor, 155.
Alcali volatile nitratum, 180.
— — purum, 155.
— — e Sale Ammoniace, 170.
— — siccum, 170.
— — tartarisat., II. 436.
Alcaligenium, 320.
Alcanna, 205.
— orientalis, II. 64.
— spuria, 205.
— vera, II. 64.
Alcea, 88.
— Aegyptiaca, 1.
— rosea, II. 99.
Alces ungula, 721.
Alchemilla, 88.
— major, 88.
— vulgaris, 88.
Alchornea latifolia, 96.
Alcis cornu, 386.
Alcohol, 88. 89. 90. 91. 92. 93.
— Absinthii, 9.
— absolut., 89 90. 91. 93.
— Aceti, 20.
— aethereum ferratum, 69.
— cum Albumine, II 315
— albuminosum, II. 315.
— alcalisatum, 90. II. 393.
— c. Aloë perfoliata, 104.
— aloëticus, 104.
— aluminosum, II. 315.
— ammoniacale, 159.
— — c. Asa foetida, 302.
— — camphorat., 165.
— — succinatum, 168.
— ammoniacat. aromat., 161.
— Ammoniae anisat., 160.
— — et Guajaci, 752.
— ammoniatum s. ammoniatus, 159.
— — foetidum, 302.
— — anisat., 160.
— — aromatic., 161.
— — aromatis., 161.
— — c. Guajaco, 752.
— c. Angelicae Radicibus, 212.
— Angelicae comp., 213.
— Anisi 223.
— — comp. 223.
— Anthos comp., II. 511.
— antodontalgicum. 400.
— c. Aromatib. comp., 417.
— — — sulphuricat., 419
— aromaticum, 411. 417. II. 59. 533.
— — ammoniacal., 161.
— — ammoniat., 161.
— — sulphuric., 419.
— aromatisat. Colonience, 571.
— Asae foet., 304.
— c. Asa foet. et Opio, 305.
— c. Aurantio, 560.
— Aurantior. Corticum, 593.
— balsamicum, 798.
— c. Bals. Peruv., 327.
— c. Balsamis et Resinis, 798.
— — Benzoate Ammoniae, comp., II 272.
— Brucini, 356,
— Camphorae saponaceum, II. 442.
— — nitricatum, 400.
— camphorat., 399.
— — crocatum, 399.
— cantharidatus, 424
— c. Caryophyllis, 450.
— castoreatum, 462.
— Cerasor. nigror., 4 9.
— c. China comp. Huxh, 532.

Alcohol Chinae comp., 533.
— cinnamomatus, 410
— Cinnamomi s. C. destill., 410.
— citratus, 570.
— Citr. et Limon. Cort., 570.
— Citri comp., 571.
— cum Citro Aurantio, 566.
— c. Coccionella comp., 418 II. 708.
— c. Cochlearia s. Cochleariae, 581.
— — et Lacca, II. 50.
— Cochleariae destill., 582.
— commune, 90.
— concentratiss., 91.
— concentratum s. concentratus, 91. 92.
— crocatum, 399.
— c. Crotone Cascarilla, 353.
— depuratum — Spir. Vin. rectificat. et rectificatiss.
— c. Deutoiodureto Mercurii, II. 194.
— dilutius, 90.
— dilutum, 90. 91. 93.
— — amarum, 94.
— — antiscorbut., II. 341.
— ferratus, 691
— Formicar. destill., 709.
— fortior s. fortius, 90.
— c. Guaj. offic. ammoniat., 752.
— Helenii, II. 6.
— — comp., II. 512.
— Inulae comp., II. 512.
— Iodi, II. 7.
— Iodii, II. 7.
— Iodinae, II. 7.
— Iodinii, II. 7.
— Iunip. comp. II. 43.
— juniperatus, II. 43.
— c. Lacca, II. 49. 50.
— Lauri Cinnamomi, 410.
— c. Lavand. comp. II. 63.
— Lavandulae, II. 62.
— magis rectificatus, 92.
— Melissae comp., II. 113.
— muriaticum aether., 76.
— Muriat. Oxyduli Ferri, 697.
— nitricat. Camphorae, 42.
— nitric. aethereum, 77.
— nitricus, 51.
— nitric aether., 77.
— Nucis vomicae, II. 252.
— c. Nucleis Persicorum, 400.
— odontalgicum, 400.
— opiatum II. 264.
— Opii dilutum, II. 268.
— cum Opio, II. 264.
— — aromatic., II. 268
— phosphorat., II 336.
— polyaromaticum, II. 531.
— Potassae, II. 393.
— purissimus — Aic absolut.
— c. Ratanhia acetat., II. 469.
— rectificatissimus, 91. 93.
— rectificatus, 91. 92. 93.
— c. Rheo, II. 484
— c. Resinis balsamicis, 340.
— Rorismarini, II. 510.
— — comp., II. 511.
— c. Rorismar. Summit., II. 510.
— Salviae vulnerar., II. 531.
— saponatum, II. 440.
— c. Sapone, II. 440.
— Serpylli comp., 161.
— simplex, 92.
— Strychninae s. Strychnini, II. 627.
— c. Succino, II. 631.
— — Sulphate Ferri tartaris., 703.
Alcohol Sulphatis Cinchonin., 555.
— sulphuricat., 60.
— sulphurico aeth., 82.
— — — Ferri, 692.
— sulphuricum, 60.
— — aeth, 82
— — c. Ferro, 692.
— sulphuricus, 60.
— — acidus, 60.
— Sulphuris, II. 631.
— supercarbonatum, 399.
— c. Tartrate Potass. ferrat., 703.
— Terebinthinae, II. 662.
— terebinthinat. comp., II. 663.
— Thymi, II. 685.
— venale, 88.
— Veratrinae s. Veratrini, II. 709
— Vini, 92.
— — alcoholisat., 92.
— — communis, 92.
— — rectificatiss, 91. 93.
— — rectificatus, 93.
— Vitae saponaceum, II. 442.
Alcool camphoratus, 399. v. Alcoh.
Alcoolatum v. Alcohol.
Alcornoco Cortex, 96.
Aletris farinosa, 96.
Alexiterium aceticum, 21.
— ammoniacale, 171.
— chloricum, 540
— desinfectans, 275.
— nitricum, 50.
— nitro-muriaticum, 275.
Alimentatio antiscorbutica, 510.
Alisma Plantago, II. 349.
Alizarinum, II. 513.
Alkali v. Alcali.
Alkanna, 205.
— spuria, 205.
Alkekengi, 96.
Alkermes s. Alkermes liquidum, 418. II. 708.
Alleluja, 16.
All flowerwater, II. 698.
Alliaria, 97.
Allium, 97.
— alpinum, 102.
— Ascalonicum, 97.
— Cepa, 97.
— montan. latifol. maculat., 102.
— Porrum, 99.
— sativum, 99.
— Scorodo prasum, 101.
— victoriale, 101.
Alnus glutinosa, 348
— nigra s. nigra baccifera, II. 470.
Aloë, 102.
— Barbadensis, 102.
— caballina, 102.
— Capensis, 102.
— depurata, 102
— hepatica, 102
— insuccata, 102.
— linguaeformis, 102.
— lota, 102.
— lucida, 102.
— pellucida, 102.
— perfoliata, 102.
— praeparata, 102.
— purificata, 102.
— rosata, 102.
— Socoterina, 102.
— Socotorina, 102.
— Socotrina, 102.
— spicata, 102.
— Succotrina, 102.
— violata, 102.
Aloë vulgaris, 102.
Aloëxylon, II. 71.
Aloysia, II. 710.
Alphenic, 786.
Alpinia Cardamomum, 440.
— Galanga, 714.
Alsine, 128
— media, 128.
Althaea, 129.
— officinalis, 129.
Altingia coerulea, II. 629.
— excelsa, II. 629.
— rosea, II. 99.
Altix, 308.
Alumen, 144.
— calcinatum, 144.
— crudum, 144.
— crystallinum, 144.
— draconisatum, 145.
— exsiccatum, 144.
— faecum, II. 398.
— igne exsiccat, 144.
— kinosatum, 145.
— plumosum, 154.
— a Rocca, 144.
— de Rochi, 144.
— Romanum, 144.
— rubrum, 144.
— Rupei, 144.
— rupeum, 144.
— saccharinum, 146.
— scissile, 388.
— tinctum, 145.
— — Mynsichti, 145.
— ustum, 144.
— vulgare, 144.
Alumina, 141.
Aluminium, 141.
Alveolaria lamellifera, 379.
— corticifera, 379.
Amalgama Hydrarg. c. Stanno, II. 623.
— Jovis, II. 623.
Amalgama Stanni, II. 623.
Amanita, 152.
— muscaria, 152.
Amara dulcis, 654.
Amaracum, II. 311.
Amaranthus luteus, II. 626.
Amaryllis Zeylanica, II. 560.
Ambarum cinereitium, 152.
Ambarvalis, II. 386.
Amblutum, 644.
Ambra, 152.
— ambrosiaca, 152.
— cinerea, 153.
— flava, II. 630.
— grisea, 152.
— — reducta, 153.
— liquida, II. 628.
— nigra, 152.
— vera, 152.
Ambreinum, 152.
Ambrosia, 496. II. 65.
Ambutua, 556.
Amianthus, 154.
Amidinum, 202.
Amidon, 202.
Ammi, 154.
— Copticum, 155.
— Creticum, 155.
— majus, 155.
— verum, 155.
— vulgare, 155.
Ammonia, 155.
— caustica, 155.
— — liquida, 155.
— hepatizata, 184.
— liquida, 155.
— muriatica, 180.
— praeparata, 170.
— pura, 155.
— — liquida, 155.
Ammoniaca alcoholisata, 159.

Ammoniacum, 155. 758.
— alcoholic. succinat, 168.
— anisatum, 160.
— causticum, 155.
— depuratum, 758.
— Gummi, 758.
— liquidum, 155.
— Sal depuratum, 181.
— succinatum, 168.
— volatile mite, 170.
Ammoniae Phosphas etc. v. Phosph. Amm.
Ammonium carbonicum, 170. 171.
— — crudum, 170.
— — depuratum, 170.
— — pyro-oleos., 173.
— citratum, 193
— hydrosulphurat. liq., 184
— hydrothionic. liq., 184.
— muriaticum, 180.
— — crudum, 180.
— — depuratum, 181.
— — ferruginosum, 694.
— — martiale. 694.
— — martiatum, 694.
— oxalicum. 190.
— subcarbonicum, 170. 171.
— — pyro-oleos., 173.
— sulphuricum, 180.
— tartaricum, II. 436.
Ammoniuretum Cupri, 619 623 625.
— — comp., 624.
— Hydrargyri, II. 196.
— Mercurii, II 196.
— Zinci, II. 728
Amomum, 745. II. 342.
— Cardamomum, v Matonia.
— Curcuma, v. Curcuma.
— Galanga, 714.
— Granum Paradisi, 745.
— latifolium, v. A. Zedoar.
— maximum, 745.
— racemosum, 441.
— repens, 411.
— vulgare, II. 603.
— Zedoaria, II. 720.
— Zerumbet, 457.
— Zingiber, II 734.
Amoracum v. Amaracum.
Amygdalae, 193
— amarae. 194.
— dulces, 193.
— excorticatae. 194.
— placenta, 195.
Amygdalus. 193.
— communis, 193.
— nana, 193.
— Persica, II. 330.
Amylum, 202.
— Chinae. 500.
— Hordei, 785.
— Marantae. 285.
— Solani tuberosi, II. 619.
Amyris, 204.
— balsamifera, II. 74.
— elemifera, 656.
— Gileadensis, 326.
— Kataf, II. 234. 255.
— Opobalsamum, 204. 326.
Anacardium longifolium, 204.
— occidentale, 204. 457.
— orientale, 204.
Anacyclus officinar. et Pyrethrum — Anthemis Pyr.
Anagallis aquatica, II. 710.
— arvensis, 205.
— coerulea, 205.
— foemina, 205.
— mas, 205.
— phoenicea, 204.
Anarrhichas Lupus, 386.
Anatron, II. 409.
Anchusa, 205
— officinalis, 205.
— tinctoria, 205.
Andromeda mariana, II. 744.
Andropogon Nardus, II. 243.
— Schoenanthus, 206.
Androsaemum, 797.
Anemone, 206.
— coronaria, 207.
— nemorosa, 206.
— pratensis, 206.
— Pulsatilla, 206.
— sylvestris, 207.
Anemoneum, 207.
Anemoninum, 207.
Anethum, 208.
— Foeniculum, 208.
— graveolens, 211.
— hortense, 210.
— segetum, 210.
— Sowa, 211.
— ursinum, II. 215.
Angelica, 211.
— Archangelica, 211.
— hortensis, 211.
— sativa, 211.
— sylvestris, 211.
Angues praeparatae, 719.
Anguis odoratus, 379.
Anguillae hepar, 721.
Anguria, 615.
Angustura, 219.
— ferruginea, 219.
— spuria s. venenosa, 219.
— vera, 219.
Anil, II. 1.
Anima Rhabarbari, II. 478. 479.
— Rhei, II. 478. 481.
Anime, 760.
Anisum 220.
— Sinense, 224.
— stellatum 224.
— vulgare, 220.
Anodynum specif. Paracelsi — Gutt. nigr.
Anonis, II. 256.
Anserina, II. 446.
Antennaria dioica, 225.
Anthemis, 485.
— Cotula, 485
— nobilis. 484.
— Pyrethrum, II. 453.
— tinctoria, 366.
Anthophylli, 449.
Anthora, 65.
Anthos, II. 505.
— sylvestris, II. 65.
Antidotus mithridat Damocratis, II. 290
Antihecticum Poterii, II. 624.
Antimonias Deutoxydi Potassii, 234.
Antimonii minera, 235.
— Murias, 250.
— Oxydum. 227.
— — vitrificat., 228.
— Sulphuretum praeparat., 235.
— Tartris, 251.
— Vitrum hyacinthin., 228.
Antimonium, 225.
— calcinatum, 229.
— calcinat. c. Nitro, 234.
— cathart. Wilsoni, 228.
— chloratum liq., 250.
— crudum. 235.
— — praeparatum, 235.
— diaphoreticum, 229. 234.
— — ablut., 229.
— — Keupii, 229.
— — lotum, 229.
— — martiale, 229.
Antimonium nitratum, 234.
— — non ablut., 234
— — rubrum, 226.
— fusum, 235.
— medicinale, 226.
— medicamentosum, 226.
— muriaticum, 250
— praeparatum, 235.
— nativum, 235.
— purum. 225.
— salitum, 250.
— sulphuratum. 235.
— tartarisat. s. tartarizatum. 251.
— ustum c. Nitro 234.
— vitrifactum, 228.
— vitrificatum, 228.
Antiquartium, II. 159.
Antirrhinum, 264. II. 75.
— Cymbalaria, 636.
— Linaria, II. 75.
— majus, 264.
Antophylli, 449.
Aparine, 715.
Apatites, 386.
Apis mellifica, 264.
Apium, 270.
— graveolens, 270.
— montanum. II. 576.
— petraeum, 357.
— Petroselinum, 270.
— saxatile, 357.
Apochylisma Berberis s. Berberum. 346.
Apocynum androsaemifol., 274.
Apozema aperitiv. ferrat., 272.
— diureticum, 99. II. 467.
— hydragoguin, 103. v. Decoctum.
Apri Dentes, 386.
Aqua, 719.
— Absinthii, 5.
— — comp, 5.
— — stillatitia, 5.
— Acaciae Florum, II. 449.
— Acetatis s. Acetitis Ammoniae. 185.
— — Cupri ammoniacalis, 627.
— — Plumbi, II. 361.
— — superplumbici, II. 361.
— Acetosae, 16.
— Acetosellae e Succo, 16.
— Acidi carbonici. 28.
— — — camphorata, 38.
— — nitrici diluti, 50.
— — sulph. dil. 59.
— acidula hydrosulphurosa. 47.
— acidulata, 28.
— — c. s. ex Acido carbonico. 28.
— acustica, 178.
— — Ludovici, II. 706.
— adstringens, 375. 627. II. 732.
— aërata. 28. II. 93.
— — alcalina II. 405.
— Aëris fixi, 28.
— aetherea camphorata. 38.
— Agrimoniae, 87.
— alcalina gasosa, II. 611.
— — oxymuriat., II. 420.
— alexiteria acetica, 212.
— — simplex, 212.
— — spirituosa, 212
— — — c. Aceto, 213.
— aloët. mercur., II. 149.
— d'Alibour, II. 732
— Aluminis Bateana, 149.
— — compos., 149.
— — vitriolata, 150.

Aqua aluminosa, 148
— — Bateana, s. Batiana, 149 II. 732.
— — Fallopii, 148.
— amara, II. 97.
— ammoniacalis coerulea, 627.
— Ammoniae, 155. 172.
— — acetatae, 185.
— — Acetatis s. Acetitis, 185.
— — causticae, 155.
— — Carbonatis, 172.
— — diluta, 158.
— — purae, 155.
— Amygd. amar., 42.
— — — concentr., 42.
— Anemones, 208.
— Anethi, 211.
— Angelica (Angel water), II. 230.
— — Viennens., II. 103.
— Angelicae, 212.
— — spirituosa, 216.
— Anhaltina, II. 664.
— Anisi fortis, 223.
— — lacticin. et spirit., 223.
— — extemporanea, 221.
— — — comp., 223.
— anodyna, 161.
— Anthemidis, 487.
— Anthos, II. 510.
— — spirit., II. 510.
— — comp., II. 511.
— antiarthrit., 35.
— antiasthmat., II. 3.
— antiherp. Cardin. de Lugnes, II. 192.
— antihyst. Quercet. reform., 461.
— antimelancholica, 609.
— antimiasmat., 626.
— — comp. 627.
— — Koechlini, 626.
— antinephritica, II. 609.
— antiophthalmica, II. 734.
— antipsorica, II. 202. 247. 607.
— antiscorbut., 581.
— antispasmodica, 411. II. 281.
— antivenerea, II. 185. 202. 207.
— apoplectica, II. 512.
— Aquisgranens. artific., 47.
— ardens, 90.
— aromatica, 411. II. 113. 533.
— — comp. c. Acido acet., II. 630.
— — Olei Citri comp., 571.
— — c. Opio, II. 263.
— — spirit., II. 232.
— d'Armagnac, 417.
— Armoraciae, II 463.
— aromat. Olei ess. Citri, 571.
— Artemisiae, 293.
— artificialis Spatana, II. 611.
— Asae foet., 303.
— — — comp., 303.
— Atriplicis foetidae, 497.
— Aurantii Flor., 559.
— — Folior., 559.
— — s. Aurantior. Cort., 559.
— — — alcoholica, 560.
— — — fortis 560
— — — spirituosa, 560.
— balsamica, II. 533.
— Baregiensis artific., 46.
— Barytae, 335.
Aqua Barytae Muriatis, 334.
— barytica, 334.
— Beccabungae, II. 711.
— Bellilucana, II. 607.
— benedicta, 256. II. 553.
— — comp., II. 553.
— — Rulandi, 255.
— — Serpylli, II. 685.
— benzoica, 341.
— Bergamottae, 568.
— Betulae artific., 91.
— Bonfermii, 417.
— Bonnensis artific., 46.
— Boraginis, 352.
— Borvonensis, II, 607.
— ad botium, 440.
— Bryon. s. Bryon. alb. comp., 461.
— Buglossi, 205.
— Calami, 371.
— Calcariae, 374.
— — acidula, 385.
— — c. China, 375.
— — muriaticae, 390.
— Calcariae prima et secunda, 374.
— — sulphurato-stib., 249.
— — ustae, 374.
— cum Calce, 374.
— Calcis, 374.
— — c. Cera, 270.
— — cerata, 270.
— — c. China, 519
— — comp., II. 553.
— — potassata, 374.
— — prima, 374.
— — secunda, 374.
— — vivae, 374.
— — vulneraria, II. 350.
— das Caldas da Rainha, 46.
— Camphorae, 395.
— camphorata Bateana, 622.
— Caponis, 722.
— Carbonatis aciduli Sodae mixta, II. 611.
— — Ammon., 172.
— — Calcis acidula, 385.
— — Ferri aciduli, 684.
— — Potass. acidula, II. 405.
— — — puri, II. 405.
— c. Carbonate Potass. acidula, II. 405
— — — Sodae ac dula, II. 611.
— carbonica, 28.
— — Ferri acidula, 684.
— Carbunculi s. contra carb., 414.
— del carcer. di Roma, II. 680.
— cardiaca, 91.
— Cardui bened., 442.
— Carlinae Radicis, 446.
— Carmelitana s. Carmelitarum, II. 113.
— carminativa, 561. 604.
— — simplex, 488.
— — spirit., 488.
— Carvi (Seminis), 448.
— — — fortis, 448.
— Caryophyll. arom., 450.
— Cascarillae, 452.
— Cassiae lig. simpl., 409.
— — — sine Vino, 409.
— — — spirit. 410.
— — — vinosa. 410.
— Castorei, 460.
— — vinosa, 460.
— catapultarum, II. 531.
— catarrhalis, 412.
— cathaeret Plenckii, II. 193.
— Cauperi, II. 549.
— caustica, II. 193.
Aqua caustica ad condylomata, II. 186. 208.
— Centaurii min., 474.
— cephalica — Aq. aromat.
— — Caroli V, 413.
— Cerasorum, 41.
— — amygdalata, 479.
— — nigror., 41.
— — — alcohol., 42.
— Cerefolii, 484.
— chalybeata, 684.
— Chamaemeli, 487.
— Chamomillae, 187.
— — anisata, 488.
— — Flor. comp., 490
— — — vinosa, 487.
— Chelidonii, 495.
— Cichorii, 514.
— Cicutae, 548.
— Cinnamomi, 409.
— — buglos., 410.
— — cordialis, 410. 412.
— — cydoniata, 411.
— — fortis, 410.
— — hordeata, 410.
— — lacticinosa, 410.
— — simplex, 409.
— — sine Vino, 409.
— — spirituosa, 410.
— — tenuis, 409.
— — vinosa, 410.
— Citreorum Cort., 570.
— Citri s. Citrorum, 570.
— — Aurant. Flor., 559.
— — Cort. lacticinosa, 570.
— — fortis s. spirituosa, 570.
— — Medicae, 570.
— — totius, 570.
— Cochleariae, 581.
— coelestis, 627. 631.
— — vulgaris, 625.
— coerulea, 627.
— Coloniensis, 571.
— communis, 719.
— confortativa, 42. 410.
— Convallariae, 602.
— — vinosa, 603.
— cordialis Colladoni, 572.
— — frigida, 410.
— — temperans s. temperata Saxonica, 413.
— Coriandri, 604.
— Cornu Cervi citrata, 724.
— Cort. Aurant., 559.
— — Peruviani, 518.
— cosmetica, 43 197. 340. 341. 668. II. 149. 613. 666.
— Cumini, 616.
— Cupri ammoniacal., 627. 631.
— — ammoniati, 627.
— — ammon. muriat., 626.
— — vitriolati comp., 623.
— Cyani, 633.
— Cydoniorum, 635.
— Cymbalariae, 636.
— dentifricia, II. 116.
— destillata, 719.
— Diatrion, 55.
— diuretica, II. 463.
— — camphorata, II. 415.
— — ex Nucleis, 43.
— divina Fernelii, II. 182.
— — mirabilis, 570.
— „Eau de javelle" dicta, II. 605.
— Ebuli, II. 538.
— Embryonum, II. 533.
— emetica, 256. II. 464.
— Enulae, II. 3.
— epidemica, 212.
— — Londin., 215.

Aqua epileptica, II. 317.
— — Langii, 603.
— Euphrasiae, 665.
— exsiccans, II. 360.
— Fabarum Flor. dest., 665.
— Falconeri, II. 405.
— Farfarae, 667.
— ferrata, 681.
— Ferri aërata, 684.
— ferruginosa, 707.
— — c. Gummi, 687.
— — salina, 684.
— — ferruginoso-gumm., 687.
— Flammulae, 577.
— Flor. Aurant., 559.
— — omnium, II. 698.
— ex flumine, 719.
— Foeniculi, 209.
— foetida, 303. 359.
— — antihyst., 303.
— — Pragensis, 303.
— fontana, 719.
— fortis Dyeri, 274.
— — simpl. et dupl., 47. 49.
— — composita, 274.
— Fragariae, 710.
— — spirituosa, 711.
— Fragorum, 710.
— Fruct. Myrti Pimentae, II. 344.
— Fumariae, 713.
— ad gangraenam, II. 202.
— gaseosa, 28.
— gelatinosa, 723.
— Gentianae comp., 737.
— ad gingivas, 139.
— Globuli, II. 739.
— contra gonorrh., II. 665.
— Goulardi, II. 361.
— Graminis, 744.
— grisea, II. 203.
— — Gohlii, II. 203.
— gummosa, 768.
— Helenii, II. 3.
— contra hemicraniam, 161.
— hepatica, 41.
— — acidulata, 45.
— de Herbis vulnerariis, II. 529.
— Hirund. c. Castoreo, 460.
— — simpl., 177.
— hordeata, 786.
— — c. Gummi, 787.
— Hordei, 786.
— Hungarica, II. 511.
— Hussoni, Reece's, 747.
— Hydrarg. mur. corr. c. Opio, II. 191.
— — — mitis nigra, II. 147.
— hydrocyanica vegetab., 43.
— Hydropiperis, II. 332
— hydrosulphurata, 44.
— — acidula, 45.
— hydrosulphurica acida, 45.
— — acidula, 45.
— hydrothionica, 44.
— Hydriod. Ferri, II. 742.
— Hyssopi s. ex Hyssopo, 802.
— hysterica, 460. 464. 489. II. 705.
— immortalis, 604.
— Jugland. Nucum, II. 35.
— Juniperi, II. 42
— — composita, II. 43.
— Kali, II. 401.
— — caust., II. 390.
— — puri, II. 390.
— — sulphurati, II. 397.
— — Sulphureti, II. 397.

Aqua kalino-aetherea, II. 402.
— Lactis alexiteria, 444.
— Lactucae sativae, II. 52.
— Lauri Cassiae, 409.
— — Cinnamomi, 409.
— Lauro Cerasi, 40.
— — ad us. artis veterin., 41
— — c. Belladonna, 315.
— Lavandulae, II. 61. 63.
— — ammoniacalis, 170.
— — spirit., II. 62.
— — Britann., II. 64.
— laxans Youngii, II. 433.
— laxativa, II. 103. 433. 591.
— — Viennensis, II. 591.
— Ledi palustris, II. 65.
— Ligni Rhodii, II. 74.
— — Sassafras, II. 554.
— — — comp., II. 554.
— Ligustri, II. 74.
— Liliorum, II. 75.
— — Convallium, 602.
— — — vinosa, 603.
— Limonum, 570.
— — totorum, 570.
— Lithargyrii Acetatis, II. 358. 361.
— — acetati, 358. 361.
— — comp., II. 361.
— lithontriptica, II. 405.
— Looch sani et experti, 410.
— Luciae, 168. II. 108.
— Lupuli, II. 88.
— Mad. Lavrillière, 583.
— magnanimitatis, 709
— — simpl., 709.
— Magnesiae (aërata), II. 93.
— Majoranae, II. 3.1.
— Malvae, II. 100.
— marina s. mar. artif., II. 607.
— Marrubii, II. 106.
— martialis, 707.
— — ad balnea, 691.
— — gaseosa, 684.
— mastichina, II. 117.
— Matricariae, II. 109.
— medicin. Hussoni, 585
— Melissae (simpl. et cohob.), II. 112.
— — antihyst., II. 113
— — comp., II. 113.
— — spirit., II. 113.
— — — comp., II. 113.
— Mellis, 265.
— Mellis Andernaci, 265.
— — odorifera, 572.
— — odorata regia, 604.
— — simplex, 265.
— Menthae alcoh., II. 123.
— — cohobata, II. 122.
— — comp. II. 124.
— — crisp., II. 121.
— — pip., II. 122.
— — Pulegii, II. 450.
— — sativae, II. 123.
— — spirit., II. 123.
— — vinosa, II. 123.
— — viridis, II. 123
— — vulg., simpl., II. 123
— mephit alcalina, II. 405
— mercurialis, II. 191. 193. 202. 205. 208
— — bals. Plenckii, II. 176.
— — comp., II. 207
— — nigra, II. 147.
— — salina, II. 202.
— — simplex, II. 127.
— mercuriata, II. 208?
— Mercurii alumin., II. 188
— — vivi cocta, II. 127.
— — vitriolati, II. 188.

Aqua mille Florum, II. 638.
— Millefolii, II. 217.
— mineralis, II. 616.
— mineral Dr. Marc, II. 73.
— — acidula, II. 607.
— — acidulata, II. 607.
— — cathartica, II. 95.
— — ferrata, 684.
— — sulphurata, II. 607.
— mirabilis, 714.
— miraculosa, 623.
— mulsa, 265.
— muriatico-mercurial. rubra, II. 148
— Muriatis Barytae, 334.
— — Calcis, 390.
— — Ferri, 691.
— — — comp. 691.
— Myrrhae, II. 240.
— Myrti (Myrtle water), II. 241.
— Myrti Piment., II. 344
— Naphae, 559
— — Florum, 559.
— Nasturtii aquat., II. 244
— Neapolitana, 47.
— nephritica, II. 232. 609
— Nicotianae, II. 247.
— nigra, II. 147.
— Nucis moschatae, II. 232.
— — — spirit., II. 232.
— Nucum Jugland., II. 35
— nivalis, 719.
— Nymphaeae, II. 253.
— odorifera, II. 64.
— ad oculos d'Yvel, II. 732.
— Unonidis, II. 256.
— ophthalmica, 182. 623. II. 45. 357. 360. 309. 725. 729. 731. 733.
— — adstringens, 139. II. 729.
— — alba Danica, II. 734.
— — aluminosa, 139
— — caerulea, 627. 691.
— — communis, 139.
— — Conradi, II. 191.
— — mercurialis, II. 182. 183. 191.
— — Ohdelii, II. 732.
— — resolvens, 261. II. 363
— — usualis, II. 725.
— — vitriolica, II. 729.
— — e Vitriol. Zinci, II. 729.
— Opii, II. 258.
— Origani, II. 34.
— Oryzae, II. 313.
— Oxycarbonat. aciduli Potassae, II. 405
— oxygenata, 50. 540. II. 315.
— oxygeno muriat., 540.
— oxymuriatica, 541.
— — Chlori, 541.
— Paeoniae, II. 316.
— — comp., II. 317.
— Panis, II. 321
— Papaveris alba, II. 325.
— errat., II. 322
— paralyseos, II. 446.
— Parietariae, II. 329.
— perlata, 42. II. 443.
— pestilentialis, 399.
— Petalor. Rosae, II. 500.
— Petroselini, 273.
— phagedaenica, II. 148. 182. 207.
— — alba, II. 209.
— — — comp., II. 184. 209.
— — Grindelii, II. 186.
— — Pideritii, II. 184.
— physagoga, 223.
— picea, II. 347.

Aqua Picis. II 317.
— — liquidae, II. 347.
— Pimentae s. Pimento, II. 344.
— — vinosa, II. 344.
— Pimpinellae, II. 339.
— Pimpinell. Anisi, 223.
— Pini Turionum, 2.
— Piperis Jamaicens., II. 344.
— Piperis Jamaic. vinosa, II. 344.
— — nigri, II. 344.
— Plantaginis, II. 350.
— Plumbi acetosi, II. 361.
— plumbica, II, 360.
— pluvialis 719.
— pontificalis, II. 217.
— Portulacae, II. 389.
— Potassae, II. 390.
— — causticae, II. 390.
— — purae, II. 390.
— — Carbonat. acidul., II. 405.
— — Subcarbonatis, II. 401.
— — Supercarbonat., II. 405.
— Pragensis, 303.
— Primulae veris, II. 446.
— prophylactica, 215.
— Pruni Avium alcohol., 42.
— — Lauro-Cerasi, 40.
— — Padi, 42.
— Pulegii s. Pulegii simpl., II. 450.
— — spirituosa, II. 450.
— Pulsatillae nigric., 208.
— pura dest. vulner., II. 533.
— purgans c. Tart. emet., II. 616.
— purificata — A. filtrata vel cocta et filtrata.
— Pyrmontana, II. 94. 607.
— Rabelii s. Rabeliana, 60.
— Ranunculi albi, 208.
— Raphani comp., 582.
— regalis, 274.
— regia, 274.
— Reginae Hungariae, II. 510. 511.
— Regis, 274.
— resolvens, II. 616.
— Rhodiae Radicis, II. 575.
— Rhoeados, II. 322.
— roborans, II. 362.
— Rorismarini, II. 510.
— — spirit., II. 510.
— Rosae, II. 500.
— — Centifol., II. 500.
— Rosarum, II. 500.
— — Damascenar., II. 500.
— Rubi Idaei, II. 516.
— rubra, II. 183. 529.
— Rutae, II. 520.
— Sabinae, II. 43.
— c. Sacch. Saturni, II. 369.
— salina, II. 434.
— Salis Ammon. fixi, 390.
— Salviae, II. 530.
— — comp., II. 530.
— — spirit., II. 530.
— Sambuci, II. 538.
— — Florum, II. 538.
— Santali citrini, II. 541.
— saphirina, 627. 631.
— Sassafras, II. 554.
— — comp., II. 554.
— Saturni, II. 361.
— saturnina, II. 360. 361. 369.
— Scabiosae, II. 555.
— sclopetaria, 23. II. 217. 511. 531.
— — aromat., II. 531.
— Scordii, II. 680.
— — comp., II. 301.
Aqua Sedlitzens. artif., II. 96.
— Selterana, II. 607.
— — alia, II. 607.
— Semin. Foenic., 209.
— — — lacticinosa, 209.
— — Persicae spirit., 42.
— separatoria, 49.
— Serpylli, II. 685.
— — comp., II. 685.
— Sinapis, II. 602.
— sine pari, 571.
— Sodae, II. 611.
— — Carbonatis, II. 609.
— — — acidula, II. 611.
— — Supercarb., II. 611.
— Solani nigri, II. 619.
— Spermatis Ranar., 731.
— Spermiolae, 731.
— spirit. Citri comp., 571.
— splenetica, 463.
— Stettinensis, II. 193.
— stibiata, 256.
— stomachica, II. 124. 610.
— styptica, 484. 623. 688. II. 732.
— — de Motte la Faveur, 687.
— — Clementina, II. 680.
— — Loofii, 691.
— Subacetat. plumbici, II. 361.
— c Subacet. Protox. Plumbi, II. 361.
— Subcarbonatis Kali, II. 401.
— Succor. veget. vulner., II. 217.
— Sulphatis Aluminae, 148.
— — Ferri et Magnes. alumin., 687.
— — Magnes. carbon., II. 97.
— — Zinci, II. 729.
— — — aluminosa, II. 732.
— sulphurata acidula, 45.
— — acida, 45.
— Sulphureti Ammoniae, 184.
— — Kali, II. 395.
— — Potassae, II. 395.
— sulphuro-acida, 45.
— sulphurosa, 46.
— — comp. II. 537.
— Superacetat. Plumbi liq. — Aq. vegeto-min.
— Supercarbonat. kalici, II. 405.
— — Potass., II. 405.
— — Sodae, II. 611.
— Swietenii, II. 184.
— ad synoviam, II. 203.
— Taedae, II. 347.
— Talci, II. 98.
— Tanaceti, II. 649.
— Tenellorum Cornu Cervi comp., 177.
— terebinthinata, II. 653.
— Thedeniana, 23.
— theriacalis. 212. 213.
— — calida, 214.
— — comp. II. 301.
— — frigida, II. 301.
— — Romana, II. 301.
— — simplex, II. 301.
— Thymi, II. 685.
— Tiliae s. Til. Flor. II. 686
— tolfana, II 737.
— Tormentillae, II. 687.
— ad tormina inf., II., 124.
— traumatica, 23. II. 531.
— — Thedenii, 23.
— Travezii, II. 96.
— de tribus, 55
— Typhor. Cervi comp 177.
— Ulmariae, II 622.
— Valerianae, II. 707.
Aqua Valerianae comp., 707.
— Vanillae, II. 708.
— Vanillarum Siliquar, II. 708.
— vegetab. min. Goulardi, II. 361
— vegeto-min., II. 361. 371.
— — Bellii, II. 371.
— — Goulardi, II. 361.
— — de Pressavin, II. 213.
— Veronicae, II. 711.
— — vinosa, II. 711.
— violacea, II. 21.
— Violarum, II. 714.
— viridis, 631.
— visceralis, 800.
— Vitae, 89.
— — duplex, 89.
— — Guajaci, 751.
— — mulierum Baecleri, 412.
— — purgans, II. 33.
— — rectificata, 92.
— — — camphorata, 309.
— — saponacea, II. 442.
— vitis, 89.
— Vitrioli albi, II. 729.
— — coerulea, 627.
— vitriolica, II. 729.
— — coerulea, 623.
— — camphorata, II. 729.
— e Vitriolo Zinci, II. 729.
— vitulina, 722.
— vulneraria, 23. 61. II. 60. 217. 350. 512. 531. 680.
— — acetosa, II. 530.
— — acida, 23.
— — c. Alcohole, II. 531.
— — aquosa, II. 533.
— — camphorata, II. 371.
— — Plenkii, II. 370.
— — Romana, II. 217
— — spirituosa, II. 529, 531.
— — Succor. vegetabil., II. 217.
— — Thedenii, 23.
— — vinosa, II. 531.
— Vulvariae, 497.
— Zedoariae anisata, II. 721.
— — vinosa, II. 721.
— Zinci vitriolata c. Camph., II. 729.
Aquae iodatae, II. 8. 10.
— min. ioduratae, II. 740.
Aquifolium, 275
Aquila alba, II. 159.
— mitigata, II. 159.
Aquilaria ovata, II. 72.
Aquilegia, 275.
— vulgaris, 275.
Aracus aromaticum, II. 707.
Aralia, 276.
— nudicaulis, 276.
— spinosa, 276.
Aranea domestica, 276.
Arbor Vitae, 276.
Arbutus Uva Ursi, II. 697.
Arcanum Archideti, 377.
— bechic. Willisii, II. 397.
— corallinum, II. 149.
— cosmeticum, II 98.
— duplicatum, II. 406.
— — depuratum, II. 406.
— — Mynsichti II. 406.
— Tartari, II. 420.
Arctium Bardana et Lappa, 332.
Areca Catechu, 467.
Argel, II. 577.
Argentaria, II. 416.
Argenti Nitras, 277.
Argentina, II. 440.
Argentum, 276
— cupellatum, 276.
— foliatum, 276.
— nativum, 276.

Argentum nitratum, 277.
— — fusum, 277.
— nitricum, 277
— — crystallisat., 277.
— — fusum, 277.
— purum, 276.
— sulphuricum, 279.
— vivum, II. 125.
— — purificatum, II. 125.
Argilla, 141.
— ferruginea rubra, 141.
— Kali sulphur. alcalisata, 144.
— pura, 142.
— sulphurica, 144.
— — alcalisata 144.
— — usta, 144.
Arguel, II. 577.
Arisarum, 295.
Aristolochia, 279.
— cava, 712.
— Clematitis, 279.
— Cretica, 280.
— fabacea, 712.
— longa, 280.
— — vera, 280.
— Pistolochia, 279.
— polyrrhiza, 279.
— rotunda, 280.
— — vera, 280.
— Serpentaria, 280.
— tenuis, 280.
— trilobata, 280.
— vulgaris, 280.
— — rotunda, 712.
Armoracia, II. 463.
Arnica, 282.
— montana, 282.
— Plauensis, 282.
— spuria, II. 2.
— Suedensis, II. 2.
Arnoglossum, II. 339.
Aroph Paracelsi, 694. 697.
Arrowroot, 285.
Arsenias Ammoniae, 292.
— Ferri, 292.
— Kali, 292.
— Potassae, 292.
— — alcoholisatus, 290.
— Sodae, 291.
Arsenici Oxydum, 287.
— — praeparatum, 287.
— — sublimatum, 287.
Arsenicum, 285.
— album, 287.
— — sublimatum, 287.
— antimoniatum, 287.
— citrinum, 285.
— crudum, 287.
— flavum, 285.
— rubrum, 285.
— — factitium, 285.
— sulphuratum rubrum, 285.
Arsenidum Sodae liquidum, 291.
Arsenis Potassae, 290.
— — aquosus, 290.
— — liquidus, 290.
— Sodae, 291
— — liquid., 291.
— — — comp., 291.
Artemisia, 292.
— alba, 292.
— Abrotanum, 4.
— Absinthium, 4.
— campestris, 294.
— Chinensis, 292.
— Contra, 551.
— Dracunculus, 294.
— glacialis, 294
— glomerata — A. Contra.
— Judaica, 551.
— Maderaspatana, 5.
— maritima, 4.
— Pontica, 4.
— rubra, 292.
— rupestris, 294.
Artemisia Santonica, 551.
— Vallesiana, 294.
— vulgaris, 292.
Arthanita, 633.
Arum, 295.
— Arisarum, 295.
— Colocasia, 295
— Dracunculus, 295.
— Indicum, 295.
— macrorrhizon, 295.
— maculatum, 295. II. 523.
— mucronatum, 295.
— peltatum, 295.
— sagittaefolium, 12. 295.
— triphyllum, 295.
Arundo, 296.
— Calamagrostis, 296.
— Donax, 296.
— Phragmites, 296.
— saccharifera s. saccharina, II. 521.
Asa, 296.
— dulcis, 339.
— foetida, 296.
— — depurat. ut G. Ammon.
Asarum, 305.
— Canadense, 305.
— Europaeum, 305.
— Hypocistis, 801.
— Virginianum, 305.
Asbestus, 154
Asclepias, 307.
— decumbens — A. tuberosa.
— gigantea, II. 230.
— incarnata, 307.
— Syriaca, 307.
— tuberosa, 307.
— Vincetoxicum, 307.
Asellus, oleum jecoris, 69.
Asparaginum, 308.
Asparagus hortensis, 308.
— officinalis, 308.
— sativus, 308.
Asperula odorata, 309.
Asphaltum, 309. II. 332.
— artificiale, 310.
Asphaltus, 309
Asphodelus albus, 310.
— mas, 310.
— ramosus, 310.
Aspidium coriaceum, 310.
— Filix Mas, 311.
— Rhaeticum, 70.
Asplenium, 482.
— Adiantum nigrum, 70.
— Ceterach, 482.
— murale, 310.
— Ruta muraria, 310.
— Scolopendrium, II 572. 573.
— Trichomanes, 71.
Assa foetida, 296.
Astacus fluviatilis, 381.
Aster conyzoides, 659.
— inguinalis, 659.
Astragalus Creticus, II. 689.
— exscapus, 310.
— gummifer, II. 689.
— Tragacantha, II. 689.
— verus, II. 689.
Astrantia, 311. II. 1.
— major, 311.
— minor, 311.
Athamanta Cretensis, 311.
— Meum, II. 215.
Athanasia, II. 647.
Athyrium Filix Mas, 311.
Atractylis, 446.
Atriplex angustifolia, 312.
— foetida, 496.
— glauca, 312.
— hortensis, 312.
— odorata, 490.
— olida, 496.
— sativa 312.
— sylvestris, 496.
Atropa, 312.
— Belladonna, 312.
— Mandragora, 315.
Atropia, 312.
Atropina, 312.
Atropinum, 312.
Atropium, 312.
Atmella, 65.
Auchenia Lama, 392.
Aurantiorum Poma s. Mala, 557.
Aurantium, 557.
— Curassavicum 557.
— Hispalense, 557.
Auricula Judae, II. 692.
— muris, 782.
— — major, 784.
— Ursi, II 446.
Auridum Ammoniacae, 318.
Auripigmentum, 285.
— rubrum, 285.
Auris Ceti, 387.
Aurum, 315.
— divisum, 316.
— — per Saccharum, 316.
— foliatum, 315.
— fulminans, 318.
— horizontale Zwingeri, 318.
— mosaicum, II. 624.
— muriatico-natricum, 317.
— — — praeparat., 317.
— muriaticum, 316.
— — c. Chlorureto Natrii, 317.
— — liquidum, 316.
— — natronatum, 317.
— musivum, II. 624.
— oxydatum, 318.
— potabile, 317.
— purum, 316.
Avellana, 636.
Avena, 319.
— excorticata s. decort., 319.
— nuda, 319.
— orientalis, 319
— sativa, 319.
Avenae Semen excort., 319.
Avicula Hirundo, 380.
— margaritifera, 380.
— Mya, 380.
Axungia, 68.
— Anatis, 69.
— Anguillae, 69.
— Anguium, 69.
— Anseris, 69
— antipsorica, II. 138.
— Ardeae, 69.
— Aschiae, 69.
— Aschii, 69
— Canis, 68.
— Caponis, 69.
— Castoris, 68
— Cati sylvestris, 68.
— cetaria, 69.
— Ciconiae, 69.
— composita, 70.
— Coturnicis, 69.
— Cuniculi, 69.
— Delphini, 69.
— Equi e collo, 68.
— — e juba, 68.
— Erinacei, 68.
— Gallinae, 69.
— Hominis, 69.
— Leporis, 69.
— Lucii Piscis, 69.
— Lunae 379.
— Lupi, 69.
— Muris alpini, 69.
— — montani, 69.
— nitrica, nitricata, 51.
— oxygenata, 51.
— Pavonis, 69.
— Phocae, 69.
— Porci, 69.

Axungia Porci purificata, 69.
— porcina, 69.
— praeparata, 69.
— Serpentum, 69.
— suilla, 69
— — praeparata, 69.
— Suis Scrofae, 69.
— Tauri Pedum, 68.
— Taxi, 68.
— Thymalli Piscis, 69.
— Ursi, 69.
— Viperarum, 69.
— viperina, 69.
— vulpina, 69.
— Vulpis, 69.
Ayapana, 662.
Azarum, 305.
Azedarach, 320.
Azotum, 320.

B.

Baccae Actes, II. 535.
— Jujubae, II. 37.
— Aurantiae, 557.
— Norlandicae, II. 515.
— Zizyphi, II. 37.
Baccharis, 603.
Bacilli Liquirit. albi, II. 82.
— — citrini, II. 82.
Baetica sylvestris, II. 241.
Balanus myrepsica, II. 221.
Balaustia, II. 451.
Ballota, 320
— lanata, 320.
— nigra, 320
Balls v. Boli et Globuli.
Balm of Gilead, Salomon's, II. 653. v. caet. Balsamum.
Balnea iodata, II. 8. 10. 742.
Balneum antisyphilit., II. 183.
— antipsoricum, II. 397.
— aromaticum, II. 500
— Chlori, 541.
— c. Hydriod. Ferri, II. 742.
— emolliens, II. 77.
— — et antisept., II. 441.
— excitans, 46.
— incitans, 24.
— irritans, 603.
— resolvens, 182. 183. II. 397.
— salinum et gelatinos., II. 606.
— sinapinum, II. 603.
— sulphuratum, 49. II. 397.
— — et gelatinos. Dupuytren, II. 397.
— sulphurosum, II. 397. 617.
Balsamaeleon, 326.
Balsamita mas, 321.
— odorata, 321.
Balsamum acet. camphorat, II. 443.
— acusticum, 98. 168.
— adstringens, II. 668.
— Aegyptiacum, 320.
— aegyptiac., 326.
— aethereum, II. 639.
— album 326
— Amyrid. Gilead., 326.
— anodynum, II. 271. 443.
— Bate s. II. 271.
— antiarthriticum, II. 443.
— antihystericum, 108.
— antiodontalg., II. 286.
— apoplecticum, II. 527.
— Apparitii, 800.
— Arcaei, II. 656.
— aromaticum, 170. 179. 451. II. 507.
— — aethereum, 450.
— — liquidum, II. 657.
Balsamum arthriticum, II. 271.
— ad aures, 98. 168. 323. 669.
— Auri, 319.
— Basvillianum, II. 670.
— e Benzoë, 341.
— Brasiliense, 321.
— Cahirense, 326.
— Calaba, II. 643.
— Canadense, 1.
— Cancamum, 656.
— ad cancrum, II. 287.
— Carpathicum, 321.
— catholicum, 341.
— c. Spiritu Vini, 798.
— ex Vino, 797.
— cephalicum Saxonic., II. 507.
— chalybeatum, 689.
— Chironis, II. 660.
— Cinnamomi, 408.
— Commendatoris, 341. 342
— de Condom, II. 230.
— Constantinopolit., 326.
— Copaibae, 321.
— Copaivae, 321.
— — reductum, 325.
— ad dentitionem, 141.
— Embryonum, II. 533.
— Feuilleti, 629.
— Fioravanti, II. 59. 663.
— — nigrum, II. 664.
— — oleosum, II. 663.
— — spirituosum, II. 664.
— Focot, II. 642.
— Fourcroyi, II. 673.
— Frahmii, II. 655.
— Friari, 341.
— Genovevae, II. 659
— Gileadense, 326.
— — factitium, 346. II. 653.
— Goulardi, II. 367
— Guajaci, 756.
— — saponaceum, 756.
— guajacinum, 752.
— Hoffmanni, 408.
— Hungaricum, 321.
— Hyperici comp., 800.
— — simplex, 798.
— Indicum, 326.
— — album, 326.
— — nigrum, 326.
— — siccum, 326.
— Innocentianum, 797. 798.
— ischaematicum, II. 668.
— Italicum, II. 658.
— — rubrum, II. 658.
— Judaicum, 320.
— Laricis nativum, II. 652.
— Lavandulae, II. 62.
— Lectorense, II. 230.
— de Lectour, II. 230.
— Liboschitzii, 427.
— Liquiritiae, II. 277.
— Locatelli, II. 655.
— ad loricand. cadaver, II. 629
— Majoranae, II. 312.
— Mariae, II. 643.
— Marrubii, Ford's, II. 270.
— de Mecca, 326.
— Meccaense, 326.
— Maccanense, 326.
— de Mecha, 326.
— Mellis III iii, 330. II. 287.
— — pectorale, 331.
— mercuriale, II. 153. 204.
— — Plenkii, II. 134.
— Myroxyli peruif., 326.
— Myrrhae, II. 247.
— narcoticum, II. 668.
— nativum, II. 652.
— nervinum, II. 527.
— Nucistae, II. 233.
— — expressum, II. 232.
— Oleae s. Olivae, II. 251.
— ophthalmicum, II. 153. 510.
Balsamum opthalmicum citrin. s. flavum, II. 152.
— — rubrum, II. 151.
— Yveanum, II. 153.
— — St Yves, II. 153.
— Opodeldoc, 167.
— orientale, 326.
— palustre, II. 117.
— pectorale, II. 660.
— Persicum, 341.
— ad s. contra perniones, II. 669.
— Peruvianum, 326.
— — album, 326.
— — factitium, 332.
— — nigrum, 326.
— — reductum, 326.
— — siccum 326.
— Pini Laricis, II. 652.
— — liquidum, II. 652.
— — sylvestris, II. 652.
— — — nativum, II. 652.
— — exsiccatum, II. 671.
— pleureticum, 615.
— Plumbi, II. 358.
— polychrestum, 752.
— Populi, II. 642.
— Rackasira, 329.
— Rakasira s. Rakasiri, 329.
— resolvens, 328.
— Rulandi, II. 638
— Rutae, II. 520.
— de Salazar, 114.
— Samaritanum, II. 713
— saponaceum, II. 442.
— — comp., II. 442.
— — terebinthinat, II. 669.
— — Saponis, 167. II. 442. 670
— — comp., II. 442.
— Saturni, II. 358. 359. 367.
— — Goulardi, II. 358. 365.
— — liquidum, II. 358.
— saturninum, II. 362.
— Schauerianum, II. 665.
— Scherzeri, II. 507.
— somniferum II. 271.
— stomachicum, II. 527.
— Styracis, II. 620.
— — officinalis, II. 620.
— — Benzoini, 339.
— Succini, II. 444 632.
— Sulphuris, II. 638.
— — anisatum, II. 638.
— — Barbadense, II. 333.
— — Rulandi, II. 638.
— — simplex, II. 638.
— — succinatum, II. 638.
— — terebinthinat., II. 639
— Syriacum, 326.
— Terebinthinae II. 670.
— — vulgare II 675.
— terebinthinatum, II. 657.
— thebaicum, II. 271.
— Thibaut's, II. 657.
— St. Thomae, II. 643.
— de Tolu, 329.
— Toluiferae Balsami, 329.
— Tolutanum, 329.
— tranquillans, 794.
— tranquillum, 794.
— traumaticum, 341.
— universale, II. 302.
— verum, 326
— Vervaini, 341.
— de Vinceguère, II. 230.
— viride 628. 629. II. 613. 661
— — Metensium, 629.
— Vitae, 119. 478. II. 238.
— — album, II. 665.
— — externum, II. 669.
— — Hoffmanni, 408. II. 509.
— — de Lelièvre, 126.
— — Rulandi, II. 639.

d by Google

Balsamum vulnerarium, 341. II. 657. 663.
— — commune, II. 652.
— — Burrhus, 342.
— — minerale Dippelii, 704.
— de St. Yves, II. 153.
— — vegetabile, II. 217.
Balsamus v. Balsamum.
Bamia moschata, 1.
Banilla, II. 707.
Baptisecula. 633.
Barba Aronis. 295.
— caprina, II. 621.
— Hirci, II. 691.
Barbarea, 659.
— praecox, 660.
Barbula caprina, II. 621.
Bardana. 332.
— minor, II. 719.
Barilla, II. 608.
Barium, 333.
Barotes salitus, 333.
Baryosma Tonga. 666.
Baryta, 335.
— acetica, 337.
— carbonata, 336.
— carbonica, 336.
— fusa, 335.
— muriatica, 333.
— nitrica, 337.
— pura liquida, 335.
— sulphurica nativa 336.
Barytes, 333. 336.
— salitus. 333.
Basilicum 338.
— citratum, 338.
— majus, 338.
— minimum 338.
Batrachites, 386.
Baume's vulneraire, II. 653.
Bdellium, 338.
Beccabunga, II. 710.
Becetta, II. 49.
Bechium, 666.
Bedeguar, 338.
Been, II. 221.
Behen, 339. II. 221.
— album, 339.
— nostras, 339.
— rubrum, 339.
Belladonna, 312.
Belliculus marinus, 380.
Bellis, 339.
— hortensis, 339.
— major, 542.
— minor, 339.
— perennis, 339.
— pratensis, 542.
Belzoinum, 339.
Ben, II. 221.
Benedicta sylvestris, 742.
Benzoas Ammoniae, 193.
Benzoë, 339.
— amygdaloides, 340.
— in sortis, 340.
Benzoin, 339.
Benzoinum, 339.
— Gummi, 339.
Berberes, 346.
Berberis, 346.
— vulgaris, 346.
Bergamottae Oleum, 558.
Beta, 347.
— Cycla, 347.
— rubra, 347.
— vulgaris, 347.
Betel, 347.
Betonica, 347.
— aquatica, II. 573.
— officinalis. 347.
— Pauli, II. 711.
— purpurea, 347.
Betula, 348. 349.
Betula alba, 349.
— Alnus, 348. 349.
Bezetta rubra, 446.
— coerulea, II. 49.
Bezoar, 392.
— Coromandelianus, 392.
— hystricum, 392.
— occidentalis, 392.
— orientalis, 392.
Bezoarticum animale, 719.
— Curbi complet., II. 573.
— — incomplet., II. 573.
— — purgans, II. 573.
— joviale, II. 624.
— martiale, 230.
— minerale 229.
Biboras Sodae. II. 611.
Bicarbonas kalicus c. Aqua, II. 405.
— natricus c. Aqua, II. 610.
— Potassae, II. 405.
— Protoxydi Ferri, 684.
— Sodae, II. 610.
Bichloretum Hydrargyri, II. 181.
— — venale, II. 181.
— Mercurii, II. 181.
Bichloruretum Calcis. 377.
— — Mercurii, II. 181.
Bidens, 349.
— cernua. 349.
— tripartita, 65.
Bilis bovina, 667.
Bina, II. 98.
Bioxalas s. Bioxalas Potassae, II. 425.
— kalicus c. Aqua, II. 425.
Bislingua, II. 518.
Bismalva, 129.
Bismuthi Subnitras, 350.
Bismuthum, 349.
— nitricum, 350.
— — praecipit., 350.
— oxydulat. album, 350.
— subnitricum, 350.
Bistorta, 351.
Bisulphas Cupri, 620.
— kalicus, II. 409.
— Potassae, II. 409.
Bisulphuretum Ferri, 674.
— Hydrargyri, II. 156.
— Stanni. II. 624.
Bitartras kalicus c. Aqua crudus, II. 429.
— — — — depuratus, II. 429.
— Potassae, II. 429.
Bitumen Asphaltum, II. 332.
— Judaicum. 309.
— Petroleum, II. 332. 333.
Bixa Orellana, II. 312.
Blatta byzantina, 379.
Blattaria, II. 709.
Blechnum lignifolium, II. 573.
Boetica sylvestris, II. 241.
Boletus. 351.
— cervinus. 352.
— fomentarius, 85.
— igniarius, 85.
— Laricis, 85.
— purgans, 85.
— Salicis, 351.
Boli adstringentes, 145. 325. 468. 679. II. 13. 469. 475.
— alterantes, 749. II. 165.
— amari. 735.
— anodyni, II. 286.
— anthelmintici. 553.
— — et antispasmod., II. 170.
— anthelmintico-laxantes, II. 179.
Boli anthelmintico nervini, II. 63.
— — tonici, 782. II. 163.
— antiarthritici, II. 667.
— antiasthmatici, II. 636.
— anticatarrhales, II. 223.
— antichlorot. emmenag. incit, 677.
— — — tonici, 672.
— anticonvulsivi, 351.
— antidysenterici, II. 13.
— antifebriles, 539. 555.
— antigonorrhoici, 325. II. 661.
— antihaemorrhoidales, II. 636.
— antihysterici, 299.
— antilactosi, II. 422.
— antipsorici, II. 636.
— antiscorbutici. 515.
— antiscrophulosi, 439.
— antispasmodici, 391. 682. II. 226. 287. 724.
— — et anticonvuls., 299.
— antisyphilitici, 317.
— — resolventes, II. 146.
— — stomachici, II. 145.
— antivenerei, II. 145.
— aromatici, II. 231.
— c. Camph. et Nitro, 394.
— camphorati, 394.
— — cum Kermete, 395.
— cardiaci, 600.
— carminativi, 221.
— cathartici, II. 25.
— chalybeati, 682.
— Chinae, 505.
— — aromatisati, 505.
— — opiati, 505.
— — — et aromatici, 505.
— — et Rhei, 506.
— cinnabarini, II. 158.
— coerulei, II. 130.
— contrastimulantes, 38. 40.
— in cystitide lenta, II. 636.
— deprimentes, II. 223.
— — ac nauseantes, 648.
— — cinnabarini, II. 158.
— — resolventes, 648.
— diaphoretici, 232. II. 158. 258. 636.
— — nauseantes, 243.
— — sedantes, II. 724.
— ad diarrhoeam, II. 277. 457.
— digestivi, II. 13.
— de Digitale, 647.
— Digitalis, 647.
— diuretici et antispasmod., 618.
— drastici, 772. II. 165.
— emetici, II. 198.
— emmenagogi, II. 39. 101. 164.
— — irritantes. 106. 121.
— — resolventes, 390. II. 9.
— ad epilepticos, II. 700.
— excitantes, 391. II. 453.
— febrifugi, 506. 515. 539. 6[illegible] II. 315. 739.
— e Ferro comp., 677.
— ferruginosi, 677. 696.
— ad haematuriam, 479.
— hydragogi. II. 25.
— ex Hydrargyro, II. 201.
— — — oxydato rubro, II. 151.
— incit., diaphoret. et expector., 243.
— — emmenagogi, 539. 677.
— — stomachici, 677. 707.
— kermetico-ammoniacales, 243.
— lac pellentes, II. 422.
— laxantes Chaussieri. II. 178.
— lenientes, II. 223. 224.
— lithontriptici, II. 439.

Boli Magnesiae crocat., II. 93.
— martiales emmenag., 672 677.
— Martis, 702.
— mercuriales, II. 131. 201.
— e Mercurio glycyrrhiz., II. 130.
— — — dulci, II. 163.
— e Muriate Hydrargyri, II. 163.
— Myrrhae, II. 236.
— narcotici, 791.
— e Narcotina. 242.
— in necrosi syphilitica, II. 145
— nervini, 299. 458.
— ad oedema pulmonum, II. 591.
— — paralysin, II. 600.
— pectorales, II. 691.
— — adstringentes, II. 691.
— in pertussi, II. 154.
— in ptyalismo mercuriali, II. 398.
— purgantes, II. 25. 171. 175. 475. 589.
— — irritantes, 772.
— — et tonici, II. 171.
— in quartana, 506.
— Ratanhiae, II. 469.
— resolventes, 127. II. 25. 146.
— — et antisyphilit., II 146.
— — deprimentes, II. 8.
— — diaphoretici, 243.
— — et incitantes. II. 169.
— — et purgantes, II. 475.
— e Rheo, II. 474.
— — sedativi, II. 475.
— roborantes, 325.
— e Roremarino, 672.
— rubri, II. 158.
— ex Sabina, II. 164.
— ad salivationem, II. 398.
— saponacei, II 438.
— Scammonii comp., II 179.
— scillitici, II. 501.
— sedativi, 27. II. 285.
— e Spongia, 439.
— e Stanno, II. 623.
— stibiati. 236.
— stimulantes, II. 600.
— — et tonici, 283.
— stomachici, 126. 485. 610 672 677. 682. 707. II. 639.
— contra strumas, 439.
— Sulphureti Mercurii, II. 158.
— Sulphuris, II. 636.
— — comp., II. 636.
— Tartari chalyb., 707.
— temperantes, 394.
— tonici, 506. 515.
— — adstring. balsamici, 733
— — sedativi c. Muriate Barytae, 335.
— tonico-antiseptici, 299.
— — diaphoretici, 394.
— ad tussim, II. 417.
— e Valerianа. II. 700.
— vermifugi, 311. 782. II. 178. 180. 623.
— — diaphoretici,
— — Storeyi. II. 158.
— vias urinarias excitantes, 325
— vomitivi, II. 14.
Boli laevigatio, 142.
Bolus alba, 142.
— Armena s. Armenia, 141.
— candida. 379.
— orientalis, 141.
— rubra, 141.
Bolus rubra artificial, 142.
Bombax, 743.
Bombyx Mori, II. 597.
Bonifacia, II. 518.
Bonplandia trifoliata, 219.
Bonus Henricus, 496.
Borago, 352.
— officinalis, 352.
Boras Hydrargyri, II. 196.
— Mercurii, II. 196.
— natricus cum Aqua, II. 611.
— Sodae, II. 611
— — alcalescens, II. 611.
— — alcalinum, II. 611.
— — alcalinus, II. 611.
— — c. baseos excessu, II. 611.
— — saturatus, II. 611.
— — supersaturatus, II. 611.
— supersodicus, II. 611.
Borassus flabelliformis. 338.
Borax, II. 611.
— crudus s. cruda, II. 611.
— natricus c. Aqua, II. 611.
— officinalis, II. 611.
— pura, II. 611.
— rathnata, II. 611.
— Sodae purificatus, II. 611.
— supersodicus, II. 611.
— tartarisatus. II. 434.
— Venetus s. Veneta, II. 611.
Borrago s. Borago.
Borussias Ferri, 707.
— Hydrargyri, II. 195.
— Potass. et Oxyduli Ferri, 40.
Bos Taurus v. Lac vacc., Fel Tauri.
Boswellia glabra, II. 255.
— serrata, II. 255.
— thurifera — Olibanum.
Botrychium Lunaria, II. 87.
Botrys, 496.
— ambrosioides, 496.
— Mexicana, 495.
Botrytis, II. 722.
Bovista. 353.
Bowdichia virgilioides, 96.
Branca ursina, 15. 353.
Brandy shrub, 96.
Brassica, 354.
— capitata alba, 354.
— — rubra, 354.
— Eruca, 354.
— marina, II. 619.
— Napus, 354.
— oleracea, 354.
— oleifera, 355.
— Rapa sativa, 355.
— rubra, 354.
Brodium v. Jus, Jusculum.
— depurativum II. 616.
— diureticum, II 571.
— purgans, II 616.
— Rosarum. II. 495.
Bromina, 355.
Bromum, 355.
Bromuretum Potassii et Sodii, 355.
Brontias, 385.
Brucea ferruginea, 219.
Brucia, 219. 355
Brucina, 219. 355.
Brucinum, 219. 355.
Brucium, 219. 355.
Brunella. II. 447.
Bruscus, II. 518.
Bryonia, 356.
— alba. 356.
— dioica, 356.
— nigra, II. 647.
Bubon, 357.
— Copticum, 155.
— Galbanum, 357.
— gummiferum. 358.
— Macedonicum, 357.
Buccu, 366.
Bulones exsiccati, 720.
Bulonites, 386.
Buglossum, 205.
— latifolium, 352.
— urbanum, 352.
— verum, 352.
Bugula, 88.
Bulbulus Thrasus, 657.
Bunias, 354.
Buphthalmum, 366.
Bupleurum rotundifolium, II. 330.
— perfoliatum, II. 330.
Bursa pastoris, II 683.
Bursera gummifera, 366. II. 46.
Butua, 656.
Butyrum, II. 48.
— Amygdal. dulcium, 194.
— Antimonii, 250.
— Cacao, 368.
— Cerae, 267.
— insulsum, II. 48.
— Majoranae II. 312.
— Nucistae, II. 232.
— c. Oxydo Merc. rubro, II. 151.
— purificatum, II. 48.
— Rutae, II. 520.
— Saturni, II. 362.
— Stanni, II. 625.
— Stibii, 250.
— Zinci, II. 722.
Buxus, 366. 367.
— sempervirens, 367.

C.

Cabbagum, 740.
Cacao, 367.
— Antillanum, 367.
— Caraccense, 367.
— Maragnan, 367.
— praeparata, 367.
— tabulata, 367.
Cachen Laguen, 661.
Cachinlagua, 661.
Cachou à la canelle à la reglisse, à la violette 469.
— à l'ambre gris, à la fleur d'oranges, musqué, 469.
Cactus coccinellifer, 578.
— cochenillifer, 578.
— Opuntia, II. 310.
— Tuna, 578.
Cadmia, II. 722.
— factitia, II. 722.
— fornacum, II. 722.
— fossilis, II. 722.
— praeparata, II. 722.
Cadmium, II. 45.
Caeruleum Berolinense, 707.
— Borussicum, 707.
— montanum, 619.
Caesalpinia echinata, II. 72.
Caffeinum, 585.
Cahuchu, II. 307.
Cajeputi Oleum, 369.
Cakes, worm c. Boli vermif.
Calaba, II 643.
Caladium. 05.
Calaguala, 310.
Calamina, II. 722.
— praeparata, II. 723.
Calamintha, II. 111.
— agrestis, II. 111.
— aquatica, II. 117.

Digitized by Google

Calamintha humilior, 774.
— montana, II. 111.
— Puleg i odore, II. 111.
— vulgaris, II, 111.
Calamita, II. 627.
Calamites vera, II. 627.
Calamus, 369.
— aromaticus, 370.
— Asiaticus, 370.
— Draco, II. 640.
— Indicus, 370.
— odoratus, 370.
— Rotang, II. 540.
— Sancti, 370.
— verus, 370.
— vulgaris, 370.
Calcareus lactiformis, 379.
Calcaria carbonica, 378.
— chlorinica, 377.
— iodica, II. 8.
— iodinica, II. 8.
— muriatica, 389.
— oxyphosphorica, 388.
— phosphorica, 386.
— pura, 373.
— — liquida, 374.
— sulphurata, 370.
— — liquida, 377.
— sulphurato-stibiata, 249.
— sulphurica, 388.
— usta, 373.
Calcis Phosphas v. Phosphas C.
— — praecipitatus, 387.
Calcitrapa, 373.
— stellata, 373.
Calcitrippa, 643.
Calcium, 373.
— sulphuratum, 376.
Calculi, 392.
Calculus cysticus bovinus, 392.
Calendula, 392.
— alpina, 282.
— arvensis, 392.
— officinalis, 392.
Calendulae minerales, 691.
Calendulinum, 393.
Cali v. Kali.
Callicocca Ipecacuanha, II. 12.
Calluna vulgaris, 658.
— herbacea et purpurascens, 658.
Calmontana, II. 111.
Calombo, 593.
Calomel, II. 159. 160.
Calomelanos, II. 159.
Calomelas, II. 159.
— ferruginosus, II. 171.
— praecipitatus, II. 159.
Calophyllum Calaba, II. 643.
— Inophyllum, II. 642.
Calotropis Mudarii, II. 230.
Caltha alpina, 282.
— sativa, 392.
Calumba, 594.
Calx, 373.
— acetata, 390.
— Antimonii, 228. 229.
— — elota, 229.
— — Hoffmannii, 249.
— — nitrata, 249. 234.
— — Nitratis, 229.
— — sulphurata, 249.
— — e Sulphure, 249.
— Arsenici alba, 287.
— Bismuthi, 350.
— e Cali puro, II. 392.
— citrata, 391.
— Cupri viridis, 619.
— extincta, 373.
— Hydrarg. alba, II. 206.
— — rubra, II. 149.
— Mercurii, II. 201.
— — cinerea, II. 190.
— — vitriolata, II. 197.
Calx muriat. Bergmanni, 389.
— oxymuriatica, 377.
— phosphorata, 370.
— Plumbi alba, II. 454.
— recens usta, 373.
— salita, 389.
— Stibii e Sulphure, 249.
— sulphurata antimoniata, 249.
— sulphurica, 388.
— — compacta, 389.
— usta, 373.
— Vismuthi, 350.
— viva, 373.
— Zinci, II. 723.
Calyculi Glandium Quercus, II. 458.
Calyptranthes Caryophyll., 403.
Calystegia Soldanella, II. 619.
Cambodium, 772.
Cambogia Gutta, 772.
Cambogium, 772.
Camelus Lama, 392.
Cammarum, 65.
Camphora, 393.
— artificialis, II. 668.
— liquida, 393.
Camphorata, 402.
Camphorosma, 402.
— Monspeliaca, 402.
Canarium balsamiferum, II. 255.
Cancamum, 656. 766.
Cancer Astacus, 381.
— Pagurus, 381.
Cancri Herba, II. 683.
Cancrorum Lapides s. Lapilli s. Oculi, 381.
— Chelae, 380.
Candelae cereae, II. 371.
— chirurgicae, II. 362.
— fumales, 344.
— mercuriales, II. 178.
— mitigantes, II. 362.
— probatoriae, II. 137 373. 445.
— resolventes, II. 362.
— saturninae, II. 373.
Canella, 402.
— alba, 402.
— Caryophyllata, 403.
— Cubana, 403.
— Malabarica, 403.
— Zeylanica, 403.
Canellinum, 402.
Canis Vulpes, 719.
Cannabina aquatica, 662.
Cannabis, 422.
— Jeea, 422.
— sativa, 422.
Cantharides, 422.
Cantharidinum, 423.
Cantharis vesicatoria, 422.
— vittata, 422.
Capillaire, syrop., 560.
Capillus Veneris, 70.
— — Canadensis, 70.
Capitulum Martis, 659.
Capparis, 435.
— spinosa, 435.
Capra Aegagrus, 392.
— Ibex, sanguis, 721.
Caprifolium, 436.
Capsicinum, II. 342.
Capsicum annuum, II. 342.
— frutescens, II. 342.
Capsina, II. 342.
Capsinum, II. 342.
Caput mortuum Vitrioli, 678.
Carabus ferrugineus, 578.
Caragna, 436.
— foetida, 436.
Caranna, 436.
Caraway cordial, 448.
Carbo, 436.
Carbo animalis, 437.
— Ligni, 436.
— Pilae marinae, 437.
— praeparatus, 436.
— purus, 436.
— Spongiae, 437.
— — marinae, 437.
— de Spongiis lotis aut illotis, 437.
— e vegetabilibus, 436.
— vegetabilis, 436.
— — praeparatus, 436.
Carbonas ammoniacalis, 171.
— Ammoniaci, 170 171.
— — alcalin. liq., 172.
— — — pyro-oleos. solut., 174.
— — — solut., 172.
— — alcalinulus, 171.
— — Cornu Cervi cryst., 173.
— — — liquidus, 174.
— — crystallisatus, 171.
— — liquidus, 172.
— — Lumbricor. cryst., 173.
— — pyro-oleosus, 173.
— — liquid., 174.
— — Viperar. cryst., 173.
— Ammoniae, 170.
— — alcalinus, 170. 171.
— — — liq., 172.
— — — solidum, 171.
— — — solutus, 172.
— — — pyro-anim., 173.
— — — pyro-oleos., 174.
— — — pyro-vinos. solut., 174.
— — crystallisatus, 173.
— — incompletus, 170.
— — pyro-animalis, 173.
— — — fuscus, 174.
— — — liquidum, 174.
— — — oleosus, 173.
— — — liquidus, 174.
— — solidus, 171.
— ammonicus crudus, 173.
— — admixto oleo empyreum. anim. v. Ammon carb. pyro-oleos.
— — depurat. solidus s. crystall., 171.
— Barytae, 333 336.
— barytico, 430.
— calcareus, 378.
— calcicus bituminat., 379.
— Calcis 378.
— — nativum, 378.
— — nativus pulverulent., 378.
— — praecipitat., 381.
— Deutoxydi Potassii, II. 405.
— Ferri, 680.
— — oxydati, 680.
— — praecipitatus, 680.
— — praeparatus, 680.
— Hydrargyri, II. 190.
— kalicus e Cinerib. clavellatis, II. 399.
— — crudus, II. 398.
— — e Lixivio cinereo II. 398.
— — e Tartaro, II. 399.
— Lixiviae alcalinus, II. 398.
— — — solutus, II. 401.
— Magnesiae, II. 90.
— — purus, II. 90.
— magnesicum, II. 90.
— magnesicus c. Aqua, II. 90.
— — — etHydrate magnesico, II. 90.
— — — — — venalis, II. 90.

Digitized by Google

Carbonas magnesicus c. Aqua venalis, II. 90.
— Mercurii, II. 106.
— natricus, II. 608 610.
— — c. Aqua crudus, II. 608.
— — — venalis, II. 608.
— — depuratus, 609.
— — — siccat., II. 609.
— — impurus, II. 608.
— — venalis, II. 608.
— Oxydi Zinci, II. 722.
— Plumbi, II. 354.
— — albus, II. 354.
— — — praeparatus, II. 354.
— plumbicum, II. 354.
— plumbicus, II. 354.
— Potassae, II. 399. 405.
— — Absinthii, II. 400.
— — alcalescens liq., II. 401.
— — alcalinum s. alcalinus, II. 398.
— — Cardui, Centaurii, Ligni Junip., Ononid., Tamarisci etc. II. 400.
— — completum, II. 405.
— — et Ferri liq., 681.
— — et Ammoniaci, II. 406.
— — depuratus, II. 398.
— — impurus, II. 398.
— — neuter, II. 405.
— — purus, II. 398.
— — purissimus, II. 399. 405.
— — e Tartari Crystallis, II. 399.
— — venale s. venalis, II. 398.
— Protoxydi Potassii, II. 405.
— — — et Ammoniaci, II. 406.
— Sodae. II. 608. 610.
— — alcalin., II. 608.
— — communis, II. 608.
— — completum s. completus, II. 610.
— — crystallisatus, II. 610.
— — impurus, II. 608.
— — incompletus, II. 608.
— — neuter, II. 610.
— — siccat, II. 608.
— — venale s. venalis, II. 608.
— Sodii Protoxydi, II. 610.
— superammonicus, 170.
— — aquosus, 172.
— — pyro-oleosus, 173.
— — — aquosus, 174.
— superpotassicus depuratus, II. 398.
— — purus, II. 398.
— Zinci, II. 723.
— — aluminosus, II. 722.
— — impura, II. 722.
— — impurus, II. 722.
— — Oxydi II. 722.
— — praeparatus, II. 723.
— zincicus terrestris. II. 722.
Carbonis Pulvis acidulus, 438.
Carbunculus, 141.
Carburetum Ferri, 673.
— — nativum, 673.
— Iodii, II. 11.
— Sulphuris, II. 634.
Cardamine, II. 244.
— pratensis, II. 244.
Cardamomum, 440.
— Javanicum, 441.
— longum, 441.
— majus, 441.
— Malabaricum, 440.
— maximum, 745.
Cardamomum medium, 441.
— minus, 440.
— rotundum, 441.
Cardamus major, II. 213.
Cardiaca, 442.
Cardopatia, 446.
Cardopatium, 446.
Carduus, 442.
— benedictus, 442.
— lacteus, 443.
— Mariae, 443.
— Marianus, 442.
— sanctus, 442.
— stellatus, 373.
— tomentosus, 442.
— Veneris, 653.
— volutans aculeatus, 659.
Carex arenaria, 445.
Carica, 445.
— pinguis, 445.
Carlina, 446.
— acaulis, 446.
— humilis, 446.
— vulgaris, 446.
Carminative, Dalby's, II. 91. 267.
Carminum, 579.
Caro Testudinum, 719.
— Viperae, 719.
— Vulpis, 719.
Caroba, 479.
Carpionum Lapides, 380.
Carpobalsamum, 204.
Carthamita, 446.
Carthamus, 446.
— lanatus, 446.
— sativus, 446.
— tinctorius, 446.
Carum, 447.
— Carvi, 446. 447.
Carvum, 446. 447.
Caryocostinum, II. 557.
Caryophyllata, 403. 742.
— aquatica, 742.
Caryophylli, 448.
— aromatici. 448.
Caryophyllinum, 449.
Caryophylloides, 615.
Caryophyllus, 448.
— aromaticus, 448.
— pratensis, 645.
— ruber, 645.
Cascarilla, 451.
Caseum s. Caseus, II. 48.
Cassamunar, 457.
Cassia, 403. 454.
— acutifolia, II. 577.
— Alexandrina, II. 577.
— Brasiliensis, 454.
— Caryophyllata. 403.
— cinnamomea, 403.
— elongata, II. 577.
— pro clysteribus, 454.
— cocta, 455.
— Fistula, 454.
— fistularis, 454.
— Javanica, 454.
— lanceolata, II. 577.
— lignea, 403.
— cum Manna, II. 103.
— Marylandica, 454.
— mollis, 454.
— obovata, II. 577.
— obtusata, II. 577.
— officinalis, 577.
— potabilis, 457.
— Senna, II. 557.
Cassine Peragua, II. 1.
Cassumuniar, 457.
Cassuvium, 204
— occidentale, 457.
Castanea equina, 72.
— pumila, 457.
— Vesca, 457.
Castaneae, 457.
Castilla elastica, II. 470.
Castor Fiber, 458.
Castoreum, 457.
— Anglicum, 458.
— Canadense, 458.
— Novae Angliae, 458.
— Moscoviticum, 458.
— Rossicum, 458.
— Sibiricum. 458.
Castorinum, 458.
Castrangula, II. 573.
Catalpa, 466.
— arborea, 466.
Cataplasma Acetat. Plumbi, II. 361.
— acetatum, 21 II. 321.
— acre Kerndlii, 98.
— adstringens, 679. 689. II. 459.
— Althaeae, 137.
— — Radicis emolliens, 137.
— albuminosum s. Albuminis, II. 315.
— aluminosum, II. 315.
— Amyli, 203.
— ammoniacale, 178.
— anodynum, 611. 790. 792. II. 261. 278. 325.
— anthelminticum, 108.
— anticancrosum, 288.
— antiophthalmicum, 611.
— antipleureticum, II. 346.
— antisepticum, 13. 438. 507. II. 459. 520.
— — e Camphora, II. 459.
— — Reussii, 507.
— antispasmodicum, II. 286.
— Aquae marinae, 390.
— aromaticum, II. 112.
— ad blennorrhagiam, 202.
— ex Bryonia, 545.
— ad cancrum, 545. II. 261.
— Cantharidum, 429.
— Carbonis Ligni, 438.
— Cicutae, 545.
— — compos., 545.
— c. Concinno, II. 459.
— — et Camphora, II. 459.
— Conii, 545.
— e Conio s. C. macul. ammoniat., 545.
— Crustae Panis acetosum, 21.
— Dauci, 642.
— e Dauco, 545.
— desiccativum, II. 713.
— discutiens. 315. 485. 701.
— domesticum — C. emolliens.
— effervescens, 669.
— emolliens, 137. 202. 611. II. 100. 321.
— —, Species pro, 129.
— epispasticum, II. 601.
— excitans, 184.
— — et maturans, 358.
— — resolv., II. 713.
— exsiccans, II. 713.
— Farinae Hordei, 785.
— farinaceum, 785.
— Far. Lini emoll., II. 77.
— fermentans, 669.
— Fermenti, 669.
— — Panis theriac., II. 302.
— Goulardi, II. 361.
— iodurstum, II. 740.
— irritans, II. 601.
— ad ischias, 376.
— contra ischuriam, 98.
— Lini c. Galbano, 98.
— maturans, 16. 98. 358. 485. 669. II. 439.
— Medullae Panis, 137. II. 321.
— — — c. Cicuta, 545
— de Mica Panis, II. 321.

Cataplasma Micae Panis anod., 611
— narcoticum, 790. 792.
— Nicotianae, II. 238.
— Nidi Hirundinis, 611.
— c. Opio, II. 278.
— Panis, II. 321.
— —, Lactis et Malvae, II. 321.
— e Panis Medulla, II. 321.
— Papav. et Hyosc. comp. 792.
— pomaceum, 611.
— Pradierii, 326.
— pus maturans, II. 439.
— repercutiens, II. 361.
— resolvens, 98. 138. 483. 485. 669. 761. II. 361. 439.
— — ad scirrhos, 545.
— roborans, 707.
— rubefaciens, II. 346.
— saponaceum, II. 439.
— saturninum, II. 361.
— sedans, II. 266.
— sedativum, 611. II. 266.
— simplex, 786.
— Sinapeos, II. 601.
— sinapinum, acre, II. 601.
— — mite, II. 601.
— Sinapis, II. 601.
— — discutiens, II. 601.
— — comp., II. 602.
— ad singultum, II. 302.
— stypticum, 689.
— suppurativum, II. 677.
— theriacale, II. 302.
— virosum, 790.
— vomitivum, II. 248.
Catapotia ad catarrhos, II. 288.
Cataputia, 466.
— minor, 466.
Cataria, 466. 467.
Catechu, 467.
— depuratum, 467.
Catelli, 719.
Cathartina, II. 577.
Cathartinum, II. 577.
Cathartocarpus Fistula, 454.
Catholicum dupl., II. 583.
Caules Angelicae canditae, 212. v. Stipites.
Cauda equina, 658.
— — minor, 658.
Causticum alcalinum, II. 391.
— ammoniacale, 164.
— antimoniale, 250.
— arsenicale, 287.
— commune, II. 391.
— — fortius, II. 391. 392.
— — mitius, II. 392. 393.
— — c. Opio, II. 393.
— lunare, 277.
— potentiale, II. 391.
— salinum, II. 391.
— vegetabile, II. 390.
Cauterium potentiale, II. 391. 393.
Ceanothus, 473.
— Americana, 473.
Cedrin, II. 347.
Cedronella, II. 111.
Cendre bleue, 619.
— verte, 619.
Centaurea Behen, 339.
— benedicta, 442.
— Calcitrapa, 373.
Centaurium, 473.
— Cyanus, 633.
— Jacea, II. 22.
— febrifuga, 473.
— lanata, 426.
Centaureum minus et majus, 473.
Centaurium, 473.
— majus, 473.
Centaurium minus, 473.
— officinale, 473.
Centinodia, 476.
Centummorbia, II. 90.
Centumnodia, 476.
Cepa — Allium Cepa.
Cephaëlis Ipecacuanha, II. 12.
Cera, 265.
— alba, 265.
— — in massis et in offis, 266.
— arborea, II. 673. 674.
— citrina, 265.
— cruda, 265.
— depurata, 265.
— flava, 265.
— — purificata, 266.
— inaurata, 629.
— ad labia, 481.
— purificata, 265.
— viridis, 629.
Ceramium aegagropilum, 781.
— albinum, 781.
— cancellatum, 781.
— catenatum, 781.
— forcipatum, 781.
— gracile, 781.
— Helminthochortos — Helmintoch
— incurvum, 781.
— scoparium, 781.
Cerasa acida, 477.
— nigra et rubra, 477.
Cerasi Gummi, 771.
Cerasus, 476.
— acidus, 476.
— Avium, 477.
— Lauro-Cerasus, 477.
— Mahaleb, 477.
— niger, 476.
— Padus, 476.
— racemosus sylvestris, 476.
— ruber acidus, 476.
— Virginiana, 477.
— vulgaris, 477.
Ceratia, 479.
Ceratonia, 479.
— Siliqua, 479.
Ceratum — Linim. simpl.
— Acetatis Plumbi, II. 368.
— — plumbici, II. 363.
— adhaesivum, II. 674.
— Aeruginis, 629.
— album, 479.
— — Ceti, 479.
— — simplex, 479.
— de Althaea, 138.
— ad ambusta, II. 726.
— Ammoniaci, 360.
— anodynum, II. 287.
— antipsoricum, II. 143.
— arsenicale, 289.
— Arsenici, 289.
— Axungiae, 267.
— Baumei, II. 111.
— Betonicae, 348.
— Calaminae, II. 725.
— calaminare, II. 725.
— camphoratum, 401.
— Cantharidis, 428. 432.
— Cantharidum s. c. Cantharide, 432.
— — camphorat., 433.
— Carbonat. Zinci impuri, II. 725.
— de Cerussa, II. 355.
— Cerussae, II. 355. 363.
— — comp., II. 384.
— Cetacei, 479.
— — album, 479.
— — rubrum, 481.
— Ceti, 479.
— c. China, 517.
— Chinae camphorat., 522.
Ceratum citrinum, II. 673. 674. 675. 676.
— coeruleum, II. 375.
— commune gummosum, 360.
— cosmeticum, 369. 480.
— detergens, II. 155.
— Diapalmae, II. 377.
— Diapompholigos, II. 726.
— emolliens, 98.
— epuloticum, II. 725.
— exploratorium, II. 438.
— exsiccans, II. 177. 364. 726. 13.
— — Kirklandi, II. 364.
— flavum, 268.
— fuscum, II. 374.
— Galbani crocatum, 362.
— Galeni, 267.
— Goulardi, II. 365. 367.
— Hufelandi, II. 720.
— Juniperi Virgin., II. 45.
— ad labia, 268. 481.
— labiale, 208. 369. 481. II. 256.
— — album, 479.
— — rubrum, 481.
— Lapidis calamin., II. 725. 728.
— Lithargyri, II. 363.
— — acetati, II. 365.
— Lithargyrii, II. 363.
— Lyttae, 432.
— Marshall's, II. 204.
— Meliloti simplex, II. 111.
— Mercantini, II. 353.
— mercuriale, II. 134. 135. 143. 151. 152.
— — Falckii, II. 155.
— Minii, II. 352.
— — gummoso-resinosum, II. 353.
— mundificans balsamic., 481.
— neutrale Kirklandi, II. 361.
— Nicotianae, II. 239.
— nigrum, II. 673. 674.
— Noricum, II. 381.
— Norimbergense, II. 381.
— oleo-resinosum, II. 672.
— ophthalmicum, II. 726.
— opiaceum, II. 261.
— opiatum, II. 282.
— Oxy-Carbonatis Zinci, II. 725.
— Oxydi Plumbi semivitrei, II. 372.
— — Merc. rubri per Acid. nitr., II. 153.
— Plumbi, II. 363.
— — Acetatis, II. 368.
— — comp., II. 363. 365.
— — Subacetat liquidi, II. 365.
— — Subcarbonat. comp. II. 384.
— — Superacetatis, II. 363.
— e Plumbo, II. 363.
— Pottii, II. 368.
— de Ranis c. Mercurio, II. 135.
— de Réchoux, 175.
— refrigerans Galeni, 267.
— Resinae, II. 673. 674. 675.
— — Burgundicae, 138.
— — flavae, II. 673. 675.
— — Pini, II. 673. 674.
— — — Burgund. resinos., II. 673.
— resinosum, II. 673. 677.
— — comp., II. 673. 677.
— rubrum, II. 159. 352.
— — camphorat., II. 353.
— Sabinae, II. 41.
— saponaceum, II. 368. 445.
— Saponis, II. 368. 444.
— Saturni, II. 362. 367.

Digitized by Google

Ceratum Saturni Goulardi, II. 363.
— saturninum, II. 367. 375.
— simplex, 267. 479.
— Spermatis Ceti, 479.
— Subacetate Plumbi medicat., II. 363.
— e Sulphure, II. 639.
— tabacinum, II. 249.
— Turneri, II. 725.
— viride, 629.
— Zinci Carbonatis impuri, II. 725.
— e Zinco, II. 725.
Ceraunius, 380.
Cerberus triceps, 232.
Cerefolium, 483.
— Hispanicum. 483.
Cerei medicati, II. 362.
Cereoli albi, II. 362.
— communes, II. 362.
— Bellii, II. 373.
— demulcentes, 269.
— elastici, II. 470.
— emollientes, 269.
— exploratorii, 269. II. 373.
— Falckii, II. 155.
— c. Kali caust., II. 393.
— medicati. II. 362.
— mercuriales, II. 137. 178 205.
— — dissolubiles, II. 192.
— mitigantes, II. 362.
— Plumbi Acetatis, II. 362.
— plumbici, II. 362.
— Saturni, II. 362.
— saturnini, II. 362.
— simplices, 269. II. 373. 445.
Cerevisia, 479.
— Absinthii, 8
— adstringens, II. 461.
— amara, 4.
— antihydropica, II. 32.
— antiicterica, II. 585.
— antiscorbutica, 3. 581. II. 464 575.
— antispasmodica, II. 704
— aperiens, II. 602.
— aperitiva, II. 602.
— Armoraciae, II. 464.
— aromatica, 414.
— cephalica, II. 704.
— Chinae, 528.
— Cochleariae, 581.
— Colocynthidis, 592.
— diuretica, II. 602
— ad hydropem, II. 32.
— martialis. 698.
— Pini comp., 3.
— — Turionum, II. 464.
— e Pini Turion. alba, II. 341.
— — — fusca, II. 341.
— prophylactica, 528. II. 743
— purgans, II. 32. 585.
— quercina, II. 461.
— sinapisata antichol., II. 744.
— stimulans, II. 602.
— stomachica, 736.
Cerinum, 669.
Ceromel, 265.
Cerussa, II. 354.
— acetata, II. 365.
— alba Hollandica, II. 354.
— — Norica, II. 354.
— Antimonii, 229.
— citrina, II. 352.
— in lamellis — C. alba
— nigra, 673.
— vera, II. 352.
Cerussae laevigatio, II. 354.
Cervaria alba — Gentiana alba.
— nigra, II 576.
Cervi cordis ossa, 387.
— priapus, 720.
Cervus Alces, 721.
Cervus Dama, 386.
— Elaphus, 386.
Cetaceum, 479.
Ceterach, 482.
— officinarum, 482.
Ceti auris, 387
— priapus, 720.
Cetinum, 479.
Cetraria Islandica, II. 66.
Cevadilla, II. 521.
Chacarilla, 451.
Chaerefolium, 483.
Chaerophyllum, 482. 483
— odoratum, 483.
— sativum, 482.
— sylvestre, 483.
Chalcantum album, II. 728.
Chalcitis, 678. 686.
Chalybs, 669.
— praeparatus, 670.
— — cum Aceto, 676.
— tartarisatus, 701.
Chamaeacte, II. 534.
Chamaeclema, 774.
Chamaecyparissus, II. 542.
Chamaedrys, II. 678.
— aquatica, II. 690.
— sylvestris, II. 711.
Chamaeleagnus, 715.
Chamaeleo album, 446.
Chamaemelum nobile, 486.
— Romanum, 485.
— vulgare, 484.
Chamaemorus, II. 513. 679.
Chamaepitys, II. 679.
— Monspeliaca. II. 679.
Chamaerops humilis, 338.
Chamomilla, 484.
— foetida. 485.
— nobilis, 485.
— Romana, 485.
— nostras, 484.
— vulgaris, 484.
Chanca lagua, 661.
Charta ad cauterium, 269. II. 655.
— cerata, 269.
— Curcumae, 632.
— explorat. coerulea, II. 50
— — lutea, 632.
— — rubefacta, II. 50.
— — rubra, II. 60
— Charta Laccae musci, II. 50.
— Rhabarbari, II. 485.
— vesicans, 630.
Cheiranthus Cheiri, 494
Cheiri, 494.
Chelae Cancrorum s. Cancri, 380.
— — praeparatae. 382.
Chelapa. II 23.
Chelidonium, 491.
— Glaucium, 495.
— majus, 491.
— minus, 494.
Chelonites, 385.
Chelsea pensioner, II. 637.
Chenevix's antimon. powder 231.
Chenopodium, 496.
— ambrosiacum, 495.
— ambrosioides, 495.
— anthelminticum, 496
— bonus Henricus, 496.
— Botrys, 490.
— Quinoa, 490.
— viride, 496
— Vulvaria, 496.
Chermes Grana. 497.
Chimaphila corymbosa, 499.
— umbellata, II. 455.
China, 499. 500.
— Carthaginensis, 501.
— China, 500.
China coronae, 500.
— flava, 501.
— fusca, 500.
— orientalis, 499.
— ponderosa, 499.
— regia, 501.
— rubra 501.
— vera, 499.
Chinachina, 500.
Chinina, 535.
Chininium, 535.
— sulphuricum, 536.
Chininum. 535.
— sulphuricum, 536.
Chinium, 535.
— sulphuricum, 536.
Chironia Centaurium, 473.
Chloras Calcis, 377
— Deutoxydi Potassii, II. 419.
— kalicus depurat., II. 419.
— — venalis, II. 419
— Potassae s. Potassii, II. 419
— Protoxydi Potassii, II. 419.
— Sodae, II. 606
Chloretum Auri c. Chloreto Natrii, 317.
— Barii c. Aqua, 333.
— Calcariae, 377.
— Calcii, 389.
— Ferri, 690.
— Hydrargyri, II. 159
— Natrii, II. 605. 606.
Chloridum Barii, 333.
Chlorina. 540
Chlorinum, 540.
Chloroxylum verticillatum, II. 643.
Chlorum, 540.
— Aqua solutum, 541
— Calcariae. 377.
— liquidum, 541
— Natrii, II. 606.
— solutum, 541.
Chloruretum Antimonii, 251
— Auri, 316.
— — et Sodii, 317
— — — praeparatum, 317.
— Barii, 333.
— Calcii, 389. 390.
— — oxydatum, 377
— Calcis, 377.
— Magnesii, II. 97.
— Ferri 690.
— Mercurii subl. aut praecip parat., II 159
— Oxydi Calcii, 377.
— Platinae s. Platini. II. 350
— Platini et Sodii, II. 350.
— Plumbi, II. 351.
— Potassae, II. 419.
— — oxydat., II. 419.
— Potassii, II 420.
— — protoxydatum, II 419
— Sodae, II. 605.
— Sodii, II 605.
— — Protoxydi, II. 605.
— Stanni, II. 625.
— Zinci, 722.
Chocolata alba, II. 525.
— antivenerea, II. 188.
— aromatica, 368.
— Castaneae, 457.
— c. Hydriodate Ferri, II. 742.
— Lichenis Island., II. 67.
— medica, 367
— purgans, II. 175.
— simplex, 367
— c. Vanilla praep., 368.
— Vanillae odore, 368.
Christophoriana, 68.
— Americana, 68.
Chromas Potassae, II. 436.

Argentum nitratum, 277.
— — fusum, 277.
— nitricum, 277.
— — crystallisat., 277.
— — fusum, 277.
— purum, 276.
— sulphuricum, 279.
— vivum, II. 125.
— — purificatum, II. 125.
Argilla, 141.
— ferruginea rubra, 141.
— Kali sulphur. alcalisata, 144.
— pura, 142.
— sulphurica, 144
— — alcalisata 144.
— — usta, 144.
Arguel, II. 577.
Arisarum, 295.
Aristolochia, 279.
— cava, 712.
— Clematitis, 279.
— Cretica, 280.
— fabacea, 712.
— longa, 280.
— — vera, 280.
— Pistolochia, 279.
— polyrrhiza, 279.
— rotunda, 280.
— — vera, 280.
— Serpentaria, 280.
— tenuis, 280.
— trilobata, 280.
— vulgaris, 280.
— — rotunda, 712.
Armoracia, II 463.
Arnica, 282.
— montana, 282.
— Plauensis, 282.
— spuria, II. 2.
— Suedensis, II 2.
Arnoglossum, II. 349.
Aroph Paracelsi, 694. 697.
Arrowroot, 285.
Arsenias Ammoniae, 292.
— Ferri, 292.
— Kali, 292.
— Potassae, 292.
— — alcoholisatus, 290.
— Sodae, 291.
Arsenici Oxydum, 287.
— — praeparatum, 287.
— — sublimatum, 287.
Arsenicum, 285.
— album, 287.
— — sublimatum, 287.
— antimoniatum, 287.
— citrinum, 285.
— crudum, 287.
— flavum, 285.
— rubrum, 285.
— — factitium, 285.
— sulphuratum rubrum, 285.
Arsenidum Sodae liquidum, 291.
Arsenis Potassae, 290.
— — aquosus, 290.
— — liquidus, 290.
— Sodae, 291
— — liquid., 291.
— — — comp., 291.
Artemisia, 292.
— alba, 292.
— Abrotanum, 4.
— Absinthium, 4.
— campestris, 294.
— Chinensis, 292.
— Contra, 551.
— Dracunculus, 294.
— glacialis, 294
— glomerata — A. Contra.
— Judaica, 551.
— Mauraspatana, 5.
— maritima, 4.
— Pontica, 4.
— rubra, 292.
— rupestris, 294.
Artemisia Santonica, 551.
— Vallesiana, 294.
— vulgaris, 292.
Arthanita, 633.
Arum, 295.
— Arisarum, 295.
— Colocasia, 295
— Dracunculus, 295.
— Indicum, 295.
— macrorrhizon, 295.
— maculatum, 295. II. 523.
— mucronatum, 295.
— peltatum, 295.
— sagittaefolium, 12. 295.
— triphyllum, 295.
Arundo, 296.
— Calamagrostis, 296.
— Donax, 296.
— Phragmites, 296.
— saccharifera s. saccharina, II. 521.
Asa, 296.
— dulcis, 339.
— foetida, 296.
— — depurat. ut G. Ammon.
Asarum, 305
— Canadense, 305.
— Europaeum, 305.
— Hypocistis, 801.
— Virginianum, 305.
Asbestus, 154
Asclepias, 307.
— decumbens — A. tuberosa.
— giganten, II. 230.
— incarnata, 307.
— Syriaca, 307.
— tuberosa, 307.
— Vincetoxicum, 307.
Asellus, oleum jecoris, 69.
Asparaginum, 308.
Asparagus hortensis, 308.
— officinalis, 308.
— sativus, 308.
Asperula odorata, 309.
Asphaltum, 309. II. 332.
— artificiale, 310.
Asphaltus, 309
Asphodelus albus, 310.
— mas, 310.
— ramosus, 310.
Aspidium coriaceum, 310.
— Filix Mas, 311.
— Rhaeticum, 70.
Asplenium, 482.
— Adiantum nigrum, 70.
— Ceterach, 482.
— murale, 310
— Ruta muraria, 310.
— Scolopendrium, II 572. 573.
— Trichomanes, 71.
Assa foetida, 296.
Astacus fluviatilis, 381.
Aster conyzoides, 659.
— inguinalis, 659.
Astragalus Creticus, II. 689.
— exscapus, 310.
— gummifer, II. 689.
— Tragacantha, II. 689.
— verus, II. 689.
Astrantia, 311. II. 1.
— major, 311.
— minor, 311.
Athamanta Cretensis, 311.
— Meum, II. 215.
Athanasia, II. 647.
Athyrium Filix Mas, 311.
Atractylis, 446.
Atriplex angustifolia, 312.
— foetida, 496.
— glauca, 312.
— hortensis, 312.
— odorata, 490.
— olida, 496.
— sativa 312.
— sylvestris, 496.
Atropa, 312.
— Belladonna, 312.
— Mandragora, 315.
Atropia, 312.
Atropina, 312.
Atropinum, 312.
Atropium, 312.
Atmella, 65
Auchenia Lama, 392.
Aurantiorum Poma s. Mala, 557.
Aurantium, 557
— Curassavicum 557.
— Hispalense, 557.
Auricula Judae, II. 692.
— muris, 782.
— — major, 784.
— Ursi, II 440.
Auridum Ammoniacae, 318.
Auripigmentum, 285.
— rubrum, 285.
Auris Ceti, 387.
Aurum, 315.
— divisum, 316.
— — per Saccharum, 316.
— foliatum, 315.
— fulminans, 318.
— horizontale Zwingeri, 318.
— mosaicum, II. 624.
— muriatico-natricum, 317.
— — — praeparat., 317.
— muriaticum, 316.
— — c Chlorureto Natrii, 317.
— — liquidum, 316.
— — natronatum, 317.
— musivum, II. 624.
— oxydatum, 318.
— potabile, 317.
— purum, 316.
Avellana, 606.
Avena, 319.
— excorticata s. decort., 319.
— nuda, 319.
— orientalis, 319
— sativa, 319.
Avenae Semen excort., 319.
Avicula Hirundo, 380.
— margaritifera, 390.
— Mya, 380.
Axungia, 68.
— Anatis, 69.
— Anguillae, 69.
— Anguium, 69.
— Anseris, 69
— antipsorica, II. 138.
— Ardeae, 69.
— Aschiae, 69.
— Aschii, 69
— Canis, 68.
— Caponis, 69.
— Castoris 68
— Cati sylvestris, 68.
— cetaria, 69.
— Ciconiae, 69.
— composita, 70.
— Coturnicis, 69.
— Cuniculi, 69.
— Delphini, 69.
— Equi e collo, 68.
— — e juba, 68.
— Erinacei 68.
— Gallinae, 69.
— Hominis, 69.
— Leporis, 69.
— Lucii Piscis, 69.
— Lunae 379.
— Lupi, 69
— Muris alpini, 69.
— — montani, 69.
— nitrica, nitrata, 51.
— oxygenata, 51.
— Pavonis, 69
— Phocae, 69.
— Porci, 69.

Digitized by Google

Axungia Porci purificata, 69.
— porcina, 69.
— praeparata, 69.
— Serpentum, 69.
— suilla, 69
— — praeparata, 69.
— Suis Scrofae, 69.
— Tauri Pedum, 68.
— Taxi, 68.
— Thymalli Piscis, 69.
— Ursi, 69.
— Viperarum, 69.
— viperina, 69.
— vulpina, 69.
— Vulpis, 69.
Ayapana, 662.
Azarum, 305.
Azedarach, 320.
Azotum, 320.

B.

Baccae Actes, II. 535.
— Jujubae, II. 37.
— Aurantiae, 557.
— Norlandicae, II. 515.
— Zizyphi, II. 37.
Baccharis, 603
Bacilli Liquirit. albi, II. 82.
— — citrini, II. 82.
Baetica sylvestris, II. 241.
Balanus myrepsica, II. 221.
Balaustia, II. 451.
Ballota, 320.
— lanata, 320.
— nigra, 320
Balls v. Boli et Globuli.
Balm of Gilead, Salomon's, II. 653. v. caet. Balsamum.
Balnea iodata, II. 8. 10. 742.
Balneum antisyphilit., II. 183.
— antipsoricum, II. 397.
— aromaticum, II. 506
— Chlori, 541.
— c. Hydriod. Ferri, II. 742.
— emolliens, II. 77.
— — et antisept., II. 441.
— excitans, 46.
— incitans, 24.
— irritans, 603.
— resolvens, 182. 183. II. 397.
— salinum et gelatinos., II. 606.
— sinapinum, II. 603.
— sulphuratum, 42. II. 397.
— — et gelatinos. Dupuytren, II. 397.
— sulphurosum, II. 397. 617.
Balsamaeleon. 326.
Balsamita mas, 321.
— odorata, 321.
Balsamum acet. camphorat, II. 443.
— acusticum, 98. 168.
— adstringens, II. 608.
— Aegypticum, 320.
— aegyptiac., 326.
— aethereum, II. 639.
— album 326
— Amyrid. Gilead., 326.
— anodynum, II. 271. 443.
— Bate s, II. 271.
— antiarthriticum, II. 443.
— antihystericum, 108.
— antiodontalg., II. 286.
— apoplecticum, II. 507.
— Apparitii, 800.
— Arcaei, II. 656.
— aromaticum, 170. 179. 451. II. 507.
— — aethereum, 459.
— — liquidum, II. 657.
Balsamum arthriticum, II. 271.
— ad aures, 98. 168. 323. 669.
— Auri, 319.
— Basvillianum, II. 670.
— e Benzoë, 341.
— Brasiliense, 321.
— Cahirense, 326.
— Calaba, II. 643.
— Canadense, 1.
— Cancamum, 656.
— ad cancrum, II. 287.
— Carpathicum, 321.
— catholicum, 341.
— c. Spiritu Vini, 798.
— ex Vino, 797.
— cephalicum Saxonic., II. 507.
— chalybeatum, 689.
— Chironis, II. 660.
— Cinnamomi, 408.
— Commendatoris, 341. 342
— de Condom, II. 230.
— Constantinopolit., 326.
— Copaibae, 321.
— Copaivae, 321.
— — reductum, 325.
— ad dentitionem, 141.
— Embryonum, II. 533.
— Feuilleti. 629.
— Fioravanti, II. 59. 663.
— — nigrum, II 664.
— — oleosum, II. 664.
— — spirituosum, II. 664.
— Focot, II. 642.
— Fourcroyi, II. 673.
— Frahmii, II. 655.
— Friari. 341.
— Genovevae, II. 659.
— Gileadense, 326.
— — factitium. 346. II. 653.
— Goulardi, II. 367.
— Guajaci, 756.
— — saponaceum, 756.
— guajacinum, 752.
— Hoffmanni, 408.
— Hungaricum, 321.
— Hyperici comp., 800.
— — simplex, 798.
— Indicum, 326.
— — album, 326.
— — nigrum, 326.
— — siccum, 326.
— Innocentianum, 797. 798.
— ischaematicum, II. 668.
— Italicum, II. 658.
— — rubrum, II. 658.
— Judaicum, 320.
— Laricis nativum, II. 652.
— Lavandulae, II. 62.
— Lectorense, II. 230.
— de Leictour, II. 230.
— Liboschitzii, 427.
— Liquiritiae, II. 277.
— Locatelli, II. 658.
— ad loricand. cadaver, II. 629
— Majoranae, II. 312.
— Mariae, II. 643.
— Marrubii, Ford's, II. 270.
— de Mecca, 320.
— Meccaënse, 326.
— Maccanense, 326.
— de Mecha, 326.
— Mellis Hi lii, 330. II. 287.
— — pectorale, 331.
— mercuriale, II. 153. 204.
— — Plenkii, II. 134.
— Myroxyli peruif., 326.
— Myrrhae, II. 237.
— narcoticum, II. 668.
— nativum. II. 652.
— nervinum, II. 507.
— Nucistae, II. 233.
— — expressum, II. 232.
— Oleae s. Olivae, II. 254.
— ophthalmicum, II. 153. 510.
Balsamum opthalmicum citrin. s. flavum, II. 152.
— — rubrum, II. 151.
— Yveanum, II. 153.
— — St Yves. II. 153.
— Opodeldoc, 167.
— orientale, 326.
— palustre, II. 117.
— pectorale. II. 660.
— Persicum. 341.
— ad s. contra perniones, II. 669.
— Peruvianum, 326.
— — album, 326.
— — factitium, 332.
— — nigrum, 326.
— — reductum. 326.
— — siccum 326.
— Pini Laricis, II. 652.
— — liquidum, II. 652.
— — sylvestris, II. 652.
— — — nativum, II. 652.
— — exsiccatum, II. 671.
— pleureticum, 615.
— Plumbi, II. 358.
— polychrestum, 752.
— Populi, II. 642.
— Rackasira, 329.
— Rakasira s. Rakasiri, 329.
— resolvens, 328.
— Rulandi, II. 638.
— Rutae, II. 520.
— de Salazar, 114.
— Samaritanum, II. 713.
— saponaceum, II. 442.
— — comp., II. 442.
— — terebinthinat, II. 669.
— — Saponis, 167. II. 442. 670
— — comp., II. 442.
— Saturni, II. 358. 359. 367.
— — Goulardi, II. 358. 365.
— — liquidum, II. 358.
— saturninum, II. 362.
— Schauerianum, II. 665.
— Scherzeri, II. 507.
— somniferum. II. 271.
— stomachicum, II. 507.
— Styracis. II. 625.
— — officinalis, II. 626.
— — Benzoini, 339.
— Succini. II. 443 632.
— Sulphuris, II. 638.
— — anisatum, II. 638.
— — Barbadense, II. 333.
— — Rulandi, II. 638.
— — simplex. II. 638.
— — succinatum, II. 638.
— — terebinthinat., II. 639
— Syriacum, 326.
— Terebinthinae II, 670.
— — vulgare II 675.
— terebinthinatum, II. 657.
— thebaicum, II. 271.
— Thibaut's, II. 657.
— St. Thomae, II. 643.
— de Tolu, 329.
— Toluiferae Balsami, 329.
— Tolutanum, 329.
— tranquillans, 794.
— tranquillum, 794.
— traumaticum, 341.
— universale, II. 302.
— verum, 326.
— Vervaini, 341.
— de Vinceguère, II. 230.
— viride 628. 629. II. 613. 661
— — Metensium, 629.
— Vitae, 119. 408. II. 238.
— — album, II. 665.
— — externum, II. 669.
— — Hoffmanni, 408. II. 509.
— — de Lelièvre, 126.
— — Rulandi, II. 639.

Balsamum vulnerarium, 341. II. 657. 663.
— — commune, II. 652.
— — Burrhus, 342.
— — minerale Dippelii, 704.
— de St. Yves, II. 153.
— — vegetabile, II. 217.
Balsamus v. Balsamum.
Bamia moschata, 1.
Banilla, II. 707.
Baptisecula, 633.
Barba Aronis, 295.
— caprina, II. 621.
— Hirci, II. 691.
Barbarea, 659.
— praecox, 660.
Barbula caprina, II. 621.
Bardana, 332.
— minor, II. 719.
Barilla, II. 608.
Barium, 333.
Barotes salitus, 333.
Baryosma Tonga, 666.
Baryta, 335.
— acetica, 337.
— carbonata, 336.
— carbonica, 336.
— fusa, 335.
— muriatica, 333.
— nitrica, 337.
— pura liquida, 335.
— sulphurica nativa 336.
Barytes, 333. 336.
— salitus, 333.
Basilicum 338.
— citratum, 338.
— majus, 338.
— minimum, 338.
Batrachites, 386.
Baume's vulneraire, II. 653.
Bdellium, 338.
Beccabunga, II. 710.
Becetta, II. 49.
Bechium, 666.
Bedeguar, 338.
Been, II. 221.
Behen, 339. II. 221.
— album, 339.
— nostras, 339.
— rubrum, 339.
Belladonna, 312.
Belliculus marinus, 380.
Bellis, 339
— hortensis, 339.
— major, 542.
— minor, 339.
— perennis, 339.
— pratensis, 542.
Belzoinum, 339.
Ben, II. 221
Benedicta sylvestris, 742.
Benzoas Ammoniae, 193.
Benzoë, 339.
— amygdaloides, 340.
— in sortis, 340.
Benzoin, 339
Benzoinum, 339.
— Gummi, 339.
Berberes, 346.
Berberis, 346.
— vulgaris, 346.
Bergamottae Oleum, 558.
Beta, 347.
— Cycla, 347.
— rubra, 347.
— vulgaris, 347.
Betel, 347.
Betonica, 347.
— aquatica, II. 573.
— officinalis, 347.
— Pauli, II. 711.
— purpurea, 347.
Betula, 348. 349
Betula alba, 319.
— Alnus, 348. 349.
Bezetta rubra, 446.
— coerulea, II. 49
Bezoar, 392
— Coromandelianus, 392.
— hystricum, 392.
— occidentalis, 392.
— orientalis, 392
Bezoarticum animale, 719.
— Curbi complet., II. 573.
— — incomplet., II. 573.
— — purgans, II. 573.
— joviale, II. 624.
— martiale, 230.
— minerale 229.
Biboras Sodae, II. 611.
Bicarbonas kalicus c. Aqua, II. 405.
— natricus c. Aqua, II. 610.
— Potassae, II. 405.
— Protoxydi Ferri, 684
— Sodae, II. 610.
Bichloretum Hydrargyri, II. 181.
— — venale, II. 181.
— Mercurii, II. 181.
Bichloruretum Calcis, 377.
— — Mercurii, II. 181.
Bidens, 349.
— cernua, 349.
— tripartita, 65.
Bilis bovina, 607.
Bina, II. 98.
Bioxalas s. Bioxalas Potassae, II. 425.
— kalicus c. Aqua, II. 425.
Bislingua, II. 518.
Bismalva, 129.
Bismuthi Subnitras, 350.
Bismuthum, 349
— nitricum, 350.
— — praecipit., 350.
— oxydulat. album, 350.
— subnitricum, 350.
Bistorta, 351.
Bisulphas Cupri, 620.
— kalicus, II. 409.
— Potassae, II. 409.
Bisulphuretum Ferri, 674.
— Hydrargyri, II. 156.
— Stanni, II. 624.
Bitartras kalicus c. Aqua crudus, II. 429
— — — — depuratus, II. 429.
— Potassae, II. 429.
Bitumen Asphaltum, II. 332.
— Judaicum, 309.
— Petroleum, II. 332. 333.
Bixa Orellana, II. 312.
Blatta byzantina, 379.
Blattaria, II. 709.
Blechnum lignifolium, II. 573.
Boetica sylvestris, II. 241.
Boletus, 351.
— cervinus, 352.
— fomentarius, 85.
— igniarius, 85.
— Laricis, 85.
— purgans, 85.
— Salicis, 351.
Boli adstringentes, 115. 325. 468. 670. II. 13. 469. 475.
— alterantes, 719. II. 165.
— amari, 735.
— anodyni, II. 286.
— anthelmintici, 553.
— — et antispasmod., II. 170.
— anthelmintico-laxantes, II. 179.
Boli anthelmintico nervini, II. 63.
— — tonici, 782. II. 163.
— antiarthritici, II. 667.
— antiasthmatici, II. 636.
— anticatarrhales, II. 223.
— antichlorot. emmenag. incit, 677.
— — — tonici, 672.
— anticonvulsivi, 351.
— antidysenterici, II. 13.
— antifebriles, 539. 559.
— antigonorrhoici, 325. II. 661.
— antihaemorrhoidales, II. 636.
— antihysterici, 299.
— antilactosi, II. 422.
— antipsorici, II. 636.
— antiscorbutici, 515.
— antiscrophulosi, 439.
— antispasmodici, 391. 682. II. 226. 287. 724.
— — et anticonvuls., 299.
— antisyphilitici, 317.
— — resolventes, II. 146.
— — stomachici, II. 146.
— antivenerei, II. 145.
— aromatici, II. 231.
— c. Camph. et Nitro, 394.
— camphorati, 394.
— — cum Kermete, 395.
— cardiaci, 600.
— carminativi, 221.
— cathartici, II. 25.
— chalybeati, 682.
— Chinae, 505.
— — aromatisati, 505.
— — opiati, 505.
— — — et aromatici, 505.
— — et Rhei, 506.
— cinnabarini, II. 158.
— coerulei, II. 130.
— contrastimulantes, 38. 40.
— in cystitide lenta, II. 636.
— deprimentes, II. 223.
— — ac nauseantes, 648.
— — cinnabarini, II. 158.
— — resolventes, 648.
— diaphoretici, 232. II. 158. 258. 636.
— — nauseantes, 243.
— — sedantes, II. 724.
— ad diarrhoeam, II. 277. 475.
— digestivi, II. 13.
— de Digitale, 647.
— Digitalis, 647.
— diuretici et antispasmod., 618.
— drastici, 772. II. 165.
— emetici, II. 198.
— emmenagogi, II. 39. 101. 164.
— — irritantes, 100. 121.
— — resolventes, 390. II. 9.
— ad epilepticos, II. 700.
— excitantes, 391. II. 453.
— febrifugi, 506. 515. 539. 667. II. 315. 739.
— e Ferro comp., 677.
— ferruginosi, 677. 696.
— ad haematuriam, 470.
— hydragogi, II. 25.
— ex Hydrargyro, II. 201.
— — — oxydato rubro, II. 151.
— incit., diaphoret. et expector, 243.
— — emmenagogi, 539. 677.
— — stomachici, 677. 707.
— kermetico-ammoniacales, 243
— lac pellentes, II. 322.
— laxantes Chaussieri, II. 176
— lenientes, II. 223. 224.
— lithontriptici, II. 439.

Boli Magnesiae crocat., II. 93.
— martiales emmenag., 672 677.
— Martis, 702.
— mercuriales, II. 131. 201.
— e Mercurio glycyrrhiz., II. 130.
— — — dulci, II. 163.
— e Muriate Hydrargyri, II. 163.
— Myrrhae, II. 236.
— narcotici, 791.
— e Narcotina. 242.
— in necrosi syphilitica, II. 145
— nervini, 299. 458.
— ad oedema pulmonum, II. 591.
— — paralysin, II. 600.
— pectorales, II. 691.
— — adstringentes, II. 691.
— in pertussi, II. 154.
— in ptyalismo mercuriali, II. 398.
— purgantes, II. 25. 171. 175. 475. 579.
— — irritantes, 772.
— — et tonici, II. 171.
— in quartana, 506.
— Ratanhiae, II. 469.
— resolventes, 127. II. 25. 146.
— — et antisyphilit., II 146.
— — deprimentes, II. 8
— — diaphoretici, 243.
— — et incitantes. II. 169.
— — et purgantes, II. 475.
— e Rheo, II. 474.
— — sedativi, II. 475.
— roborantes, 325.
— e Roremarino, 672.
— rubri, II. 158.
— ex Sabina, II. 164.
— ad salivationem, II. 398.
— saponacei, II 433.
— Scammonii comp., II 179.
— scillitici, II. 501.
— sedativi, 27. II. 285.
— e Spongia, 439.
— e Stanno, II. 623.
— stibiati. 236.
— stimulantes, II. 600.
— — et tonici, 283.
— stomachici, 126. 485. 610 672 677. 682. 707. II. 639.
— contra strumas, 439.
— Sulphureti Mercurii, II. 158.
— Sulphuris, II. 636.
— — comp., II. 636.
— Tartari chalyb., 707.
— temperantes, 394.
— tonici, 506. 515.
— — adstring. balsamici, 733
— — sedativi c. Muriate Barytae, 335.
— tonico-antiseptici, 299.
— — diaphoretici, 391.
— ad tussim, II. 417.
— e Valerianа. II. 700.
— vermifugi, 311. 782. II. 178. 180. 623.
— — diaphoretici,
— — Storeyi, II. 158.
— vias urinarias excitantes, 325
— vomitivi, II. 14.
Boli laevigatio, 142.
Bolus alba, 142.
— Armena s. Armenia, 141.
— candida. 379.
— orientalis, 141.
— rubra, 141.
Bolus rubra artificial, 142.
Bombax, 743.
Bombyx Mori, II. 597.
Bonifacia, II. 518.
Bonplandia trifoliata, 219.
Bonus Henricus, 496.
Borago, 352.
— officinalis, 352.
Boras Hydrargyri, II. 196.
— Mercurii, II. 196.
— natricus cum Aqua, II. 611.
— Sodae, II. 611
— — alcalescens, II. 611.
— — alcalinum, II. 611.
— — alcalinus, II. 611.
— — c. baseos excessu, II. 611.
— — saturatus, II. 611.
— — supersaturatus, II. 611.
— supersodicus, II. 611.
Borassus flabelliformis. 338.
Borax, II. 611.
— crudus s. cruda, II. 611.
— natricus c. Aqua, II. 611.
— officinalis, II. 611.
— pura, II. 611.
— rathnata, II. 611.
— Sodae purificatus, II. 611.
— supersodicus, II. 611.
— tartarisatus. II. 434.
— Venetus s Veneta, II. 611.
Borrago s. Borago.
Borussias Ferri, 707.
— Hydrargyri, II. 195.
— Potass. et Oxyduli Ferri, 40.
Bos Taurus v. Lac vacc., Fel Tauri.
Boswellia glabra, II. 255.
— serrata, II. 255.
— thurifera — Olibanum.
Botrychium Lunaria, II. 87.
Botrys, 496.
— ambrosioides, 496.
— Mexicana, 495.
Botrytis. II. 722.
Bovista. 353.
Bowdichia virgilioides, 96.
Branca ursina, 15. 353.
Brandy shrub, 96.
Brassica, 354.
— capitata alba, 354.
— — rubra, 354.
— Eruca, 354.
— marina, II. 619.
— Napus, 354.
— oleracea, 354.
— oleifera, 355.
— Rapa sativa, 355.
— rubra, 354.
Brodium v. Jus, Jusculum.
— depurativum II. 616.
— diureticum, II 571.
— purgans, II 616.
— Rosarum, II. 495.
Bromina, 355.
Bromum, 355.
Bromuretum Potassii et Sodii, 355.
Brontias, 386.
Brucea ferruginea, 219.
Brucia, 219. 355
Brucina, 219. 355.
Brucinum, 219. 355.
Brucium, 219. 355.
Brunella, II. 447.
Bruscus, II. 518.
Bryonia, 356.
— alba. 356.
— dioica, 356.
— nigra, II. 647.
Bubon, 357.
— Copticum, 155.
— Galbanum, 357.
— gummiferum. 358.
— Macedonicum, 357.
Buccu, 366.
Bulones exsiccati, 720.
Bufonites, 386.
Buglossum, 205.
— latifolium, 352.
— urbanum, 352.
— verum, 352.
Bugula, 88.
Bulbulus Thrasus, 657.
Bunias, 354.
Buphthalmum, 366.
Bupleurum rotundifolium, II. 330.
— perfoliatum, II. 330.
Bursa pastoris, II 683.
Bursera gummifera, 366. II. 46.
Butua, 656.
Butyrum, II. 48.
— Amygdal. dulcium, 194.
— Antimonii, 250.
— Cacao, 368.
— Cerae, 267.
— insulsum, II. 48.
— Majoranae II. 312.
— Nucistae, II. 232.
— c. Oxydo Merc. rubro, II. 151.
— purificatum, II. 48.
— Rutae, II. 520.
— Saturni, II. 362.
— Stanni, II. 625.
— Stibii, 250.
— Zinci, II. 722.
Buxus, 366. 367.
— sempervirens, 367.

C.

Cabbagum, 740.
Cacao, 367.
— Antillanum, 367.
— Caraccense, 367.
— Maragnan, 367.
— praeparata, 367.
— tabulata, 367.
Cachen Laguen, 661.
Cachinlagua, 661.
Cachou à la canelle à la reglisse, à la violette 469.
— à l'ambre gris, à la fleur d'oranges, musqué, 469.
Cactus coccinellifer, 578.
— cochenillifer, 578.
— Opuntia, II. 310.
— Tuna, 578.
Cadmia, II. 722.
— factitia, II. 722.
— fornacum, II. 722.
— fossilis, II. 722.
— praeparata, II. 722.
Cadmium, II. 45.
Caeruleum Berolinense, 707.
— Borussicum, 707.
— montanum, 619.
Caesalpinia echinata, II. 72.
Caffeinum, 585.
Cahuchu, II. 407.
Cajeputi Oleum, 369.
Cakes, worm c. Boli vermif.
Calaba, II 643.
Caladium. 95.
Calaguala, 310.
Calamina, II. 722.
— praeparata, II. 723.
Calamintha, II. 111.
— agrestis, II. 111.
— aquatica, II. 117.

Calamintha humilior, 774.
— montana, II. 111.
— Puleg i odore, II. 111.
— vulgaris, II, 111.
Calamita, II. 627.
Calamites vera, II. 627.
Calamus, 369.
— aromaticus, 370.
— Asiaticus, 370.
— Draco, II. 640.
— Indicus, 370.
— odoratus, 370.
— Rotang, II. 540.
— Sancti, 370.
— verus, 370.
— vulgaris, 370.
Calcareus lactiformis, 379.
Calcaria carbonica, 378.
— chlorinica, 377.
— iodica, II. 8.
— iodinica, II. 8.
— muriatica, 389.
— oxyphosphorica, 388.
— phosphorica, 386.
— pura, 373.
— — liquida, 374.
— sulphurata, 370.
— — liquida, 377.
— sulphurato-stibiata, 249.
— sulphurica, 388.
— usta, 373.
Calcis Phosphas v. Phosphas C.
— — praecipitatus, 387.
Calcitrapa, 373.
— stellata, 373.
Calcitrippa, 643.
Calcium, 373.
— sulphuratum, 376.
Calculi, 392.
Calculus cysticus bovinus, 392.
Calendula, 392.
— alpina, 282.
— arvensis, 392.
— officinalis, 392.
Calendulae minerales, 691.
Calendulinum, 393.
Cali v. Kali.
Callicocca Ipecacuanha, II. 12.
Calluna vulgaris, 658.
— herbacea et purpurascens, 658.
Calmontana, II. 111.
Calombo, 594.
Calomel, II. 159. 160.
Calomelanos, II. 159.
Calomelas, II. 159.
— ferruginosus, II. 171.
— praecipitatus, II. 159.
Calophyllum Calaba, II. 643.
— Inophyllum, II. 642.
Calotropis Mudarii, II. 230.
Caltha alpina, 282.
— sativa, 392.
Calumba, 594.
Calx, 373.
— acetata 390.
— Antimonii, 228. 229.
— — elota, 229.
— — Hoffmannii, 249.
— — nitrata, 249. 234.
— — Nitratis, 229.
— — sulphurata, 249.
— — c. Sulphure, 249.
— Arsenici alba, 287.
— Bismuthi, 350.
— c. Cali puro, II. 392.
— citrata, 391.
— Cupri viridis, 619.
— extincta, 372.
— Hydrarg. alba, II 206.
— — rubra, II. 149.
— Mercurii, II 201.
— — cinerea, II. 190.
— — vitriolata, II. 197.
Calx muriat. Bergmanni, 389.
— oxymuriatica, 377.
— phosphorata, 370.
— Plumbi alba, II. 354.
— recens usta 373.
— salita, 389.
— Stibii c. Sulphure, 249.
— sulphurata antimoniata, 249.
— sulphurica, 388.
— — compacta, 389.
— usta, 373.
— Vismuthi, 350.
— viva, 373.
— Zinci, II. 723.
Calyculi Glandium Quercus, II. 458.
Calyptranthes Caryophyll., 403.
Calystegia Soldanella, II. 619.
Cambodium, 772.
Cambogia Gutta, 772.
Cambogium, 772.
Camelus Lama, 392.
Cammarum, 65.
Camphora, 393.
— artificialis, II. 668.
— liquida, 393.
Camphorata, 402.
Camphorosma, 402.
— Monspeliaca, 402.
Canarium balsamiferum, II. 255.
Cancamum, 656. 766.
Cancer Astacus, 381.
— Pagurus, 381.
Cancri Herba, II. 683.
Cancrorum Lapides s. Lapilli s. Oculi, 381.
— Chelae, 380.
Candelae cereae, II. 373.
— chirurgicae, II. 362.
— fumales, 344.
— mercuriales, II. 178.
— mitigantes, II. 362.
— probatoriae, II. 137 373. 445.
— resolventes, II. 362.
— saturninae, II. 373.
Canella, 402.
— alba, 402.
— Caryophyllata, 403.
— Cubana, 403.
— Malabarica, 403.
— Zeylanica 403.
Canellinum, 402.
Canis Vulpes, 719.
Cannabina aquatica, 662.
Cannabis, 422.
— Jeea, 422.
— sativa, 422.
Cantharides, 422.
Cantharidinum, 423.
Cantharis vesicatoria, 422.
— vittata, 422.
Capillaire, syrop., 560.
Capillus Veneris, 70.
— — Canadensis, 70.
Capitulum Martis, 659.
Capparis, 435.
— spinosa 435.
Capra Aegagrus, 392.
— Ibex, sanguis, 721.
Caprifolium, 430.
Capsicinum, II 312.
Capsicum annuum, II. 342.
— frutescens, II. 342.
Capsina, II. 342.
Capsinum, II. 342.
Caput mortuum Vitrioli, 678.
Carabus ferrugineus, 578.
Caragna, 436.
— foetida, 436.
Caranna, 436.
Caraway cordial, 448.
Carbo, 436.
Carbo animalis, 437.
— Ligni, 436.
— Pilae marinae, 437.
— praeparatus, 436.
— purus, 436.
— Spongiae, 437.
— — marinae, 437.
— de Spongiis lotis aut illotis, 437.
— e vegetabilibus, 436.
— vegetabilis, 436.
— — praeparatus, 436.
Carbonas ammoniacalis, 171.
— Ammoniaci, 170. 171.
— — alcalin. liq., 172.
— — — pyro-oleos. solut., 174.
— — — solut., 172.
— — alcalinulus, 171.
— — Cornu Cervi cryst., 173.
— — — liquidus, 174.
— — crystallisatus, 171.
— — liquidus, 172.
— — Lumbricor. cryst., 173.
— — pyro-oleosus, 173.
— — liquid., 174.
— — Viperar. cryst., 173.
— Ammoniae, 170.
— — alcalinus, 170. 171.
— — — liq., 172.
— — — solidum, 171.
— — — solutus, 172.
— — — pyro-anim., 173.
— — — pyro-oleos., 173.
— — — pyro-vinos. solut., 174.
— — crystallisatus, 173.
— — incompletus, 170.
— — pyro animal., 173.
— — — fluidus, 174.
— — — liquidum, 174.
— — — oleosus 173.
— — — liquidus, 174.
— — solidus, 171.
— ammonicus crudus, 173.
— — admixto oleo empyreum. anim. v. Ammon. carb. pyro-oleos.
— — depurat. solidus s. crystall., 171.
— Barytae, 333 336.
— baryticus, 336.
— calcareus, 378.
— calcicus bituminat., 379.
— Calcis 378.
— — nativum, 378.
— — nativus pulverulent., 378.
— — praecipitat., 381.
— Deutoxydi Potassii, II. 403.
— Ferri 685.
— — oxydati, 686.
— — praecipitatus, 686.
— — praeparatus, 686.
— Hydrargyri, II 190.
— kalicus e Cinerib. clavellatis, II 399.
— — crudus II. 398.
— — e Lixivio cinereo II. 398.
— — e Tartaro, II. 399.
— Lixiviae alcalinus 398.
— — — solutus, II. 401.
— Magnesiae II 91.
— — purus, II. 90.
— magnesicum, II. 91.
— magnesicus c. Aqua, II. 90.
— — — et Hydrate magnesico, II. 90.
— — — — — venalis, II. 90.

Digitized by Google

Carbonas magnesicus c. Aqua venalis, II. 90.
— Mercurii, II. 106.
— natricus, II. 608 610.
— — c. Aqua crudus, II. 608.
— — — venalis, II. 608.
— — depuratus, 609.
— — — siccat., II. 609.
— — impurus, II. 608.
— — venalis, II. 608.
— Oxydi Zinci, II. 722.
— Plumbi, II. 354.
— — albus, II. 354.
— — — praeparatus, II. 354.
— plumbicum, II. 354.
— plumbicus, II. 354.
— Potassae, II. 399. 405.
— — Absinthii, II. 400.
— — alcalescens liq., II. 401.
— — alcalinum s. alcalinus, II. 398.
— — Cardui, Centaurii, Ligni Junip., Ononid., Tamarisci etc. II. 400.
— — completum, II. 405.
— — et Ferri liq., 681.
— — et Ammoniaci, II. 406.
— — depuratus, II. 398.
— — impurus, II. 398.
— — neuter, II. 405.
— — purus, II. 398.
— — purissimus, II. 399. 405.
— — e Tartari Crystallis, II. 399.
— — venale s. venalis, II. 398.
— Protoxydi Potassii, II. 405.
— — — et Ammoniaci, II. 406.
— Sodae. II. 608. 610.
— — alcalin., II. 608.
— — communis, II. 608.
— — completum s. completus, II. 610.
— — crystallisatus, II. 610.
— — impurus, II. 608.
— — incompletus, II. 608.
— — neuter, II. 610.
— — siccat, II. 608.
— — venale s. venalis, II. 608.
— Sodii Protoxydi, II. 610.
— superammonicus, 170.
— — aquosus, 172.
— — pyro-oleosus, 173.
— — — aquosus, 174.
— superpotassicus depuratus, II. 398.
— — purus, II. 398.
— Zinci, II. 723.
— — aluminosus, II. 722.
— — impura, II. 722.
— — impurus, II. 722.
— — Oxydi II. 722.
— — praeparatus, II. 723.
— zincicus terrestris, II. 722.
Carbonis Pulvis acidulus, 438.
Carbunculus, 141.
Carburetum Ferri, 673.
— — nativum, 673.
— Iodii, II. 11.
— Sulphuris, II. 634.
Cardamine, II. 244.
— pratensis, II. 244.
Cardamomum, 440.
— Javanicum, 441.
— longum, 441.
— majus, 441.
— Malabaricum, 440.
— maximum, 745.
Cardamomum medium, 441.
— minus, 440.
— rotundum, 441.
Cardamus major, II. 213.
Cardiaca, 442.
Cardopatia, 446.
Cardopatium, 446.
Carduus 442.
— benedictus, 442.
— lacteus, 443.
— Mariae, 443.
— Marianus, 442.
— sanctus, 442.
— stellatus, 373.
— tomentosus, 442.
— Veneris, 653.
— volutans aculeatus, 659.
Carex arenaria, 445.
Carica, 445.
— pinguis, 445.
Carlina, 446.
— acaulis, 446.
— humilis, 446.
— vulgaris, 446.
Carminative, Dalby's, II. 91. 267.
Carminum, 579.
Caro Testudinum, 719.
— Viperae, 719.
— Vulpis, 719.
Caroba, 479.
Carpionum Lapides, 380.
Carpobalsamum, 204.
Carthamita, 446.
Carthamus, 446.
— lanatus, 446.
— sativus, 446.
— tinctorius, 446.
Carum, 447.
— Carvi, 446. 447.
Carvum, 446. 447.
Caryocostinum, II. 557.
Caryophyllata, 403. 742.
— aquatica, 742.
Caryophylli, 448.
— aromatici, 448.
Caryophyllinum, 449.
Caryophylloides, 615.
Caryophyllus, 448.
— aromaticus, 448.
— pratensis, 615.
— ruber, 615.
Cascarilla, 451.
Caseum s. Caseus, II. 48.
Cassamunar, 457.
Cassia, 403. 454.
— acutifolia, II. 577.
— Alexandrina, II. 577.
— Brasiliensis, 454.
— Caryophyllata, 403.
— cinnamomea, 403.
— elongata, II. 577.
— pro clysteribus, 454.
— cocta, 455.
— Fistula, 454.
— fistularis, 454.
— Javanica, 454.
— lanceolata, II. 577.
— lignea, 403.
— cum Manna, II. 103.
— Marylandica, 454.
— mollis, 454.
— obovata, II. 577.
— obtusata, II. 577.
— officinalis, 577.
— potabilis, 457.
— Senna, II. 557.
Cassine Peragua, II. 1.
Cassumuniar, 457.
Cassuvium, 204.
— occidentale, 457.
Castanea equina, 72.
— pumila, 457.
— Vesca, 457.
Castaneae, 457.
Castilla elastica, II. 470.
Castor Fiber, 458.
Castoreum, 457.
— Anglicum, 458.
— Canadense, 458.
— Novae Angliae, 458.
— Moscoviticum, 458.
— Rossicum, 458.
— Sibiricum, 458.
Castorinum, 458.
Castrangula, II. 573.
Catalpa, 466.
— arborea, 466.
Cataplasma Acetat. Plumbi, II. 361.
— acetatum, 21 II. 321.
— acre Kerndlii, 98.
— adstringens, 679. 689. II. 459.
— Althaeae, 137.
— — Radicis emolliens, 137.
— albuminosum s. Albuminis, II. 315.
— aluminosum, II. 315.
— Amyli, 203.
— ammoniacale, 178.
— anodynum, 611. 790. 792. II. 261. 278. 324.
— anthelminticum, 108.
— anticancrosum, 288.
— antiophthalmicum, 611.
— antipleureticum, II. 346.
— antisepticum, 13. 438. 507. II. 459. 520.
— — e Camphora, II. 459.
— — Reussii, 507.
— antispasmodicum, II. 280.
— Aquae marinae, 390.
— aromaticum, II. 112.
— ad blennorrhagiam, 202.
— ex Bryonia, 545.
— ad cancrum, 545. II. 261.
— Cantharidum, 429.
— Carbonis Ligni, 438.
— Cicutae, 545.
— — compos., 545.
— c. Concinno, II. 459.
— — et Camphora, II. 459.
— Conii, 545.
— e Conio s. C. macul. ammoniat., 545.
— Crustae Panis acetosum, 21.
— Dauci, 642.
— e Dauco, 545.
— desiccativum, II. 713.
— discutiens, 315. 485. 701.
— domesticum — C. emolliens.
— effervescens, 669.
— emolliens, 137. 202. 611. II. 100. 321.
— —, Species pro, 129.
— epispasticum, II. 601.
— excitans, 184.
— — et maturans, 358.
— — resolv., II. 713.
— exsiccans, II. 713.
— Farinae Hordei, 785.
— farinaceum, 785.
— Far. Lini emoll., II. 77.
— fermentans, 669.
— Fermenti, 669.
— — Panis theriac., II. 302.
— Goulardi, II. 361.
— iodurstum, II. 740.
— irritans, II. 601.
— ad ischias, 370.
— contra ischuriam, 98.
— Lini c. Galbano, 98.
— maturans, 16. 98. 358. 485. 669. II. 439.
— Medullae Panis, 137. II. 321.
— — — c. Cicuta, 545
— de Mica Panis, II. 321.

Cataplasma Micae Panis anod., 611.
— narcoticum, 790. 792.
— Nicotianae, II. 248.
— Nidi Hirundinis, 611.
— c. Opio, II. 278.
— Panis, II. 321.
— —, Lactis et Malvae, II. 321.
— e Panis Medulla, II. 321.
— Papav. et Hyosc. comp. 792.
— pomaceum, 611.
— Pradierii, 326.
— pus maturans, II. 439.
— repercutiens, II. 361.
— resolvens, 98. 138. 483. 485. 669. 761. II. 361. 439.
— — ad scirrhos, 545.
— roborans, 707.
— rubefaciens, II. 346.
— saponaceum, II. 439.
— saturninum, II. 361.
— sedans, II. 266.
— sedativum, 611. II. 266.
— simplex, 785.
— Sinapeos, II. 601.
— sinapinum, acre, II. 601.
— — mite, II. 601.
— Sinapis, II. 601.
— — discutiens, II. 601.
— — comp., II. 602.
— ad singultum, II. 302.
— stypticum, 689.
— suppurativum, II. 677.
— theriacale, II. 302.
— virosum, 790.
— vomitivum, II. 248.
Catapotia ad catarrhos, II. 288.
Cataputia, 466.
— minor, 466.
Cataria, 466. 467.
Catechu, 467.
— depuratum, 467.
Catelli, 719.
Cathartina, II. 577.
Cathartinum, II. 577.
Cathartocarpus Fistula, 454.
Catholicum dupl., II. 583.
Caules Angelicae canditae, 212. v. Stipites.
Cauda equina, 658.
— — minor, 658.
Causticum alcalinum, II. 391.
— ammoniacale, 164.
— antimoniale, 250.
— arsenicale, 287.
— commune, II. 391.
— — fortius, II. 391. 392.
— — mitius, II. 392. 393.
— — c. Opio, II. 393.
— lunare, 277.
— potentiale, II. 391.
— salinum, II. 391.
— vegetabile, II. 390.
Cauterium potentiale, II. 391. 393.
Ceanothus, 473.
— Americana, 473.
Cedria, II. 347.
Cedronella, II. 111.
Cendre bleue, 619.
— verte, 619.
Centaurea Behen, 339.
— benedicta, 442.
— Calcitrapa, 373.
— Centaurium, 473.
— Cyanus, 633.
— Jacea, II. 22.
— febrifuga, 473.
— lanata, 426.
Centaureum minus et majus, 473.
Centaurium, 473.
— majus, 473.
Centaurium minus, 473.
— officinale, 473.
Centinodia, 476.
Centummorbia, II. 90.
Centumnodia, 476.
Cepa — Allium Cepa.
Cephaelis Ipecacuanha, II. 12.
Cera, 265.
— alba, 265.
— — in massis et in offis, 266.
— arborea, II. 673. 674.
— citrina, 265.
— cruda, 265.
— depurata, 265.
— flava, 265.
— — purificata, 266.
— inaurata, 629.
— ad labia, 481.
— purificata, 265.
— viridis, 629.
Ceramium aegagropilum, 781.
— albinum, 781.
— cancellatum, 781.
— catenatum, 781.
— forcipatum, 781.
— gracile, 781.
— Helminthochortos — Helmintoch
— incurvum, 781.
— scoparium, 781.
Cerasa acida, 477.
— nigra et rubra, 477.
Cerasi Gummi, 771.
Cerasus, 476.
— acidus, 476.
— Avium, 477.
— Lauro-Cerasus, 477.
— Mahaleb, 477.
— niger, 476.
— Padus, 476.
— racemosus sylvestris, 476.
— ruber acidus, 476.
— Virginiana, 477.
— vulgaris, 477.
Ceratia, 479.
Ceratonia, 479.
— Siliqua, 479.
Ceratum — Linim. simpl.
— Acetatis Plumbi, II. 368.
— — plumbici, II. 363.
— adhaesivum, II. 674.
— Aeruginis, 629.
— album, 479.
— — Cetti, 479.
— — simplex, 479.
— de Althaea, 138.
— ad ambusta, II. 726.
— Ammoniaci, 360.
— anodynum, II. 287.
— antipsoricum, II. 143.
— arsenicale, 289.
— Arsenici, 289.
— Axungiae, 262.
— Bammel, II. 111.
— Betonicae, 348.
— Calaminae, II. 725.
— calaminare, II. 725.
— camphoratum, 501.
— Cantharidis, 428. 432.
— Cantharidum s. c. Cantharide, 432.
— — camphorat., 433.
— Carbonat. Zinci impuri, II. 725.
— de Cerussa, II. 365.
— Cerussae, II. 365. 363.
— — comp., II. 384.
— Cetacei, 479.
— — album, 479.
— — rubrum, 481.
— Cetti, 479.
— c. China, 517.
— Chinae camphorat., 522.
Ceratum citrinum, II. 673. 674. 675. 676.
— coeruleum, II. 365.
— commune gummosum, 360.
— cosmeticum, 369. 480.
— detergens, II. 155.
— Diapalmae, II. 377.
— Diapompholigos, II. 726.
— emolliens, 98.
— epuloticum, II. 725.
— exploratorium, II. 438.
— exsiccans, II. 177. 364. 726. 13.
— — Kirklandi, II. 364.
— flavum, 268.
— fuscum, II. 371.
— Galbani crocatum, 362.
— Galeni, 267.
— Goulardi, II. 365. 367.
— Hufelandi, II. 720.
— Juniperi Virgin., II. 45.
— ad labia, 268. 481.
— labiale, 268. 369. 481. II. 258.
— — album, 479.
— — rubrum, 481.
— Lapidis calamin., II. 725. 728.
— Lithargyri, II. 363.
— — acetati, II. 365.
— Lithargyrii, II. 303.
— Lyttae, 432.
— Marshall's, II. 204.
— Meliloti simplex, II. 111.
— Mercantini, II. 353.
— mercuriale, II. 134. 135. 143. 151. 152.
— — Falckii, II. 155.
— Minii, II. 352.
— — gummoso-resinosum, II. 354.
— mundificans balsamic., 481.
— neutrale Kirklandi, II. 361.
— Nicotianae, II. 249.
— nigrum, II. 673. 674.
— Noricum, II. 381.
— Norimbergense, II. 381.
— oleo resinosum, II. 672.
— ophthalmicum, II. 726.
— opiaceum, II. 261.
— opiatum, II. 282.
— Oxy-Carbonatis Zinci, II. 725.
— Oxydi Plumbi semivitrei, II. 372.
— — Merc. rubri per Acid. nitr., II. 153.
— Plumbi, II. 363.
— — Acetatis, II. 368.
— — comp., II. 363. 365.
— — Subacetat liquidi, II. 365.
— — Subcarbonat. comp. II. 384.
— — Superacetatis, II. 365.
— e Plumbo, II. 363.
— Potti, II. 368.
— de Ranis c. Mercurio, II. 135.
— de Réchoux, 175.
— refrigerans Galeni, 267.
— Resinae, II. 673. 674. 675.
— — Burgundicae, 138.
— — flavae, II. 673. 675.
— — Pini, II. 673. 674.
— — — Burgund. resinos., II. 673.
— resinosum, II. 673. 677.
— — comp., II. 673. 677.
— rubrum, II. 159. 352.
— — camphorat., II. 353.
— Sabinae, II. 41.
— saponaceum, II. 368. 445.
— Saponis, II. 368. 443.
— Saturni, II. 362. 367.

Ceratum Saturni Goulardi, II. 363.
— saturninum, II. 367. 375.
— simplex, 267. 479.
— Spermatis Ceti, 479.
— Subacetate Plumbi medicat., II. 363.
— e Sulphure, II. 639.
— tabacinum, II. 249.
— Turneri, II. 725.
— viride, 629.
— Zinci Carbonatis impuri, II. 725.
— e Zinco, II. 725.
Ceraunius, 380.
Cerberus triceps, 232.
Cerefolium, 483.
— Hispanicum, 483.
Cerei medicati, II. 362.
Cereoli albi, II. 362.
— communes, II. 362.
— Bellii, II. 373.
— demulcentes, 269.
— elastici, II. 470.
— emollientes, 269.
— exploratorii, 269. II. 373.
— Falckii, II. 155.
— c. Kali caust., II. 393.
— medicati, II. 362.
— mercuriales, II. 137. 178. 205.
— — dissolubiles, II. 192.
— mitigantes, II. 362.
— Plumbi Acetatis, II. 362.
— plumbici, II. 362.
— Saturni, II. 362.
— saturnini, II. 362.
— simplices, 269. II. 373. 445.
Cerevisia, 479.
— Absinthii, 8.
— adstringens, II. 461.
— amara, 4.
— antihydropica, II. 32.
— antiicterica, II. 585.
— antiscorbutica, 3. 581. II. 464. 575.
— antispasmodica, II. 704.
— aperiens, II. 602.
— aperitiva, II. 602.
— Armoraciae, II. 464.
— aromatica, 414.
— cephalica, II. 704.
— Chinae, 528.
— Cochleariae, 581.
— Colocynthidis, 592.
— diuretica, II. 602.
— ad hydropem, II. 32.
— martialis, 698.
— Pini comp., 3.
— — Turionum, II. 464.
— e Pini Turion. alba, II. 341.
— — — fusca, II. 341.
— prophylactica, 528. II. 743.
— purgens, II. 32. 586.
— quercina, II. 461.
— sinapisata antichol., II. 744.
— stimulans, II. 602.
— stomachica, 736.
Cerinum, 660.
Ceromel, 265.
Cerussa, II. 354.
— acetata, II. 365.
— alba Hollandica, II. 354.
— — Norica, II. 354.
— Antimonii, 229.
— citrina, II. 352.
— in lamellis — C. alba
— nigra, 673.
— vera, II. 352.
Cerussae laevigatio, II. 354.
Cervaria alba — Gentiana alba.
— nigra, II. 576.
Cervi cordis ossa, 387.
— priapus, 720.
Cervus Alces, 721.
Cervus Dama, 386.
— Elaphus, 386.
Cetaceum, 479.
Ceterach, 482.
— officinarum, 482.
Ceti auris, 387.
— priapus, 720.
Cetinum, 479.
Cetraria Islandica, II, 66.
Cevadilla, II. 521.
Chacarilla, 451.
Chaerefolium, 483.
Chaerophyllum, 482. 483.
— odoratum, 483.
— sativum, 482.
— sylvestre, 483.
Chalcantum album, II. 728.
Chalcitis, 678. 686.
Chalybs, 669.
— praeparatus, 670.
— — cum Aceto, 676.
— tartarisatus, 701.
Chamaeacte, II. 534.
Chamaeclema, 774.
Chamaecyparissus, II. 542.
Chamaedrys, II. 678.
— aquatica, II. 680.
— sylvestris, II. 711.
Chamaeleagnus, 715.
Chamaeleo album, 446.
Chamaemelum nobile, 485.
— Romanum, 485.
— vulgare, 484.
Chamaemorus, II. 514. 679.
Chamaepitys, II. 679.
— Monspeliaca, II. 679.
Chamaerops humilis, 338.
Chamomilla, 484.
— foetida, 485.
— nobilis, 485.
— Romana, 485.
— nostras, 484.
— vulgaris, 484.
Chanca lagua, 661.
Charta ad cauterium, 269. II. 655.
— cerata, 269.
— Curcumae, 632.
— explorat. coerulea, II. 50
— — lutea, 632.
— — rubefacta, II. 50.
— — rubra, II. 60
— Charta Laccae musci, II. 50.
— Rhabarbari, II. 485.
— vesicans, 640.
Cheiranthus Cheiri, 494.
Cheiri, 494.
Chelae Cancrorum s. Cancri, 380.
— — praeparatae, 382.
Chelapa, II. 23.
Chelidonium, 491.
— Glaucium, 495.
— majus, 491.
— minus, 494.
Chelonites, 385.
Chelsea pensioner, II. 637.
Chenevix's antimon. powder 231.
Chenopodium, 496.
— ambrosiacum, 495.
— ambrosioides, 495.
— anthelminticum, 496
— bonus Henricus, 496.
— Botrys, 490.
— Quinoa, 499.
— viride, 496
— Vulvaria, 496.
Chermes Grana, 497.
Chimaphila corymbosa, 499.
— umbellata, II. 455.
China, 499. 500.
— Carthaginensis, 501.
— China, 500.
China coronae, 500.
— flava, 501.
— fusca, 500.
— orientalis, 499.
— ponderosa, 499.
— regia, 501.
— rubra 501.
— vera, 499.
Chinachina, 500.
Chinina, 535.
Chininium, 535.
— sulphuricum, 536.
Chininum, 535.
— sulphuricum, 536.
Chinium, 535.
— sulphuricum, 536.
Chironia Centaurium, 473.
Chloras Calcis, 377.
— Deutoxydi Potassii, II. 419.
— kalicus depurat., II. 419.
— — venalis, II. 419.
— Potassae s. Potassii, II. 419.
— Protoxydi Potassii, II. 419.
— Sodae, II. 605.
Chloretum Auri c. Chloreto Natrii, 317.
— Barii c. Aqua, 333.
— Calcariae, 377.
— Calcii, 389.
— Ferri, 690.
— Hydrargyri, II. 159.
— Natrii, II. 605. 606.
Chloridum Barii, 331.
Chlorina, 540.
Chlorinum, 540.
Chloroxylum verticillatum, II. 643.
Chlorum, 540.
— Aqua solutum, 541.
— Calcariae, 377.
— liquidum, 541.
— Natrii, II. 606.
— solutum, 541.
Chloruretum Antimonii, 251.
— Auri, 316.
— — et Sodii, 317.
— — — praeparatum, 317.
— Barii, 333.
— Calcii, 389. 390.
— — oxydatum, 377.
— Calcis, 377.
— Magnesii, II. 97.
— Ferri 690.
— Mercurii subl. aut praecip parat., II. 159.
— Oxydi Calcii, 377.
— Platinae s. Platini, II. 350.
— Platini et Sodii, II. 350.
— Plumbi, II. 351.
— Potassae, II. 419.
— — oxydat., II. 419.
— Potassii, II. 420.
— — protoxydatum, II. 419.
— Sodae, II. 605.
— Sodii, II. 605.
— — Protoxydi, II. 605.
— Stanni, II. 625.
— Zinci, 722.
Chocolata alba, II. 525.
— antivenerea, II. 188.
— aromatica, 368.
— Castaneae, 457.
— c. Hydriodate Ferri, II. 742.
— Lichenis Island., II. 67.
— medica, 357.
— purgans, II. 175.
— simplex, 367.
— c. Vanilla praep., 368.
— Vanillae odore, 368.
Christophoriana, 68.
— Americana, 68.
Chromas Potassae, II. 436.

Digitized by Google

Chrysanthemum Leucanth. 542.
Chrysocolla, 619. II. 611.
Chrysolithus, 143. 386
Chrysomela Populi sanguinol., 578.
Chrysoprasius, 133
Chrysosplenium alternifol. u. oppositif., II. 555.
Cicer, 542.
— arietinum, 542.
Cichorium. 543.
— agreste, 543.
— Endivia, 543.
— Intybus, 543.
Cicuta, 544.
— aquatica. 544.
— major, 545.
— terrestris, 545.
— virosa. 544.
— vulgaris, 545.
Cicutaria, 483.
— aquatica, 544.
— latua, 544.
— vulgaris, 483.
Cicutina s. Cicutinum, 545.
Cina, 551.
Cinara v Cynara.
Cinchona angustifolia, 501.
— Caribaea 500.
— condaminea, 501.
— cordifolia, 501.
— grandifolia, 501.
— floribunda, 501.
— lanceolata. 501.
— lancifolia, 501.
— nitida, 501.
— oblongifolia, 501.
— officinalis — China.
— ovata. 501.
— pallida. 501.
— purpurea, 501.
— rubra, 501.
— scrobiculata, 501.
Cinchonia, 551
— acetica. 556.
— sulphurica, 555.
Cinchonina. 554
— acetica. 556.
— sulphurica. 555.
Cinchoninum. 554.
— aceticum 556.
— sulphuricum, 555.
Cinchonium, 554.
— aceticum. 556.
— sulphuricum, 555.
Cincus marinus 720.
Cineres Animalium ustae, 381.
— clavellati, II. 398. 399.
— — depurati. II 398.
— Herbarum. II. 398.
— perlati, II 398
— Russici etc. II. 398.
Cinis infectorius, II. 398
— Plumbi s. Plombi. II. 352
— faecum, II. 398.
Cinnabaris, II. 156.
— Antimonii. II 143.
— artificialis. II. 156.
— factitia. II. 156
— nativa, II 156.
— nativae laevigatio, II. 156
— praeparata, II. 156.
Cinnamomum, 402.
— acutum, 403.
— Cayennense, 403.
— e China. 403
— Indicum. 403.
— Magellanicum, 605.
— Sinense 403.
— verum. 403.
— Zeylonense, 403.
Cissampelos. 556.
— Caapeba, 556.
— Pareira. 555.
Cistus Creticus, II. 53
Cistus ladaniferus, II. 53.
Citini, II. 451.
Citras Ammoniaci, 193.
— Ammoniae. 193.
— Calcariae animalis, 391.
— calcicus. 391.
— Calcii Protoxydi. 391.
— Calcis, 391.
— Chinini, 539.
— Ferri, 700.
— kalicus, II. 426.
— kalinus, II. 426.
— Morphinae. II. 224.
— Morphini. II. 224
— Potassae, II 426.
— — aquosus. II. 426
— Potassii Protoxydi, II. 426.
Citrullus, 615
Citrus. 556. 569.
— acida, 568.
— Aurantium. 556.
— Limonum, 568.
— Medica vulgaris et acida. 568.
Cladonia Islandica, II. 66.
Claretum aromaticum, 224.
— Fructuum 478.
— ex sex Seminibus, 604.
Clava Herculis, II. 719.
Clematis. 576. II. 712.
— crispa. 577.
— erecta 576
— Vitalba. 577.
Clinopodium montanum, II. 684
Clusia alba et rosea. II. 652.
Clutia Eluteria, 451.
Clymenum Italorum. 797
Clysma antispasmodicum. 397. v. Enema
— — resolvens, II. 606
— adstringens. II. 452.
— antilacteum 69.
— ad ascarides v. Enema ad asc.
— camphoratum, 397.
— commune v Enema.
— emolliens. 202
— — anthelminth, II. 492.
— excitans, v Enema
— Granator. Corticum. II. 452
— grassum. 69.
— incitans. 397.
— — et sedans. 301.
— involvens. II 78.
— nutriens. 722.
— oleosum. II 78. 251.
— purgans v. Enema.
— refrigerans. 615.
— resolvens, II. 440.
— Sabadillae II. 521
— sedans et adstring., II. 367.
— — et emolliens, 202. II. 314.
— ad soporosos affectus, 263
— tonicum et antispasmod., 301.
— Vini antim irritans, 263.
Clyssus Antimonii. 61.
— Sulphuris, 61.
Clyster vide Enema.
Cnicus benedictus, 442.
— lanatus. 446.
— tinctorius, 446.
Coagulum aluminos officinale, II. 315.
Cobaltum, 577.
Coccinella, 578.
— bipunctata. 578.
— septempunctata. 578.
Coccionella, 578
Coccognidium, 638.
Coccoloba uvifera, II. 46.
Cocculus, 578.
— Indicus, 578.
— palmatus, 594.
— suberosus, 578.
Coccus, 578.
— baphica, 497.
— Cacti 578.
— — coccinelliferi, 578
— cnidius, 638.
— Ficus, II. 48.
— Ilicis, 497.
— Laccae, II. 48.
Cochlearia, 579.
— Anglica. 579
— Armoracia, II. 463.
— Batava. 579
— Britann. marina, 579.
— Coronopus. 605
— hortensis, 570.
— officinalis. 579.
— vulgaris, 579.
Cochlearinum, 579.
Cochlearum Folia, 380.
— Opercula, 380.
— Testae, 379.
Cocos butyracea, II. 254.
Codagapala. 584.
Coeruleum Berolinense 707.
— Borussicum, 707.
— montanum, 619.
— Parisiense, 707.
— Prussicum nativum. 684
Coffea, 584.
— Arabica, 584.
— c. Cort. Peruviano, 502.
— Glandium, II. 461.
Coix Lacryma, II. 51.
Colchicum, 585.
— autumnale. 585
— Hermodactylus. 784.
— Illyricum, 784.
Colcothar. 678.
— artificiale, 686.
— nativum. 678.
— Vitrioli, 678.
Cold punch, 95.
Colla, 719.
— Piscium, 719.
Collutorium acidulum, 35. Littus acid.
— adstringens, 149. II. 370. 499. 612. 729. 734.
— alcalinum. II. 502.
— aluminosum 159.
— antiodontalgicum, 792. II. 259. 454.
— antiscorbuticum, 378. 573. 583. 584. 644.
— c. Borace s. boraxatum, II. 612.
— Catechu, 472
— — saturninum. II 370.
— detergens, 51 II. 239. 499
— — et adstring., 58.
— excitans. II. 454. 603.
— humectans. 574.
— gingivale. 583.
— mercuriale, II. 191.
— opiatum s. opiaceum, II 266.
— saturninum. II. 360.
— stalagogum. II. 454.
— Sinapi, II. 602
— Zinci Sulphatis vel Vitr. alb, II. 729
— e Zinco comp. II. 731.
Collyrium Acetat. Ammoniae liq., 187.
— Acidi acetici, II. 501.
— adstringens. 621. 760. II. 360. 501. 724. 730. 731. 733.
— — sedativum, II. 369

Collyrium Aluminis, 149.
— aluminosum, 149.
— anodynum, 611. II. 266. 281.
— antiphlogisticum, II. 360.
— antivenereum, II. 163
— boracicum II. 613.
— de Brun 105
— coeruleum, 627.
— crocatum, 611.
— cupratum, 621. 622.
— detergens, 623. II 730.
— detersivum, II. 730.
— emolliens, 134.
— exsiccans, 647.
— Fernandezii, II. 180.
— ferruginosum, 686.
— Gimbernati II. 393.
— Goulardi, II. 360.
— ex Hydrarg. mur. corros, II. 183. 191.
— Hydr. Oxymur., II. 183.
— Hydriodatis zincici, II. 722.
— Hyoscyami, 791.
— de St. Jerneron, II. 732.
— Lanfranci, 285.
— leniens, II. 281.
— mercuriale, II. 183.
— molle, II. 732.
— ex Muriate Hydr. oxygenato, II, 182.
— narcoticum. II, 280.
— Neumanni, 187.
— Nihili, II. 725.
— Opii, II. 273. 281.
— — c. Camphora, II. 281
— opiaceum, II. 264 278.
— plumbatum, II. 362.
— Plumbi Acetatis, II. 360.
— — — et Opii, II. 361.
— resolvens, 182. 611. 623. 628 631. II. 360 369. 724. 731.
— roborans, 258
— rubrum, 105. II. 404.
— Sacchari Saturni, II. 369.
— de Salibus igne fusis, 622. 623.
— saphirinum. 627
— saturninum, II 362.
— sedans, II. 281.
— sedativum, 611.
— siccum, II. 151. 176. 189 724.
— — ammoniacale, 155.
— simplex. 373.
— Stierncronense, II. 732.
— Supersulphat. Alum. et Potass., 149.
— tenquianum, II. 371.
— tonico adstringens, 623.
— tonicum, II. 732.
— Vitrioli albi s. e Vitriolo albo, II 729.
— — coerulei, 622.
— vitriolicum, II. 729.
— Zinci. II. 729.
— — Acetatis, II. 733.
— — Iodatis, II. 722.
— — Sulphatis, II. 729.
— — — c. Plumbi Acetate, II. 731.
— — — camphoratum, II. 730.
— zincicum, II 725.
— e Zinco, II. 725.
— — comp, II. 733.
— — sulphurico. II. 729.
Colocynthina, 587.
Colocynthinum, 587.
Colocynthis, 587.
— praeparata, 587.
Colomba, 591.
Colombo, 594.
Colophonia, II. 671.
Colophonium, II. 671.
Color Indicus, II. 1.
Coluber Natrix, 719.
— Berus, 719.
Colubrina, 230. 351.
Columbo, 594.
Colutea arborescens, 596. II. 577.
Conchae, 379.
— calcinatae, 374.
— citratae, 391.
— marinae. 379.
— — praeparatae, 381.
— Ostrearum, 379.
— praeparatae, 381.
— sulphuratae, II. 635
— ustae, 374.
Concinnum, II. 458.
Concrementa Astaci, 381.
— Cancrorum, 381
Conditum antiepilept., II. 282
— anthelminticum, II. 27.
— Calami, 370.
— catechuicum. II. 304.
— corroborans, II. 672.
— Cydoniorum, 633.
— epilepticum, II 701.
— febrifugum, II. 667.
— hydrargyro-unguinos., II. 128.
— Iridis saccharatum, II. 21.
— muscarium, 152.
— nephreticum, II. 655.
— pectorale, II. 637.
— purgativum, II. 476.
— Satyrii, II. 524
— tamarindinaceum, II. 582.
— ad vermes, II. 27
— vermifugum, II. 27.
Coneina s. Coneinum 545.
Confectio Alkermes, 498.
— Amygdalae, 194.
— Amygdalarum, 194.
— Anisi laxativa, II. 27.
— Archigenis, 407.
— aromatica, 407. II. 735.
— Aurantior. Cort., 567.
— Calami arom., 371.
— cardiaca, 407.
— Cassiae, 455.
— — Fistulae, 455.
— Chinae antiepilept. (Fulleri), 510.
— — antimonialis. 510.
— Cinae Seminis, 653
— Cinnamomi regia, 408.
— communis. 407.
— cordialis. 407.
— Cynosbatos s. Cynosbati, II. 494
— Diaprunum, II. 579.
— Diascordii, II. 304.
— Fistulae. 455.
— Foeniculi, 208.
— Hamech, 588.
— hyacinthina, 610.
— de Hyacintho, 610.
— Hyacinthor. c. Acido s. comp, 610.
— Japonica, 470. II. 304.
— Iridis II. 21.
— Kinae adstringens Fulleri, 509.
— — antiepilept., 510.
— Margarit. kermesina, 498.
— mithridatica Damocratis, II. 290.
— opiata, II. 301.
— Opii, II. 293
— passulata. II 579.
— — cathartica, II. 579.
— Paulina. 407
— de Prunis, II. 579.
— — Rebecha, II. 82.
Confectio Rosae, II. 493.
— — caninae. II. 494.
— — rubrae s. Gallicae, II 493. 494.
— Rosarum, II. 493.
— — rubr. Flor, II. 493
— Rutae. II. 519.
— Santalor. cordial., 610.
— Scammoneae, II. 558.
— Sennae, II 579
— — composita, II 582.
— Tanaceti sicca, II. 647.
— vermifuga, 553.
Conium maculatum, 545.
Conserva Absinthii, 12.
— Acetosae. 16.
— Acetosellae, 16.
— adstringens, II. 494.
— Amygd. dulcium, 196.
— Angelicae, 211.
— Anthos, II. 605
— antiscorbutica. 579. II. 244. 463
— Apii, 271.
— Ari. 295.
— Aurantii. 557.
— Aurantior. Cort., 557.
— — Flor., 557.
— Beccabungae, II. 711.
— Bellidis min., 339.
— Betonicae, 348.
— Borraginis, 352.
— Botryos ambrosioidis, 497.
— Buglossi, 205.
— Calend. Flor, 393.
— Capilli Ven., 71.
— Cardui bened., 443.
— Caryophyll. rubr., 645.
— Cassiae, 455.
— de Cedra, 569.
— Centaurii min., 474.
— Cerefolii, 283
— Chamaemeli Flor., 485.
— Chamomill. Flor., 485.
— Cichorii, 543.
— Cicutae, 545.
— Citri, 569.
— — Aurantii, 557.
— Cochleariae. 579.
— Consolidae maj., 597.
— Cornorum, 605.
— Cydoniorum. 633. 634.
— Cynosbatos s. Cynosbati, II. 494.
— Dactylorum, II. 334. 335.
— depectorans, 235.
— Erucae, 355.
— Eryngii, 659.
— Erysimi, 660.
— Farfarae, 667.
— Fumariae, 712.
— Genistae, 732.
— Hederae terrestr, 774.
— Hyssopi, 801.
— Inulae. II. 2.
— Juniperi, II. 39.
— Lauro-Cerasi, 477.
— Lepidii, II. 65
— Lilior. Convall. Flor., 601.
— — albor. Flor., II. 75.
— Majoranae, II. 311.
— Malvae, II. 100.
— Marrub. albi. II. 105.
— Melissae. II. 112.
— Melonum, 614.
— Menthae s Menth. Folior., II. 118.
— Mesembryanth. cryst., II. 214.
— Millepedum, II. 218.
— Nasturtii II. 244.
— Nymphaeae, II. 253.
— Orchidis, II. 524.
— Paeoniae, II. 310.

Conserva Persicor. Flor, II. 330.
— Plantaginis, II. 349.
— Portulacae, II. 389.
— Primulae veris, II. 446
— Prunae sylvestr., II. 448.
— Prunorum, II. 448.
— — depurata, II. 448.
— — leniens, II. 448.
— — sylvestr., II. 448.
— resolv. et aperiens, II. 423.
— Rhododendri chrysanthi, II. 486.
— Rhoeadis, II. 322.
— Ribium nigr. Fol., II. 488
— Rorismarini, II. 505.
— Rosae, II. 493.
— — canin. Fruct., II. 494.
— — Gallicae, II. 493. 494
— — rubr. Petalor., II. 493
— Rosarum, II. 493.
— — adstringens, II. 494.
— — anthelmint., II. 494.
— — mercuriata, II. 494
— — rubrarum Florum, II 793.
— — sicca, II. 494.
— — omni tempore paranda, II. 493.
— — vitriolata, II. 494
— Rutae, II. 519
— Sabinae, II 39.
— Salviae, II. 528.
— Scordii, II. 680.
— Sorbi Fruct., II. 620.
— spagyrica, II. 408.
— Symphyti, 597
— Tamarindorum, II. 644.
— Tanaceti, II 647.
— Tiliae, II. 686.
— Trifolii fibrini, II. 692.
— Veronicae, II. 711.
— Violarum, II. 714.
— — sicca, II. 714.
Consolida, 597.
— major, 597.
— media, 88
— minima, 339.
— minor, II. 447.
— regalis, 643.
— Saracenica, II. 716.
— tuberosa, 597.
Contrayerva, 599. 600.
— alba, 599.
— Drakena, 600.
— Germanica, 307.
— major, 599.
— Mexicana, 599.
— nova, 599.
— Virginiana, 280.
Convallaria majalis, 601.
Convallium majale, 601.
Convolvulus arvensis, 603.
— Brasiliensis, II. 556.
— Jalapa s. Jalappa, II. 23.
— major, 603.
— Mechoacanna, II. 109.
— minor, 603
— panduratus, 603.
— Scammonia, II. 556.
— scoparius, II. 73.
— sepium 603.
— Soldanella, II. 619.
— Turpethum, II. 695.
Conyza coerulea, 658.
— major, 659.
— media, II. 2.
— minor, 658.
— — vera, 659.
— squarrosa, 603.
— vulgaris, 603.
Copaiba factitia, 325.
Copaifera officinalis, 321.
Copaiva, 321.
Copal Resina, 603
Coptis trifolia, 604.
Coral tooth powder, 385.
Corallia praeparata, 381.
Corallina, 781.
— Corsicana, 781.
— officinalis, 781.
— officinarum, 781.
— rubens, 781.
— rubra, 781.
Corallium album, 379.
— nigrum, 380.
— praeparatum, 381.
— rubrum, 376.
Cordia Myxa, II. 241.
Cordial, clove, II. 344.
— ,coriander, 604.
— ,Chamberlain's bilious, II. 36.
Cordiale nervinum de Brodum, 126. 707.
— equorum, 164.
— Warneri, II. 588.
Coreopsis bidens, 65.
Coriandrum, 604.
— sativum, 604.
Coriaria myrtifolia, II. 577.
Corn plaster, 629.
— — ,Kennedy's, 629.
Cornina, 605.
Corninum, 605.
Cornu Alces, 386.
— Cervi, 386.
— — auratum, 318.
— — praep. sine igne, 387.
— — — philosophice, 387.
— — pulveratum, 386.
— — raspatum, 386.
— — ustum, 387.
— — — album, 387.
— — — nigrum, 387.
— — — praeparat, 387.
— cervinum, II. 349.
— Rhinocerotis, 386. 721.
— Unicornu, 386.
— ustum nigr., alb., praep., 387.
Cornus, 604. 605.
— circinnata, 604.
— florida, 605.
— mascula, 605.
— sericea, 605
Coronopus Ruellii, 605.
Corpus pro Bals. Saponis, II. 670.
— — — Sulph., II. 638.
Corrector Opii, II. 669.
— Starkeyi, II. 669.
Cortex Chinae Caraibicae, 500.
— — Calisayae, 501.
— — Caribaeae, 500.
— — Carolinensis, 500.
— — flavae, 501.
— — flavus, 500.
— — fuscus, 500.
— — luteae, 501.
— — officinalis, 500.
— — Luziana, 501.
— — montana, 501.
— — Piton, 501.
— — regiae, 501.
— — regius, 501.
— — ruber, 501.
— — rubrae, 501.
— — St. Luciae, 501.
— Citri, 569
— Conessi, 581.
— Limonis, 569.
— Magellanicus, 605.
— Peruvianus, 500.
— — flavus, 501.
— — fuscus, 500.
— — officinalis, 500
— — regius, 501.
— — ruber, 501.
Cortex Chinae tritus reductus, 501.
— Pocgereba, II. 384.
— profluvii, 584.
— quercinus, II. 458.
— regius, 501.
— Winteranus, 605.
— — spurius, 402. 606.
Corydalis bulbosa, 712.
Corylus, 606.
— Avellana, 606.
Costa, 801.
Costus, 606.
— amarus, 606.
— Arabicus, 606.
— corticosus, 402. 606.
— dulcis, 402 606.
— hortorum 321.
— nostras, 801.
— speciosus, 606.
Cotinus, II. 487.
Cotonea, 633.
Cotula, 485. 606.
— aurea, 606.
— foetida, 485.
Cotyledon lutea, 607.
— Umbilicus, 606.
Cough medicine, Cochrane's, II. 328.
Coumarouma odorata, 566.
Coutarea speciosa — China flavi
Coxae Ranarum, 720.
Crameria triandra, II. 467.
Craniu n humanum, 386.
Crassula, 607.
— major, 607.
Cream of tartar, british, II. 430.
Crataegus Oxyacantha, II. 215.
Crême d'orange, 561.
— de menthe, II. 124.
Cremor, II. 48.
— Cinnabaris, II. 156.
— cosmeticus, 480.
— Hordei, 785. 788.
— Oryzae, II. 313.
— pectoralis, 39. 331. 369.
— Tartari, II. 429. 430.
— — Borace solubilis, II. 434.
— — reductus, II. 430.
— — solubilis, II. 434.
Crepitus Lupi, 353.
Creta, 378.
— alba, 378.
— argentaria, 378.
— barotica, 330.
— Brianzonica, II. 97.
— Gallica, II. 97.
— Hispanica, 379.
— Plumbi, II. 354.
— plumbica, II. 354.
— ponderosa, 330.
— praecipitata, 381.
— praeparata, 381.
— pura, 378.
— sartoria, 379.
— Sodae, II. 608.
— Umbria, 678.
Cristallum, Cristallus vide Crystall.
Crithmum, 607.
— maritimum, 607.
Crocus, 607.
— Antimonii, 234.
— autumnalis, 607.
— Ferri, 680.
— Martis, 678. 680.
— — adstringens, 678.
— — aperiens, 680.
— — aperitivus, 679 680.
— — — antimoniatus, 679
— — rore majali part., 680
— — sulphuratus, 679.

Crocus Martis vitriolatus, 678.
— Metallorum, 234.
— sativus, 607.
— Solis, 318.
— Veneris, 619.
Croton Cascarilla, 451.
— castaneifolium, II. 48.
— Eleutheria, 451.
— Eluteria, 451.
— lacciferum, II. 48.
— Moluccanum, 612.
— sebiferum, 612.
— Tiglium, 612.
— tinctorium, II. 49.
Cruciata, 613.
Crysoprasius, 143.
Crystalli Lunae, 277.
— lunares, 277.
— Tartari, II. 429.
— — pulverisati — Cremor Tart.
— Veneris, 630.
Crystallum minerale, II. 411. 412.
Crystallus mineralis, II. 411. 412.
Cubeba, 613.
Cubebae, 613.
Cuculus, II 244.
Cucumis, 614.
— agrestis, II. 219.
— asininus, II. 219.
— Colocynthis, 587.
— hortensis, 614.
— Melo, 614.
— sativus, 614.
Cucurbita, 614. 615.
— Citrullus, 614.
— Lagenaria, 615.
— Pepo, 615.
Culen, 615.
Culilaban, 615.
Culilawan, 615.
Cuminum, 615. 616.
— Cyminum, 615.
— nigrum, II. 249.
Cunila bulbula. II. 311.
— Mariana, 616.
— sativa. II. 554.
Cupressinus officinalis, 662.
Cupressus, 616.
— sempervirens, 616.
Cupri Sulphas etc. v. Sulphas Cupri etc.
Cupridum Ammoniacae liquidum, 631.
Cuprum, 617.
— aceticum, 627. 630.
— Aceto corrosum, 627.
— aluminatum, 622.
— ammoniacale, 623.
— — vitriolicum, 623.
— ammoniacum, 623.
— ammoniato-muriat, 626.
— — sulphuricum, 623.
— ammoniacum, 623.
— Armenus, 619.
— calcinatum, 619.
— carbonat. coerul. terrestre, 619.
— — viride, 619.
— muriatico-ammoniacale, 626.
— oxydatum sulph., 620.
— purum, 617.
— — politum, 617.
— subaceticum, 627.
— sulphurico-ammoniatum, 623.
— sulphuricum, 620.
— venale, 617.
— vitriolatum, 620.
Cupulae Glandium Quercus, II. 458
Curaçoa, 561.
Curculio antiodontalg., 578.
Curcuma, 632.
— angustifolia, 285.
— aromatica — Zedoaria.
— longa, 632.
— rotunda, 632.
— Zedoaria — Zedoaria.
— Zerumbet, 457.
Curcumina, Curcuminum, 632.
Cuscuta, 632.
— Epithymum, 632.
— Europaea, 632.
— major, 632.
Cusparia, 219.
— Angustura s. febrifuga — Galipea C.
Cyanetum Kalii et Ferri venale, 40.
Cyanuretum Ferri, 707.
— — hydrateum, 707.
— Hydrargyri, II. 195.
— Mercurii, II. 195.
— Potassii, 39.
— Zinci, II, 722.
Cyanus, 633.
— segetum, 633
Cycas circinnalis, II. 523.
Cyclamen Europaeum, 633.
— officinale, 633.
Cydonia, 633.
— communis, 633.
— Cotonia, 633.
— vulgaris, 633.
Cymbalaria, 636.
Cyminum, 616.
Cyna, 551.
Cynanchum, 636.
— Arghel, II. 577.
— Monspeliacum, 636. II. 556.
Cynara Cardunculus, 636.
— Scolymus, 636
Cynips Gallae tinctoriae, 716.
— Quercus Folii, 716.
— Rosae, 338.
Cynocrambe, II. 125.
Cynoglossa major, 637.
— vulgaris, 637.
Cynoglossum, 637.
— officinale, 637.
Cynomorium, 637.
— coccineum, 637.
Cynorrhodon s. Cynorrhodum, II. 493.
Cynosbatos. II. 493.
Cyperus, 637.
— esculentus, 637.
— longus, 637.
— odoratus, 637.
— orientalis major, 637.
— Romanus, 637.
— rotundus, 637.
Cyphoides Galli, II. 661
Cyprus antiquorum, II. 64.
Cytinus Hypocistis, 831.
Cytiso-Genista, 732.

D.

Dactyli, II. 331.
Dactylus, II 331.
— Idaeus, 380.
Daedalea suaveolens, 351.
Dalbergia monetaria, II. 540.
Daphne, 638.
— Gnidium, 638.
— Laureola. 638.
— Mezereum. 638.
— Thymelaea, 638.
Daphnoides, II. 712.
Datisca Cannabina, 422.
Datura, 640
— fastuosa, 640.
— Metel, 640.
— Stramonium, 640.
Daturia, 640.
Daturina, 640.
Daturinum, 640.
Daucus. 642.
— Candianus, 310.
— Carota, 642.
— Copticus, 155.
— Creticus, 310.
— cyanops, II, 339.
— gummifer, 338. II. 310.
— nostras, 642.
— sativus, 642.
— sylvestris. 642.
— vulgaris, 642.
Decoctum adstringens. II. 688.
— album, 768. II. 320.
— — c. Gummi Mimosae, 725.
— — Sydenhami, II. 320.
— — tenuius, 769.
— Alcornoco Corticis, 96.
— Aloës s. Aloës comp. 119.
— Althaeae. 133.
— — officin., 133. 416.
— — c. Ammoniaco mur. 134. 182.
— — compositum, 133.
— — (Radicis) emolliens, 133.
— amaro-aromat. laxativum, II. 479
— amarum. 736. II. 457.
— — aethereum, 736.
— — alcoholisatum nervin., 736.
— — anthelmint., 552.
— — antifebrile, 511.
— Amygd. Persic. Fol., II. 331.
— Angusturae, 220
— anthelminticum. 108. 741.
— — Rosensteinii. II. 127.
— Anthemidis nobilis, 492.
— antiarthriticum, II. 549.
— antiasthmaticum, 466.
— anticachecticum, II. 596.
— antidysentericum. 70.
— antifebrile, 525.
— antihaemorrhoidale, II. 590.
— antiherpeticum, 656
— — et tonicum, 710.
— antihydropicum, 786.
— antiictericum, 527. 710.
— antilacteum, 716.
— antiperiodic. et pectorale, 524.
— antiphlogisticum, 786.
— antiphthisicum, 548.
— antipsoricum, 755.
— antiscorbuticum, 580. 787. II. 467
— antisepticum, 283. II. 681.
— antisyphilit. nutriens, II. 547.
— — Pollini, II. 36.
— — Yvo Gaukes, 755.
— antivenereum laxans, II. 548.
— — Musitani, II. 717.
— — Passerini vel Salvadorii, II 550.
— — Ulyssiponense II. 549.
— aperiens, 745. II. 482. 650.
— — et tonicum, II. 256.
— aperitivum, 283. 308. II. 514.
— — nitratum, 308.
— Araliae nudicaulis, 276.
— Arctii Lappae, 332.
— Arnicae Florum, 283.
— aromaticum, II. 529.
— Asparagi, 308.
— Astragali exscapi, 311.
— Aurantii Cort., 562.
— — Folior., 562.
— avenaceum Lowerianum, 319.

Decoctum Azederach Corticis, 320.
— Ballotae lanatae, 321.
— Bardanae, 332.
— Bignoniae Catalpae, 466.
— Bistortae, 351.
— Boraginis, 352.
— Bryoniae, 357.
— Carbonat Potass. Absinth., II. 403.
— Caricarum, 445.
— carminativo-emolliens, II. 100.
— carminativum, II. 103.
— — pro clystere, 210.
— e Carne gallinacea, 598.
— cum Carne pectorale, II. 71.
— Carnis antispasm., II. 317.
— — aperiens s. aperitiv., II. 514.
— — depurans, II 616.
— — purificans, II. 5.
— Caryophyllatae, 743.
— — aethereum, 743.
— — c. Cascarilla, 743.
— — c. Rheo, 743
— Cassiae s. Cassiae Fistulae, 455.
— Catechu, 471
— catholicum, II. 548.
— Centaurii minor., 474.
— Cerasor acid. siccor., 478.
— Chamaedryos s. Cham. amar., II. 679.
— Chamaemeli, 492.
— — compositum, 492.
— Chamomillae, 492.
— — comp., 492.
— Chinae, 520.
— — Radicis, 500.
— — acidum, 523.
— — alcalinum, 526.
— — c. Alumine, 522.
— — antiseptic. purgans, 527.
— — c. Arnica, 523
— — c. Caryophyllata et Opio, 523.
— — c. Cascarilla, 523.
— — c. China pulv., 525.
— — compositum, 525
— — — et laxans, 527.
— — factitium, 73.
— — c. Lichene, 524.
— — nitratum, 521.
— — opiatum, 521.
— — c. Potassa, 521.
— — c. Rheo, 525.
— — c. Senega, 524
— — c. Serpentaria, 525.
— — c. Valeriana, 526.
— Cichorii, 544
— Cinae, 555.
— Cinchonae, 520.
— — cardiacum, 525.
— — lancifoliae, 520.
— — officinalis, 520.
— Citri Myusichti, 575.
— Colombaes Colombo, 595
— — compositum, 596
— Colocynthidis, 591.
— commune, 492
— Consolidae, 597.
— contrastimulans Laennec, II. 741.
— Corallinae Corsicanae, 782.
— Corni floridae, 605.
— Cornu Cervi, 725.
— — — citratum, 724.
— — — compositum, II. 320.
— — — Elaphi comp., II. 320.
— — — gummosum, 768
— Cornu Cervi c. Mica Panis, II. 320
— — — Sydenhami, II. 320.
— — — usti gummosum, 768.
— — — cervini, 768.
— Corticis Mezerei, 638.
— — Peruviani, 520.
— Cucumerum c. Extr. Nuc. vom., II. 252.
— Cydoniae s. Cydonior. Semin., 635.
— Cynae, 552.
— Daphnes Mezerei, 638.
— Daturae, 640.
— Delphinii Staphisagriae, 643
— depurans et diureticum, 308.
— — et tonicum, II. 616.
— diaphoret., 525. 754. II. 696.
— — incitans, II. 547.
— Digitalis, 649.
— Diosmae èren., II. 743.
— diureticum, 274. 755. II. 387. 467.
— — alcalinum, 745.
— — Hufelandi, II. 565.
— — tonicum, II. 424.
— Dulcamarae, 655.
— — composit., 655.
— edulcorans, II. 546.
— emmenagogum, II. 387.
— emolliens, 134
— — et carminans, 134.
— pro enemate, II. 103.
— Enulae, II. 5.
— — compositum, II. 5.
— excitans, 525.
— febrifugum, 521. II. 403.
— — laxans, 527.
— — magistrale, 527.
— — et pectorale, 524.
— — purgans, 527.
— — salinum 474
— — et tonicum, 525.
— — simplex, 73.
— Ficuum, 445.
— Filicis maris, 312.
— Foresti, 788.
— ad fungos articulor., II. 371.
— Furfuris, 713.
— — Tritici, 713.
— Gallarum, 718
— Gei urbani, 733.
— — — aethereum, 743.
— Gentianae comp., 736.
— Geoffraeae inermis, 741.
— — Jamaicensis, 741.
— — Surinamensis, 741.
— Glycyrrhizae, II. 85.
— Graminis, 745.
— — compos., 745.
— Granati Corticis, II. 452.
— — — Rehmanni, II. 453.
— — Radicis, II. 452.
— Gratiolae, 747.
— Guajaci, 753.
— — compositum, 754.
— — — et purgans, II. 548.
— Gummi Arabici, 768.
— Haematoxyli, II. 72.
— Helenii, II 5
— — compositum, II. 5.
— Hellebori albi, 779
— — foetidi, 779
— Helmintochort., 782.
— Hippocast. Cortic., 73.
— hordeat. amygdalin, 196.
— Hordei s. per se, 786.
— — acidulatum, 787.
— Hordei acidulum, 787.
— — c. Cera et Oleo, 788.
— — citratum, 787.
— — compositum, 787.
— — decorticati, 786.
— — gummosum, 787.
— — integri, 786.
— — nitratum, 788.
— — simplex, 786.
— hydragogum, 100. II. 561
— Hydrargyri, II 127.
— Ichthyocollae comp., II. 547.
— incitans aromat., II. 59.
— — nutriens, diaph. etc, 755.
— incrassans Fulleri, 768.
— Ipecacuanhae, II. 16.
— Jaceae cum Aqua et Lacte, II. 23.
— Juglandis, II. 36.
— — compositum, II. 36.
— Jujubar. pectorale, 788.
— — — solutivum, 788.
— Juniperi, II. 44.
— — Fruct. carminativ., II. 45.
— — Ligni, II. 44.
— Kalmiae latifoliae, II. 45.
— Kinae Kinae comp. et lax., 527.
— — — simplex, 525.
— Lapathi, II. 517.
— laxans, II. 428. 616.
— laxativum, II. 103
— — Viennense, II. 591.
— Leontodontis Taraz., II. 649.
— Lichenis amarum, II. 68.
— — Islandici II. 68.
— — — (amarum), II. 68.
— — — compos., II. 69.
— — — lacteum, II. 69.
— Ligni Campech., II. 72.
— — Guajaci compos., II. 546.
— — Quassiae, II. 457.
— — — compos., II. 457.
— Lignorum, 754.
— Lobeliae syphilit., II. 87.
— ad lupias synos., II. 371.
— Lusitanicum, II 549.
— Malti, II 98
— — acidulum, II 98.
— — per se, II. 98.
— — compositum, II 98
— Malvae, II 100.
— — compositum, II 100.
— Malvarum carminativ., II. 100.
— Mannae purgans, II. 103.
— mastichinum, II. 17.
— mercuriale II 127.
— Mercurialis, II. 125.
— Mercurii, II 127
— ad metrorrhagiam, 582
— Mezerei, 638
— — compositum, 638.
— — fortius, 638.
— mucilagineum, 768
— ex Myrtillis, 724.
— narcoticum, II. 618.
— nervinum, 462
— Nicotianae, II. 246.
— nigrum Allenii, 526.
— Nucum Jugland., II. 36.
— ophthalmic. mucilagin., 133
— Orchid. Morionis, II. 52.
— Oryzae, II 313
— — acidulatum, II. 313

Decoctum Papaveris s. Pap. albi, II. 325
— Pareirae, 556.
— Parietariae, II. 329.
— Passularum, II. 718.
— pectorale. 134. 786. 787. 788. II. 38. 85. 313. 386.
— — corroborans, II. 387.
— — et incisivum, II. 564.
— — nutriens, II. 69.
— — — et incitans, II. 69.
— — solutivum. II. 596.
— — in phthisi. II. 344.
— Persicae Folior., II. 331.
— Petri Foresti v. Decoctum Foresti.
— Pini Turionum, 3. II. 311.
— — — saponatum, 3.
— — — vinos. Hoffm., 3.
— Pollini, II. 36.
— Polygalae amarae, II. 386.
— Senegae, II. 380.
— — Virginicae, II. 386.
— Pomorum, II. 388.
— del Pomponaccio, II. 717.
— Prunorum c. Senna, II. 590.
— Pruni Padi, 478.
— purgans, II 590.
— — antiphlogist., II. 448.
— Pyrolae. II. 456.
— Quassiae, II. 457.
— — compositum, II. 457.
— Quercus, II. 459.
— — cum Aceto, II. 460.
— — c. Alumine, II. 460.
— — aluminosum, II. 460.
— — Roboris, II. 459.
— Quinae, 527
— — comp. et lax. 527.
— — antisepticum, 527.
— — — purgans, 527.
— Quinque Radicum, 309.
— Rasorii a Soresina. II. 194.
— Ratanhiae, II. 468.
— refrigerans, 789.
— — Lieutaud., 788.
— resolvens, II. 650.
— — et diureticum, II. 417. 423.
— Rhabarbari, II. 479.
— Rhododendri chrysanthi, II. 485.
— roborans. 524. 525.
— Rubi villosi, II. 515.
— Rubiae, II 513.
— — alcalinum, II. 514.
— — compositum, II. 514.
— Rutae zincatum. II. 732.
— Sabinae, II. 44.
— de Salep Radice. II. 524.
— Salicariae, II. 525.
— Salicis. II. 527
— — compositum. II. 527.
— — Laureae Cort., II. 527.
— Sambuci Corticis, II. 537.
— Santali citrini, II. 541.
— Santonici, 552.
— Saponariae, II. 543.
— Sarsae, II. 545.
— Sarsaparillae, II. 545.
— — ex Callac, II. 550.
— — compos, II. 546 549.
— — edulcorans, II. 546.
— — c. Mezereo, II. 549.
— saturninum, II. 358.
— Scillae, II. 561.
— Scorzonerae bezoard., II. 573.
Decoctum Scorzonerae bezoard. solutivum, II. 573.
— Semalis cornuti, II. 574.
— Semin. Cydonior., 635.
— Senegae. II. 386.
— Serpentariae Virg, 281.
— Simarubae, II. 599.
— Smilacis Sarsaparillae, II. 545.
— Spartii cacuminum. 732.
— Specier guajacinar., II. 543.
— — — c. Rheo, II. 543.
— — — c. Mezereo, II. 543.
— Spigeliae, II. 620.
— Spongiae ustae, 440.
— Staphisagriae. 643.
— Stomach. resolvens, II. 414.
— Stramonii, 640
— strumale, 440
— contra strumas, 440.
— Suberis Corticis, II. 459.
— sudoriferum. II. 546.
— sudorificum, 754.
— Sulphureti Calcis Hoffm., 249.
— syphilit. robor., II. 36.
— — Yvo Gaukes — Dec. antiven.
— Tabaci, II. 246.
— Tamarind., II. 644.
— — comp., II. 645.
— Taraxaci, II. 649.
— — comp., II. 650.
— Tartari citratum, II. 432.
— — Crystallorum, II. 432.
— temperans, 789.
— — Lieutaud, 788
— tonicum, 596 II. 514.
— — cichoraceum, II. 650.
— — et leniens, 526.
— cinchonatum, 520.
— Tormentillae, II. 388.
— Trifolii fibrini, II. 694.
— Turpethi, II. 695.
— Ulmi, II. 696.
— — campestris, II. 696
— — compositum, II. 696.
— Uvae Ursi Fol., II. 697.
— Veratri, 779.
— Verbasci anodyn. s. comp., II. 710.
— vermifugum, 552. 782.
— Violae tricoloris c. Aqua, II. 23.
— — — cum Lacte, II. 23.
— Visci albi, II. 717.
— vomitivum, 307.
— Zittmanni, II. 550.
Decoctura vide Decoctum.
Delphia. 643.
Delphinium, 643.
Delphinium, 643.
— Ajacis 643.
— Consolida, 643.
— elatum, 643
— Staphysagria, 643.
Delphinus edentulus u. Orca, 479.
Dens Leonis, II. 649.
Dentales, 380.
Dentalia, 380.
Dentalium Dentalis, 380.
— Entalis, 380.
Dentaria, 644. II. 453.
— digitata, 644.
— major 644.
— minor. 644.
— pinnata, 644.
Dentes Apri, 386.
— Equi marini, 386.
— Hippopotami, 386.
Dentes Monocerotis s. Unicornu marini, 386.
Dentifricium Sang. Draconis, 388.
— siccum, 388.
Dentillaria, 644.
Depilatory, Colley's, II. 396.
Desmarestia aculeata, 781.
Desvauxia fluitans, 644.
Deutoacetas Cupri 630.
— Ferri, 697.
— Mercurii, II. 213.
— Sodii, II. 617.
Deutocarbonas Potassii, II. 405.
— Sodii, 61[illegible]
Deutochloruretum Hydrargyri, II. 180.
— Mercurii, II. 180.
Deutohydrochloras Antimonii, 250.
— Cupri, 625.
— — et Ammoniaci, 626.
— Hydrargyri, II. 181
— Mercurii, II. 181. 182.
— Stanni, II. 625.
Deutoiodas Mercurii, II. 206.
Deutoioduretum Hydrargyri s. Mercurii, II. 194.
Deutomurias Antimonii, 250.
— Hydrargyri, II. 181.
— Mercurii, II. 181.
— Stanni, II. 625.
— Stibii, 250
Deutonitras Cupri, 625.
— Hydrargyri solutus, II. 205.
— Mercurii, II. 205.
Deutophosphas Cupri. 619.
Deutosulfas vide Deutosulphas.
Deutosulfuretum Hydrarg. rubrum, II. 156.
Deutosulphas Cupri, 620.
— — et Ammoniae. 623.
— Potassii — Kali sulphuric
— Sodii — Natr. sulphur.
Deutosulphuretum Antimonii, 244.
— Arsenici, 285.
— — artificiale, 285.
— Hydrarg. rubrum, II. 156.
Deutotartras. Potass., II. 427.
— — et Stibii, 251.
— — et Sodii — Tart. natronat.
Deutoxycyanuretum Ferri hydrat, 707.
Deutoxydum Antimonii, 229.
— Arsenici, 287.
— Barii, 336.
— Ferri, 675
— Hydrargyri, II. 149.
— — completum s. rubrum etc. II. 149
— — nitrat. s. nitrat. rubr. s. nitric., II. 149.
— Hydrogenii, II. 315.
— Mercurii, II. 148.
— — complet. etc. v. Deutox. Hydr. compl.
— Plumbi, II. 352.
— — rubrum, II. 352.
— Potassii — Kali caust. sicc.
— — liquidum. II. 390.
— Zinci — Flor. Zinci.
Deutoxysulphuretum Sodii, II. 604.
Diacaryon, II. 34.
Diacassia c. Manna, 455.
Diaceltatesson Paracelsi, 232.
Diaclysma Radic. Pyrethri odontalg., II. 454.
Diachylon compositum, 765.
— simplex, II. 372.

Diacodium liq. Mont. II. 326.
Diacrydium. II. 555. 556
— cydoniatum, II. 556.
— glycyrrhizatum, II. 556.
— Liquirit. edulcorat., II. 556
— rosatum. II. 556.
— sulphuratum, II. 556.
Diacydonium. 634.
— aromat., 634.
— jalappinum, II. 30.
— lucidum. 634.
— — jalappinum, II. 30.
— simplex, 634.
— solutiv. pellucidum, II. 30.
— c. Speciebus. 634.
Diagrydium v. Diacrydium.
Diamoron c. Melle, II. 516.
Dianthus Caryophyllus, 645.
— arenarius, Armeria, barbatus, Carthusianus, 645.
Diapensia, II. 540
Diascordium correctum, II. 304
— liquidum, II. 682.
— vigoratum, II. 304.
Dictamnus albus, 645. 646.
— Creticus, II. 310.
Diervilla, 646.
— Tournefortii, 646
Digestivum liquefactum, II. 656
— Plenkii, II. 657.
Digitalinum, 646.
Digitalis, 646
— ferruginea, 646.
— purpurea, 646.
Dinitras Bismuthi. 350.
Diosma crenata, 356.
— serratifolia, 356.
Dioscorea sativa, II. 523.
Diospyros, 652.
— Ebenum, 652.
— Virginiana, 652.
Dipsacus Fullonum, 653.
— sylvestris. 653.
Diptamnus officinalis, 646.
Dipterix odorata, 666.
Dolichos pruriens, II. 625.
Doronicum Germanicum, 282.
— latifolium, 653.
— officinale. 653.
— Pardalianches, 653.
— plantagineum, 653.
— Plantaginis folio, 282
— Romanum. 653.
Dorstenia Contrayerva, 590.
— Drakena Brasil., Houstenia, 600.
Dracaena Draco, II. 540.
Draco mitigatus, II. 159.
Dracocephalum Moldavicum, II. 111.
Draconinum, II. 540.
Draconis sanguis, II. 539.
Dracontia minor. 295.
Dracontium foetidum, 653.
Dracunculus esculentus, 294.
— hortensis, 294.
Drageae Keyseri s. antisyphil. Keyseri. II. 212.
— vermifugae. II. 165.
Draught, common black, II. 594.
Drink, Young's purging, II. 433.
Drops v. Guttae
Dropax antiparalyticum, II. 346.
Drosera, 653.
— longifolia, 653.
— rotundifolia, 653.
Drymis aromatica, II. 612.
— Winteri, 605.
Dryobalanops Camphora, 393.
Dulcamara, 654
Dulcichinum, 637.

E.

Eau de Husson, Reece's, 747.
— de Javelle, II. 420. 605.
— d'ange destillée, II. 630.
— — — et musquée, II. 630.
— — de bouquet, 571.
— de mille fleurs, II. 230. 571 630.
— sans pareil, 571.
— de Cologne, 571.
— de Maréchale, II. 230.
Ebulus, II. 534.
Ebur, 386.
— fossile, 386.
— ustum album vel nigrum, 387.
Echioglossum, II. 267.
Echites antidysenterica, 584.
— Italicum, Onosma, 656.
— rubrum, 656.
Echium vulgare, 656.
Eclegma album, 199.
— amygdalinum, 199.
— gummoso-oleosum, 199.
— leniens, 197
Elaeocarpus copallifera, 603.
Elaeodendrum Organ, II. 471.
Elaeosaccharum Absinthii, 5.
— Anisi, 221.
— Aurantii s. Aurantior., 558.
— — Florum, 559.
— Cajeputi, 369.
— Calami, 371.
— Carvi. 418
— Caryophyll aromat., 450.
— Cassiae cinnam., 408.
— Chamaemeli, 487.
— Chamomillae, 487.
— Cinnamomi s. C. acuti, 408.
— Citri, 569.
— Crotonis, 612.
— Foeniculi, 209.
— Juniperi. II. 42.
— Macidis, II 233.
— Menthae crispae, II. 120.
— — pip., II. 120.
— Myrrhae, II. 235.
— Salviae, II. 530.
— Sassafras, II. 551.
— Succini, II. 632.
— Terebinthinae, II. 667.
— Valerianae, II. 707.
Elais Guineensis, II. 254.
Elaterinum, II. 219.
Elaterium, II. 219 220.
— album. II. 219
Elatinum, II. 219.
Electrum II. 630.
Electuarium d. Acoro, 371.
— adstringens, 470. 508. 621 II. 46. 303. 306. 451. 469.
— — Duhaumi. 118.
— — Fulleri, 509 II. 494.
— alcalino ferratum, 677.
— de Aloë, Mur. Hydr. et Ferro. 673.
— Aloës compositum, 114.
— — Hydr. mur. et Ferri, 673.
— alterans. II. 143.
— anodynum pro infant., II 93.
— antacidum, II. 93.
— anthelminticum, 553. II. 27. 180. 319. 701.
— — Heisteri, II. 141.
Electuarium anthelminticum Vogleri. II. 180.
— antiarthriticum, II. 34. 159
— anticachecticum, II 345.
— anticardialgicum, 508.
— antidysentericum, 220. II. 306. 476.
— antiepilepticum, 478. 510 II. 701
— antifebrile, 508.
— — Masdevallii, 508.
— antihaemorrhoidale, II 103. 345. 582.
— antiherpeticum, 260. 264. II. 145. 188.
— antihydrophobicum, II. 3.
— antilyssicum, II. 116.
— antirheumaticum, II. 63.
— antiscorbuticum, 579. II. 601.
— antiscrophulosum, II. 43 424.
— antispasmodicum, 510. II. 701.
— antisyphiliticum, II. 190
— aperiens, II. 579
— — antihydropicum, II. 563.
— aphrodisiacum, 499. II 525
— Arnicae Florum. 283.
— aromatico-opiatum, II. 293.
— aromaticum, 407. 485.
— bechicum, II. 103.
— Boleti suaveolentis, 352
— cum Carbone, 438.
— cardiacum, 407.
— carminativum, 470.
— caryocostinum, II. 557.
— Cassiae, 455.
— — Fistulae, 455.
— — lenitivum, 455
— — Sennae. II. 581.
— — tamarindinatum, 455
— Catechu, 470. II. 304
— — compositum, 470. II 304.
— catholicum. II. 583.
— — commune, II. 579.
— — duplicatum, II. 583
— ceratum, 266.
— chalybeatum, 673. 683.
— e Chamaemelo, 485.
— e Chamomilla, 485.
— Chinae, 509.
— — alcalinum, 508.
— — antimoniatum, 510
— Cochleariae cum Calamo, 579.
— cordiale, 610.
— — Cremoris Tartari, II. 430.
— demulcens, 266.
— dentifricium, 385. II. 237. 431. 737.
— desobstruens, II. 563
— detergens. II. 237.
— Diacatholicon, II. 583.
— Diaphoenix, II. 558.
— Diaprunum, II. 579
— ad diarrhoeam, 470.
— Diasatyrum, II 525.
— Diascordium, II. 304.
— Diatartareum, II 582.
— Diatessaron, II. 237.
— Diatragacanthae, II. 689.
— diureticum, II. 41. 564.
— Dolichos II. 625.
— ad dysenteriam, II. 476.
— eccoproticum, II. 579.
— excitans, II. 453

Electuarium febrifugum, 73. 282. 507. 508. 510.
— — et aperiens, II. 425.
— ad flatus, 470.
— Florum Arnicae, 283.
— gingivale, 469. II. 237. 431. 744.
— — antiscorbuticum, II. 237.
— ad gingivas, II. 237.
— de Graphite, 674.
— ad haemoptysin. 790.
— ad herpetem, II. 145
— Hierae picrae, 114.
— hydragogum, II. 26. 30. 557
— Hyoscyami opiatum, II. 308.
— pro infantibus, II. 93.
— incrassans. II. 71. 324.
— Ipecacuanh. moschatum, II. 14.
— joviale ad taeniam, II. 624.
— de Junipero, II. 41.
— — Kina Kina. 509.
— Lauri Bacc., II. 59.
— c. Lauro-Cerasi Conserva, 478.
— laxans, II. 637.
— — et emmenagog., 107.
— laxativum, 455. II. 646.
— lenitivum, 455. II. 431. 579. 684.
— — pro pauperibus, II. 582.
— — c. Sulphure. II. 583.
— Limatur. Ferri Gorzonii, 673.
— de Manna, II. 102.
— martiatum, 673.
— Mimos. Catechu comp., 470. II. 3?4.
— — contra mors. canis rabidi, II. 116.
— mithridaticum, II. 93. 290.
— mundificans, 757. II. 583.
— — pauperum, 758.
— — Werlhofii, 757.
— Myrrhae compositum, 469
— opiatum, II. 293.
— — ad dentes, II. 744
— — polypharmacon, II. 293.
— Opii, II. 293.
— — compositum, II. 293.
— pro pecoribus, 758. II. 237.
— pectorale, II. 385. 637. 735.
— — laxans II. 30.
— Peruvianum Fulleri, 509.
— — antiepileptic. Full., 510.
— piperinum, II. 345.
— Polygalae amarae, II. 385.
— purgans, II. 26 159. 432. 558. 583. 637.
— purificans, II. 145.
— ad rabiem, II. 116.
— refrigerans. II. 431.
— Requies Nicolai, II. 308.
— resolvens antiherpeticum, II. 139.
— — martiale diuret., 677. II. 564.
— resumptivum, 667.
— de Rhabarbaro, II. 583.
— Rhei compositum, II. 583.
— roborans 508.
— de Roccamore, 558.
— sanans, 266.
— Scammonii, II. 558.
Electuarium Scammonii et Turpethi comp., II. 558.
— Scordii s. e Scordio, II 304.
— — Fracastoris, II. 304.
— — opiaceum. II 304.
— — opiatum, II. 304
— e Scordio. II. 304.
— ad scrophulas, II. 423. 424.
— sedativum et adstringens, 470.
— de Senac febr fug., 509.
— e Senna, II. 579.
— — c. Carbone, II. 583.
— Sennae, II. 579.
— — compositum, II. 579
— — c. Pulpis, II. 579.
— Sinapis, II. 600.
— Spielmanni ad stomac., 147.
— stimulans, II. 306. 563.
— contra stomacacen, 147.
— stomachicum, 371. 558. II. 3?5. 475 739.
— — alterans, II. 345.
— Sulphuris, Sulph. comp. et Sulph. c. Borace, II. 637.
— — compositum, II. 432.
— Tamarindorum, II 579. 646.
— temperans, II. 413.
— Terebinthinae, II. 667.
— terebinthinatum, II. 667.
— thebaicum, II. 293.
— Theriaca, II. 293.
— theriacale, II. 293.
— — magnum, II. 293.
— tonico-resolvens, 677.
— tonicum, 508. 677.
— Tragacanthae, II. 689.
— traumaticum, 342. II. 495
— ad vermes, II. 26
— vermifugum, II. 26. 180. 623. 624. 625.
— vomitivum, II. 14.
Elemi, 656
— occidentale, 656.
— orientale, 656.
Elemintochorton, 781.
Eleminum, 657.
Eleoselinum, 270.
Elettaria Cardamomum, 441.
Eleutheria, 451.
Elichrysum montanum, 225.
Elixir acido-aromat., 419.
— acidum, 60
— — Dippelii 60.
— — Halleri, 60.
— — Vitrioli, 419.
— adstringens, II. 73.
— ad longam vitam, 123.
— Alkermes, 418.
— Aloës, 115.
— — saponaceum, 118.
— amarum, 119. 124. 444. 567. II. 428.
— — aquosum, II. 561. 568.
— — Peyrilhe, 739
— — vinosum, 737. 738. II. 694.
— Americanum Courcellesii, II. 6.
— ammoniato opiatum, II. 86.
— antacidum, 375 II. 457.
— anthelmint. Succorum, II. 33.
— antiapoplect. Jacobinor., 418.
— antiarthriticum, 115. 294. 752.
— — c. Aconito. 67.
— — Caribaeum, 752.
— antiasthmaticum, II. 271.
Elixir antiasthmat. Lemort, II. 273.
— anticolic. crocat., 116.
— antifebrile, 534.
— antihypochondriac., 533.
— antihystericum, 305. 463. 464. II. 0
— — Durietzii, 305.
— — officinale, 305.
— antinephritic., 60.
— antiodontalgic., II. 451.
— antipodagricum, 60.
— antiscorbut, II. 245. 694.
— — amarum, 584
— — Boerhaavii, 583.
— — Sellii, 543
— antiscrophulos. Peyrilhe, 739.
— antisepticum, 534.
— antispasmod., 791. II. 706.
— antisyphilit., 322.
— antivenereum, 322. 752.
— aperiens, II. 428,
— aperitivum, 115. II. 651.
— — Clauderi, 119.
— c. Aq. Calcar. ustae, II. 457.
— aromaticum, 224. 372. 417.
— — acidum, 419.
— — adstringens, II. 665.
— asthmaticum, II. 271.
— Aurantior. comp., 564. 568.
— aureum, 692.
— balsamicum, 563. 564.
— — Hoffmanni, 563 564
— — pectorale Tolutan., 331.
— — purificans, II. 190.
— — spirituos. Hoffm., II. 682.
— — temperat. Hoffm., 563.
— — Werlhofii, 531.
— de Cedro, 573.
— cholagogum, 118.
— Citri, 573.
— — purgans. II 33.
— cordiale et stomach., 116.
— Croci c. Castoreo, 463.
— Daffyi, II. 588.
— — Swinton's, II. 586.
— — Dicey's, 587.
— d'or v Elixir aureum.
— Diaboli, II. 343.
— Duboisii, 739.
— dulce Rhei, II. 483. 485.
— febrifugum, 73. 534.
— foetidum, 463.
— forte, 739.
— Gambog. alcalin., 773.
— de Garus, 116.
— Glycyrrhizae, II. 85.
— Guajaci volatile, 752.
— guajacinum, 752.
— — volatile, 752.
— Helmontii, 115.
— Hippocast. Extracti, 73
— Jalapae comp., II. 33.
— Jernitzii, 123.
— Juniperinum, II. 41.
— — malvatic., II. 41.
— mastichinum s. Mastichis, II. 108.
— de Mittié, II. 736.
— Myrrhae, s. M. compos., II. 240.
— odontalg. et antiscorb, II. 245.
— Papaveris, II, 260.
— paregoricum, II. 269. 270. 271. 272.
— — Edinburgense, II. 272
— pectorale, 327
— — Anglicum. II. 569.
— — dulce, II. 85.

Elixir pectorale Elsneri, II. 6.
— — Regis Danor. s. Daniae, II. 85.
— — simplex, II. 81.
— — Wedelii, II. 568.
— polychrest Halense, II. 558.
— — purgativ., II. 588.
— proprietatis, 115.
— — c. Acido Boerh., Paracelsi, 117.
— — sine Acido, 116.
— — album Helmonti, 115.
— — antiscorbut., 118.
— — aquosum, 119.
— — dulce, 115. 116.
— — Helmontii, 119.
— — Paracelsi, 115.
— — rhabarbarinum, 125.
— — c. Rhabarbaro, 125.
— — c. Rheo, 125.
— — Stahlii, 118.
— — tartarizatum, 116.
— purgans Radcliffii, 124.
— Radcliffii, 124.
— Rawlini, II. 588.
— resolvens, II. 425. 428. 651.
— Rhabarbari, II. 485.
— Rhei amarum, II. 484.
— — composit., II. 483.
— — dulce, II. 483. 485.
— Ringelmanni, II. 85.
— roborans, 124. 633. 694.
— — acidum, 453.
— — Whyttii, 533.
— sacrum, 123.
— salutis, II. 586.
— scorbuticum, 584.
— Sennae, II. 585.
— de spina, 126.
— de Squire, II. 270.
— stimulans, 124.
— stomachicum, 123. 217. 327. 532. 563. 568. 738.
— — amarum, 738.
— — aquosum, 735.
— — dulcificat., 123.
— — officinale, 123.
— — spirituos., 533.
— — temperatum, 564.
— — Viennense, 563.
— de Stoughton, 125.
— e Succo Glycyrrh., II. 85.
— — Liquirit., II. 85.
— sudoriferum, II. 272.
— — Lettsomi, II. 272.
— sudorific. Willisii, II. 19.
— suecicum, 123.
— sulphurico-acid, 60.
— tonicum, 123.
— — ad dentes, II. 470.
— traumaticum, 311.
— uterinum, 365.
— — Crollii, 363.
— vermifug. de Regimbeau, 126.
— viscerale, 8. 563. 564. 568.
— — Hoffmanni, 563. 561.
— — Rosensteinii, II. 482.
— — de Stoughton, 125.
— vitae Matthioli, 413.
— — mulierum, II. 533.
— ad vitam longam, 123.
— Vitrioli, 58. 419.
— — acido aromat., 419.
— — aromaticum, 419.
— — acidum aromat. Mathabelli, 419.
— — dulce, 419.
— — Edimburgense, 419.
— — Mynsichti, 419.
— — e Tinct. aromat., 419.
— Weighti, II. 192.
— Whyttii, 533.
Elleborus niger, 776.
Eluteria, 451.
Embrocatio ammoniacalis, 161. 176.
— Ammoniae Acetatis, 190.
— Camphorae, 397.
— Opii comp., II. 273.
— refrigerans, 85.
— resolvens, 189. 193.
— ad rheumatism., Gueston., II. 668.
— Saponis, II. 442.
— — cum Camphora, II. 443.
— — rubefaciens, 427.
— sinapina pro equis, II. 602.
— ad tussim convuls., II. 633.
Emetina, 657. II. 12.
— pura, 657.
Emetinum, 657. II. 12.
Empetrum, 784.
Emplastrum adhaerens, II. 673. 674. 677.
— adhaesivum, 729. II. 673. 674. 677.
— — Anglicum, 729.
— — Bayntoni, II. 677.
— — Woodstockii, 729.
— adstringens, II. 374.
— album coctum, II. 383.
— de Althaea, 138.
— Ammoniaci, 360. 763. 764.
— — c. Hydrarg., II. 137.
— — c. Merc., II. 137.
— de Ammoniaco, 676.
— — c. Merc., II. 137.
— — mercuriale, II. 137.
— ammoniaco-galbanic., 360.
— — mercuriale, II. 137.
— Ammonii c. Camph., 179.
— Andreae a Cruce, II. 675.
— Anglicanum, 729.
— Anglo saxonic., II. 382.
— Anglicum, 729.
— anodynum, II. 287. 289. 373.
— — Fulleri, II. 374.
— antiarthrit., II. 382.
— anticancros., II. 397.
— anticolicum, 365.
— antihaemorrhoid., II. 302.
— antihysteric., 364. 764.
— antiodontalgic., II. 108.
— antispasmod., II. 286.
— antistrumale, 259.
— ad s. contra apoplexiam II. 660.
— aromaticum, 407. 449. 765.
— Asae foet., 364. 764.
— — — et Ammoniaci, 764.
— — — compos., 764.
— — matricale, 362.
— Assae foet. vide As. foet.
— attrahens, II. 673. 674.
— balsamicum, II. 383. 445.
— — Schilhausii, II. 383.
— Bechholzii, 265.
— Belladonnae, 315.
— benedictum, II. 384.
— Betonicae, 348.
— ad bubones venereos, II. 137.
— caeruleum, II. 364.
— calefaciens, 432.
— camphorat. Stahlii, II. 382.
— e Cantharidib. epispast. solidius, 429.
— Cantharidis, 429. 431.
— — perpetuum, 433.
— — resinosum, 429. 433.
— — vesicatoriae, 429.
— — — compos., 431.
Emplastrum Cantharidum, 429.
— — camphorat., 432.
— — cereum, 429.
— — c. Euphorbio, 433.
— — ordinarium, 429.
— — perpetuum, 433.
— — resinosum, 429.
— Capucinorum, 664.
— Carbonat. Plumbi ustum, II. 384.
— catagmaticum, II. 599.
— cephalicum, 53. 289.
— Cerae, 268. II. 673.
— — terebinthinat., II. 673. 674.
— cereum, II. 673. 674.
— c. Cerussa, II. 383.
— Cerussae, II. 353.
— — compos., II. 383.
— Cetacei, 479.
— — album, 479.
— de Cicuta, 549.
— — c. Ammoniaco, 549.
— — compos., 549.
— Cicutae, 549.
— — comp. v. de Cicuta comp.
— citrinum, 138. 140. II. 673. 674.
— ad clavos pedum, 630.
— — Pajot-Laforestii, 178.
— ad colicam, II. 289.
— Collae ad herniam, II. 397.
— commune, II. 372. 673. 677.
— — adhaesivum, II. 677.
— — attrahens, II. 673.
— — gummatum, 360.
— — c. Mercurio, II. 135.
— — c. Resina, II. 677.
— — c. Sapone, II. 444.
— confortativ. Vigonis, II. 375.
— Conii, 549.
— — maculati, 549.
— e Conio, 549.
— consolidans, II. 727.
— — vegetabile, 172.
— corrosivum, II. 187.
— Crocі compos., 362.
— de Crusta Panis, II. 643.
— Cumini, 616.
— — compos., 616.
— — saponaceum, II. 441.
— e Cumino s. Cymino, 616.
— defensivum, 629.
— — rubrum, 629. II. 375.
— — viride, II. 675.
— — Wepferi, II. 352.
— detergens rubrum, II. 361.
— Diabotan. Blondelli, II. 379.
— Diachalciteos, II. 375.
— Diachylon s. Diachylum, II. 372.
— — compos., 360.
— — c. Gummat., 360.
— — gummat., 360.
— — c. Gummi, 360.
— — c. Gummi - Resinis, 360.
— — magnum, II. 677.
— — minus, II. 372.
— — simplex, II. 372.
— Diapalmae, II. 373. 375.
— Diaphoenix, II. 375.
— diaphoret. Mynsichti, 419.
— Diapompholigos, II. 727.
— Diasulph. Rulandi, II. 268.
— Digitalis, 652.
— divinum, II. 378.
— ad dolores dentium, II. 108.
— de Doven, II. 382.
— emolliens, 138. II. 373.

Digitized by Google

Emplastrum epispasticum, 429.
— — camphorat., 429.
— — e duplici dosi Cantharidum, 429.
— — primum, 431.
— — secundum, 430.
— epuloticum, II. 373.
— equinum, II. 352.
— Euphorbii, 433. 664.
— de Euphorbio, 664.
— Ferri, II. 375.
— Filii, 359.
— — Zachariae, 268.
— flavum, 138. II. 314.
— Flos Unguentorum dict., II. 674.
— Foenu gr. s. e F. graeco, 764.
— foetidum, 364. 764.
— ad fonticulos, 267. II. 353.
— ad fracturas, 499.
— — et luxationes, 509.
— pro fracturis dictum, II. 378.
— frigidum Riedlini, 140.
— Fuliginis, 712.
— fundans, II. 127. 353.
— ad fungos articulor., 661.
— fuscum, II. 375.
— Galbani, 360.
— — camphorat., 359.
— — compos., 360.
— — crocat., 362.
— — roborans, 364.
— — saturnin., 360.
— — simplex, 359.
— de s. e Galb., 360.
— — crocat., 362. 364.
— ad ganglia, 765.
— glutinans Litharg., II. 677.
— glutinosum, 729.
— de Graphite, 674.
— Gratia Dei, II. 655.
— griseum, II. 727.
— — coctum, II. 383.
— Guillermi servit., II. 642.
— c. Gummatibus, 360.
— — resinosum, 360.
— gummatum, 360.
— c. Gummi, 360.
— c. s. e Gummi-Resinis, 360.
— gummi-resinosum, 764.
— gummosum, 763. 764.
— — compos., 362.
— ad hernias, 598.
— — Baumé, 598.
— pro herniosis, 598.
— Hjerneri, II. 375.
— Hydrargyri s. c. dupl. dosi Hydr., II. 135.
— — c. Conio, II. 138.
— — — et Opio, II. 138.
— hydrargyric., II. 135.
— ex Hydrargyro, II. 135.
— Hyoscyami, 793.
— de Hyoscyamo, 793.
— Ichthyoc. telae induct., 729.
— imperiale, II. 377.
— incognitum, II. 541.
— irritans, 429.
— ischiadicum, 365. 664.
— Janini, 433.
— Juchii, II. 135.
— Labdani, II. 53.
— labiale album, 480.
— Ladani, II. 53.
— — comp., II. 53.
— de Lapide calaminii, II. 727.
— Lauri Baccar., II. 69.
— Lithargyri, II. 372.
— — c. Resina Pini, II. 677.
— — compos., 360.
— — glutinans, II. 677.
Empl. Lithargyri c. Gummi, 360.
— — c. Hydrarg., II. 135.
— — simplex, II. 372.
— lithargyric. c. Resina, II. 677.
— Lithargyrii simpl., II. 372.
— ad lupiam, 630.
— Lytharg. vide Empl. Litharg.
— Lyttae s. Lyttae vesicat., 429. 431.
— magneticum, 286.
— malactic. c. Gummi, 140.
— — sine Gummi, 140.
— mammillare, 482. II. 382. 444.
— ad mammillas, 482.
— mastichinum, II. 108.
— matricale, 364.
— Matris, II. 381.
— maturans, II. 675.
— Meliloti s. de Mel. simpl., II. 109. 110.
— — camphorat., II. 111.
— — compositum, II. 111.
— Meloës vesicat., 429.
— — — comp., 434.
— Mercantini, II. 353.
— mercuriale, II. 135. 205.
— — gummos., II. 137.
— — resolvens, II. 135.
— Merc. c. Conio et Opio, II. 138.
— Minii adustum, II. 381.
— — camphorat., II. 381.
— — gummoso-resinosum, II. 353.
— e Minio s. de Minia, II. 352.
— — fuscum, II. 353.
— miraculosum, II. 382.
— e mixtis quat., II. 138.
— moschatum, II. 226.
— de Mucilaginibus, 763.
— mucilaginosum, 138.
— de Nicotiana, II. 249.
— nigrum, 365.
— — Becholzii, 365.
— — sulphuratum, 365.
— Norimbergense, II. 381.
— Noricum, II. 381.
— odontalgicum, 432. II. 289.
— opiatum, II. 289.
— Opii, II. 283.
— Opodeldoc, II. 377.
— oxycroceum, 362. 364.
— Oxydi Ferri rubri, 679. II. 375.
— — Plumbi, II. 372.
— — s. ex Oxydo Plumbi Diabot, II. 379.
— — — epuloticum, II. 373.
— — — gummatum, 360.
— — — mucilagineum s. mucilaginos, II. 374.
— — — — comp., II. 677.
— — — rubri camphor., II. 381.
— — — rubrum, II. 375.
— — — saponaceum, II. 382.
— — — semivitrei, II. 372. 677.
— — — c. Resina, II. 677.
— — — — Pini, II. 677.
— — — — comp., II. 444.
— — — — gummos., 360.
— — — — resinos., II. 677.
Empl. Oxydi Plumbi semivitrei c. Sulph. Ferri calcin., II. 375.
— — plumbici, II. 372.
— Oxyduli Plumbi semivitr., II. 372.
— — — — gummosum, 363.
— — — — adustum, II. 381.
— Oxynitrat. Hydr. et Ammon., II. 205.
— Paracelsi, II. 375.
— perpetuum, 433.
— peruvianum, 328.
— picum, II. 673. 674.
— Picis, II. 673. 674.
— — Burgundicae, II. 53.
— — comp., II. 675.
— — liquidae, II. 348.
— — navalis, II. 673. 674.
— — nigrae regium, 598.
— — et Resinae, II. 675.
— — solidae, II. 673. 674.
— piperitum, II. 346.
— Plumbi, II. 372.
— — gummi-resinos., 360.
— — gummosum, 363.
— — nigrum, II. 351.
— — Protoxydi, II. 372. 444. 677.
— — — fusi, II. 372.
— — — — simplex, II. 372.
— — — — fuscum, II. 374.
— — — — c. Mercurio, II. 135.
— — simplex, II. 372.
— — Subcarbonat. comp., II. 383.
— e Plumbo comp., II. 383.
— polychrestum, II. 677.
— Porri, II. 382.
— Prioris ad hernias, 598.
— Protoxydi Plumbi c. G. Ammo., 360.
— Pyrethri, II. 454.
— — contra rachit., II. 675.
— Ranar. simpl., II. 379.
— — c. Hydrarg., II. 135.
— de Ran. sine Merc., II. 379.
— regale, II. 290.
— e Resina elast., II. 470.
— c. Resina, II. 677.
— — — Pini, II. 677.
— Resinae, II. 677.
— Resinar. glutin., II. 675.
— resinosum, II. 677.
— — Cantharidum, 429.
— — sulphurat., II. 641.
— resolutivum, II. 379.
— resolvens, 183. 551. 630. 763. 764. 765. II. 127. 138. 353. 369.
— — ammoniacat., 179.
— — et anticancros., II. 397.
— — compos., II. 135.
— — c. Mercurio, II. 138.
— — opiaceum, II. 381.
— — e quatuor Fundant. s. ex Mixtis quat. resolv., II. 138.
— — Raistingii, II. 377.
— — c. Sapone et Camph. II. 445.
— — Schmuckeri, 763.
— Rhei comp., 128.
— roborans, 679. II. 374. 375. 673. 678.
— rubefaciens, 429. 432. 664.
— rubrum, 362. II. 352.
— contra rupturam, 598. II. 377.
— Salis Ammoniaci, II. 375.
— santalinum, II. 541.
— saponaceo-plumbic., II. 375.

Empl. saponaceum, II. 444.
— — de Barbette, II. 382.
— saponatum. II. 444. 445.
— — camphorat., II. 445.
— de Sapone. II. 444.
— Saponis, II. 444.
— — ammonici, 183.
— — camphorat., II. 445.
— saturninum, II. 728.
— — Mynsichti, II. 728.
— de Scrophularia, 629.
— Sevi anodynum. II. 375.
— Siliquarum, II. 375.
— — imperiale, II. 377.
— simplex, II. 372. 673. 677.
— — agglutinans, II. 677.
— — glutinans, II. 677.
— deSpermateCeti comp., 359.
— — Ranarum, II. 383.
— Spermatis Ceti, 479.
— spleneticum, 765.
— stibiatum, 259.
— sticticum, II. 375. 673. 674.
— — Hamburgense, II. 674.
— stimulans, II. 346.
— stomachicum, 449. II. 53. 302. 629. 643.
— ad strumam, 259.
— stypticum, 679. II. 375. 678.
— de Styrace, II. 629.
— Styracis comp. s. stomach., II. 629.
— Subcarbonat. Plumbi, II. 383.
— — — comp., II. 384.
— c Subcarbonate Plumbi Protox., II 383.
— sulphuratum, 365. II. 238. 642.
— suppurativum, 357.
— Tabaci, II. 249.
— de Tacamahaca, II. 643.
— tacamahacinum, II. 643.
— ad tempora, II. 289.
— Thuris, II. 374. 375.
— — compos., II. 739.
— ad tormina ventris, II. 289.
— Trifolii Meliloti, II. 109.
— tripharmacum. II. 381.
— universale Waltheri, II. 375.
— ad verrucas, 630.
— vesicatorium 429. 431.
— — extemporaneum, 430.
— — Janini. 433.
— — de Mejean, 434.
— — Monspeliac, 431.
— — ordinarium, 429.
— — perpetuum, 433.
— — — Janini, 433.
— Vigonis sine Merc., II. 379.
— — c. Merc, II. 137.
— viride. 629.
— — comp., 629.
— volatile, 179.
— zincico-plumbic., II. 727.
Emulsio Acaciae Arab., 196.
— adstringens, 143. II. 461.
— amara, 574.
— Ammoniaci Gummi, 758.
— Amygdalarum, 196.
— — camphorata. 197.
— — compos., II. 91.
— — c. Manna. 197
— Amygdali comm., 196.
— amygdalina. 196.
— — hordeata. 196.
— anthelmintica, II. 310.
— anticatarrhalis, II. 334.
— antihysterica, 301.
— antimonial. camphorata, 260.
— antirheumatica, 771.
— Arabica. 196.
Emulsio c. Bals. Sulph. anis., II. 618.
— Bals. Copaiv., 323.
— balsamica, 330
— Barthezii, II. 415.
— bechica, II. 329.
— Brunneri, 761.
— de Cadet, 323.
— Cajeputi, 369.
— Camphorae, 397.
— camphorata, 397.
— — c. Nitro, 397.
— cannabina, 422.
— Cantharidum, 428. 435.
— ad catarrhum, II. 334.
— cerea, 266.
— Chinae, 618
— Citri Seminum, 574.
— communis, 196. 614.
— Cornu Cervi usti, 768.
— cosmetica, 327.
— diuretica, 424. 761.
— emetica, 243.
— excitans, 369.
— febrifuga, 476.
— Ferri comp, 681.
— pro gonorrhoea chronica, 325.
— Guajaci Resinae, 755.
— guajacina, 755.
— gummata, 202.
— Gummi Arab, 196. 202. 771.
— — Ammon. Brunneri, 761.
— gummosa, 202. 771
— hordeata amygdalina, 196.
— Jalapae, II. 31.
— kermetica, 243.
— laxans, II. 31.
— leniens, 80. 197. 201. 614.
— ad lumbaginem, II. 403.
— cum Manna, II. 104
— Myrrh. Griffithii s. ferrata, 681.
— narcotica, 702 II. 264
— nitrata s nitrosa, II. 414.
— c. Nuce vomica, 251.
— e Nucleis Persic. externa, II. 332.
— Olei Amygdalar., 201.
— — Terebinth., II. 666.
— oleosa, 201. II. 254.
— — volatilis, 176
— phosphorata, II. 336.
— Pineae Nucleor., II. 341.
— Pini s. Turion. Pini, 4.
— Pistaciarum, II. II. 347.
— purgans, II. 27. 31. 105. 491. 559.
— refrigerans, II. 409. 416.
— Ricini Olei, II. 491.
— salina, II. 428.
— sedativa, 792.
— — simplex, II. 224.
— Sublimati corrosivi, II. 186
— temperans, II. 324.
— c. Terebinthina s Terebinthinae, II. 653.
— terebinthinacea, II. 653.
— terebinthinata, II. 653. 666.
— vermifuga, 43 II. 559.
— Violarum, II. 714.
— violata, II. 714.
Emys lutaria, 719.
Endivia. 543.
Enema c. Acido sulph., 58.
— acetosum, 21.
— acidum. 54.
— adstringens, 351. 470. 521. 718. II. 452 654.
— — c. Opio, 718.
— — et tonicum, 283.
— amylaceum, 204.
— Amyli, 204.
— — anodynum, 204.
Enema Amyli cum Opio, II. 279.
— anodynum, 791. II. 266. 279. 280. 325.
— anthelminticum, 492. II. 702.
— anticolicum 492.
— antihystericum. 301.
— antihaemorrhoidale, II. 78.
— antilacteum, 69.
— antiperiodicum, 521.
— antisepticum, 521.
— antispasmodico-resolv., II. 606.
— antispasmodicum, 301. 491. 492. II. 229. 266. 606.
— antispasticum, 791.
— antisyphiliticum, II. 184.
— aperiens, II. 492.
— aquosum, 719.
— ad ascarides, II. 521. 606. 643.
— balsam. adstringens, II. 654.
— — — c. Opio, II. 654.
— c. Balsamo Copaivae, II. 740
— Belladonnae, 314.
— Camphorae pro equis, II. 270.
— camphoratum, 400.
— — Chinae c Asa, 301.
— carminativum, 223. II. 55.
— cathartieum, 103. II. 90.
— Chamomillae, 492.
— Chinae, 520.
— — c. Opio. 516.
— Cinchonae, 523.
— commune, II. 78. 440.
— Cubebae. II. 740.
— ad diarrhoeam, II. 329.
— domesticum, II. 78.
— emolliens, 131. 131. II. 78. 100. 254.
— excitans, 521 523.
— Filicis, II. 741.
— foetidum, 301.
— Granatorum Corticum. II. 452.
— grassum, 69.
— Hyoscyami, 791.
— involvens, II. 78.
— irritans, II. 247.
— laxans. II. 523. 595. 615.
— — et leniens, 455.
— leniens, 714. II. 279. 325. 654.
— Malvar. Folior. emolliens, II. 100.
— mannatum, 173.
— mercuriale, II. 163. 173. 183. 184.
— Nicotianae, II. 247.
— Olei Ricini, II. 492.
— Terebinthinae, II. 666.
— oleosum, II. 78. 254.
— opiaceum. II. 278.
— opiatum, II. 266. 279. 280.
— Opii, II. 266. 278.
— oxymellicum, 23.
— Papaveris, II. 325.
— Parietariae, II. 329.
— purgans, 257. 747 II. 96. 125. 582. 584. 595. 606. 615.
— — pictorum, 595.
— — pro equis, II. 606.
— — pro vaccis, II. 606.
— refrigerans, II. 414.
— resolvens, 492. II. 440.
— roborans, 523.
— Sabadillae, II. 521.
— salinum, II. 606.
— sedans, II. 278.
— sedativum, II. 261. 262. 266.
— — et adstringens, II. 307.
— — et emolliens, II. 311.
— Sennae, II. 595.

Enema stibiatum, 263.
— stimulans, 591. II. 248.
— — pro equis. II. 606.
— Sulphat. Magnesiae, II. 96
— Tabaci, II. 247.
— tabacinum, II. 247.
— Tanaceti, 301.
— temperans, 714.
— Terebinthinae, II. 654.
— terebinthinatum, II. 654 660.
— — c. Opio, II. 654.
— tonicum, 516
— vermifugum, 401. II. 492. 606. 646.
Ens Martis, 694.
— Veneris Boylei, 694.
Entalia, 380.
Enula, II. 2.
— Campana, II. 2.
Epidendrum Vanilla — Van arom.
Epithema Ammoniaci, 763.
— antiarthrit., II. 273.
— antihystericum, 222.
— Nicotianae, II. 248.
— rubefaciens, 179. II. 345.
— vermifugum, 105.
Epithymum Creticum, 632.
— officinarum, 632.
Epyrèle de succin ammoniacale. 169.
Epyretum Terebinth., II. 662.
Equi marini Dentes, 386.
— testes, 720.
Equisetum, 658.
— arvense. 658.
— fluviatile. 658.
— hyemale, 658.
— majus, 658.
— minus, 658.
— palustre, 658.
Erica. 658.
— vulgaris, 658.
Erigeron, II. 576.
— acre, 658.
— Canadense, 658.
— graveolens, 659.
— Philadelphicum, 658.
— viscosum, 659.
Erinaceus combustus, 381. 437.
— Europaeus, 381.
Erioxylon, 744.
Erodium moschatum, 741.
Errhinum adstringens, II. 352.
— contra ozaenam, 212.
— haemastaticum, II. 732.
Eruca, 355. II. 600.
— nigra, II. 600.
Ervum, II 712.
— Ervilia, II. 712.
— Lens, II. 65.
Eryngium, 659.
— aquaticum, 659.
— campestre, 659.
— foetidum, 659.
— marinum, 659.
— maritimum, 659.
— tricuspidatum, 659.
Erysimum Alliaria, 97.
— Barbarea, 659.
— officinale. 659
— praecox, 660.
— vulgare, 660.
Erythraea Centaurium, 473.
— Chilensis, 661
Erythrina monosperma, II. 48.
Erythrodaninum, II. 513.
Erythronium flavescens, 661.
— Indicum, II. 559.
Esox Lucius. 386
Esprit de violettes, II. 32.
Essence of orange, yellow, 567.
— — lemon peel, 570. v. Essentia.
Essence des violettes — Ol. Irid. destill.
— of jasmine II. 22. 33.
— of neroli, II. 22.
— of violets. II. 22.
— de tubereuses, II. 43.
— of peppermint, II. 124.
— — camomill., II. 458.
— of civet, II. 721.
— royale, II. 721.
Essentia Absinthii, 9.
— — amara, 10.
— — composita, 10.
— — totius, 9.
— Aconiti, 67.
— Agallochi Ligni. II. 71.
— alexipharm. Stahlii, II. 681.
— — temperata Stahlii, II. 682.
— Aloës, 104.
— amara, 10. 475. 739. II. 694.
— — Halensis. II.
— Ambrae comp. aeth., 154.
— — griseae. 153.
— — Hoffmanni. 153.
— — liquida, 154.
— — Minderери, 154.
— — sicca, 153.
— Amomi repentis, 441.
— Angelicae, 216.
— Angusturae, 220.
— anodyna Ludovici, II. 269.
— officinalis, II. 268.
— antarthrit. Hoffm. c. Opio, 463.
— — — sine Opio, 463.
— antihydrop. Hoffm., 111.
— antihysterica, 305. 460. 464.
— Antimonii, 255.
— antiscorbutica, 421.
— antiseptica Huxhami, 532.
— Aristolochiae Serpent., 281.
— aromatica, 417.
— Artemisiae Absinthii, 9
— Asae s. Assae foetidae, 304.
— — — aetherea, 303.
— — — kalica, 304.
— Aurantii, 566.
— — dulcis, 567.
— — flava, 567.
— — immaturi, 567.
— — sicca, 558.
— Aurantior. Cortic., 566.
— — — vinosa, 563.
— — Pomor. immatur., 567.
— Bals. Canad. roborans, 1.
— — — mundificans, II. 190.
— — Copaivae kalica, 322.
— — Peruviani, 327.
— balsamica. 327. 573.
— Bardanae Hillii, 756.
— Belladonnae, 314.
— Benzoës. 340.
— Benzoini, 340.
— Bergamottae, 568.
— bezoardica Halensis, 217.
— — Bonplandiae, 220.
— Bruceae, 220.
— Calami, 372.
— Canellae albae, 416.
— Cantharidis s. Canth. vesic., 424.
— Cardamomi, 441.
— Cardui benedicti, 444.
— carminativa, 418.
— — Trilleri, 568.
— — Wedelii, II. 720.
— Carvi, 418.
— Caryophyllatae, 742.
— Capsici s. Caps. annui, II. 343.
— Cascarillae, 454.
Essentia Cassiae Baccae s. cinnam. vel ligneae, 416.
— Castorei, 462.
— — Canadensis, 462.
— — carminativa, 466.
— — Moscovitici s. Rossici, 462.
— — Novae Angliae, 462.
— — opiata, 463.
— — simplex, 462.
— — thebaica, 463.
— — vulgaris, 462.
— Catechu, 472.
— — Terrae. 472.
— catholica purg. Rothii, II. 33
— de Cedro, 569.
— Centaureae bened., 444.
— Centaurii min, 474.
— cephalica, 373.
— Chinae, 531.
— — alexipharmaca, 532.
— — antisept. Huxh., 532.
— — compos., 532.
— — concentrata, 532.
— — Hellwigii, 532.
— Cicutae, 548.
— Cinchonae s. Cinch. offic. 531.
— — lancifoliae, 531.
— Cinnamomi, 416.
— — comp., 417.
— Citri sicca, 570.
— Cochleariae, 581.
— Conii, 548.
— Corticis Peruv., 531.
— — — alexipharm. Huxh., 532.
— — — comp., 533.
— — Winterani, 606.
— Corticum Winteranor., 607.
— cosmetica, 341.
— — simpl., 340.
— Croci, 609
— Culilaban s. Culilawan, 615.
— Digitalis, 650.
— — purpureae, 650.
— dulcis, II. 423.
— emetica Helvetii, 228.
— foetida, 304.
— Fuliginis Clauderi, 189.
— Galbani, 359.
— Gei urbani, 742.
— Gentianae, 737.
— — rubrae, 737.
— Glechomae hederac., 775.
— Guajaci, 750.
— G. Ammoniaci, 760.
— — — kalina. 760.
— haemato-cathart., 189.
— — et alexiph. Claud., 189.
— Hederae, 775.
— Hyoscyami, 792.
— — nigri, 792.
— Hyperici, 798.
— hysterica, 401.
— Jasmini, II. 34.
— Jugland. Cortic. virid., II. 35.
— Lactucae virosae, II. 52.
— Lauri Cinnamomi, 416.
— Levistici, II. 74.
— Ligni Aloës, II. 71.
— — Guajaci, 750.
— — Sassafras, II. 553.
— — — comp. II. 553.
— Lignorum, 751.
— Limonum, 569.
— Liquiritiae. II. 85.
— Lyttae s. L. vesicat., 424.
— Macidis, II. 232.
— Macis, II. 232.

Essentia Malti, II. 98.
— martiata aperitiva, 689.
— Martis aperiens, 689.
— — aperitiva, 689.
— Mastiches s. Mastichis, II. 108.
— mastichina, II. 108.
— Meliss. comp., II. 112
— Meloes vesicatorii, 424.
— Menthae pip., II, 120. 124.
— Menyanthis, II. 694.
— Millefolii. II. 217.
— Millepedum, II. 219
— Mimosae Catechu, 472.
— moschata, II. 229.
— Moschi, II 229
— Myrrh. alcalisata, II. 238 240.
— — alcoholica, II. 239
— Myrti, II. 241.
— nigra Anglica, II. 258
— Nucis moschatae, II. 232.
— Nucum Cortic. virid., II. 35.
— — Jugl. Cortic. virid., II. 35.
— Papaveris. II. 260.
— Pareirae bravae, 556.
— Pimpinellae albae, II. 339
— — — kalica, II. 340.
— Pini, 2. II. 341.
— Piperis, II. 343.
— polychresta Gundelsheim., II. 343
— Populi, II. 389.
— — Oculorum, II. 589.
— — vulneraria, II. 389.
— Pulegii II. 450.
— regalis, II. 721.
— Rorismarini, II, 507.
— Rosarum, II. 501.
— Sabinae, II. 41
— Sassafras, II. 553
— — comp., II 553
— scillit. Keupii, II. 425.
— Scordii, II. 681.
— de Scordio comp., II. 682
— Senegae, II. 385.
— Sennae praep, Selway's. II. 595.
— Serpentariae, 281.
— Sinapis. II. 603.
— Spicae Indicae. II. 243.
— splenetica Stahlii, 798.
— Stibii, 255.
— stomachica. 561.
— — polychresta Gundelsh., II. 343.
— Stramonii, 612.
— Succini. II. 631
— — alcoholisata, II. 631.
— — alcoholica, II. 631.
— Terebinthinae, II. 652. 662.
— Terrae Catechu, 472.
— — Japonicae, 472.
— theriacalis, 213. II. 302.
— traumatica, II. 687.
— Trifolii fibrini, II. 694.
— Valerianae, II. 704.
— — ammoniata, II. 705.
— — composita, II. 703.
— — volatilis, II. 705.
— contra vermes, II. 648.
— vermifuga, II. 648.
— Vincetoxici. 378.
— vulneraria simpl., II. 108.
— — Stahlii, II. 663.
— Zedoariae, II. 720.
— Zibethi, II. 721.
— Zingib Jamaic. concentr., Oxley's, II. 736.
Etula minor, 662.
Etain de glace, gris v. Stannum.
Eucalyptus resinifera. II. 46
Euchloras Potassae, II. 419.
Eugenia Caryophyllata, 448.
Eupatorium 662.
— Ayapana, 662.
— cannabinum, 662.
— Mesues, 732.
— perfoliatum, 662.
— purpureum, 662
— teucrifolium, 662.
— veterum. 87.
Euphorbia, 662.
— Antiquorum, 663.
— Canariensis. 663.
— corollata, 662.
— Cyparissias. 662.
— Helioscopia, 662.
— Ipecacuanha, 663.
— Lathyris, 266.
— officinarum, 663.
— palustris, 662.
— Peplus, 663.
— sylvatica, 663.
Euphorbii correctio, 663.
Euphorbinum, 663.
Euphorbium. 663.
Euphragia, 665.
Euphrasia, 664.
— officinalis. 664.
— ophthalmica, 664.
Evonymus, 665.
— Europaeus. 665.
Excoecaria Agollocha, II. 71.
Exostema angustifol. — Cinchona angust.
Extractum Absinthii, 6.
— — alcoholicum, 9.
— — aquosum, 6.
— Acetosellae, 17.
— Aconiti. 66.
— — alcoh., 66.
— — Herbae recentis, . 66.
— Acori v. Extr. Calami.
— Agallochi Ligni, II. 71.
— Agarici aquosum, 96.
— — alcoholicum, 80.
— — aloëticum, 592.
— Agrimoniae. 87.
— Alkekengi Fruct., 96.
— Aloës, 103.
— — Acido sulph. correctum, 104.
— — aquosum, 103.
— — gummosum. 103.
— — Poerneri, 104.
— — purificatum. 103.
— — absque Resina, 103.
— — resinosum, 104.
— amarum, II. 603.
— Anemones pratensis, 207.
— Angelicae, 215.
— Angusturae, 219.
— anodynum. II. 276.
— Anthemidis, 489
— — nobilis, 489.
— Aristolochiae, 281.
— Arnicae alcoholicum, 284.
— — aquosum, 283.
— Artemisiae. 293.
— — Absinthii aquos., 6.
— Asari, 307.
— Aurantii Folior., 561.
— Aurantior. Cort. aquos., 561.
— — — alcoholicum, 567.
— Bardanae, 332.
— Beccabungae. II. 712.
— Belladonnae, 313.
— — Herbae recentis, 314.
— Betulae, 349.
— bezoard. Camerarii, 216.
Extractum Bilis, 668.
— — bovinae, 668.
— Bistortae. 351.
— Boraginis, 353.
— Bryoniae, 356.
— Buglossi. 206.
— Calami, 372.
— — arom. alcoholic., 372.
— — — gummoso-resinos., 372.
— — — vinosum, 372.
— Calendulae. 393.
— — Herb. recentis. 393.
— Campechiens. Ligni, II. 72.
— Cantharidum, 423.
— Cardui benedicti, 443.
— — tomentosi, 443.
— Carnis, II. 314.
— Caryophyllatae, 743.
— Cascarill. alcoholic., 453
— — aquosum, 452.
— — gummosum, 452.
— — resinoso-gummos., 452.
— — resinosum, 452.
— Cassiae, 455.
— — Fistulae, 455.
— — Sennae, II. 584.
— Castorei, 462.
— Catechu, 467.
— catharticum, 590.
— catholicum, 590. II. 478.
— Centaureae benedictae, 43
— Centaurii min. alcoholic., 475.
— — — aquosum, 475.
— — — spirituos., 475.
— Cerefolii, 484.
— — Hispan., 484.
— Chacarillae Cort., 452. 453.
— Chaerophylli, 484.
— Chamaedryos, II. 678.
— Chamaemeli. 489.
— Chamomillae, 489.
— — vulgaris, 489
— Chelidonii majoris, 495
— — Herbae recentis, 495.
— Chinae alcoholico aquos., 513.
— — alcoholicum, 514.
— — aquosum, 511.
— — durum, 512.
— — emulsivum, 513.
— — frigide parat., 511.
— — fuscae et reg. frig. par. 511.
— — gummosum, 511.
— — molle, 512.
— — resinosum, 514.
— — spirituosum. 514.
— — vinosum, 513.
— Cichorii, 543
— Cicutae, 546.
— — virosae, 546.
— Cinchonae 511.
— — alcoholico-aquosum, 513.
— — aquosum. 511.
— — durum, 512.
— — flavae et rubrae, 511.
— — gummosum. 511.
— — officinale, 513.
— — resinosum. 513.
— cnico pharmacum, II. 478
— Cocculi. 578.
— — Indici. 578.
— Cochleariae, 579.
— Colchici. 585.
— Colocynthidis. 589.
— — comp., 590,
— Colombo, 590.

Digitized by Google

Extractum Columbo, 596.
— Conii, 546.
— — maculati, 546.
— — — Herbae recent., 546.
— Contravervae, 600.
— Convallariae, 602.
— Convolvuli Jalapae, II. 28.
— Cort. Peruv. alcoh. aquos., 513.
— — — alcoholicum, 514.
— — — aquosum, 511.
— — — durum, 512.
— — — frig. parat, 511.
— — — gummosum, 511.
— — — reductum, 515.
— — — c. Resina, 513.
— — — resinosum, 513 514.
— — — spirituosum, 514.
— — — vinosum, 513.
— Croci alcoholicum, 608.
— — aquosum, 607.
— Daturae Stramonii, 641.
— Dauci, 643.
— — Carotae, 643.
— — Radicis, 643.
— Digitalis Herb. recent., 649.
— — purpureae, 648.
— Dulcamarae, 654.
— Elaterii, II. 219.
— Enulae (aquos.), II. 4.
— — alcoholic., II. 6.
— Esulae, 663.
— Fellis, 668.
— — Tauri, 668.
— Ferri, 697. 698.
— — cydoniatum, 699.
— — pomatum, 698.
— — c. Tartaro, 702.
— Filicis aethereum, II. 737.
— — oleoso - resinos., II. 737
— Flammulae Jovis, 577.
— Fumariae, 712.
— Gallarum, 718.
— Genistae, 732.
— Gentianae, 733.
— — alcoholic., 734.
— — aquosum, 733.
— — durum, 734.
— — luteae, 733.
— Geoffraeae, 740.
— Glechomae hederac., 774.
— Glycyrrhizae, II. 80.
— Goulardi, II. 359.
— Graminis, 744.
— — liquidum, 744.
— Gratiolae, 746.
— — alcoholic., 746.
— — Herb. recent., 746.
— Guajaci, 748. 749.
— Haematoxyli, II. 72.
— Hederae terrestr., 774.
— Helenii aquos., II. 4.
— — alcoholic., II. 6.
— Hellebori albi, 779.
— — nigri, 777.
— — alcoholic., 777.
— — sec. Bacheri meth., 777.
— — — vinosum, 777.
— Hippocastani aquos., 73.
— — spirit., 73.
— Humuli, II. 88.
— Hyoscyami alcohol., 792.
— — aquosum, 790.
— — Herb. recent., 790.
— Hyperici, 797.
— Jaceae, I. 23.
— Jalappae alcohol., II. 28.
Extractum Jalappae aquosum, II. 28.
— — durum, II. 28.
— — gummosum, II. 27.
— — resinosum, II. 28.
— Inulae, II. 4. 6.
— Ipecacuanhae, II. 15.
— Iridis Flor., II. 20.
— Jugandis, II. 34.
— Juniperi, II. 39.
— — Bacc. optimum, II. 40.
— — — sine contus, II. 40.
— — — contus., II. 40.
— Ivae, II. 679.
— Lactucae, II. 52.
— — sativae, II. 52.
— — vinosae, II. 51.
— Lapathi, II. 517.
— Laurocerasi, 478.
— Leontodont. Tarax., II. 650.
— Levistici, II, 74.
— Lichen. Island., II. 67.
— Ligni Aloës, II. 71.
— — Campech., II. 72.
— — Guajaci alcohol., 749.
— — — aquosum, 748.
— — — durum et molle, 748.
— — — resinosum, 749.
— — — vinosum, 748.
— — Haematoxyli, II. 72.
— — Quassiae, II. 456. 457.
— — Sassafras, II. 563.
— Ligustici, II. 74.
— Liliorum Convall., 602.
— Liquirit. crudum, II. 79.
— — depuratum, II. 79.
— — siccum crud., II. 79.
— — Succi, II. 80.
— Lupuli, II. 88.
— — alcoholicum, II. 88.
— Lupulini, II. 89.
— — coct. parat., II. 89.
— — alcoh. s. resinos., II. 89.
— Mahagony, II. 642.
— Malatis Ferri, 698.
— marocostinum, III.
— Marrub. alb. alcohol., II. 106.
— — — aquosum, II. 106
— Martis, 697. 698. 701.
— — aceticum, 697.
— — aperiens Lemery, 700.
— — — Mynsichti, 700.
— — cydoniatum, 699.
— — pomatum, 698.
— — cum Succo Pomor., 698.
— — c. Tartaro, 702.
— Matricariae, II. 109.
— Melampodii, 777.
— Melissae, II. 112.
— Millefolii alcohol., II. 216.
— — aquosum, II. 216.
— Mimosae Catechu Ligni, 467.
— Momordicae Elaterii, II. 219.
— Myrrhae aquosum, II. 234.
— — compositum, II. 235.
— — graminatum, II. 235.
— — gummosum, II. 234
— — absque resina, II. 234.
— — resinosum, II. 235.
— Narcissi pratensis, II. 242.
— Nasturtii II. 244.
— Nicotianae, II. 246.
— — mitigatum, II. 246.
— c. Nuce vomica, II. 251.
Extractum Nucis vomic. alcohol., II. 251.
— — — aqnosum. II. 251.
— — — siccum, II. 251.
— Nucum II. 35.
— — Juglandis, II. 35.
— — Juglandium, II. 35.
— — vomicar, II. 251.
— — — spirit., II. 251.
— Opii, II. 274.
— — acetosum, II. 268.
— — alcoholic., II. 265.
— — Aqua paratum, II. 274.
— — aquosum, II 274.
— — — Narcotina priv., II. 275.
— — cinnabarin., II. 159.
— — crocatum, II. 276.
— — cydoniatum, II. 276. 277.
— — Diestii, II. 275,
— — per fermentat., II. 276.
— — glycyrrhizat., II. 277.
— — gummo resinosum, II. 265.
— — gummosum, II. 274.
— — Morphina privatum, II. 221.
— — siccum, II. 258. 275.
— — resinosum, II. 265.
— — thebaicum, II. 258. 274.
— — vinosum, II. 259.
— Osmundae regàlis, II. 257.
— Paeoniae, II 316.
— panchymagogum, II. 478.
— — Crollii, 590.
— — Quercetani, 590.
— Papaveris albi, II 325.
— — erratici, II. 322.
— — Rhoeados, II. 322.
— — somnifer. II. 325.
— Patientiae, II. 517.
— Peucedani, II. 333.
— phlegmagog. Quercetani, 590.
— Pimpin. alb., II. 339.
— Pini alcoholis., 2.
— — aquosum. 2.
— Piperis nigri, II. 342.
— Plantaginis, II. 350.
— Plumbi, II. 359.
— Podophylli, II. 384.
— Polygalae amarae, II. 385.
— — Virginicae, II. 385.
— Pomor. ferrarium, 698.
— — liquidum, 699
— Pulsatillae alcoholic., 207.
— — aquosum, 207.
— — Herbae recentis, 207.
— — nigricantis, 207.
— Pyrolae umbellatae, 455.
— Quassiae alcoholicum, II. 456.
— — aquosum, II. 456.
— — Ligni, II. 456.
— Quercus Corticis, II. 459
— Ratanhae, II. 468
— — venale, II. 468.
— Ratanhiae, II. 468.
— — siccum, II. 468.
— Rhabarb. alcoholic., II. 477.
— — aquosum, II. 477.
— Rhapontici, II. 472.
— Rhei alcoholicum, II. 477.
— — aquosum, II. 477.
— — composit., II. 478.
— Rhoeados. II. 322.
— Rhois radicantis, II. 487.
— — Toxicodendri, II. 487

Extractum Rorismarini, II. 505.
— Rubiae alcoholic., II. 513.
— — aquosum. II. 513.
— Rutae alcoholic., II. 519.
— — aquosum, II. 519.
— Sabinae alcoholic., II. 41.
— — aquosum, II. 40.
— Salicis aquosum, II. 526.
— — spirituos., II. 527.
— Salviae, II. 529.
— Sambuci Bacc., II. 535.
— — Flor., II. 536.
— Santonici Sem. aether., 552.
— Saponariae, II. 542.
— Sarsaparillae, II. 545.
— Sassafras, II. 553.
— Saturni, II. 358. 359. 369.
— — Goulardi s. liquid., II. 358.
— Scillae, II. 364.
— Scordii, II. 680.
— Scorzonerae, II. 573.
— Senegae, II. 385.
— — Radicis, II. 385.
— Sennae alcohol., II. 584.
— — (Fol.) aquosum, II. 584.
— Siliquae dulc., 479.
— Smilacis asperae, II. 545.
— solutivum, II. 584.
— Stramonii, 641.
— — Herbae recent., 641.
— — e Seminibus, 641.
— Tabaci, II. 246.
— Tanaceti alcohol., II. 648.
— — aquosum, II. 647.
— Taraxaci, II. 650.
— — liquid., II. 650.
— Theae, II. 683.
— thebaicum, II. 258.
— — ammoniacale, II. 86.
— theriacale, II. 301.
— Tormentillae, II. 687.
— Trifol. fibr. alcohol., II. 693.
— — — aquosum, II. 692.
— Tritici repentis, 744.
— Turion. Pini alcohol., 2.
— — — aquosum, 2.
— Turpethi, II. 695.
— Ulmi, II. 696.
— Urticae, II. 697.
— Valerianae alcohol., II. 704.
— — aquosum, II. 703.
— — frigide parat., II. 703.
— — siccum, II. 704.
— vegetabile (vegetable extract.), II. 116.
— Verbasci, II. 710.
— Verbenae, II. 710.
— Veronicae, II. 712.
— Vincetoxici, 307.
— Virgae aureae, II. 716.
— Visci aquosum, II. 717.
— — vinosum, II. 717.
— Vitis Pampinor., II. 718.
— Zedoariae, II. 720.
Exuviae Serpentum, 721.
Eye-water, Bate's, 622.

F.

Faba, 665.
— alba, 665.
— febrifuga, 665.
— St. Ignatii, 665.
— Indica, 665.
— marina, 380.
— Pichurim, 666.
— — major et minor, 666.
— Tunka, 666.
Faba vulgaris, 665.
Fabae v. Faba.
Fabaria, 607.
Faecula amylacea, 202.
— Ari, 295.
— Aristolochiae, 280.
— Arrowroot, 285.
— Belladonnae, 313.
— Bryoniae, 357.
— Chinae, 500.
— Cicutae, 546.
— Cucumeris agrestis, II. 220.
— Hippocast. Fruct., 72.
— Hyoscyami, 790.
— Ireos, s. Iridis, II. 21.
— Marantae, 285.
— Paeoniae, II. 316.
— Sagittariae, 285.
— Sagu, II. 523.
— Solani tuberosi, II. 619.
— Stramonii, 640.
— Tapioca, II. 649.
Fagara octandra, II. 642.
Fagopyrum, 666.
Fagus, 666.
— Castanea, 457.
— sylvatica, 666.
Farfara, 666. 667.
Farina Hordei, 785.
— — amygdalata, 785.
— — praeparata, 785.
— fossilis, 379.
— Lini Placentarum, II. 76.
— Secalis, II. 574.
Farinae emollientes, II. 76.
— Potatoe, II. 619.
— resolventes, 709. II. 574.
Febrifugum Cranii, 226.
— salsum, II. 403.
Fecula vide Faecula.
Fel Anguillarum, 668.
— bovinum, s. Bovis, 667.
— — inspiss., 668.
— Leporis, 668.
— Siluri, 668.
— Tauri, 667.
— — inspissat., 668.
— Terrae, 473.
— Ursi, 668.
— Vitri, II. 409.
Fenum v. Foenum.
Ferculum commune, 785.
— Saxonicum, 785.
Fermentum Cerevisiae, 669.
— Panis — Panis.
Feronia Elephantum, 766.
Ferraria — Scrophularia aquat.
Ferri Carbonas, 680.
— Fila, 670.
— Limaturae purif., 670.
— Murias, 690.
— Oxydi Squamae, 675.
— Oxydum, 675. 678.
— — nigrum, 675.
— Ramenta, 670.
— Rubigo s. Subcarbonas, 680.
— Scobs, 670.
— Squamae purif., 675.
— Sulphas venale, 685.
— Tartarum, 702.
Ferrocyanas Potassae, 40.
Ferrum 669.
— aceticum, 697.
— — oxydatum, 697.
— ammoniacale, 694.
— ammoniacat, 694.
— ammoniat., 694.
— Borussicum, 707.
— carbonic., 680.
— Haematites, 678.
— hydraticum, 680.
— hydrocyanic., 707.
Ferrum hydroiodic., II. 11.
— magnet. compact., 675.
— muriat., 690.
— — oxydat., 690.
— — — crystall., 690.
— — oxydulat., 690.
— nitricum, 689.
— oxydatum, 680.
— — carbon. et fusc., 680.
— — fuscum, 680.
— — hydratic., 680.
— — hydrocyanic., 707.
— — rubrum, 678.
— oxydulat. magnet., 675.
— — nigrum, 675.
— — rubrum, 678.
— — et oxydat. hydrocyan., 707.
— — sulphuric., 674.
— phosphoricum, 684.
— potabile 700.
— praeparatum, 670.
— pulveratum s. pulverisat., 670.
— purum politum, 670.
— — selectum, 670.
— salitum, 690.
— sidero-zootic., 707.
— subcarbonic., 680.
— sulphuratum, 674.
— sulphuricum, 685.
— — crystallis., 685.
— — oxydulat., 685.
— tartarisatum, 700.
— vitriolatum, 685.
— — exsiccatum, 685.
— — ustum 678.
— zooticum, 707.
Ferula Ammon. et Ferulago — G. Ammon.
— Asa s. A. foet., 297.
— Opoponax — Opopanax.
— orientalis, 758.
— Persica, II. 523.
Festuca fluitans, 641.
Ficaria, 494. II. 573.
Ficus, 445.
— Carica, 445.
— Indica, II. 48.
— infernalis, II. 250.
— passae, 445.
— religiosa, II. 48.
— vulgaris, 445.
Filicula dulcis, II. 387.
Filipendula, II. 621.
Filix, 311. II. 449.
— Femina, II. 449.
— florida, II. 257.
— Mas, 311.
— non ramosa dentata, 311.
Flammula, II. 462.
— Jovis, 576.
Flavedo Cortic. Aurantior., 557.
— — Citri, 569.
Flores Aeris, 630.
— Antimonii, 227.
— — argentei, 227.
— Auri, 694.
— bechici, II. 100.
— Benzoës s. Benzoini, 24.
— Bismuthi, 351.
— Boracis, 26.
— Calomellis, II. 162.
— Cerevisiae, 669.
— martiales, 694.
— Salis Ammoniaci, 181.
— — — haematitati, 694.
— — — martiales, 694.
— — — volatiles, 171.
— — Armoniaci, 181.
— Sulphuris, II. 633.
— — compositi, 113. 120.

Flores Sulphuris depurati, II. 634.
— — loti, II. 634.
— viridis Aeris, 631.
— Zinci, II. 723.
Fluxus albus, II. 400.
Foeniculum, 208.
— aquaticum, II. 334
— dulce, 208.
— Lusitanicum, 155.
— marinum s. maris, 607.
— porcinum, II. 333.
— ursinum, II. 215.
— vulgare, 208.
Foenum Camelorum, 206.
— Graecum, 708.
Folia Cochlearum, 380.
Folium Indicum s. Indum, 403.
Folliculi Sennae, II. 577.
Fomentatio acetosa camph., 400.
— adstringens, 148. 687. 717. II. 350 362. 452. 460. 731.
— ammoniacal. camph., 176.
— anodyna, 135. II. 325.
— anthelmintica, 281.
— antihaemorrhoidal., 99. II. 101.
— antiphlogist., II. 441.
— antipleuretica, II. 325.
— antiseptica, 522. 523 II. 460.
— aromatica, 449.
— Brünningshaus., II. 393.
— calida extemporanea, II. 742.
— camphorata, 400.
— contra colicam, 492.
— communis, 23.
— c. Concinno, II. 460.
— detersiva, II 310
— discutiens, 39.
— diuretica, 183.
— emmenagoga, 357
— emolliens, 130. 135. II. 77.
— — et laxativa, 135.
— excitans, II. 247. 428. 533.
— frig. s frig. Schmuck., Richt., II. 416.
— incitans, 399. II. 428.
— Juniperi Baccar. vinosa, II. 713.
— lax. et. antispasmod., II. 440.
— leniens, II. 259. 267. 325. 371.
— Malvae, II. 101.
— narcotica, II. 278.
— nitrica, 50.
— contra perniones, 542.
— c. Querc. Cort., II. 460.
— refrigerans, II. 362. 416.
— — Schmuckeri, II. 416.
— resolvens, 183. 187. 190. II. 362. 370. 403. 537. 670.
— Richteri, II. 417.
— roborans, II. 460.
— Rosar. vinosa, II. 713.
— saponacea, II. 441.
— saturnina, II. 370.
— sedans, II. 267. 371.
— sinapina s. sinapisata, II. 603.
— styptica, II. 460.
— Tabaci, II. 247.
— c. Tannino, II. 460.
— tonica, 492.
— vinosa, II. 713.
— — alcoholica, II. 713.
— — cum Salvia, II. 713.
— Zinci Sulphatis, II. 730.
Fomentum Acidi phosph., 54.
— adstringens, 375.
— aluminosum — Aqua alum.
— ammoniac. camph., 176.
— aromaticum, II. 507. 681.
— Belladonnae ammoniat., 187.
— calcareum c. Myrrha, 375.
— camphoratum, 400.
— ad colicam, 492.
— commune, 23.
— — c. Muriate Ammoniae, 183.
— — per se, 23.
— — tepidum, II. 737.
— detergens, II. 310.
— discutiens, 23.
— emolliens, Species pro, 130
— excitans, 275. II. 529.
— frigid. Schmuck., II. 416.
— nitricum, 50.
— ad perniones, 542.
— ad pustulas favendas, 275.
— quercinum, II. 460.
— refrigerans, II. 362.
— resolvens, 491. II. 537.
— Saponis comp., II. 440.
— — ammoniat., II. 440.
— saturninum, II. 370.
— — c. Opio, II. 362.
— siccum, II. 537
— Specier. aromat., 486.
— tonico-adstring., II. 731.
— — antisept., 3 2.
— vulnerar. acidum, 23. Mixt.
Fondant v. Fundans.
Formica, 709.
— fusca, 709.
— nigra, 709.
— rufa, 709.
Formicae, 709.
— c. acervo, 709.
Fotus adstringens, II. 460.
— anodynus, II. 710.
— antisepticus, II. 460
— aromaticus, 8.
— ex Bryonia, 357.
— carminativus, II. 45.
— Cicutae, 548.
— communis, 8.
— discutiens, 23 183. 492.
— frigidus 23. II. 416.
— — Schmuck., Richteri, II. 416.
— ad gangraenam, 523.
— refrigerans, 23. II. 416.
— — et deprimens, 23.
— resolvens, II. 537.
Fraga, 710.
Fragaria, 710.
— Vesca, 710.
Fragum, 710.
Frangula II. 470.
Frasera Caroliniensis, 594.
— Walteri, 594.
Fraxinella, 646.
Fraxinus, 711.
— argentea, II. 102.
— excelsior, 711. II. 102.
— Ornus, II 102.
— parviflora, II. 102.
— pumila, 646.
— rotundifolia, II. 102.
— subrufescens, II. 102.
— sylvestris, II. 620.
Frontale anticephal., 398.
— hypnoticum, 789
Fructus Cardamomi, 440.
— Caricae, 445.
— pectorales, 445.
— Tamarindorum, II. 643
Frumenti Spiritus, 89.
Frumentum, II. 574.
Fucus, 711.
Fucus barbatus, 781.
— ericoides, 781.
— fasciatus, 781.
— Helminthochortos, 781.
— plumosus v. F. Helmintoch
— purpureus v. F. Helmint.
— saccharatus v. Iodum.
— sedoides, 781.
— vesiculosus, 711.
Fuligo, 711.
— Ligni, 711.
— splendens, 711.
Fumaria, 712.
— bulbosa, 712.
— officinalis, 712.
Fumigatio Acidi nitrici, 50.
— antiloimica Gaubii, 275.
— antiseptica, 50.
— antivenerea, II. 156.
— aromatica, II. 255.
— Chlori, 540.
— Cinnabaris, II. 156.
— desinfectans, 50. 275. 540.
— Guyton-Morviana, 540.
— hygiaenica, 540.
— mercurialis, II. 156.
— muriatico-oxygenata, 540.
— nitrica Smithiana, 50.
— nitrosa, 50.
— oxy muriatica, 540.
— resinosa, II. 673.
— Smithiana, 50.
— volatilis, 158.
Fumigationes, v. Fumigatio.
Fumiterra, 712.
Fundans (remedium) Lassone, II. 434.
— Antimonii Lemery, 274.
— Richardi, II. 609.
— Rotrou, 234.
— Ruhlandi, 235.
Fungus Bedeguar, 338.
— chirurgorum, 353.
— Cynosbati, 338.
— Laricis, 85.
— Melitensis, 637.
— quercinus, 86.
— Rosae, 338.
— Salicis v. Boletus suaveol.
— Sambuci, II. 692.
Furfur, 713.

G.

Gadus Lota, 387.
— Morrhua, 69.
Gagates, 714.
Galanga, 714.
— major, 714.
— minor, 714.
— spuria, 714.
Galbanetum s. Galbanetum Paracelsi, 359.
Galbanum, 357.
— colatum reductum, 366.
— depuratum, 358.
— in granis, 357.
— in lacrymis, 357.
— in massis, 358.
— rubrum, 358.
Galbuli Cupressi, 617.
Gale, 714. 715.
— frutex, 714.
Galega, 715.
— officinalis, 715.
— Virginiana, 715.
Galena, II. 351.
Galeopsis, II. 54.
Galipea Cusparia, 219.
— febrifuga, 219.

Galium, 715.
— album, 715.
— Aparine, 715.
— cruciatum, 613.
— luteum, 715.
— Mollugo, 715.
— uliginosum, 715.
— verum, 715.
Galla, 716.
— alba, 716.
— de Aleppo, 716.
— nigra, 716.
— quercina, 716.
— tinctoria, 716.
— turcica, 716.
Gallae v. Galla
Gallato Carbonas Potassae, II. 399.
Gallinae stercus, 65.
— ventriculus, 721.
Gallitriche, II. 528.
Gambogia, 772
Gambogium, 772.
Garcinia Cambogia, 772.
Gardenia gummifera, elemifera, 656
Gargarisma aceticum, 23.
— acetosum, 183.
— acidulum, 23.
— acidum, 58.
— adstringens, 35. 149. 187. 397. 621. 717. II. 301. 370. 453. 469. 603. 688. 731.
— — acidum, 58.
— — detergens, 58.
— Aeruginis, 618
— aluminosum, 149.
— ammoniacale, 158. 175.
— ammoniatum, 158. 175.
— in angina maligna, 23.
— antiodontalgicum, II. 454.
— antiphlogisticum, 80.
— antiscorbuticum, 35. 583. 584. II. 99. 465.
— antisepticum, 182. 522 525. 542. II. 460.
— antisyphiliticum, II. 184 185. 186.
— antivenereum, II. 162. 208.
— ad aphthas, 472. II. 612.
— Belladonnae c Hydr., II. 189.
— — mercuriale, II. 189.
— Boracis s. Boracis Sodae, II. 612.
— e Borace, II. 612.
— camphoratum, 398.
— Capsici annui, II. 345.
— chloricum, 542.
— Cochleariae, 581
— commune, 789. II. 413. 499. 612.
— cupratum, 621.
— desinfectans, II. 740.
— detergens s detersivum, 35. II. 210. 498 537 612.
— emolliens, 130. 134. 598.
— excitans, II. 345 454.
— — piperitum, II. 345.
— leniens, 134. II. 101. 279. 325. 328.
— c. Melle rosato, II. 498.
— mercuriale, II. 129. 184. 192
— Muriat. Ammon., 182.
— — Hydrarg oxyd., II. 183.
— Nasturtii comp., 583.
— nitratum, II. 414.
— nitrosum, II. 414.
— opiaceum, II. 266.
— Oxymuriat. Hydrarg., II. 183.
— piperitum, II. 345.
Gargarisma Potassae Nitratis, II. 414.
— Pyrethri, II. 454.
— Quercus, II. 460.
— refrigerans, II. 414.
— resolvens. 182.
— salitum. 187.
— Salviae c. Acido muriat., 35.
— saturninum, II. 370.
— e Scilla, II. 571.
— scilliticum, II. 571.
— sedans, II. 325 370.
— sedativum, II 278.
— sialagogum. II. 454. 602.
— Spiritus Salis, 35.
— stimulans, 175. 638. II. 345. 529.
— stypticum, II. 361.
— Subboratis Sodae. II. 612.
— Sublimati corros., II. 184.
— tonicum, 601
— in ulcerib. venereis, II. 184.
— viride, 618.
Garrus v. Elixir cord. et stomach.
Gas Acidi carbonici, 27.
— — muriat. oxygen., 540.
— — oxymuriat., 540.
— acidum carbonic., 27.
— — muriaticum, 33.
— azoticum, 320
— — oxygenatum, 320.
— Chlori, 540.
— hepaticum, 43.
— hydrocarbonatum, 718.
— Hydrogenium, 718.
— — carbonat., 718.
— — percarbonatum, 718.
— — sulphuratum, 43.
— hydrosulphuratum, 43.
— inflammabile, 718.
— Oxydum nitrosum, 180.
— Oxygenium, II. 315.
— sulphuric. s. sulphuros., II. 738.
Gascarilla, 451.
Gaultheria procumbens, 718.
Gaz v. Gas.
Gelappium, II. 23.
Gelatina, 719.
— Amyli, 203.
— ex Amylo Solani tuber., II. 619.
— analeptica, 728
— animalis. 719. 726.
— Brassicae rubrae, 354.
— e Carne Quadrup., Volatil, 727.
— cum China, 523.
— Chinae, 500.
— Collae. 726.
— Cornu Cervi, 726. 727.
— — — acida, 727.
— — — amygdalata, 727.
— — — citrata, 727.
— e Crure bubulo, 727.
— Cydoniorum, 634.
— — aromatica, 634.
— Fragariae. 710.
— Gloucesteri, II. 523.
— Glycyrrhizae, II. 81.
— Grossulariae, II. 489.
— Helminthochorti, 782.
— Hordei germanici, 785.
— Ichthyocollae, 726.
— laxans, II. 102.
— leniens. 726.
— Lichenis c. China, II. 70.
— — Island., II. 69
— — opiata, II. 670.
— Liquiritiae, II. 81.
Gelatina Oxycocci, II. 699.
— Panis, II 321.
— Pomorum, II. 388.
— purgans, II. 30.
— Ribesiorum nigr., II 488.
— Ribium, II. 489.
— Rubi Idaei, II. 515.
— Sagu, II. 523.
— Saleb s. Salep, II. 524.
— Tapioka, II 649.
— Testudinum, 726
— Vituli Pedum, 726.
— vitulina, 726.
Genipi album, 294.
— nigrum, 294.
— spurium 731.
— verum, 731.
Genicella, 731.
Geniculata, 731.
Genista, 732.
— angulosa, 732.
— Canariensis, II. 74.
— juncea, 732.
— sagittalis, 732.
— scoparia, 732.
— tinctoria, 732.
Genistella, 732.
Gentia, 740.
Gentiana, 732.
— alba, II. 54.
— Catesbaei. 733.
— Centaurium, 473.
— Chirayita, 370.
— cruciata, 613.
— lutea, 732 733.
— major 733.
— minor, 613.
— nigra, II. 576.
— purpurea v. G. lutea.
— rubra, 733.
— veterum, 733.
Gentianeina, 733. 740.
Gentiana, 733. 740.
Gentianina, 733. 740.
Gentianinum, 733 740.
Geoffraea. 740.
— inermis, 740.
— Jamaicensis, 740.
— Surinamensis, 740.
Geoffroya v. Geoffraea.
Geranium, 741
— batrachioides, 741.
— columbinum, 741.
— maculatum, 742.
— moschatum, 741.
— pratense, 741.
— Robertianum, 741.
— rotundifolium, 741.
— sanguineum, 742.
— tuberosum, 742.
Germanica, 353.
Geum, 742.
— montanum, 742.
— nivale, 742.
— urbanum, 742.
Ghitta Jemoco, 772.
Gialappa, II 23.
Gigartina Helminthochortos, 781.
— plicata, 781.
Gilla, 6 8
— Theophrasti, II. 728.
— Vitrioli, II. 728.
Gillenia, 743
— trifolia, 743.
— trifoliata, 743. II. 12.
Ginseng, II. 319
Glacies Mariae vulg., 388.
Gladiolus coeruleus, II 19.
— communis, 743.
Gladiolus luteus, II. 19.
Glaiadinum, 743.

Glandes Quercus s. quercinae, II. 458.
— — tostae, II. 461.
Glans unguentaria, II. 221.
Glastum, II 22.
Glaucium corniculatum, 494.
Glechoma hederacea, 774.
Glecoma hederacea, 774.
Glessum — Succinum.
Globularia, 743.
— Alypum, 743. II. 577.
— vulgaris, 743.
Globuli anodyni, II. 286.
— bezoardici, 281.
— camphorati, II. 438.
— carminativi, 668
— chalybeati, 702
— Contrayervae, 600.
— ad erysipelas, II. 355.
— ad infectionem, 541.
— Ferri tartaris, 702.
— martiales, 702
— — soluti, 702.
— martiati, 702.
— mercuriales, II. 178.
— Molsheimi, 703.
— moschati, II. 227.
— — rubri, II. 228.
— de Nancy, 702.
— stomachici purg., II. 178.
— Tartari ferrugin., 702.
— — martiales, 702.
— — martiati, 702.
— tonici, 505.
— Tartrat. Ferri et Lixiv., 702.
Globulus bezoardicus, 382.
Gluten pectorale, II. 81.
Glycyrrhiza, II. 79.
— echinata, II. 79.
— glabra, II 79.
— lucida, II. 81.
— officinalis, 715.
Glycyrrhizina s. Glycyrrhizinum, II. 79.
Gnaphalium dioicum, 225.
— arenarium, II. 626.
— Stoechas, II. 626.
Gorgonia Antipathes, 380.
Gossypina, 744.
Gossypium, 743.
— herbaceum, 743.
Gramen, 744
— album, 744.
— caninum, 744.
— majus, 445.
— Manna, 644
— orientale, 206.
— Parnassi, 783.
— rubrum, 445.
Grana Actes, II. 535.
— Gnidia, 638
— Kermes s. tinctorum, 497.
— Moluccana, 612.
— moschata, 1.
— Paradisi, 745.
— Sago s. Sagu, II. 523.
— Tiglia, 612.
— Tiglii, 612.
— Tilli, 612.
— Vitae Mesues, 113.
Granatum, 144. II. 451.
Graphites, 673.
— depuratus, 674.
— hydrargyratus, II. 139.
Gratia Dei 746.
Gratiola, 746.
— officinalis, 746.
Grossularia, II. 488.
Grosvenor's tooth powder, 384.
Grutellum, 319.
Grutum, 319
Guajacina, 747.
Guajacum, 747.
— officinale, 747
Gualtheria procumbens, 718.
Guilandina Moringa, II. 73. 221.
Gummi Acaciae, 760.
— adstring. Fothergilli. II. 46
— Aloës, 102.
— Ammoniacum, 758.
— — alcalisatum, 766.
— — amygdaloides, 758.
— — electum, 758.
— — in granis, 758.
— — in lacrymis, 758.
— — in massis, 758.
— — — panibus, 758.
— — — placentis, 758.
— Amyrid. Kataf, II. 255.
— Anime, 766.
— Arabicum, 766.
— Armeniacae, 771.
— Asae foetidae, 296.
— Astragali Tragacanth., II. 689.
— Bdellii, 338.
— Benzoës, 349.
— Benzoinum, 339.
— Bubon. Galbani, 357.
— Caragna s. Caranna, 436.
— Carannae, 436.
— Cerasi, 771.
— Cerasorum. 771.
— Chandetros s. Chanderros Copal, 603.
— Copal, 603.
— elasticum, II. 470.
— Elemi. 256
— Euphorbii, 663.
— Ferulae Ammon, 758.
— — Asae foet., 296.
— flavum, II. 719.
— Galbani s. Galbanum, 357.
— Gamandrae, 772.
— Gamba, 772.
— Gambiense, II. 46.
— de Goa, 772.
— Guajaci s. Guajacum, 747.
— Gutta, 772.
— Guttae, 772.
— — Americanum, 772.
— — Cambogium, 772.
— — Gambiae, 772.
— — Siamense, 772.
— — spurium, 772.
— — verum, 772.
— — Zeylanicum, 772.
— Gutti, 772.
— Hederae, 773.
— Hymenaeae Courbaril, 766.
— de Jemu, 772.
— Juniperi. II. 539.
— — Lyciae, II. 255.
— Kikekunemalo, II. 45.
— Kino, II. 45
— Ladanum, II. 53.
— Laccae, II 48.
— — in ramulis etc. v. Lacca in ram.
— Labdanum, II. 53.
— Ligni Sancti, 747.
— Lycium, 467.
— Mancinellae, 747.
— Mastiches, II. 107.
— Mimosae, 766.
— — Niloticae, 766.
— Myrrhae, II. 234.
— nostras, 771.
— Oleae s. Olivae, II. 254.
— Olibani s. Olibanum, II. 255
— Panacis, II 309.
— Persicae, 771.
— Peucedani, II. 333.
— Pruni, 771.
— Sagapenum, II. 523
— Sanguin Draconis, II. 539.
— Sarcocollae, II. 543.
— Seneca, 772.
Gummi Senegal s. Senegalense, 772.
— Serapionis, 766.
— serapinum, II 523.
— Stalagmitidis cambogioidis, 772.
— Tragacanthae, II. 689
— Turicum, 766. 772.
— Ulmi, II. 696
— Resina Acaroidis, II. 719.
— — Euphorbii etc., v. Gummi.
— — Scammoniae, II. 555. 556.
Gutta Gambir, 467.
— Gamba, 772.
Guttae Abbat. Rousseau, II. 265.
— acidae tonicae, 60.
— acusticae, 165
— albae Wardii, II. 285.
— amarae, 608 II. 252
— Anglicae s. Anglicanae cephalicae, 175. II. 64.
— anodynae, II. 223.
— — acidae, II. 273.
— anthelminticae, II. 35.
— antihystericae, 305.
— antiscorb., Lignum's, II. 185.
— —, Spilburry's, II. 188.
— antivenereae, II. 185.
— ad arthrodyniam, 193.
— aureae de la Motte, 692.
— ad blennorrhoeam, 323.
— Chamomillae, 487.
— Coffeae, 585.
— cordiales Warneri, II. 587 588.
— e Cupro. 619.
— deprimentes, II. 223.
— excitantes, 369.
— febrifugae, 56.
— — (arsenicales), 287.
— Fellis, 608.
— ferratae, 689.
— General. La Motte, 319
— Jenenae, 125.
— Jesuitarum, 311. 752.
— lenientes, II. 223.
— Limonis, 574.
— martiales, 689.
— Menthae pip., II. 123.
— nervinae, 692
— nigrae, II. 224. 258.
— pectorales Balemanni, II 267.
— prophylact. ad choler, II. 743.
— resolventes, 735.
— roseae, II. 224.
— Salis volatilis, 161. II 62.
— stomachicae, 473.
— uterinae, 305.
— — Reginae Hispan., II. 252.
— vitae, II. 280.
— Wadely, 341.
Guttaefera s. Guttifera vera, 772
Gutti, 772.
Guttulae albae Wardii, II. 205.
— diureticae, II. 247.
— phosphoratae, 54.
Gypsum, 389.

H.

Haematinum, II. 72.
Haematites, 678.
Haematoxylinum, II. 72.
Haematoxylon s. Haematoxylum Campechianum, II. 72
Halcyonium rotundum II. 338.

Halicacabum, 96.
Haloidum oxygenatum, II. 419
Hamamelis, 773.
— Virginiana, 773.
Hastula Regis, 310.
Haustus Acetat. Ammon. et Stibii, 188.
— Acidi nitrici comp., 650.
— Acidum carbon. evolvens, 29. 3 .
— adstringens, II. 268. 600.
— Ammoniae Acetatis, 608.
— anodynus, II. 263.
— antiemeticus. 29
— balsamicus, 330.
— ad biennorrhagiam, 323.
— camphoratus, 395
— cathart. pro infant., II. 476.
— — oleosus, II. 491.
— — salinus, II. 95.
— Collae animalis, 723.
— Crotonis purg. Nimmo, 613.
— diaphoret. resolvens, 67.
— diureticus Milmanni, II. 425.
— emeticus, 256.
— guajacinus, 750.
— incitans diaphoret., 188.
— — nervinus, 393.
— — resolvens, II 479.
— oleosus laxans, II. 587.
— ex Olibano, II 265
— opiato stibiatus, II. 269.
— opiatus, II. 269. 280.
— pectoralis incitans, II. 387.
— — resolvens, 656
— purg. comm. decoct. vel infus. parat., II. 595.
— salinus, 576.
— — effervesc., 576.
— saponaceus, II 439.
— sedans narcoticus, 791. II. 224.
— stomachicus, II. 457.
— terebinthinatus, 323.
— tonicus adstring., II. 263.
— — martialis, 700.
Hedera, 773.
— arborea, 773.
— Helix, 773.
— terrestris, 774.
Hedysarum Alhagi, II. 102.
Helenium, II. 2
Helianthus annuus, II. 652.
— tuberosus, 775. II. 652.
Helichrysum, II. 626.
— arenarium, II. 626.
— Stoechas, II. 626.
Heliochrysum, II. 647.
Heliotropium Europaeum, 775.
— Jamaicense, 775.
Helix Pomatia, 720.
Helleboraster, 776.
— maximus, 776.
Helleborus, 775. 776.
— albus, 775.
— foetidus, 776.
— niger, 776.
— orientalis, 776.
— trifolius, 604.
— viridis, 776.
Helminthocorton, 781.
Helminthocortos, 781.
Helmintochortos, 781.
Helxine, II 329
Hemet's dentifrice, 384.
Hepar Anguillae, 721.
— Antimonii, 234. 249.
— Arsenici min., II. 737.
Canis rabidi, 720.
— Lupi, 720
— Sulphuris, II. 395.
— — alkalinum, II. 395.
Hepar Sulphuris calcareum. 376.
— — salinum, II. 395.
— — volatile, 184.
— — vulgare, II. 395
Hepatica, 783.
— alba, 783.
— fontana, 783
— nobilis, 783.
— polymorpha, 783.
— stellata, 309. 783
— triloba, 783
Hepatorium, 87.
Heptaphyllum, II. 687.
Heracantha, 446.
Heracleum gummiferum, 758.
— lanatum — H Sphondyl.
— Sphondylium, 353.
Herba Aegyptiaca, II. 109.
— Britannica, II. 617
— Cancri, 775. II. 683.
— Ignis, II. 66.
— opthalmica, 665.
— paralyseos, II. 446.
— Ruperti, 741.
— Sancti Petri, 607.
— Sardoa, II. 462.
— Trinitatis, II. 23.
— Ventis, 206
Herbae aromaticae, II. 528.
— — vulnerariae, II. 528.
— vulnerariae, II. 528.
Hermodactyli, 784.
— spurii, 784.
Herniaria, 784
— glabra, 784.
— hirsuta, 784.
Heuchera Americana, 784.
Hevea Guianensis v. Siphonia Cahuchu.
Hibiscum, 129.
Hibiscus Abelmoschus, 1.
Hiera picra, 113.
Hieracium Gronovii, 785.
— murorum, 784.
— Pilosella, 784
Hippocastanum, 72
Hippocras—VinumCinnamomi
Hippoglossum, II. 518.
Hippolapathum, II 473.
Hippomane Mancinella, 747.
Hippopotami Dentes, 386.
Hirci Sanguis, 721.
Hirudo officin., medicin., 785.
— provincialis, 785.
Hirudines, 785.
Hirundinaria, 307.
Hirundines combustae, 381. 437.
Hirundinum Nidi combusti, 381.
Hirundo rustica, 381.
Hispidula, 225.
Histrix cristatus, 392.
Holostium, II. 349.
Hordeum, 785.
— crudum, 785.
— decorticatum, 785.
— distichon, 785.
— excorticatum, 785.
— hexastichon, 785.
— integrum, 785
— mundatum, 785.
— perlatum, 785
— praeparatum, 785.
— vulgare, 785
Horminum, II. 528.
— sylvestre, II. 528.
Hudson's cold cream, 480.
Huile liqueureuse des fleurs d'oranges, 562.
Humulus Lupulus, II. 87.
— — foemina, II. 87.
Hyacinthus, II. 736.
Hydragogum Boyle, 277.
Hydrargyri Acetas, II. 211.
— Murias, II 180.
Hydrargyri nitrici Oxyd., II. 149.
— Nitrico-Oxydum, II. 149.
— Oxydum per Acidum nitric., II. 149
— — cinereum, II. 145.
— — rubrum, II. 149.
— Oxymurias, II. 180.
— Permurias, II. 180.
— Phosphas, 197.
— Submurias, II. 159.
— — ammoniat., II. 206.
— Subnitras, II 149.
— Subsulphas flavus, II. 197.
— Sulphuretum nigr., II. 141.
— — rubrum, II. 156.
— — sublimatum, II. 156.
Hydrargyrum, II. 125.
— acetatum, II. 211.
— aceticum, II. 211.
— ammoniato-muriat., II. 206
— bichlorat. c. Oxydo et Ammon. muriat., II 206.
— bicyanatum, II. 195.
— Borussicum, II. 195.
— calcinatum, II. 149.
— chloratum, II. 159.
— c Creta, II. 131.
— depuratum, II 125.
— glycyrrhizatum, II. 130.
— haloidatum, II. 180.
— hydrochloricum, II. 180.
— hydrocyanicum, II. 195.
— c. Magnesia, II. 131.
— muriat. corros., II. 180.
— — — venale, II. 181.
— — mite, II. 149.
— — praecipitatum, II. 206.
— nitricum, II 201.
— oxydat. nigrum, II. 199.
— — muriat. ammoniat., II. 206.
— — phosphoric. acidum, II. 197.
— — rubrum (praeparat.), II 149.
— — — venale, II. 149.
— oxydulatum nigrum, II. 145. 99.
— — — purum, II. 199. 739.
— — nitrico-ammoniat., II. 199.
— perchloratum, II. 180.
— phosphoratum, II. 197.
— phosphoreum, II 197.
— phosphoricum, II. 197.
— praecipit album, II. 206.
— purificatum, II. 125.
— purum, II. 125.
— rubrum praep., II. 149.
— saccharatum, II. 130.
— stibiato-sulphurat., II. 144.
— — — aurantiac., II. 144.
— sulphurat. nigr., II. 141.
— — rubrum, II. 156.
— tartarisatum, II. 213.
— terebinthinatum, II. 738.
— virgineum, II. 125.
— zooticum, II. 195.
Hydrargyrus, II. 125.
— acetatus, II. 211.
— calcinatus, II. 149.
— corrosiv albus, II. 180.
— c Creta, II 131.
— — Magnesia, II. 131.
— muriat. ammoniacal. fortior, II. 206.
— — dulcis, II. 159.
— — oxydulatus, II. 159.
— muriatus, II. 180.
— — corrosivus, II. 180.

Digitized by Google

Hydrargyrus muriatus dulcis, II. 159.
— — mitis, II. 159.
— — oxydulatus, II. 159.
— nitratus ruber, II. 149.
— oxydulatus, II. 159.
— praecipit. albus, II. 206.
— — ruber, II. 139.
— purificatus, II. 125.
— sulphurat. niger, II. 141.
— — ruber, II. 156.
— c. Sulphure, II. 141.
— vitriolatus, II. 197.
Hydras Calcariae, 374.
— ferricum s. ferricus, 680.
— kalicum s kalicus, II. 391
— kalicus et k. fusus, II. 391.
— Potassae, II. 391.
— — fusae, II. 391.
— — purae fusae, II. 391.
— Potassii Deutoxydi impur., II. 391.
— — Protoxydi, II. 391.
— Sulphuris, II. 634.
Hydrastes Canadensis, 789.
Hydratum Sulphuris, II. 634.
Hydriodas Ferri, II. 11.
— Potassae s. Potassii s. kalicus, II. 11.
— — ioduratus, II. 10.
— Potassii Protoxydi, II. 9.
— zincicus, II. 722.
Hydrocarbonas Cupri coeruleus, 619
— — — terrosus, 619.
— — viridis, 619
Hydrochloras Ammoniae, 180
— — depuratus, 181
— — et Ferri, 694
— Ammoniaci, 180.
— — cupricus, 626.
— — et Ferri, 694.
— ammonicus depurat., 181.
— — crudus, 180.
— — — c. Oxydo hydrarg., II. 206
— — — c. Sesquichloreto Ferri, 693.
— Argenti et Ammon., 279.
— Auri, 316.
— — et Sodae, 317.
— Barytae, 333 334.
— Calcis solut. Hydrate Deutox. Hydr mixt., II. 138
— Cupri Deutoxydi, 625.
— Ferri, 690.
— Magnesiae, II. 97.
— Manganesii, II. 101.
— Mercurii et Ammon., II. 206
— — ferrati, II 171.
— natricus, II. 605.
— Oxydi Antimonii, 250.
— Platini II. 350.
— Potassae, II 420
— Potassii Protoxydi, II. 420.
— Protoxydi Barii, 334.
— — Calcii, 390.
— Sodae, II. 605.
— Sodii Protoxydi, II. 605.
— Stanni, II. 625.
Hydrochloret. Ammonii crud., 180.
— — depurat., 181.
— — c. Oxydo hydrargyrico, II. 206
— — c. Subbichloreto Ferri. 694.
— Deutoxydi Hydrarg. s. Merc., II. 159
Hydrochlorinas Ferri, 690.
Hydrochlorinas natricus, II. 605.
Hydrocyanas Ferri, 707.
— — Tritoxydi, 707.
— Mercurii s. Hydrarg., II. 195 196.
— Potassae, 39.
— — et Ferri. 40.
— — ferruginosus, 40.
— — medicinalis. 30.
— Potassii Protoxydi, 39.
— Protoxydi Potassii, 39.
— Zinci, II. 722
Hydrogale, II. 48.
Hydrogenium, 718.
— azotatum. 155.
— oxydatum. 719.
Hydrogeno-Sulphuret. Ammon. liq., 184.
Hydroiodas kalicus, II. 9.
— Potassae, II. 9.
— — ioduratus, II. 10
— Potassii, II. 9
— — Protoxyni, II. 9
— Sodae, II. 11.
Hydrolapathum, II. 517.
Hydromel, 265.
— antiasthmatic., 650.
— anticatarrhale, II. 71.
— asthmaticum, 650.
— compositum, II. 5
— simplex, 265.
— vinosum, 94
Hydropiper, II. 332.
Hydroselinum. 270.
Hydrosilicas Zinci, II. 722.
Hydrosulphas Ammoniae, 184.
— — sulphuratum, 184.
— Ammoniaci, 184.
— — sulphurat., 184.
— Antimon. sulphurat, 238 244.
— Calcii Protox., 399
— Calcis, 389
— — antimoniat., 249.
— — compactus, 389.
— — lenticularis, 388.
— Potassae, II, 396. 420.
— Protox. Antimon. persulphurat., 244.
— — Calcii. 389.
— — Stibii sulphuratus s. persulph., 238.
— Sodae, II. 613. 617.
Hydrosulphocyanas Potassae, 40
Hydrosulphuretum ammoniacale aquos., 184.
— Ammoniae, 184.
— — liquidum, 184.
— ammonicum, 184.
— Antimonii rubrum, 238.
— Calcis antimoniat., 249.
— flavum Oxydi Stib. s. Antim. sulphurat., 244.
— liquidum, 45
— luteum Oxydi Stib. s. Antim. sulphurat., 244.
— — s flavum Oxyduli Stib. sulphurat., 244
— Oxydi Stibii aurantiac., 244.
— — — fuscum, 238.
— — — rubrum, 238.
— Oxyduli Stibii. 238
— — — sulphurat., 244.
— Potassae, II. 396.
— rubrum Stibii sulphurati, 238.
— stibiatum c. Sulphure, 244.
— Stibii, 238
— — sulphurati rubrum, 238.
— stibiosum, 238.
— — c. Sulphure, 244.
Hydrosulphuro-sulphuretum hydrogenat. Ammoniaci liq, 184
Hydroxydum Ferri — Ochra lutea.
— — globulare — Aetites.
Hymenaea Courbaril. 760.
Hyosciamus v. Hyoscyamus.
Hyoscyama, 789
Hyoscyamino, 789
Hyoscyaminum, 789.
Hyoscyamus, 789.
— albus, 789.
— niger, 789.
Hyperanthera Moringa, II. 221.
Hypercarbonas Potassae venalis, II. 398.
— Sodae, II. 608.
Hypericum, 797.
— Androsaemum, 797.
— Ascyron, ascyrum, 797.
— bacciferum, 772.
— Canadense, 772.
— Cayennense, 772.
— Coris, 797.
— elegans, 797.
— parviflorum, 797.
— perforatum, 797.
— quadrangulare, 797.
— sessilifolium et Vismia, 797.
Hyperoxalas Potassae, II, 425.
Hyperoxodes Ferri nigrum, 675.
— Hydrargyri, II 149.
Hyperoxydum Arsenici. 287.
Hyperprotocarbonas Calcii, 385.
Hyperprotooxalas Potassii, II, 425
Hyperprotophosphas Calcii, 388.
Hyperprototartras Potassii, II. 429
— — boraxat, II. 434.
— — c. Borate Sodae, II. 434.
— — Protoxydi. II. 429.
Hypersulphas Aluminae et Potassae. 143
Hypertartras Potassae, II. 429
— Potassii Protoxydi, II. 429.
Hypoboras Sodae, II. 611.
Hypocarbonas Ammoniae, 170.
— — liquidum s. liquidus, 172.
— — pyro-animale s. pyro-animalis, 173
— — — liquidum s. liquidus, 174.
— — pyro-oleos. liquid., 174.
— Magnesiae, II. 90.
— Potassae liquidum, II. 401.
— pyro-oleosus liquidus, 174.
— Sodae, II. 608
Hypochaeris maculata, 801.
Hypocistis, 801.
Hypoglossum, II. 518
Hypophosphis Potassae, II. 406.
Hyposulfites Merc. et Ammon., II. 199.
— — et Potassae, II. 199.
— — et Sodae, II. 199.
— Potassae, II. 410.
— Sodae, II. 617.
Hyposulphas Antimonii, 228.
Hyposulphis s. Hyposulphites v. Hyposulfites.
Hypoxodes Ferri, 675.
Hyssopus, 801.
— officinalis, 801.
Hystrix v. Histrix.

I.

Iberis. II. 65.
Ibiscum, 129.
Iced punch, 95.
Ichthyocolla, 719.
Icica Caranna, 436.
— Icicariba, 657.
Ictodes foetidus — Dracontium foet.
Ignatia amara, 665.
Ignis Herba, II 66.
Ilex Aquifolium, 275.
— vomitoria, II. 1.
Illecebra II 575.
Illecebrum majus, 607.
— vermiculare, II. 575
Illicium anisatum, 224.
Imbricaria parietina, II. 67.
Imperatoria, II. 1.
— Ostruthium, II. 1.
Imperial, II. 333.
Indicum, II. 1
Indigofera Anil, II. 1.
— argentea, II. 1
— tinctoria, II. 1.
Indigotina, II. 1. 22.
Indigotinum, II 1. 22.
Indum — Malabathrum
Infusio anthelmintico-tonica, 595. v. Infusum.
Infuso-Decoctum Salicis, II. 527.
Infusum Absinthii, 5.
— — nitratum, 6.
— Acaciae Catechu, 471.
— adstringens, 473. II. 459. 495. 496.
— alexiterium, 281.
— Althaeae, 133.
— amarum, 444. 735.
— — alcalisatum, 736.
— — Edinburgense, 735.
— — c. Natro, 736. II 609.
— — et Rorismarini, 736.
— — vinosum, 737.
— Amygdali Persic. Fol., II. 331.
— Angelicae, 215.
— Angusturae, 220.
— Anisi, 224.
— anthelmintico-incitans, II. 681.
— — tonicum, 595.
— anthelminticum, 782. II. 621.
— Anthemidis, 490.
— antihydropicum, II. 467.
— antiscorbuticum, 580.
— Armoraciae, II. 466.
— — compositum, II. 466
— Arnicae Florum, 283.
— — — compos., 283.
— — vinosum, 284.
— Artemisiae Absinthii, 5.
— Astragali exscapi, 310.
— Aurantii comp., 561.
— Aurantior. Folior., 561.
— Ayapanae, 662.
— Baccar. Junip, II. 44.
— bechicum, II. 100 323.
— Belladonnae, 314.
— Binae, II. 98.
— Boraginis Flor., 353.
— Brucene, 220.
— Buchu 366
— Buglossi, 206.
— Bynes, II. 98.
— Calami aromat. s. Calami, 371.
— Calami aromat. cum Acido mur. oxygen., 542.
— Calcis cinchonat, 519.
— Calombae s. Columbae, 595
— Cannabis, 422.
— Cantharidum acetos. et aquos., 424.
— Capilli Veneris, 71.
— Capsici, II. 346.
— cardiacum. 281.
— — acetatum, 281.
— Cardui benedicti, 444.
— carminans. 491.
— Caryophyllorum, 449.
— Cascarillae, 453.
— Cassiae Fistulae, 455.
— — Maryland., 455.
— — Sennae simpl., II 589.
— — — comp, II. 591.
— Catechu s. C comp, 471.
— cathartico-anodyn., 491
— catharticum, II. 591. 593.
— — — pro clystere II. 595.
— Centaureae benedictae, 444.
— Centaurii min., 474.
— Cerasor. pedunculor., 478.
— Ceterach Folior., 482.
— Chamaedryos, II. 679.
— Chamomillae, 490.
— — compositum, 491.
— — c Subcarb. Potass., 491.
— Chenopodii ambrosioid., 467.
— for child, II. 17.
— Chimaphilae, 499.
— Chinae c. Aq. Calcis, 519.
— — aquos. compos., 519
— — calidum, 518.
— — comp., 520.
— — — sine calore, 518.
— — frigidum, 518.
— — c. Magnes. ust., 518.
— — potassatum, 519.
— — c. Succo Limon., 520.
— Ciceris Seminum, 543
— Cicutae, 548.
— ad cimices, II. 521.
— Cinchonae c. Aq. Calcis, 519.
— — aquos. comp., 520.
— — calidum, 518.
— — sine calore, 518.
— — frigidum, 518.
— — c. Magnesia usta, 518.
— — c Succo Limon., 520.
— Cinnamomi, 415.
— Cochleariae Armor., II. 466.
— Colombae, 595.
— Colombo, 595.
— Columbae, 595.
— Columbo, 595.
— Conii maculati, 548.
— Cort. Peruv vinos., 528.
— Croci, 608.
— Curcumae, 632.
— Cuspariae, 220.
— Digitalis, 639.
— — purpureae 639.
— Diosmat. crenat. Folior., 366.
— diureticum, 274. 649. 732. II. 44.
— Dulcamarae, 655.
— emmenagogum, 736.
— Eupator. perfoliati, 662.
— excitans, II. 702.
— expectorans, 71.
— Extr. Mimos Catechu, 471.
— — — — c. Opio, 471.
— — — Katechu, 471.
— — — — c. Opio, 471.
— Flammulae Jovis, 577
— Florum Mali Pers., II. 33.
— — Paeoniae, II. 316.
— — Rosarum, II. 495.
— Galii lutei, 716.
— Gallarum, 717.
— Gentianae comp., 735.
— Glycyrrhizae, II. 85.
— Gratiolae, 747.
— Guajaci comp., 753.
— haemastaticum, II. 496.
— Hederae terrestr., 774.
— Hellebori nigri, 779.
— — — Hoffm., 779.
— Helminthochorti, 782.
— ad hemicraniam, II. 694.
— ad hydropicos, II. 467.
— Hyssopi, 801.
— Jaceae, II. 23.
— Japonicum, 471.
— Imperatoriae, II. 1.
— Ipecacuanhae, II. 15.
— — vinosum, II. 17.
— Iridis versicoloris, II 20.
— Juglandis comp., II. 36.
— Juniperi Baccar, II. 44.
— — — comp., II. 44.
— Kali carbon. c. Scilla vinos., II. 567.
— Laccae coeruleae, II. 49.
— Lauro-Cerasi Folior., 478.
— Lavandulae, II. 60.
— laxativ. Mannagettae, II. 592.
— — sedans, II. 479.
— — simplex, II. 591.
— — Viennense, II. 591
— Ledi s. L palustr., II. 65.
— Lepidii, II. 65.
— Lichenis Island., II. 68.
— Ligni Brasil., II. 72.
— — Campech., II. 72.
— — Sassafras, II. 553.
— Lini s. L usitatis., II. 77.
— — cathartici, II. 77.
— — compositum, II. 77.
— Liquiritiae, II. 85.
— Lupuli, II. 88.
— Mali Persici, II. 331.
— Malti, II. 98.
— Malvae, II. 100.
— Marrubii, II. 105.
— Melissae, II. 112.
— Menthae, II. 118
— — compositum, II. 118.
— — crispae, II. 118.
— Millepedum, II. 218
— Menyanthis s. Menyanthidis, II. 694.
— nervinum, II. 702.
— — aethereum, 234.
— — martiale, 284.
— Nicotianae, II. 247.
— Nymphaeae, II. 253.
— Opii aquosum, II. 273.
— Orchidis, II. 524.
— Origani, II. 311.
— Paeoniae Petalor., II. 316.
— Papav. errat., II. 323.
— ad paralysin, II. 467.
— paralyticum, II. 467.
— Pareirae bravae, 556.
— Pastae Althaeae, 770.
— pectorale, 133. 774.
— — Species pro, 131.
— Persicorum s Persicae Flor, II, 331.
— Pervincae Petal, II. 712.

Infusum Picis empyreum. liq., II. 347.
— — liquidae, II. 347.
— Pimpinellae, II. 339.
— Pini Turionum, 3.
— Piperis Cayenn., II. 346.
— — vinosum, II. 346.
— Polygalae amar., II. 386.
— Pulsatillae, 208.
— purgans, II. 32.
— Quassiae, II 457.
— — excelsae, II. 457.
— — c. Natro, II. 610.
— — et Sulph. Zinci, II. 457.
— Quercus Glandium, II. 461.
— — Corticis compos., II 459
— Raphani, II. 466
— Ratanhiae, II. 468.
— Rhabarbari, II. 478.
— Rhei, II. 478 481.
— — alcalinum, II. 481.
— — alcalisatum, II. 481.
— — amarum, II. 479.
— — aquosum, II. 481.
— — boraxatum, II. 482.
— — palmati, II. 478 481.
— — salinum, II. 482.
— — c. Subcarb. Potass., II. 481.
— Rhododendri chrysanthi, II. 486.
— Rhoeados, II. 323.
— roborans, 454. 736.
— Rorismarini, II. 505.
— Rosae, II 495.
— — acidulum, II. 495.
— — adstringens, II. 495.
— — compos., II. 495.
— — solutivum, II. 495.
— Rosarum, II. 495.
— Sabinae, II 44.
— — c. Acido phosphor., 55.
— Salep c. Adstring., 612.
— Salviae, II. 529.
— — acidulum, II. 529.
— — vinosum, II. 529.
— Sambuci, II 537.
— — c Tart stibiato, 257.
— Sanguinariae, II. 539.
— Santonici Seminis, 551.
— Sarsaparillae comp., II. 545
— Sassafras Ligni, II. 553.
— scillit. vinos. comp., II. 566.
— Secalis cornuti, II. 574.
— Sennae, II. 589.
— — sine Aromat, II. 591.
— — citratum, II. 590.
— — composit., II 589 591.
— — — sine Aromat., II. 591.
— — laxativum, II. 591.
— — c. Manna, II. 591.
— — purgans, II. 591.
— — simplex, II. 589.
— — c. Succo Citri, II. 590.
— — tamarindatum, II 591.
— — et Tamarindi, II. 591.
— — tamarindinat, II. 591.
— — c. Tamarind., II. 591.
— — tartarisatum, II. 591.
— Serpentar. Virg., 281.
— — compositum, 281.
— Simarubae, II 600.
— Sinapios, II. 466.
— Sinapis Seminum, II. 466.
— Species aromat, 496.
— Spigeliae, II. 621.
Infusum Spigeliae comp., II. 621.
— stimulans, II. 466
— stomachicum, 519.
— sudoriferum, 188.
— Tabaci, II. 247.
— Tamarindi et Sennae, II 591.
— Tamarindorum, II. 644.
— — compos., II. 591. 644.
— Tanaceti, II. 648.
— Thymi, II. 684
— Tiliae, II. 686.
— — aurantiat., II. 686.
— tonico-nervinum, II. 702
— tonicum, 474. 523 II. 15.
— Trifolii fibrini, II. 694.
— Ulmi, II. 696.
— Uvae Ursi, II. II. 697.
— Valerianae, II. 702.
— — comp., II. 702.
— — fortius, II. 702.
— — vinos., II. 703.
— vermilugum, II. 621. 681.
— Veronicae, II. 712.
— Violarum, II. 713.
— vulnerarium, 87.
Inhalatio balsamica, 330.
— iodinica, II. 741.
Injectio acustica, 328.
— adstringens, 138. 471. 523. 621. 625. 687 717. II. 46. 208. 360. 370. 371. 460. 731. 732 733. 734.
— anod., II. 731.
— — refrigerans, II. 370.
— Aluminis, 148.
— aluminosa comp., II. 371.
— anodyna, II. 279. 522.
— antiseptica, II 527.
— antivenerea, II 191.
— c. Aq. Lauro Cerasi, 41.
— ad aures, 328.
— auricularis detersiva, II. 519.
— balsamica, 322.
— ad blennorrhoeam, II. 734.
— contra blennorrhagiam, II. 740.
— ad carn. luxur. urethrae, II. 163.
— Catechu, 471.
— Chinae, 522 523.
— — antiputrida, 522.
— contrastimulans, 41.
— Copaibae, 322.
— cuprata, 621. 624.
— Cupri ammoniacalis, 610
— deprimens, II. 262.
— detergens, 107. 618. II. 184. 240.
— — et roborans, 120.
— detersiva adstring., II. 731.
— diuretica, 649
— emolliens, II. 262. 326.
— — et anodyna, II 326.
— excitans, 375. 426. 668.
— fellea, 668
— ad fistulas, 375. 426.
— ex Gallis, 717.
— Girtanneri, II. 393.
— in gonorrhoea, II. 177.
— Hydrargyri s. hydrargyrica simpl., II. 128
— — Oxymuriatis, II 183.
— hydrargyro — saturnina, II. 192.
— — terebinthinata, II. 131.
— Ichthyocoll. et Myrrh, 723.
— incitans, 426.
— irritans, II 713.
Inject. Lactis opiata, II. 279
— leniens, 789. II. 221. 262. 280.
— ad leucorrhoeam, II. 360. 732.
— lithontriptica, II. 413. 610.
— mercurialis, II. 147. 183
— — Aliberti, II. 183.
— — opiacea, II. 191.
— — Plenkii, II. 129.
— — simplex, II 128.
— Mercurii camph., II. 190.
— e Mercurio dulci, II. 162.
— mucilaginosa, II. 77.
— ex Muriate Hydrarg., II. 162
— Muriat. Hydr. camphor, II. 180
— narcotica, 791. II. 242. 262
— in necrosi syphilit., II. 184
— oleosa. II. 360.
— opiacea, II. 279.
— Opii, II. 223
— ad phimosin. 622.
— Plumbi Acetatis, II. 369.
— Plumbi Carbonatis, II. 357.
— de Plumbo et Merc., II. 192.
— Quercus, II. 460.
— Quinae antiputrida. 522.
— resolvens. II. 360. 369.
— saturnina, II. 352.
— — c. Myrrha, II. 370.
— — myrrhata. II. 370.
— sedans, II. 266. 360.
— sedativa, II. 266. 278. 360.
— — adstringens. II. 731.
— Submuriat. Hydrarg., II. 162.
— Sulphat. Zinci alumin., II. 732.
— terebinthinacea, II. 655.
— Theae, II 683.
— tonica, 522.
— ad ulcera fistulosa, II. 183.
— vaginalis emmenagoga, 158.
— — c. Mercurio, II. 147.
— Vini rubri, II. 713.
— Whately, II. 186.
— Zinci Acetatis, II. 733.
— — Sulphatis, II. 731.
Inspissamentum Cucum agrestis, II. 219. v. Extractum. Mellago, Gelatina
Intestina Leporis, 720.
Intybus angustum, II. 51.
— hortensis, 543.
Inula II. 2
— dysenterica, II. 2.
— Helenium. II. 6.
Inulinum, II. 2.
Iodas Calcis, II. 8.
— Hydrargyri s. Mercurii, II. 194. 206.
— Potassae, II. 8.
Iodetum Kalii, II. 9
— Sulphuris, II. 739.
Jodides Zinci, II. 12.
Jodina, II. 7.
Jodinium, II. 7.
Jodium, II. 7.
Jodum, II 7.
— causticum, II. 740.
Joduretum Arsenici, II. 11.
— Barii, II. 11.
— Carbonii, II. 11.
— Mercurii, II. 194.
— Potassii, II. 9
— Sulphuris, II. 12.
Jonidium Ipecacuanha, II 12.
Ipecacuanha, II. 12.

Digitized by Google

Ipomoea Jalapa s. macrorrhiza — Convolv. Jalapa.
Iris, II. 19.
— florentina, II. 19.
— foetidissima, II. 19.
— Germanica, II. 19.
— nostras, II. 19
— palustris, II 19.
— Pseudacorus, II. 19.
— tuberosa, 784. II. 20.
— versicolor, II. 19.
— vulgaris, II. 19.
Isatina s. Isatinum, II. 22.
Isatis, II. 22
— tinctoria, II. 1. 22.
Isis nobilis, 379.
Isolusinum, II. 385.
Iva, II. 679.
— arthritica, II. 679.
Izarinum, II. 513.

J.

Jacea, II. 22
— nigra, II. 22. 23.
Jacobaea. II. 576.
Jalapa, II. 23.
— alba, II. 109.
Jalapina, II. 23.
Jalapinum, II. 23.
Jalappa, II. 23.
Jalappium, II. 23.
Jamaicinum, 740.
Janipha Manihot, II. 649
Jasminum, II 33
— grandiflorum, II. 33.
— officinale, II. 33.
Jatropha Curcas, II. 250.
— Manihot. II. 649.
— glauca et multifida, II. 250
— elastica — Siphonia Cahuchu.
Jecoris Aselli Oleum, 69.
Jodum v. Iodum.
Juglans, II. 34.
— cinerea, II. 34.
— regia, II. 34.
Jujuba. II. 36. 37.
Julapium, II. 522.
— acidulatum, 59 80.
— acidum, 34
— adstringens, 150. II. 307. 540.
— aethereum, 83.
— aluminosum, II. 739.
— anodynum. II. 328.
— anthelminticum, 554.
— antiarthriticum, 398.
— antihaemorrhagicum, 59.
— antihystericum, II. 228. 621.
— antiphthisicum, 622.
— antispasmodicum, 85.
— e Camphora. 395.
— — c. Aceto, 396.
— camphoratum, 395
— — acidulum, 396.
— diatartareum, II 596.
— diureticum, II. 666.
— emmenagogum, 611.
— expectorans, II. 328.
— foetidum, 301.
— gummosum, 770.
— hydragogum, 263.
— leniens, II. 224. 262. 370. 403.
— — et purgans, II. 415.
— Menthae, II. 124.
— mithridaticum, II 293
— moschatum, II. 228
Julapium Moschi, II. 228.
— narcoticum, II. 328.
— Nitratis Potassae, II. 414.
— nitrosum, 50.
— oxymellitum, 23.
— pectorale, 770. II. 328 735.
— purgans, II 31.
— refrigerans, 64. 574. II. 414
— regium, II. 501.
— Rosarum, II. 501.
— rosatum, II 501.
— sambucinum, II 538.
— scilliticum II. 572.
— scoticum, 231.
— sedans, II. 224 403.
— sedativum. II. 262.
— sistens, II. 307.
— stomachicum, II. 404.
— Subcarbonat. Potassae, II. 401.
— succinatum, II. 631.
— sudorificum, 188.
— temperans, 398. II. 415.
— Violarum. II. 714.
— violatum, II. 714.
— vitriolatum, 59.
Julep v. Julapium.
Juncus odoratus, 206.
Juniperus, II. 38.
— communis, II. 38 539.
— Lycia, II. 255. 539.
— Phoenicea, II. 255.
— Oxycedrus, II. 347. 539.
— Sabina, II. 38.
— thurifera, II. 255.
— Virginiana, II. 38.
Jupiter, II. 622.
Jus adstringens, 598.
— antiherpeticum, 711.
— aperitivum, 309.
— Cancrorum, 722. 723.
— Caponis, 722. 723.
— Carnis bubulae, 723,
— Columbae, 723.
— depurativum, 333
— diureticum, 309.
— helicinum, 722
— Lacertarum, 722.
— leniens, 725
— Liquiritiae, II. 79.
— Millepedarum, II. 218.
— ossium, 721.
— pectorale, 354. 723. 725. II 71.
— purgans, II. 616.
— purificans, II. 5.
— Ranarum, 722.
— temperans, 725.
— Testudinum, 722. 723.
— Vituli Pulmonum, 722. 723.
— vitulinum, 721
Jusculum antiepilepticum, II. 317.
— antispasmodicum, II. 317.
— helicinum, 722
— lientericum, 725.
— pectorale, II. 326
— Pulli Gallinae lienteric., 725.
— siccum, 728.
— Viperae s. viperale, 722.
— viperinum, 721.
Jusquiamum, 789.
Justicia Adhatoda, 70
— pectoralis, II. 45.

K.

Kadmia — Kadmium.
Kadmium, II 45
Kaempferia Galanga, 714.
Kaempferia rotunda, II. 720.
Kali, II. 527.
— acetatum, II. 420.
— aceticum, II. 420.
— aëratum, II. 405.
— ammoniato — tartar. II. 436.
— arsenicatum, 292.
— arsenicosum, II. 737
— bisulphuric., II. 409.
— Borussicum, 40.
— — venale, 40.
— carbonicum, II. 398. 399.
— — acidulum, II. 405.
— — e Ciner. clavell., II. 399.
— — crudum, II 398.
— — impurum, II. 398.
— — neutrale, II. 405.
— — perfecte saturat., II. 405.
— — e Tartaro, II. 399.
— causticum II. 390.
— — c. Calce, II. 392.
— — fusum, II. 391.
— — siccum, II. 391.
— chloricum, II. 419.
— — depurat., II. 419.
— — venale, II. 419.
— citratum, II. 420.
— ferreo-boruss., 40.
— ferrocyanicum. 40.
— ferruginoso-hydrocyan., 40.
— hydroiodicum, II. 9.
— hydroiodinicum II. 9.
— hydrosulpho-cyanic, 40.
— iodicum. II. 8.
— iodinicum. II. 8.
— muriat oxygenat., II. 419
— — — depur. et venale, II. 419.
— nitratum, II. 410.
— nitricum. II. 410.
— — crudum, II. 410.
— — depuratum, II. 410.
— — purificatum. II. 410.
— — purum, II. 410.
— oxalicum acidulum, II. 425
— — purum, II. 426.
— oxymuriat., II. 419.
— — depurat. et venale, II. 419.
— praeparatum, II. 398.
— — e Tartaro. II. 399.
— purum, II 390.
— sidero-zooticum, 40.
— stibiato sulphurat. — Hepar Antimonii
— subcarbonicum. II. 398.
— — crudum II. 398
— — purissimum. II. 399.
— sulphurato stibi t., 219.
— sulphuratum, II. 395
— — pro balneo. II. 395.
— Sulphuretum, II. 395.
— sulphuricum, II. 406.
— — acidum, II. 409.
— — crudum. II. 406.
— — depuratum. II. 406 407.
— tartaricum, II 427.
— tartarisatum, II. 427.
— e Tartaro, II. 399.
— vegetab caust., II 390.
— — purum, II. 390.
— vitriolatum, II. 406.
— zooticum 40.
— — venale, 40.
Kalium iodatum, II 8
— sulphuratum, II. 395.
Kalmia II. 45
— latifolia. II. 45.
Keiri, 494
Kermes Grana, 497.

Digitized by Google

Kermes, Cluzell's, 239.
— minerale. 238.
Ketmia Aegyptiaca, 1.
Kevri, 494.
Kikekunemalo, II. 45.
Kinnum. 535.
Kino. II. 46.
Krameria triandra. II. 467.

L.

Labdanum. II. 53.
Lac, II. 47.
— adstringens. II. 460.
— ammoniacale 758.
— — compos., 760.
— Ammoniaci, 758.
— Amygdalae s. Amygdalar., 196.
— anodynum, 197.
— antipsoricum. 389.
— artificiale, 197.
— Asae foetidae, 301.
— asininum, II. 47.
— — artificiale, 723.
— bubulum. II. 47.
— caprinum, II 47.
— diureticum, II. 653.
— ebutyratum, II. 48.
— Guajaci s. Gummi Guajaci, 755.
— guajacinum. 755.
— leniens, 201.
— infantum, II. 403.
— Lunae, 370.
— mercuriale. II. 206.
— — Plenkii, II 128.
— montium, 379.
— pectorale. 482.
— Plumbi, II. 351.
— Rosarum, II. 501.
— Sulphuris, II. 634.
— terebinthinaceum. II. 653.
— Terrae, II 90.
— vaccinum, II. 47.
— virginale, II. 357. 371.
— virginis. 340. 341. II. 357.
Lacca, II. 48.
— in baculis. II. 48.
— coerulea, II. 49
— Florentina, II. 48.
— in granis, II. 48.
— in massis, II. 48.
— Musci. II. 48.
— musica, II. 49.
— in ramis, II. 48.
— in ramulis. II. 48.
— in seminibus, II. 48.
— in tabulis II. 48.
— Zeylanica. II. 48.
Laccae Muscus, II. 49.
Laccinum. II. 49.
Lacerta agilis, 720.
— viridis, II. 151.
Lacmus, II 49
— tinctorius, II. 49.
— — albo-coerul., II. 49
Lacryma Jobi, II. 51.
Lactuca, II 51.
— elongata, II. 51.
— perennis. II. 51.
— sativa, II. 51. 52.
— Scariola, II. 51.
— sylvestris. II. 51.
— — major. II. 51.
— virosa, II. 51.
Lactucarium. II. 52.
Ladanum, II 53.
— factitium, II. 54.
— in massis, II. 53.
— in sortis, II. 53.
Lagophthalmus, 742.
Lamium album, II 54.
— montanum, II. 116.
Lana philosophica, II. 723.
Lapathum acutum, II. 517.
— aquaticum, II. 517.
— crispum, II. 517.
— sanguineum, II. 517.
— sativum, II. 517.
— unctuosum, 496.
Lapha. 295.
Lapides Cancri s. Cancrorum. 381.
— — acetati, 390.
— — citrati, 391.
— — praeparati, 382.
— Carpionum. 380.
— Percarum. 380.
— Spongiarum. 380
— — praeparati, 381.
Lapilli Cancrorum, 381.
— — praeparati, 382.
Lapis Armenia s. Armenius praep., 619.
— Bezoar, 392.
— Bufonius, 386.
— calaminaris, II. 722.
— — diaphoreticus. II. 723
— — praeparatus, II. 723
— calcareus, II. 379.
— causticus, II. 391.
— — Chirurgorum, II. 391.
— cordialis de Goa, 382.
— Contrayervae, 600.
— divinus, 622.
— de Goa, 382. II. 228.
— Haematites s. Haematitis. 678
— hystricus, 392.
— infernalis, 277 II. 391.
— — alcalinus, II. 391
— Judaicus. 380.
— — praeparatus, 381.
— Lazuli. 144.
— Lyncis, 389.
— Malaccensis, 392.
— Manati. 387.
— medicamentosus. 146.
— miraculosus. 623.
— nephriticus, II. 54.
— ophthalmicus, 622.
— porcinus, 379. 392.
— Prunellae. II. 411.
— Pumicis s. Pumex, II. 451.
— septicus, II. 391. 393.
— specularis, 388.
— suillus. 379.
— — praeparatus. 382.
— vulnerarius externus, 623. II. 732.
Lappa major, 332
— minor II. 719.
Lappula hepatica. 87.
Lardner's prepared charcoal, 384
Larix Europaea, II. 102. 652.
Laserpitium, II. 54.
— angustifolium et chiron., II. 54.
— Germanicum, II. 74.
— latifolium, II. 54.
— Siler, II. 54.
Lathyris major, 366.
Laudanum, II 268.
— antihystericum, II. 277
— cinnabarinum. II. 159.
— compositum, II. 260.
— crocatum, II. 260.
— cydoniatum. II 276.
— diuretic·um, II. 277.
— Ford's, II. 268.
— Helmontii junioris. II. 277.
— de Lalouette. II. 259.
— liquidum. II. 260. 263. 268.
— — compositum, II. 260.
Laudanum liquidum cydoniatum, II. 276.
— — Neumanni, II. 276.
— — Sydenhami, II. 260.
— — tartarizatum, II. 273.
— — Warneri, II. 270.
— Nepenthes Quercetani, II. 259.
— opiatum, II. 258. 259 274. 276.
— — cydoniatum. II. 277.
— — Rousseau. II. 265.
— simplex, II. 274.
— urinarium, II 277.
— — Micheli, II. 277.
Lauraster Amboinensis, 666.
Lauri Oleum, II. 55.
Lauro-Cerasus. 477.
Laurus, II. 54. 55.
— Alexandrina angustif, II. 518
— Camphora, 393.
— Cassia 403.
— Cinnamomum, 402. 403.
— Culilaban, 615.
— Myrrha, II. 234.
— nobilis, II. 54.
— Persea, II. 54.
— Pichurim, 660.
— Sassafras II. 552.
Lavandula, II. 59.
— latifolia, II. 59.
— Spica, II. 59.
— Stoechas, II. 625.
— vera, II. 59.
Lawsonia inermis, II 64.
— spinosa, II. 64.
Lecanora tartarea — Lacca.
Ledum palustre, II. 65.
Lemitochorton, 781.
Lemonade, for icing etc., 574.
Lens, II. 65.
Lentiscus vulgaris, II. 107.
Leontodon Taraxacum, II. 649.
Leontopodium, 88.
Leonurus Cardiaca, 442.
Lepidium, II. 65.
— Iberis, II. 65.
— latifolium, II, 65.
— procumbens. II. 65.
Leporum Talus, 380.
Lepus combustus. 381. 437.
— timidus, 381. 720.
Leucanthemum odoratum, 485.
Leucoium luteum. 494.
Levisticum, II. 74.
Libanus thurifera. II. 225.
Lichen, II 65
— calcareus, II. 49.
— caninus. II. 66.
— cinereus terrestris, II. 65.
— cocciferus, II. 66.
— infundibuliformis, II. 66.
— Islandicus, II 66.
— parellus, II. 49.
— petraeus latifolius, 783.
— pulmonarius. II. 67.
— pyxidatus, II. 66.
— Roccella, II. 49.
— stellatus, 783.
— tartareus, II. 49.
— terrestris, II. 66.
— — cinereus II 66.
Lignum Agallochi veri, II. 71.
— Agallochum, II. 71.
— Aloës, II. 71.
— Aquilae s. aquilin., II. 71.
— Aspalathi, II. 71.
— benedictum, 747.
— Brasil. rubrum, II. 74.
— Brasiliense, II. 72.
— Buxi. 367.
— Campechense, II. 72.
— Campechianum, II 72.
— Campechiense, II. 72.
— Campescanum, II. 72.

Lignum cedrinum, II. 38.
— coeruleum, II. 72.
— colubrinum, II. 628.
— Coryli 606
— Ebenum, 652.
— Fernambuci, II. 72.
— Guajaci, 747.
— — sancti, 747.
— Haematoxyli II. 72.
— Indicum, 747.
— Juniperi, II 38.
— Mahagony. II. 642.
— Moluccanum, 612.
— Moluccense, 612.
— nephriticum, II. 73.
— Panavae. 612.
— Pavonae. 612.
— Pterocarpi, II 540.
— Quassiae. II. 430.
— Rhodii, II. 73
— rhodium, II. 74
— sanctum. 747.
— Santali albi. II 541.
— — citrini. II. 541.
— — rubri, II. 540
— — — raspat., II. 541.
— Sappan, II 72.
— Tigilii, 612.
— Visci, II. 716.
Ligusticum, II. 74.
— aquilegifol. s. Cornubic., II. 74. 310.
— Levisticum, II 74.
— Meum, II 215.
Ligustrum, II. 74.
— Aegyptiacum, II 64.
— vulgare, II. 74.
Lilium, II. 74
— album. 74.
— candidum. 74.
— Convallium, 601.
Limatura Chalybis, 670.
— Ferri, 670.
— — alcoholisata, 670.
— — depurata, 670.
— — praeparata, 670. 680.
— — puri. 670.
— — purificata, 670.
— Martis, 670.
— — alcoholisata, 670.
— — depurata. 670
— — praeparata, 670.
— — purificata, 670.
— Stanni, II. 623.
— — puri, II. 623.
Limaturae v. Limatura.
Limonata alcoholica, 95.
— c. Acido oxalico, 52.
— Cremoris Tartari, II. 432.
— — — solubilis, II. 427.
— emetica, 257.
— haemastatica, 59.
— laxans s. laxativa, II. 434
— mineralis, 59
— nitrica, 50.
— phosphorica, 54.
— refrigerans. 573.
— — diuretica, 50 II. 434.
— sicca, 32. 574.
— stibiata, 257.
— sulphurica. 59.
— tartarica. 64.
— vegetabilis, 61. 573.
— vinosa II 713.
— — alcoholica, II. 713.
Limonium, 349.
— maritimum, 339
Limonum, 339.
Linaria, II. 75.
— Cymbalaria, 635.
— spuria, II. 75.
Linctus vulgaris, II. 75.
— acidus, 58. 636
— Acidi muriatici, II. 498.
— albus, 199
— amygdalinus, 199.
— antisyphilit., II. 208.
— aperiens, II. 103.
— ad aphoniam, II. 413.
— ad aphthas. II 612.
— de Borace, II 612.
— camphoratus, 395.
— Cetacei. 482.
— communis, 199. 482. II. 495.
— compositus, II. 281.
— demulcens, 200. 482.
— emeticus, 261.
— emolliens, 200.
— expectorans, 26. 246. II. 571.
— febrifugus, 485.
— gelatinos. nutriens, 727.
— ad gingivas, II. 239.
— de Haen, 455.
— lavans Tronchini, 455.
— leniens, II. 263. 690.
— mannatus, II. 103.
— Mesembryanth. cryst, II. 215.
— Olei Terebinth., II. 667.
— oleosus, 200. II. 495 571.
— opiatus, II. 329.
— Oxymuriatis calcici, 378.
— pectoralis, II. 14. 217.
— Phosphori, II. 336.
— Potassae Nitratis, II. 413.
— purgans, 773.
— refrigerans, II. 413.
— saponaceus, II. 439.
— saponatus, II 439.
— ad stomacacen, 378. 542.
— subadstringens, 471.
— vermifugus, II. 701.
Lingua Avis, 711.
— Bovis, 205.
— cervina, II. 573.
— serpentaria, II. 257.
Lini Placenta, II. 78.
Linimentum Absinthii, 8.
— Acetat. Cupri s. cuprici, 617.
— aceticum, II. 443.
— Aerugimis, 617.
— aethereum, II. 55. 444.
— aethericum, II. 443.
— album, 480
— Albuminis Ovi, II. 315.
— alcalinum, II. 403.
— Aluminis, 149
— aluminosum, 149.
— ad ambustiones, 375.
— — c. Opio, 375
— Ammoniacae, 161
— ammoniacale, 161.
— — c. Camth., 427.
— — camphorat., 165. 178.
— — compositum. 166.
— — opiaceum, 166.
— ammoniacatum, 164.
— — mixtum, 178.
— Ammoniaci Gummi, 760.
— Ammoniae, 164. 178.
— — et Antimon. tartaris., 170. 259.
— — fortius. 165.
— — Subcarbonatis. 178.
— ammoniato - aether., 170. 427.
— — aromaticum 170. 427.
— — camphoratum, 165.
— — terebinth., II. 677.
— ammoniatum 161.
— — c. Camphora, 165.
— ammoniicum, 161.
— Ammonii foetidum, 160.
Linimentum Ammonii opiatum, 166.
— ammoniatum, 469.
— Ammoniureti Mercurii, II. 190.
— Amygdalarum, 194.
— contra anginam, 192.
— Anglicanum, 164.
— anodynum, 166. II. 261. 262. 269. 270. 278 281. 443.
— — opiatum, II. 270.
— — et resolvens, 791.
— antarthriticum, 166. 179. 327. II. 671.
— anthelminticum, 688.
— anticholericum, II. 713.
— antihaemorrhoidale, 478. 797. II. 76. 656.
— antiherpeticum, 674.
— antihystericum, II. 365
— antiophthalmicum, 679. II. 355.
— antipleureticum, II. 444
— antipsoricum, 376.
— antirheumaticum, II. 669.
— antiscrophulosum, 668.
— antispasmodicum. II. 262.
— antispasticum, 166.
— antivenereum. II. 139.
— aphrodisiacum, 328.
— ad aphthas, II. 612.
— ex Aqua s. Aquae Calcis, 375.
— Arcaei, II. 656.
— aromaticum II. 62.
— — stimulans, II. 507.
— arsenicale, 289.
— ad arthrodyniam, 332.
— cum Bals. Fioravanti, II. 664.
— Bals. Peruviani, 327.
— barbaricum, 335.
— Bituminis (camphorat.), II. 348
— Boracis, II. 612.
— de Borate. II. 612.
— boraxatum, II 612.
— calcareum, 375
— Calcariae sulphuratae, 377.
— calcicum 375.
— — c. Opio, 375.
— Calcis, 375
— Camphorae, 401.
— — comp., 105
— — ammoniat., 165.
— camphorato - ammoniat., 421.
— — opiaceum, 401.
— — saponatum, 401.
— camphoratum, 401.
— — compositum, 165
— — opiaceum, II 270.
— Cantharidum, 428.
— — camphoratum. 427.
— Carbonatis Ammoniae, 178
— causticum, II 440
— Cepae, 98.
— cuprosum, 628.
— depilatorium, 296
— digestivum, II. 656.
— diureticum, II. 564 666
— — gastro scillit., II 564
— Elemi, II. 657.
— emolliens, 202
— epilatorium, 266.
— excitans, 401. 432 II. 44 [illegible] 266 668.
— — aethereum, 427.
— — aromaticum 427
— — camphoratum 427.
— — resolvens, II. 443
— — terebinthinat., 427.
— ex Felle Tauri, 668.

Digitized by Google

Linimentum farinaceum c. Pice, II. 348.
— gingivale, 35. 469.
— — mundificans, II. 237.
— — roborans, 469.
— gummoso-balsamic., 328.
— Hydrargyri, II. 138.
— — ammoniat, II. 133.
— — Nitratis, II. 204.
— hydrargyro-acetos., II. 212.
— incitans, 398.
— Iodinae, II. 8.
— irritans, 164. 170. 427.
— — saponaceum, 427.
— juniperinum, II. 43.
— leniens, 401. II. 262.
— ad mammillas, 328.
— mercuriale, II. 128. 138.
— — ammoniacale, II. 138.
— — — camphorat., II. 138.
— — opiaceum, II. 139.
— muriaticum, 35.
— narcoticum, II. 261. 262.
— Nicotianae II. 248.
— nigrum, 366.
— Nucis vomic., II. 741.
— Olei cum Calce, 375.
— oleo-calcareum, 375.
— — opiatum, 375.
— ophthalmicum, 679. II. 178.
— opiaceum, II. 262. 278.
— — camphorat., II. 262.
— — et saponatum, II. 262.
— opiato-camphorat., II. 262.
— — saponac., II. 262.
— opiatum, II. 261. 266. 443.
— — et saponaceum, II. 262.
— Opii, II. 273.
— — camphoratum, II. 270. 741.
— — c. Felle vitulino, II. 283.
— Ovi Vitelli, II. 314.
— Petrolei, II. 333.
— — ammoniat., 165.
— phosphoratum, II. 337.
— — camphorat., II, 337.
— Picis liq. (Tar liniment), II. 348.
— plumbatum, II. 363
— Plumbi Acetatis comp., II. 364.
— — compositum, II. 368.
— psoricum, II. 639.
— refrigerans, 375. 480.
— resinoso-terebinthinat., II. 677
— resolvens, 166 178. 328. 378 395. 432. 668. II. 668.
— — et diureticum, II. 43
— — opiaceum, II. 364.
— rubefaciens, 427. II. 601.
— saponaceo-opiatum, II. 443.
— saponaceum, 167. II. 441. 442.
— — alcoholicum. II. 441.
— — camphorat., II. 444.
— — compos.. 167.
— — opiatum, II. 443.
— saponato-ammoniat., 166.
— — camphorat, 167. II. 442.
— — hydrosulphuratum, II. 396
— saponatum Kaempfii, II. 444.
— Saponis, 167. II. 442. 444.
— — aethereum, II. 443.
— — camphorat., 167. II. 270. 442.
— — compos., 167. II. 270 442.
Linimentum Saponis et Opii s. c. Opio, II. 271. 443.
— — rubefaciens, 427.
— saturnino-quercinum, II. 371.
— sedans, 795. II. 262.
— — aethereum, II. 273.
— sedativum, 795. II. 278. 363.
— — camphorat., II. 269.
— simplex, 267.
— Spermatis Ceti, 480.
— spirituosum, 177.
— — anodynum, II. 270.
— stimulans, 424. 668. II. 669.
— stomachicum, II. 507.
— ad struman, II. 607.
— Subborat. Sodae, II. 612.
— Subcarbonat. Ammoniae, 178.
— Succini opiat, II. 633.
— de Sulphure, II. 638.
— sulphurico-terebinthinat., II. 669.
— sulphuricum, II. 668.
— sulphuro-saponac., II. 605.
— Superacetat. Plumbi comp. v. Ung. etc.
— Tabaci, II. 248.
— Terebinthinae, II. 667.
— — aethereum, II. 663.
— terebinthinatum, II. 667.
— terebinthino-ammoniat., 166.
— contra tineam, 166.
— tripharmacum, II. 364.
— Tutiae, II. 726.
— vermifugum, II. 648.
— volatile, 164. 178.
— — c. Camphora, 165.
— — camphorat., 165.
— Zinci Sulphatis. II. 733.
Linum, II. 76.
— catharticum, II. 76.
— commune, II. 76.
— purgativum, II. 76.
— usitatissimum, II. 76.
Liquamen Martis, 690.
— Myrrhae, II. 238.
— Salis Tartari, II. 401.
Liqueur v. Liquor.
Liquidambar, II. 628.
— imberbe, II. 628.
— orientale, II. 627.
— styraciflua, II. 629.
Liquiritia, II. 79.
— cocta citrina, II. 82.
— officinalis, 715.
Liquor Acetat. Ferri aetherei, 698.
— — Ammoniae, 185.
— — ammonici, 185.
— — kalici, II. 421.
— — Plumbi (basici), II. 395.
— Acidi muriat. oxyg., 541.
— — oxalici, 52.
— — tartarici, 61.
— acidus Halleri, 61.
— — phosphoric. purus — Acid. Phosph.
— adstringens, II. 732.
— Aeris cinnamomat., 622.
— Aeruginis, 622.
— aether. martial. nitric., 689.
— aethereus oleosus, 83.
— — sulphuricus, 82.
— Aetheris nitrosus, 80.
— Alcali acet. nigri, II 421.
— — volat. acetici, 185.
— — — compos., 192.
— alexiterius acetat., 21.
— — extemporalis, 542.
Liquor alexiterius extemporaneus, 542.
— — oxygenatus, 541.
— Aluminis comp., 149. II. 732.
— ex Ammonia et Oleo Succini, 168.
— ammoniacalis, 172.
— ammoniaco-mercurialis, II. 207.
— ammoniacalis c. Aceto, 185.
— Ammoniae. 155.
— — Acetatis, 185.
— — anisatus. 160.
— — carbonicae, 172.
— — purae, 155
— — spirituosus. 159.
— — Subcarbonatis, 172.
— — subcarbonicae, 172.
— ammoniato-muriat. c. Hydrarg., 620.
— ammoniato stibiatus, 192.
— Ammonii, 155.
— — acetici, 185.
— — anisatus, 160.
— — carbonici, 172.
— — — aquosus, 172.
— — — pyro-oleosi, 174.
— — caustici, 155.
— — foeniculatus, 161.
— — Hydrothiod., 184.
— — oxalici, 190. II. 731.
— — puri, 155.
— — pyro-oleosus, 174.
— — — — succinici, 191.
— — subcarb. aquosus, 172.
— — succinici, 191.
— — sulphurati, 184.
— — Sulphureti, 184.
— — tartarici. 193.
— — vinosus, 154.
— anodyn. animalis, 80.
— — martialis, 692.
— — mineralis, 82.
— — — Hoffm., 82.
— — — aquosus. 83.
— — — martialis, 692.
— — succinatus, II. 633.
— — topicus, 178.
— — Trilleri, 178.
— — vegetabilis, 75.
— — de Vicat, 161.
— antarthrit. Elleri. 193.
— — de St. Marie, 193.
— antiarthriticus, 752.
— antimiasmat., 626.
— — Beisseri s. Koechlini, 626.
— — Labarraquii, 378.
— Antimonii tartaris., 255.
— — tartariz., 255.
— antinephreticus, II. 417.
— antiodontalgicus, II. 168.
— antiophthalmicus, 295.
— antiphlogisticus, 21.
— antipyreticus, 290.
— antiscrophulosus, 334.
— — Niemanni, 390.
— antispasmodicus, 39. 192.
— — Grimaudi, 193.
— antisyphiliticus, II. 185. 196.
— — Chaussieri, II. 196.
— antivenereus, II. 185.
— — Roueni. II. 546.
— aperitivus, II. 433.
— ad aphthas, II. 612.
— Argenti muriatico-ammoniati, 279.
— — nitrici, 278.
— — sulphurici, 279.

Liquor aromat. saponato-ammoniat., 177.
— Arseniatis Potassae, 290.
— arsenicalis, 290.
— — Fowleri 290.
— Arsenici albi, 287.
— arthriticus Elleri, 193.
— — Pottii. II. 668.
— Auri muriat., 316.
— auricularis, 328
— balsamico aromat., II. 509.
— Baritae, 334.
— Barytae acet., 337
— — Muriatis, 334.
— — muriat., 334.
— — nitricae, 337.
— baryticus, 335.
— Barytis Muriatis, 334.
— Beisseri, 626.
— Bellostii, II. 202.
— Calcariae chloratae, 378.
— — muriaticae, 390.
— — sulphuratae, 377.
— — sulphuricae, 389.
— Calcii Oxydi, 374.
— Calcis, 374
— — Muriatis, 390.
— — oxymuriat., 378.
— Camphor. artific., II. 668.
— Carbonat. Ammon., 172.
— — ammonici, 172.
— — — c. Oleo empyreum., 174.
— — kalici, II. 401.
— Caribaeorum, 752.
— cathaereticus, 622.
— Chloreti Stibii, 250.
— Chlori, 541.
— — extemporan., 542.
— Ciner. clavell. depur., II. 401.
— ad condylom., II. 186. 193.
— Cornu Cervi alcalinus, 174.
— — — succinatus. 191.
— — — — albus, 191.
— — — tartarisatus, 193
— — — terebinthinat., 185. 186.
— — — volatilis, 174.
— Cupri ammoniacalis, 624.
— — ammoniati, 624 627
— — ammoniato s. ammonio-muriatici, 626.
— — sulphurici, 622.
— — sulphurico - ammoniat., 624.
— cuproso-mercurial., 626.
— Deutochlorureti Merc., II. 182.
— digestivus Boerhav., II. 421.
— discutiens, 23
— diureticus, II. 219.
— enixus. 180.
— excitans, 168.
— exsutorius, 427. 428.
— febrifugus. 687.
— Ferri alcalini, 681.
— — muriat oxydati, 691.
— — — oxydulati, 690.
— — saliti, 691.
— — sulphurici, 686.
— fumans Boylei, 184.
— — Libavii, II. 625.
— ad gangraenam, 182.
— ad gingivas, II. 239.
— Gypsi. 389
— hepat Mustel. fluv., II. 744.
— Hoffm. anod., 82.
— Hydrarg. ammoniati, II. 207.
— — camphorat, II. 186.
— — muriat. corros, II. 182.
Liquor Hydrarg. nitrici. II. 202.
— — — oxydati, II. 205.
— — — oxydulati, II. 202.
— — oxyd. phosphor acidi, II. 197.
— — Oxymuriatis, II. 184.
— hydrargyro acetic., II. 213
— Hydratis kalici, II. 390.
— — natrici, II. 604.
— Hydrogenii sulphurat., 45
— hydrosulphurat. pro balneo, 46.
— hydrosulphuretico - acidulus, 45.
— hydrosulphuric. pro balneo, 46.
— Kali acetici, II. 421.
— — — nigri, II. 421.
— — — c. Rheo, II. 424.
— — carbonici, II. 401.
— — caustici, II. 390.
— — ferreo-boruss., 70.
— — ferruginoso - hydrocyanici, 40.
— — oxalici, II. 426.
— — subcarbonici, II. 401.
— Koechlini, 626.
— Lithargyri Acetat., II. 361.
— — — comp, II. 361.
— — Subacetat. compos., II. 361.
— de Lamotte, 692.
— Magnes. sulph., II. 95.
— martialis, 692.
— mercurialis, II. 182. 202.
— — camphoratus, II, 186.
— Mercur. ammoniati, II. 207.
— — nitrosi, II. 202.
— — — calore parat., II 202.
— — — dilutus, II. 202.
— — — frigore parat, II. 202.
— — sublimati corros., II. 182.
— Mindereri, 185.
— — fortior, 185.
— — tenuior, 185.
— Morphii s. Morphinae Citratis, II. 224.
— — tartarisat, II. 224.
— muriatico-hydrargyro-cupricus ammoniacalis, 626 II. 209.
— Muriatis Antimon., 250.
— — Deutoxydi hydrargyro-calcarei, II. 148.
— — Ferri, 691.
— — Hydrarg. corros., II. 182.
— — hydrargyro - ammoniacalis, II. 207.
— — zincici, II. 722.
— Myrrhae, II. 238.
— — alcalisatus, II. 238.
— Natri carbonici. II. 609.
— — arsenicosi, II 737.
— — caustici, II. 604
— — chlorici, II. 608.
— — hydroiodinici, II. 739.
— — muriatici, II. 608.
— — sulphurici, II 615
— ad nephrit. calculos., II. 326.
— nervinus, 692.
— Rangii, 398.
— Perebomii, II. 670.
— Nitratis Hydrarg., II. 202.
— — hydrargyrici, II. 205
— — hydrargyros., II. 202.
Liquor nitrico-aeth. martialis, 689.
— ad odontalgiam, II. 108.
— odontalgicus, II. 108.
— Olei animal. et Cajeputi, 360.
— oleosus Sylvii, 161.
— ophthalmicus, 627.
— — anodynus, II. 689.
— — detersivus, II. 731.
— — roborans, 120.
— Opii sedativus, II. 223. 224.
— Ossium volatilis, 175.
— ad pannum oculor. consumend., 630.
— ad perniones, II. 362.
— philodont. et antispasm., II. 124
— Platini muriat., II. 350.
— Plumbi Acetatis, II. 361.
— — acetici, II. 369.
— — — basici, II. 358.
— — Subacetatis, II. 358.
— — — dilutus, II. 361.
— Potassae, II. 390.
— — Arseniatis, 290.
— — causticae, II. 390.
— — Subcarbonat., II 401.
— probator. Hahnem., 45.
— — Moeglingii, 286.
— — Vini, 280.
— — Wirtemberg., 286.
— ad pterygium. 630
— pyro - oleos. ex panno reget., II 744.
— pyro-tartareus, 55.
— pyro-tartaricus, 55.
— resolvens, II. 131. 425.
— Sacchari Saturni, II. 369.
— salinus, II. 428.
— — laxativ., II. 95. 433.
— — volatilis 185.
— Salis Alcali veget. acetati, II. 422.
— — amari, II. 95.
— — Ammoniaci anis., 160.
— — — fixi. 390
— — communis, II. 607.
— — essent. Tartari, 64.
— — mirabil. Glauberi, II. 615.
— — Sodae puriss., II. 609.
— — Tartari, II. 401.
— — — perfecte saturati, II. 406.
— — — purissimi II. 401.
— — volat. Ammon. succinat, 191.
— Saponis stibiati, 248.
— scilliticus. II. 425
— Sesquichloreti Ferri. 691.
— Sodae concentratus, II 601.
— — oxymuriaticae, II. 607.
— Spangenbergii, II. 191.
— Spir. Salis marin. dephlogist., 541.
— spleneticus ex Tart., II. 427.
— Stanni muriat., II. 625.
— stibiat. c. Aconito, 67.
— Stibii muriat. 250
— stimulans et vulnerar., II. 239.
— stypticus, 143. 691.
— — Weberi, 688.
— Subacetat. Lithargyri, II. 358.
— — — comp., II. 361.
— — Plumbi s plumbici, II. 361
— Subchloreti Ferri, 691.
— Subcarbonat. Ammon., 172
— Succinat. Ammon s. ammon., 191.

Digitized by Google

Liquor succinic. anod., II. 633.
— Sulphat. calcarei, 389.
— — Magnesiae, II. 95
— — Zinci aluminosus, II. 732.
— Sulphureti Ammon., 184.
— Swietenii, II. 184. 207.
— syphilit. Swietenii, II 184.
— — Turneri, II. 184.
— Tart emet. 255. 256.
— — solubilis, II. 436.
— — — chalybeati, 707.
— — stibiati, 256.
— — tartaris., II. 427.
— — vegetabilis, II. 421.
— — vitriolati, II. 409.
— Tartratis ammonici, 193.
— Terrae foliatae, II. 421.
— — — Tartari, II. 421. 424.
— — — — spirit., II. 424.
— — ponderos. salit., 334.
— tonicus, 153.
— Trilleri, 178.
— ad ulcera atonica, II. 419.
— — faucium, II. 239.
— — oris, 618.
— ad unguem oculor. consumend., 630.
— vegeto min. de Pressavin, II. 213. 214.
— Vini probat. Hahnem., 45.
— viscералis, 699.
— Vitrioli coerulei, 622.
— — Martis, 686.
— — — oxydat., 686.
— volat. C. C., 174.
— — — c. Calce, 174.
— vulnerarius, II. 663.
— — mineralis, 704.
— — vegetab. Dippel., II. 217.
— Zinci Acetatis s. Acetitis, II. 733.
— — muriatici, II. 722.
Liriodendron tulipifera, 500. II. 86.
Liryngium, 659.
Lithagrostis, II. 51.
Lithargyrium, II. 351.
Lithargyrius, II. 351.
— s. Lithargyrus Argenti et Auri, II. 351.
Lithargyrum, II. 351.
Lithargyrus, II. 351.
Lithontript. Tulpii, 426.
Lithospermum, II. 86.
— officinale, II. 86.
Litus acidus, 35.
— ad haemorrhoides, 797.
— Hydrargyri, II. 191.
Lixiva acetata, II. 240.
— purificata, II. 398.
— — liquida, II. 397.
Lixivia acetata, II. 420.
— caustica, II. 390.
— purificata, II. 398.
— tartarisata, II. 427.
— vitriolata, II. 406.
Lixivium Alkali veget., II. 401.
— Absinthii II. 402.
— ammoniacale, 155.
— — anisatum, 160.
— — aromatic., 161.
— — causticum, 155. II. 390.
— — vinosum, 159.
— causticum, II. 390. 604.
— — minerale, II. 604.
— — vegetabile, II. 390.
Lixivium Genistae, II. 402.
— juniperinum, II. 402.
— c. Junipero, II. 402.
— Kali vegetab., II. 401.
— lithontript. Saunders., II. 393.
— magistrale, II. 390.
— Martis, 690.
— Potass. pur. magistr., II. 390.
— Matris Salis marini, 389.
— Sanguinis, 40.
— Saponariorum, II. 390. 604.
— saponarium, II. 390.
— Sodae, II. 604.
— — purae, II. 604.
— Tamarisci, II. 402.
— Tartari, II. 401.
Lobaria pulmonaria, II. 67.
Lobelia, II. 86.
— cardinalis, II. 87.
— circiifolia, II. 87.
— inflata, II. 87.
— longiflora, II. 87.
— syphilitica, II. 86.
— tupa et urens, II 87.
Lonchitis, II. 573.
Lonicera Periclymenum, 436.
Looch adstringens, 471.
— album, 199.
— Amygdalarum, 43.
— amygdalinum, 199.
— Amyli, 471.
— c. Amylo, 471.
— anisatum, 222.
— anthelminticum, 553. 783.
— ad asthma, II. 563.
— antiasthmaticum, 761.
— anticatarrhale, 77.
— antisyphilit., II 208.
— balsamicum, 1. 329.
— bechicum, 636.
— Brassicae rubrae, 354.
— camphoratum, 395.
— commune, 200. 482.
— compositum, II. 281.
— crocatum, II. 690.
— cum Croco et Pistaciis, II. 690.
— demulcens, 200.
— emolliens, 200.
— emeticum, 261.
— expectorans, 243. 265. 770. II. 637.
— Farfarae s. de Farf., 667.
— Glacialis, II. 215
— Gordoni, 353
— gummoso oleos., 199.
— gummosum, 771.
— Japonicum, 471.
— c. Kermete, 243.
— kermeticum, 243.
— laxans, 544.
— leniens, 199. 482. II. 77. 263.
— — balsamicum, II. 653.
— de Manna s. Mannae, II. 103.
— Mesembryanth. cryst., II. 215.
— oleosum, 200
— Ovi, 201.
— Ovorum, 201.
— Oxymuriat. calcici, 378.
— pectorale, 200. 385. 770. II. 217. 565. 571.
— — leniens, 201 768.
— pulmonale, 222. II. 84.
— de Pulmone Vulpis, 222. II. 84.
— pulmonem stimulans, 761.
— purgans, 773.
— refrigerans, II, 413.
— rubrum, 201.
Looch sanum et expert., II. 84.
— saponaceum, II. 439.
— saponatum, II. 439.
— saponicum, II. 439.
— de Scilla, II. 563.
— scilliticum, II. 565.
— simplex, 200. 771. II. 600.
— contra stomacacen 378.
— terebinthinatum, II. 653. 666
— contra tussim. II. 263.
— vermifugum, 783. II. 701.
— viride, II. 690.
— vomitivum, 261.
Lopezia racemosa, II. 461.
Loranthus Europaeus, II. 716.
Lotio Acetatis Mercurii, II. 212.
— acida, 50.
— adstringens, 94. II. 360. 372. 724
— alba, II. 361.
— alcohol. saponacea, II. 440.
— alcoholisata, 375.
— Aluminis, II 732.
— anodyna, II. 326.
— antiphlogistica, II. 361.
— antipsorica, 46. II. 163.
— antirachit. Bonhomme, II. 401.
— antiseptica, 521. 522. II. 369.
— Calcis, 375.
— Cupri Acetatis, 631.
— e Cupro et Zinco comp., II. 724.
— desinfectans v. Liq. Calc. oxymuriat.
— evaporans, II. 738.
— excitans, 257. 644. II. 616.
— — et caustica, II. 740.
— exsiccans, II, 192.
— Goulardi, II. 183. 362.
— ad haemorrhoides, 797.
— helleborata, 780.
— Hydrargyri, II. 147. 183.
— — lutea s. flava, II. 148.
— — nigra, II. 147.
— — Oxymuriat., II. 183.
— hydrocyanica, 38.
— hydrosulphurata, 46
— hydrosulphurosa acida, II. 397.
— mercurialis, II. 183. 203.
— — Aliberti, II. 183.
— — Manry, II. 203.
— Myrrhae s. M. compos., II. 240.
— Nicotianae, II. 247.
— Opii, II. 278.
— contra perniones, 161. II. 402.
— phagedaenica, II. 240.
— Picis, II. 347.
— plumbata, II. 362.
— Plumbi comp., II. 192.
— — Acetatis comp., II. 370.
— — Subacetatis, II. 361.
— Quercus saturnina, II. 372.
— resolvens, II. 362.
— ad rheumatismum, II. 669.
— saponacea, II. 402.
— saturnina, II. 362.
— sedativa, II. 325.
— e Staphisagria, 644.
— Sulphuris, II. 638.
— sulphuro - saponacea, II. 640.
— Tart. stibiati, 257.
— terebinthinata, II. 663.
— ad tineam, 375. II. 605. 616
— Veratri mercurialis, II. 163.

Digitized by Google

Lotio e Veratro, 780.
— vinosa, II. 713.
— Vitrioli coerulei, 622.
— Zinci sulphur. s. Sulphatis. II. 730.
— e Zinco et Cupro comp. II. 724.
Lotus ad haemorrhoides, 797.
— odorata, II. 109.
— ad rheumatism., II. 669
— herba sylvestris, II. 692.
— urbana, II. 109.
Lozenges v. Trochisci, Pastilli, Morsuli etc.
Lucii Maxillae praep., 381.
— Piscis Mandib., 386.
Lujula, 16.
Lumbricus terrestris, 720.
Lunaria, II. 87.
— Botrytis, II. 87.
Lupinus, II. 87.
— albus, II. 87.
— sylvestris, varius, II. 87.
Lupulina, II. 87.
Lupulinum, II. 87.
Lupulus, II. 87.
Lybisticum, II. 74.
Lycoperdon Bovista, 353.
Lycopersicum, II. 618.
Lycopodii Semen s. Sulphur, II. 89.
Lycopodium, II. 89.
— annotinum — L. clavatum.
— clavatum, II. 89.
— complanatum — L. clavat.
Lyringium, 659.
Lysimachia lutea, II. 90.
— Nummularia. II. 90.
— purpurea, II. 525.
— — spicata, II, 525
— vulgaris, II. 90.
Lythargyrum, II. 351.
Lythrum Salicaria, II. 525.
Lytta coerulea, 422.
— Gigas — Cantharis.
— vesicatoria, 422.
— vittata, 422.

M.

Macis, II. 231.
Madar, II. 230.
Madrepora oculata, 379.
Magisterium Antimon. diaphor., 229.
— Bismuthi, 350.
— Coralliorum, 380.
— Gummi Guttae — G. Guttae praeparatio.
— Jalapae, II. 28. 29.
— Lapidis calaminaris, II. 723.
— Marcasitae, 350.
— Margaritarum, 381.
— Matris Perlarum, 381.
— Oculorum Cancrorum, 381.
— Opii Ludovici, II. 259.
— Plumbi, II. 351. 354.
— Saturni, II. 351. 354.
— Sulphatis Ferri, 679.
— Sulphuris, II. 634.
— Tartari purgans, II. 420.
— Vitrioli Martis, 679.
— Zinci. II. 723.
Magistrantia, II. 1.
Magma scytodepsic. ex Quercu, II. 371.
Magnes, 675.
— arsenicalis, 286.
Magnesia, II. 93.
Magnesia alba, II. 90.
— alba. II. 90.
— — calcinata, II. 90.
— — genuina, II. 90.
— calcinata, II 90.
— carbonica. II. 90
— — venalis, II. 90.
— communis, II. 90.
— cretosa, II. 90.
— dulcis. II. 90.
— Edimburgensis, II. 90.
— effervescens, II. 90.
— hydrochlorica, II. 97.
— mitis, II. 90.
— nigra, II. 101.
— Nitri, II. 90.
— nitrica. II 90.
— opalina, 226.
— phosphorica, II. 94.
— pura, II. 90.
— Salis amari, II. 90.
— — Ebshamens., II. 90.
— — Epsomens., II. 90.
— silicica, II. 97.
— stibiata, 258.
— subcarbonica, II. 90.
— sulphurica, II. 95.
— — cruda, II. 95.
— — depurata, II. 95.
— usta, II. 93.
— vitriariorum s. vitrarior., II. 101.
— vitriolata, II. 95.
— — depurata, II. 95.
Magnesiae Subcarbonas, II. 90
Magnesium, II. 90.
— oxydatum nativ., II. 101.
— — nigrum, II. 101
Magnolia glauca, II. 98.
— precia, tripetala, II. 98.
Mahagoni, II. 642.
Majorana, II. 311.
Mala insana, II. 618.
— Armeniaca praecocia, II 438.
— Aurantia, 557.
— Lycopersica, II. 618.
— Punica, II. 451.
Malabathrum, 403.
Malacorium, II. 451.
Malas Ferri, 698.
— — Protoxydi, 698.
Malicorium, II. 451.
Malthum, II. 98.
— Hordei, II. 98.
Maltum, II. 98.
— Hordei, II. 98
Malucorium, II. 451.
Malum citreum, 569.
— insanum, II 618.
— Lycopersicum, II. 618.
— Punicum, II. 451.
Malus communis, II. 388.
— Citria, 569.
— Limonia, 569.
Malva, I. 99
— Alcea. 88.
— arborea, II. 99.
— hortensis, II. 99.
— minor, II. 99.
— rosea, II. 99.
— rotundifolia, II. 99.
— sylvestris, II 99.
— vulgaris, II. 99.
Malvaviscum, 129.
Manati Lapis, 387.
Mandibulae Lucii Piscis, 386.
Mandragora, 315.
Manganesium, II. 101.
— aceticum, II. 102.
— muriat. oxydul., II. 101
— ochraceum nigrum, II. 101.
— oxydatum, II. 101.
— — nativum. II. 101
— sulphuric oxydul., II 102.
Manganum, II. 101.
— hyperoxydatum, II. 101.
— oxydatum nativum, II. 101.
Mangostana Cambogia — Garcinia C.
Maniguetta, 715.
Manna. II. 102.
— Alhagi, II. 102.
— Brigantina. II. 102.
— Calabrina, II. 102.
— canaliculata, II. 102.
— canellata, II 102.
— cannulata, II. 102.
— Capachi, II. 102.
— communis, II. 102.
— electa, II. 102.
— di fronde, II. 102.
— Gerace, II. 102.
— granulosa, II. 102.
— grassa, II. 102.
— in lacrymis, II. 102.
— lacrymata, II. 102.
— laricina, II. 102.
— liquida, II. 103.
— longa, II. 102.
— metallorum II. 159.
— Persica, II. 102.
— pinguis, II. 102.
— sordida, II. 102.
— in sortis, II. 102.
— spissa, II. 102.
— tabulata, II. 431.
— tartarisata, II. 431.
— Thuris et Thuris crystallina, II. 255.
Mannita, II. 102.
Manulnvium irritans s. sinapinum, II. 693.
Maranta arundinacea, 285.
— Galanga, 714.
— Indica, 285.
Marathrum, 208.
Marcasita, 349
— argentea, 349.
Marchantia polymorpha, 783.
Margaritae, 380.
— praeparatae 381.
Marmelada adstring., II. 672.
— antinephretica, II. 655.
— expectorans, 244.
— febrifuga, 485. II. 667.
— de Haen. 455.
— Iridis, II 81.
— mercurialis, II. 128.
— pectoralis, II. 44. 637. 735
— purgans 773.
— stimulans, II. 735
— Tronchini, 455.
— de Zanetti, 243.
Marmor album, 379.
— calcareum, 379.
— praeparatum, 381.
— — salinum, 379.
— saccharoides, 379.
Marrubium album, II. 105.
— conditum, II. 105. 106.
— foetidum, 320.
— nigrum, 320.
— vulgare, II. 105.
Mars, 669
— solubilis, 700.
— vitriolatus, 685.
Martia, II. 714.
Martis Limatura, 670.
Marum, II. 681.
— Syriacum, II. 679.
— verum, II. 679.
— vulgare, II. 681.
Massa Althaeae, 769
— desobstruens, 761.
— pro fornace odorif., 34
— ad fornacem, 311.
— de Guimauve, 769.

Digitized by Google

Massa de Gummi Arab., 769.
— Liquiritiae alba, II. 82.
— — fusca II. 83.
— mercurialis mollis, II. 139
— — sicca, II. 128.
— odontalgica, II. 107.
— Pilular. e Cynoglosso, II. 288
— — hydragog. Janini, II. 169.
— — contra obstruct. Halens, 128.
— — polychrest. bals., 121.
— — resolv. Schmuck., II. 738.
— — Ruffii, 121.
— — Schmidtii contra taeniam, II. 738.
— — scillit., II. 561.
— — de Succino Craton., 113.
— — visceral. Kaempf., II. 737.
Massicot, II 353.
Masticatorium pro equis, II. 453.
— excitans, II. 452.
Mastiche s. Mastice, II. 107.
Masticbina, II. 102.
— Gallorum, II. 684.
Mastix, II. 107.
Mater Margaritarum, 380.
— Perlarum, 380.
— — praeparata, 381.
Materia perlata s. perl. Kerkringii, 229.
Matonia Cardamomum, 441.
Matricaria, II. 108.
— Chamomilla, 484.
— Parthenium, II. 108.
Matrisylva, 309. 436.
Maxillae Lucii praep., 381.
Mays, II. 719.
Mechoacanna, II. 109.
— alba, II. 109.
— nigra, II. 23.
Meconas Sodae, II. 618.
— Sodii Protoxydi, II. 618.
Meconium, II. 257.
Medulla bovilla s. bovina, 68.
— Cruris vaccin. praep., 68
— saxorum, 142.
Mel, 264.
— Aceti, 22.
— — Colchici, 586.
— — colchitici, 586.
— — Scillae s. scillit., II. 570.
— Aegyptiacum, 617. 618.
— album, 264.
— Anglicum, 264.
— anthosatum, II. 506.
— Armoraciae, II. 463.
— Boracis, II. 612.
— boraxatum, II. 612.
— Cannae, II. 522.
— Chelidonii. 495.
— Colchici, 585.
— commune, 264.
— — purum, 264.
— cupratum, 617.
— depuratum, 264.
— — simplex, 264.
— despumatum, 264.
— — inspissat., 264.
— flavum, 264.
— glycyrrhizatum, II. 85.
— hydrargyratum, II. 130.
— Hydrargyri, II. 130. 163.
— Italicum, 264.
— Liquiritiae, II. 85.
Mel mercuriale, II. 125. 130. 151. 202.
— Mercurialis annuae, II. 125.
— Mercurii dulcis, II. 163
— Minorcense, 264.
— Mororum, II. 225.
— e Muriate Hydrargyri, II. 163.
— Narbonnense, 264.
— Rorismarini, II. 506.
— rosaceum, II. 497.
— Rosae, II. 497.
— — Gallicae, II. 497.
— Rosarum, II. 497.
— rosatum, II. 497
— — solutivum, II. 498.
— de Rosis, II. 497.
— Rubi Idaei, II. 5 5.
— Sambuci Flor., II. 536.
— — Fructuum, II. 536.
— Saponis, II. 439.
— Scillae, II. 565. 567.
— — acetatum, 570.
— — composis., II. 565.
— — maritimae II. 570.
— scilliticum, II. 565.
— — compos, II. 565.
— solutivum, II. 498.
— Subboratis Sodae, II. 612.
— Superacetat. Cupri, 617.
— terebinthinatum, II. 607.
— ustum, II. 522.
— Violarum, II, 715.
— virgineum, 264.
Melaleuca Cajaputi, 369.
— Leucadendron, 369.
Melampodium, 776.
Melanthium, II. 249.
Melia Azedarach, 320.
Meliguetta, 745.
Melilotus citrina, II. 109.
— coeruleus, II. 109.
— officinalis, II. 109.
— vulgaris, II. 109.
Melissa Calamintha, II. 111.
— citrata, II. 111.
— citrina, II 111.
— Fuchsii, II. 116.
— hortensis, II. 111.
— humilis, II. 116.
— Nepeta, II. 111.
— officinalis, II. 111.
— Turcica, II. 111.
Melissophyllum, II. 116.
Melitochorton, 781.
Melittis Melissophyllum II. 116.
Mellago Graminis, 744. 745.
— Taraxaci, II. 650.
— Tritici repentis, 744. 745.
Mellicratum, 205.
Mellitum de Acetate Cupri, 617.
— Aceti simplex, 22.
— de Cupro acetatum, 617.
— Mercurialis, comp., II. 125.
— Rosar. s. de Rosis, II. 497.
— simplex, 264.
Melo, 614.
Meloë, II. 116.
— majalis, II. 116.
— niger — Cantharis.
— Proscarabaeus, II. 116.
— vesicatorius, 422.
Melongena, II. 618.
Menispermum Cocculus, 578.
— hirsutum, 594
— lacunosum, 594.
— palmatum, 594.
Menstruum Auri, 274.
— pro Essentia dulci, II. 424.
Mentha aquatica, II. 117.
— arvensis. II. 117.
— Balsamina II. 117.
— Calamintha. II. 111.
— Cataria, 467.
Mentha crispa, II. 117.
— — verticillata, II. 117.
— equina, II. 117.
— gentilis, II. 117.
— longifolia, II. 118.
— Menthastrum, II. 118
— Piperis sapore, II. 117.
— piperita, II. 117.
— Piperitidis, II. 117.
— Pulegium, II. 449.
— Romana, 321.
— rotundifolia, II. 117.
— rubra, II. 117.
— Saracenica, 321.
— sativa, II. 117.
— sylvestris, II. 117. 118
— — folio rotundiore, II. 117.
— verticillata, II. 117.
— viridis, II. 118.
Menthastrum, II. 118.
Menyanthes trifoliata, II. 602.
Mephitis, 378.
— barotica, 336.
— hepatica, 43.
— Plumbi, II. 354.
— Sodae, II. 608.
Mercurialis, 496. II. 125.
— annua, II. 125.
— Mas et Femina, II. 125.
— perenn. et tomentosa, II. 125.
Mercurius, II. 125.
— acetatus, II. 211.
— aceticus, II. 211.
— alcalisatus. II. 131.
— boraxatus, II. 196.
— calcinatus ruber, II. 149.
— causticus flavus, II. 197.
— — luteus, II. 197.
— cinereus, II. 145.
— — Blackii, II. 199.
— corallinus, II. 149.
— corrosivus albus, II. 180.
— — flavus, II. 197.
— — ruber, II. 149.
— — sublimatus, II. 180.
— cosmeticus, II. 206.
— c. Creta, II. 131.
— depuratus, II. 125.
— dulcis, II. 159.
— — martiatus, II. 171.
— — per viam humidam, II. 159.
— — sexies sublimat., II. 160.
— emeticus flavus, II. 197.
— flavus, II. 197.
— fluctuans Guidotti, II. 184.
— glyzyrrhizatus, II. 130.
— gummatus, II. 128.
— gummosus Plenkii, II. 127.
— hydrocyanicus, II. 195.
— liquidus. II. 208.
— c. Magnesia, II. 131.
— mitis, II. 159.
— mortis, 250.
— muriaticus, II. 159.
— muriatus corrosivus, II. 180.
— niger Moscati, II. 145.
— nitratus ruber, II. 149.
— nitrosus. II. 201. 205.
— — alior, II. 202.
— phosphoratus, II. 197.
— praecipitatus s. praecip. albus, II. 149. 206.
— — corrosivus ruber, II. 149.
— — flavus, II. 197.
— — fuscus II. 197.
— — Moscati, II. 145.
— — niger, II. 199.

Mercurius praecipitatus ruber, II. 149.
— — — per se, II. 149
— — — praep., II. 149.
— — — venalis, II. 149.
— — Saunderi, II. 207.
— — viridis, II. 151.
— — Wurtzii, II. 197.
— rectificatus, II. 126.
— redivivus Cinnab., 126.
— ruber, II. 149.
— saccharatus, II. 130.
— solubilis Hahnemanni, II. 199.
— — Moretti, II. 147.
— — Moscati, II. 145.
— sublimatus corrosiv., II. 180.
— — — venalis, II. 180.
— — dulcis, II. 159.
— c. Sulphure, II. 141.
— tartarisatus, II. 213.
— terebinth, II. 738.
— terrestris, II. 332.
— vitae, 227. 250.
— vitriolatus, II. 197.
— vivus, II. 125.
— — depuratus, II. 125.
— — rectificatus, II. 125.
— Zinci, II 739.
Mesembryanthemum crystallin., II. 214.
Mespilus, II. 215.
— arbutifolius, 500.
— Germanica, II. 215
— Oxyacantha, II. 215.
Metel, 640.
Metella, 640.
Metroxylon Sagu — Sagu.
Meum, II. 215.
— athamanticum, II. 215.
— Foeniculum — Foeniculum.
Mezereum, 638.
Mica Panis albi, II. 319
Milium II. 319
— esculentum, II. 319.
— Solis, II. 86.
Millefolium, II. 215. 216.
Millepedae s. Millepedes II. 218.
— praeparati, II. 218.
Milligrana, 784.
Mimosa Catechu, 467.
— cinerea, II 49.
— Corinda, II 49.
— Nilotica, 15. 766.
— Senegalensis, 772.
— Unguis Cati, II. 73.
Minium s. Minium rubrum, II. 352.
Mirospermum toluiferum, 329.
Mithridatium, II. 290.
Mistura v. Mixtura.
Miva Cydoniorum, 634. 635.
— — aromat., 634.
Mixtura absorbens, 375. 391.
— acida, 275. II. 409.
— — anodyna, II. 273.
— Acidi muriatici, 35.
— — — oxygenati, 542.
— — nitrici, 51.
— — phosphorici, 54.
— acido-mineralis, 275.
— adstringens, 323. 470 517. II. 73. 268. 469. 495. 655.
— aetherea, 83.
— alba, 323. 760.
— alcalina, II. 403.
— — anodyna, II. 393.
— aloëtica, 119.
— alterans, 257.
— amara, II. 476.
Mixtura amara c. Rheo, II. 476.
— ammoniacalis, 758.
— — salina, 182.
— Ammoniaci, 758.
— — et Antimonii, 261.
— — comp., 760.
— — et Olei volat. Succini, 149.
— Ammoniae Acetatis, 188.
— Ammonii acetici, 188.
— — — Liquoris, 189.
— — carbon. pyro-oleosi camph., 176.
— — — — compos., 176.
— — caust. Liquoris, 158.
— ex Ammonio muriat., 182.
— Amygdalae s. Amygdalar., 196.
— analeptica, II. 314.
— anodyna, 83 II 263.
— — pro infantibus, II. 328.
— antacida, II. 94. 394. 609.
— anthelmintica, 324. 554. II. 178. 333.
— anthelmintico-incitans, II. 681.
— antiacida v. M. antacida.
— antiasthmatica, 761. II. 4 536.
— — Swietenii, 176.
— antiaphthosa, II. 315.
— antiblennorrhagica, 323. 353.
— anticatarrhalis, II. 567.
— anticathartica, II. 209.
— anticholerica, II. 742 743.
— antidiarrhoica, 266. II. 233
— antidysenterica, 50. 257. II 525
— antiemetica, 29. II. 426.
— antiepileptica, 177.
— antifebrilis, 516.
— antigonorrhoica, 323.
— antiguttosa volatilis, 398.
— antihaemorrhagica, 59 726
— antiherpetico diaphoret., 67.
— antihydropica, 435.
— antihysterica, 302. 464.
— antijcterica, II. 423.
— antilethargica, II. 64.
— antimiasmatica, 626.
— antiotodynica, II. 285.
— antiodontalgica, 450. II 285.
— antiperiodica, 516 517.
— antiphlogistica, II. 416.
— antiphthisica, 655.
— antipsorica, 674.
— antiscabiosa, 674.
— antispasmodica 83. 176. 192. 302. 464. II. 228. 701.
— — et diuretica, 85.
— — resolvens, 85.
— — simplex, 75.
— antisyphilitica, 618. II. 176.
— — de Haen, II. 190.
— antivomitiva, 5.
— aperiens, 260
— ad aphthas, II. 315.
— Aquae Lauro Cerasi, 41.
— aromatica, 421.
— arsenicalis, 291.
— Asae foet. s. Assae foet., 301. II. 737.
— — — pro clysmate, 301.
— — Millari, 301,
— Bals. Peruv., 329.
— balsamica 323. II. 653.
— — Fulleri, 323.
— bechica, 758
Mixtura Boerhaavii, II. 571.
— boraxata, II. 612.
— c. Calomelle, II. 163
— Camphorae, 395
— — comp., 398.
— e Camphora c. Aceto, 395
— camphorata, 395.
— — aetherea, 398
— camphorato spirit., 399.
— camphorica, 400.
— Carbonat. Calcis comp., II. 267.
— — Potass. Absinth. stomach., II. 493.
— — — Absinthii, 29.
— cardiaca, 408. 417.
— carminativa, 224. II 91. 96. 483.
— Castorei aetherea, 465.
— — ammoniato-spirit., 465.
— cathaeretica, 285.
— cathartica v. Potio purg., 613.
— — ammoniata, II. 589.
— — Arabica, II. 559.
— cerea, 266.
— Chelidonii, 496.
— Chinae officinalis, II. 738.
— — phosphorata, II. 337.
— Cicutae, 547.
— Cinchonae aperiens, 527.
— — officin., II 738.
— citro-muriatica, II. 606.
— Conii composita, 547.
— e Conio, 547.
— Copaibae comp., 323.
— Copaivae, 323.
— — comp., 323
— — Broussonetii, Delpechii, Lallemandi, Willisii, 323. Fabre, Chopart, 324.
— Cornu Cervi, 768.
— — cervini, 768.
— — usti, 768.
— cosmetica, II. 402.
— cretacea, 385.
— Cretae, 385
— Cupri ammonio-muriat., 626.
— Cyanureti Potassii, 39.
— demulcens, II. 523. 524.
— — ammoniac., 182.
— deprimens, 41. 648
— — et valde diuretica, 648.
— — expectorans, 649.
— desobstruens, II. 424. 429.
— detergens, II. 501.
— diaphoretica, 177. 188. 611. II. 17. 267. 403.
— — anodyna, II. 18.
— ad diarrhoeam, II. 233. 688.
— Diatrion, 55.
— Digitalis camph., 651.
— diuretica, 587. II. 89. 402. 417 424 567 653. 663.
— — et refrigerans, II. 416
— — fortior, 651.
— — et tonica, II 424.
— ad dysenteriam, II. 280.
— ad dyslochiam, 84.
— effervescens, II. 406.
— emetica, 256. 261. 622. 657. II. 15.
— Emetinae purae, 658.
— emeto-anodyna, 244.
— emmenagoga, 682. 694.
— excitans, 164. 395. 518. II. 606
— — mitis, 189.

Naphtha Vitrioli 81.
— — camphorata, 398.
— — diluta, 83.
— — martialis, 692.
— — phosphorata, II. 336.
— — rectificata, 82.
Napus, 351.
— dulcis, 354.
— sylvestris, 354.
Narcissus Pseudo-Narcissus, II. 221.
Narcotina, II. 242.
Narcotinum, II. 242.
Nardus, II. 243.
— Celtica, II. 243.
— — altera, 282.
— Indica, II. 243.
— rustica, 305.
— sylvestris, 305.
Nasturtium aquaticum, II. 244.
— hortense, II. 243.
— Indicum, II. 243.
— pratense, II. 244.
— sylvestre, 605.
Natri paratio, II. 608.
Natron s. Natrum, II. 608.
— aceticum, II. 617.
— arsenicosum, II. 737.
— carbonicum, II. 608.
— — acidulum, II. 610.
— — crudum, II. 608.
— — crystallisatum, II. 608.
— — depurat., II. 608.
— — — siccum, II. 608.
— — neutrale, II. 610.
— — perf. saturat., II. 610.
— chloratum s. chlorinicum, II. 606.
— glaciale, 388.
— hydriodinic., II. 11.
— hydrochloric., II. 605.
— muriat, II. 605.
— — oxygenat., II. 606.
— nitricum, II. 617.
— oxyphosphorodes, II. 613.
— praeparatum, II. 608.
— phosphoricum, II. 613.
— subboracicum, II. 611.
— subcarbon. crudum, II. 608.
— Succo Citri neutralisatum, II. 609.
— sulphuratum, II. 604.
— sulphuricum, II. 614.
— — acidum, II. 614.
— — crudum, II. 614.
— — crystallis., II. 614.
— — depur. cryst, II. 614.
— — — siccum, II. 614.
— tartaricum, II. 435.
— tartarisatum, II. 435.
— vitriolatum, II. 614.
Nauclea Gambir, 467.
— longiflora, II. 46.
Nenufar, II. 252.
Nenuphar, II. 252.
Nepenthes opiatum, II. 259 282.
Nepeta, 467. II. 111.
— Cataria, 466.
Nephrocatharticum Foresti, 272.
Nephrodium Filix mas — Athyrium Fil.
— crenatum, 311.
Nerium, II. 245.
— antidysentericum, 584.
— Oleander, II. 245.
Nezetta, II. 49.
Nicotiana, II. 245.
— minor, II. 245.
— rustica, II. 245.
— Tabacum, II. 245.
Nicotianina, II. 245.
Nicotianinum, II. 245.
Nicotinum, II. 245.
Nidi Hirundinum, 381.
Nigella, II. 249.
— arvensis, II. 249.
— Damascena, II. 249.
— sativa, II. 249.
Nigrum Eboris, 437.
Nihil s. Nihilum album, II. 722. 723.
— griseum, II. 722.
Ninsi, II. 604.
Ninsing, II. 603.
Ninsinus, II. 603.
Nitras Ammoniacae, 180.
— ammonicus c. Oxydo hydrargyroso, II. 199.
— Argenti, 277.
— — ammoniacalis, 279.
— — crystallin., 277.
— — crystallis., 277.
— — fusus s. fusum, 277.
— — liquidus, 278.
— argenticus crystall., 277.
— — fusus, 277.
— Barytae, 337.
— Bismuthi, 350.
— — c. baseos excessu, 350.
— — praecipitat., 350.
— cubicus, II. 617.
— Cupri, 625.
— — Deutoxydi, 625.
— Deutoxydi Argenti, 277.
— — Hydrarg. liq., II. 202.
— Ferri, 689.
— — Tritoxydi, 689.
— Hydrargyri, II. 201.
— — ammoniato nitricum, II. 200.
— — liquidus, II. 202.
— Kali, II. 410.
— kalicum s. kalicus, II. 410.
— — crudus, II. 410.
— — depuratus, II. 411.
— — purus, II. 411.
— Lixiviae, II. 410.
— Mercur. Deutoxydi, II. 205.
— — liquidus, II. 202.
— — Protoxydi, II. 201.
— natricum s. natricus, II. 617.
— Oxyduli Hydrarg. liquidus, II. 202.
— Plumbi, II. 358.
— Potassae, II. 410.
— — crudus, II. 410.
— — crystallizat., II. 411.
— — depuratum, II. 411.
— — impurus, II. 410.
— — purgatus, II. 411.
— — purificatum, II. 411.
— — purum s. purus, II. 411.
— — c. Sulph. fusum, II. 411.
— Potassii Protoxydi s. Deutoxydi, II. 410.
— — Deutoxydi fusus, II. 411.
— Sodae, II. 617.
— Sodii Protoxydi, II. 617.
— Strychninae s. Strychnini, II. 628.
— subbismuthicum, 350.
Nitri depuratio, II. 411.
— Naphtha, 77.
— Spirit. fumans, 48.
Nitrogenium, 340.
Nitromurias Platini, II. 350.
Nitrum, II. 410.
— alkalisatum, II. 400.
— ammoniacale, 180.
— antimoniatum, 235.
— — Stahlii, 235.
— baroticum, 337.
— crudum, II. 410.
Nitrum crystallis. et depurat., II. 410.
— cubicum, II. 617.
— depuratum, II. 410.
— ta Carbonibus fixum, II. 400.
— fixum Schroederi, II. 406.
— — per Tartarum, II. 400.
— flammans, 181.
— fontanum, II. 95.
— fusum, II. 411.
— inflammabile, 180.
— lunare, 277.
— Mercurii, II. 201.
— nativum, II. 410.
— papaveratum, II. 411.
— perlatum, II. 412.
— purificatum, II. 410.
— purissimum, II. 411.
— purum, II. 410.
— regeneratum, II. 411.
— rhomboidale, II. 617.
— rosatum, II. 411.
— saturninum, II. 367.
— Schroederi, II. 406.
— tabulatum, II. 411.
— Terrae pond., 337.
— venale, II. 410.
— vitriolatum, II. 406.
— — Schroed., II. 406.
Nodulus purgans, II. 579.
Nola culinaria, 206.
Nostoc, II. 250.
Nostochium commune, II. 250.
Nuces aquaticae, II. 691.
— Avellanae, 606.
— Cupressi, 617.
— Juglandis immat. et mat., II. 34.
— moschatae, II. 231.
— Quercus s. quercinae, II. 458.
— — tostae, II. 461.
— quernae tostae, II. 461.
— vomicae, II. 250.
Nucista, II. 231.
Nuclei Pineae s. Pini, II. 340
— Myristicae, II. 231.
Nummularia, II. 90.
Nux Barbadensis, II. 250.
— Been s. Behen s. Ben, II. 221.
— cathart. Americana, II. 250.
— Juglans s. Juglandis, II. 34.
— Metella, 640.
— moschata, II. 231.
— vomica, II. 250.
Nymphaea alba, II. 252.
— lutea, II. 252.

O.

Ochinglossum, II. 257.
Ochra lutea 678.
— plumbaria, II. 352.
— rubra, 678.
— Veneris, 619.
Ocimum v. Ocymum.
Octopus vulgaris — Sepia offic.
Oculi Cancrorum, 391.
— — citrati, 391.
— — praep., 392.
Oculus Christi, II. 528.
Ocymum Basilicum, 338.
— magnum, 338.
— medium, 338.
— minimum, 338.
— vulgatius, 338.
Oenanthe Phellandrium — Phell. aquat.
Oenoplia, II. 471.
Oenos, II. 712.

Digitized by Google

Oesypus, II. 253.
— praeparatus, II. 253.
Offa alba, 176.
— — Helmontii, 176.
Oil, British, 731.
Ointment v. Unguentum.
— ,le Mort's, II 357.
— ,Donavants. II. 147.
— ,Bailey's itch. II. 159.
— for grease, II. 355. 364. 369.
Olea Europaea II. 251.
— mixta, II. 62.
Oleo-Ceratum Aqua subact., 267.
— — Galeni, 267.
— Margaras Mercurii, II. 214.
— Resina Copahu, 321.
— — de Mecca, 326.
Oleosaccharum cephal., II. 230.
— Cajaputi, 369.
— Crotonis Tiglii, 612.
— Foeniculi, 209.
— Myrrhae, II. 235.
— Succini. II. 632.
— Terebinthinae. II. 667. cf. Elaeosacch.
Oleum Abietis, II. 652.
— Absinthii aether., 5.
— — coctum, 11.
— — destillat., 5.
— — infusum, 11.
— — stillatitium. 5.
— Acori aromat, 371.
— acusticum, 795. II. 667.
— aethereum, 83.
— Agrippae, II. 572.
— Aloës, 102.
— aloëtic. Batavum, 103.
— Althaeae, 138.
— ammoniatum, 164.
— Ammoniaci Gummi, 761.
— Amygdalae, 194.
— — comm., 194.
— Amygdalar. s. Amygdalor., 194.
— — amar essent., 42.
— — dulcium, 194.
— amygdalinum, 194.
— Anagallidis, 205.
— Anacardii, 204.
— Andropogon. Nardi, II. 243.
— Anethi aethereum, 211.
— coctum vel infus., 211.
— Angelicae, 212.
— animale, 730.
— — aethereum, 730.
— — — empyreumat., 730.
— — foetidum, 730.
— Anisi aeth. s. destill. s. volat., 222.
— — expressum, 222.
— — reductum, 223.
— — stellati, 225.
— — suphurat., II. 638.
— anthelminticum, 592. II. 667.
— Anthemidis coeruleum, 486.
— — viride, 487.
— Anthos, II. 507.
— Antimonii, 250.
— Apparitii reformatum, 800.
— Aregonis, II. 220.
— arilli Myrist. mosch. aeth., II. 232. 233.
— aromo-narcotic., 794.
— Artemisiae, 293.
— Arthanitae comp., 593.
— arthriticum. 753.
— Asphalti, II. 744.
— Aurant. aeth. s. destill., 558.
Oleum Aurant. expressum, 558.
— — Flor., 558.
— ad aures, 98. 795.
— Avellanarum, 606.
— balatinum, II. 221.
— Balsami, 326.
— Basilici, 338.
— Been, II. 221.
— Benzoës, 342.
— Benzoini, 342.
— Bergamottae s. Bergamotte, 568.
— Betulae, 349.
— betulinum, 349.
— bezoardicum Wedelii, 401.
— Britannicum, British oil, 731.
— Bryoniae comp., II. 572.
— Bufonum, 794.
— Buxi, 367.
— Cacao, 368.
— — concret., 368.
— — destillatum, 369.
— — Fruct., 368.
— — spissat., 368.
— — Theobromae expr., 368.
— cadinum, II. 347.
— Cajaputi, 369.
— Cajeput, 369.
— Cajeputae s. Cajeputi, 369.
— — rectificat., 369.
— Cajuputi, 369.
— Calami s. Cal. aromat. s. Cal. destill., 371.
— Calcis, 389.
— Camphorae, 393. 400.
— — liq. et butyrac., 393.
— — nitricat., 400.
— camphorat., 401.
— Cannabis (Semin.), 422.
— Cantharidum, 428.
— Capiviae. 321.
— de Capparibus, 435.
— Capparium s. Capparum, 435.
— Cardamomi Sem. aeth., 442.
— Carlinae Radicis stillat., 446.
— carminativum, 493.
— — aethereum, 487.
— Carpathicum, 321.
— Carvi, 447.
— — aethereum, 447.
— Caryophyll. arom., 450.
— — reductum, 450.
— Cascarillae, 452.
— Cassiae cinnam., 407.
— Castorei, 459.
— Cataputiae minoris, 466.
— Catellorum, 799.
— de Cedro s. Cedri, 569.
— — rectificat., 569.
— Cerae (empyreum.), 267.
— Cerefolii, 484.
— cetaceum, 69.
— Chamaemeli aeth. s. destill., 486.
— — coct. s. infus., 492.
— — coerul. compos., 487.
— — compos., 487.
— chamaemelinum, 492.
— Chaerefolii, 484.
— Chaerophylli, 484.
— Chamomill. aeth. s. destill., 486.
— — citratum, 487.
— — coct. s. infus., 492.
— — terebinthinat., 487.
— Cheiri. 494.
— Chenopodii, 497.
— anthelmint., 497.
— chrysomelinum, II. 448.
Oleum cicinum, II. 250.
— Cicutae. 549.
— — destillatum, 549.
— Cinnamomi. 407.
— — Ceylanici, 407.
— — Sinensis, 407.
— Citri Aurant. Cort. expr. 558.
— — Cort., 569.
— — Flor., 569.
— — Medic. Cort. aether., 569.
— — — — expr., 569.
— — rectificatum, 569.
— Cocois butyraceae, II. 254.
— Colocynthidis, 592.
— Conyzae comp., II. 220.
— Coriandri, 604.
— Cornu Cervi empyreum., 730.
— — — — rectif., 730.
— — — foetid., 730.
— — — rectif., 730.
— — — succinat., 730.
— — — volatile, 729.
— — cervini etc. v. Ol. Cornu Cervi.
— Cort. Aurant., 558.
— corylinum, 606.
— costincum, 606.
— Croci, 609.
— Crotonis, 612.
— Cubebar aeth., 614.
— Cucumeris Semin., 614.
— de Cucurbita, 615.
— Cucurbitae pleuret, 615.
— — s. Cymini Semin., 616.
— Cumini aeth., 616.
— Cunilae, 616.
— Cupri Oxydi viride, 629.
— Dictamni, II. 311.
— Dippelii, 730.
— dulce, 83.
— empyreumat animale, 730.
— — commune, II. 254.
— — Pini sylv. — Pix mg liq.
— — — — exsiccat. — Pix.
— Enulae comp., II. 7.
— Euphorbii, 663.
— — Cyparissiae. 466.
— Fabar. Pichurim, 606.
— Fagi, 666.
— Filicis, II. 737.
— Flor. Aurant., 558.
— — septem, 493.
— — Slotani, 799.
— Foeniculi, 208.
— — aeth. s. essent., 208.
— — dulcis aeth., 208.
— Formicarum, 710.
— del Frayle. II. 683.
— Fruct. Cacao, 368.
— Fuliginis, 711.
— Galbani, 358. 359.
— — compos, 359.
— Gaultheriae, 718.
— Guajaci, 748.
— — comp., 748.
— Gualtheriae, 718.
— Guiland. Bonducellae, II. 221.
— Gummi Ammoniaci, 761.
— Habacuci, 592.
— Helenii comp., II. 7.
— Helianthi, 775.
— hieraclinum, 606.
— Hyoscyami, 790. 793.
— — ammoniato-camph., 166.

Mixtura expectorans, 331. II. 571.
— — et tonica, II. 17.
— febrifuga, 516. 517. II. 416.
— — metallica v. Potio febr., 292.
— — et purgans, II. 27.
— ferrea, 694.
— Ferri composita, 681.
— foetida, 302. 459.
— frigorifica, II. 416.
— progingivis roborand., 469.
— Guajaci, 755.
— — alcalina, 758.
— — ammoniata, 753.
— — Gummi Bergeri, 755.
— guajacina, 749.
— G. Resin. Fer. Ammon comp., 759.
— — — Asae foet., 301. II. 737.
— — — Myrrh. ferrata, 681.
— gummosa ex Hydr. corros., II. 208.
— — e Sublim. corros., II. 208.
— — scillitica, II. 572.
— in haematuria chronica, II. 23.
— Hulmiana, 30.
— hydragoga, II. 220.
— Hydrocyanatis Potassae, 39.
— ad icterum, II. 423.
— incisiva, II. 572.
— incitans martialis, 700.
— — nervina, 284.
— — et sedans, II. 242.
— Infusi Uvae Ursi c. Digit, II. 697.
— — — — compos., II. 697.
— e Kali nitrico, II. 413.
— — sulphurico, 262.
— Kali tartarici, II. 430.
— kermetica, 243.
— Lauro-Cerasi Aquae, 41.
— laxans, II. 103. 433. 491. 645.
— lenions, 201. 636.
— Liquor. Ammon. acet. 189.
— — — caust., 158.
— lithontriptica, 84.
— e Lupulo, II. 88.
— Lycopodii, II. 89.
— e Magnesia sulph., II. 95.
— Marrubii, II. 106.
— martiata amara, 700.
— mercurialis, II. 128. 207.
— — balsamica, II. 128.
— Mercurii gummosa, II. 128.
— Millefolii, II. 217.
— mineralis, II. 185.
— moschata, II. 228.
— Moschi, II. 228.
— mucilaginosa, 771.
— mucilaginosa aromat., 453.
— — balsamica, 3. 331.
— Myrrhae, II. 238.
— — alcalisata, II. 240.
— — Griffithii s. ferrata, 681.
— Natri phosph., II. 614.
— nervina, 464.
— — et resolv., 284.
— Nicotianae diuret., II. 248.
— nitrata, II. 413.
— Nitratis Potassae, II. 413.
— nitrato camphorica, II. 416.
— nitrosa, II. 413.
— Nucum Jugland., II. 35.
— Olei Ricini c. Julapa, II. 33.
— oleosa, 201.
Mixt. oleosa c. Aceto, 23.
— — laxans, II. 491.
— oleoso-acida, 32. 574.
— — balsamica, 308. II. 509.
— — salina, II. 96.
— Olibani comp., II. 255.
— opiacea, II. 263. 268.
— opiato-aetherea, II. 264.
— — antidysenterica, II. 264.
— Opii adstringens, II. 307.
— oxygeno muriat., 542.
— ad partum, II. 612.
— pectoralis, 39. 182. II. 4. 329. 571.
— — hydrocyanica, 38.
— contra perniones, 328.
— piperita, 421.
— purgans, II. 33.
— — acidula, II. 433.
— pyrotartarica, 55.
— refrigerans, II. 362. 413. 418.
— Resinae Copaybae, 323.
— resolvens, 183. 335. 655. II. II. 340. 425. 429. 435. 663.
— — et roborans, II. 429.
— — spirituosa, II. 394.
— Rhei composita, II. 476.
— Rhois radic. Extracti, II. 487.
— Riverii, 29.
— roborans, 639. II. 47.
— Rogersi, II. 737.
— salina, II. 423. 425. 426.
— — antacida, II. 96.
— — composita, II. 426.
— — Macbridii, II. 425.
— — pauperum, II. 422.
— — simplex, II. 418. 426.
— — volatilis, 185.
— saponacea, II. 402.
— — purgans, II. 30.
— scillina, II. 565.
— sedans, II. 273.
— — et aromatica, II. 269.
— sedativa, II. 261. 281.
— sedativo-narcotico-pectoral., II. 263.
— — refrigerans, II. 413.
— Sennae composita, II. 695.
— simplex, 23. 55.
— — alba, 55.
— — antiscorbutica, 583.
— — Ludovici, 56.
— — ordinaria, 55.
— sistens, II. 307.
— solvens, 262.
— stimulans, II. 124.
— — antispasmod., II. 228.
— stomachica, 568. 735. II. 88.
— Strychninae s. Strychnini, II. 647.
— styptica, 622.
— Subcarbonat. Magnes., II. 94.
— — Potass, 29.
— succinea, II. 509.
— Sulphatis Ferri gummosa s. c. Gummi, 687.
— sulphurico-acida, 60.
— Sulphuris praecip., II. 638.
— Sylvii, II. 259.
— Tartari emetici, 257.
— — stibiat. et borax. juniperina, 262.
— tartarica, II. 430.
— temperans, 23. 464. 771.
— Terebinthinae, II. 667.
— terebinthinata, II. 653.
— theriacalis, II. 303.
— tonica, 534. 568. 689. II. 427.
— tonico-adstringens, 525.
— — antiseptica, 301. 523.
— — balsamica, 700.
Mixt. tonico-balsamica diaphoretica, 524.
— — nervina Stahlii, II. 394.
— — stomachica, 595.
— topica — Sapo chem. Dippel.
— Trifolii aquat. foetida, II. 694.
— ad tussim convuls., 516.
— vermifuga, II. 741.
— — et purgans, II. 27.
— vinosa, II. 409.
— volatilis, 192.
— ad vomitum sanguinis, II. 307.
— vomitiva, II. 15.
— vulneraria acida, 23. 189.
— Werlhofii, 329.
— Zinci Sulphatis, II. 729. 730.
Mixture, trush, II. 318.
Mochlique des frères de la Char., 228.
Mofetta — Gas acid. carbon.
Mollugo montanum, 715.
Molybdaenum Magnesii, II. 101.
Momordica, II. 219.
— Balsamina, II. 219.
— Elaterium, II. 219.
Monarda punctata, II. 220.
Monoceros, 386.
Monodon Monoceros, 386.
Moringa, II. 221.
— oleifera, II. 221.
— Zeylanica, II. 221.
Morpheum, II. 221.
Morphia, II. 221.
Morphina, II. 221.
— sulphurica, II. 222.
Morphinum, II. 221.
Morphium, II. 221.
— aceticum, II. 223.
— citricum, II. 224.
— sulphuricum, II. 222.
Morrhua, 69.
Morsuli Aceti, 21.
— c. Acido citrico, 32.
— Acidi oxalici, 52.
— anthelmintici, 553.
— antimoniales, 236.
— — Kunkelii, 236.
— antistrumales, 439.
— aromatici, 406.
— aromatico-stomachici, 406.
— Chinae, 507.
— chinati, 507.
— Cinnamomi, 406. 417.
— Citri, 573.
— Ginseng, II. 319.
— Imperatoris, 406.
— Menthae pip., II. 121.
— Oculor. Cancri, 382.
— pectorales, II. 278.
— purgantes, II. 30.
— restaurantes Kunkelii, 236.
— Rhoeados, II. 324.
— ad scabiem, II. 637.
— ad sitim restinguendam, 64.
— ad sodam, 383.
— solventes s. solutivi, II. 26.
— stibiati, 236.
— Stibii, 236.
— stimulantes, II. 735.
— stomachici, 406.
— ad ventriculi ardorem, 383.
— contra vermes, 553.
Morsus Diaboli, II. 565.
— Gallinae, 128.
Morus, II. 224.
— Indica, II. 461.
— nigra, II. 224.
— ruber, II. 514.
Moschus, II. 225.

Moschus artificialis, II. 632.
— fictitius, II. 632.
— in graniss. in vesica, II. 226.
— moschifer, II. 226.
Moscowatum, II. 522.
Motacilla Troglodytes, 381.
Mucharum Rosarum, II. 495.
Mucilago Acaciae, 768.
— Althaeae (Radicis), 133.
— Amyli, 203.
— Astragali Tragacanth., II. 689.
— camphorata, 395.
— Cantharidum, 426.
— Consolidae maj., 597.
— Corallinae Corsic., 782.
— cretica, 385.
— Cydoniae Semin., 635.
— Cydoniorum, 635.
— — Seminum, 635.
— — — acidulata, 636.
— Foenu graeci, 708.
— Glycyrrhizae, II. 81.
— Gummi Arab., 768.
— — — mercurialis, II. 127.
— — Mimosae, 768.
— — Tragacanth. II. 689.
— Helmintochorti, 782.
— Lichenis Island., II 69.
— Lini Semin., II. 76
— Liquiritiae, II. 81.
— mercurial. Plenkii, II. 127.
— oleosa, 200.
— Psyllii, II 349.
— Salep. II. 524.
— Tragacanthae, II 689.
Mudar, 230.
Mudarinum, II. 230.
Mumia Persica nativa—Bitumen.
Mumiae, 310.
Mungos, II. 230.
Mures marini, II. 744.
Muria, II. 605.
— fontana, II. 605.
Murias Ammoniacae, 180.
— — aeruginatus, 626.
— — et Cupri, 626.
— — ferratus s. ferricus, 694.
— — superhydrargyricus. II. 206.
— Ammoniaci sublim. c. Ferro, 694.
— Ammoniae, 180.
— — et Cupri liquid., 626.
— — depuratus, 181.
— — et Ferri, 694.
— — ferricus, 694.
— — martiatus, 694.
— — et Oxydi Ferri, 694.
— — purus, 181.
— ammonicus, 180.
— Ammonii ferrici, 694.
— — et Cupri, 626.
— ammonio-ferricum, 694.
— Antimonii, 250.
— — oxygenatus, 250.
— — superoxygenat., 250.
— Atropinae, 312.
— Auri, 316.
— — liquidus, 316.
— — et Sodae triplex, 317.
— aurico-natricum, 317.
— — — praep., 317.
— Barytae, 333.
— — liquidus, 334.
— barytic., 333.
— Calcariae, 389.
— calcicum, 389.
— Calcis, 389.
— — hyperoxygenat., 377.
— — oxygenat., 377.
Murias Calcis superoxygenat., 377.
— Cupri, 625.
— Deutoxydi Hydrarg., II. 180.
— Ferri, 690. 691.
— — ammoniacalis, 694.
— — liquid, 690.
— — sublimatus, 690.
— ferricus, 690.
— ferro-ammoniacale, 694.
— Hydrargyri, II.
— — basi Oxydi imperf., II. 181.
— — corros., II. 180.
— — Deutoxydi, II. 180.
— — dulcis sublimat., II. 159.
— — ferratus, II. 171.
— — mitis, II. 159.
— — oxydatus, II. 181.
— — Oxydi ammoniacalis, II. 206.
— — oxydulati, II 159.
— — oxydulatus praep., II. 159.
— — oxygenat. sublimatione s. praecipitatione parat., II. 180.
— — spirit. liquid., II. 184.
— — sublimat., II. 159.
— — suboxygenat., II. 159.
— — — praecip. parat., II. 159.
— — superoxygenat., II. 181.
— hydrargyric. corros., II. 180.
— hydrargyro-ammoniacal., II. 206.
— — — acerrimus, II. 206.
— — — insolubilis, II. 206.
— — — solutus, II. 207.
— hydrargyros. mitis, II. 159.
— Magnesiae, II. 97.
— Manganesii, II. 101.
— Mercurii ammoniacalis, II. 206.
— — corros., II. 180.
— — dulcis, II. 159.
— — suboxygenat., II. 159.
— — superoxygenat., II. 180.
— natricus, II. 605.
— Oxydi Antimonii, 250.
— — Hydrarg. ammoniacalis, II. 206.
— — — corros., II. 180.
— Oxyduli Hydr. mitis, II. 159.
— — Stanni, II. 625.
— — — liquidus, II. 625.
— — Stibii, 250.
— — — liquidus, 250.
— oxygenat. Hydr. sublimat., II. 181.
— — Mercurii, II. 181.
— Platinae, II. 350.
— Plumbi, II. 351.
— Potassae, II. 420.
— — hyperoxygenat. s. superoxyg., II. 419.
— — oxygenatus, II. 419.
— Protox Hydrarg., II. 159.
— Sodae II 605.
— — fossilis, II. 605.
— — depuratum, II 606.
— — exsiccatus, II. 606.
— — purificatus, II. 606.
— — purus, II. 606.
— — siccatum, II. 606.
Murias Stanni, II. 625.
— — Oxyduli, II. 625.
— — — liquid., II. 625.
— — protoxygenati, II. 625.
— — superoxygenatus, II. 625.
— Stibii, 250.
— — sublimatus, 250.
— stibiosus s. stibiosum, 250.
— — oxygenatus, 250.
— Zinci, II. 722.
Murigenium, 540.
Muscae Hispanicae, 422.
Muscari Ambrosiacum, II. 231.
Muscus Acaciae, II. 67.
— albus quernus, II. 66.
— arboreus, II. 66. 67.
— caninus, II. 66.
— capillaceus major, II. 388.
— catharticus, II. 66.
— clavatus, II. 89.
— corallinus, 781.
— — marinus, 781.
— Helminthocort., 781.
— Islandicus, II. 66.
— marinus, 781.
— pulmonarius, II. 67.
— pyxidatus, II. 66.
— quernus albus, II. 66.
— terrestris, II. 89.
Mustelae Piscis Spinae s. Vertebrae, 387.
Mustum, II. 717.
— Hordei, II. 98.
Myrica Gale, 714.
— cerifera, 715.
Myricinum, 216.
Myristica, II. 231.
— aromatica, II. 231.
— moschata, II. 231.
— officinalis, II. 231.
Myrobalani belliricae, II. 233.
— chebulae s. chebuli, II. 234.
— citrinae s. citrini, II. 234.
— emblicae, II. 234.
— flavae, II. 231.
— Indae s. Indicae s. Indici, II. 234.
— nigrae, II. 234.
— quinque, II. 234.
Myrobalanus bellirica, II. 234.
— chebula, II. 231.
— citrina, II. 234.
Myrospermum peruifera, 326.
Myroxylon s. Myroxylum peruif., 326.
— toluiferum, 329.
Myrrha, II. 234.
— liquida, II. 238.
— rubra, II. 234.
Myrrhis annua, 311.
Myrtacantha, II. 518.
Myrteum, II. 241.
Myrtillus, II. 698.
Myrtus, II. 240. 241.
— Brabantica, 715.
— Caryophyllata — Calyptranthes.
— communis, II. 240.
— Pimenta, II. 342.
Mytilus margaritiferus, 380.
Myxa, II. 241.

N.

Nacra Perlarum, 380.
Napellus, 65.
Naphae Flores, 557.
Naphtha, II. 241.
— Aceti, 74.
— Nitri, 77.
— Petrolei, II. 333.

Oxydulum Stibii sulphurat. fuscum, 234.
— — — semivitreum, 234.
— — vitreatum, 228.
— — vitreum. 228.
Oxydum Aluminii, 141.
— — factitium, 142.
— — naturale, 141.
— Antimonii album, 227. 229 250.
— — — per praecipit., 229.
— — — lotum, 229.
— — auratum, 244.
— — hydrosulphurat. aurant., 244.
— — — fuscum, 238.
— — — rubrum, 238.
— — majus per Nitrum. 229
— — minus, 227.
— — nitromuriatic, 250.
— — non ablutum, 234.
— — cum Phosphate Calcis, 230.
— — per Potassam, 234.
— — semivitrificatum, 234
— — sublimat., II. 723.
— — sulphurat. aurant, 244.
— — — griseum, 228.
— — — c. Potassa, 249.
— — — rubrum, 238.
— — cum Sulphure per Nitratem Potass. 234. v. Croc. Ant.
— — — vitrif., 228.
— — vitrificat, 228.
— — — cum Cera, 228.
— arsenicale album, 287.
— Arsenici (album), 287.
— — — c. Sulphureto Stibii, 287.
— — praeparatum. 287.
— — sublimatum, 287.
— Auri, 318.
— — ammoniat., 318.
— Bismuthi, 350.
— — album, 350.
— Cadmii, II. 45.
— calcicum purum, 373.
— Calcis, 373.
— Cobalti, 577.
— Cupri p. Acid. vegetab., 627.
— — acetatum, 627.
— — — praeparatum, 628.
— — viride, 627.
— — aluminosum, 141.
— Ferri, 680.
— — aluminosum rubrum, 141.
— — — Magnes., 142.
— — — praeparat, 142.
— — fuscum, 680.
— — nigrum, 675.
— — — purificat., 675.
— — rubrum, 678.
— ferricum, 675. 678.
— — c. Aqua, 680.
— — crystallis. nativum, 678.
— ferroso-ferricum, 675. 680.
— ferrosum, 675.
— Hydrargyri, II. 145.
— — ammoniacale, II. 199.
— — cinereum, II. 145. 199.
— — complet., II. 149
— — mediante Ammon. praecip., II. 199.
— — nigrum, II. 145. 199.
— — — mediante Amm. praecip., II. 199.
Oxyd. Hydrarg. nitrat., II. 149.
— — — rubrum, II. 149
— — — — per Acid. nitr., II. 149.
— — nitrici, II. 149.
— — ammoniacale, II. 199
— — nitricum, II. 150.
— — rubrum, II 149
— — — p. Acid nitr, II. 149.
— — — p. ignem, II. 149.
— — saccharat., II. 130.
— — salinum, II. 109
— — sulphuric., II. 197.
— hydrargyricum, II. 149.
— — praecipitatum, II. 145
— — praeparatum, II. 149
— hydrargyrosum, II. 145. 199 739.
— Hydrogenii, 719.
— Kadmii, II. 45
— Magnesii, II. 90
— — nigrum, II 101.
— — — nativum. II. 101
— Manganesii nigr., II. 101
— Mangani nativum, II. 101.
— — nigrum, II. 101.
— — — nativum, II. 101
— Mercurii, II. 145.
— — album p. Acid. sulphuric., II. 199.
— — cinereum, II. 199.
— — flavum p. A. sulph., II. 197.
— — griseum, II. 199.
— — nigrum, II. 199.
— — rubrum, II. 148. 149.
— — sulphur. rubr., II. 156
— Platinae, II. 354.
— Plumbi album, II. 354.
— — carbonatum, II. 354.
— — — p. Acid. acetos., II. 354.
— — flavum, II. 352.
— — fusum, II. 351.
— — griseum, II. 352.
— — puliceum, II. 354.
— — rubrum, II 352.
— — semifusum, II. 351.
— — semivitreum, II. 351.
— — sulphuratum, II. 351.
— plumbic. semivitr., II. 351.
— plumbosum, II. 352.
— Stanni, II. 625.
— — hydrosulph., II. 624
— — nigrum. II. 624.
— stibicum, 227.
— — c. Sulph. Stibii, 234
— Stibii c. Acido mur. oxyg parat, 250.
— — griseum, 227.
— — hydrosulphurat., 244.
— — — rubro-fuscum, 238.
— — non ablut., 234.
— — c. Potassa non ablut., 234
— — potasseum non ablut., 234.
— — c. Subphosphate Calcis, 230.
— — sulphuratum — Vitr. Antim.
— — — rubrum, 238.
— — — vitreum, 228.
— — c. Sulphure vitrificat, 228
— stibiosum, 229. 234.
— Vismuthi, 350.
— Zinci, II. 722. 723.
— — album, II. 723.
— — cinereum, II. 722.
— — hydrateum, II. 723
— — impurum, II. 722.
Oxyd. Zinci impur. praep., II. 722.
— — nativum, II. 722.
— — per se, II. 723.
— — semivitrif., II. 722.
— — sublimatum, II. 722. 723.
— zincicum, II. 722. 723.
— — album, II. 722.
— — griseum, II. 722.
— — per praecipit., II. 723.
— — per se, II. 722.
Oxygenium, II. 315.
Oxygeno chlor. Potassii, II. 419.
Oxylapathum, II. 517.
Oxymel, 22.
— Acetitis Cupri, 617.
— Aeruginis, 617.
— alliatum, 100.
— Allii, 100.
— antispasmod., 302.
— Belladonnae, 315.
— chalybeat, 697.
— Colchici s. colchicum, 586.
— colchiticum. 586.
— cuprosum, 628
— helleboratum, 781.
— martiale, 697.
— Narcissi prat., II. 242.
— Nicotianae, II. 248.
— Oxyduli Cupri, 617.
— pectorale, II. 5.
— Primulae veris, II. 447.
— saccharinum, 22.
— Sambuci, II. 537.
— Scillae, II. 570.
— scillinum. II. 570.
— scilliticum, II. 570.
— simplex, 22.
— c. Subacetate Cupri, 617.
— Tabaci, II 248.
— tartarosum, II. 430.
Oxymellitum Scillae s. scilliticum, II. 5.
— simplex, 22.
Oxymuriras Calcis, 377.
— Hydrargyri, II. 181.
— Plumbi, II. 351.
— Potassae, II. 419.
— Sodae, II 606.
Oxynitras Hydrarg. et Ammoniae, II. 199.
— — — mellitus, II. 201.
Oxyphosphas Calcii, 388.
— Ferri 684.
Oxyrhodinum, II. 501.
Oxysaccharum, 22.
— Digitalis, 650.
— emeticum, 258.
— scilliticum, II. 570.
Oxyseptonicum, 47.
Oxytartarus, II. 320.
Oxytriphyllum, 16.

P.

Padus, 476.
Paeonia, II. 316.
— officinalis, II. 316.
Palampissa, II. 671
Palma Christi, II. 490.
Palmulae, II. 334.
Paludapium, 270.
Pamphilus chirurg, II. 727.
Pampini Vitis, II. 717.
Panacea duplicata, II. 406.
— de Holstein, II. 406.
— Kornmanni, 318.
— lapsorum, 282.
— mercurialis II. 159 160.
— Mercur. rubra, II. 149.
— tartarea, 755.
Panada Anglorum, II. 319.
Panavae Lignum, 612.
Panax quinquefolium, II. 319.

Digitized by Google

Panchymagog. mercuriale, II. 159
— quercetanum, II. 159.
Pancratium verum, II. 559.
Panes purgantes et vermifugi, II. 176.
— saccharati purgantes, II. 26.
Panicum miliaceum. II. 319.
— Dactylon, II. 330.
Panis, II. 319
— albus, II. 319.
— Cassaviensis, II. 649.
— Cydoniorum, 634.
— — c. Aromat, 634.
— — compos., 634.
— porcinus, 633
Papaver, II. 321. 322.
— album, II. 322.
— coeruleum, II. 322.
— corniculatum, 495.
— erraticum, II. 322.
— nigrum, II. 322.
— officinale. II. 257.
— Rhoeas, II. 321.
— rubrum, II. 322.
— somniferum, II. 257. 322.
Paraetonium, 379
Paralyseos Radix, II. 446.
Pareira brava, 556.
Parietaria, II. 329.
— officinalis. II. 329
Parillina s. Parillinum, II. 544.
Paris, II. 329
— quadrifolia, II. 329.
Parnassia palustris, 783.
Paronychia, 310.
— argentea, 320
Parthenium, II. 108.
Paspalum Dactylum, II. 330.
Passae Ficus, 445
Passulae, II. 717.
— anthelminticae, II. 476.
— Corinthiacae, II. 717.
— Corinthicae, II 717.
— Corinthinaceae, II. 717.
— laxativae, II. 579.
— majores, II. 717.
— minores. II. 717.
— vermifugae. II. 476.
Pasta adstringens. 142
— Althaeae, 769
— Amygdalarum, 194.
— amygdalata cosmetica, 195.
— amygdalina. 194.
— — fusca, 195.
— anticephalalgica, 789.
— Apii, 271.
— arsenicalis, 288. 290.
— Cacao, 367.
— — c. Lich. Isl., II. 67.
— cacaotina, 367.
— — lichenifera, II. 67.
— — saccharata, 367.
— caustica Elsii, II. 393.
— cosmetica, 193.
— Dactylorum, II. 335.
— emulsiva, 194.
— epilatoria, 286.
— epispastica, 429.
— Glycyrrhizae. II. 81.
— — gummata et anisata, II. 81.
— de Guimauve, 769.
— de Gummi Arab., 769.
— Gummi Senegal, 772.
— gummosa, 769.
— — saccharata, 769.
— Iridis Florentinae, II. 21.
— Jovis, II. 623.
— Jujubarum, II. 37.
— c. Lich. Islandico, II. 70.
— lichenifera. II. 70.
— limacina, 728.
— Liquiritiae, II. 81.
— — anisata, II. 81.
Pasta Liquiritiae fusca, II. 81.
— — nigra, II. 81.
— — opiacea, II. 82.
— — c. Opio, II. 82.
— mollis G. Arab., II. 81.
— ad naevos, 376.
— pectoralis, 768.
— contra perniones, 147.
— regia, 194.
— rubefaciens et febrifuga, II. 519.
— pro Syrupo hordeato, 195.
— vesicatoria, 429.
Pastilli aromatici, II. 630.
— de Catechu, 468.
— — odorati, 469.
— fumales, 344.
— de Manna tart., II. 431.
— de Mentha pip., II 121.
— de Portugal, II. 691.
— purgantes, II. 165.
— de Rosa, II. 494. 691.
Pastinaca. II. 330.
— Anethum—Aneth. graveol.
— aquatica, II. 603.
— hortensis, II. 330.
— Opopanax, II. 310.
— sativa, II. 330.
Pata lupina, 442.
Patientia, II. 517.
Pavonae Lignum, 612.
Pavonis Stercus, 65
Pediluv. ex Armoracia, II. 463
— alcalinum. II. 401.
— irritans, II 463. 603.
— salinum s. c. Sale comm., II. 606
— sedativum, II. 52.
— sinapinum, II. 603.
Pedra de Porco spuria — Lap. porcin.
Peganum Harmala, II. 518.
Pelias Berus, 719.
Pellis Goulardi, II. 365.
Peltigera aphthosa, II. 66.
— canina, II. 66.
— horizontalis, II. 66.
— polydactyla, II. 66.
— venosa, II. 66.
Penaea Sarcocolla, II. 543.
Penides, 780.
Pentaphyllum, II. 446.
Peperomia crystallina, II. 312
Pepo. 615.
Perbromuretum Ferri, 355.
Perca fluviatilis, 380.
Percarburetum Ferri, 673.
Percarum Lapides, 380.
Perchloridum Hydrargyri, II. 181.
Perchloruretum Hydrargyri, II 181
— Mercurii, II 181.
Perdeutoxysulphuret. Antimonii, 244.
Perfoliata, II. 330.
Periclymenum, 436.
Periploca Indica, II. 544.
— Graeca, II. 577.
— Secamone, II. 556.
Perlae, 380.
— praeparatae, 381.
— textiles, 380.
Permurias Hydrargyri, II. 180.
Peroxydum Cupri, 619.
— Antimonii, 229.
— Ferri, 678.
— — stalactiticum, 678.
— Hydrarg., II. 149.
— Manganesii, II. 101.
— — nigrum, II. 101.
— — — nativum, II, 101.
— Mercurii, II. 148.
— Plumbi, II. 354.
Peroxydum Stanni, II. 624.
Persesquisulphas Ferri, 686.
Persica II. 330.
— vulgaris, II. 330.
Persicaria minor, II. 332.
— urens, II. 332.
Personata, 332
Persulphas Ferri, 686.
— Hydrargyri, II. 199.
Persulphuretum Stanni, II. 624
Pervinca, II. 712.
Pes Calumbi, 741.
— Cati, 225.
— columbinus, 741.
— Leonis, 88.
Petasites, II. 332.
— major, II. 332.
— rubens, II. 332.
— vulgare, II. 332.
Petroleum, II. 332.
— album. II. 332.
— Barbadense, II. 333.
— nigrum, II. 332.
— rectificatum, II. 333.
— rubrum, II. 332.
— sulphuratum, II. 333.
Petroselinum, 270.
— Macedonic., 357.
Petum, II. 245.
Peucedanum, II. 333.
— officinale, II. 333.
— Ostruthium — Imperat. O.
— Silaus, II. 599.
Peziza Auricula — Auric. Judae.
Phaseolus, 665.
— Mungo, II. 523.
— nanus, 665.
— vulgaris, communis, 665.
Phasianus Gallus — Ova
Phellandrium, II. 334.
— aquaticum, II. 334.
Philonium Londin., II. 293 301.
— Romanum, II. 308.
Phoenicites, 380.
Phoenix dactylifera, II. 331.
Phosphas ammoniaco-mercurialis, II. 197.
— Ammoniacae, 179.
— Ammoniae, 179.
— calcic. stibiat., 230.
— Phosphas Calcii, 386.
— — Protoxydi acid., 388
— Calcis, 386. 388.
— — acidus. 388.
— — praecipitatus, 387.
— — stibiatus, 230.
— Cupri, 619.
— Ferri, 684.
— — Tritoxydi, 681.
— Hydrargyri, II. 197.
— — Protoxydi, II. 197.
— Magnesiae, II. 95.
— Mercurii, II. 197.
— natricum, II. 613.
— natric. c. Aqua, II. 613.
— Sodae, II. 613.
— — et Ammoniaci, II 614.
Phosphorus, II. 335.
— Kunckelii, II. 335.
— liquidus. II. 336.
— ossium, II. 335.
— pulveratus, II. 336.
— urinae, II. 335.
Phosphuretum Calcis, 376.
Phrasium, II. 105.
Phu. II. 699.
Phyllanthus Emblica, II. 234.
Phyllitis, II. 573.
Phyllon, II. 125.
Physalis Alkekengi, 96.
Physcia Islandica, II. 66.
— nivalis, II. 65.
— Prunastri, II. 67.

Oleum Hyoscyami Folior. coctum. 793.
— — — infusum, 793.
— — Herbae coctum, 793.
— — — infusum, 793.
— — Seminum, 790.
— — viride, 793.
— Hyperici coctum, 798.
— — compositum, 800.
— — — ad usum artis veterin., 800.
— — facticium, 799.
— — Florum, 798.
— — infusum, 798.
— — Seminum, 797.
— Hyssopi, 802.
— Inulae comp., II. 7.
— Ireos, II. 21
— Iridis, II. 21.
— — destillatum, II. 21.
— irinum. II. 21.
— — compos., II. 21.
— Jasmini, II. 33.
— Jatrophae, II. 250.
— Jecoris s. Jecinoris Aselli, 69.
— Juglandis s. Juglandis regiae, II. 34.
— Juniperi Baccar., II. 42.
— — Ligni, II. 42.
— de Kerva s. kervinum, II. 490.
— Lacertar. virid, 729.
— Laricis, II. 661. 662.
— — rectificat., II. 662.
— lateritium s. Laterum, II. 254.
— c. s. de Lateribus, II. 254.
— Lathyridis, 466.
— Lauri Baccar., II. 55.
— — expressum, II. 55.
— — Sassafras, II. 554.
— laurinum, II. 55. 56.
— — expressum, II. 55.
— — infusum, II. 55.
— — verum, II. 55.
— — vulgare, II. 56
— Lavand. s. Lavend. s. L. Spicae aeth., destill., II. 61.
— — exotic. s. latifol., II. 62.
— — pingue, II. 62.
— — Spicae s. Stoechadis, II. 61. 626.
— — rectif., II. 62.
— Ligni Rhodii, II. 74.
— — Santal. citr., II. 541.
— — Sassafras, II. 554.
— Liliorum alb., II. 75.
— Limonis Bergamottae, 558.
— Limonum Cort., 569.
— Lini (usitat.) express., II. 78
— — c. Calce, 375.
— — coctum, II. 78.
— — sine igne, II. 78.
— — recens parat., II. 78.
— — sulphuratum, II. 638
— Lumbricor. terrestr., 728. 730.
— Lupuli destill., II. 88.
— Macidis, II. 232. 233.
— Macis in ollis, II. 232
— — expressum verum, II. 232.
— Majoranae aeth., II. 312.
— — infusum. II. 312
— Mariae, II. 643.
— Martis, 690.
— — per deliquium, 690.
— Mastiches, II. 108
— mastichinum, II. 108.
— Melaleuc. Leucadendr. volat., 309.
Oleum Meliloti, II. 109.
— Melissae, II. 112
— Menthae aeth., II. 120.
— — crispae, II. 120.
— — — terebinth., II. 120.
— — destillatum, II. 120.
— — infusum, II. 120.
— — Piperitis reduct., II. 120.
— — piperit., viridis, vulgar., II. 120.
— — sativae, II. 120.
— Millefolii, II. 217.
— Momordicae, II. 220.
— — compos., II. 220.
— Monardae, II. 221.
— Morrhuae, 69.
— Moschatae expressum, II. 232.
— Moschi, II. 229.
— de Mucilaginibus, 708. II. 77.
— Mucilaginis, 708.
— mucilaginosum. II. 77.
— Myristicae s. M. moschatae, II. 232.
— Myrrhae, II. 238. 240.
— — per deliq, II. 238.
— Myrti essent, II. 241.
— myrtinum II. 241.
— Myrti Pimentae, II. 344.
— Naphae, 558.
— Narcissi aeth., II. 242.
— Narcoticor., 794.
— Neroli, 558
— nervinum, 68.
— Nicotianae, II. 248.
— Nucis Jugland sulphurat., II. 638.
— — mosch. aeth. s. destill, II. 233.
— — — expres., II. 232.
— — Pini, II 341.
— Nucistae aeth., II. 233.
— Nucleorum express., II. 232.
— — Pineorum, II. 341.
— Nucum Avellanarum s. Coryli, 606.
— — Jugland., II. 34.
— Olivae s. Olivarum, II. 253.
— — Provinciale, II. 253.
— — empyreum., II. 254.
— — maturum s. complet., II. 254.
— — oxygenat., 542.
— omphacinum, II. 254.
— Origani, II. 311.
— — Cretici, II. 311.
— Ovor. Vitell., II. 314.
— Oxydi Cupri viride, 629.
— Palmae, II. 254.
— — Christi, II. 491.
— — liquidum, II. 491.
— — sebaceum, II. 254.
— Papav. albi, II. 324.
— — recens parat., II. 321.
— — somniferi, II. 324.
— paregoricum, 790.
— Perfoliatae infus. s. coct., 798.
— Petrae, II. 332.
— — album, II. 241. 333.
— — nigrum, II. 333.
— — vulgare. II. 668
— Petrolei Barbadens, II. 333.
— — volatile, II. 333.
— Petroselini, 273.
— Peucedani. II. 333
— Philosophorum, II. 254.
— phosphoratum, II. 337. 338.
— — aromatic., II. 338.
— phosphoricum, II. 337.
Oleum Pimentae, II. 344.
— Pimpinellae. II. 340.
— — Anisi. 222.
— Pinguedinis, 70.
— Pini aeth., II. 347. 661. 662.
— — Laricis, II. 661.
— — sylvestris — Ol. Terebinth.
— — volatile, II. 347. 662.
— — — purissimum, II. 662.
— Piperis acre, II. 346.
— — nigri s. piperin., II. 344.
— — Jamaicensis, II. 344.
— Pistaciarum, II. 347.
— Pulegii, 450.
— purgans, II. 558.
— pyro-animale, 730.
— — depuratum, 730.
— pyrocarbonicum. II, 744.
— Pyrogenium anim., 730.
— Raphani, II. 463.
— Raventsarae, 450.
— Rhodiolae roseae, II. 575.
— Ricini, II. 490.
— — Americani, II. 250.
— — artificiale, 612. II. 30.
— — Seminum, II. 490.
— Rorismarini, II. 507.
— — rectificat, II. 507.
— Rosae aethereum, 500.
— Rosarum, II. 499.
— — aethereum, 500.
— rosatum, II. 499.
— Rutae aeth., II. 520.
— — infus. s. coct., II. 520.
— Sabinae, II. 42.
— Salviae, II. 530.
— Sclareae destill., II. 530.
— Sambuci, II. 537.
— — viride, II. 538.
— Santali citrini vel albi, II. 541.
— Saponis, II. 444. 445.
— Sassafras, II. 554.
— Saturejae, II. 554.
— Saturni, II. 367.
— — Goulardi, II. 367.
— Scarabaeorum, II. 116.
— Scorpion. simpl., 728.
— — compos., 728.
— Scrophulariae, II. 574.
— septem Florum, 493.
— Serpylli, II. 684.
— Sesami, II. 509.
— — orient., II. 598.
— Sinapi infus., II. 602.
— Sinapis, II. 600
— — nigrae, II. 602.
— Solani nigri, II. 618.
— Spicae verum, II. 626.
— Spermat. Ranar., 729.
— stomachale 12.
— Stramonii, 642.
— — comp., 794.
— Succini, II. 632.
— — aeth., II. 632.
— — crud., II. 632.
— — depurat., II. 632.
— — empyreum., II. 632.
— — oxydat., II. 632.
— — rectificat., II. 632.
— — reductum, II. 633.
— — sulphurat., II. 638.
— sulphurat, II. 638.
— Sulphuris, 61
— — Beguini, 184.
— — per campanam, 61.
— — succinat. II. 638.
— Tacamahacae, II. 643.
— Taednae, II. 347.
— contra taen, II 667.
— — — Chaberti, II. 667.
— Tanaceti, II. 648.

Oleum Tapsiae, II. 683.
— Tart per deliq., II. 401.
— — foetid., 55.
— — solut., II. 401.
— templinum, 321. II. 662.
— Terebinth., II. 662.
— — aethereum, II. 663.
— — aromaticum, II. 662.
— — densum empyreumat., II. 662.
— — depurat., II. 662.
— — essentiale, II. 661. 662.
— — rectificat., II. 662.
— — sulphurat., II. 639.
— Terrae, II. 739.
— Thapsiae antirheumat., II. 683.
— Thymi, II. 684.
— Tiglii, 612.
— ad tormina ventris, 493.
— de tribus, II. 668.
— Valerianae, II. 706.
— Verbasci, II. 710.
— Vini, 83.
— — aethereum, 83.
— — dulce, 81. 83.
— — volatile, 83.
— Violar., II. 716.
— Viperar empyreumat., 730.
— viride, 629. II. 254.
— e Vitellis Ovor., II. 314.
— Vitrioli, 57.
— — Anglicum, 57.
— — depurat., 57.
— — dulce, 82.
— — Germanicum, 57.
— — glaciale, 57.
— — Hilarii, 57.
— — Nordhusan., 57.
— — purificatum, 57.
— — purissimum, 57.
— — rectificatum, 57.
— volat. animale, 730.
— — Dippelii, 730.
— vulpinum, 709.
— Zedoariae, II. 721.
— Zingiberis, II. 736.
Olibanum, II. 255.
— electum, II. 255.
— in guttis, II. 255.
— in sortis, II. 255.
— vulgare, 671.
Olivae Oleum, II. 253.
Olivillum, 254.
Olivum — Ol. Olivarum.
Olmitinm, II. 576.
Omphacium, II. 717. 718.
Oniscus Asellus, II. 218.
Ononis, II. 256.
— arvensis, II. 256.
— spinosa, II. 256.
Onopordon Acanthium, 442.
Onosma, 656.
— echioides, II. 256.
Opercula Cochlear., 380.
Ophioglossum, II. 257.
— Lunaria, II. 257.
— Osmunda, II. 257.
— vulgatum, II. 257.
Ophiorrhiza Mungos, II. 230.
— lanceolata, II. 231.
Opianum, II. 204.
Opiate, Delescott's myrtle, II. 241.
Opiatum adstringens, 344. 470. 509. II. 180. 461. 525.
— antiapoplecticum, 684.
— anticachecticum, II. 345.
— antichloroticum, 683.
— antidysentericum, II. 14.
— antiepilepticum, II. 282. 319.
— antigonorrhoicum, 324.
— antihaemorrhoidale, II. 345.
Opiatum antiherpeticum, II. 27.
— antiodontalgicum, 451.
— antiperiod. et tonic., 233.
— antiphthisicum, II. 637.
— antisyphilit., II. 171. 177.
— aperitiv. et purgans, 684. II. 141.
— Arabicum, II. 514.
— dentifricium, 143. 388. II. 237.
— desalterans, 659.
— detersivum, II. 237.
— dysentericum, II. 303.
— — balsamicum, II. 303.
— emmenagogum, 673. 683.
— febrifugum, 13. 507. 509. 510.
— — et incisivum, 509.
— — et purgans, 508.
— hydragogum, 684.
— lenions, II. 371.
— mesentericum, 673.
— Neapolitanum, II. 176.
— de Pajot - Laforest, II. 189.
— pectorale, 324.
— — tonicum, 673.
— purgans, II. 165.
— purgativum, II. 165.
— — et tonicum, II. 172.
— de Roccamore, 558.
— sedans, II. 371.
— stimulans, II. 27.
— stomachicum, II. 735.
— sulphuratum, II. 637.
— cum Sulphure, II. 637.
— terebinthinatum, II. 667.
— tonicum et purg., II. 165.
— vermifugum, II. 27. 143.
Opium, II. 257.
— c. Aceto praeparat., II. 258.
— brutum, II. 258.
— colatum, II. 258. 274.
— crudum, II. 258.
— depuratum, II. 258. 274.
— Glaser's prepared, II. 275.
— gummosum, II. 274.
— Indicum, II. 257.
— Neumanni, II. 276.
— Persicum, II. 257.
— purificatum (molle et durum), II. 258.
— — Powel's, II. 265.
— Quercetan's, II. 258.
— thebaicum, II. 257.
— torrefactum, II. 258.
— tostum, II. 258.
— Turcicum, II. 257.
Opobalsamum siccum, 326.
— verum, 320.
Opodeldoc, 167.
Opopanax s. Opoponax, II. 310.
Opuntia, II. 319.
Orchis fusca — Salep.
— mascula, II. 524.
— militaris — Salep.
— Morio, II. 524.
— ustulata — Salep.
Oreoselinum, II. 576.
Origanum, II. 310.
— aquaticum, 662.
— commune, II. 311.
— Creticum, II. 310.
— Dictamnus, II. 310.
— Majorana, II. 310.
— vulgare, II. 311.
Orleana, II. 312.
— in baculis, foliis, ovulis, rotulis, II. 312.
— Terra, II. 312.
Ornithoglossa, 711.
Orobanche, II. 312.
— major, II. 313.
— Virginiana, II. 312.
Orobus, II. 712.
Orontium majus, 264.
Orvietanum, II. 304.
Oryza, II. 313.
— sativa, II. 313.
Os Sepiae, 380.
— — praeparatum, 381.
— triquetrum, 364.
Osmazoma, II. 314.
Osmunda Lunaria, II. 87. 257.
— regalis, II. 257.
Ossa, 386.
— de Cordib. Cervi, 387.
— Sepiae, 380.
— usta praeparata, 387.
Osteocolla, 379.
— praepar., 381.
Ostrea edulis, 379.
Ostrearum testae s. conchae, 379.
Ostruthium, II. 1.
Ova gallinacea, II. 314.
Ovorum testae, 379.
— — praeparatae, 381.
Oxalas Ammoniaci, 190.
— Ammoniae, 190.
— — liquid., 190.
— Hydrargyri, II. 211.
— Mercurii, II. 211.
— Potassae, II. 425.
— — acidul., II. 425.
— — acidus, II. 425.
— — basicus, II. 425.
— — et Ferri, 700.
— — neutrum, II. 426.
— subpotassic., II. 425.
Oxalis, 15.
— Acetosella, 16.
— corniculata, 16.
Oxalium, II. 425.
Oxidum v. Oxydum.
Oxodes Ferri, 675.
— Hydrarg. nigr., II. 109.
— — rubrum, II. 149.
— Mangani nativ., II. 101.
— Plumbi nigrum, II. 352.
— Stibii album, 229.
— — sulphurat., 244.
— Zinci, II. 722.
— — album, II. 723.
— zincicum, II. 722.
Oxyacantha, 346. II. 215.
Oxyacetas Ammoniacae, 185.
— Mercurii, II. 211.
Oxycarbonas Plumbi, II. 351.
— Zinci impuri praep., II. 723.
Oxychloruretum Calcii, 377.
Oxycoccos s. Oxycoccus, II. 698.
— erythrocarpus, II. 698.
Oxycratum, 21.
Oxydulum Antimonii hydrosulphurat aurant, 244.
— Arsenici album, 287.
— Ferri, 675.
— — fuscum, 680.
— — nigrum, 675.
— Hydrarg. Hahnem., II. 109.
— — ammoniacale, II. 199.
— — nigrum, II. 145.
— — salinum, II. 199.
— Plumbi, II. 352.
— — semifusum, II. 352.
— Stanni, II. 623.
— Stibii, 227.
— — per Acid. muriat., 227.
— — fuscum, 234.
— — griseum, 227.
— — hydrosulphurat., 244.
— — — rubrum, 238.

Physeter macrocephalus, 153. 479
— microps v. P. macroceph.
— Orthodon v. P. macroceph.
— Tursio, 479.
Phytolacca, II. 338.
— decandra, II. 338.
Pichurim — Faba Pichurim.
Picrotoxa, 578.
Picrotoxinum, 578.
Pigmentum Indicum, II. 1.
— Urucu. II. 312.
Pila Caprae rupicaprae, 392 v. Aegagrop.
— marina, II. 338.
Pilae Damarum, 392.
— Rupicaprarum, 392.
Pills, Chamberlains restorative, II. 158.
—, common night, II. 259.
—, worm. II. 165.
Pilosella, 784.
Pilulae absorbentes, 668. II 475. 609.
— Acetatis Mercurii, II. 212.
— — Plumbi, II. 367.
— — — et Ipecac., II. 367.
— Aconiti mercuriales, II. 188.
— adstringentes, 145. 326 468. 672. 688. II. 46. 170 236. 367 469. 661. 672. 687. 729.
— — et tonicae, 688.
— aethiopicae, II. 144
— — compositae, II. 141.
— albae, 683 II. 175.
— Allii sativi, II. 439.
— de Aloë et foetidis, 110
— — et Cambogia, 112.
— aloëphanginae, 121.
— Aloës, 105. 107
— — et Agarici, 107.
— — amarae, 123.
— — et As. foet. s. c. As. foet., 107.
— — — — saponaceae, 108.
— — et Chinae. 123.
— — c. Colocynthide s et Colocynthidis, 108.
— — comp., 105. 108. 128.
— — crocatae, 121.
— — et G. Ammoniaci, 112.
— — et Kinaekinae, 123.
— — martiales, 110
— — c. Myrrha s. et Myrrhae, 121
— —, Myrrhae et Guajaci, 233.
— — saponaceae, 106.
— — et Stalagmit. cambogioid., 772.
— — et Substant. foetid., 110.
— — et Tart. stib., 107.
— — c. Zingibere, 106.
— aloëticae, 105. 106.
— — amarae, 123.
— — martiales, 109. 110.
— — c. Myrrha. 126.
— alterantes. 749 II. 164.
— — compositae, II 167.
— — Plummeri simpl., II. 166.
— — — compositae, II. 167.
— Aluminis, 147.
— amarae, 735. II. 475.
— amaro-catharticae, 121.
Pilulae contra amaurosin, 299
— Ambrae, 153.
— de Ammoniaco, 761.
— ex Ammon. c. Sulphure stibiato, 246
— Ammoniureti Cupri, 625.
— analepticae, 233
— — Jamesii, 233.
— Andersoni, 112.
— anethinae. 109.
— Angelicae, 126.
— anodynae, 246. 595. 791. II. 282. 287.
— — et sudorificae, 262.
— ante cibum, 123.
— anthelminticae, 127. 553. II 165. 168. 170. 173. 251. 521. 624.
— — purgantes, II. 165.
— antiarthrit., 175. 237. 246 263. 750 II. 146. 172.
— antiasthmat., 419.
— antibiliosae, 590
— — Dicksoni. 128.
— anticatarrhales, II. 741.
— antidiarrhoicae, II. 46.
— antidysentericae, 506. II. 290.
— antiemeticae, II. 238. 307.
— antiepilepticae, 278. II. 701.
— antifebriles, 515.
— antigalacticae, 394.
— antigonorrhoicae. 325. 395.
— antiherpeticae, 335. II. 143. 166. 168. 172. 188. 189.
— antihydropicae, 763. II. 177. 180.
— antihystericae, 297. 458. 791 II. 227.
— — Josephi del Papa, 458
— — opiatae, 297.
— antiictericae, 127. 314. II. 164.
— antilactosae, II. 617.
— antimoniales, 236. 262.
— — compositae, II. 169
— — Kleinii, 237.
Antimonii compositae, II. 168.
— antiphlogisticae, II. 367.
— antirheumaticae, II. 172
— antiscrophulosae, 335. II 141.
— antisepticae, 394.
— antispasmodicae, 278. 297. II. 227. 287. 701.
— — et tonicae, 395.
— antispasticae. 297.
— antisyphiliticae, II. 168. 171. 172. 189. 191
— — et antiherpeticae, II. 189.
— — Plenkii, II. 129.
— — et resolventes, II. 161.
— antivenereae, II. 139. 146. 151. 164. 178. 190 191 741.
— — Kaempfii, II. 68.
— — Lassonne, II. 193.
— — Swediaur, II. 210.
— aperientes, 109.
— — hydrargyratae, II. 177.
— — laxantes, 127.
— — Stahlii, 672.
— aperitivae. II 412.
— aromaticae, 106.
— Arseniatis Ferri, 292.
— arsenicales. 289.
— Arsenici. 289.
— — compositae, 289.
— ad arthritidem, II. 146.
— ex Asa foetida, 297.
— As. foet. compositae, 107. 108. 297.
Pilulae As. foet. helleboratae, 300 779.
— — — martiatae, 302.
— — — saponatae 297.
— — — scilliticae, 300.
— — — simplices, 297.
— asiaticae, 289.
— aureae, 178.
— Auri muriatici s. Muriatis, 317.
— ex Auro fulminanti, 319.
— Bacheri, 778.
— Baldingeri, II. 145.
— balsamicae, 2. 127. 299 II. 236 255. 601.
— — aperitivae, II. 661.
— — Junkeri, II. 672.
— — martiales. II. 136.
— — Mortonianae. 20.
— — opiaceae, II. 277.
— — c. Opio. II. 277.
— — terebinth, II 661.
— Belladonnae, 314.
— Bellostii, II. 139.
— benedictae s. bened. Fulleri, 110.
— benzoicae, 26.
— ad bilem, 590.
— bilis. 668.
— c. Bromureto Ferri. 355.
— in bronchit. lenta., II. 334.
— Brucini, 356.
— c. Butyro Cacao. 369.
— cachecticae, 672.
— caeruleae, 625. II. 130.
— Calcar. sulphurato-stib., 249
— Calomelanos, II. 174. 179.
— Calomellis compos., II. 167.
— — et Ipecacuanh., II. 173
— Cambogiae comp., 112. 772.
— camphoratae, 394.
— Cantharidis, 434.
— Cantharidum, 434.
— — c. Hydrargyro, 434.
— — mercuriales, 434.
— — opiaceae, 434.
— Carbonum kalinae II. 396.
— carminativae, 300. 608.
— Castorei comp, 458
— catarrhales, II. 175
— catharticae, 107. 122 128. 590. II. 173. 174.
— cathartico-diureticae, II. 175.
— cephalicae, II. 29.
— chalybeatae, 672. 676. 682.
— e Chelidonio, 495.
— Chinae, 506.
— — aluminatae, 147.
— — camphoratae, 515.
— — comp., 515.
— Chlorureti Auri, 317.
— ante cibum, 113. 123.
— Cicutae, 517.
— cocciae minores, 108.
— Cocchii, 108.
— coccinae, 108.
— cochiae, 108. 109.
— — Rhasis, 108.
— coeruleae v. Pil. caeruleae.
— Colocynthidis, 128.
— — comp., 108 590.
— — Extr. comp., 591.
— e Colocynthide simplices, 128
— communes, 121.
— comp. Edimburg., 126.
— Conii, 517.
— — cinnabarinae, II. 153.

Pilulae e Conio, 547.
— cupratae, 625
— Cupri ammoniac., 625.
— — ammoniacalis, 619.
— e Cupro ammoniaco, 625.
— Cyanureti Mercurii, II. 196.
— de Cynoglosso, II. 288.
— — c. Castoreo, II. 288.
— demulcentes, 768.
— deprimentes, II. 222.
— depurantes, II. 167. 177.
— desobstruentes, 111. 677. 761. II. 562.
— Deutochlorureti Mercurii, II. 188.
— Deutoiodureti Mercurii, II. 194.
— Diabulor. trium, II. 171.
— Diambrae sine odoratis, 106.
— diaphoreticae, 106. II. 145. 167.
— — stibiatae, 233.
— diaphoretico - sedativae, 224.
— ad diarrhoeam, II. 46.
— de Digitale, 647.
— Digital. purpureae, 647.
— diureticae, II. 179. 562. 563. 661.
— — roborantes, II. 672.
— resolventes, II 562.
— roborantes, II 637.
— Dulcamarae, 654.
— de duobus, 128.
— eccoproticae, 110.
— ecphracticae, 121. 128. II. 475. 475.
— Elaterii comp., II. 220.
— ex Elaterio, II. 220.
— Emanuelis, 125.
— emeticae. 621. II. 733.
— emmenagogae, 121. 123. 671. 677. 682. 763. II. 39. 170. 227.
— — et deprimentes, II. 224.
— — irritantes, 689.
— excitantes, 278. 297. 595. II. 251. 453.
— — antispasmodicae, II. 227.
— expectorantes, II. 14. 169. 563. 729.
— Extr. catholici, II. 557.
— — Opii. II. 272.
— febrifugae, 515.
— — Anglicae, 506.
— Fellis Tauri amarae, 668.
— Ferri ammoniati, 696.
— — comp., 682.
— — c. Myrrha, 682.
— — Sulphat., 686. 689.
— — sulphurici, 686
— — — comp., 689.
— e Ferro laxantes, 677.
— ferulaceae c. Ammon., 297.
— — cum Arnica et Tart. stib., 299
— — camphoratae, 300.
— foetidae, 297. 358.
— — majores, 588.
— Fothergillii, 128
— fundantes, 182. 683. II. 164.
— Galbani comp., 358.
— e Galb. martiatae, 671.
— Gambog. comp., 112.
— e Gentiana crocatae, 123.
— Gentianini, II. 740.
— contra gonorrhoeam, II. 141. 170.
— de Graphite, 674.
— graphiticae, 674.
— Griffithii, 682.
— Guajaci, 756.
Pilulae Guajaci c. Hydrarg., Stib. et Extr. narcot., 237.
— — c. Stibio, 248.
— guajacinae. 756.
— — comp, 750.
— e Gummi, 358.
— G. Ammoniaci balsamicae, 761.
— de Gummatibus, 358.
— G. Ammoniaci, 761.
— — Guttae aloët., 112.
— gummi-resinosae, II. 236.
— gummosae, 297. 358.
— — laxativae, 106 359.
— de Gutta Gamandra, II. 173.
— Hahnemanni, II. 201.
— Hellebori, 778.
— — aloët., 779.
— — balsam., 779.
— — nigri comp., 778.
— ex Helleb. et Myrrha, 778
— de Hiera, 107.
— Hierae c. Agarico, 107.
— Hooperi, 110.
— Humuli Lupuli, II. 88
— hydragogae, 613. 648. II. 169. 175. 220. 435. 562.
— — Bontii, 112.
— — Janini, II. 169.
— Hydrargyri. II. 130. 141.
— — c. Antimon. Tartrate, II. 738
— — Edinburgenses, II. 130.
— — glycyrrhizatae, II. 130.
— — gummosae, . 129.
— — Jalappinae, II. 174.
— — Muriatis camph. s. et Camph., II. 171.
— — — et Oxydi Stib. hydrosulph., II. 144.
— — Oxydi cinerei, II. 146.
— — — rubri, II. 151.
— — oxydati. II. 188.
— — oxydul. nigri, II. 201.
— — Oxymuriatis, II. 210.
— — et Rhei, II. 139.
— — Submuriatis, II 177.
— — — comp., II. 167.
— — — c. Opio, II. 177.
— ex Hydrarg. cathart., II. 174.
— — — diuret., II. 201.
— — — glycyrrhizato, II. 131.
— — — mur. miti, II. 161.
— — — c. Sulph. stib. aurant., II. 166.
— — — nitrico, II. 203.
— — oxydul. nigro, II. 201.
— Hydriodatis Potassae, II. 10.
— Hydrochlorat. Manganesii, II. 101
— hydropicae Bontii, 112.
— hypnoticae, II. 277.
— hystericae, 358.
— incisivae, 99. 677. II 563.
— incitantes, 595. II. 458.
— iodatae, II. 8.
— Iodii, II. 8.
— Iodinae, II. 8
— Iodureti Mercurii, II. 194.
— irritantes, II. 251.
— Jalapae, II. 30.
— — comp., II. 175.
— ex Jalap. Resina, II. 174.
— Jamesii. 233.
— Kali sulph. aloët., 112.
— kermesinae, 243.
Pilulae Keyseri, II. 212.
— e Kino comp, II 46.
— — et Camph., II. 46.
— lac pellentes, 393. II. 171. 617.
— laxantes, 26. 30. 174. 617.
— — c. Mercurio, II 175.
— — et resolventes, II. 175.
— laxativae, II. 30.
— lenientes, 708. II. 222. 253. 262. 287. 724.
— — Mesues, II. 288.
— de Leslie, II. 177.
— lithontripticae, II. 609.
— Lucis majores, 109
— lunares, 278.
— Lupulinae, 289.
— Lyttae (opiaceae), 234.
— Machiavellii, 121.
— majores Hoffmanni, II. 187.
— majornae, 127.
— Manganes. muriat., II. 101.
— martiales, 671. 676. 682. 688. 707.
— martiatae c. Galb et Myrrha, 689.
— e Mastiche s. mastichinae, 113.
— Matthaei, 777.
— Meglini, 791.
— Mellis hydrargyrati, II. 130.
— menagogae, 688.
— — cathartieae, 128.
— ad menstrua, 110. 123.
— mercuriales, II. 130. 132. 134. 139. 141. 171. 172. 174. 175. 187. 193. 201.
— — ammoniacales, II. 210.
— — Barbarossae, II. 739.
— — camphoratae, II. 172.
— — compositae, II. 193.
— — diureticae, II. 201.
— — gummosae. II. 129.
— — Moscati, II. 146.
— — Noltii, II. 211.
— — Plenkii II. 129.
— — — comp., II. 129.
— — c. Opio. II. 149.
— — purgativae, II. 140.
— — saponaceae, II. 174.
— — de Sedillot, II. 134.
— Merc. glycyrrhiz., II. 131.
— — melliti, II 130.
— — terebinth., II. 131.
— ex Merc. dulci, II. 161.
— — — — et Camph., II. 175.
— — — — et Guaj., II. 172.
— — — — et Jalap comp., 175.
— — — saponaceae, II. 174.
— — — — comp., II. 175.
— — — simplices, II. 174
— — — et Opio. II. 177.
— — — — comp., II. 169.
— — glycyrrhiz., II. 131.
— — mellato, II. 130.
— — solub. Hahnem., II. 201.
— — sulphurato stib., II. 144.
— — terebinth., II. 131.
— ad morbos cutaneos, 243.
— — — deploratos, 233.
— Mortoni, 26.
— moscoviticae, 596.

Pilulae moschatae s. Moschi, II 227.
— Moseley, II. 475.
— Muriatis Hydrarg oxydati, II. 188.
— — — oxydul. stib., II. 169. cf. Pil. Hydr. Mur.
— — — — et Camph., II. 171.
— Muriatis Mercurii oxygenati, II. 210.
— Myrrhae c. Arnica, II. 236.
— — amarae c. Ammoniaco, II. 236.
— — comp., 297. 682.
— — et Ferri, 682.
— — et Hyoscyami, II. 136.
— c. Myrrha et Guaj., 233.
— narcoticae, 314 547. II. 262. 282.
— nauseam cientes, II. 14.
— Neapolitanae, II 139. 140.
— Nicotianae, II. 246
— Nitratis Argenti fusi, 270. II. 737
— Olei Crotonis, 613.
— c. Oleo pyro-carbonico, II. 744.
— opiatae, II. 282.
— Opii, II 282 286.
— — antimoniatae. II. 287.
— — camphoratae, II. 287.
— — comp., II. 287. 288.
— — Extracti, II. 288.
— — et Ipecacuanhae, II. 285.
— — saponaceae, II. 286.
— ex Opio, II. 282.
— opticae, 109.
— orientales. II. 287.
— Oxydi Antim. et Sulphureti Merc.. II. 141.
— — Auri, 318.
— Oxynitrat Hydr. et Ammon.. II. 201.
— pectorales, 246. 610. 761. II. 562.
— — opiaceae, II. 277.
— — tonicae, 682.
— perpetuae. 227.
— — Peters, 112.
— physagogae, II. 562.
— piceae. II. 348.
— Picis, II. 348.
— Plummeri, II. 166.
— — comp., II. 167.
— — simpl., II. 166.
— polychrestae, II. 151.
— — balsamicae, 121.
— — Starkeyi, 777.
— e Praecip. rubro, II. 151.
— Pringelii, II. 177.
— prophylact. ad variolas, II. 166.
— Protochlorureti Merc., II. 164.
— — — c. Sulph. Antim. aur., II. 166.
— Protoiodureti Mercurii, II. 195
— purgantes, s. purgativ., 106. 127. 591. 613. 772. 778. II. 26. 29. 30. 139. 164. 174. 177. 557.
— — dictae Pievani, 128.
— — c. Hydr. mur. miti, II. 174.
— — c. Calomelle, II. 174.
— — c. Mercurio, II. 175.
— — simplices, 128.
— purificantes, 246.
— ad putredinem nosocom., II. 227.
— Pyrethri, II. 458.
— Radicis Cynoglossi opiatae, II. 288.
Pilulae relaxantes, 106.
— e Resina Jalapae, II. 174.
— resolventes, 111. 182. 262. 318. 547. 648. 671. 677. 683. 711. 761. II. 143 146. 164. 168. 169. 170. 172. 385. 439. 475. 557. 651. 661.
— — diuret. et deprimentes, 648.
— — Finkii, II. 167.
— — c. Mercurio, II. 167.
— — et purgantes, 235.
— — c. Rheo, II. 475.
— — in scrophulis, 335.
— — Stahlii. 109.
— restaurantes, II. 158.
— rhabarbarinae antacidae, II. 475.
— de Rhabarbaro, II. 475.
— — — compos., 126.
— Rhei, II. 475.
— — comp., 126
— — palmati, II 475.
— e Rheo c. Natro acet, II. 475. 617.
— Rhois toxicodend., II. 488.
— Richteri. 262
— roborantes, 621. II. 237.
— — ad blennorrhoeam, II. 475.
— rubrae Boerhavii. II. 158.
— Rudii, 109.
— Rufi, 121.
— Salicinae, II. 740.
— sanitatis Frankii, 113.
— di Santa Fosca, 128.
— saponaceae, 376. II. 439.
— Saponis, II. 439.
— — aloët., 106.
— — comp., II. 174. 286.
— — c. Opio, II. 286.
— Scammon. hydrargyrosae, II. 193
— e Scammon. comp, II. 193
— — mercuriales, II. 193.
— Schmuckeri, 262.
— Scillae, II. 561.
— — ammoniacales, II. 561.
— — c. Zingibere, II. 561.
— scillinae et Mur. Hydr. oxydul., II. 179.
— scilliticae s. scillinae, II. 561.
— — compositae, II. 562.
— scoticae, 112.
— contra scrophulas, II. 141.
— sedantes et bechicae, II. 262.
— sedativae s. sedantes, 289. 648. 791. II. 277. 724.
— Sedilloti, II. 135.
— sialagogae, II. 177. 188.
— Sodae Subcarbonatis, II. 609.
— solares Wildegansii, 319.
— solventes del Porati, II. 439.
— specificae, II. 210.
— Speedimans, 126
— spleneticae, 111. 128.
— ad sput. sanguin. Deckers, II. 289.
— Stahlii, 109. 233.
— sthenicae, II. 168.
— stibiatae, 236. 262.
— — c. Opio et Laxant. resinos, 237 248.
— e Stibio et Hydrarg., II. 166.
— stimulantes, 435. II. 237. 250. 345. 475. 561.
Pilulae stimulantes ad gonorrhoeam, II. 46. 672.
— stomachicae, 123. 126. 515. 672. II. 236.
— — Mesues, 113.
— — Tronchini, II. 236.
— e Storace, II. 284.
— Strychnini, II. 627.
— stypticae. I. 367
— de Styrace sine Ambra. II. 284.
— e Styrace, II. 284.
— Subcarb. Cupri et Ammon., 619.
— — Sodae, II. 609.
— ex Sublim. corros., II. 187.
— de Sublim. et Opio, II. 190.
— Suboxydi Hydrarg., II. 739.
— Subsulphatis ammonicocuprici, 625.
— Cupri et Amm., 625.
— Succini Cratonis, 113.
— de Succino, 113.
— — auctae, 113.
— sudorificae, 750.
— — lenientes, 243.
— — sedativae, 243.
— Suecicae, II. 169.
— Sulphat. ammonicocuprici, 625.
— — Ferri, 686.
— — — comp., 688. 689.
— — Potass. aloët., 112.
— — Quininae, II. 739
— sulphurato stibiat. c. Arnica et Camph. 246.
— — — c. Cicuta. 246.
— Sulphureti Antim. et Calcis, 249
— — Potassae, II. 396.
— syphiliticae, II 151.
— syst. nervos. et musc. vellicantes, 278. II. 250.
— Tabaci, II. 246.
— Taddei, II. 190.
— contra taeniam, 335. II. 141. 661.
— tartareae Bontii, 112.
— — Schroederi, 110.
— e Tart. borax., II. 435.
— temperantes, 648.
— e Terebinthina, II. 661. 671. 672.
— Terebinthinae, II. 661.
— thebaicae, II. 282.
— Thomsoni, 688.
— contra tineam, 335
— tonicae, 235. 351. 539. 596. 621. 671. 682. 689. 696. 735. II. 457.
— — et anodynae, 506.
— — et antispasmodicae, 233.
— — Bacheri, 778.
— — et hypnoticae, II. 287.
— — et lenientes, 506.
— — nervinae, 688.
— — et purgantes, II. 579.
— torpentes et resolv., II. 53.
— Toxicodendri, II. 488.
— traumaticae, II. 661.
— de tribus, 127.
— ad tussim Schroed., II. 288.
— Unguenti mercur., II. 134.
— Valerianae, II. 701.
— — ferulaceae, 297.
— ad variolas, II. 166.
— venereae, 625.
— Veratrini, II. 709.
— de Vigarous, II. 164.
— Vogleri, II. 188
— Werlhofii, II 178

Pilulae Zelleri, II. 203.
— Zinci, II. 729.
Pimenta, II. 342.
Pimento, II. 342.
Pimpinella, II. 339.
— alba, II. 338.
— Anisum, 220.
— dissecta — P. Saxifraga.
— hircina, II. 338.
— hortensis, II. 339.
— Italica, II. 339.
— magna, II. 338.
— minor, II. 339.
— nigra, II. 339.
— nostras, II. 338.
— rubra, II. 339.
— Saxifraga, II. 338.
— umbellifera, II. 338.
Pinckneyia pubescens, 500.
Pineolus, II. 340.
Pinguedo Ursi, 69.
— Viperae, 69.
Pinus Abies, II. 671. — Abies.
— balsamea, 1.
— Canadensis, 1.
— Cembra, 321. II. 652.
— Larix — Larix Europ.
— maritima, II. 347. 652.
— Mughus, 321. II. 662.
— palustris, 657. II. 347. 652.
— Picea, II. 652.
— Pinaster — P. sylv. var.
— Pinea, II. 340.
— Pumilio, 321.
— sylvestris, II. 340. 347. 652. 671.
Piper, II. 341.
— album, II. 341.
— Amalago, angustifolium, II. 342.
— Betel, 347.
— Carpapiga, caryophyllatum, II. 342.
— caudatum, 613.
— crystallinum, II. 342.
— Cubeba, 613.
— Hispanicum, II. 342.
— Indicum, II. 342.
— Jamaicense, II. 342.
— longum, II. 342.
— nigrum, II. 341.
— — tritum reductum, II. 344.
— odoratum, II. 342.
— peltatum, reticulatum, II. 342.
— rotundum — P. nigrum.
— Siriboa, II. 342.
— Tabasci, II. 342.
— Turcicum, II. 342.
— umbellatum, II. 342.
Pipera, II. 342.
Piperinum, II. 342. 346.
Piperitidis Herba, II. 65.
Pisa pro fonticulis, 434. II. 158. 655.
Pissa, II. 347.
Pissasphaltus — Petrol., Asphalt.
Pisseleon Indicum, II. 333.
Pistacia, II. 347.
— Atlantica — P. Lentiscus.
— Lentiscus, II. 107.
— Terebinthus, II. 652.
— vera, II. 347.
Pistolochia, 279.
Pix abietina, alba, II. 671.
— arida, atra, II. 671.
— Burgundica, II. 671.
— Cedria, II. 347.
— Graeca, II. 671.
— liquida, II. 347.
— — nigra, II. 347. 671.
— navalis, II. 671.
— nigra, sicca solida, II. 671.
— vegetabilis, II. 671.
Placenta Lini, II. 78.
Plantago albicans, II. 349.
— angustifolia, II. 349.
— aquatica, II. 349.
— arenaria, II. 348.
— coronopus, II. 349.
— Cynops, II. 348.
— lanceolata, II. 349.
— latifolia, II. 349.
— major, II. 349.
— media, II. 349.
— Psyllium, II. 348.
— quinquenervia min., II. 349.
Platina, II. 350.
Platinum, II. 350.
Plumbago, 673.
— Europaea, 644.
Plumbi Acetas, II. 366.
— Carbonas, II. 351.
— Subcarbonas, II. 354.
— Superacetas, II. 395.
Plumbum, II. 351.
— acetatum, II. 365.
— aceticum, II. 365.
— — crudum, II. 365.
— — depuratum, II. 366.
— carbonicum, II. 354.
— hydrocyanicum, II. 351.
— nigrum, 673.
— oxydatum — Plumbum.
— — rubrum, II. 352.
— phosphoricum, II. 351.
— spathicum, II. 354.
— ustum, II. 351. 352.
Pocgereba, II. 384.
Podalyria tinctoria — Sophora.
Podophyllum peltatum (pedatum), II. 384.
Polanisia dodecandra, II. 384.
Polium Creticum, II. 680.
— montanum, II. 680.
Pollen Juttorum, 606.
Polyanthes tuberosa (Essence), II. 31.
Polychroites, 607.
Polygala, II. 384.
— amara, II. 381.
— amarella — P. amara.
— Americana, II. 385.
— Senega s. Seneka, II. 385.
— Virginiana, II. 385.
— vulgaris, II. 385.
Polygalinum, II. 385.
Polygonatum angulosum, 731.
— latifolium, 731.
— majus, 731.
— vulgare, 731.
Polygonum, 476.
— aviculare, 476.
— Bistorta, 351.
— Fagopyrum, 666.
— Hydropiper, II. 332.
— Persicaria, II. 332.
Polypodium, II. 387.
— Filix mas, 311.
— vulgare, II. 387.
Polyporus fomentarius, 85.
— igniarius, 85.
— officinalis, 85.
Polytrichum aureum, II. 388.
— commune, II. 388.
— vulgare, II. 388.
Poma s. P. acidula, II. 388.
— Acajou, 457.
— Aurantia, 457.
— Borstorfiana, II. 388.
— Citrea s. Citri, 569.
— Colocynthidis — Colocynth.
— Elaterii, II. 219.
— Renetta, II. 388.
— terrestria, II. 618.
Pomata ophthalmica, II. 163.
Pomatum Acetitis Plumbi, II. 368.
— adstringens, II. 718.
— albissimum, 480.
Pomatum alcalinum, II. 609.
— aluminosum, 148.
— ammoniac. saponac., 164.
— anodynum opiatum, II. 281.
— antihaemorrhoidale, II. 281. 378. 726.
— antiherpeticum, 213. II. 154. 163. 204. 209. 373. 368. 641.
— — anglicum, II. 163.
— — Chevalierii, 378. II. 198.
— — Guillerieri, II. 198.
— — Goulardi, II. 373.
— antipsoricum, 458. II. 151. 152. 396. 404. 639.
— — Jasseri, II. 640.
— antispasmodicum, 459.
— antivenereum, 316. II. 177. 186.
— Arsenici s. arsenicale, 289.
— Autenriethii, 259.
— Belladonnae, 314.
— Bellii, II. 151.
— camphoratum, 481.
— Cantharidum, 429.
— Carbonis, 438.
— Cinnabaris, II. 150.
— Cirilli s. Cyrilli, II. 188.
— — opiatum, II. 187.
— Cyanureti Mercurii, II. 186.
— cosmeticum, 480.
— Comitissae, II. 733.
— Dessaulti, II. 154.
— Deutochlorur. Merc., II. 186.
— Duboisi, II. 304.
— epispast., 428. 433.
— — ammoniacale, 164.
— — camphorat., 424.
— escharoticum, 289.
— Fabri, 260.
— Gondreti, 151.
— Goulardi, II. 365. 367.
— Grandjean, 432.
— ad haemorrhoides, II. 280. 281.
— Helmundi, 288.
— Jadelotii, II. 210. 396.
— c. Hydriodate Potassae, II. 10.
— — — iodurato, II. 11.
— Janini, II. 210.
— Jenneri, 259.
— contra intertriginem, II. 726.
— Iodii, II. 195.
— c. Iodio, II. 8.
— c. Iodureto Arsenici, II. 12.
— — Barii, II. 11.
— ad labia rubrum, 268.
— laurinum, II. 55.
— leniens, 70. 402. II. 280. 283.
— — et balsamicum, II. 650.
— Lugdunense, II. 151.
— contra lumbaginem, 175.
— Lupulini, II. 89.
— Mareschalli, 349.
— mercuriale opiaceum, II. 139.
— — aptyalizomenon, II. 186.
— — oxygenatum, II. 134.
— — corrosivum, II. 186.
— — Sanchetii, II. 134.
— — saponaceum, II. 139.
— e Mercurio praecipitato, II. 209.
— Muriat Hydrarg. oxygen., II. 186.
— Auri et Sodae, 318.
— Naphae Florum, 501.
— nitricum, 51.
— — oxygenatum, 51.
— — Dupuytren, II. 154.
— ophthalmic. Janini, II. 210.

Pomatum ophthalmic. Pelletani, II. 151.
— opiaceum, II. 261. 282.
— opiatum, II. 282.
— Oxydi Zinci, II. 725.
— — — camphorat. II. 726
— c. Oxydo Hydrarg. rubro. II. 154
— oxygenatum. 51.
— de Papavere, Hyosc. et Bellad., 795
— phosphoratum, II. 337.
— de Praecipit. rubro, II 151.
— contra pruriginem, II. 609.
— purgans, 588. II. 176.
— Resinae virid. Mezerei, 630.
— resolvens, 711. II. 163. 180. 368 444.
— saponaceo - hydrosulphuratum, II. 396.
— saponaceum, II. 410.
— Saturni, II. 363. 367.
— saturnino - mercuriale, II. 204.
— saturninum, II. 167. 368.
— ad scabiem, II. 396.
— sedans, II. 575.
— sedativum, II. 280.
— Semin. frigidor., 480.
— stibiatum, 259.
— Stramonii, 632.
— contra strumam, II. 314.
— Sulphuris s. sulphuratum simpl., II. 639.
— — compositum, II. 640.
— sulphuro-saponaceum, II. 639.
— — alcalinum, II. 396.
— à la Sultane, 481.
— ad tineam, 438. 711. II. 205. 210. 397. 641.
— Veratrini, II. 709.
— vesicatorium, 428.
— virginale, II. 733.
Pommade divine II 312. 726.
— fondante, II. 163.
Pompholix, II. 685. 722. 723
Pomum Citri, 569.
— Colocynthidis, 587.
— Hierosolymitanum, II. 219.
Populus, II. 389.
— balsamifera, II. 388. 642.
— nigra, II. 389.
— tremula, II. 389
— tremuloides, II. 389.
Porcinus Lapis — L. porc.
Portable soup glace, 728.
Portlandia hexandra — China flava.
Portulaca, II. 389
— oleracea, II. 389.
— pilosa, II. 389
Posca Galeni, II. 713.
Potassa, II. 391 398.
— per Alcoholem, II. 392.
— cum Calce, II. 391. 392.
— Calcis ope par. et fusa, II 391.
— caustica, II. 390. 391. 392.
— — c Calce, II. 391.
— — fusa, II. 391
— ferruginosa liquida, 681.
— fusa II. 391.
— impura, II. 398.
— liquida, II. 390.
— praeparata, II. 398.
— pura, II. 390. 391.
— — liquida, II. 390.
— — fusa, II. 391.
— purificata. II. 398.
— sulphurica, II. 406.
— venalis, II. 398.
— vitriolata, II. 406.
Potassae Acetas, II, 420.
Potassae Carbonas, II. 399. 405.
— Euchloras, II. 419.
— et Sodae Tartras, II. 435.
— Subcarbonas, II. 398 399
— Sulphas, II. 406 409.
— — c Sulphure, II. 406.
— Sulphuretum, II 395.
— Supercarbonas, II 398.
— Supersulphas, II. 409.
— Supertartras, II. 429.
— — impura, II. 429
— Tartras, II. 427.
Potassidum Myrrhae, II. 237.
Potassium, II. 390.
Potentilla, II. 446.
— Anserina, II. 446.
— argentea, II. 446.
— reptans, II. 446.
— Tormentilla — T. erecta
Poterium Sanguisorba, II. 339.
Potestates Succini, 170.
Potio absorbens, 158. II 267. 302. 609
— c. Acetate Potassae, II. 422.
— acetosa et oleosa, 23
— acida, 54.
— acidula, 21.
— acidulata, 63.
— adstringens, 61 142. 190. 323. 351. 473. 516. 525. 598. 686. 717. II. 46. 73. 208. 469. 600. 602
— — et tonica, 522.
— aetherea, 83
— — camphorata, 398.
— alba. 323.
— alcalina, II. 405.
— — gasosa, 29
— alcohol camphorata, 399.
— alexipharmaca, 192
— alterans. 257.
— aluminosa, 150.
— amara, 700.
— — antifebrilis, 73.
— ammoniacalis, 177.
— — Peyrilhe, 175.
— ammoniata, 175.
— Angelica, II. 591.
— ad anginam malignam, 261.
— Anglica, II. 103.
— anodyna, 302. II. 130. 328.
— antemetica, II. 15.
— anthelmintica, 553. II. 492. 660.
— — aloëtica. 105.
— — parum laxans, 553
— — oleoso-aromat, II. 492.
— antiacida, II. 91.
— antiarthritica, 750. 756.
— antiasthmatica, 158 189. II. 302.
— anticatarrhalis. 225. II. 463 571.
— antichlorotica, 61.
— anticolica. II. 103.
— anticynangica, 261.
— antidiarrhoeica, 190.
— antidysenterica, II. 264.
— antiemetica. 29.
— — et adstringens, 471.
— antiepileptica, 715. II. 701.
— antifebrilis, 35. Mixt Acid. mur.
— antigonorrhoica, 323. 614.
— antihaemorrhagica, 59. 517. II. 263.
— antiherpetica, II. 397.
— antihydrophobica, 189.
— antihydropica, II. 103.
— antihysterica, 192. 464.
— antiicterica. II. 423.
— antilactosa, II. 403.
— antilyssica, 189 II. 116.
— antimoniata, 256.
— antinarcotica, 585.
— antinephretica, 770. II. 417.
Potio antiperiodica, II. 263.
— antiphlogistica, II. 414.
— — laxans, 263.
— antipleuretica, 233.
— antirhachitica, II. 514.
— antiscorbutica, 510. II. 403.
— antiscrophulosa, 177. 521. II. 610.
— antiseptica, 31. 189. 511. 523.
— — camphorata, 517.
— antisoporosa. 257.
— antispasmodica, 51. 75. 158. 192. 234. 464 491. 497. II. 15. 124. 228. 230. 253. 303 402. 703.
— — et diuretica 85.
— — et resolvens, 85.
— — et tonica. 517.
— antistrumalis s. antistrumosa, II. 402.
— antisyphilitica, II 183.
— antitetanica, 170.
— antivomitiva, 29. II. 15.
— aperiens s. aperitiva, II. 413. 423.
— contra aphoniam, 96.
— aromatica, 611.
— contra asthma, 158.
— asthmatica, 189.
— ad atram bilem, II. 428.
— balsamica, 323.
— bechica, 188
— cum Brucino, 356.
— camphorata, 397.
— Capivi, 323.
— Carbonat. Calcis, 385.
— cardiaca, 177. 600. 611.
— carminativa, 158. II. 124. 263.
— ad catarrhum, II. 463. 571.
— catarrhica. II. 65. 616.
— cathartico - diaphoretica, 263.
— Chinae composita. 518.
— c. Chinae Decocto, 521.
— — Pulvere, 510.
— chlorica, 542.
— Choparti, 324.
— confortans, 524. 612.
— — acidulata, 612.
— Copahu s. Copaiv. comp., 323.
— cordialis, 611. II. 303.
— — diuretica, II. 5.
— c. Creta 385
— cretacea, 385
— demulcens, 770. II. 525.
— deprimens, II. 264.
— c. Deutochlorur. Mercurii, II. 183.
— diaphoretica, 188. 193. 233 261.
— — et bechica, 233.
— contra diarrhoeam, 190.
— digestiva, II. 609.
— diuretica, 51. 80. 188. 329. 420. 483. 574. 586 649 651. II. 248. 403. 413. 414 422. 423. 424. 432. 434. 565. 568. 571. 666.
— — et leniens, II. 425
— — Milmanni, II. 425
— drastica, 86.
— contra ebrietatem, 158.
— effervescens, 29.
— emetica, 243. 256. 261. 30 II. 15. 16.
— — cordialis, 258
— emeto-cathartica, 263.
— — laxans, 263.
— emetisata, 256.
— emmenagoga, 396. 426. 694. II. 41. 42. 519
— emulsiva, 196
— Enulae compos., II. 5.

Potio excitans, 189. 371. 526. 542. II. 217. 255. 317. 387. 487. 703.
— — et antispasmodica, II. 701.
— — martialis, 700.
— — nervina, 284.
— — et resolvens, II. 479.
— expectorans, 51. 189. 246. 257. 303. 548. 570. 649. 651. 724. 758. II. 403. 570. 610. 633.
— — et incisiva, II. 17.
— febrifuga, 291. 292. 516. 538. 585. II. 17. 280. 413. 611.
— — amara, 511.
— — et laxativa, 516.
— ferruginosa, 687. 694.
— ex foetidis, 464.
— frigida martialis, 707.
— fundans, 260.
— ex G. Ammon. et Scilla, 758.
— gummosa s. gummata, 770. II. 689.
— — scillitica, II. 572.
— gummoso-opiacea, II. 328.
— haemastatica, 150. 689.
— Helminthochorti, 783.
— ad herpetem, II. 397.
— Hulmii s. Hulmiana, 30.
— hydragoga, 262. 495. 649. II. 41. 432. 694.
— c. Hydrobromate Potassii, 355.
— hypnotica, II. 263. 269. 328.
— incisiva, II. 404. 572.
— incitans, 526.
— iodurata, II. 741.
— ex Ipecacuanha comp., II. 17.
— juniperina, II. 41.
— c. Kermete s. kermetica, 243.
— laxans, II. 95. 428. 491. 593. 614. 644. 645.
— — oleosa, II. 587.
— laxativa, II. 103. 409. 591.
— — et leniens, II. 479.
— — oleosa, II. 587.
— — et resolvens, II. 479.
— — et sedans, II. 479.
— — Viennensis, II. 591.
— leniens, 27. 201. 482. 651. 768. II. 77. 224. 242. 263. 264. 267. 280. 326. 328. 415.
— — Andry, II. 130.
— lithontriptica, 35. II. 94. 402. 406. 610.
— c. Manna et Rheo, II. 483.
— Mannae emulsiva, II. 103.
— — s. Mannae tamarindata, II. 103.
— — composita, II. 483.
— Martis aurata, 691.
— — salita, 691.
— mercurialis, II. 127. 203.
— — Plenkii, II. 128.
— Mercurii vivi, II. 127.
— muriatica mitior, II. 743.
— narcotica, II. 222. 279.
— nervina, 464.
— Niemanni, 30.
— nitrata s. nitrosa, II. 413.
— nutriens et sedans, II. 53. 69.
— Olei Ricini, II. 491.
— ocytica, II. 575.
— c. Oleo Lathyrid., II. 741.
— oleosa, 201. II. 254. 689.
— — drastica, 613.
— — leniens, 202.
— opiacea, II. 269.
— oxygenata, II. 420.
— oxymellata, 23.
— paregorica, II. 263.
Potio partum accelerans, II. 575.
— pectoralis, 38. 39. 235. 261. 329. 656. 758. 768. II. 106. 263. 387. 545.
— — amara, 518. II. 385.
— pellens, II. 403.
— Peruviana, 329.
— phosphorata, II. 336.
— picea, II. 347.
— cum Polygala, II. 385. 387.
— purgans s. purgativa, 243. 263. 456. 613. II. 27. 33. 94. 103. 428. 433. 472. 476. 483. 491. 559. 591. 593. 615. 645.
— — Anglica, II. 31.
— — camphorata, II. 596.
— — comm. decoct. vel infus. parat., 595.
— — pro infantibus, II. 428.
— — et febrifuga, II. 403. 596.
— — major, II. 27.
— — cum Oleo Ricini, II. 491.
— — et tonica, II. 483.
— — et vermifuga, II. 476. 595.
— ad rabiem, II. 116.
— refrigerans, II. 415.
— repellens, II. 403.
— resolvens, 260. II. 11. 409.
— — ex Iodio, II. 9.
— — et laxans, II. 479.
— — Mutzelii, II. 428.
— Riverii, 29. II. 423.
— roborans, 521.
— — acidulata, 612.
— salina, 29. II. 96.
— — mannata, II. 103.
— — purgans, 263. II. 436.
— saponacea, II. 402. 440.
— scillitica, II. 571.
— — acidula s. acidulata, II. 571.
— sedans, II. 267.
— — et diuretica, II. 415.
— sedativa s. sedans, 791. II. 53. 267. 269. 425.
— sistens, 611.
— solutiva c. Cassia, 457.
— stibiata, 256.
— stibio-opiacea, 261.
— stimulans, 176. 356. II. 10. 124. 627. 660.
— — cum Aqua Menthae, II. 124.
— — et tonica, 517.
— stomachica, 107. 351. 595. II. 124. 457.
— — visceralis, 8.
— ad strumam, II. 402.
— cum Strychnina s. Strychnino, II. 627. 741.
— sudorifica, 182. 190.
— Sulphatis Quininae, II. 740.
— sulphurata, II. 638.
— sulphurosa, II. 397.
— contra taeniam, 324. II. 666.
— tartarica comp., II. 433.
— c. Tartaro-boracica, II. 434.
— temperans, 315. 464. 547. 771. II. 158. 414. 423.
— terebinthinata, II. 653.
— tetanica, 170.
— tonica, 190. 220. 301. 416. 515. 517. 521. 522. 523. 524. 526. 595. 601. 611. 687. 739. II. 303. 479.
— — et antispasmodica, 516. 611.
— — adstring., II. 263.
— — camphorata, 517.
— — martialis, 700.
— tonico-anodyna, 595.
Potio ad tormina infantum, 488.
— ad tussim convulsivam, II. 370.
— vermifuga, 161. 497. 534. 773. 783. II. 667. 681.
— Viennensis, II. 591.
— vinosa, 411. II. 713.
— vomitiva, 256. II. 15. 16.
— — stibiata, 256.
Potus c. Acido tartarico, 61.
— acidus, 23. 58. II. 490.
— — mineralis, 59.
— — vegetabilis, II. 432.
— Aetheris sulph. alcoholis, 83.
— aluminosus, 148.
— analepticus, 95.
— antichlorot., 61.
— antifebril. acidulus, 60.
— antiphlogist. diaphor. et leviter laxans, 257.
— — diureticus, II. 417. 418.
— — leviter laxans, 257.
— ad blennorrhoeam, 323.
— carminativus, II. 45.
— Cerasorum, 478.
— Citri stibiatus, 257.
— comm. incitans, 94.
— diureticus, II. 44.
— — simplex, II. 423.
— hydrocyanicus, 39.
— imperialis, II. 433.
— mercurial. Belleti, II. 283.
— muriatico-acidus, 34.
— Oryzae citratus, II. 313.
— oxygenatus, II. 420.
— oxymellicus, 23.
— ad perniones, 148.
— ex Pomis, II. 388.
— Pomorum, II. 388.
— Sacch. Lactis, II. 48.
— spirituosus, 99.
— sulphurico-salinus, II. 410.
— Uvarum siccarum, II. 718.
Poudre de blanchiment, 377.
Powder antim. v. Pulvis.
—, Blaine's, II. 625.
Powders, spruce beer, II. 341.
— Ward's sweating, II. 284.
Praecipitatus albus, II. 159. 206.
— flavus, II. 197.
— niger, II. 199.
— per se, II. 139.
— roseus, II. 197.
— ruber, II. 119.
— solubilis niger, II. 199.
— viridis, II. 151.
— Wurtzii, II. 197.
Prassium, II. 105.
Preservative for the teeth, II. 239.
Présure, II. 48.
Preuve de Hollande, 89.
Preventive, II. 3.
Priapus Cervi, 720.
— Ceti, 720.
— Tauri, 720.
Primula Auricula, II. 446.
— officinalis, II. 446.
— veris, II. 446.
Prinos glaber, II. 447.
— verticillatus, II. 447.
Prophylacticum anticholericum, II. 743.
Propolis, 270.
Protoacetas Barii, 337.
— Calcii, 390.
— Mercurii, II. 211.
— Plumbi, II. 365.
— Potassii, II. 420.
— Sodii, II. 617.
Protocarbonas Magnesii, II. 90.
— Potassii, II. 405.
— — et Ammoniaci, II. 400.
— Sodii, II. 620.

Protochloras Potassii, II. 419.
Protochloruretum Ferri, 690
— Hydrargyri, II. 159.
— Mercurii, II. 159.
Protocitras Calcii, 391.
— Ferri, 700.
— Potassii, II. 426.
Protogallas Plumbi, II. 371.
Protohydriodas Potassii, II. 9.
Protohydrochloras Calcii, 389.
— Ferri solidus s. crystallis., 690.
— Magnesii, II. 97.
— Mercurii, II. 159.
— Potassii, II. 420.
— Sodii, II. 605.
Protohydrocyanas Potassii, 39.
Protohydroferrocyanas Potassii, 40.
Protohydrosulphas Calcii, 389
Protohydrosulphocyanas Ferri, 708.
— Potassii, 40.
Protohyposulphites Potassii, II. 410.
— Sodii, II. 617.
Protoiodas s. Protoiodis Hydrargyri s. Mercurii, II. 206.
Protoioduretum Mercurii, II. 194.
Protomalas Ferri, 698.
Protomeconas Sodii, II. 618.
Protonitras Barii, 337.
— Hydrarg. solutus s. liq. II. 202.
— Mercurii, II. 201.
— — et Ammoniaci, II. 205.
— — liquid., II. 202.
— Plumbi, II. 358.
— Potassii, II. 410.
— Sodii, II. 617.
Protooleomargaras Plumbi, II. 372.
— Potassii, II. 436.
— Sodii, II. 618.
Protophosphas Calcii acidus, 388.
Protosulfas v. Protosulphas.
Protosulphas Barii, 336.
— Calcii, 388.
— Ferri, 685
— Magnesiae, II. 95.
— — c. Deutosulphate Sodii, II. 97.
— Potassii, II. 406.
— — et Ammoniaci, II. 410.
— — et Magnesiae, II. 410.
— Sodii, II. 614.
Protosulphites Potassii, II. 410.
— Sodii, II 617.
Protosulphuretum Antimonii, 235. 238.
— Arsenici, 285.
— Cupri, 618.
— Stanni, II. 624.
Prototartras Antimonii, 251.
— — et Potassii, 251.
— Potassii, II. 427.
— — et Ammoniaci, II. 436.
— — et Ferri, 700.
— — et Sodii, II. 435.
Protoxychloruretum Calcii, 377.
— Sodii, II. 605.
Protoxydum Antimonii, 227. 250.
— Barii, 335.
— Calcii, 373.
— Cobalti, 577.
Protoxydum Ferri, 675.
— Hydrarg. nitrico-ammoniac., II. 199.
— Mercurii, II. 145.
— Plumbi, II. 351. 352.
— Potassii, II. 390.
— Sodii, II. 604.
— Stanni, II. 624.
— Stibii griseum, 227.
— — sulphurat. fuscum, 234.
— Zinci, II. 722.
— — impurum, II. 722.
Protoxyphosphuretum Calcii, 376.
Protoxysulphuretum Calcii, 376.
— Potassii, II. 395.
— Sodii, II. 604.
Pruna agrestia — Pr. spinosa.
— Brignolensia, II. 447.
— Damascena, II. 447.
— laxativa, II. 558.
— praeparata s. purgant., II. 558.
— sylvestria, II. 448.
Prunella, II. 447.
— vulgaris, II. 447.
Pruneolus sylvestris, II. II. 447.
Prunus, II 447.
— Armeniaca, II. 448.
— Avium. 447.
— Cerasus, 477.
— domestica, II. 447.
— Laurocerasus, 477.
— Mahaleb, 477.
— Padus, 476.
— spinosa, 14. II. 447.
— sylvestris, II. 447.
— Virginiana, 477. II. 448.
Prussias Ferri, 707.
— Hydrargyri, II. 195.
— Lixiviae et Ferri, 40. 707.
— Mercurii, II. 195.
— Potassae et Ferri, 40. 707.
Pseudacorus, II. 19
Pseudo-Alcannnum, 205.
— - Angustura, 219.
Pseudorhabarbarum, II. 682.
Psoralea glandulosa, 615.
— pentaphylla, 599.
Psychotria emetica, II. 12.
— sulphurea. II. 13.
Psyllium, II. 348.
Ptarmica. II. 449.
— montana, 282.
Pteris aquilina, II 449.
Pterocarpus Draco, II. 540.
— erinacea, II. 46.
— Indicus, II. 540.
— officinalis — Pt. Draco.
— santalinus, II. 540. 541.
Ptisana Angelica, anticolica, laxativa Mannae, Mannae tamarindinata, salina mannata, v. Potio.
— Callaci s. ex Callac, II. 550.
— de Cichorii Foliis, 544.
— communis, 787.
— Datisbii, 574.
— hippocratica, 786.
— laxativa, II. 591.
— Oryzae. II. 313.
— ex Pane, II. 319.
— passulata, II. 591.
Pulegium vulgare, II 450.
Pulicaria. II. 449.
Pulmo Vulpis siccatus, 719.
Pulmonaria arborea, II. 67.
— Gallica, 784.
— maculosa, II. 451.
— officinalis, II. 450.
Pulpa Caricarum, 445.
Pulpa Cassiae, 454. 455.
— — pro clysteribus, 455.
— — compos., 455.
— — Fistulae, 454.
— Ceparum 97.
— Colocynthidis, 587.
— Cynorrhodontis, II. 491.
— Cynosbati. II. 493.
— Dactylorum, II. 335.
— Ebuli, II. 536.
— emolliens, 133.
— Ficuum, 445.
— Jujubarum, II. 37.
— Lilii, II. 75.
— Melimelorum, II. 388.
— Passularum, II. 718.
— Pomorum dulcium, II. 388.
— Prunorum, II. 447. 448.
— — depurata, II. 448
— — sylvestrium condita, II. 448.
— Rosae caninae, II. 493. 494.
— Sambuci — Rob. Samb.
— Scillae, II. 560.
— Sorbi Baccar., II. 620.
— Tamarindorum, II. 644.
— Uvarum, II. 718.
Puls arsenicalis, 288.
Pulsatilla coerulea, 206.
— minor, 207.
— nigricans, 207.
— vulgaris, 206.
Pulticula de Manna, II. 102.
— saponacea, II. 476.
Pulvis contra abortum, II. 503.
— absorbens, 231. II. 92. 474.
— — Wedelii, 231.
— — pro usu externo, II. 571.
— Acetitis Cupri comp., 630.
— ex Acido tartarico, 64.
— acidulus, 64.
— Aconiti, 66.
— — Foliorum, 66.
— — nitratus, 67.
— contra acredinem — P. absorb., 231.
— adstringens, 145. 621. 679. 683. II. 46. 284. 540. 687. 733.
— aërophorus, 28. II. 92.
— — e Magnes. carbon., II. 92.
— — e Natro carbon. acidulo, 28.
— ex Aethiope antim., II. 144.
— Aethiopicus, II. 144.
— albicans, 377.
— alexipharmacus, 142. II. 415.
— — Camerarii, 142.
— — Rollwagii, 142.
— — ruber, II. 415.
— — Sinicus, II. 226.
— alexiterius, 281. 600. II. 13. 284.
— Algarothi, 227. 250.
— Aloës c. Canella, 113.
— — comp., 111. 113.
— — c. Guajaco, 113.
— aloëticus cum Ferro, 111.
— — compos., 113.
— alterans comp., II. 167.
— — Plummeri, II. 166.
— Aluminis comp, 145.
— — c. Kino. 145.
— — kinosatus. 145.
— aluminoso-mercurialis, II 150.
— aluminosus, 142. 145.
— — compositus, 145.
— — Helvetii, 145.
— amarus, 733.
— — ferratus, 686.

Pulvis ammoniato-camphorat., 175.
— Ammonii, 175.
— — muriat., 181.
— amygdalinus communis, 195.
— Anagallidis, 205.
— analepticus, II. 156.
— Angelicae comp., 182.
— Angelicus, 250
— — Sharpii, II. 150.
— anodynus, II. 92. 278. 281. 284. 286.
— — Camerarii. II. 278.
— — Doveri. II. 281.
— — Ludovici, II. 278.
— — anonymus, II. 691.
— antacidus. 392. II. 92. 282 v. P. antiarthr.
— — Vogleri. II. 93.
— antarthriticus, II. 557.
— — purgans, II. 557.
— — Wepferi, II. 737.
— anthelminticus, 552. 686. II. 25 131. 156 173 700
— antiacidus, II 92.
— antiarthriticus, 739 749. II. 486.
— amarus, 473.
— — purgans, II. 578.
— antiasthmaticus, II. 635.
— anticalculosus, II. 697.
— anticachecticus, 670. 680. 683.
— anticancrosus, 288.
— anticatarrhalis, 241. II. 317. 334 4'2. 635.
— antichloroticus, 671.
— anticholericus, II. 743. 744
— anticolicus Camerarii, II. 401.
— anticonvulsiv. stomach., 458.
— antidiarrhoicus, II. 13.
— antidysentericus, 503. 600. II. 284. 635
— antiemeticus, II. 92.
— antiepilepticus. II. 157. 317.
— — Marchionis. II, 318.
— — niger, II. 318.
— antifebrilis, 503. 696.
— antihaemorrhagicus, 597.
— antihectico - scrophulos., II. 231
— antihecticus, II. 474.
— antihydropicus, 647.
— antihystericus, 4.
— antiictericus, II. 578.
— antileucorrhoicus, 666.
— antilyssus, 385. II. 67. 156. 519.
— — Ormskirkianus, II. 3.
— — Tunchin. s. Tunquinensis, II. 226.
— antimonialis 230. 231. 236.
— — ,Chenevix's, 231.
— — factitius, 232.
— antiperiodicus, 538.
— — et purgans, 504.
— antiphlogisticus, II. 408
— antiphthisicus, 621. II. 367.
— antipleureticus, II. 631.
— antipsoricus, II 367. 634
— — Pyhorelii. 377.
— antirhachiticus, II. 513.
— antirheumaticus. 245.
— antiscorbuticus, 505.
— antisepticus, 502. 504.
— antispasmodicus, 242. 504 647. II. 158. 168 226. 287. 700. 723.
— — infantum, II. 706
— — nitrosus, II. 158.
Pulvis antispasmodicus et anticonvuls. stomach., 458.
— — Rosensteinii, II. 284.
— — Stahlii, II. 560.
— antispasticus, II. 700.
— antistrumalis, 383. II. 142. 724.
— antivenereus, II. 197.
— aperiens et resolvens, II. 408.
— aperitivus, II. 385. 412.
— aphrodisiacus, II. 226.
— ad Aquam confortativ., 385.
— ad arenulas. 556.
— Argenti Nitratis, 278.
— Ari s. Ari alcalinus, 295.
— — — comp., 295.
— Arnicae comp., 282.
— — opiatus, 282.
— aromatico - ferratus, 676. 686.
— aromaticus, 403. 505 II. 314. 605.
— arsenicalis, 287.
— — Baumanni, 288.
— — pro equis, 288.
— — Justamondi, 287.
— — Plenczii. 288.
— — Pluketii, 288
— — Rousseliotii, 288.
— arthriticus, 66.
— Asari comp., 306.
— atramentarius, 687.
— Auri muriat., 316.
— Auripigmenti factit., 285.
— balsamicus, II. 235.
— basilicus, II. 167.
— Belladonnae, 312.
— benzoicus, 26.
— e Benzoino, 26.
— Bernhardi, 288.
— bezoard. alb. Ludovici, 388.
— — Anglic., complet., 231.
— — — incompl., 231.
— — Curvi, 504.
— — Halensis, 231.
— — Kentianus, 382
— — Rollwagii, 142.
— — Sennerti, 383.
— e Bolo compos. cum et sine Opio, II. 687.
— ad botium, 438.
— cachecticus, 676.
— — Chesneau, 683.
— — Ludovici, 230.
— — Quercetani incompl., 680.
— Calami aromat., 370.
— Calaminae c. Myrrha, II. 724.
— Calcariae sulph c. Aconito, 577.
— ad calculum, 556.
— Camphorae s. camphoratus, 394.
— e Cancror. Chelis comp., 381.
— — — pretiosus. 382.
— Cantharid. camphorat., 434.
— Capucinorum, II. 521.
— Carbon. Calcis comp., 383.
— capit. Sti. Angeli, 306.
— Carbonis acidulus, 438.
— cardiacus, 600. II. 150.
— contra cariem, 297.
— de Carignan, II. 317.
— carminativus, 221. II. 13 92.
— Carthusianorum, 238.
— caryocostinus, II. 556.
pulvis Caryophyllatae 742.
— — e Rhei, 742.
— castoreatus. 458
— contra casum, II. 546.
— catarrhalis, II. 635.
— ad catarrhum. II. 331.
— Cate hu comp., 467.
— cathartico - diuret., II. 6[illegible]
— cathartic us, 102. II. 178 474.
— — absorbens, II. [illegible] 635.
— — febrifugus, 593.
— catholicus, II. 556.
— causticus, II. 150.
— — Plenkii, II. 150.
— Krügeri, II. 189.
— Cellensis aureus, II. 158.
— — nobilis. II. 156.
— cephalicus. 306. 348. II. [illegible] 317.
— — albus, II. 318.
— — Camerarii, II. 157.
— — niger, II. 724
— — ruber, II. 157. 504.
— — Winteri, II. 157.
— e Cerussa, II. 355.
— — compos., II. 355.
— cervinus Camerarii, 389
— Chamomill. c. Antimon., 232.
— Chelarum compos 382.
— e Chelis Cancrorum comp., 382.
— e Chelis Cancror. minus pret., 382
— — — pretiosus, 382.
— Cheltenhamensis, II 95
— Chinae, 502. 504
— — antisepticus, 504
— — camphoratus, 502.
— — compos., 504.
— — factitius, 72.
— — c. Sale Ammon., 504.
— Chininae emetisat., II. 739.
— — et Morphinae. II 739.
— Chlorureti Auri et Sodii, II. 741.
— Chocolatae chinatae, 502.
— e Cinchona cathart., 503.
— Cinchonae. 502
— — c. Myrrha, 504.
— — c. Soda, 503.
— Cinnamomi comp., 403.
— Coff. c. Cort. Peruv., 502.
— Colocynthidis, 588.
— Colombae, 595.
— Comitis de Warwick, 232.
— Comitissae Kantii 600.
— compos. Stahlii, II. 560.
— ad condienda intranea, 120.
— ad condiendas carnes, 120.
— ad condiendum, 120.
— — cor, 120.
— confortans Camerarii, II. 157.
— Constantini, II. 213.
— contentus, 403.
— Contrayerv. compos., 600.
— cordial. Cellensis, II. 150.
— Cornachinus, 232.
— Cornu s. Cornu Cervi usti c. Opio, II. 281.
— corroborans, 502.
— Cort. Quercus et Anthemid. nob., II. 459.
— cosmeticus, 73 195. II. 438.
— — ad manus, 73. 195.
— Cosmii. 288.
— cretaceus, 383.
— Cretae comp., 383.

Pulvis Cretae comp. c. Opio, II. 281.
— Cupressi restrictiv., II. 733.
— — Zinci, II. 722.
— dentifricius, 384. 438. 505. II. 92. 430 634 738.
— — albus, II. 451.
— — antiscorbuticus, II. 469.
— — Hufelandi, 505.
— — niger. 438.
— — Pelletier. 538.
— — viridis, 438.
— deprimens et nauseam ciens. 647.
— depurans, II. 144.
— contra diabetem, 143.
— Diacarthami, II. 556.
— Diagrydii compos., 232.
— diaphoreticus, 231. 389. 749. II. 169. 176. 284. 417. 418 419. 634.
— — et sedativus, II. 285.
— diapnoicus, II 284.
— Diaromaton, 403. 404.
— Diarrhodon, II. 504.
— ad diarrhoeam, II. 13
— Diascordii, II. 304.
— Diasennae, II. 578.
— Diaturpethi compos., II. 695.
— digestivus, 221. 262. II. 92. 95. 178. 401. 408. 432. 472.
— — compos., II. 408.
— — Kleinii, II. 427.
— — c. Rheo, II. 408.
— — Unzeri, II. 310.
— Digitalis purp., 646.
— diureticus. 434. 647. II. 39. 417. 561. 617. 697.
— — martialis, II. 416.
— Doveri s. Doweri, II. 284.
— Ducis Portland, 733.
— dysentericus, 600.
— ad dysuriam, 132
— eccoproticus, II. 431
— ecphracticus, 686. II. 93. 432.
— — Sellii, II. 93.
— Edinburgensis, II. 166.
— Elaterii, II. 220.
— emeticus, 258. 260. 621. II. 13.
— — compos., 258.
— — Helvetii, 260.
— emeto-catharticus, II. 13.
— emmenagogus, 434. 671. II. 39. 235.
— epilepticus, II. 157. 317 700.
— — albus, II. 318.
— — Cullarii, II 318.
— — ad guttetam Riverii, II. 318.
— — Holsaticus, II. 319.
— — Marchionis, II. 318.
— — Marchionum, II. 92. 318.
— — mirab. Mynsichti, II. 157.
— — niger (Viennens.), II. 318.
— — ruber, II 157.
— pro epithemate cordis et puls., II 504.
— equorum, 237.
— errhinus, 306. II. 172.
— ad erysipelas, II. 352. 535.
— — externus 13.
— erysipelatodes Mynsichti, II. 352.
— — externus. 13.
— escharoticus, 621. 630. II. 150. 151 211. 367.
Pulvis evacuans puerorum, II. 174.
— excitans, II. 42. 170. 474.
— in excoriatione aegri, 384.
— ad excrescentias. 146.
— expectorans, 241. II. 13. 176. 635.
— exsiccans et incitans, 394.
— externus ad erysipelas, 13.
— Extr. Pulsatill., 207.
— — Saturni, II. 395.
— febrifugus. 181. 287. 503. 515. 624. 733 II. 13 344. 739.
— — adstring., 502.
— — et anticachecticus, 503.
— — antimonialis, 229.
— — Fizesii, 503.
— — Gaubii, 503
— — Hoffmanni, 503.
— — et incisivus, 502.
— — Jodeti, 504.
— — Lescuyeri, 504.
— — Mortoni, 232.
— — et nervinus, 504.
— — c. Opio s. opiat., 504.
— — pauperum, 742.
— — et purgans, II 25.
— — salinus II. 419.
— — Schwanbergi, 230.
— — stibiatus, 502.
— — Trilleri, 503.
— — Unzeri, 246.
— ferratus. 676.
— Ferri alcoholisatus, 670.
— — limati, 670.
— ferruginosus, 676.
— ad flatus. 221.
— contra fluorem album, 666. II. 107.
— Foeniculi compos., 210.
— Fontanellesii. 288
— de Fordyce, II. 435
— Frankii, II. 432.
— fumalis, 343. II. 630.
— — Haagii, 343
— — nobilis, 343.
— — odoratus. 343.
— ad fumigat. muriat., 540.
— fumigator. ad contagia, 62. 540.
— galactopoeus, II. 92.
— galactopoieticus, 210.
— di Gambello, II. 636.
— Gascoigne verus, 382.
— Gentianae comp., 733.
— Glycyrrh. comp., 549.
— ad gonorrhoeam. 696.
— graphiticus. 674.
— Gratiolae c. Hydrarg., 746 II. 170.
— Gregorianus, II. 578.
— Grimaldii. 683
— Guajaci c Senna, II. 578.
— Guarini. 241.
— Gummi-Res. Guaj. opiat., 749.
— — — — et Subcarb. Ammon., 749
— — — — et Tartrat. Stib. et Potass., 749.
— gummosus, 760 II. 600.
— — alcalinus 767. II. 401.
— — c. Liquir. et Sulph. stib., 245.
— — stibiatus. 241.
— — sulphuratus, 766.
— contra guttam serenam, 208.
— de Gutteta, II. 317.
— ad Guttetam, II. 157. 317. 318.
— ad haemoptysin, I. 540.
Pulvis de Haly, 202.
— Helmintochorti compos., 782.
— hepaticus ruber, II. 430.
— hermodactylatus, II. 536.
— ad herpetem, II. 144.
— Hierae picrae, 113
— hydragogus. II. 3? 178.
— Hydrarg. c. Camph., II. 170.
— — cinereus, II. 115. 199.
— — c. Opio, II. 176.
— — oxydati rubri. II. 150.
— — stibiato-sulphurat. c. Cicuta, II. 144.
— — stibiatus, II. 166. 168.
— — — c. Hyosc, II. 168.
— ex Hydrarg. mur. miti c. Sulph. Stibii aurant, II 166.
— — rubro c. Alumine, II. 150.
— — stibiato-sulphurato, II. 144.
— hypnoticus, II. 141.
— hystericus, 458.
— Imperatoris, 403 404.
— incidens s. incisivus, 242. 259. 391. II. 427. 635
— — Stahlii, 391.
— incrassans Fulleri, 767.
— pro infantibus, 384. II. 92.
— infantum, 384. II. 92.
— — anodynus, II. 92.
— — antacidus. II. 92.
— — citrinus, II. 92.
— — cum Rheo, II. 474.
— ad intertriginem, 381.
— Inulae aromatis., II. 3.
— Ipecacuanh. comp., II. 284.
— — cum Calomelane, II. 173.
— — et Cupri Sulphat. s. Cupri sulphur., 621.
— — hydrargyratus, II. 173.
— — opiatus, II. 284.
— — et Opii, II. 284
— — c. Opio, II. 284.
— — c. Tart stib., 260.
— — thebaicus, II. 284.
— Iridis c. Nitro, II. 412.
— Jalapae, II. 23. 24.
— — comp., II. 24.
— — hydrargyrat., II. 24.
— — c. Hydr. mur. miti, II. 24
— — c Kali sulphurico. II. 24.
— — et Muriat. Hydrarg. oxydul., II. 173.
— — c Natro, II. 24.
— — salinus, II. 24.
— — et Supertartrat. Potass., II. 24.
— — tartaricus, II. 24.
— Jamesii, 230. 231.
— Johan. de Vigo, II. 149.
— Junip. Sabin. comp., II. 39
— pro jusculo extempor., 721.
— Kentianus, 231. 382.
— kermesinus. 241.
— kermes. c. Camphora, 241.
— e Kermete min., 241.
— — c. Ipecac., 242.
— Kinae antisept., 504
— c. Kino, 145.
— Kino comp., II. 46.
— — gummos., II. 46.
— kinosatus. 145.
— Knoxii, 378
— Lauri carbonicus, II. 55.
— — Baccar. comp., II. 231.

Pulvis laxans, II. 23. 474. 578. 634.
— — c. Merc., II. 24.
— — pu rorum, II. 174.
— — c Sale. II 24.
— — et temper. Tronchini, II. 431.
— laxativ. vegetab., II. 24.
— leniens s. lenitivus antihypochondriac. Kleinii, II. 427.
— — Thedenii, II. 412.
— lenitivus, II. 474.
— — tartarisat., II. 474. 578.
— — pro Limonata, 64.
— Liquirit. comp, II. 578.
— lithontripticus, II. 697.
— longae vitae s. ad l. vitam, II. 579.
— ad lumbricos, 173.
— lunaris, 278.
— Lupulini. II. 89.
— ad maculas corneae, II. 431. 733.
— e Magnes. carbon., II. 92.
— Magnes. comp., II. 92. 474.
— — c. Rheo, II. 92.
— — tartaricus, 28.
— ad mammillas, 767. II. 742.
— Mantuanus, 600.
— manualis, 73. 195.
— Marchionis, II. 317. 318.
— Mareschalli. 449.
— Martialis 670.
— — Anglicus, 670.
— masticatorius, II. 1.
— mercurialis, II. 169. 173.
— — antimoniatus, II. 166.
— — argenteus, II. 213.
— Mercurii Moscati, II. 146.
— — et Cretae. II. 131.
— — dulc. c. Opio, II. 176.
— — saccharinus de Lagneau, II. 130.
— e Mercurio, II. 169.
— — dulci, II. 162.
— ad mictum involuntar., 683.
— mitigans Wepferi, 132.
— ad mors. canis rabidi, II. 519.
— Moschi, II. 226.
— — comp., II. 226.
— — opiatus, II. 226.
— motum peristalt. invertens, II. 13.
— mucilaginosus, II. 689.
— Muriat. hydrargyrosi theobaic, II. 176.
— — Mercurii dulc. opiat., II. 176.
— Myrrhae comp., II. 235.
— Nardi Celt. comp., II. 233.
— nasalis odorat, II. 504.
— Natri carbon. c. Acido tart., 28.
— nauseam ciens, II. 13.
— nephritic. pretiosus, 391.
— nervinus, II. 700.
— Nitratis Argenti, 278.
— — Potass comp., II. 412.
— Nitri oxalicus, II. 418.
— — tartaricus. II. 418.
— Nitri thebaicus, II. 284.
— nitro- s. nitroso-camphoratus, II. 415.
— nitrosus, II. 412. 418. 419.
— — cinnabarinus. II. 168.
— nobilis Cellensis, II. 150.
— Nucis vomicae, II. 250.
— — mosch comp., II. 231.
— Nucum Cupressi restrictiv., II. 733.
— nutricum, 210. II. 92.
— nutriens, 721.
Pulvis ocyticus, II. 345.
— odoriferus ad contagia, 62.
— Olibani compos., II 255.
— ophthalmicus, 665. II. 431.
— — Baldingeri, II. 431.
— opiatus, II. 281.
— Opii compos., II. 281.
— Oxalatis Potassae, II. 426.
— Oxydi Manganesii ad contagia, 540.
— — Stibii compos., 232.
— ex Paeonia compos., II. 317.
— Pannonicus ruber ordinar., 143.
— — — incomplet., 143.
— — — minus pretios., 143.
— paregoricus, II. 92.
— ad partum, II. 345. 612.
— pectoralis, 181. 232. 235. 241. 282. 310. II. 48. 324. 578. 635.
— — balsamicus, II. 635.
— — — Wedelii, II. 635.
— — et diaphoreticus, 235.
— — resolvens, 245. II. 635.
— — viridis, II. 578.
— ad s. contra pediculos, 644.
— peristalt. mot. invertens, II. 13.
— Peruvian. purgans, 504.
— ex Pheiland. aquat. gummos., II. 334.
— de Phosphate Calcis et Stibii comp., 230.
— ad s. contra phthisin, 515. 621. II. 367.
— Pilae marinae, 437.
— pleureticus, 388.
— — Mynsichti. II. 634.
— Plumbi comp., II. 355.
— e Plumbo comp., II. 356.
— Plummeri comp., 167.
— ad potiut. nocturnas, 452.
— Portlandii. 733.
— praecipitans Stahlii, 231.
— Principis, II. 149.
— — de Carignan, II. 317.
— ad procidentiam ani, 142.
— ad prolaps. ani, 142.
— ad ptyalismum, II. 396.
— puerorum citrinus, II. 20. 92.
— — epilept. c. Rheo, II. 474.
— Pulsatill. Extracti, 207.
— purgans, 262. 668. II. 23. 91. 95. 173. 474. 556. 557. 578.
— — absorbens, II. 635.
— — anthelminticus, II. 178.
— — et diureticus, 647.
— — et irritans, 746.
— purificans, II. 144.
— — Jasserii. 237.
— — Kaempfii, 236.
— purpur. Anglicus, 385.
— pyricus s pyricus de Struensee, II. 419.
— contra quartanam, 503.
— Quercus comp., II. 459.
— — marinae, 437.
— ad rabiem Comit d'Ysenburg, 385.
— contra rabiem. 205.
— ad rachitidem, II. 513.
— Rad. Ipecac. opiatus, II. 284.
— refrigerans, 64. II. 412. 415. 416. 431.
— relaxans, 262.
Pulvis Resin. Guaj. et Subcarb Ammon., 749.
— resolvens, 242. 259. II. 178. 427.
— — antiphlogistic., II. 385.
— — comp., 232.
— — Stahlii, 232.
— restaurans, 367.
— Rhabarbari, II. 474.
— Rhei, II. 437.
— — comp., II. 408. 474.
— — c. Magnesia. II. 474.
— — et Muriat. Hydrarg. oxydul., II. 178.
— — salinus, II. 474.
— — saponaceus, II. 474.
— — et Sulphat. Potass., II. 474.
— — c. Tartaro, II. 474.
— — c. Tartrate Potass., II. 474.
— e Rheo, II. 474.
— rheumatic. anod., 261.
— roborans, P. corrob., II. 157.
— — antispasmod, II. 700.
— — Camerarii. II. 157.
— — martialis, 503.
— Rubiae comp., II. 513.
— Rudingii, 228.
— Sacchari acidulus. 61.
— Sabin. s. Sabinae comp., II. 39.
— Salep. II. 524.
— Salicis comp., II 526.
— salino-stibiat., 262.
— salinus, II. 432.
— — compos., II. 95. 158.
— ad salivationem, II. 396.
— Sambuci, II. 535.
— Sanguin. Dracon. dentifric., 388.
— Saponis comp., 668.
— contra scabiem, II. 631.
— Scammoneae s. Scammoniae comp, II. 556.
— Scammonii antimon, 232.
— — et Calomellis, II. 557.
— — catholicus, II. 556.
— — comp. Odierii, 232.
— e Scammonio c. Aloë, II. 557.
— — — c. Calomelane, 179.
— Scillae, II. 560.
— — comp., II. 560.
— — — Stahlii, II. 560.
— e Scordio cum Opio, II. 304.
— sedativus, 312. II. 389.
— Sedlitzensis, 29.
— e Senna, II. 578.
— Sennae comp., II. 578.
— — c. Sulphure, II. 578.
— — viridis, II. 578.
— sialagogus, 182.
— Sodae tartarisat. s tartaric., 28.
— Specier. Diatragacanth. s. Tragacanth. comp., II. 689. 690.
— Spongiae comp., 438.
— — ustae, 437. 438.
— stagnoticus, II. 258.
— Stanni, II. 623. 624.
— — c. Deutosulphate Ferri, II. 623.
— — factitius, II. 623.
— — ferratus, II. 623.
— — martiatus, II. 623.
— — philosophice parat., 623.

Pulvis sternutatorius, 306. 347. 601. 613. 663. 776. II. 172. 246. 453.
— — albus, II. 230.
— — Nopsii, 602.
— — variegatus, 602.
— — viridis, 601.
— stibiato-opiatus, 261.
— stibiatus, 230. 231. 245. 258.
— — de Marryat, 260.
— stimulans, II. 55.
— stomachicus, 221. 502. 504. 595. 733. II. 724.
— — s. stomachalis Birkmanni, 295.
— — Doerflingens, II. 579.
— ad s. contra strumam, 383. 438. II. 142. 162. 724.
— Strychnini, II. 628.
— stypticus, 145. 686. II. 46. 367.
— Subcarbonat. calcici, 382.
— Succini s. de Succino comp., II 290.
— sudorificus, II. 284.
— — Doveri, II. 284.
— — et tonicus, II. 544.
— — Wardii, II. 284.
— ad suffiendum, II. 630.
— pro suffimigio s. suffimento, II. 255. 630.
— Sulphat. Aluminae s. Aluminis comp., 145. II. 150.
— — Chininae, II. 739.
— — Ferri c. Kino, 686.
— de Sulphate Potassae comp, II. 168.
— de Sulphure et Scilla, II. 635.
— ex Sulphure stibiato, 246.
— — — rubro. 241.
— — — — c. Camphora, 241.
— Sulphureti Antimonii, 235.
— e Sulphureto Hydrarg. nigro, II. 141.
— sulphureus, II. 635.
— Sulphuris comp., 113.
— — sublim. comp., II. 635.
— sulphurosus, II. 635.
— Supersulphat Aluminae et Potassae comp., II. 150.
— Supertartrat. Potass. et Stalagmit. cambogioidis, II. 432.
— — — et Digit. purp. 647.
— Tanaceti comp., II. 647
— Tartari argillatus, II. 431.
— — comp., II. 430. 432.
— Tartrat. Stib. et Potass., 749.
— temperans, 27. 350. 647. II. 281. 366. 419. 431.
— — albus, II. 418.
— — Bouillon-Lagrange, II. 418.
— — camphorat., II. 415.
— — diureticus, II. 418
— — Rosensteinii, II. 418.
— — ruber, II 158.
— — Stahlii, 242. II. 158.
— — Tennanti, 377.
— — Unzeri, II. 419.
— terebinthinatus, II. 667.
— terrestris, 382.
— thebaicus, II. 281.
— contra tineam, 335.
— ad tisanam ordin. extemporan., II. 413.
— tisaniferus, 767.
— tonico-adstringens, 502.
— — antispasm. martialis. 670.
Pulvis tonico-martialis, 670.
— — stomachicus. 671.
— tonicus, 503. 504. 604. 621. 676. 683. 686. 696. 707. 708. II. 13.
— — Bangii, 504.
— — et resolvens, 242.
— Tormentillae comp., II. 687.
— ad tormina infant., II. 474.
— — — — antacidus, II. 92.
— Tragacanth. comp., II. 689. 690.
— de Tribus, 232.
— Tunchinensis, II. 226.
— contra tussim convuls., 242.
— — — infantum, II. 317.
— ad ulcera crurum, II. 24
— — — tendinum. II. 235.
— Uvae Ursi, II. 697.
— Valerianae, II. 700.
— — aromat., II. 700.
— Vanillae, II. 707.
— contra vermes, 552. II. 142.
— vermifugus. 232. 311. 552. 746. 782. II. 39. 131. 142. 162. 170. 173. 180. 606. 620 623 624. 625.
— — mercurialis, II. 141.
— Vernicis, 621.
— Viennens. alb. virgineus, 389.
— Vigonis, II. 149.
— vitae Imperatoris. 403. 406.
— vomicus, II. 13.
— vomitivus Scherffii, 260.
— Warwicensis, 232.
— Zinci oxyd. albi, II. 723.
— Zingiberis, II. 735.
Pumex, II. 451.
Punch, 95.
—, cold, iced, tea, wine, 95.
Punica Granatum, II 451.
Purgativum Grandii, II. 428.
— Le Royi, II. 31.
Purpura Cassii, 318.
— mineralis, 318.
— vegetabilis, 679.
Putamen Jnglandis, II. 31.
Pyrethrum officinale, II. 453.
— Parthenium — Matricaria.
— salivale, II. 453.
Pyri martiales, 702.
Pyrites arsenical. micaceus, 285.
— Ferri artificialis et nativ., 674.
Pyrola, II. 455.
— altera, II. 455
— rotundifolia, II. 455
— secunda, II. 455.
— umbellata, 499. II. 455.
Pyroleum Ossium rectif, 730.
— Succini, II. 632
Pyrothonides, II. 744.
Pyrus Cydonia, 633.
— Malus, II. 388.

Q.

Quadrichloruret. Sodii, II. 605.
Quadroxalas Potassae, II. 426.
Quassia amara, II. 455.
— excelsa, II. 456.
— polygama, II. 456.
— Simaruba, II. 599.
Quassina s. Quassinum, II. 456.
Quercula minor, II. 678.
Quercus, II. 458.
— aegilops — Q. infectoria.
— Aesculus — Q. infectoria.
— alba, II. 458.
— Ballota, II. 458.
Quercus Cerris s Cerrus, 716.
— foliata. II. 459.
— Ilex, II. 458.
— infectoria, 716.
— marina, 711.
— pedunculata, II. 458.
— Robur, II. 458.
— Suber, II. 458.
— tinctoria, II. 458.
Quina s. Quinia 535.
Quinina s. Quininum, 535.
Quininum sulphuricum — Chininum sulph.
Quinium, 535.
Quinquefolium s. Quinquef. majus, II. 446.
Quinque Lapides pretiosi, II. 735.
Quinquenervia minor, II. 319

R.

Rackasira, 329.
Radices Carlinae conditae, 446.
Radix Brasiliensis, II. 12.
— Enulae trita reducta, II. 2.
— Eryngii Saccharo condita, 659.
— Indica Lopeziana, II. 461.
— Lopeziana, II 461.
— Mungos, II 231.
— Serpentum, II. 231.
— Zedoariae, II. 719.
— Zingiberis condita, II. 735.
— — trita reducta, II. 734.
Rakasira, Rakasiri, 329.
Ramenta Ferri, 670.
Rana esculenta, 720.
— paradoxa, 720.
— temporaria, 720.
Ranarum Coxae, 720.
Ranunculus, II. 462
— acris, II. 462
— albus. 206
— aquaticus, II. 462.
— bulbosus, II. 462.
— Ficaria, 491.
— flammeus major, II. 462.
— — minor, II. 462.
— Flammula, II. 462.
— Lingua, II. 462.
— nemorosus. 206.
— palustris, II. 462.
— pratensis, II 462.
— sceleratus, II. 462.
— Thora, II. 462.
Raphanus aquaticus, II. 603.
— hortensis, II. 463.
— marinus, II. 463.
— niger, II. 463.
— rusticanus, II. 463
— rusticus, II. 463.
— sativus, II. 462.
— sylvestris, II. 463.
Rapus ruber, 347.
Raspatura Cornu Cervi, 386.
— Ligni Guajaci, 747.
Rasura Cornu Cervi, 386
— Ligni Guajaci. 747.
— — Santali rubri, II. 541.
— Succini — Succin. raspat.
Ratafia antiscorbutica, 478.
— Caraibum s. Caribaeor., 752.
— de cerises, 478.
— d'ecorce d'oranges, 561.
— de fleurs d'oranges, 561.
— de Grenoble, 478.
Ratanha, II. 468.
Ratanhia, II. 468.
Rathania, II. 468.
Realgar. 285

Recrementa Sulphuris vivi, II. 033
Recrementum Vitri, II. 409.
Regina pratensis, II. 621.
Reglisse eau de Husson, 747.
Reguli usti, 381. 431.
Regulus Antimonii, 225
— — martialis, 226.
— — medicinalis. 226.
— — simplex, 225
— — stellatus, 225 226
— Jovis, II. 227
— Stibii, 225
Remedium contra accidentias a fungis veneficis, 115
— antichotericum, II. 744.
— antidiabeticum Redfearn, II. 404.
— antihydropicum, 680.
— antiphthisicum, II. 740
— Adairii. 622.
— antitaeniosum, II. 162.
— antivenereum de Mittié, II. 35.
— Capucinorum, II 202.
— Christiani (Chrestien) ad bilem, 543.
— Ducis d'Andin. II 202.
— contra hydropem, 280.
Requies Nicolai, II 308.
Resina abietina, II 652.
— Abietis. II. 652 671.
— — humida, II. 671.
— — sicca, II. 671.
— alba, II. 671.
— — humida, II. 671.
— Anime, 700.
— Benzoës. 339.
— benzoica. 341.
— Burgundica, II. 671.
— Cachibon, 366.
— Calami, 370
— Canadens. fluida, I.
— Carannae s Caragnae, 436.
— Caryophyllorum, 449.
— Cayennensis, II. 470.
— Chibou. 366
— Chinae 514.
— communis, II. 671.
— Copahu. 321.
— Copaiferae officin., 321.
— Copal. 603
— copallina, 603.
— Cort. Peruv., 514.
— elastica, II. 470.
— Elemi. 656.
— flava, II. 671.
— Galbani, 357.
— Gialapae. II. 28.
— Gnidii viridis. 639.
— de Gomart, 366.
— Guajaci, 749
— nativa. 747.
— Hederae, 773.
— Jalapae II. 28.
— praep., II. 29.
— Jalappae, II. 28
— praep., II. 29.
— Juniperi, II. 539
— Kikekunemalo, II. 45.
— Laccae in ramulis—Lacca
— Laricis liquida. II 652.
— Lentisci s. lentiscina, II. 107.
— Ligni Guajaci, 749.
— Ligustici, II. 74.
— liquida Pistaciae Terebinthi, II. 651.
— Mastichis, II. 107.
— Meccanensis fluida, 326.
— liquida, 326.
— nigra, II. 347. 671.
— Novae Hispaniae liq., 321.
— Oleae, II. 255.
— Pini, II. 652.
— — Abietis, I. II. 671.
— — — sponte concreta, II. 671.
— — balsameae liq., I.
— — communis, II. 671.
— — empyreum. liq. II., 347
— — — solida, II. 671.
— — fusa, II. 671.
— — Laricis liq., II. 652.
— — nativa, II. 671.
— — oleo volatile deprivata, II. 671.
— Pistaciae Lentisci, II. 107.
— Pterocarpi Dracon., II. 539.
— Quinquinae, 514.
— Sang. Draconis, II. 593.
— Scammonii, II. 555. 556.
— Styrax, II. 626.
— Succini, II. 630 631. 632.
— — balsamica, II 632.
— Terebinthinae, II. 651.
— Turpethi, II. 695.
Resino - Extractivum Chinae, 513
Resolvens Richardi, II. 669.
Resta Bovis. II. 256.
Rhabarbarina s. Rhabarbarinum, II. 473.
Rhabarbarum, II. 473.
— album, II. 109.
— Britannicum, II. 473.
— Bucharicum, II 473.
— Chinense, II. 472.
— Danicum, II. 472.
— Europaeum, II. 473.
— Gallicum, II. 473
— Indicum, II 109. 472.
— Monachorum, II. 473 517.
— Moscoviticum, II. 473.
— nigrum, II. 23.
— nostras, II. 473
— officinale, II. 472.
— pauperum, II. 682.
— Rhaponticum, II. 472.
— Rossicum s. Russicum, II. 473.
— Sinense, II. 472.
— spurium, II. 473.
— Tartaricum, II. 473.
— tostum, II. 473.
— Turcicum, II. 473.
— verum, II. 472.
Rhamnina s. Rhamninum, II. 471.
Rhamnium, II. 471.
Rhamnus, II. 471.
— Alaternus, II. 471.
— catharticus, II. 471.
— Frangula. II. 470.
— infectorius, II. 471.
— Jujuba, II. 49
— Lotus, lycioides, niger, Oenoplia, paliurus, II. 471
— sanguineus, soporifera, II. 471.
— Siculus, II. 471.
— Zizyphus, II. 36.
Rhaponticinum, II. 472.
Rhapontico, II. 472. 517.
— Behen. 339.
— verum, II 472
Rhatania, II. 468.
Rheinum — Rhabarbarinum.
Rheum, II. 472.
— Chinense, Dan., Indic., Sinense v. Rhabarbarum.
— compactum. II. 473.
— officinale, II. 472.
— palmatum, II. 473.
— Rhabarbarum — Rh. undulat
— Rhaponticum. II. 472.
— spurium, II. 473.
— undulatum, II. 473.
— verum, II. 472
Rheuminum, II 473.
Rhinoceros Indicus, 396.
Rhinocerotis Cornu, 396. 721.
Rhodia, II. 575.
Rhodiola, II. 575.
— rosea, II. 575.
Rhododaphne, II. 245.
Rhododendron Chrysanthum, II. 486.
— maximum, II. 486.
Rhodomel, II. 497.
Rhodosaccharum, II. 496.
Rhoeas, II. 322.
Rhum. 88.
Rhus Cotinus, II. 486
— copallinum, 604.
— Coriaria, II. 487.
— glabrum, II. 487.
— Javanicum, II. 487.
— metopium. II. 487
— radicans, II. 487.
— striatum, II. 487.
— Toxicodendron, II. 487.
— typhinum, II. 487.
— Vernix. II. 487.
— Virginianum, II. 487.
Ribes Grossularia. II. 488.
— nigrum, II. 488.
— rubrum, II. 488.
— Uva crispa, II 488.
Richardsonia Brasiliensis, II. 12.
Ricinus, II. 490.
— communis, II. 490.
— major, II. 250.
— minor, II. 490
— undulatus — R communis.
Risigallum, 285.
Rob Acaciae Germ. Fruct., II. 449.
— antiscorbuticum, II 460.
— — mercuriale, II. 189
— antisyphilit, 445. II 548 550. 551.
— Berberum, 316.
— Cerasorum, 477.
— Citri Medicae, 573.
— Cydoniorum, 634.
— Cynosbatos, II. 494.
— Dauci, 643.
— — Carotae, 643.
— — crudus. 643.
— — depurat., 643.
— Diacaryi Galeni, II. 34.
— Diacaryon sine melle, II. 34
— Diamorum, II. 225.
— Ebuli, II. 536.
— Fragariae, 710.
— Jugland reg. Nuc, II. 34.
— Juniperi, II 39 40.
— — Baccar, II. 40.
— — — comm., II. 40.
— de Laffecteur, 445.
— Mororum, II. 225.
— Myrtillorum, II. 699.
— Nucum Jugland, II. 34.
— Oxycoccos, II. 699.
— Prunorum, II. 439.
— — acidorum, II. 448.
— Ribesiorum, II. 489.
— — nigrorum, II. 488.
— Ribium, II. 489
— Rosae canin. Fruct., II. 494.
— — Gallicae, II. 494.
— Rubi Idaei, II. 515.
— Sambuci, II. 535
— — Baccarum cum et sine Saccharo, II. 535.
— — crudum, II. 535.
— — depuratum, II. 535.

Rob sambucinum, II. 535.
— Sorbi, II. 620.
— Spinae cervin, II. 471.
— tonic. et antiperiod., 507.
— Uvarum, II 718.
— Vaccinii Myrtilli, II. 699.
— — Oxycocci, II. 699.
— Vitis Idaeae II. 699.
Robinia Pseudo-Acacia, II. 492.
Roccella, II. 708.
— tinctoria II. 708.
Rochetta Alexandrina, II. 608.
Roob v. Rob.
Rorella, 654.
Rosa alba, II. 492
— arvensis, II. 493.
— benedicta, II. 316.
— canina, 338. II. 492
— Centifolia, II. 492.
— Damascena, II. 492.
— Eglanteria, II. 493.
— Gallica, II. 492.
— incarnata, II. 492.
— mineralis, II. 197.
— mollissima, II. 493.
— moschata, II. 492.
— pallida, II 492
— Provincialis, II. 492.
— regia, II. 316.
— rubiginosa, II. 493.
— rubra, II 492.
— — vulgaris, II. 493.
— sempervirens. II. 493.
— Solis, 654.
— sylvestris, II. 493.
Rosago, II. 215.
Rosaria, II. 575.
Rose pink, 384.
Rosmarinus, II. 505.
— hortensis, II. 505.
— officinalis, II. 505.
— Stoechadis facie, II. 680.
— sylvestris, II. 65.
Ros Solis, 654.
Rossolis Chinae, 532.
Ros Vitrioli, 57.
Rotulae e Althaea. 132.
— anthelminticae, II 179.
— Berberum, 346
— Calami aromat., 371.
— Catechu, 408.
— Citri, 573
— diacreos, II. 21.
— c. Magnesia s. Magnes. Subcarbonate, II. 93.
— Jalapae cocolatae, II. 30.
— c. Ipecacuanha, II. 14.
— Manus Christi, II. 523.
— Menthae piperitae, II. 121
— pectorales, II. 636.
— Sacchari, II. 522.
— contra vermes, II. 143.
— vermifugae, II. 165.
Royal preventive, II. 361. 362.
Rubetae terrestres majores, 720.
Rubia major. II. 513.
— Manjista s. Manjith, II 573.
— sativa, II. 513.
— tinctoria, II. 513.
— tinctorum, II. 513.
Rubigo, 680.
— Chalybis, 680.
— Ferri. 680.
— — praep., 680.
Rubinus, 141.
— Arsenici, 285.
Rubrica fabrilis, 141.
Rubrum Anglicanum, 678.
— cinchonicum, 501.
— montanum, 678.
Rubus arcticus, II. 515.
— Chamaemorus, II. 514
Rubus fruticosus, II. 514.
— Idaeus, II. 515.
— niger. II. 514.
— trivialis. II 515.
— villosus, II. 515.
— vulgaris, II. 514.
Rumex Acetosa. 15
— acutifolius, II. 517.
— acutus, II. 517
— alpinus, II 473
— aquaticus, II. 517.
— Britannica, II. 517.
— crispus, II. 517.
— nemorosus — R. obtusifol.
— obtusifolius, II. 517.
— Patientia, II. 517
— sanguineus, II 517.
— scutatus, 15
Ruptorium commune, II. 391.
Ruscus, II. 518.
— aculeatus, II. 518.
— Hypoglossum, II. 518.
Ruspini's dentifrice, 384.
Ruta, II. 518
— angustifolia, 518.
— capraria, 715.
— graveolens, II. 518.
— hortensis, II. 518.
— muraria, 310.
— sylvestris, II. 518.

S.

Sabadilla. II. 521.
Sabadillina s Sabadillinum, II. 521. 708.
Sabadillum, II. 521
Sabina, II. 38.
Saccharum, II. 522.
— albissimum, II. 522.
— album. II. 522.
— aluminatum, 146.
— Aluminis, 146.
— anthelminticum, II. 130.
— aurantiacum purgans, II. 24.
— candum s. Candis s. cantum, II. 522.
— — rubrum et album, II 522.
— Chinae. 518.
— clarificat., II. 522.
— crystallisat., II. 522.
— — album. II. 522.
— glycyrrhizatum, II. 81.
— hordaceum, 786.
— hordeatum, 786.
— Lactis, II. 48.
— Melasses, II. 522.
— mercuriale. II. 130.
— — compos., II. 139.
— Mercur vermifug., II. 130.
— Molasses, II. 522.
— Moscowatum. II. 522.
— Myrrhae, II. 235.
— myrrhatum, II. 235.
— nitratum II 418.
— non purificatum, II. 522.
— officinarum s. officinale, II. 521.
— perlatum, II. 494. 523.
— Plumbi, II. 365.
— purgans aurat. — Pulv. Jal comp.
— purificatum, II. 522.
— purissimum, II. 522.
— Quinquinae, 518.
— raffinatum II 522.
— rosatum, II. 494.
— rubrum, II. 522.
— Saturni, II. 365
— — depurat., II. 366.
Saccharum saturninum, II. 365.
Sacculus aromaticus, II. 118.
— purgans, II 579.
— resolvens, 155. 181. II 109. 606.
Safranum, 446
Sagapenum, II. 523.
— depuratum, II. 523.
Sago, II 523
— ,Portland Island, II. 523.
Sagu, II. 523
Sagus farinacea, II. 523.
— genuina, II. 523.
— Rumphii, II. 523.
Sal Absinthii, II. 400.
— — citratum, II. 426.
— Aceti — Vapor acet.
— Acetosellae s. Acet. verus, II. 425.
— acetos. ammoniacale, 185.
— — minerale, II 617.
— Alcali minerale, II 608.
— — volat. siccum, 171.
— Alembroth, II. 266.
— Alkali v. Sal Alcali.
— amarum crudum, II. 95.
— — depuratum, II. 95.
— Ammoniacum, 180.
— — Anglicanum, 171.
— — crudum, 180.
— — depuratum, 180.
— — fixum, 389.
— — martiale, 694.
— — nitrosum, 180.
— — purificatum 180.
— — secret. Glaub., 180.
— — tartareum, II. 430.
— — volatile, 171.
— Ammoniacus, 180.
— — fixus, 389.
— — purificatus, 180.
— — volatilis, 171.
— Anglicanum, II. 95.
— — cathartic., II. 95.
— Anglicum s. Anglicus, II. 95.
— — cathart. depurat., II. 95.
— Armoniacum, 180.
— Astracanense artificiale, II. 616.
— Benzoës acidum, 24.
— — essentiale. 24.
— — volatile. 24.
— Boracis acidum, 26.
— — volatile. 26.
— Cardui benedicti, II. 400.
— cathartic um, II. 614.
— — amarum. II. 95.
— — Pearsoni. II. 613.
— Centaurii min., II. 400.
— Chalybis, 685.
— Cheltenhamense, II. 95 616.
— — Thomson's real, II. 616
— Chinae essentiale, 511. 513.
— Cinerum claveil depur., II. 398.
— commune s. communis, II. 605.
— — decrepitat., II. 606.
— — depuratum, II. 606.
— Coralliorum, 390.
— Cornu Cervi, 173
— — — depuratum, 173.
— — — succinat., 190.
— — — volatile, 173.
— culinare, II. 605.
— Dentium Bovis, 173.
— digestivum, II. 420.
— diureticum, II. 420.
— — vegetab, II 427.

Sal diureticus, II. 420.
— — veget., II. 427.
— de duobus, II. 406.
— Ebshamense, II. 95.
— enixum, II. 407. 409.
— Epsomense. II. 95.
— — depurat., II. 95.
— essent. Benzoës, 21.
— — Tartari, II. 406.
— Fabar. Stipit., II. 400.
— febrifug. Sylv., II. 420.
— Fuliginis, 711.
— Gemmae, II. 605.
— Glauberi, II. 614.
— Guindre, II 616.
— Juniperi Ligni, II. 400.
— de Lagaraye, 513.
— lixiviale Tachenian., II. 400.
— Margaritar., 390.
— marinum s. marinus, II. 605.
— — calcareum, 389.
— — Calcariae, 389.
— martiale Lagresie, 686.
— Martis, 685.
— — muriat., 690.
— — — ammoniacale, 691.
— Matris Perlarum, 390.
— Mercuriale acetosum, II. 211.
— Mercurii acetosum, II. 211.
— microcosmic. urinae, II. 408
— mirabile Glaub. crudum, II. 614
— — — depurat., II. 615
— — — siccat, II. 615
— — perlatum, II. 613.
— Modenense artificiale, II. 97.
— Muriat. barotic., 333.
— niger, 605.
— Nitri, II 410.
— Oculor. Cancror., 390.
— Ononidis, II. 400.
— Opii essent, II. 575.
— Ossium, 173.
— panchrestum., 427.
— perlatum, II. 615.
— Petrae. II. 410.
— Placentinus, II. 614.
— Plumbi, II. 365.
— polychrestum s. polychrestus Glaseri, II. 406.
— — Lemery, II. 406.
— — Parisiense, II. 406.
— — Seignette s. Seignetti. II. 435.
— — solubile, II. 435.
— polychrestus, II. 406.
— Prunellae, II. 411.
— pungens, 21.
— Restae Bovis, II. 400.
— Rhabarbari s. Rhei essent., II. 477.
— Rupellens., II. 435.
— sapientiae, II. 206. 406.
— Saturni, II. 365.
— scientiae, II. 206.
— sedativa, 26.
— — Hombergi, 26.
— — mercuriale, II. 196.
— Sedlitzense, II. 95.
— Seidlitzense, II. 95.
— Seidschutzense, II. 95.
— Seignette, II. 435.
— Sennae essent., II. 584.
— Sodae, II. 608.
— — acetatum, II. 617.
— — crudum, II. 608.
— — depuratum, II. 608.
Sal Sodae siccum, II. 609.
— — perf. saturatum, II. 610.
— — purissimum, II. 610.
— Succini. 56.
— — depurat., 56.
— — essent., 56.
— — volat., 56
— Tachenianum, II. 400.
— Tamarisci, II. 400.
— Tartari, II. 399.
— — alcalin. aërat., II. 405.
— — — e Tart. comb., II. 399.
— — depuratus, II. 400.
— — per se liquid., II. 401.
— — perf. saturat., II. 405.
— — purissimum, II. 400.
— — sulphurat. s. vitriolat., II. 406.
— — volatile, 173.
— Thermar. Carolin., II. 616.
— Urinae fusibile, II. 408.
— — microcosmic., II. 408.
— — nativum, II. 408.
— — volatile, 173.
— urinos. purissimum, 171.
— vegetabil., II. 427.
— vitae, II. 206.
— Vitri, II, 409.
— Vitrioli narcoticum, 26.
— volatile, 171.
— — Ammoniaci, 171.
— — Anglicanum, 171.
— — aromaticum, 175.
— — concretum, 173.
— — Cornu Cervi, 173.
— — oleos. Angelicae, 214.
— — — Sylvii, 161.
— — Salis Ammon., 171.
— — Succini. 56.
— — Tartari, 173.
— — urinae. 173
— vomitor. Vitrioli, II. 728.
— Westendorfii, 21.
Salab, II. 521.
Salap. II. 521.
Salep, II. 521.
Salicaria, II. 525.
Salicina s Salicinum, II. 526.
Salivalis, II. 453.
Salix alba. II. 526
— amygdalina, II. 526.
— Babylonica, II. 526.
— capraea, 526
— eriocephala, II. 526.
— fragilis, II 526.
— Helix, II. 526.
— latifolia, II. 526.
— laurea, II. 526.
— monandra, II. 526.
— pentandra, II. 526.
— purpurea, II. 526.
— Russeliana — S. frag.
— viminalis, II. 526.
— vitellina, II. 526.
Salsaparilla, II. 544.
— Germanica, 445.
Salsilago ammoniacalis, 185.
— — acetosa, 185.
— Cornu C. succinata, 191.
— Oxytartari, II. 422.
Salsola Kali, II. 527.
sativa — S. Soda.
— Soda, II. 527.
— Tragus, II. 527.
Salvia agrestis, II. 680.
— aethiopica, II. 528.
— Cretica, II 528.
— Horminum, II. 528.
— hortensis, II. 528.
— lyrata, II. 528.
— minor, II. 528.
Salvia Oculus Christi, II. 528
— officinalis, II. 527.
— pratensis, II 528.
— Sclarаea, II. 528
— sylvestris, II. 680.
— Verbenaca, II 528.
— verticillata, II. 528.
— virtutis, II. 528.
— vitae, 310.
Sambucus, II. 535.
— agrestis, II. 534.
— Canadensis, II. 535.
— Ebulus, II. 534.
— humilis, II. 534.
— nigra. II. 535.
Sampsuchum, II. 311.
Sanamunda, 742.
Sandaraca, 285. II. 539
— Germanica, II. 539.
Sandaracha Graecorum, 258
Sanguinalis, 476.
Sanguinaria 476. 742. II. 683.
— Canadensis, II. 539.
— minor, II. 330
Sanguis Caprae Ibicis, 721.
— Draconis, II. 539.
— — in cannis, II. 539.
— — factitius, II. 540.
— — in granis, II. 539.
— — in guttis, II. 539.
— — in lacrymis, II. 539.
— — in placentis, II. 539.
— — in tabulis, II. 539.
— — Hirci, 721.
Sanguisorba, II. 339.
— officinalis, II 339.
Sanicula. II. 540.
— alba, 614.
— Europaea. II. 540.
Santalina s. Santalinum, II. 541.
Santalum album, II. 541.
— citrinum s pallidum, II. 541.
— rubrum, II. 540.
Santolina, II. 542.
— Chamaecyparissias, II. 542
Santonicum, 551.
Sapa Aceti, 18.
— Uvarum, II. 718.
— vomit. Sylvii, 255.
Sapo acetico-aethereus, II. 443
— aceticus aeth., II. 443
— Acidi sulph., 60.
— acidus, 60. II. 668.
— — Achardi, 60.
— — sulphuricus, 60.
— Aetheris acetici, II. 443.
— albus, II. 436. 437.
— alcoholico-ammoniac. s. ammoniat., 167.
— Alicantinus, II. 436.
— Aloensis, II. 436.
— Aloniensis, II. 436.
— ammoniacalis, 164.
— — camphorat., 167.
— ammoniaco-camph., 167.
— Ammoniae, 164.
— — oleaceus, 164.
— amygdalinus, II. 437.
— animalis, II. 437.
— — aromat, II. 438.
— antimonialis, 246.
— Antimonii, 246.
— antiphlogist. resolv., II. 363.
— antisialagog. Singeri, II. 396.
— aromaticus, 167. II. 440.
— — pro balneis, II. 438.
— arthritic. Pottii, II. 668.
— cacaotinus, II. 437.
— calcareus, 375.
— Calcariae, 375.

Sapo Castillanus marmoratus, II. 436.
— Cerae, II. 604.
— cereus, II. 604.
— chemic. Dippelii, II. 395.
— — pro usu ext., II. 669.
— chymicus, 176.
— cosmeticus, II. 438.
— domesticus, II. 436.
— durus, II. 436.
— guaiacinus, 756.
— Gummi Ammon., 766.
— — Gutti, 773.
— Hispan. (albus), II. 436.
— Hydrargyri, II. 214.
— Hydrosulphureti Oxyduli Stibii sulphurati, 246.
— Jalapae s. Jalappae, II. 29
— jalappin. s. jalapinus, II. 29
— kalicus, II. 437.
— liquidus, II. 438.
— medicinalis, II 437.
— — amygdalinus, II. 437.
— Medull. bovin., 437.
— — — ammoniacal. camph, 167.
— mercurialis, II. 135. 214.
— — Chaussieri, II. 214.
— — volatilis, II. 138.
— Mercurii, II. 214.
— mollis, II. 437.
— niger, II. 437.
— nostras, II. 436.
— Olei Crotonis, 612.
— — Terebinth. et Potass, II. 669.
— oleos. — S. Alicant.
— ex Oleo Terebinth. et Potass., II. 669.
— ex Olivo, II 436.
— — et Soda, II. 437.
— piceus, II. 437.
— Potass. terebinthinaceus, II. 669.
— Resinis medicatus, II. 438.
— Sodae medicinalis, II. 437.
— — oleaceus s. oleos. — S. Alicant. et medicat.
— — sebaceus, II. 436.
— — sulphuratus, II. 605.
— sebaceus — S. domesticus.
— Starkeyanus, II. 669.
— stibiatus, 246.
— sulphurato - ceratus, II. 396
— Sulphureti Sodae, II. 605.
— superammoniacatus, 164.
— tartareus, II. 669.
— — Starkevi, II. 669.
— Tartari, II. 669.
— terebinthinat., II. 669.
— Tiglii, 612.
— de toelette. II. 438.
— transparens, II. 437.
— vegetabilis, 767. II. 401. 437.
— Venetus, II. 436.
— viridis, II. 437.
— vitri s. vitriariorum, II. 101.
— Wologdensis, II. 437.
Saponaria officinalis, II. 542.
— rubra, II. 542.
— vaccaria, II. 542.
Saponina s. Saponinum, II. 542.
Sapota dissecta, 500
— salicifolia, 500.
Sapphirus, 141.
Sarcocolla, II 543.
Sarcocollinum, II. 543.
Sarsa, II. 544
Sarsaparilla, II. 544.
— ,country, II. 544.
Sassafras, II. II. 552. 553.
Satureja, II. 554.
— capitata, II. 554.
— durior, frutescens, II. 554.
— hortensis, II. 554
— Juliani, montana, spicata, II. 554.
— Thymbra, II. 554.
Saturnus, II. 351.
— acetosus, II. 365.
— phosphoratus, II 351.
Saxifraga alba, II. 555.
— Anglicana, II. 599.
— aurea, II. 555.
— Cotyledon, II. 555.
— granulata, II. 555.
— rubra, II. 621.
— tridactylites, II. 555.
— vulgaris, II. 599.
Scabiosa arvensis, II. 555.
— Succisa, II. 555.
Scammonium, II. 555.
— Aleppense, II. 556.
— de Aleppo. II. 556.
— Americanum. II. 109.
— Halepense, II. 556.
— Monspeliacum. II. 556.
— Smyrnaeum, II. 550.
— Smyrnense factitium, II. 557.
— Syriacum, II. 556.
Scammony, potatoe slip, II. 556
Scandix Cerefolium — Chaerophyll. sat.
Scarabaeus unctuarius, II. 116.
Scariola, 543. II. 51.
Schinus molle, II. 107.
Schoenanthus, 206.
Scilla marina, II. 559.
— maritima, II. 559.
— — exsiccata, II. 560.
— praeparata. II. 560.
— rubra, II. 559.
Scillitina s. Scillitinum. II. 559
Scincus, 720
— maximus, 720.
— officinalis, 720.
Sclarea, II. 528.
Scleroderma cervinum, 352.
Sclerotium Clavus, II. 574.
Scobs Ferri, 670.
— Ligni Sant. rub., II. 541.
— styracina, II. 627.
Scolopendrium, II. 573.
— officinale s. officinarum, II. 572
— verum, 482.
Scoparia, 732.
Scordium, II. 680.
Scorodonia, II. 680.
Scorpio Europaeus, 720.
Scorzonera, II. 573.
— Hispanica, II. 573.
— humilis, II. 573.
— latifolia sinuata, II. 573.
— purpurea subcaerulea, II. 573.
Scrofularia, II. 573. 574.
Scrophularia aquatica, II. 573.
— foetida, II. 574
— nodosa, 573. 574.
— vulgaris, II. 574.
Scutum antispasmodicum, II. 302.
— stomachicum, II. 302.
— pro umbilico, 304.
Scyphophorus cocciferus, II. 66.
— pyxidatus, II. 66.
Sebaceum Palmae, II. 254.
Sebestena. II. 241.
Sebum v. Sevum.
Secale, II. 574.
Secale cereale, II. 574
— cornutum, II. 574.
Sedum acre. II. 575.
— album, anacampseros, cepaea, II. 575.
— majus, II. 575.
— minimum, II. 575.
— minus, II. 575.
— Rhodiola, II. 575.
— Telephium, 607.
Segestria cellaria, 276.
Seggrum, II. 576.
Selinum Cervaria, II. 576.
— carvifolia, II. 576.
— Galbanum — Bubon.
— Oreoselinum, II. 576.
— palustre. II. 576.
— sylvestre, II. 576.
Semen Cinae, 551.
— Contra, 551.
— Cynae, 551.
— Lumbricorum, 551.
— sanctum, 551.
— Santonicum, 551.
— Sinae, 551.
— contra vermes, 551.
— Zedoariae, 551.
Sementina, 551.
Semina frigida majora, 614.
— Adiowaen, 155.
— Perlarum, 380.
Sempervivum, II. 575.
— tectorum, II. 575.
Sené de la pique etc. II. 577.
Senecio, II. 576.
— coeruleus, 658.
— Jacobaea, II. 576.
— vulgaris, II. 576.
Senega, II. 385.
Senegina, II. 385.
Seneka, II. 385.
Senna, II. 577.
— Arabica, Indica, de Mokka, II, 577.
— de la Palthe, II. 577.
— powder, Battley's green, II. 578.
— Tripolitana, II. 577.
Sepia officinalis, 380.
Sepiae Os, 380.
— — praep., 381.
Septifolium, II. 687.
Septinervia, II. 349.
Serici Folliculi, II. 597.
Sericum adhaesivum, 729.
— Anglicum, 729.
— crudum, II. 597.
— glutinans. 729.
— tostum, 437.
Seris, 543.
Serpentaria, II. 573.
— minor, 295.
— rubra, 351.
— Virginea, 280.
— Virginiana, 280.
— Virginica, 280.
— vulgaris, 351.
Serpillum, II. 684.
Serpyllum, II. 684.
Serum, II. 48.
— Lactis. II. 48.
— — acetosum. II. 597. 598.
— — acidum, II. 598.
— — aluminatum, 151. II. 598.
— — aluminosum, 151. II. 598.
— — — c. Cinnamomo, 152.
— — antiscorbuticum, 581. II. 598. 645.
— — aperitivum, II. 97.
— — chalybeatum, II. 597.

Serum Lactis clarificatum, II. 597.
— — compositum, II. 598.
— — depurans, II. 598
— — depuratum, II 597.
— — diluens, II 598
— — dulce, II. 597.
— — — Hoffmanni, II. 597.
— — dulcificatum, II. 597.
— — Haguenoti, 775.
— — mannatum, II. 104.
— — praeparatum, II. 597
— — pulveratum, II. 597.
— — purgans, II 104.
— — cum Sinapi, II 602.
— — sinapinum, II. 602.
— — sincerum, II. 597.
— — van Swieten. II. 435.
— — tamarindatum, II. 645.
— — tamarindinat., II. 645.
— — tartarisatum, II 598.
— — temperans, II. 645.
— — vaccinum, II 597.
— — vinosum, II. 597.
— — Weissii, II. 588
Sesamum, II 598.
— orientale, II. 598.
Seseli, II. 54.
— Creticum, II. 599.
— Massiliense, II. 599.
— montanum, II. 599.
— pratense, II. 599
— tortuosum, II. 599.
Sesquicarbonas Ammoniae, 171.
Sesquichloreti Ferri Liquor, 691.
Sesquichloruretum Ferri, 690.
Sesquisulphuretum Arsenici, 285.
Sevadilla, II. 521.
Sevum, 68.
— bovillum s. bovinum, 68.
— bubulum, 68
— cervinum, 68.
— Ceti,
— hircinum, 68.
— ovillum. 69.
— praeparatum, 68.
— vaccinum, 68.
— vervecinum, 69.
Sherbet, orange, 574.
— ,raspberry, II. 516.
Shrub, brandy, punch, rum II. 6.
Siciliana, 797.
Sideritis hirsuta, II. 622.
Siderocyanas Ferri, 707.
Sief album, II. 355
— — cum Opio, II. 355.
Sigesbeckia orientalis, 65
Sigillum Salomonis, 731.
Silene, II. 599
— Behen, 339.
— Otites, II. 599
— Virginica, II 599.
Siler montanum, II. 54.
Silicas Aluminae et Ferri, 144.
— — et Glucini, 144.
— — et Sodae, 144.
— Magnesiae, II. 97.
— Zirconii, II. 736.
Siliciphthoruretum Aluminii, 143.
Siliqua Banillae, II. 707.
— dulcis, 479.
— hirsuta II. 625.
— Vanigliae s. Vanillae, II. 707.
Silurus Glanis, 719.
Simarouba, II. 599.
— amara, II. 599.
Simaruba, II. 599.
— officinalis, II. 599.
Sina 561.
Sinapis II. 600.
— alba, II. 600.
— arvensis, dichotoma, glauca, II. 600
— nigra, II. 600.
— ramosa Sinensis, Tori, II. 600.
Sinapismus communis, II. 601.
— fortior, II. 601.
— irritans, II. 601.
— mitior, II 601.
— simplex, II. 601.
Sinopis, 121.
Siphonia Cahuchu, II. 470.
— elastica — S Cachuchu.
Sirium myrtifolium, II. 541
Sisarum, II. 604.
Sison, II. 603.
— Amomum, II. 603.
— amphibium, II. 603.
— segetum, II. 603
Sisymbrium Nasturtium, II. 243
— Sophia, II. 603.
— sylvestre, II. 117.
Sium Ammi, 154.
— angustifolium, II. 603.
— berula. II. 604.
— latifolium, II 603.
— Ninsi, II 604.
— nodiflorum, II. 603.
— Sisarum. II. 604
Smaltum 577.
Smaragdus, 144.
Smerillus, 141.
Smilacina s. Smilacinum, II. 544.
Smilax China, 499.
— aspera, II. 544.
— officinalis — S. syphil.
— Sarsaparilla, II. 544.
— syphilitica, II. 544.
Smiris, 141.
Smyris, 141.
Snuff, cephalic, 777.
Soap, transparent, II. 437.
Soda, II. 6 8.
— acetata, II. 617.
— acetosa. II. 617.
— aërata, II 608.
— Alicantina s. alonensis, II. 608.
— boraxata. II. 611.
— caustica, II. 604.
— — fluida s. liquida, II. 604.
— communis, II. 608.
— cretacea, II. 608.
— depurata. II. 608.
— effervescens, II. 608.
— impura, II. 608.
— — aërata, II. 608.
— muriatica, II. 605.
— nativa. II. 608.
— phosphorata, II. 613.
— phosphorica, II. 613.
— pura, II. 604
— — liquida. II. 604.
— purificata, II 608.
— sulphurica, II 614.
— tartarisata s. tartarizata, II. 435.
— vitriolata, II. 614.
Sodae Carbonas, II. 610.
— Murias, II. 605.
— — exsiccat., II. 606.
— Phosphas, II. 613.
— Subboras, II. 611.
— Subcarbonas, II. 608.
— — exsiccata. II. 608.
— Sulphas, II. 614.
— Sulphuretum, II. 604.
Sodium. II. 603
— iodatum, II. 11.
Sol, 315.
Solamen hypochondriacorum, II. 427.
— Scabiosorum. 712.
Solanina, 654 II. 618. 619.
Solaninum, 654. II. 618 619.
Solanum Dulcamara, 654.
— furiosum, 312.
— incanum, II. 618.
— lethale, 312.
— lignosum. 654.
— Lycopersicum, 618.
— maniacum, 312. 640.
— Melongena, II. 618.
— nigrum II. 618.
— quadrifolium, II. 329
— racemosum, II. 338
— scandens, 654.
— tuberosum, II. 618.
— vesicarium, 96.
— vulgare, II. 618.
Soldanella. II. 619.
Solenostemma Arghel — Cynanchum.
Solidago odora, II. 616
— Saracenica, II 716.
— Virga aurea, II. 716.
Solutio Acetat. Cupri et Muriat Ammon, 627.
— Acetatis Cupri, 631.
— — Ammoniae, 185.
— — Mercurii, II. 212.
— — Morphinae, II. 213.
— — Plumbi aquosa, II. 369
— — — — opiacea, II. 369.
— — — cryst. fortior, II. 371.
— — plumbici, II. 361.
— — s. Acetitis Zinci, II. 733
— Acetitis zincici II. 733.
— Acidi arsenicosi et Nitrat. Potass., 290.
— — muriat. oxyg. vaporif., 331
— — nitrici vaporif., 50.
— aetherea, 148.
— Albuminis. II. 315.
— alexiteria, 31.
— — Gaubiana, 275.
— — oxygenata, 541.
— aluminosa, 148
— Ammoniaci subcarb. alcoholis., 176.
— Ammoniureti Cupri. 627.
— antipsorica c. Chloruret. Calcariae, II. 738
— antiscorbutica, 335.
— antiscrophulosa, 335
— antistrumalis s. antistrumosa, II. 11.
— Arseniatis Ammoniaci, 292
— arsenicalis, 287. 290.
— — amara, 290.
— — Borussica, 291.
— — Brerae, 291.
— — Fowleri, 290.
— — Heinii, 290
— — Jacobi 290.
— — natrosa, II. 737.
— — simplex, 291.
— arsenicata, 290.
— Arsenici, 287.
— — Deutoxydi, 287.
— Arsenitis kalici, 290.
— — Potassae, 290.
— Asae foetidae, II. 737.
— atrophica, II. 10.
— balsamica alcalisata II. 610.

Solutio Barytae muriat., 334.
— Belladonnae, 314.
— Bromii aquosa, II. 711.
— Calcariae muriat., 390.
— — sulphurato-stibiatae, 249.
— Calcis, 374.
— — Muriatis, 390.
— — oxygenata, 377.
— Camphorae aeth., 308.
— — aquosa, 305.
— — oleosa, 401.
— cathaereticа, 285.
— cerata, 266.
— Chlorat Potassae, II. 419.
— Chlorur. Calcis alcoholis., II. 738.
— Citratis kalici, II. 426.
— — Morphinae, II. 224.
— citro-muriatica, II. 606.
— Cohenii, II. 393.
— Coindeti, II. 10.
— Cremoris Tartari, II. 432.
— cuprata, 622.
— Cupri ammoniacalis, 631.
— — ammoniata, 624.
— — sulph. aquosa, 621.
— cupro-arseniata, 285.
— Deutochlorureti Merc., II. 207.
— Deutoiodureti Merc. alcohol, II. 194.
— — — — aetherea, II. 194.
— Elaterii, II. 220.
— emetica, 622.
— epispastica, 256.
— evaporatoria, 85.
— excitans, II. 606.
— Extracti Malv. sylv. alcoh., II. 101.
— — Nucis vom., II. 251.
— ferrata, 707.
— Ferri aluminosa, 688.
— — muriat. c. Baryta muriat., 335.
— — Protosulphatis, 686.
— — Sulphatis, 687.
— Ferrocyanatis Potassae, 40.
— Fowleri, 290.
— Fuliginis foetida, 304.
— gelatinosa, 723.
— Guajaci gummosa, 755.
— Gummi Guttae alcalina, 773.
— Haematini, II. 73.
— Hahnem. saponacea, II. 440.
— Heinekii, 292.
— Hepatis Sulphuris, II. 397.
— hydrargyrata, II. 192.
— Hydrarg. gummosi, II. 128.
— Hydriodatis Potassae, II. 9.
— — — iodurati II. 10.
— Hydrochloratis Ammoniaci et Ferri, 690.
— — Morphinae, II. 224.
— — Zinci aetherea, II. 722.
— Hydroiodatis Potassae, II. 9.
— — — iodurati, II. 10.
— hypnotica, II. 266.
— Indigo, II. 2.
— Iodinae, II. 7.
— — alcoholica, II. 8.
— iodurata, II. 710.
— — rubefaciens, II. 740.
— lithontriptica, II. 401.
Solut. lithontriptica della Lena, II. 423.
— Malatis Ferri, 699.
— Marryati, II. 185.
— mercurialis, II. 207.
— Mercur. corros., II. 184.
— mineralis, 290.
— — Fowleri, 290.
— mucilaginosa, 768. II. 689.
— Muriat. Ammon. acetata, 183.
— — Auri, 316.
— — Barytae, 334.
— — Calcis, 367. ?
— — — hydrargyrata, II. 148.
— — Ferri, 691.
— — — composita, 691.
— — ferrici aetherea, 692.
— — — spirituosa, 691.
— — — spirituoso-aeth., 692.
— — Hydrarg. oxydati, II. 207.
— — — — corrodens II. 185. 207.
— — — — et Ammoniae fortior, II. 207.
— — — — — dilutior, II. 207.
— — — oxygenati, II. 184.
— — Potassae oxygenati, II. 419.
— Zinci aetherea, II. 722.
— Myrrhae, II. 238.
— — alcalisata, II. 238. 240.
— — alcoholica, II. 239.
— Nitratis Argenti, 278.
— — — lusi, 278.
— — Hydrarg. ammoniacal., II. 205.
— — Sodae, II. 617.
— nitricata s. nitrosa, 51.
— Nitromuriat. Platini, II. 350.
— Opii alcoholisata, II. 265.
— Oxydi Calcii, 374.
— Oxymuriatis calcici, 377.
— — Calcis, 377.
— Pearsoni, 291.
— Pyromellis, 669.
— Plumbi in Acido acetoso, II. 358.
— — Subacetatis, II. 361.
— Potassae, II. 390. 393.
— — alcoholica, II. 393.
— — caustica, II. 390.
— prophylactica contra scarlatin., 314.
— Resinae Guajaci aquosa, 755.
— resolvens Niemanni, 183.
— — Vogleri, 183.
— Rob Juniperi, II. 41.
— salina gelatinosa, 76. II. 616.
— salino-gelatinosa, 76.
— Salis Ammoniaci fixi, 390.
— saponacea Hahnemanni, II. 440.
— Saponis, II. 440.
— — aetherea, II. 443.
— — alcoholica, II. 440.
— — — aromat, II. 441.
— — — — et camph., 442.
— — — camphorata, II. 442.
— — — — et opiacea, II. 443.
— Saviardi, II. 393.
Solut. sedativa, II. 266. 268.
— Sodae Muriatis, II. 606.
— ad strumam, II. 11.
— styptica, 623.
— — Loofii, 691.
— Subacetat. Cupri et Ammon., 631.
— — plumbici, II. 361.
— Subcarbonat. Ammoniaci alcoholica, 159.
— — Ammoniae, 172.
— — ammonici spirit., 159.
— — Potassae aquosa, II. 401.
— Sublimatis, II. 183.
— — corros. alcoholica, II. 184.
— — — — opiacea, II. 191.
— — — aetherea II. 186.
— — — aquosa, II. 182.
— Sulphatis Argenti — Liq. Arg. sulph.
— — Cupri, 621.
— — — et ammon., 624.
— — — aromatisata, 624.
— — — camphorata, 624.
— — — composita, 623.
— — Potassae, II. 409.
— — Zinci, II. 729.
— — — aluminosa, II. 732.
— — — aquosa simpl., II. 729.
— — zincici, II. 729.
— Sulphureti Antimon. e Calcis, 249.
— — Potassae alcoholica, II. 398.
— Supersulph. Alum. et Potass. comp., II. 732.
— Tart. depurati, II. 432.
— — solubilis, II. 427.
— — — alcoholica, II. 428.
— — — aquosa, II. 427.
— Tartrat. Stib. et Potass., 256.
— Thaecheri, 175.
— Veratrini, II. 709.
— vitriolica, II. 732.
— Weikardi, II. 208.
— Zinci aluminosa, II. 732.
Solutiones ioduratae, II. 740.
— Kali iod. ad balnea, II. 742.
Sonchus asper, II. 619.
— laevis, II. 619.
— oleraceus, II. 619.
Sophia Chirurgorum, II. 603.
Sorbus, II. 620.
— aucuparia, II. 620.
— domestica, II. 619.
Sotirella parva, II. 286.
Soymida, II. 642.
Sparadrap s. Sparadrapum adhaes., II. 672.
— album, II. 356. 375.
— aromaticum, II. 233.
— e Cetaceo, 482.
— commune, 269. II. 655.
— compos. cum Emplastris, II. 375.
— ad corpus condit. involv., II. 273.
— desiccativ. s. exsiccans, II. 356.
Diachyli, II. 373.
— cum Emplastris, II. 660.
— epuloticum, II. 375.
— pro fonticulis, II. 353. 375.
— Goulardi, II. 305.
— ordinarium, 269.

Sparadrap pallidum, II. 373.
— resinosum, II. 675.
— resolvens. II. 369.
— rubrum, II. 150. 353.
— vesicans, 332.
— viride, 621. 629.
— vulgare, 369.
Spartium junceum, 732.
— scoparium. 732.
— spinosum, II. 448.
Spathula foetida, II. 19.
Spathum s. Spatum calcareum 372
— ponderosum. 336.
Species Acidi muriat. pro vaporibus, 34.
— — nitrici pro vaporibus, 50.
— adstringentes, II. 216 451.
— — pro gargarismate, II. 451.
— Althaeae, 129.
— — compositae, 131.
— amarae, 13 474
— amaricantes, 13.
— anodynae, 435. II. 324.
— anthelminticae, 13 280.
— antihaemorrhoidales, 99.
— antinephreticae. 272.
— antipsoricae, 746.
— antiscorbuticae, II. 341. 463.
— antispasmodicae, II. 702.
— aperientes, 273
— aperitivae majores 273.
— — minores, 273.
— — c Rheo, 273.
— contra apoplexiam, II. 317.
— aromaticae. 403. 485. II 60. 87. 505. 508
— — caryophyllatae, 405.
— — — completae, 405.
— — pectorales v. Sp. bechicae, 774
— — rosatae, 403. 404.
— — — completae, 404.
— — vulnerariae, II. 528
— avenaceae, 319.
— bechicae. 445. 483. 667. 774. II. 37. 79. 385. 718
— pro brodio Avenae, 319.
— de Bryonia 357.
— carminativae, 447. 486.
— caryocostinae, II. 556.
— ad cataplasma, 129
— pro cataplasmate emoll, 129.
— cathartieae et sudorif., 262.
— cephalicae. 181. II. 118.
— — pro cucuphis, II. 20.
— — — epithemate, II 60.
— — — fomentatione, II. 60.
— — — sacculo, II. 20.
— pro clysmate. 131.
— cordiales, II. 71
— — temperatae, II. 71.
— pro cucuphis, II 60.
— Decocti antinephrit., 272
— — pro gargarism. ad string., II. 451.
— — Lignorum, 445. 756.
— — antipodagrici Viennens., 757.
— — nephro-cathart. Foresti, 272.
— pro Decocto antiarthrit, 757.
— — — antipsorico, 746.
— — — antipodag. Viennens., 757.
— — — Avenae, 319.
Species pro Decocto carminativo, 447.
— — — demulcente, 766.
— — — Flor. et Fruct., II. 37.
— — — ad gangraenam, II. 504.
— — — — infantum, 721. II. 79.
— — Lignorum, 445. 756.
— — nigro, 716
— — vulnerario, II. 340.
— ad Decoct. Lignorum, 756.
— depurantes, 2.
— detergentes s. detersivae, 757.
— Diaboracis, II. 612.
— Diacinnamomi, 403. 405.
— Diacretae, 333.
— Diaereos. II. 20.
— Diajalapae, II 24.
— Diamargaritae frigidae, II. 252.
— — calidae, II. 735.
— Diambrae, 403. 405.
— — sine odoratis, 403. 404.
— — completae, 405.
— Dianisi, 221.
— Dianthos. II. 505.
— Diapentes, II. 237.
— diaphoreticae, II. 535.
— Diarrhodon, II. 504.
— Diascordii, II 304.
— Diatragacanthae, II. 690.
— — frigidae. II. 690.
— Diatrion Santalon, II. 542.
— Diaturbith c. Rheo, II 473
— discutientes, 14.
— diureticae, 271. 272. 308. II. 332.
— emmenagogae, 357.
— emollientes, 129. 485. II. 100.
— — ad s. pro cataplasm., II. 76.
— — ad enema, 131.
— ad enema 131
— pro enemate emolliente, 131.
— pro epithemate, II. 504.
— — cordis et pulsuum. II. 504.
— febrifugae 502.
— ad fomentum, II. 87.
— — emolliens, 129.
— pro fomento emoll., 130.
— pro fotu ad colicam, 486.
— — — emmenagogo, 357.
— — ad gangraenam, 14.
— — antihaemorrhoid., II. 452.
— — laterali, II. 325.
— fotus discut. et nervini, 181.
— ex Fructibus bechicis, 445
— fumales, 343
— — pro suffimento, II. 255.
— ad fumigat. anticontag., 62
— pro fumigationibus, 343.
— — fumo, 343.
— contra grangraenam, 14. II 504.
— ad gargarisma, 130.
— pro gargarismate, 130
— — adstringente, II. 451.
— — emolliente, 130. II. 100.
— de Gemmis frigidae, II. 253.
— guajacinae comp., II. 543.
Species Herbarum pro Inf. analept, 282.
— Hierae picrae, 113.
— de Hyacintho, II. 503.
— Imperatoris, 403. 404.
— pro Infuso diuretico, II. 332.
— — pectorali, 131.
— ad Infusum pectorale, 131.
— lactificantes completae, 405.
— — Rhazis, 403 405.
— lenientes, 766.
— Lapid pretios. frigid., II. 253.
— Lignorum, 756. II. 543.
— mundificantes, 2.
— nephro-cathart. Foresti, 272.
— nervinae, 557.
— — pro cucuphis, II. 647.
— — externae, II. 118
— pro odoramento, II. 20.
— odoriferae, II. 20.
— pectorales. 71. 131. 667. 721. II. 67. 79. 711.
— — cum Fructibus, II. 37.
— contra pleuresiam. II 385.
— pro potu infantum. II. 79.
— purgantes, II 577
— resolventes, 14 486. II. 453. 513. 543.
— — externae. 14.
— contra scorbutum, II. 463
— e Scordio cum Opio, II. 304.
— — — sine Opio, II. 682.
— — sputum sanguinis, II. 216.
— sternutatoriae, 317. II. 505.
— sudorificae, 332. 445. II. 535. 540.
— — ad Decocta paranda, 756.
— ad suffiendum, 343.
— pro Thea, II. 111. 711.
— — — amara, II. 698.
— — Tisana, 711
— Turion. Pini comp, II. 341.
— pro vaporib. Acidi acet., 21.
— — — — muriat., 34.
— — — — nitrici, 50.
— — — Superoxydi muriat., 540.
— vermifugae, 13
— viscerales pro clysmate enematib. Kaempfii, II. 64
— vulnerariae, 474 II. 340 519 528.
Specificum antatrophic. Wepferi, 712.
— antepilept. Weismanni, 623.
— antifebrile Crollii, 374
— cephalicum. II. 157.
— Cranii, 226.
— Genevense, II. 211.
— Helvetii, 145.
— jalapinum, II. 24.
— Paracelsi, II. 476
— stomach. Poterii, 230
— Tart. pharyngicum, 147
— de Zobel, 147.
Specilla cerea, II. 373.
Sperma Ceti, 479.
— Mercurii, II. 211.

Sperma Ranarum, 720.
Sperniola Crollii, II. 236
Sphaera marina, II. 338.
— thalassia, II. 338.
Sphaerococcus Helmintoch. — Gigartina.
Sphondylium, 353.
Spica, II. 59
— alpina, II. 243.
— Celtica, II. 243.
— Indica, II 243.
— Nardus, II. 243.
— vulgaris, II. 59
Spigelia anthelmia, II. 620.
— Marylandica, II 620.
Spilanthus, II. 244.
— Acmella, 65.
— oleraceus, 65. II. 244.
Spina alba, 442. 443. II. 215.
— cervina, II. 471.
— domestica, II. 471.
Spinachia, II. 621.
Spinacia, II. 621.
— oleracea, II. 621.
Spinae dorsi Mustelae Piscis, 387.
— Viperae, 719.
— Vulpis, 719.
Spiraea Filipendula, II. 621.
— salicifolia et tomentosa, II. 622.
— trifoliata, 743. II. 12.
— Ulmaria, II. 621.
Spirits, Freeman's bathing, II. 443.
— Jacksons bathing, II. 271. 443.
Spiritus Absinthii, 5.
— Abietis, 2.
— Aceti, 17. 20.
— acetico-aethereus, 75.
— Acidi sulph. German., 57.
— Aeruginis, 19.
— aethereus nitrosus, 78.
— — vitriolatus, 82.
— Aetheris aromaticus, 419.
— — ferratus, 692.
— — nitratus, 77.
— — nitrici, 77.
— — nitrosi, 77.
— — sulphurici, 82
— — — comp., 82.
— — vitriolici, 82.
— — — compos., 82.
— Alcali volat., 159.
— alexiterius, 411.
— Aluminis, 57.
— Ammoniacal. aromaticus, 161.
— — terebinth., 161.
— ammoniacatus, II. 270.
— Ammoniae, 148.
— — anisatus, 160.
— — aromaticus, 161.
— — composit., 161.
— — dulcificatus, 159.
— — dulcis, 159.
— — foetidus, 302. 304.
— — succinatus, 168.
— — cum Succino, 168.
— — vinosus, 159.
— ammoniato-anisat., 160.
— Angelicae, 212. 217.
— — compos., 213.
— — — camphorat., 213.
— Anhaltinus, II. 664.
— Anisi, 223.
— — compos., 223.
— — stellati, 225.
— Anthos, II. 570.
— antihystericus, 302. 460.
— antiictericus, II. 663.
— antiscorbut. Drawitzii, 583.
Spiritus aperitiv. Renoti, 55.
— Armoraciae, II. 464.
— — compos., II. 464.
— aromaticus, 411. II. 113 217. 511. 685.
— — acetosus, II. 61.
— — acidus, II. 217.
— — ammoniacalis, 161.
— — camphoratus, 213.
— arthriticus Pottii, II. 608.
— Aurantior abstractit., 560
— — Cortic., 560.
— Balsami Copaivae, 322.
— — Peruviani, 327.
— balsamicus, II. 665.
— Beguini, 181.
— bezoardicus Bussii, 192.
— Bryoniae alb. comp., 461.
— caeruleus, 632.
— Camphorae, 399.
— camphorato-crocatus, 399.
— camphoratus, 399.
— Cantharid. ammoniacal., 161.
— Cari Carvi, 448.
— carminativus, II. 512.
— — Sylvii, 214.
— — de tribus, 56.
— Carvi, 448.
— Caryophyllorum aromat., 450.
— Cassiae, 410.
— Castorei s. C. compos., 460
— Cerasorum nigror., 479.
— cinnamomatus, 410.
— Cinnamomi, 410.
— Citri Corticis, 570.
— Cochleariae, 581.
— — compos., 482.
— Colchici ammoniatus, 587.
— Convallariae, 603.
— Coriandri, 604.
— Cornu Cervi, 173.
— — — rectificat., 174.
— — — succinat., 191.
— — — vinosus, 159.
— Cortic. Aurantior., 560.
— Croci, 609
— Diatrion, 55.
— Eboris, 174.
— febrifugus Cluttoni, 83.
— Foeniculi alcalinus, 210.
— Formicarum, 19. 709.
— Fragariae, 711.
— Frumenti, 89.
— — concentratiss., 93.
— — concentratus, 93.
— — depuratus 89. v. Alcohol dilut.
— — dilutus, 93.
— — rectificatus, 93.
— — vinosus, 89.
— Fuliginis, 19. 711.
— fumans Beguini, 184.
— Fumariae, 713.
— Hyssopi, 802.
— Jasmini, II. 22. 33.
— Juniperi, II 43.
— — compositus, II. 43.
— Lauri Cinnamomi, 410.
— Lauro-Cerasi, 41.
— Lavandulae s. Lavendulae, II. 62
— — ammoniacalis, II. 64.
— — compositus, II. 63.
— Ligni Guajaci, 747.
— Liliorum Convallium, 603.
— Lumbricorum, 174.
— — vinosus, 160.
— Mastiches compos., II. 107.
— mastichinus, II. 107.
— Mastichis, II. 107.
— matricalis, II. 107.
Spiritus Melissae, II. 113
— — compositus, II. 113.
— — magistralis officin. II. 113
— Mellis s. Mellis Andernaci, 265
— Menthae crisp., pip., sativae, virid. et vulg, II 123. 124
— — saccharatus, II. 124.
— Millefolii comp, II. 217.
— — acetatus, II 217.
— Mindereri, 185. 186.
— muriatico-aethereus, 76.
— Myristicae s Myristicae mosch. s. aromat., II. 232.
— Myrti Pimentae, II. 344.
— Nasturtii aquatici, II. 244.
— nervinus Riemeri, 177.
— Nitri, 48.
— — acidus, 48.
— — decolor, 48.
— — dulcis, 51 77. 79.
— — fumans, 48.
— — — Glauberi, 48
— — — Glauberianus, 48.
— — GlauberiBoerhavii, 48.
— — tenuior, 49.
— — tenuis, 49.
— nitrico-aethereus, 77.
— Nucis moschatae, II. 232.
— — — compos., II. 232.
— Olei terebinth aeth., II. 662
— oleosus aromat. Sylvii, 161.
— ophthalmicus Himlyi, 328
— — Mindereri, 185.
— Oryzae, 88.
— Panis, II 321.
— — secal. acidus, II. 321.
— ad paralysin, II. 739.
— Pimentae s. Pimento, II. 344.
— potassatus, II. 393.
— Pulegii, II. 450.
— purgans, II. 33.
— Pyrethri, II. 456.
— — compos., II. 456.
— Raphani compos., 582.
— — rusticani, II. 464.
— rectificatus, 89 90.
— resolvens, II. 417.
— — Schmuckeri, 183.
— Ribium nigror, II. 489.
— Rorismarini, II. 510.
— — acetatus, II. 217.
— — comp., II. 217.
— officinalis, II. 483.
— Rosae s. Rosarum, II. 501.
— Sabinae, II. 43.
— Sacchari, 88.
— salinus aromat. s. oleos., 161.
— Salis, 32.
— — acidus, 32.
— — Ammoniaci p. Alcali fixus, 172.
— — — anisatus, 160.
— — — aquos., 155. 172.
— — — c. Calce s. c. Calce viva parat., 155.
— — — causticus, 141.
— — — c. Cinerib. clavell., 172.
— — — dulcificatus, 159.
— — — dulcis, 159.
— — — foeniculatus, 161
— — — lactescens, 168.
— — — lacteus, 168.
— — — per Sal Tart., 172.

Sparadrap pallidum, II. 373.
— resinosum, II. 675.
— resolvens. II. 369.
— rubrum, II. 159. 353.
— vesicans, 432.
— viride, 621. 629.
— vulgare, 269.
Spartium junceum, 732.
— scoparium, 732.
— spinosum, II. 448.
Spathula foetida, II. 19.
Spathum s. Spatum calcareum, 378.
— ponderosum. 336.
Species Acidi muriat. pro vaporibus, 34.
— — nitrici pro vaporibus, 50.
— adstringentes, II. 216 451.
— — pro gargarismate, II. 451.
— Althaeae, 129.
— — compositae, 131.
— amarae, 13 474
— amaricantes, 13.
— anodynae, 435. II. 324.
— anthelminticae, 13. 280.
— antihaemorrhoidales, 99.
— antinephriticae. 272.
— antipsoricae, 746.
— antiscorbuticae, II. 341. 463.
— antispasmodicae, II. 709.
— aperientes, 273
— aperitivae majores 273.
— — minores, 273.
— — c. Rheo, 273.
— contra apoplexiam, II. 317.
— aromaticae. 403. 485. II 60. 87. 505. 528
— — caryophyllatae, 405.
— — — completae, 405.
— — pectorales v. Sp. bechicae, 774
— — rosatae. 403. 404.
— — — completae, 404.
— — vulnerariae, II. 528
— avenaceae, 319.
— bechicae. 445. 483. 667. 774. II. 37. 79. 385. 718
— pro brodio Avenae, 319.
— de Bryonia 357.
— carminativae, 447. 486.
— caryocostinae, II. 556.
— ad cataplasma, 129
— pro cataplasmate emoll, 129.
— catharticae et sudorif., 262.
— cephalicae. 181. II. 118.
— — pro cucuphis, II. 20.
— — — epithemate, II 60.
— — — fomentatione, II. 60.
— — — sacculo, II. 20.
— pro clysmate. 131.
— cordiales, II. 71
— — temperatae, II. 71.
— pro cucuphis, II 60.
— Decocti antinephrit., 272
— — pro gargarism. ad string., II. 451.
— — Lignorum, 445. 756.
— — antipodagrici Viennens., 757.
— — nephro-cathart. Foresti, 272.
— pro Decocto antiarthrit., 757.
— — — antipsorico, 746.
— — — antipodag. Viennens., 757.
— — — Avenae, 319.
Species pro Decocto carminativo, 447.
— — — demulcente, 766.
— — — Flor. et Fruct., II. 37.
— — — ad gangraenam, II. 504.
— — — — infantum, 721. II. 79.
— — Lignorum, 445. 756.
— — nigro, 716
— — vulnerario, II. 340.
— ad Decoct. Lignorum, 756.
— depurantes, 2.
— detergentes s. detersivae, 757.
— Diaboracis, II. 612.
— Diacinnamomi, 403. 405.
— Diacretae. 383.
— Diaereos. II. 20.
— Diajalapae. II 24.
— Diamargaritae frigidae, II. 252.
— — calidae, II. 735.
— Diambrae, 403. 405.
— — sine odoratis, 403. 404.
— — completae. 405.
— Dianisi, 221.
— Dianthos. II. 505.
— Diapentes, II. 237.
— diaphoreticae. II. 535.
— Diarrhodon, II. 504.
— Diascordii, II 304.
— Diatragacanthae, II. 690.
— — frigidae. II. 690.
— Diatrion Santalon, II. 542.
— Diaturbith c. Rheo, II 473
— discutientes, 14.
— diureticae, 271. 272. 308. II. 332.
— emmenagogae, 357.
— emollientes, 129. 485. II. 100.
— — ad s. pro cataplasm., II. 76.
— — ad enema, 131.
— ad enema 131.
— pro enemate emolliente, 131.
— pro epithemate, II. 504.
— — cordis et pulsuum, II. 504.
— febrifugae 502.
— ad fomentum, II. 87.
— — emolliens, 129.
— pro fomento emoll., 130.
— pro fotu ad colicam, 486.
— — — emmenagogo, 357.
— — ad gangraenam, 14.
— — antihaemorrhoid., II. 452.
— — laterali, II. 325.
— fotus discut. et nervini. 181.
— ex Fructibus bechicis, 445
— fumales, 343
— — pro suffimento, II. 255.
— ad fumigat. anticontag., 62
— pro fumigationibus, 343
— — fumo, 343.
— contra grangraenam, 14. II 504.
— ad gargarisma, 130.
— pro gargarismate, 130
— — adstringente, II. 451.
— — emolliente, 130. II. 100.
— de Gemmis frigidae, II. 253.
— guajacinae comp., II. 543.
Species Herbarum pro Inf. analept, 282.
— Hierae picrae, 113.
— de Hyacintho, II. 503.
— Imperatoris, 403. 404.
— pro Infuso diuretico, II. 332.
— — pectorali, 131.
— ad Infusum pectorale, 131.
— lactificantes completae, 405.
— — Rhazis, 403 405.
— lenientes, 766.
— Lapid pretios. frigid., II. 253.
— Lignorum, 756. II. 543.
— mundificantes, 2.
— nephro-cathart. Foresti, 272.
— nervinae, 557.
— — pro cucuphis, II. 647.
— — externae, II. 118.
— pro odoramento, II. 20.
— odoriferae, II. 20.
— pectorales. 71. 131. 667. 721. II. 67. 79. 711.
— — cum Fructibus, II. 37.
— contra pleuresiam. II. 325.
— pro potu infantum. II. 79.
— purgantes, II 577.
— resolventes, 14 486. II. 453. 513. 543
— — externae. 14.
— contra scorbutum, II. 463.
— e Scordio cum Opio, II. 304.
— — — sine Opio, II. 682.
— — sputum sanguinis, II. 216.
— sternutatoriae. 317. II. 505.
— sudorificae, 332. 445. II. 535. 546.
— — ad Decocta paranda, 756.
— ad suffiendum, 313.
— pro Thea, II. 111. 711.
— — — amara, II. 692.
— — Tisana, 744
— Turion. Pini comp, II. 341.
— pro vaporib. Acidi acet., 21.
— — — — muriat, 34.
— — — — nitrici, 50.
— — — Superoxydi muriat., 540.
— vermifugae, 13.
— viscerales pro clysmate s. enematib. Kaempfii, II. 619.
— vulnerariae, 474 II. 340. 519 528.
Specificum antatrophic. Wepferi, 712.
— antepilept. Weismanni, 623.
— antifebrile Crollii, 374.
— cephalicum. II. 157.
— Cranii, 226.
— Genevense, II. 211.
— Helvetii, 145.
— jalapinum, II. 24.
— Paracelsi, II. 476.
— stomach. Poterii, 230
— Tart. pharyngicum, 147.
— de Zobel, 147.
Specilla cerea, II. 373.
Sperma Ceti, 479.
— Mercurii, II. 211.

Sperma Ranarum, 720.
Sperniola Crollii, II. 236
Sphaera marina, II. 338.
— thalassia, II. 338.
Sphaerococcus Helmintoch. — Gigartina.
Sphondylium, 353.
Spica. II. 59
— alpina, II. 213.
— Celtica, II. 213.
— Indica. II 243.
— Nardus, II. 243.
— vulgaris, II. 59
Spigelia anthelmia, II. 620.
— Marylandica, II 620.
Spilanthus, II. 244.
— Acmella, 65.
— oleraceus, 65. II. 244.
Spina alba, 442. 443. II. 215
— cervina, II. 471.
— domestica, II. 471.
Spinachia, II. 621.
Spinacia, II. 621.
— oleracea, II. 621.
Spinae dorsi Mustelae Piscis, 387.
— Viperae, 719.
— Vulpis, 719.
Spiraea Filipendula, II. 621.
— salicifolia et tomentosa, II. 622.
— trifoliata, 743. II. 12.
— Ulmaria. II. 621.
Spirits, Freeman's bathing, II. 443.
— Jacksons bathing, II. 271. 443.
Spiritus Absinthii, 5.
— Abietis, 2.
— Aceti, 17. 20.
— acetico - aethereus, 75.
— Acidi sulph. German., 57.
— Aeruginis, 19.
— aethereus nitrosus. 78.
— — vitriolatus, 82.
— Aetheris aromaticus, 419.
— — ferratus, 692.
— — nitratus, 77.
— — nitrici, 77.
— — nitrosi, 77.
— — sulphurici, 82
— — — comp., 82.
— — vitriolici, 82.
— — — compos., 82.
— Alcali volat., 159.
— alexiterius, 411.
— Aluminis, 57.
— Ammoniacal. aromaticus, 161.
— — terebinth., 161.
— ammoniacatus, II. 270.
— Ammoniae, 148.
— — anisatus, 160.
— — aromaticus, 161.
— — composit., 161.
— — dulcificatus, 159.
— — dulcis, 159.
— — foetidus, 302. 304.
— — succinatus, 168.
— — cum Succino, 168.
— — vinosus, 159.
— ammoniato - anisat, 160.
— Angelicae, 212. 217.
— — compos., 213.
— — — camphorat., 213.
— Anhaltinus, II. 664.
— Anisi, 223.
— — compos., 223.
— — stellati, 225.
— Anthos, II. 570.
— antihystericus, 302. 460.
— antiictericus, II. 663.
— antiscorbut. Drawitzii, 583.
Spiritus aperitiv. Renoti, 55
— Armoraciae, II. 464.
— — compos., II. 464.
— aromaticus, 411. II. 113 217 511. 685.
— — acetosus, II. 61.
— — acidus. II. 217.
— — ammoniacalis, 161
— — camphoratus, 213.
— arthriticus Pottii, II. 608.
— Aurantior abstractit., 560
— — Cortic., 561.
— Balsami Copaivae, 322.
— — Peruviani, 327.
— balsamicus, II. 665.
— Beguini, 181.
— bezoardicus Bussii, 192.
— Bryoniae alb. comp., 461.
— caeruleus, 632.
— Camphorae, 399.
— camphorato - crocatus, 399.
— camphoratus, 399.
— Cantharid. ammoniacal., 161.
— Cari Carvi, 448.
— carminativus, II. 512.
— — Sylvii, 214.
— — de tribus, 56.
— Carvi, 448.
— Caryophyllorum aromat., 450.
— Cassiae, 410.
— Castorei s. C. compos., 460
— Cerasorum nigror, 479.
— cinnamomatus, 410.
— Cinnamomi, 410.
— Citri Corticis, 570.
— Cochleariae, 581.
— — compos., 482.
— Colchici ammoniatus, 587.
— Convallariae, 603.
— Coriandri, 603.
— Cornu Cervi, 173.
— — — rectificat., 174.
— — — succinat., 191.
— — — vinosus, 159.
— Cortic. Aurantior., 560.
— Croci, 609
— Diatrion, 55.
— Eboris, 174.
— febrifugus Cluttoni, 83.
— Foeniculi alcalinus, 210.
— Formicarum, 19. 709.
— Fragariae, 711.
— Frumenti, 89.
— — concentratiss., 93.
— — concentratus, 93.
— — depuratus 89. v. Alcohol dilut.
— — dilutus, 93.
— — rectificatus, 93.
— — vinosus, 89.
— Fuliginis, 19. 711.
— fumans Beguini. 184.
— Fumariae, 713.
— Hyssopi, 802.
— Jasmini, II. 22. 33.
— Juniperi, II 43.
— — compositus, II. 43.
— Lauri Cinnamomi, 410.
— Lauro - Cerasi, 41.
— Lavandulae s. Lavendulae. II. 62
— — ammoniacalis, II. 64.
— — compositus. II. 63.
— Ligni Guajaci. 747.
— Liliorum Convallium, 603.
— Lumbricorum. 174.
— — vinosus, 160.
— Mastiches compos., II. 107.
— mastichinus, II. 107.
— Mastichis, II. 107.
— matricalis, II. 107.
Spiritus Melissae, II. 113
— — compositus, II. 113.
— — magistralis officin. II. 113
— Mellis s. Mellis Andernaci. 265
— Menthae crisp., pip., sativae, virid. et vulg., II 123. 124
— — saccharatus, II. 124.
— Millefolii comp., II. 217.
— — acetatus. II 217.
— Mindereri, 185. 186.
— muriatico - aethereus, 76.
— Myristicae s Myristicae mosch. s. aromat., II. 232.
— Myrti Pimentae. II. 344.
— Nasturtii aquatici, II. 244.
— nervinus Riemeri, 177.
— Nitri. 48.
— — acidus. 48.
— — decolor, 48.
— — dulcis, 51 77. 79.
— — fumans, 48.
— — — Glauberi, 48
— — — Glauberianus, 48.
— — GlauberiBoerhavii, 48.
— — tenuior, 49.
— — tenuis, 49.
— nitrico - aethereus, 77.
— Nucis moschatae, II. 232.
— — — compos., II. 232.
— Olei terebinth aeth., II. 662
— oleosus aromat. Sylvii, 161.
— ophthalmicus Himlyi, 328
— — Mindereri, 185.
— Oryzae, 88.
— Panis. II 321.
— — secal. acidus, II 321.
— ad paralysin, II. 739.
— Pimentae s Pimento, II. 344.
— potassatus, II. 393.
— Pulegii, II. 450.
— purgans, II. 33.
— Pyrethri, II. 456.
— — compos., II. 455.
— Raphani compos., 582.
— — rusticani, II. 464.
— rectificatus, 89 90.
— resolvens, II. 417.
— — Schmuckeri, 183.
— Ribium nigror, II. 489.
— Rorismarini, II. 510.
— — acetatus. II. 217.
— — comp., II. 217.
— officinalis, II. 483.
— Rosae s. Rosarum, II. 501.
— Sabinae, II. 43.
— Sacchari, 88.
— salinus aromat. s. oleos., 161.
— Salis, 32.
— — acidus, 32.
— — Ammoniaci p. Alcali fixus, 172.
— — — anisatus, 160.
— — — aquos., 155. 172.
— — — c. Calce s. c. Calce viva parat., 155.
— — — causticus. 144.
— — — c. Cinerib. clavell., 172.
— — — dulcificatus, 159.
— — — dulcis, 159.
— — — foeniculatus, 161
— — — lactescens, 168.
— — — lacteus, 168.
— — — per Sal Tart., 172.

Spiritus Salis Ammoniaci simplex, 172
— — — succinatus, 168.
— — — e Succino, 168.
— — — sulphurat., 184.
— — — tartarisat., 172.
— — — urinosus, 155
— — — vinosus, 159.
— — — volatilis, 135.
— — Armoniaci anisat., 160.
— — communis, 32.
— — dephlogisticatus, 540.
— — Dubois, 70.
— — dulcis, 76.
— — fumans, 32.
— — marini, 32
— — — coagulat., 470.
— — — dephlogist., 540.
— — terebinthinatus, II. 668.
— — volat. oleos. Sylvii, 161,
— Salviae, II. 630.
— Sambuci, II. 638.
— saponaceus, II. 441.
— saponatus, II. 440. 441.
— Saponis, II. 440. 441
— — compositus, II 670.
— Saturni, 20.
— Serpylli, II 685
— suaveolens pro suffitu, 570.
— Succinatis Ammoniae, 191.
— — ammonici, 191.
— Succini, 56. II. 631.
— sulphureo-aethereus, 82.
— — — vinosus, 82.
— sulphurico-aeth., 82.
— — — camphoratus, 398.
— — — ferruginosus, 692.
— — — martiat., 692.
— Sulphuris, 57. 61.
— — Beguini, 184
— — per campanam, 61.
— — volatilis, 184.
— ex Syrupo, 89.
— Tartari, 55.
— — rectificatus, 55.
— — simplex, 55.
— — vitriolatus, 55.
tenuior, 82,
— Terebinthinae, II. 662.
— — aromaticus, II. 662.
— theriacalis, II. 302.
— — camphorat. s. c. Camphora, 213
— — non camphorat, 213.
— — correctus, 213.
— — simplex, 213.
— Thymi, II. 685.
— traumaticus, II. 531.
— de tribus, 56.
— Trifolii fibrini, II. 695.
— Ungulae Alcis, 174.
— Urinae, 173.
— Valerianae compositus, II. 707.
— Vanillae, II. 708
— Vini, 89. 92. 93.
— — absolutus, 91.
— — alcoholisatus, 91. 92.
— — alcalisatus, 92.
— — ammoniaceus, 183.
— — camphoratus, 399.
— — — crocatus, 399.
— — communis, 91
— — concentratiss., 91.
— — dephlegmatissim., 92.
— — depuratus, 90.
— — dilutus, 91.
Spir. Vini fortior, 90.
— — Gallici, 81.
— — rectificatiss., 90. 91. 92. 93.
— — rectificatus, 89 90. 91 92 93.
— — tartarisatus, 92.
— — tenuior, 90 92.
— — tenuis, 91. 93
— vinosus camphoratus, 399.
— — Frumenti, 89.
— — rectificatus, 90.
— — tenuior, 90.
— Violarum, II. 22.
— Viperarum, 174.
— viridis Aeris et Veneris, 19.
— Vitrioli, 57.
— — acidus, 58.
— coagulat. Mynsichti, II. 406.
— — dulcis, 60. 82.
— — fortis, 57
— — phlogisticatus, 61.
— — tenuis, 58
— volatilis, 57. 361.
— — ammoniacalis alcoholicus s. vinosus 159.
— — aromaticus, 161.
— — causticus, 155.
— — foetidus, 302 304.
— vulnerarius s. vuln. acidus, II. 217.
Spodium, 387.
— praeparatum, 387.
Spongia calcinata, 437.
— cerata, II. 622.
— Cynosbati, 338
— dealbata, II. 622.
— lacinulosa, II. 622.
— marina, II. 622.
— maritima, II. 622.
— officinalis, II. 622.
— — cerata, II 622.
— — tosta, 437.
— praeparata, II. 622.
— — absque Cera, II. 622.
— — cum Cera, II. 622.
— Rosae, 338.
— usta, 437.
Spongiae ceratae, II. 622.
— compressae, II. 622.
— officinales, II. 622 ?.
— ustae, 437.
Spongiarum Lapides, 380.
— — praeparatae, 381.
Spuma Martis, 701.
Squamae Ferri purif., 676.
Squamaria, 644.
Squilla, II. 559
Squinanthus, 206.
Squire's Elixir, II. 270.
Stachys recta, II. 622.
Stalagmitis cambogioides, 272.
Stannas Auri, 3 8.
Stanni Amalgamatis Pulvis, II 623.
— Pulvis, II. 623. 624.
Stannum, II. 622.
— glaciale, 349
— granulatum, II. 623.
— griseum, 349
— Indicum, II. 721.
— limatum, II. 623
— muriat oxydulat., II. 625.
— praeparatum, II. 623.
— — cum Sulphure, II. 624.
— pulveratum, II. 623. 624.
— raspatum, II. 623.
— suboxydatum, II. 624.
— sulphuratum, II. 624
Staphisagria, 643.
Staphysagria, 643.
Statice Caroliniana, 339.
— Limonium, 339.
Stella Terrae, II 97.
Stercus caninum album, 387.
— Diaboli, 296.
— Gallinae, 65.
— Pavonis, 65.
— Vaccae, II 698.
Stibii Potassae, 229.
Stibium, 225.
— oxydatum album, 229.
— — — ablutum, 229.
— — non ablutum, 234.
— — fuscum, 231
— — griseum, 227.
— — sulphurat. vitrificat., 228.
— oxydulatum, 227.
— — fuscum, 231.
— praeparatum, 235.
— purum, 225.
— striatum, 235.
— sulphurat. nigrum, 235.
— — — alcoholisatum, 235.
— — — crudum, 235.
— — — laevigatum, 235. 236.
— — — porphyrisatum, 235.
— venale, 226.
Stillicidium aromaticum, 183.
Stipites Angelicae Saccharo conditae, 212
— Apii Saccharo conditae, 271.
Stitzolobium, II. 625.
— pruriens, II. 625.
Stizolobium s. Stitzolobium.
Stoechas Arabica, II. 625.
— citrina, II. 620.
— Germanica, II. 626.
— Neapolitana, II. 626.
— purpurea, II. 625.
Storax, II. 626
— purificata, II. 627.
Stramonium, 610
Strobili s. Strobuli Pini, II. 310.
— Lupuli, II. 87.
Strombus lentiginosus, 379.
Strychna, II. 627.
Strychnina, II. 627.
Strychninum, II. 627.
— nitricum, II. 628.
Strychnium, II. 627.
— nitricum, II. 628.
Strychnos colubrina, II. 628.
— Ignatia — Ignatia amara.
— Nux vomica, II. 250.
— potatorum, II. 628.
Styracinum, II. 629.
Styracis s. St. officinalis Balsam., II 626.
Styrax amygdaloides, II. 627.
— alba 326.
— artificialis, II. 627.
— Balsamum, II. 626.
— Benzoin, 340.
— Calamita, II 626. 627.
— — factitia, II. 627.
— cannulata, II. 627.
— colata, II. 627.
— — factitia, II. 627.
— communis, II 62.
— in granis, II. 626.
— granulata, II. 626
— liquida s. liquidus, II 628.
— — reducta, II. 629.
— Liquidambar, II. 628.
— in massis, II. 628.

Styrax officinalis s. officinale, II. 627
— purificata II. 627.
— Resina, II. 626.
— rubra, II. 626.
— solidus, II. 626.
— in vesicis, II. 627.
Subacetas s. Subacetis Cupri, 627. 631.
— Cupri impurus, 628.
— cupricus, 627. 631.
— Deutoxydi Cupri, 627.
— Plumbi, II. 354. 358.
— — liquidus, II. 358.
— — Protoxydi, II. 358.
— — — dilutus, II. 361.
— — — liquidus, II. 358. 359.
Subbisulphuretum Stibii, 244.
Subboras natricum, II. 611.
— Sodae, II. 611.
— Sodii Protoxydi s. Deutoxydi, II. 611.
Subcarbonas ammonicum empyreum., 173.
— Ammoniaci, 171.
— — oleosus concretus, 173.
— — liquidus, 174.
— — — oleosus, 174.
— ammoniacus, 170.
— Ammoniae, 170 171.
— — animale, 173
— — liquid., 172.
— — oleosus concentratus, 173.
— — pyro-animale, 173.
— — — liquidum, 174.
— — — pyro-oleosum s. pyro-oleosus, 174.
— — — — liquidus, 174.
— Barii Protoxydi, 336.
— Barytae, 336.
— bismuthicum, 349.
— Calcariae cretaceum s. cretaceus, 378.
— Calcii Protoxydi, 378.
— Calcis 378.
— — praeparatus, 381.
— Cupri et Ammon., 619.
— Ferri, 680.
— — Tritoxydi, 680
— ferroso-ferricum, 680.
— Kali depuratum, II. 398.
— kalicum depuratum, II. 398.
— — impurum, II. 398.
— Magnesiae, II 90.
— natricum, II. 608.
— Oxydi Magnesii, II. 90.
— Plumbi, II. 354.
— — Protoxydi, II. 354.
— Potassae, II. 399.
— — crudus, II. 398.
— — depuratus, II. 398.
— — impurum s. impurus, II. 393.
— — e Tartari Crystallis, II. 399.
— — ex Tart. comb., II. 399.
— — liquidus, II. 380.
— — purissimus, II. 399.
— — purus, II. 378.
— Potassii s. Potassii Protoxydi, II. 398.
— — Deutoxydi, II. 399.
— — — purus, II. 400.
— — — solutus, II. 401.
— Sodae, II. 608.
— — exsiccata, II. 608.
— — impurus s. impura, II. 608.
— Sodii Protoxydi s. Deutoxydi, II. 608.
Subchloras Calcis, 377.
Subchloruretum Antimonii, 250.
— Calcis liquidum, 378.
— Sodae liquidum, II. 608.
Subdeutoacetas Cupri, 627.
— — et Ammoniaci, 631.
Subdeutocarbonas Cupri, 619.
— Potassii, II. 398.
— Sodii, II. 608.
— — impurum, II. 608.
Subdeutonitras Cupri et Ammoniaci, 625.
Subdeutosulphas ammoniaco mercurialis, II. 199.
— Cupri et Ammon., 623.
— Hydrargyri, II. 197.
— Mercurii, II. 197.
Subdeutotartras Potassii et Stibii, 251.
Subdeutoxysulphuretum Antimonii, 238.
Suber, II. 458.
Suberina, II. 458.
Subhydrochloras Antimonii, 250.
Sublimatus corrosivus, II. 180.
— dulcis, II. 159.
Submurias ammoniaco hydrargyricus, II. 206.
— Antimonii, 250.
— — Protoxydi, 250.
— Hydrargyri, II. 159.
— — ammoniat, II. 206.
— — mitis, II. 159.
— Mercurii, II. 159.
— — mitis, II. 159.
— — praecipitatus, II. 159. 206.
— — sublimatus, II. 159.
— Plumbi, II. 351.
Subnitras Bismuthi, 350.
— — Deutoxydi, 350.
— bismuthicum s. bismuthicus, 350.
Suboxydum Plumbi, II. 352.
— Stanni, 624.
Subphosphas Calcariae s. Calcis, 386.
— Calcii Protoxydi, 386.
— Sodae, II. 613.
— Sodii, II. 613.
— — Protoxydi s. Deutoxydi, II. 613.
Subphosphuretum Calcis, 376.
Subprotoacetas Plumbi, II. 358.
Subprotoboras Sodii, II. 611.
Subprotocarbonas Barii, 336.
— Bismuthi, 349.
— Calcis, 378.
— Plumbi, II. 354.
— Potassii, II. 398.
— Sodii, II. 608.
Subprotohydrosulphas Antimonii, 238.
Subprotonitras Bismuthi, 350.
— Hydrargyri et Ammoniae, II. 199.
— Mercurii, II. 199.
Subprotophosphas Calcii, 386.
— Sodii, II. 613.
Subprotosulphas Plumbi, II. 357.
— Potassii, II. 409.
Subsulfas Cupri et Ammonii, 623.
— Hydrargyri peroxydati, II. 197.
— Stibii loti, 235.
Subsulphas ammonio-cupricum, 623.
— Ammoniae et Deutoxydi Aeris, 623.
— Antimonii, 228.
— Cupri et Ammoniae, 623.
Subsulphas Deutoxydi Cupri et Ammoniaci, 623.
— — — et Ammoniae, 623.
— Hydrargyri peroxydati, II. 197.
— — flavus, II. 197.
— Potassae II. 409.
— Stibii loti, 235.
Subtritocarbonas Ferri, 680.
Succinas Ammoniaci, 190.
— — liquidus, 191.
— Ammoniae, 190.
— — liquidus, 191.
— — pyro-animale liq., 191.
— — pyro-oleoso-aquos., 191.
— — — — solutus., 191.
Succinum, II. 630.
— album, II. 630.
— citrinum, II. 630.
— nigrum, 714.
— oxygenatum, II. 632.
— praenaratum, II. 630.
— raspatum, II. 630.
Succisa, II. 555.
Succo-gommite, II. 79.
Succolata alba, II. 525.
— antivenerea, II. 188
— Castaneae, 457.
— Lichenis Island, II. 67.
— medica s. simplex, 367.
— purgans, II. 175.
— Vanillae odore, 308.
Succus Acaciae German., II. 448.
— — — inspissatus, 15.
— — nostratis, 15.
— Acetosae, 16.
— Aceto-ellae, 17.
— Aconiti inspiss., 66.
— Agrestae, II. 718.
— antiscorbuticus, 580.
— Armoraciae compos., II. 463.
— Aurantiorum, 658.
— e Baccis Myrtillor., II. 698
— Beccabungae, II. 711.
— Belladonnae inspiss., 313. 314.
— Berberum, 316.
— Betonicae, 348.
— Boraginis, 352.
— Bryoniae, 356.
— Buglossi, 205.
— Carotae, 642.
— Centaurii minoris, 474.
— Cerasorum, 477.
— Cerefolii, 483.
— Cichorii, 543.
— Cicutae, 546.
— — inspissatus, 546.
— Citreorum, 573.
— Citri, 573.
— Cochleariae, 580.
— — compositus, 580.
— Conii macul inspiss., 546.
— Consolidae, 597.
— Cucumeris, 614.
— Cydoniorum, 635.
— Dauci, 642
— — inspiss. crudus, 643.
— — — depurat., 643.
— diureticus, II. 463.
— domesticus, II. 471.
— Ebuli, II. 535.
— — Baccarum, II. 535.
— Elaterii, II. 219.
— Fragorum, 710.
— Fumariae, 712.

Succus Glyzyrrhizae crudus s. simplex. II. 9
— — depuratus, II. 79.
— Graminis, 744.
— Granatorum, II 452
— Granorum Kermes, 498.
— Grossulariae, II. 489.
— Hispanicus, II. 79.
— Hyoscyami inspiss., 790
— Hypocistidis, 801.
— Japonicus, 407.
— Juniperi inspiss., II. 40.
— — — depuratus, II. 40.
— Kermetis, 498.
— Lactucae virosae inspiss., II. 51.
— — sativae spissatus, II. 52.
— Limonum, 573.
— — spissatus, 573.
— Liquiritiae crudus, II. 79.
— — anisatus, II. 80.
— — de Blois, II. 81.
— — depuratus, II. 79.
— — c. Gummi, II. 80.
— — gummosus, II. 80.
— — mercurialis, II. 130.
— Malorum fermentat. chalybeat., 698.
— Marrubii albi, II. 105.
— Millefolii, II. 216.
— Momordicae Elat. spissat., II. 219.
— Mororum, II. 225.
— — inspissat., II. 225.
— Myrtillorum, 698.
— Nasturtii aquat., II. 244.
— Omphacii, II. 718.
— Oxycocci, II. 698.
— — c. Nitrate Potassae, II. 698.
— Papaveris somnif. inspissatus, II. 257.
— Parietariae, II. 320.
— e Persicorum Floribus, II 331.
— Plantaginis, II. 349.
— Pomorum, II. 388.
— — Granatorum, II. 452.
— Prunellae, II. 447.
— Prunorum sylvestrium, II. 448.
— Pulmonariae, II. 451.
— Rhamni, II. 471.
— — cathartici, II. 471.
— Ribesiorum nigror., II. 488.
— Ribium, II. 489.
— Rosarum pallidarum, II. 493.
— Rubi Idaei, II. 515.
— Sambuci, II. 535.
— — Baccarum, II. 535.
— — crudus, II. 535.
— — inspissatus crudus, II. 535.
— — — depuratus, II. 535.
— Saponariae, II. 542.
— de Spina cervina, II. 471.
— Spinae cervinae, II. 471.
— Stramonii spissat., 641.
— — concretus, 641.
— Taraxaci, II. 649.
— temperans et diureticus, 483.
— thebaicus, II. 257.
— Toxicodendri, II. 487.
— Trifolii fibrini, II 692.
— — — concretus, II. 692.
— Tritici repentis, 744.
— Urticae, II. 697.
Succus Vaccinii Oxycocci c. Nitrate Potassae, II. 698.
— Veronicae, II. 711.
— Violarum, II. 714.
Sucre orangé, purgatif, II. 24.
Sulfitus Chlorini, 540.
— oxymuriat cus, 540.
Suffumigatio Guytoniana, 540.
Sugar, lemon, 574.
Sulphas acidulum Aluminae, 144.
— acidulus Aluminae et Lixiviae, 144.
— Aluminae, 144.
— — acetatum, 146.
— — acidulum, 144.
— — exsiccatum, 144.
— — fusum, 144.
— — et Lixiviae acidulus, 144.
— — et Potassae acidul., 144.
— — — — — ustus, 144.
— — — — acidum s. acidus, 144.
— — exsiccatus, 144.
— — purificatus, 144.
— aluminico-kalicus, 144.
— — — c. Aqua, 144.
— Ammoniacae, 180.
— — cupratus, 623.
— Argenti, 279.
— — liquid., 279.
— Atropinae, 312.
— Barii Protoxydi, 337.
— Barytae, 336.
— — nativus, 336.
— baryticus nativus, 336.
— Cadmii, II. 45.
— calcicum, 383
— Calcii Protoxydi, 388.
— Calcis, 388.
— Chinini, 536.
— Cinchonae 536.
— cinchonicus, 555
— Cinchonini, 555.
— Cupri, 620.
— — acidus, 620.
— — aluminosus, 622.
— — — camphorat., 622.
— — ammoniacalis, 623.
— — et Ammoniae s. Ammoniaci, 623
— — camphoratus, 622.
— — coeruleus, 620.
— — Deutoxydi acid., 620.
— — purificatus, 620.
— cupricus, 620.
— — acidus, 620
— — c Aqua, 620.
— cupro-ammoniacal., 623.
— Ferri, 685.
— — ad albedinem calcinat., 686.
— — calcinat., 678.
— — exsiccat., 685.
— — Oxyduli, 685.
— — praeparatus, 685.
— — Protoxydi, 685.
— — purus, 685.
— — viridis, 685.
— ferrosus c. Aqua purus, 685.
— Hydrargyri, II. 197.
— — luteum, II. 197.
— — c. excessu oxydi, II. 197.
— Indigo, II. 2
— Kali, II. 406.
— kalico-aluminicum, 144.
— kalicus crudus, II. 406.
Sulphas kalicus depuratus, II. 406.
— Lixiviae, II. 406.
— Magnesiae, II. 95.
— — depuratum, II. 95.
— — exsiccatus, II. 95.
— — purificat., II. 95.
— — purus, II 95.
— — et Sodae, II. 97. 616
— magnesicus c. Aqua crudus II. 95.
— — — depuratus, II. 95.
— Magnesii Protoxydi, II. 95.
— Mercurii, II. 198.
— — Deutoxydi, II. 198.
— — oxydulat., II. 197.
— — Protoxydi, II. 198.
— Morphinae s. Morphini, II. 222.
— natricum s. natricus, II. 614.
— natricus c. Aqua crudus, II. 614.
— — — depuratus, II. 614.
— — depuratus, II. 614.
— Oxyduli Ferri, 685.
— Pigmenti Ind. liq., II. 2.
— Potassae, II. 406. 409.
— — acidus, II. 409.
— — ferruginosus, 686.
— — et Ammoniaci, II. 410.
— — depuratus, II 406.
— — et Magnesiae, II. 410.
— — c. Sulphure, II. 408.
— Potassii, II. 406.
— — Deutoxydi, II. 406.
— — Protoxydi, II. 406.
— quinicus, 530.
— Quininae, 536.
— Sodae, II. 614.
— — acidulum s. acidulus. II. 614.
— — acidum s. acidus, II. 614.
— — et Magnesiae, II. 616.
— Sodii Protoxydi s. Deutoxydi, II. 614.
— Strychninae, II. 628.
— superammoniaco-cupreus. 623.
— — cupricus, 623.
— triammonico cupricus, 623.
— Zinci, II. 728.
— — purificatus s. purus. II. 728.
— zincicum s. zincicus, II. 728.
— — venalis, II. 728.
— zincicus c. Aqua, II. 728.
Sulphis s. Sulphites Potassae, II. 410.
— — sulphuratus, II. 410.
— sulphurat. Potass. et Merc, II. 199.
Sulphites Sodae, II 617.
— — sulphuratus, II. 617.
Sulphur, II. 633.
— antimonietum fuscum, 238-248.
— — praecipitatum, 238.
— — rubrum, 238.
— — tartarisatum, 238.
— Antimonii, 244. 248
— — auratum, 244.
— — — liquidum, 248.
— — hydrogenatum, 244.
— — praecipitatum, 238.
— — saponatum 240.
— auratum Antimonii, 244
— — — liquid., 248.

Digitized by Google

Sulphur in bacillis, II. 633.
— caballinum, II. 633.
— citrinum, II. 633.
— Cupri, 619.
— depuratum. II. 634.
— factitium, II. 633.
— griseum — impurum.
— iodatum, II. 739.
— lotum, II 634
— Lycopodii, II. 89.
— nativum, II 633.
— — griseum II 633.
— praecipitatum, II. 624.
— purificatum, II. 633.
— in rotulis s. rotundum, II. 633.
— rubrum, 238.
— stibiatum, 258.
— — aurantiacum, 244.
— — factitium, II. 156.
— — rubeum, 238.
— — rubrum, 238
— — rufum, 244.
— sublimatum. II. 633.
— — depuratum, II. 633
— — lotum, II. 634.
— tartarisat. rubrum, 238.
— vegetabile, II. 89.
— vivum, II. 633.
— — citrinum, II. 633.
Sulphuretum Ammoniacae, 184.
— — hydrogenatum, 184.
— Ammoniae, 184.
— Antimonii. 235 238. 244.
— — et Calcis, 249.
— — nativum, 235.
— — nigrum, 235.
— — et Potassae, 249.
— — praecipitatum, 244 248.
— — praeparatum, 235.
— Arsenici, 285
— — flavum. 285.
— — rubrum. 285.
— Barii, 333.
— Calcariae. 376.
— — et Stibii, 249.
— Calcii. 376.
— Calcii c. Sulphate calcico, 376.
— — c. Sulphureto Stibii et Sulphate calcico, 249.
— Calcis, 376.
— — antimoniatum, 249.
— — et Arsenici, 286.
— — liquidum, 389
— — stibiatum, 249.
— Ferri, 674.
— — potassati, 675.
— Hydrargyri, II. 143.
— — nigrum, II. 141.
— — — et Stibii, II. 144.
— — oxydulat., II. 142.
— — rubrum, II. 156.
— — simplex, II. 141.
— — stibiatum, II. 143.
— — et Stibii, II. 143.
— — sublimatum, II. 156.
— — trituratum, II. 142.
— Kali, II. 395.
— kalicum, II. 395.
— Kalii c. Sulphate kalico, II. 395.
— Lixivae s. Lixiviae, II. 395.
— Lixiviae stibiatum, 234.
— Mercurii, II. 155
— — nigrum s. simplex, II. 144 156.
— — oxydulatum, II. 142.
— — praeparatum, II 156.
— — rubrum, II. 156.
— — trituratum, II. 142.
— Olei volat. anisatum, II. 638.
Sulphuretum oleosum fixum, II. 638.
— Oxyduli Stibii hydrogenat., 244.
— Plumbi, II. 351.
— — nativum, II. 351.
— Potassae. II. 395.
— — et Ferri, 675.
— — martiale, II. 397.
— — simplex, II. 395.
— Potassii s. Potassii Protoxydi, II. 395.
— saponaceum, II. 639.
— Sodae, II. 604.
— — simplex, II. 605
— Sodii Protoxydi, II. 624.
— Stanni. II. 624.
— Stibii, 235.
— — arsenicatum, 278
— — hydrogenatum, 244.
— — nativum. 235.
— — nigrum, 235.
— — — crudum, 235.
— — — praeparatum, 235.
— — oxydulati. 244.
— — Oxyduli hydrogenatum, 244
— — praeparatum, 235.
— — rubrum, 238.
— — venale, 235.
— — — ablutum, 235.
— Suboxydi Antimonii hydrogenatum, 238.
— Vini, 147.
Sulphuroprussuretum Potassae hydrogenatum, 40.
Sumach, II. 487
Superacetas Cupri impurus, 628.
— Plumbi, II. 365.
Supercarbonas Calcii Protoxydi. 385.
— Potassae, II. 398.
Supercarburetum Ferri, 673.
Superdeutosulphas Cupri, 620.
Superhydrosulphuretum Mercurii. II. 155.
Superhydrosulphuro - Superhyposulphites Oxydi Antimonii, 244.
Supermurias Hydrargyri, II. 181.
Superoxalas kalicum, II, 425.
— Potassae. II. 425.
— Potassii Protoxydi. II. 425.
Superoxydum manganicum, II. 101.
— Plumbi, II. 351.
— plumbicum, II. 352.
— plumbosum, II 352.
Superphosphas Calcii. 388.
Superprotocarbonas Calcii, 385.
— Ferri, 684.
Superprotooxalas Potassii, II 425.
Superprotophosphas Calcii, 388.
Superprotosulphas Sodii, II. 614.
Superprototartras Potassae, II. 429.
— Potassii, II. 429.
— — c. Borate Sodae, II. 434.
— — boraxatus, II. 434.
Suberstibiis kalica, 229
Supersulphas Aluminae et Potassae, 144.
— — — exsiccatum, 144
— — — fusus, 144.
— Argilla alcalisatum, 141.
SupersulphasCupri camphorat, 622.
— Oxydi Aluminii et Protoxydi Potassii, 144.
— Potassae, II. 409.
— Sodii Protoxydi, II. 614.
Supersulphuretum Mercurii, II. 142
— Potassii, II. 395.
— Sodae, II. 605.
Supertartras kalicum, II. 429.
— — praeparatum. II. 425.
— Potassae, II. 429.
— — depurat., II. 429.
— Potassii Protoxydi, II. 429
Supertartris Potassae, II. 429.
Suppositorium ad alvum sollicitandum, II. 439.
— anodynum, 369. II. 283.
— anthelminticum, 106. III.
— antihaemorrhoidale. 438.
— catharticum, II. 439.
— commune, 265.
— emolliens. 369.
— irritans, 588
— laxativum, II. 439.
— leniens, II. 283.
— Mellis commune, 265.
— — — irritans, 588.
— narcoticum s. opiatum, II. 283.
— roborans, II. 460.
— sedativum, II. 283.
— vermifugum, 106.
Supratartras Potassii Deutoxydi, II. 429.
Surinamina, 740.
Sus Scrofa, 386.
Swietenia febrifuga. II. 642.
— Mahagony, 500. II. 642.
Symphytum, 597.
— dentarium, 614.
— maculosum, II. 451.
— minimum, 339.
— officinale, 597.
— tuberosum, 537.
Symplocarpus foetidus — Dracontium.
Synopis, 141.
Syringites, 380.
Syrupus Absinthii, 6.
— — compositus, 6.
— de Absinthio, 6.
— — compositus, 6.
— Acaciarum, II. 449
— — Florum, II. 449.
— Acetatis Morphini, II. 224.
— Aceti, 22
— — acetosus, 22.
— — antimoniati, 258.
— cum Aceto, 22.
— Acetosae, 16.
— Acetosellae, 17.
— Acetositatis Citri, 576.
— Acidi acetici, 22.
— — acetosi, 22.
— — citrici, 32 542.
— — hydrocyanici, 38.
— — phosphorici, 54.
— — sulphurici, 58.
— de Acido Tartari, 64.
— de Adianto, 71.
— adstringens. II. 461.
— — Jouberti, II. 699.
— cum Aethere sulph. parat., 83
— de Agresta, II. 718.
— Agrestae, II. 718.
— Agresti, II. 718.
— alcalinus, II. 402.
— alexandrinus. II. 501.
— Alkermes, 498.
— Allii, 99.

Syrupus de Allio, 99.
— de Althaea, 135.
— — compositus, 137.
— Althaeae, 135.
— — compositus, 137.
— — officinalis, 135.
— Ammoniaci, 760.
— — compositus, 159.
— de Ammoniaco, 760.
— ammoniacalis, 760.
— Amomi Zingiberis, II. 735.
— Amygdalarum, 197.
— amygdalinus, 197.
— Amygdali Persicae, II. 331.
— — — Florum, II. 331.
— de Amygdalis, 197.
— Amygdalium, 197.
— Anethi Foenic. comp., 271.
— anodynus, 641.
— Anthemidis, 491.
— anthiarthriticus, II. 559.
— antihydropicus, II. 559.
— antimoniatus, 258.
— antiscorbuticus, II. 465.
— — compositus, II. 465.
— — Portali, II. 189.
— antiscrophulosus, 317.
— antisyphiliticus Larreyi, II. 208.
— antivenereus St. Ildefont, II. 185.
— aperitivus, 271.
— Apii s. de Apio, 271.
— de Apio compos., 271.
— Aquilegiae, 275.
— Armoraciae, II. 467.
— — compositus, II. 465.
— aromaticus, 293.
— cum Artemisia et Castoreo Lemery, 293.
— de Artemisia, 293.
— — compositus, 293.
— Artemisiae, 293.
— ad arthritidem et hydropem, II. 559.
— de Arundine, 371.
— Asparagi Conorum, II. 740.
— Atriplicis Mexic., 497.
— Aurantii, 562.
— — Florum, 560.
— Aurantiorum, 558.
— — Corticum, 562.
— — — alcoholicus, 557.
— — — vinosus, 573.
— — Florum, 560.
— — e Succo, 568.
— de Aurantiis, 568.
— Auri, 316.
— — muriatico - natrici, 317.
— Balsami Peruviani, 327.
— — Indici nigri, 327.
— — Tolutani, 330.
— balsamicus, 322. 327. 330.
— — pectoralis, 331.
— — de Tolu, 330.
— bechicus, II. 397.
— Belladonnae, 314.
— Beileti mercurialis, II. 203.
— Bellidis, 339.
— de Benzoë, 340.
— de Berberide, 346.
— Berberidum, 346.
— Berberum, 346.
— Betonicae, 348.
— Betulae albae, 349.
— Boraginis, 353.
— Botryos compositus, 497.
— de Boullay, 520.
— Boyleanus, 568.
— de Brassica rubra, 354.
— Bryoniae, 359.
— Buglossi, 366.
— byzantinus Mesues, 372.

Syrupus Capilli Veneris, 71. 72. 560.
— Capillorum Veneris, 71.
— — — compositus, 72.
— Capitum Papaveris, II. 326.
— Caprifolii, 436.
— cardiacus, 415.
— Cardui benedicti, 444.
— Carthami solutivus, 446.
— Caryophyll. rubr., 645.
— Cascarillae, 453.
— Cassiae Sennae, II. 589.
— Catechu, 471.
— Centaurii minoris, 474.
— Cerasorum, 478.
— — acidorum, 478.
— chalybeatus, 688. 706.
— Chamaemeli, 491.
— Chamomillae, 491.
— Chenopodii, 497.
— chermesinus, 498.
— Chinae, 522.
— — compositus, 500.
— — vinosus, 528.
— Chinae Chinae, 522.
— — compositus, 500.
— Chinii sulphur. comp., 539.
— Chininae sulph., 539.
— Chinini sulph., 539.
— — — compositus, 539.
— Cichorii s. de Cichorio, 544.
— — compositus, 544. II. 480.
— — et Rhabarbari s. c. Rhab., II. 480.
— Cicutae, 546.
— Cinchonae, 522.
— — vinosus, 528.
— Cinchonini s. Cinchoninae (Sulphatis), 555.
— Cinnamomi alcoholicus, 416.
— — aquosus, 415.
— — vinosus, 415.
— Citratis acidi Chinini, 539.
— Citreorum de Succo, 576.
— Citri Aurantii Cort., 562.
— — — Florum, 560.
— — Corticum s. Corticis amarus, 575.
— — — alcoholicus, 575.
— — — aquosus, 575.
— — — vinosus, 575.
— — aromaticus, 575.
— — Medicae Succi, 576.
— — Succi, 576.
— — e toto, 576.
— Coccinellae, 579.
— de Cochlearia officin., 580.
— Cochleariae, 580.
— — compos., 580.
— — officinalis comp., II. 465.
— coeruleus II. 715.
— Colchici, 587.
— — aceticus, 587.
— — autumnalis, 587.
— Comitis, 440.
— communis, II. 522.
— Consolidae majoris, 597.
— — composi., 598.
— Contrayervae, 601.
— — compositus, 601.
— copaivicus, 322.
— Corallii, II. 5-3.
— — rubri s. simpl., 391.
— Corallinae Corsicanae, 782.
— Coralliorum, 391.
— cordialis, II. 714.
— Corticis Peruviani, 522.
— — — vinosus, 528.
— Corticum Aurant., 562.

Syrupus Croci aquosus, 608.
— — vinosus, 609.
— de Cucurbita Mesues, 615.
— Cuisinieri, II. 551.
— — reformatus, II. 552.
— cyanicus, 38.
— de Cydoniis, 635.
— Cydoniorum, 635.
— depurans s. depurativus, II. 551.
— depurativus Larreyi, II. 208.
— — Majaulti, 159.
— de Desessartz, II. 18.
— Diacodii, II. 326.
— Diacodion, II. 279. 326.
— Diacodium crocatus, II. 328.
— — liquid. Montani, II. 326.
— Dianthi Caryophylli, 645.
— de Dictamno, II. 311.
— Digitalis, 650.
— — aceticus, 650.
— domesticus, II. 471.
— drasticus, II. 568.
— emeticus, 258.
— — d'Ange Sala, 258.
— — Glauberi, 258.
— Emetini, 658.
— emulsivus, 197.
— Enulae, II. 3.
— Erysimi, 660.
— — compositus, 660.
— de Erysimo, 660.
— — compositus, 660.
— — Lobelii, 660.
— expectorans, 760. II. 16.
— Farfarae, 667.
— Florum Aurantii, 560.
— — Naphae, 560.
— Foeniculi, II. 271.
— Fragorum, 710.
— de Framboesiis, II. 515.
— de Fumaria s. Fumariae, 713.
— Gentianini s. Gentianinae, 740.
— Glycyrrhizae, II. 85.
— de Granatis, II. 452.
— Granatorum, II. 452.
— Grossulariae, II. 489.
— guajacinus, 735.
— Gummi Ammon. aquos., 761.
— — — vinosus, 760.
— — Acaciae, 769.
— — Arabici, 769.
— Hederae terrestris, 774.
— Helicum Boudeti, 724.
— Hellebori nigri comp., 779.
— Helmintochorti, 782.
— Hepatis Sulphuris, II. 397.
— hordeatus, 197.
— Hydriodatis Potassae, II. 10.
— — — iodurati, II. 10.
— Hydrargyri, II. 127.
— Hydrocyanatis Potassae, 40.
— Hyoscyami, 791.
— Hyperici, 797.
— hypnoticus, II. 279.
— Hyssopi, 801.
— — compositus, 801.
— — cum Scilla, 802.
— — scilliticus, 802.
— de Hyssopo, 801.
— Infusionis Caryophyllor. Flor., 645.
— Iodii, II. 8.
— Ipecacuanhae aquosus, II. 16.

Syrupus Ipecacuanhae alcoholicus, II. 18.
— — compositus, II 16 18.
— de Jalapa, II. 31
— Jalapae aromatisatus, II. 31.
— jalapinus, II. 31.
— de Jujubis, II. 37.
— Kali sulphurati, II. 397.
— Karabe, II. 281.
— Kermes Granor., 498.
— kermesinus, 498.
— Kinae, 528.
— de Kinkina, 522.
— Kino, II. 47.
— Lactis, II. 742.
— de Lescure, 524.
— Lichenis Islandici, II. 68.
— Limonis, 576.
— — Succi, 576.
— Limonum, 575. 576.
— — compos., 576.
— — e Succo, 576.
— Liquiritiae, II. 85.
— longae vitae, II. 125.
— Lupulini, II. 89.
— Macidis, II. 232
— magistralis, 705.
— Malorum Persicor. Fruct., II. 331.
— de Manna, II. 104.
— — laxativus, II. 101.
— e Manna c. Senna, II. 104
— Mannae, II. 104
— — c. Senna, II. 104.
— Marrubii, II. 106
— de Marrubio, II. 106.
— martialis, 705.
— Mastichis, II. 108.
— mastichinus, II. 108.
— Matricariae, II. 109.
— Meconii, II. 279. 326.
— de Meconio, II. 279. 326.
— Melissae, II. 112.
— de Melle s. Mellis, 264.
— de Mentha pip., II. 119.
— Menthae, II. 119.
— — crispae, II. 119.
— — piperitae, II. 119
— — — vinosus, II. 119.
— — Piperitidis, II. 119.
— — viridis, II. 119
— de Menyanthe, II. 692.
— — — compos., II. 692.
— mercurialis, II. 127. 203. 212.
— — Belleti, Bouillon Lagrange etc., II. 203.
— — Cheroni, II. 186.
— — gummosus de Lagneau, II. 128.
— mercurialis, II. 125.
— Mercurii, II. 127.
— — gummosus, II. 127.
— de Mercurio et Gummi, II. 127.
— e Mercurio solub. Hahnem, II. 201.
— Mesembryanth. cryst., II. 215.
— Millefolii s. de Millefolio, II. 217
— Millepedum, II. 218.
— mineralis, 58.
— Molasses, II. 523
— Mori nigrae, II. 225.
— de Moris, II. 225.
— Mororum, II. 225.
— — Succi, II. 225.
— Morphii acetici, II. 224.
— muriaticus, 35.
— de Musco querno, II. 68.
Syrupus Myrtilli s. Myrtillorum, II. 699
— Myrti s. de Myrto, II. 241.
— Naphae Florum, 560.
— de Nasturtio, II. 245.
— de Nicotiana, II. 247.
— Nicotianae, II. 247.
— Nucistae, II. 232.
— Nucum moschat., II. 232.
— Nymphaeae, II. 253.
— — albae de Flor., II. 253.
— Omphacii, II. 718.
— opiatus, II. 260. 279.
— Opii, II. 279.
— — alcoholicus, II. 266.
— — emulsivus, II. 279.
— — Extracti, II. 279.
— — succinatus, II. 281.
— — vinosus, II. 260.
— de Opio, II. 279.
— Oxycocci Baccar., II. 699.
— ex Oxydulo Hydrargyri Hahnem., II. 201.
— Paeoniae, II. 316.
— de Papavere albo, II. 326.
— — — erratico, II. 323.
— Papaveris s. Papaveris albi, II. 326.
— — anisatus, II. 328.
— — de Capitibus, II. 326.
— — crocatus, II. 328.
— — erratici, II. 323.
— — Rhoeadis, II. 323.
— — Rhoeados, II. 323.
— — rubri, II. 323.
— — somniferi, II. 326.
— Paralyseos, Flor., II. 436
— pectoralis, 71. 497. II. 280 572. 712.
— — Anglicus, II. 328.
— — de Courti, II. 16.
— — leniens, 488.
— — Maloeti, II. 280
— Persicae Folior., II. 331.
— — s. Persicorum Flor. II. 332.
— ad pertussim, 520. 598.
— Peucedani, II. 333
— Plantaginis, II. 349.
— — majoris, II. 349.
— Polygalae Virg., II. 386.
— de Pomis comp., II. 590.
— — solutivus, II. 590.
— Pomorum helleborat., 779
— — compositus, II. 590.
— — redolentium, II. 388.
— — solutivus, II. 561.
— de Prassio s. Prassii albi, II. 106.
— Primulae veris, II. 446.
— prophylacticus, II. 125.
— Prunellae II. 447.
— Psychotriae emet., II. 18.
— e Pulmonibus vitul., 724.
— purificans amarus, II. 465.
— Quininae sulphuricae, 539.
— e Quinque Radicibus, 271.
— Radicum quinque aperientium, 271.
— Raphani rusticani, II. 467.
— regius, II. 591.
— resolvens, 260.
— Rhabarbari, 479.
— cum Rhabarbaro aromat., II. 479.
— de Rhabarbaro c. Senna, II. 590.
— Rhamni, II. 471.
— — cathartici, II. 471.
— Rhei, II. 479.
— — alcalisatus, II. 482.
Syrupus Rhei aromaticus, II. 479.
— — palmati, II. 479.
— — cum Senna, II 590.
— cum Rheo aromat., II. 479.
— de Rheo, II. 479.
— — compositus, II. 480.
— Rhoeadis s. Rhoeados, II. 323.
— Ribesiae nigrae, II. 489.
— de Ribesiis, II. 489.
— Ribesiorum, II. 489.
— Ribis nigri, II. 489.
— — rubri, II. 489.
— Ribium, II. 489.
— — nigrorum, II. 489.
— rosaceus solutivus, II. 496.
— — — c Senna, II. 497.
— Rosae, II. 496
— — Centifoliae, II. 496.
— — Gallicae, II. 496.
— Rosarum compos, II. 497.
— — pallidarum, II. 496.
— — rubrarum, II. 496.
— — — Succi, II. 496.
— — simplex, II. 497.
— — solutivus, II. 496.
— — — c. Senna, II. 497.
— rosatus simplex, II. 496.
— — solutivus, II. 496
— de Rosis pallidis, II. 496.
— — siccis, II. 496.
— Rubi acetatus, II.
— — arctici, II. 515.
— — fruticosi, II. 515.
— — — cum Melle, II. 516.
— — Idaei, II. 515.
— Rutae, II. 519
— Sacchari, II. 522.
— — albi, II. 522.
— — rubri, II. 522.
— saccharinus c. Aqua Naphae, 560.
— Sambuci, I. 535.
— de Sarsaparilla comp., II. 551.
— — et Guajaco, II. 551.
— — et Senna com., II. 551.
— Sarsaparillae, II. 546. 551.
— — et Guajaci, II. 551.
— — vinosus, II. 552.
— Sassafras Cort Ligni, II. 553.
— de Scammonio, II. 559.
— scelotyrbicus Foresti, II. 245.
— de Scilla, II. 565
— Scillae, II. 565.
— — acetosus, II. 570.
— — compositus, II. 565.
— — maritimae, II. 570.
— scilliticus, II. 565.
— Scordii, II. 681.
— de Scordio, II. 681.
— sedativus, II. 279.
— Sedi majoris, II. 575.
— Sempervivi, II. 575.
— Senegae, II 386.
— — c. Liquirit., II. 386.
— — moschatus, II. 386.
— Sennae, II. 589.
— — compositus, II. 590.
— — rosaceus, II. 497.
— simplex, II. 522.
— simplicissimus, II. 522.
— Smilacis Sarsaparillae, II. 551.
— solutivus, II. 590.
— Spigeliae, II. 621.

Syrupus de Spina cervina, II. 71.
— Spinae cervinae, II. 471.
— spleneticus, 272.
— Stephensii, II. 551.
— de Stoechate, II. 626.
— — compos, II. 626
— Succi Ribis nigri, II. 489.
— — Rubi Idaei, II. 515.
— sudorificus, II. 551.
— Sulphatis Chinini, 539.
— — — comp., 539
— — Morphii, II. 222.
— sulphureticus, 185.
— de Sulphureto Potassae, II. 397.
— Sulphuris, II. 397.
— Symphyti, 597.
— e Symphyto, 597.
— — Fernelii, 598.
— Tartratis Mercurii, II. 214.
— thebaicus, II. 297
— de Thridace, II. 52.
— Toluiferae Balsami, 330.
— Tolutanus, 330.
— de Trifolio fibrino, II. 692.
— — — — compos., II. 692.
— Tunicae 645.
— — Florum, 645.
— Tussilaginis, 667.
— de Urtica, II 697.
— Urticarum, II 697.
— Uvarum, II. 718
— Valerianae, II. 702.
— — Radicis, II 702.
— Vanillae, II. 708.
— vegetabilis, II. 185.
— vermifugus, 783.
— — et purgans, II, 596.
— de Veronica, II 712.
— Violae II. 715.
— — odoratae, II. 715.
— Violarum, II. 715.
— — communis, II. 715.
— — Petalor, II. 715.
— — solutivus, II. 716.
— — e Succo, II. 716.
— Viperarum, 724.
— vitriolatus, 58.
— Zingiberis, II. 735.
— — (vinosus), II. 736.

T.

Tabacum, II. 245.
Tabellae absorbentes, II. 93.
— Acidi citrici, 32.
— — oxalici, 52.
— alimentariae, 728.
— Althaeae, 132. 769.
— Anisi compositae, II. 83.
— antacidae, II. 93.
— anthelminticae, II. 26. 141. 627.
— antiacidae laxantes. II. 93.
— anticatarrhales Tronchini, 242.
— antichloroticae, 672.
— antimoniales Kunkelii, 236.
— Antimonii, 236.
— antiperiodicae, 575.
— antipsoricae, II. 637.
— aphrodisiacae, II 227.
— ad ardorem ventriculi, 383.
— aromaticae, 406.
— Balsami Tolutani, 329.
— ad botium, 439
— Calabricae, II. 102.
Tabellae Carbonatis Magnesiae, II. 93.
— cardialgicae, 383.
— Castorei, 459.
— Catechu cum Liquiritia, 468.
— de Catechu Terra, 468.
— — et Magnesia, 469.
— — odoriferae, 469.
— Chinae, 515
— c. Coffea Mokk., II. 10.
— desalterantes, II. 408.
— Diacarthami, II. 557.
— Diarrhodon. II. 494.
— — c. Rhabarb., II. 416.
— Diatragacanthae, II. 691.
— emeticae, 260.
— Glycyrrhiz. comp., II. 82.
— Ferri. 672.
— funales 341.
— Guajaci, 749.
— gummosae, II. 691.
— Iridis Flor. compos., II. 21.
— Japonicae, 641.
— kermesinae, 241.
— Kermetis, 241 242.
— Liquiritiae, II. 82.
— Magnesiae s. de Magnesia, 93.
— Manus Christi, II. 494.
— mercuriales, II 169.
— de Mercurio, II. 169.
— au Moka, II. 10.
— c. Oculis Cancrorum, 382.
— Opii, II. 278
— pectorales, 242. 329 II. 264 630.
— purgantes compos, II. 557.
— — c. Oleo Lathyridis, II. 741.
— purgativae s. purgantes, II. 30. 176.
— Quinquinae. 515.
— refrigerantes, II. 418.
— restaurantes Kunkelii, 236
— de Rheo, II. 476.
— rosatae. II. 494.
— Saccharo et Manna confectae, II. 102.
— Scammon. et Sennae purg, II. 557.
— de Scammonio et Senna comp., II. 557.
— de Semine Santonico, 553.
— ad sitim, 64.
— Spitzlayi, 222.
— ad sodam, 383.
— Stibii Kunkelii, 236.
— de Sulphure simpl. et comp., II. 636.
— Sulphureti Antimonii, 236.
— Sulphuris, II. 636.
— temperantes, II. 418.
— de Terra Catechu. 468.
— de tribus. II. 418.
— contra vermes, 553.
— vermifugae, 521. II. 160 169.
— violatae s Violarum, II. 714.
— Vitae. II. 227.
Tablets. purple, II. 93.
Tabulae alimentariae, 728.
— Althaeae, 132.
— antichloroticae. 672.
— Ferri compositae, 677.
— instaurantes, 672.
— Kermetis, 241.
— martiales, 672. 677.
— Oculorum Cancri, 382.
— pectorales, 329
— Spitzlayi v. Tabellae.
Tacamahaca, II. 642.
— Americae septent., II. 642.
— Caragna, 436.
— communis, II. 642.
Tacamahaca Mauritiana, II. 642.
— in sortis, II. 642.
— sublimis. II. 642.
— in testa, II. 642.
— vera, II. 642.
Taffetas Anglicum, 729.
— epispastic. Guilberti, 421.
— d Inghilterra, 729
— Resinae Guidii, 640.
— vesicans, 431.
Taffia, 88.
Talc, oil of, II. 98.
— water, II. 98.
Talcum, II. 95.
— transparens, 388.
— Venetae, II. 97.
Talpa Europaea, 381.
Talpae combustae, 381 437.
Talus Leporum, 386.
Tamarindi, II. 643.
— naturales, nigri, praep., rubi II. 643.
Tamarindus Indica, II. 643.
Tamariscus, II 646.
— Gallicus. II. 646.
— Germanicus. II. 646.
Tamarix. T. Gallica, II. 646.
— Germanica, II. 646.
Tamnus, II. 627.
Tamus, II. 647.
— communis, II. 647.
Tanacetum, II. 647.
— annuum, Balsamita, II. 647.
— hortense, 321.
— vulgare, II. 647.
Tannin, II. 458.
Tapioca, II. 649.
Tapioka, II. 649.
Taraxacum. II. 649.
— Dens Leonis, II. 649.
Tar liniment, II. 348.
Tartari Crystalli, II. 429.
Tartarum, II. 429
— album, II. 429.
— antimoniatum, 251.
— boraxatum, II. 434.
— crudum, II. 429.
— emeticum, 251.
— Ferri, 700.
— rubrum, II. 429.
— solubile, II. 427.
— — extemporaneum, II. 427.
— tartarisatum, II. 427.
— vitriolatum, II. 406.
Tartarus, II. 429.
— acetosus, II. 420.
— albus, II. 429.
— ammonialis, II. 436.
— ammoniatus, II. 436.
— antimoniatus, 251.
— boraxatus, II. 434
— chalybeatus, 700.
— — solubilis, 700.
— crudus, II. 429.
— crystallisatus, II. 429.
— depuratus, II. 429.
— emeticus, 251.
— ferruginosus, 700.
— impurus, II. 429.
— martialis. 700
— — solubilis, 700.
— martiatus, 700.
— mercurialis, II. 213.
— natronatus, II. 435.
— Potassae et Sodae, II. 435.
— ruber, II. 429
— solubilis. II 427
— — ammoniacalis, II. 436.
— — de Seignette, II. 435.
— stibiatus, 251.
— tartarisatus. II 427.
— vitriolatus crudus, II. 406.
— — depuratus, II. 407.

Tartras acidulus Potass. admixto Acido boracico, II. 431.
— — — purus, II. 429.
— — — venalis, II. 429.
— Ammoniacae pyro-oleoso-aquos., 193.
— — s. Ammoniaci, 193.
— Antimonii, 251.
— — et Potassae, 251.
— Deutoxydi Potassii et Protoxydi Antimonii, 251.
— Kali, II 427.
— kalico-ammonicus, II. 430,
— — — ferricum s. ferricus, 700.
— — — natricus c. Aqua II. 435.
— — — natricum, II 435.
— — — stibialis, 251.
— — — stibicus, 251.
— kalicus, II. 427.
— kalinum, II. 427.
— Lixivae s. Lixiviae, II 427.
— — acidulus depuratus, II. 429.
— — — impurus, II. 429.
— — et Sodae, II. 435.
— — stibiatum s. stibiatus, 251.
— Mercurii, II. 213.
— — et Potassae, II. 213
— — Protoxydi, II. 213.
— Oxyduli Stibii et Potassae, 251.
— Potassae, II. 427.
— — acidulum s. acidulus, II. 429.
— — — crudus, II. 429.
— — — purus, II. 429.
— — — — praeparatus, II. 429.
— — — solubilis admixto Acido boracico, II. 434.
— — — stibiatus, 251.
— — acidus II. 429.
— et Ammoniaci, II. 436.
— — antimonialis, 251
— — antimoniatum, 251.
— — et Antimonii, 251.
— — boraxatus, II. 434.
— — crystallisatus, 63.
— — ferratum, 700.
— — et Ferri, 700.
— — — liquidum, 703.
— — — solidus, 702.
— — ferrosum. 701.
— — ferruginosum, 700.
— — neutrale s. neutrum, II. 427.
— — et Oxydi Ferri, 702.
— — — Antimonii, 251.
— — et Sodae, II. 435.
— — sodicum, II. 435.
— — solubilis p. Acidum boricum, II. 431.
— — stibiale, 251.
— — stibiat., 251.
— — stibios., 251.
— Potassii, II. 427.
— — Deutoxydi s. Protoxydi, II. 427.
— — —, Tartrate et Borate Deutoxydi Sodii commixt., II. 434.
— — Protox. et Ammoniaci, II. 436.
— — — et Sodii Protox., II. 435.
— — stibiosus, 236.
Tartras Sodae et Kali, II. 435.
— Stibii, 251.
— — c. Potassa s. et Potassae, 251.
— subpotassicum, II. 429.
— superpotassicum, II. 429.
Tartris Antimonii, 251.
— boraxata Potassae et Sodae, II. 434.
— Lixiviae stibiatus, 251.
— Potassae, II. 427.
— — acidul. depurat., II. 429.
— — et Ammoniae, II. 436
— — antimoniatus, 251.
— — ferruginosus, 701.
— — et Sodae, II. 435.
— — — boraxata, II. 434.
— — stibiata, 251.
Tasteless ague drop, 287.
Tecolithus, 380.
Tela araneosa, 276.
— communis, 269.
— emplastica epulotica, II. 373.
— dicta Maja, 269.
— Gualthieri s. Gualteri, II. 375.
— Ichthyocollae glutinans, 729.
— vulgaris, 269.
Telephium vulgare, 607.
Terebinthina, II. 652.
— abiegna, II. 652.
— abietina, II. 652.
— Argentoratensis, II. 652.
— balsamea, I.
— Bordegalensis, II. 652.
— Burdigalensis, II. 652.
— Canadensis, I.
— Chia, II. 651.
— cocta, II. 671.
— communis, II. 652.
— Copahu, 321.
— Cypria, 651.
— empyreumatica, II. 347.
— laricea, II. 652.
— laricina, II. 652.
— larigna, II. 652.
— nativa, II. 652.
— pinea, II. 652.
— Pini Laricis, II. 652.
— — sylvestris, II. 652.
— pistacina, II. 651.
— Veneta, II. 652.
— vera, II. 751.
— vulgaris, II. 652.
Terra absorbens mineralis, II. 90.
— Aluminis, 142.
— amara, II. 90.
— — aërata, II. 90.
— — sulphurica, II. 95.
— — vitriolata, II. 95.
— animalis, 386.
— argillacea pura, 142.
— bolaris, 141.
— — pura, 142.
— calcarata s calcarea, 378.
— calcarea pura, 373.
— Catechu, 467.
— Coloniensis, 678.
— foliata Mercurii, II. 211.
— — mercurialis, II. 211.
— — mineralis, II. 617.
— — Tartari, II. 420.
— — — crystallisata, II. 617.
— Japonica, 467.
— Lemnia, 141.
— Lemniana, 141.
— magnesica, II. 90.
Terra Ossium, 386.
— ponderosa, 336.
— — acetata, 337.
— — aërata, 336.
— — carbonica, 336.
— — muriata, 333.
— — muriatica Bergmanni, 334.
— — pura, 335.
— — salita, 333.
— — vitriolata Bergmanni, 336
— sigillata, 141.
— — alba, 141.
— — rubra, 141.
— talcosa oxyanthracodes. II 90.
— Tripolitana, II. 659.
— Umbria 678.
— viridis, 619.
— Vitrioli dulcis, 678.
Testae Cochleae, 379.
— Ostrearum, 379.
— — praeparatae, 381.
— Ovorum, 379. 381.
— — praeparatae, 381.
Testes Equi, 720.
Testudo Lutaria, 719.
Tetranthera Pichurim, 666.
Tetroxydum Manganesii, II. 101.
Teucrium Chamaedrys, II. 678.
— Chamaepitys, II. 679.
— Creticum, II. 680.
— flavum, II. 678.
— Iva, II. 679.
— Marum, II. 679.
— montanum, II. 680.
— Scordium, II. 680.
— Scorodonia, II. 680.
Thalictrum flavum, II. 682.
— angustifolium, aquilegifolium, II. 683.
— magnum, II. 682.
— majus, minus, II. 683.
Thapsia Asclepium, II. 683.
Thapsus barbatus, II. 709.
Thea amara, II. 692.
— Bohea, II. 683
— Bouy, II. 683.
— Chinensis, II. 683.
— haemastatica, II. 496.
— Heysan, II. 683.
— Mexicana, II 683.
— Paraguay, 615.
— Peccao, II. 683.
— perlata, II 683.
— poudre à canon, II. 683.
— Saot chaou, II. 683.
— Schulang, II. 683.
— viridis, II 653.
— Thecolithes, 380.
Theina — Theae princip. salif.
Theobroma Cacao, 367.
Theriaca, II. 293.
— Andromachi, II. 293.
— — reformata, II. 293.
— coelestis Hoffm., II. 307.
— communis, II 522.
— Diatessaron, II. 237.
— Germanica vulgaris, II. 40.
— Germanorum, II. 40.
— officinalis, II. 3. 237.
— pauperum, II. 40. 237.
Thlaspi, II. 683.
— arvense, II. 683.
— Bursa pastoris, II. 683.
— campestre, II. 683.
— sativum, II. 243.
Thridax, II. 52.
Thuja articulata, II. 539.
— occidentalis, 270.
— quadrivalvis, II. 539.

Digitized by Google

Thus. 451. II. 255.
— foemineum, masculum, II. 255.
— foemininum, II. 671.
— in guttis, II. 255.
— in massis, II. 255.
— Judaeorum, II. 626.
— verum, II. 255.
— vulgare. II. 671.
Thuya s. Thuja.
Thymbra vera, II. 554.
Thymelaea, 638.
Thymiama, 451.
Thymus alpinus. II. 684.
— Creticus, II. 554.
— hortensis, II. 684.
— mastichina, II. 684.
— Serpyllum. II. 684.
— verus, II. 554.
— vulgaris, II. 684.
Tiglina, 612.
Tiglium, 612.
Tilia, II. 686.
— Europaea, II. 686.
Tillium, 612.
Tincal, II. 611.
Tinkal, II. 611.
Tinkar, II. 611.
Tinctura Absinthii, 9.
— — alcalina, 9.
— — amara, 10.
— — aquosa, 11.
— — composita, 10.
— — Extracti comp., 11.
— Acaciae Catechu. 472.
— Acetatis Ferri, 697.
— — — c. Alcohole, 698.
— — — alcoholica, 697.
— — Zinci, II. 734.
— acida aromatica. 419.
— Acidi sulph., 419.
— Aconiti. 67.
— — aetherea, 67.
— — alcoholica, 67.
— Acori, 372.
— adstringens, II. 369. 462.
— aetherea, 82.
— — alcoholica de Muriate Ferri, 692.
— — camphorata, 398.
— — ferrata, 692.
— alcalina. II. 393.
— — acris, II. 393.
— alcoholica Opii aromatica, II. 268.
— Alceae, 88.
— — purpureae, II. 101.
— Alcoholis Sulphuris iodata, II. 8.
— alexipharmaca Huxh., 532.
— alkalina acris, II. 393.
— Aloës, 101. 105.
— — aetherea, 117.
— — alcoholica compos., 115.
— — aquosa, 105.
— — composita, 115.
— — crocata, 115.
— — c. Myrrha, 115.
— — — crocata, 115.
— — et Myrrhae, 114.
— — Socotrinae. 105.
— aloëtica alcalina, 116.
— amara, 125. 564. 567. 738. II. 694.
— — Halensis, 2.
— Ambrae s. A. gris, 153.
— — aetherea, 154.
— — balsam. Dipp., 154.
— — composita aeth., 154.
— — griseae alcalina, 153.
— — liquidae, 154.
Tinctura Ambrae Mindereri, 154.
— — moschata aeth., 154.
— — cum Moscho, 153.
— ammoniata aromatica, 161.
— — foetida, 302.
— Amomi repentis, 441.
— — Zingiberis, II. 736.
— Angelicae. 216.
— — ammoniacea, 214.
— Angusturae. 220.
— Anime Gutti. 766.
— anodyna, II. 260.
— — volatilis, II. 270.
— Anthemidis, 490.
— antiarthritica, II. 404.
— antiepileptica, 602.
— antigonorrhoica. II. 417.
— antihysterica, 464.
— Antimonii acris. II. 393.
— — alcalina, II. 393.
— — balsamica, II. 393.
— — Hermbstaedtii, 248.
— — Jacobi, 248.
— — nigra, II. 393.
— — saponata, 248.
— — tartarisata, II. 393.
— antiodontalgica, II 454.
— antiphthis. Gramanni, 700. II. 371.
— antirheumatica, 642.
— antiscorbutica, II. 50.
— antiseptica, 532.
— antispasmodica, 302. II. 273. 706.
— — Christiani, II. 265. 269.
— — camphor., II. 270.
— — Dumasii, II. 270.
— — Keupii, II. 706.
— — et tonica, II. 705.
— antispasmodico - emmenagoga, 114.
— antisyphilitica, II. 186.
— — Besnardi, II. 404.
— — Talbotii, II. 404.
— antivenerea Falkii, II. 190.
— aperitiva, 35. II. 483.
— Aquilegiae Flor., 276.
— Aristolochiae Serpent., 281.
— Arnicae, 284.
— — aetherea, 284.
— — alcoholica, 284.
— aromatica, 414. 417.
— — acida, 419.
— — c. Acido sulph., 419.
— — ammoniacea, 161.
— — composita, II. 60. 529.
— — flava, II. 344.
— — sulphurica, 419.
— Artemisiae Absinthii, 9.
— arthritica, II. 41.
— Asae foet., 304.
— — — aeth., 303.
— — — ammoniata, 302.
— — — kalica, 304.
— — — stibiata, 248.
— Asari, 307.
— Assae foet. v. Tinct. As. foet.
— Aurantii, 566.
— — dulcis, 567.
— — immaturi, 567.
— — Pomor. immat., 567.
— Aurantior. aeth., 563.
— — Cortic., 566.
— — — alcalis, 561.
— — — alcoholica Whyttii, 533.
— — — composita, 568.
— — — Whyttii, 533.
Tinctura Aurantior Pomor. immatur., 567.
— aurea s. aurata, 592. 692.
— — nervino-tonica. 692.
— — — — Lamotte, 692.
— Auri, 317.
— Balsami Canadensis, 1.
— — — roborans, 1.
— — Copaivae, 322.
— — — alcalina, 322.
— — de Mecca, 326.
— — Peruviani, 327.
— — Sulphuris, II. 639.
— — Tolutani, 331.
— balsamica, 327. 331. 341.
— — composita, 1. 322. 341.
— — purificans, II. 190.
— Belladonnae, 314.
— Bellidis Flor., 339.
— Benzoatis Ammon. camph., II. 271.
— — — compos., II. 272.
— Benzoës, 340.
— — aloëtica, 341.
— — balsamica, 341.
— — composita, 341.
— Benzoini. 340.
— — aloëtica, 341.
— — balsamica, 341.
— — composita, 341.
— Bestuchelfii, 692.
— bezoardica, II. 720.
— — Ludwigii. 217.
— Bonplandiae trifol., 220.
— Botryos, 496.
— — Mexicanae, 496.
— Bruceae, 220.
— Brucini, 356.
— Buchu, 366.
— Burgundica, 530.
— caerulea, 632.
— Calami aromatici. 372.
— — composita, 372.
— Calumbae. 596.
— Cambogiae ammoniacata s. ammoniata, 773.
— Camphorae, 399.
— — composita, II. 271.
— — opiata, II. 271.
— Cancrorum Oculorum, 391.
— Canellae albae, 416.
— Cantharidis. 422.
— — vesicatoriae. 424.
— Cantharidum. 424.
— — aetherea, 427.
— — — camphor., 428.
— — — composita, 428.
— — alcoholica. 426.
— — — camphorata, 426.
— — camphorata, 426.
— — composita. 426.
— — opiata. 426.
— — terebinthinata, 426.
— Capsici, II. 343.
— — annui, II. 343.
— — et Cantharid., II. 347.
— Carbureti Sulphuris iodurati, II. 8.
— Cardamomi, 441.
— — composita, 441.
— cardiaca Rymeri, II. 343.
— Cardui benedicti, 444.
— carminativa, 448.
— — Wedelii, 448.
— Caryophyllatae, 742.
— Caryophyllor. arom., 449.
— Cascarillae alcohol., 453.
— — alcoholico - alcalina, 454.
— — aquosa s. aquosa alcalina, 453.

Tinctura Cassiae s. C. cinnamomeae, 416.
— — ligneae, 416.
— — Sennae comp., II. 586.
— Castorei, 462.
— — aetherea, 465.
— — Canadensis s. Novae Angliae, 462.
— — — aetherea, 465.
— — composita, 463.
— — foetida, 463.
— — kalina, 462.
— — Moscovitici s. Rossici, 462.
— — opiata, 463.
— — simplex, 462.
— — thebaica, 463.
— — vulgaris, 462.
— Catechu, 472.
— — aromatica, 472.
— — composita, 472.
— — Terrae, 474.
— cathartica, II. 580.
— Centaurii minoris, 474.
— Cerasor nigror., 479.
— chalybeata, 704.
— Chamaemeli. 490.
— Chamomillae, 490.
— Chenopodii, 496.
— — aetherea, 496.
— — ambrosioidis, 496.
— Chestoni, 478.
— Chinae, 531.
— — alcoholica, 531.
— — amara. 533.
— — ammoniata, 532.
— — aquosa 5 9.
— — Cort. compos., 533
— — composita, 533.
— — compos. alcohol, 532.
— — concentrata, 532.
— — flavae, 632.
— — fuscae vinosa — c. Vino Hisp. par.
— — gingivalis, 535.
— — kalina, 532.
— — officinalis Huxhami, 532.
— — regiae, 532.
— — rubrae, 532.
— — simplex, 532.
— — volatilis, 532.
— — Whyttii, 533.
— Chinini sulph., 539.
— Cicutae, 548
— — aetherea, 548.
— — aquaticae, 548.
— Cinchonae, 531.
— — alcohol., 532
— — aetherea comp., 535.
— — amara, 533
— — ammoniata, 532.
— — composita, 532.
— — flavae, 532.
— — kalina, 532.
— — lancifoliae, 531.
— — martiata, 699
— — officinalis. 531.
— — — comp., II. 535
— — rubrae, 532.
— — volatilis, 532.
— Cinchoninae s. Cinchonini, 555
— — sulphurici, 555.
— Cinnamomi, 416.
— — acuti, 416.
— — aetherea, 419.
— — composita, 417.
— — phosphorico - acida, 54.
— — Sinensis, 416.
— — Zeylanici, 416.
— Citri Aurantii, 566.
Tinctura Coccinellae septemp., 578.
— Coccionellae, 579.
— Cochleariae, 581.
— coerulea, 619.
— Colchici autumnalis, 586.
— — Seminum, 586.
— — — vinosa, 586.
— — vinosa, 585.
— Colocynthidis, 592.
— — anisata, 592.
— — stibiata, 592.
— Colombo, 596.
— — composita, 596.
— Columbae, 596.
— Columbo, 596.
— compos. Whyttii, 533.
— Conii comp., 548.
— Conorum Humuli Lup., II. 89.
— Contrayervae, 601.
— Convolvuli Jalapae, II. 32
— Corallii, II. 523.
— Coralliorum, 391.
— Corticis Peruv. alcohol., 531.
— — — alcalina, 519.
— — — alexipharmaca Huxh, 532.
— — — ammoniata, 532.
— — — aquosa kalina, 519.
— — — composita, 532
— — — kalina, 532.
— — — volatilis. 532.
— — Quercus, II. 469.
— — Winterani, 606.
— Corticum Aurant, 566.
— — Winteranor., 606.
— cosmetica, 341.
— — simplex, 340.
— Croci, 609.
— — c. Spiritu Vini, 609.
— — vinosa, 608.
— Crotonis Eleutheriae, 453.
— Cubebae, 614.
— Culilaban s. Culilawan, 615.
— Cupri, 624.
— — Lewisii, 619.
— — sulphurici, 622.
— Curcumae, 632.
— — aquosa, 632.
— Cuspariae, 220.
— Daffyi, II. 588.
— Dahlbergi s. Dalbergi, 592.
— Delphinii. 643.
— ad dentes, II. 22.
— Deutoiodureti Merc. alcohol., II. 194.
— Diambrae sine odoratis, 404.
— diaphoretica, 601.
— Dictamni albi, 646.
— digestiva, 739
— Digitalis, 650.
— — aetherea, 652.
— — aquosa Fowleri, 649.
— — aquoso - aetherea, 652.
— — composita, 650.
— — Flittneri, 652.
— — Harlesii, 651.
— — Macleani, 651.
— — Planchii. 657.
— — purpureae, 650.
— — — aetherea, 652.
— — Remeri. 650.
— — semispirituosa, 651.
— — simplex, 650.
— — spirituosa, 651.
— — Trommsdorfii, 651.
— diuretica, 651. 652. II. 694
— elastica, 681.
— Ellebori composita, 780.
Tinctura Eluteriae, 453.
— Enulae. II. 6.
— Euphorbii, 663.
— — alcalina, 664.
— excitans, 336. 533.
— Extracti Opii. II. 264.
— — Tormentillae erectae, II. 688.
— febrifuga, 291.
— — acida, 56.
— — Cluttonii, 217.
— — Huxhami, 533.
— — Mutisii. 533.
— — Whytti, 533.
— Fellis, 669.
— ferrata, 704.
— Ferri, 690.
— — Acetatis, 697.
— — — alcoholica. 697.
— — acetici, 697.
— — — aetherea, 698.
— — aetherea, 692.
— — ammoniati, 697.
— — aquosa alcalina, 681.
— — aurantiaca, 700.
— — muriati. 690. 691.
— — muriatici, 690. 691.
— — — oxydulati, 691.
— — Muriatis, 691.
— — oxydul. tart., 699.
— — pomata, 699.
— — pomati, 699.
— — Protohydrochloratis, 691.
— — sulphuro - zoot., 708.
— — tartarici, 704.
— — tartarisata, 703.
— — tartarisati vinosa, 703.
— — Tritohydrochloratis, 691.
— ferruginosa, 704.
— Ferulae Asae foet, 304.
— Filicis Gemmarum aeth., II. 741.
— Florum martial. s. Flor. Salis Ammoniaci martialium, 697.
— foetida, 304.
— — ammoniacalis s. ammoniacata, 463.
— — pyro - oleosa, II. 273.
— Formicarum composita, 709.
— Fuliginis, 304.
— — alcalina, 189.
— — Glauderi, 189.
— — foetida, 304.
— Galangae, 714.
— Galbani, 359.
— — composita, 359.
— Gallarum, 718.
— Gei urbani. 742.
— Gentianae, 737.
— — alcalina, 739.
— — alcoholico - sulph. composita 419.
— — composita, 738.
— — — alcalina, 739.
— — rubrae, 737.
— Gentianinae s. Gentianini, 740.
— — alcalina, 740.
— Geoffroeae, 741.
— gingivalis, 472.
— — balsamica, 472. II. 49. 50.
— Glechomae hederaceae, 775.
— Gnidii Resinae, 639.
— — contra gonorrhoeam, II. 417.
— Gratiolae, 747.
— Guajaci. 751. 752.
— — aetherea, 750.
— — ammoniacalis, 752.
— — — aromatica, 752.

ed by Google

Tinctura Guajaci ammoniacata, 752.
— — ammoniata, 752.
— — composita, 752.
— — Emerigonis, 752.
— — foeniculata, 752.
— — Gummi, 751.
— — Ligni, 750.
— — officinalis, 750. 751.
— — Resinae, 751.
— — volatilis, 753.
— — — Dewesii, 753.
— guajacina etc. v. Tinct. Guajaci.
— Gummi Ammoniaci, 760.
— — — kalina, 760.
— — Guttae ammoniata, 773.
— — Gutti, 773.
— — — alkalina, 773.
— — — ammoniacata, 773.
— — — ammoniata, 773.
— — Laccae aquosa, II. 49.
— — — composita, II. 49.
— haemastatica, 579.
— Haematitis ammoniati, 597.
— Haffieldi, 753.
— Hederae terrestris, 775.
— Helenii, II. 6.
— Hellebori, 780.
— — albi, 780.
— — composita, 780.
— — nigri, 780.
— — — vinosa, 780.
— — viridis, 781.
— Hierae, 114.
— Hjernaei contra taeniam, 108.
— Humuli, II. 89.
— — Lupuli, II. 89.
— hydragoga, 694. 781 II. 44.
— Hydriodatis Ferri, II. 742.
— Hyoscyami, 792.
— — aetherea, 792.
— — Faeculae, 791.
— — nigri, 792.
— — Seminum, 792.
— Hyperici, 798.
— — balsamica, 798.
— — compos., 798.
— — vinosa comp., 797.
— — vulneraria alcohol., 798.
— hypnotica, II. 268.
— Indigo Resinae, II. 2.
— Inulae, II. 6.
— Iodi, II. 7.
— Iodii, II. 7.
— — aetherea, II. 8.
— Iodinae, II. 7.
— — diluta, II. 7.
— Iodinii, II. 7.
— Ipecacuanhae, II. 17. 18.
— — amisata, II. 18.
— — opiata, 189.
— Ipecacuannae, II. 17.
— Jalapae s. Jalappae, II. 32.
— — aromatica, II. 32.
— — composita, II. 33.
— — confortans s. roborans, II. 32.
— — Resinae, II. 32.
— Jalappii, II. 32.
— Japonica, 472.
— Juglandis Nucum Cort. virid., II. 35.
— kalina, II. 393.
— Kermetis, 497.
— Kinkinae amara, 533.
— Kino, II. 47.
— Laccae aquosa, II. 49.
Tinctura Laccae alcoholica, II. 49. 50.
— — — comp., II. 49.
— — aluminata, II. 50.
— — coeruleae, II. 49. 50.
— — — aquosa, II. 49. 50.
— — composita, II. 49.
— — kalica, II. 50.
— — spirituosa, II. 50.
— — c. Spir. Cochlear. offic., II. 50.
— Lactucae, II. 52.
— — virosae, II. 52.
— Lactucarii, II. 52.
— Laudanum, II. 200.
— Lauri Cinnamomi, 416.
— Lavandulae comp., II. 63.
— laxativa, 105.
— Ligni Agallochi, II. 71.
— — Aloës, II. 71.
— — Quassiae, II. 457.
— — Sassafras, II. 553.
— — — comp., II. 553.
— Lignorum, 3. 751.
— Lobeliae, II. 87.
— — inflatae, II. 87.
— longae vitae, 123.
— Lupuli, II. 89.
— — Strobilorum, II. 89.
— Lupulini, II. 89.
— Lyttae s. L. vesicator., 424.
— — — aetherea, 427.
— Macidis, II. 232.
— Macis, II. 232.
— Malatis Ferri, 699.
— Mari veri aeth., II. 680.
— martialis Ludovici, 703.
— Martis, 691. 699.
— — adstringens, 691. 697.
— — alcalina, 681.
— — aperiens, 691. 702. 703.
— — aperitiva, 691. 697. 703.
— — — Glauberi, 703.
— — — tartarisata, 703.
— — — Zwoelferi, 697.
— — aurea, 691.
— — cydoniata, 699.
— — dulcis, 691.
— — elleborata, 704.
— — Glauberi, 703.
— — helleborata, 704.
— — Klaprothii, 698.
— — pomata, 699.
— — pomati, 699.
— — c. Pomis Aurant., 700.
— — c. Sale Ammoniaco, 691.
— — salita, 690. 691.
— — c. Spir. Salis, 691.
— — c. Succo Cydonior., 699.
— — — — Pomor., 699.
— — tartarisata, 702. 703.
— — — Glauberi, 703.
— — — Ludovici, 703.
— — c. Vino, 705.
— — — Malvat. et Pomis Aurant., 700.
— — vinosa, 705.
— — — Boerhavii, 705.
— — e Vitriolo, 697.
— Mastiches s. Mastichis, II. 108.
— — composita, II. 108.
— mastichina, II. 108.
— Matris Perlarum, 391.
— Melampodii, 780.
— Melissae, II. 112.
— Meloës vesicat., 424.
— Menthae crispae, II. 738.
Tinctura Menthae piperitae, II. 120.
— — Piperitidis, II. 120.
— — viridis, II. 120.
— Menyanthis, II. 693.
— Metallorum, II. 593.
— Millefolii, II. 217.
— Millepedum, II. 219.
— Mimosae Catechu, 472.
— moschata, II. 229.
— Moschi, II. 229.
— — aetherea, II. 230.
— — alcoholica, II. 229.
— — artificialis, II. 633.
— — vinosa, II. 229.
— de Muriate Ferri aeth. alcoh., 692.
— Muriatis Ferri, 691.
— — — alcoholisata, 654.
— — — c. Oxydo rubro, 691.
— Myrrhae, II. 229.
— — alcalisata, II. 240.
— — alcoholica, II. 239.
— — — uterina, 304.
— — c. Aqua Rabelii, II. 240.
— — aquosa, II. 238.
— — composita, II. 239.
— — phosphorata, 55.
— — rubra, II. 239.
— — simplex, II. 240.
— — uterina, 304.
— nervina Bestucheffii, 692.
— — Halensis, 692.
— — (nervalis) et tonica, II. 705.
— nervino-tonica-martial., 692.
— — — Lamotte, 692.
— Nicotianae, II. 248.
— Nucis moschatae, II. 232.
— — vomicae, II. 252.
— Nucum vomicarum, II. 252.
— Oculorum Populi, II. 389.
— odontalgica, II. 454.
— Olei camphorati, 400.
— — Crotonis, 612.
— ophthalmica, 261.
— Opii, II. 264 273.
— — acetosa, II. 258.
— — alcoholica, II. 264. 269.
— — — et Acidi benz. camphorata, II. 271.
— — — ammoniacalis et camphorata, II. 270.
— — — aromatica, II. 268.
— — — composita, II. 269.
— — — — anticolica etc., II. 269.
— — — saponacea, II. 277.
— — ammoniacalis, II. 270.
— — — camphorata, II. 270. 271.
— — ammoniacata, II. 270.
— — ammoniata, II. 270. 272.
— — et Benzoatis Ammoniae, II. 272.
— — benzoica, II. 271.
— — — comp., II. 271.
— — camphorata, II 269. 271.
— — — cum Acido benzoico, II. 271.
— — crocata, II. 260.
— — crocea, II. 269.
— — Eckardi, II. 268

Tinctura Opii Extracti, II. 264.
— — officinalis. II. 263.
— — saponacea, II. 271.
— — simplex, II. 259. 264 268.
— — spirituosa, II. 259. 263.
— — thebaica. II. 264.
— — — genuina, II. 259.
— — vinosa, II. 259
— — — anticolica, II. 269.
— — — et aromatica, II. 260.
— — — crocata, II. 260.
— — — Sydenh., II. 260.
— Oreoselini, II. 576.
— Papaveris Capsularum, II. 324.
— — erratici, II. 324.
— — Florum. II. 324.
— — Rhoeadis s. Rhoeados, II. 324.
— paregorica, II. 269.
— Phellandrii aquat., II. 334
— physagoga, 563.
— Picis Graecae alcohol. comp., 114.
— — liquidae, II. 347.
— Pimentae. II. 343.
— — sulphurica. II. 343.
— Pimpinellae, II. 339.
— — albae, II. 339.
— — comp., II. 340.
— — kalica, II. 340.
— Pini, 2. II. 341.
— — composita, 3.
— Piperis, II. 343.
— — Jamaic. aeth., II. 343.
— — nigri, II. 343.
— plumbosa, II. 361.
— Populi, II 389.
— — Oculorum, II. 389.
— prophylactica ad choleram, II. 743.
— proprietatis Mynsichti, 224.
— Protohydrochlorat. Ferri, 691.
— Psychotriae sulphuricae, II. 13.
— purgans, II. 33.
— Pyrethri, II. 454.
— — aetherea, II. 455.
— — odontalgica, II. 454.
— Quassiae alcoholica, II. 457.
— — excelsae, II. 457.
— — vinosa. II. 457.
— Quercus Corticis, II. 459.
— Raphani comp., II. 465.
— Ratanhiae, II. 469.
— — acetosa s. c. Aceto, II. 469.
— — aquosa, II. 469.
— — aromatica, II. 469.
— — compos., II. 469.
— — saccharata, II. 469.
— regia, 154. 414.
— Resinae Guajaci, 712.
— — Indigo, II. 1.
— — Succini, II. 633.
— resino-saponacea, 753.
— Rhabarbari, II. 487.
— — alcoholica, II. 484.
— — — aromatica, II. 485.
— — aquosa, II. 479. 481.
— — composita, II. 485.
— — spirituosa, II. 484.
— — vinosa, II. 483.
— Rhataniae aromatica, II. 469.
— Rhei, II. 481. 486.
— — alcoholica, II. 484.
Tinctura Rhei alcoholica aromatica, II. 485.
— — et Aloës, 123
— — amara, II. 485.
— — aquosa, II. 478. 481.
— — — alcalina, II. 481.
— — — salina, II. 482.
— — composita, II. 486.
— — Darelii, II. 484.
— — dulcis, II. 484 485.
— — et Gentianae, II. 485.
— — palmati, II. 481.
— — spirituosa, II. 485.
— — — dulcis, II. 455.
— — vinosa, II. 483. 484.
— — — Darelii, II. 484.
— Rhodii, II. 74.
— Rhododendri, II. 486.
— Rhois radicantis, II. 488.
— Ricini, II. 492.
— roborans, 417. 532. 738.
— — Whyttii, 533.
— Rosarum, II. 495. 499.
— — acidula, II. 501.
— — Flor. s. Rosar. rubr. aquosa, II. 501.
— Sabinae, II. 41.
— — composita, II. 240.
— — kalina, II 41.
— sacra, 104. 105. 123.
— salina. II. 394
— — comp., 739.
— Salis Amm. cuprifera, 626.
— — — cupriferi, 626.
— — Tartari, II. 393.
— — — phosphorata, II 337.
— Sanguinariae Canad., II. 539
— Sanguinis Draconis, II. 540.
— Saponis, II. 440. 441.
— — c. Camphora et Opio, II. 443.
— — camphorata, 167. II. 442.
— — composita, II. 442.
— — et Opii s. c. Opio, II. 271.
— Sarcocollae, II. 544.
— Sarsaparillae, II. 552.
— Sassafras, II. 553.
— — compos., II. 553.
— — Ligni, II. 553
— Saturni, II. 359.
— saturnina, II. 369.
— saturnino-martialis, II. 369.
— Scammonii, II. 558.
— Scillae. II 567. 568
— — aromatica, II. 568.
— — composita, II. 568.
— — kalina, II. 568.
— — maritimae, II. 567.
— Scordii, II. 681.
— — composita, II. 682.
— sedativa. II. 263. 268.
— — camphorata, II. 271.
— Senegae, II. 385.
— Sennae. II. 586.
— — amara, II. 587.
— — aromatica, II 586. 588
— — composita, II. 586.
— Serpentariae Virg., 281.
— Spilanthi, II. 245.
— Spiritus Terebinth. Vauquelini, II. 663.
— stibiata, II. 273.
— Stibii alkalisata, II. 393.
— stomachica, 504. 508. 706. II. 343
— — acuta Ernstingii, II. 343.
— — aromatica, 418.
Tinctura stomachica Lentini, 373.
— — Lipsiensis, 161.
— — martialis. 704. 706.
— — Whyttii, 533.
— Stramonii. 641.
— — aetherea, 642.
— — alcoholica. 642.
— — ammoniata, 642.
— — Seminis, 641. 642.
— Strychnini. II. 627.
— Stychnos, II. 252.
— styptica, 718.
— Succini. II. 631.
— — aetherea, II. 633.
— — alcalisata, II. 631.
— — alcoholica, II. 631.
— — aromatica, II. 509.
— — balsamica, II. 630. 633.
— — foetida, II. 633.
— Sulphatis Chinini, 539.
— — Cinchonini, 555.
— — Cupri, 622
— — Quininae, 539.
— Sulphuris, II. 398 638.
— — Alcoholis. iodata, II. 8.
— — Carbureti iodurati, II. 8.
— Sulphuroprussureti Ferri, 708.
— Tabaci, II. 248.
— Tanaceti. II. 648.
— Tartari, II. 393.
— — acris, II. 374.
— — composita, 755.
— tartarisata Glauberi, 703.
— — Ludovici, 703.
— Tartratis Potassae ferrici, 703.
— Terebinthinae, II. 652.
— Terrae Japonicae, 472.
— — Catechu, 472.
— thebaica, II. 260 264. 263.
— — Bambergi, II. 268.
— — Marabelli, II. 259.
— theriacalis, 213. II. 302.
— Toluiferae Bals., 331.
— tolutana, 331.
— — aetherea, 331.
— tonica, 519.
— — Huxhami, 532.
— — martialis, 706.
— — — lactea, 691.
— — et temperans, 519.
— — Whyttii, 533.
— tonico-nervina Halensis, 692.
— — — Bestuscheffii, 692.
— Tormentillae, II. 688.
— — Extracti, II. 688.
— Trifolii fibrini. II. 691.
— Tritohydrochlorat. Ferri, 692.
— Turion Pini compos., 3.
— Valerianae, II. 704.
— — aetherea, II. 706.
— — — camphorata, II. 706.
— — ammoniacea comp., 705.
— — ammoniata, II. 705.
— — anodyna, II. 706.
— — camphorata, II. 704. 706.
— — composita, II. 704.
— — officinalis, II. 704.
— — sylvestris, II. 704.
— — volatilis, II. 705.
— Vanigliae s. Vanillae, II. 708
— Veratri s. V. albi, 780.

Digitized by Google

Tinctura Veratri viridis, 781.
— Veratrini, II. 709.
— vermifuga, II. 273.
— c. Vino Boerhaavii, 705.
— vinosa Boerhaavii, 705.
— Vincetoxici, 308.
— vinosa Extracti Absinthii comp., 563.
— pro vita producenda, 123.
— volatilis anodyna, II. 270.
— vulneraria, II. 529.
— — rubra, II. 529.
— — simplex, II. 108.
— — Stahlii, II. 663.
— Zedoariae, II. 720.
— — composita, II. 720.
— Zinci Acetatis, II. 734.
— Zingiberis, II. 736.
Tincture of Pyrethrum, Oxley's, II. 455.
— of rhubarb, Bates's, 485.
— Rymer's cardiac, v. Tinctura.
Tinkal, Tinkar, II. 611.
Tisana acida, 574.
— acidulata, II. 490.
— adstringens, 59. 472. 598. 768. II. 452. 495. 688.
— — febrifuga, II. 459.
— alcalina Mascagni, II. 401.
— Angelicae, 215.
— antidysenterica, II. 402.
— antifebrilis acidula v. Potus antif.
— antigalactica, 483.
— antiherpetica, 656.
— antiicterica, II. 514.
— antilactosa, 483.
— antiphlogistica, II. 411.
— antiscorbutica, 583. II. 461.
— antiscrophulosa, 524. II. 513.
— antispasmodica, II. 281.
— antisyphilitica, 755.
— antivenerea, 755. II. 547. 549.
— — purgans, II. 548.
— aperiens s. aperitiva, II. 423.
— Arabica, II. 546.
— ad arenulas, II. 610.
— Bourquenodi, II. 158.
— Callaci s. ex Callac, II. 550.
— camphorata, 397.
— carminativa, II, 112.
— Cerasorum Succi, 477.
— Cichorii, 544.
— Citri composita, 574.
— communis, 786. 787.
— Cremoris Tartari, II. 432.
— depurans, 333.
— depurativa — Tis. purif.
— — de Vigarous, II. 548.
— diuretica, 445. II. 44. 403. 417. 423. 518.
— — — simplex, II. 423.
— emolliens, 787.
— emulsiva, 197.
— — c. Camphora, II. 416.
— — et camphorata, II. 416.
— Enulae, II. 4.
— expectorans, II. 5.
— febrifuga, 585.
— — et laxans, II. 433.
— Feltzii, II. 547.
— — resolv. et diuret. — Decoct. resolv. etc.
— de Fructibus pectoral., 445.
— haemastatica, II. 217.
Tisana Helenii, II. 4.
— imperialis, II. 433.
— Inulae, II. 4.
— Jausserandi, II. 549.
— laxativa, II. 645.
— leniens, 135. II. 23.
— de Lichene, II. 68.
— Lusitanica — Decoct. Lus.
— de St. Marie, II. 545.
— Milmanni, II. 432.
— nitrata, II. 413.
— Oryzae, II. 313.
— oxygenata, II. 420.
— pectoralis, 131. II. 48. 100.
— purgativa, II. 645.
— purificans, 655.
— Ratanhiae, II. 468.
— refrigerans et diuretica, II. 418.
— regalis s. regia, II. 591.
— resolvens et diuretica, II. 417. 523.
— Sarsaparillae, II. 545. 546.
— ad scorbutum, II. 461.
— stomachica resolvens, II. 414.
— sudorifica, 333. 751. II. 547.
— — Astruc, II. 549.
— — excitans, II. 547.
— — et nutriens — Decoct. incit. et nutr.
— — et purgans, II. 550.
— sulphurico salina, II. 410.
— contra tineam, 755.
— tonica, 474. 596.
— — et antiherp., II. 513.
— tonico-expectorans, II. 96.
— ad urinam arenosam, II. 610.
— vermifuga, 312.
— Vinachi, II. 548.
— vinosa, II. 415.
— — Williamsi, 586.
— vulneraria, 283.
— — Yvo Gaukes, 755.
Tithymalum latifolium, 466.
Tithymalus Cyparissiae, 602.
Toile v. Tela.
Tolu, 329.
Toluifera Balsamum — Mirosperm. toluif.
Tonco — Faba Tunca.
Topasius s. Topazius, 143.
Topazium, 143.
Topicum antispasmod., 459.
— — et tonicum, II. 302.
— aurificum, 316.
— detersivum, II. 131.
— leniens s. sedans, II. 259.
— purgans, 588.
— resolvens, 356.
— vermifugum, 588.
Tordylium, II. 599.
— officinale, II. 599.
Tormentilla erecta, II. 686.
— officinalis, II. 687.
— sylvestris, II. 687.
Tornasolis coerulea, II. 49.
— rubra — Nezetta.
Tota bona, 496.
Totasana, 797.
Toxicodendron, II. 487.
Tragacantha, II. 689.
Tragacanthae Gummi, II. 689.
Tragea Actis Granorum, II. 535.
— alba, 766.
— aromatica, 403. 405.
— — Gabelchoveri s. Gabelkoveri, 405.
— — officinalis, 405.
— Granorum Actes, II. 535.
— ophthalmica, 220. 665.
Tragemata Chinae, 515.
— Radicis Jalappae, II. 26.
— Rhabarbari, II. 476.
— de Semine Santonico, 553.
— Seminis Santonici, 553.
Tragopogon, II. 691.
— porrifolium, II. 691.
— pratense, II. 691.
Tragoselinum, II. 338.
— majus, II. 339.
Trapa natans, II. 691.
Tremella Auricula Judae, II. 692.
— Nostoc, II. 250.
Tribulus aquaticus, II. 691.
Trichechus Manatus, 387. 392.
— Dugong, 387.
Trichites — Alumen plumosum.
Trichomanes, 71.
Trifolium, II. 692.
— acetosum, 16.
— antiscorbuticum, II. 692.
— aquaticum, II. 692.
— aureum, 783.
— cervinum, 662.
— fibrinum, II. 692.
— Melilotus officinalis, II. 109.
— odoratum, II. 109.
— paludosum, II. 692.
— palustre, II. 692.
— pratense, II. 692.
— purpureum, II. 692.
Trigonella Foenum graecum, 708.
Trinitatis Herba, II. 23.
Triosteum perfoliatum, II. 695.
Tripela s. T. officinalis, II. 695.
Tripolitana Terra, II. 695.
Trissago, II. 678.
Triticum aestivum, hybernum turgidum et Spelta — Farina, Amylum, Furfur.
— faginum, 666.
— repens, 744.
Trito-Acetas Ferri, 697.
Tritohydrochloras Ferri, 691.
Tritohydrocyanas Ferri ferruratum, 707.
Tritohydroferrocyanas Potassae, 707.
Tritonitras Ferri, 689.
Tritophosphas Ferri, 684.
Tritosulphas Ferri, 686.
Tritoxydum Antimonii, 229. 234.
— Ferri, 678.
— Manganesii, II. 101.
— Plumbi, II. 352. 354.
Trochisci absorbentes, II. 93.
— ex Acetate Mercurii, II. 212.
— Agarici, 86.
— de Agarico, 86.
— albi, II. 355.
— — Rhazis, II. 355.
— alcalini, II. 611.
— Alhandal, 587.
— alipti moschati, II. 228.
— Alkekengi, 97.
— — c. Opio, 97.
— Alkermes, 499.
— — completi, 499.
— Althaeae, 132.
— — compositae, 142.
— de Ambra, 153.
— Amyli, 203.
— — sine Iride, 203.
— antacidi, II. 93.

Trochisci anthelmintici, 553. 687. II. 26. 179.
— — Doct. Ching, II. 165. 174.
— — martiales, 687.
— antihysterici, 610.
— Antimonii, 236.
— aromatici. 406.
— aromatico - stomachici, 406.
— bechici, 767. II. 82.
— — albi, 132. 203. 767. II. 21. 82.
— — citrini s. flavi, 767. II. 82.
— — nigri, II. 83.
— — opiacei s. opiati, II. 283.
— — rubri, II. 691.
— Calami aromatici, 370.
— Calcis Carbonatis, 383.
— de Carabe, II. 290.
— Carbonatis Magnesiae, II. 93.
— — Plumbi camphorati, II. 355.
— carbonici, 438.
— Castorei, 459.
— Catechu, 468.
— — c. Ambra, 469
— — c. Liquiritia, 469.
— — c. Magnesia, 469.
— chalybeati aromatici, 687.
— e Cerussa, II. 355.
— Chaussieri, II. 287.
— e Chelis Cancror. comp., 382.
— Chlorureti Calcis, 738.
— Cinnamomi, 406 417.
— Citratis ferrici, 700.
— Colocynthidis, 587.
— — praep., 587.
— de Cremore Tart., II. 431.
— Cretae, 383.
— Cupressi Fructuum, 617.
— Cypheos, II. 661.
— digestivi, II. 611.
— emetici, 657.
— Emetinae, 657.
— emmenagogi, 673. II. 11.
— Enulae, II. 3.
— escharotici, II. 188. 192.
— — albi, II. 188.
— excitantes, II. 345. 453.
— Ferri tartarisati, 702.
— ferruginosi, 673.
— ad foetorem oris, 469.
— fumales, 341.
— Galliae moschatae, II. 228.
— e Glycyrrhiza, II. 82.
— Glycyrrhizae, II. 82. 83.
— — comp., II. 83.
— — c. Gummi, II. 83.
— — c. Opio, II. 83.
— — thebaici, II. 83.
— Gordoni, 767.
— gummati Althaeae, 769.
— Gummi Acaciae, 767.
— gummosi. 767. II. 691.
— hedychroi, 370.
— hermetici. II. 174.
— — Scretae, II. 179.
— Hydrargyri, II 201
— — escharotici, II. 188.
— Japonici, 641.
— Imperatoris, 406.
— iodati, II. 8.
— Iodii, II. 8.
— Ipecacuanhae, II. 14.
— — comp., II. 15.
— — opiati, II. 15.
— — saccharati, II. 14.
— Iridis Florent., II. 21.
Trochisci de Karabe, II. 290.
— de Lagneau, II. 129.
— Lichenis Islandici, II. 71.
— Liquiritiae, II. 83.
— — c. Gummi, II. 83.
— Magnesiae, II. 93.
— Mannae, II. 102.
— masticatorii, II. 107.
— Menthae piperitae, II. 121.
— mercuriales, II. 158. 169. 201.
— Mercurii saccharati, II. 129.
— — saccharini, II 129
— de Minio, II. 192.
— Mogolici, II. 228.
— moschati, II. 228.
— Muriat. oxygenati Hydr., II. 188.
— muscerdae — Troch. Catechu.
— de Myrrha, 300.
— — comp., 300.
— Myrrhae comp., 300.
— Nitratis Potassae, II. 412.
— de Nitro, II. 412.
— Nucum Cupressi ex Ramich, 617.
— odoriferi, 153.
— c. Oxydo Merc. nig. et Sacch. arom., II. 147.
— pectorales, 657 767.
— — Regis Danorum, II. 83.
— de Perchlorureto Merc. et Deutox. Plumbi, II. 192.
— purgantes, II. 176.
— refrigerantes, II. 418.
— Rhazis, II. 355.
— de Scilla, II. 560.
— — Damocratis, II. 560.
— scillitici, II. 560. 563.
— sedativo - balsamici, II. 83.
— solventes s. solutivi, II. 26.
— Spongiae ustae, 339.
— ad sputum cruentum, 468.
— stibiati. 236.
— stomachici, 406.
— ad strumam, 439.
— Succini, II. 290.
— e Sulphure s. Sulphuris, II. 636.
— temperantes, II. 418. 426.
— de Terra Catechu, 468.
— contra vermes, II 174.
— vermifugi, II. 174.
— — Barthezii, II. 65.
— — Doct. Ching, II. 174.
— de Vipera, 721.
— Viperarum, 721.
Trois-six, 89.
Tropaeolum majus, II. 243.
Tryphera magna, II. 305.
Tubera cervina, 352.
Tunica, 645.
— hortensis, 645.
— rubra, 645.
Tunicae interiores ventriculi Gallinae, 721.
Turpethum album, II. 695.
— minerale, II. 197.
— nigrum, II. 199.
— rubrum, II. 197.
— vegetabile, II. 695.
Turundae intumescentes, II. 622
Tussilago, 666.
— Farfara, 666.
— Petasites, 332.
Tuthia, II. 722.
Tutia, II. 722.
— Alexandrina, II. 722.
Tutia praeparata, II. 722.
Tyllelinum, II. 576
Typha fluitans, 644.

U.

Ulmaria, II. 621.
Ulminum, II. 696.
Ulmus, II. 696.
— campestris, 695.
— effusa — U. campestris.
— fulva, II. 695.
Ultramarinum 133.
Ulva Lactuca, 781.
— fluitans, 644.
— pavonia, 781.
— squamaria, 781.
Umbilicus, 607.
— marinus, 380.
— Veneris, 607.
Umbra, 678.
Uncaria Gambeer — Nauclea G.
Unguentum Abbatiae du Bec. II. 675.
— Acetatis Cupri, 617. 628.
— — — crystallisati, 628.
— — — c. Melle, 617.
— — Plumbi, II. 363. 368.
— — — carbonatum, II. 374.
— — — tenuis, II. 363.
— — superplumbici, II. 363.
— acetatum, 24.
— Acetitis Cupri c. Melle, 617.
— — Plumbi, II. 363. 368.
— Acidi nitrici, 51.
— — nitrosi, 51
— — sulphurici, 60.
— acre, II 739.
— Adipis suillae, II. 572.
— Adipocerae Cetorum, 480.
— adstringens, 148. 716. II. 355. 356 357. 365. 369. 469. 718.
— Aegyptiacum, 617. 618. 628
— Aegypticum, 617. 618. 628.
— Aeruginis, 617. 628. II. 744.
— — melleum, 617.
— Aethiopicum, II. 143.
— agglutinans martiale, II. 678
— Agrippae, II. 572.
— alabastrinum, 141.
— Alabastrum, 141.
— albissimum, 480.
— album, 267. 480. II. 355.
— — camphoratum, II. 356.
— — resolvens, 164.
— — Rhazis, II. 355.
— — simplex, II. 355.
— alcalinum, II. 609.
— Aloës c. Petroleo, 107.
— de Althaea s. Althea, 138.
— Althaeae s. Altheae, 138. 139. 298.
— — camphorat. s. compos., 140.
— Aluminis, 147.
— aluminosum, 148.
— amarum, 593.
— ad ambusta, 794. II. 726. 728.
— ad ambustiones, II. 356.
— ammoniacale saponaceum, 164
— Ammoniae, 179.
— ammoniatum, 179
— amygdalinum, 267.
— Amyridis elemif., II 656.
— anodynum, 794. II. 283. 285.

Unguentum anodynum opiatum II. 282.
— anthelminticum, 12. 107. 593.
— antiarthriticum, II. 134.
— antihaemorrhoidale, 716. II. 281. 357. 364. 368. 374. 726.
— antiherpeticum. 243. 378 II. 159. 163 204. 209. 363. 365. 368. 624. 641.
— — Chevallieri, 378. II. 198.
— — Cullerieri, II. 198.
— — Goulardi, II. 365.
— Antimon. tartarisati, 259.
— antiophthalmicum, II. 262.
— antiphthiriacum, 273.
— antipsoricum, 438. II. 143. 147 151. 187. 209. 210. 396. 404. 405. 605. 620.
— — Jaeseri, II. 640.
— — e Nicotiana, II. 239.
— antiscorbuticum, II. 629.
— antiscrophulos., II. 11. 248.
— antispasmodicum, 459. II. 283.
— antisyphiliticum, 316.
— antivenereum, 316. II. 152. 177. 186.
— Apostolorum, II. 378.
— Aquae Rosarum, II. 502.
— Arcaei, II. 656.
— aromaticum, II. 56. 57. 58. 507. 510.
— — camphoratum, II. 58.
— arsenicale, 289.
— Arsenici, 289.
— de Arthanita, 593.
— Arthanitae compositum, 593.
— aureum, 286. II. 675.
— Auri, 316.
— Autenrriethii, 250.
— — contra decubitum, II. 461.
— Balsami et Olei Laricis, II. 655.
— balsamicum, II. 656.
— basilicum, II. 656. 675.
— — flavum, II. 656. 675.
— — nigrum, II. 676.
— — pallidum, II. 675.
— — c. Pice navali, II. 676.
— — viride, 628.
— Belladonnae, 313. 314.
— Bellii, II. 154.
— de Bicour, II. 384.
— ad blennorrhagiam chordat., II. 138.
— de Bolo, 142.
— c. Bromo, 355.
— Bryoniae, II. 572.
— Burdenii, II. 405.
— Calaminae comp., II. 728.
— calaminare, II. 725.
— e calaminari lapide, II. 725
— Calcis Hydrarg. albae, II. 209
— Calcis vivae, 375.
— Calendulae Flor., 392.
— de Calomelle, II. 163.
— camphoratum, 481.
— ad cancrum, II. 738.
— Cantharidis, 423.
— — cereum, 428.
— — infusi, 423.
— Cantharidum, 527.
— — cereum, 528.
— — colatum, 414.
— — irritans, 428.
Unguentum Cantharidum opiaceum, 423
— Carbonatis Plumbi albi, II. 355.
— — plumbici, II. 355.
— — Zinci impuri, II. 725.
— Carbonis, 438.
— cardiacum, 656.
— carminativum, 493. II. 58.
— Catechu, 470.
— cathaereticum. 623. II. 151.
— catharticum, 107.
— c. Cera, Terebinth. et Resina Pini, II. 676.
— Cerae, 267. 480.
— — c. Aceto, II. 371.
— — c. Hydrargyro, II. 134.
— ceratum, 267.
— cereum. 267
— — Curcumae, 268.
— Cerussae, II. 355.
— — acetatae, II. 355.
— — camphoratum. II. 356.
— Cetacei (album), 480.
— Ceti, 480.
— Cicutae, 548.
— — deopilativum, 551.
— cinnabarinum, II. 159.
— Cinnabaris, II. 159.
— Cirilli, II. 186.
— — opiaceum, II 187.
— citricum, 32.
— citrinum 138. II. 204. 675.
— clysmaticum, 141.
— coeruleum, II 133.
— ad combustiones, 794. II. 356. 364.
— Comitissae, 717. II. 733.
— commune, 267.
— Conii, 548.
— — debile, 548.
— Conyzae, 663.
— corrodens, II. 151.
— cosmeticum, 480.
— Cucumerum, 614.
— cupratum, 625. 628.
— Cupri, 625.
— — compositum, 628.
— e Cupro, 621.
— Curcumae, 268.
— Cyanureti Mercurii, II. 196.
— Cyrilli, II. 186. v. Ungt. Cirilli op.
— Damascenum, II. 744.
— defensivum, 142
— — coeruleum, 577.
— deopilativum, 551.
— depilatorium, II. 655.
— depurativum, II. 249.
— Desaulti, II. 154.
— desiccativum, II. 726.
— Deutochlorur. Mercurii, II. 187.
— Deutoiodureti Hydrarg. s Merc., II. 195.
— Diapompholigos, II. 725. 726. 728.
— digerens balsamicum, II. 656.
— digestivum, II. 629. 657.
— — animatum, II 658.
— — aloëticum. II. 658.
— — compositum, II. 658.
— — flavum. II. 656.
— — luteum, II. 657.
— — mercuriale, II. 134.
— — myrrhatum, II. 658.
— — opiaceum, II. 658.
— — simplex, II. 657.
— — veterinarium, II. 658. 668.
Unguentum Digitalis, 652.
— — et Bryoniae, 654.
— — purpureae, 652
— diureticum, II. 561.
— — resolvens, II. 564.
— dodecapharmacum, II. 378.
— ad dolorem faciei, II. 365.
— Duboisi, II. 204.
— Elemi, II. 656.
— — c. Aerugine, II. 657.
— — c. Alumine, II. 153.
— — compositum, II. 656.
— — et Terebinthinae, II. 656.
— emolliens, 98. 267. II. 655. 675. 676.
— — et sedans, II. 267.
— empiricum Tiaki, II. 624.
— emplasticum, II. 111.
— Enulae, II. 3.
— enulatum, II. 3.
— epispasticum, 423. 428. 431. 433. 639.
— — ammoniacale, 154.
— — camphorat., 424. 432.
— — e Daphne Laureola, 639.
— — equinum, 433.
— — flavum, 429.
— — fortius, 431.
— — Mezerei, 639.
— — mitius, 423.
— — viride, 434.
— escharoticum, 289. II. 152.
— excitans, 427.
— exsiccans, II. 357. 726. 728.
— — rubrum Acrelii, II. 728
— exsutorium, 431.
— c. Extr Canth. comp., 423.
— Fabri, 260.
— Falckii, II. 155.
— Fellis bovini comp., 668.
— Filii Zachariae, 208.
— ad fistulas equorum, II. 668. 678.
— flavum, 138. 139. II. 673. 674.
— Florum Naphae, 561
— ad fonticulos Bergii, 434.
— fuscum, II. 152. 374. 677.
— Gallae s Gallarum, 716.
— — camphoratum, 716.
— — compositum, 716. 717.
— ex Gallis comp. s. opiatum. 716 717.
— Gondreti, 164
— Goulardi, II. 365.
— de Grandjean, 432.
— de Graphite, 674.
— griseum, II. 132. 725.
— — camphoratum, II. 138.
— Gummi Elemi, II. 656.
— haemorrhoidale, 611. 716. 790.
— ad haemorrhoides, II. 262. 281. 285. 374.
— Helenii, II. 3.
— Hellebori albi, 781.
— — viridis, 781.
— ad herpetes, II. 279.
— Hydrargyri, II. 132.
— — albi, II. 209.
— — album. II. 209.
— — camphoratum, II. 138.
— — cinereum, II. 132.
— — — fortius, II. 187.
— — — c. Terebinth., II. 133.
— — citrinum, II. 204.
— — compositum, II. 204.
— — Deutoxynitratis, II. 151.

Unguentum Hydrargyri fortius, II. 133. 147.
— — griseum, II. 147.
— — mitius, II. 133. 134.
— — Muriatisammoniacalis, II. 209.
— — nitrati, II 204.
— — Nitratis, II. 204.
— — nitrico - oxydi, II. 151.
— — Oxydi cinerei, II. 132.
— — Oxymuriatis, II. 187
— — praecipit albi, II. 209
— — — per Calcem, II. 187
— — Prussiatis, II. 195.
— — rubri, II. 151
— — rubrum, II. 151. 153.
— — ad scabiem, II. 187.
— — Sulphureti sublimati, II. 159.
— — sine et c. Terebinth., II. 132.
— ex Hydrarg. oxydato rubro, II 151.
— c. Hydriodate Ferri, II. 742
— Hydriodatis Potassae, II. 10.
— — — iodurati, II. 11.
— c. Hydrobromate Potassae bromureto, 355.
— Hyoscyami s. de Hyoscyamo, 793.
— hypnoticum, II. 293.
— de Infuso Canth., 423.
— infrigidans Galeni, II. 502.
— Inulae, II. 3.
— — Helenii, II. 3.
— — Martiatonis, II. 3.
— iodatum, II. 8.
— Iod dis Zinci, II. 12.
— Iodii s. Iodinii, II. 8.
— ioduratum, II. 710.
— Iodinae opiatum, II. 741.
— Iodureti Arsenici, II. 12.
— — Barii, II. 11.
— — Hydrargyri, II. 195.
— — Mercurii. II. 195.
— — Plumbi. II. 741.
— — Sulphuris. II. 12.
— — Zinci v. Ung. Iodidis Z.
— irritans, 259. 428. 431.
— Jacene. II. 23.
— Jadelotii, II. 210. 396.
— Janini, II. 210.
— Jenneri. 259.
— Joerdensii, II. 154.
— Juchii, II. 135.
— juglandinum c. Felle Tauri, 669
— Juniperi, II. 45.
— Kali hydroiodici. II. 10.
— labiale, II. 254.
— Lapidis calaminaris, II 725. 728.
— — — saturninum, II. 728.
— laurino - camphoratum, II. 58.
— laurinum, II. 55. 56.
— leniens, 70. 402. II. 280. 283. 575
— — et balsamicum, II. 656
— lenitivum, 138. II. 656.
— de Linaria, II. 76.
— Linariae, II. 76
— de Liquiritia. II. 357.
— Lithargyri, II. 363.
Unguentum Lithargyri resinos. martiale, II. 978
— de Lithargyro s. Lithargyrio, II. 363
— Lugdunense, II. 151.
— Lumbricorum nervinum, II. 56.
— Lupuli, II. 89.
— Lupulini, II. 89.
— luteum, II. 657.
— Lyttae. 423.
— — cereum, 428.
— — irritans, 428.
— ad maculas corneae, 669.
— magistrale, II. 381.
— Majoranae. II. 312.
— Mali insani s. Malorum insanorum, 628.
— Malvae, II. 101.
— malvinum, II. 101.
— Mareschalli, 449.
— martiatum, II. 58.
— Matris, II, 374.
— — Theclae, II. 374.
— Medullae mucilag., 268.
— — vaccinae, 70.
— Meloës vesicat. Infusii, 423.
— mercuriale, II. 132. 155.
— — album, II. 209.
— — — Werlhofii, II. 209.
— — aptyalizomenon, II. 186.
— — Baekingii, II. 152.
— — camphoratum, II. 134. 138.
— — cinereum, II. 132
— — citrinum, II. 204.
— — — Baumé, II. 204.
— — corrosivum, II. 186
— — mitius, II. 134.
— — opiaceum s. opiatum, II. 139.
— — oxygenatum, II 134.
— — rubrum, II. 151.
— — Sanchezii II. 134.
— — saponaceum. II. 135 ?
— — simplex, II. 132.
— — c. Terebinth., II. 134.
— Mercurii rubrum, II. 155.
— — sulphurati, II. 143.
— de Mercurio dulci, II. 163.
— eMerc. praecipitato, II. 209.
— Mezerei, 639.
— — Resinae viride, 640.
— Minii, II. 352.
— — camphoratum, II. 353.
— de Minio, II. 352. 381.
— — camphoratum, II. 353.
— Monspeliacum, 797.
— Le Mort, II. 357.
— mundificans, II. 143.
— — Poterii, II. 239.
— — Stahlii, II. 138.
— — Zelleri, II. 209.
— Muriatis Auri et Sodae, 318.
— — Hydr. ammoniacalis, II. 209.
— — mercurial. p. praecipitat., II. 178.
— — oxygen. Hydrargyri, II. 186. 187.
— Myrrhae, II. 238
— myrtinum comp., 717.
— Naphae Flor., 561.
— narcoticum, II 283
— Neapolitanum, II. 132.
— nervinum, 170. II. 56. 507.
— contra neutalgiam faciale, II. 355.
Unguentum de Nicotiana s. Nicotianae, II. 248
— nigrum, II. 159.
— Nihili, II. 725. 726.
— — ad oculos, II. 725. 726.
— de Nihilo, II. 725.
— Nitratis Hydrarg., II. 204.
— — — fortius, II. 204.
— — — mitius, II. 204.
— — hydrargyrici, II. 204.
— — Merc. et Ammoniae, II. 205.
— nitricatum, 51.
— — fortius, 51.
— — mitius, 51.
— nitricum, 51.
— — oxygenatum, 51.
— nutritum, II. 363.
— oculare, II. 338.
— — album, II. 725.
— — Keyseri, II. 726.
— ad oculorum defluxiones, II. 732
— ophthalmicum. 60. 630. 659. II. 154. 163. 368. 726. 732.
— — album, II. 725. 726.
— — cupratum, 630.
— — Dupuytrenii, II. 154.
— — Janini, II. 210.
— — Pelletani, II. 151.
— — Richteri, II. 152.
— — rubrum, II. 151. 726.
— — Singletoni, 286
— — Sloanii, II 726.
— — viride, II 726.
— — St. Yves, II 153.
— opiaceum s. opiatum, II 261. 282 283. 364.
— Opodeldoc s. Opodeldoch, 167.
— Oxycarbonatis Zinci impuri, II. 725.
— Oxydi albi Merc. p. Acid. sulph, II. 198.
— — Cobalti. 577.
— — Cupri melleum, 617.
— — Hydrarg. cinerei, II. 132.
— — — nitrati, II. 151.
— — — rubri, II. 151. 154.
— — — rubrum Tittmanni, II 151.
— — hydrargyrici nitrati, II. 151.
— — Merc. rubri p. Acid. nitr., II. 154.
— — Plumbi acetatum, II. 363.
— — — albi, II. 355.
— — — — p. Acid. acetos., II. 355.
— — — Carbonatis, II. 355.
— — — fuscum. II. 374.
— — — rubrum, II. 351.
— — Zinci, II. 725.
— — — camphoratum, II. 726
— — — impuri, II. 725.
— — — nativi, II. 725.
— c. Oxydo Hydrargyri rubro, II. 154.
— Oxyduli Plumbi semivitrei adustum, II. 374
— oxygenatum, 51.
— — ex Acido nitrico, 51.
— — ex tempore parandum, 542.
— Oxynitratis Hydr. et Ammoniae, II. 205.
— — — — comp, II. 205.
— oxynomenon, 51.

Unguentum de Papav., Hyosc. et Bellad., 795.
— paralyticum. 60. II. 444.
— ad paralysin, II. 444.
— pectorale, II. 21.
— pediculorum, II. 135.
— contra pediculos, 210. II. 463. 521.
— — — capitis, 644.
— ad perniones, 147. 401. II. 58. 603. 672.
— phosphoratum, II. 337.
— phosphoricatum, 55.
— Phytolaccae Radicis, II. 338.
— de Pice et Cera, II. 641.
— piceum comp., II. 675.
— Picis, 348. II. 675.
— — aridae, II. 675.
— — et Cerae, II. 675.
— — empyreum., II. 675
— — liquidae. II. 348.
— — nigrae, II. 676.
— — c. Oxydo Merc. rubro, II. 152.
— — et Sulphuris, II. 348.
— Piperis nigri, II. 345.
— Placentinum, II. 154.
— Plumbi comp., II. 357. 364. 365.
— — acetatum, II. 363.
— plumbicum, II. 363.
— pomadinum, 268. II. 502. 503.
— pomatum oxygenatum, 51.
— Pompholigis, II. 728.
— populeum, 795. II. 389.
— Populi Gemmar. comp., 795.
— pro porrigine, II. 348.
— Praecipitati viridis, II. 214.
— de Praecip. rubro, II. 155.
— propolicum, 270.
— ad prosopalgiam, II. 355.
— Protoiodureti Hydrarg. s. Merc., II. 195.
— psoricum Anglicum, II. 640.
— puliceum, II. 354.
— Pulv. Meloës vesic. s. Canth., 431.
— purgans, 588. II. 176.
— purpureum Wurzii, 618.
— refrigerans, 401. II. 502.
— Regentii, II. 154.
— regium, II. 675.
— de Renal, II. 287.
— de Resina Pini comp., 138. 140.
— Resinae albae, II. 673.
— — Elemi, II. 656.
— — flavae, II. 656.
— — nigrae, II. 676.
— — Pini Burg., II. 673.
— — sylv. comp., 138. 140.
— resinosum, II. 673. 739.
— resolvens, 424. 711. II. 139. 180. 368. 444.
— — mammarum tumores — Lin. volat.
— resumtivum, 138. 139.
— Rorismarini comp., II. 56. 510.
— rosaceum, II. 510.
— Rosae Aquae, II. 502.
— Rosarum, II. 502.
— rosatum, II. 502.
— — compositum, II. 209.
— — malvinum, II. 502.
— — simplex, II. 502.
— rubefaciens, 639.
Unguentum rubrum, II. 154. 159. 352.
— — desiccativum, II. 726.
— — ad labia oris, II. 256.
— — potabile, II. 256.
— Rustii, II. 154.
— Rutae, II. 520.
— Sabadillae c. Merc., II. 135.
— Sabinae. II. 41.
— Salicis, II. 526.
— Salis marini, II. 607.
— Sambuci s. S. Flor., II. 538.
— sambucinum, II. 538.
— santalinum, II. 641.
— saponaceo-hydrosulphuratum, II. 396.
— saponaceum, II. 440. 444.
— Saponis, II. 444.
— saturninum, II. 363. 368.
— — s. Saturni saponac., II. 365.
— saturno-mercuriale, II. 204.
— ad scabiem, II. 147. 159. 204. 396. 639. 640. 742.
— — Anglicum, II. 640.
— — Jasseri, II. 640.
— — c Perchlorur. Mercur., II. 187.
— — c. Sulphure sublim., II. 640.
— — Zelleri. II. 209.
— Scillae, II. 564.
— — maritimae, II. 564.
— scilliticum, II. 564.
— ad scrophulas, II. 11.
— Sebi Arcaei, II. 656.
— sedans, II. 369. 575.
— sedativo-narcoticum, II. 283.
— sedativum, II. 278. 280.
— Semin. frigid., 480.
— siccativum, II. 193.
— simplex, 267. II. 673. 674.
— Sinapis, II. 600.
— Solani, II. 619.
— somniferum, II. 290.
— Spermatis Ceti, 480.
— spleneticum, 706.
— de Staphisagria, 644. II. 135.
— — compositum, 644. II. 135.
— Staphysagriae. II. 135.
— — compositum, II. 135.
— stibiatum, 259.
— stimulans, 427. 428. II. 153. 629. 641.
— stomachale s. stomachicum. 12. 449. 493.
— Stramonii, 642.
— contra strumam, 299. II. 314.
— Styracis, II. 629.
— — compositum, II. 629.
— — resinosum, II. 629.
— Subacetatis Cupri, 628.
— — — c. Melle — Oxymel cuprosum.
— — Plumbi, II. 335. 363.
— — — liquidi, II. 363.
— — — camphoratum, II. 365.
— — — opiatum, II. 364.
— — — saponaceum, II. 365.
— — plumbici, II. 363.
— Subacetitis Cupri, II. 628.
— Subcarbonatis Plumbi, II. 55.
Unguentum Subcarbonat. Plumbi Protoxydi, II. 355.
— Submur. Hydrarg. amm., II. 209.
— Subnitrat. Hydr. s. hydrargyrici, II. 151.
— Suboxydi Hydr., II. 133.
— Sulphat. Hydr., II 198.
— sulphuratum II. 640.
— — compositum, II. 640.
— — simplex, II. 639.
— e Sulphure, II. 639.
— — hydrargyrato, II. 143.
— sulphuricum, 60.
— Sulphuris, II. 639. 640.
— — compositum, II. 640.
— — cum Helleboro, II. 640.
— — c. Potassa, II. 396.
— — c. Zinci Sulphate, II. 640.
— sulphuro-alcalinum, II. 396.
— — saponaceum. II. 639.
— à la sultane. 481.
— Superacetatis Plumbi, II. 368.
— — Plumbicomp. II. 365.
— Supernitrat. Hydr., II. 240.
— suppurans, 98.
— suppurativum, II. 153.
— Tabaci, II. 248.
— ad tabida membra, 664.
— Tart. emetici, 259.
— — stibiati. 259.
— e Tart. stibiato, 259.
— Tartrat. Pot. stibiati, 259.
— — Stibii et Pot., 253.
— de Terebinthina, II. 657.
— — et Adipibus, II. 656.
— — et Cera, 140.
— — et Ovor. Vitellis, II. 657.
— Terebinthinae, II 657. 658.
— — camphoratum, II. 657. 659.
— Terebinth. et Picis, II. 675.
— — resinosum, II. 675.
— terebinthinatum, II. 655.
— tetrapharmacum, II. 675.
— ad tineam, 438. 711. II. 178. 205. 210. 611. 673.
— de Tornamira, II. 355.
— tripharmacum, II. 363. 364.
— Turpethi mineralis, II. 198.
— Tutiae. II. 725.
— ad ulcera lymphatica, II. 153.
— — scrophulosa. II. 153.
— — venerea, II. 153.
— de Uvis, 268.
— ad varices ani, 716. II. 364. 374.
— Veratri albi, 781.
— Veratrini, II. 709.
— ad s. contra vermes, 12. 593.
— vermifugum, 107.
— ad vesicata s. vesicatoria, 431.
— vesicatorium, 428. 431.
— virginale, II. 733.
— viride, 628. 630. II. 378.
— — potabile, 800.
— Zinci, II. 725. 726.
— — foditis, II. 722.
— — potabile, 760.
Ungula Alces, 721.
— — praeparata, 682.
— caballina, 666.

Ungulae Cancri s. Cancrorum, 380.
— — praeparatae, 382.
Unicornu, 386. 721.
— fossile, 386.
— marinum, 386.
— — praeparatum, 386.
— minerale, 386.
— verum, 386.
Uniones, 380.
— praeparatae, 381.
Urceola elastica, II. 470.
Urea, 65.
Uredo Frumenti — Sclerotium Clavus.
Urina Hominis, II. 696.
— Vaccae, II. 696.
Urna odorifera, 344.
Ursinum verum, 15.
Ursus, 353.
Urtica, II. 696.
— dioica, II. 695.
— Hispanica — U. pilulif.
— major, II. 696.
— minor, II. 696.
— mortua, II. 54.
— pilulifera, II. 696.
— Romana, II. 696.
— urens, II. 695.
Urucu, II. 312.
Usnea plicata, II. 66.
Usquebaugh flavum, viride, II. 244.
Uva Ursi, II. 697.
— versa, II. 329.
— vulpina, II. 329.
Uvae, II. 717.
— minores Corinthiacae, II. 717.
— passae s. siccatae, II. 717.
Uvularia, II. 578.

V.

Vaccae Stercus, II. 698.
Vaccaria, II. 542.
Vaccinium, II. 698.
— glaucum, macrocarpum, meridionale, II. 698.
— Myrtillus, II. 698.
— Oxycoccos, II. 698.
— uliginosum, II. 698.
— Vitis Idaea, II. 698.
Vainiglia, II. 707.
Vakaka Indorum, II. 708.
Valantia cruciata, 613.
Valeriana, II. 699.
— Celtica, II. 243.
— Jatam. arensis, II. 243.
— Locusta, II. 700.
— major, II. 699.
— minor, II. 699.
— montana, II. 700.
— officinalis, II. 699.
— Phu, II. 699.
— rubra, II. 700.
— sylvestris, II. 699.
Valerianella olitoria, II. 707.
Vaniglia, II. 707.
Vanilla, II. 707.
— aromatica, II. 707.
Vanillia, II. 707.
Vapor aceticus, 21.
— Acidi acetici, 21.
— hepaticus, 45.
— hydro-sulphuratus, 45.
— Muriat. Calcis oxygenati, i. e. Mur. Calc. oxyg. q. placet.
Vapor oxymuriat. acid. — Liq. alexit. extemporan.
Vapores v. Vapor.
Variolaria, II. 708
— orcina, II. 708.
Vateria Indica, 604.
Vegetable extract, II. 116.
Velno's vegetable syrup, II. 185.
Ventriculus Gallinae, 721.
Venus, 617.
Veratria, 775. II. 708.
Veratrina, 775. II. 708.
Veratrinum, 775. II. 521. 708
Veratrum, 775.
— album, 775.
— Lobelianum, — V. alb.
— Sabadilla, II. 521.
Verbasculum pratense, II. 446.
Verbascum, II. 709.
— album, 709
— Blattaria, II. 709.
— nigrum, II. 709.
— phlomoides, II. 709.
— thapsiforme — V. Thapsus.
— Thapsus, II. 709.
Verbena, II. 710.
— Jamaicensis, II. 710.
— officinalis, II. 710.
— triphylla, II. 710.
Verbesina, 349.
Vermis majalis, II. 116.
Vernix sicca, II. 539.
Veronica, II. 711.
— Anagallis, II. 710.
— arvensis, II. 711.
— Beccabunga, II. 710.
— Chamaedrys, II. 711.
— mas, II. 711.
— montana, II. 711.
— officinalis, II. 710.
— purpurea, 347.
— sylvestris, II. 711.
— teucriifolia, II. 711.
— Teucrium, II. 711.
— Virginica, II. 711.
Verrucaria, 392. 775.
Verrucarium, 605.
Vertebrae Mustelae Piscis, 387.
Vesicatorium de Lecomte, 433
— magistrale, 429.
Vetonica, 645.
Vicia, II. 712.
— Ervilia, II. 712.
— sativa, II. 712.
Victorialis feminea, 743.
— longa, 102.
— mascula, 102.
— rotunda, 743.
Vinaigre de quatre voleurs, 100. II. 61.
— dentifrique, II. 455.
Vinca, II. 712.
— major, II. 712.
— minor, II. 712.
— Pervinca, II. 712.
Vincetoxicum, 307.
Vini Gallici Spiritus, — Spir Vin. Gall
Vinum, II. 712.
— absinthiatum, 8.
— Absinthii, 8.
— — compositum, 9.
— Absinthidis, 8.
— Absynthii, 8.
— adstringens, 322. 472. 617. II. 514.
— adustum, 89.
— album, II. 713
— Alicantinum, II. 713.
— Aloës, 104.
— — Socotrinae, 104.
— aloëtico-alcalinum, 119.
Vinum aloëticum, 104.
— — alcalin. m. 119.
— amaro-chalybeatum, 705.
— amarum, 470. 529
— — alcalisatum, 564.
— amarum aromaticum, 9.
— — et diureticum, II. 585.
— — scillit. comp., II. 566.
— — e Spiritu Vini, 737.
— ammoniat. c. Tinct. analept., 192.
— anthelminticum, 8.
— antiapoplecticum, II. 32.
— antiictericum, 563. II. 585.
— antimoniale, 255
— antileucorrhoicum, 531.
— antimoniatum (Huxh.), 255.
— Antimonii, 255.
— — Huxh., 255.
— — tartarizati, 255.
— antiperiodicum, 530.
— antirheumaticum, 257.
— antiscorbuticum, 530. II. 465.
— aperiens et purgans, II. 585.
— aperitivum et tonic. Barthez, 435.
— Aquifolii, II. 740.
— Armoraciae, II. 465.
— aromaticum, II. 529.
— — alcalisatum, 564.
— — camphoratum, 399.
— — opiaceum, II. 260.
— aromo-aloëticum, 104.
— aromo-chalybeatum, 705.
— aromo-opiaceum, II. 260.
— Aurantior. comp. 563
— — Corticum, 563.
— — — alcalisatum, 564.
— benedictum, 255.
— Bordegalense s. Burdeg., II. 713.
— Burgundicum, II. 713.
— Calami, 372.
— calidum, 415.
— camphoratum, 399.
— Catechu, 472.
— Cayennense, II. 342.
— Cephaëlis Ipecacuanhae — Vin. Ipec.
— chalybeatum, 705.
— — comp., 706.
— Chinae, 528.
— — amarum, 529.
— — aromaticum, 529.
— — compos., 529.
— — martiatum, 529.
— chinatum, 528.
— c. Chinino sulph., 539.
— Cinchonae, 528.
— — compositum, 529.
— Cinchonini (Sulphatis), 555.
— Cinnamomi, 415.
— Cochlear. comp., II. 465.
— Colchici, 585.
— — Florum, 586.
— — Seminum, 586.
— Colocynthidis, 592.
— cordiale, 415.
— Corticis Peruv., 528.
— crocato-opiatum, II. 260.
— crocatum s. croceum, 608.
— Cupressi compos., 617.
— Cydoniorum, 94.
— Dictamni martiat., 706.
— Digitalis, 650.
— diureticum, II. 45. 219. 465. 566. 663.
— — amarum, II. 566.
— — Anglicum, II. 433.

Vinum diureticum Sydenh, II. 433.
— emetico-purgans Leroy, 263.
— emeticum, 255. II. 17.
— — turbidum, 255.
— Enulae, II. 5.
— enulatum, II. 5.
— excitans. II. 433 694.
— de Extractis, 503.
— febrifugum, 529.
— ferratum, 705.
— Ferri, 705.
— cum Ferro, 705.
— ferruginosum, 705.
— Gallicum album, II. 713.
— — rubrum, II. 713.
— Genistae Sydenh., II. 433.
— Gentianae. 737.
— — comp., 737.
— Granati, II. 452.
— Gratiolae, 717.
— Guajaci helleborat., 780.
— Helenii, II. 5.
— helleboratum, 779.
— Hellebori albi, 779. 780
— — viridis, 780.
— hippocraticum. 415.
— Hispanicum, II. 713.
— Hungaricum, II. 713.
— hydragogum, II. 433.
— Hydriodatis Ferri, II. 742.
— Hydromellis, 94.
— Inulae, II. 5.
— Ipecacuanhae, II. 17.
— — compos., II. 17.
— Juniperi alcalisatum, II. 433.
— juniperinum, II. 45.
— lixiviale, II. 433.
— Lusitanic. arte fact., 95.
— Maderanum, II 713.
— Malacense, II. 713.
— martiale aromatic., 705.
— martiatum, 705.
— — compos., 706.
— Martis, 705.
— mellitum, 94.
— Nicotianae II. 248.
— — Tabaci, II. 248.
— ophthalmicum, 107.
— opiaceum. II. 259. 306.
— opiatum c. Alcohole, II. 259.
— — per fermentat., II. 265.
— — Sydenhami, II. 260.
— Opii, II. 260. 268.
— — aromat. II. 260.
— — compos., II. 260.
— — crocato-opiatum, II. 260.
— — crocatum, II 260.
— de Opio compos., II. 260.
— Oxydi Antimonii, 255.
— paregoricum, II. 260.
— Psychotriae, II. 17.
— — emeticae. II. 17.
— purgans, II. 685.
— — et tonicum, II. 685.
— Raphani martiat., 706.
— Rhabarbari, II. 483.
— — amarum, II. 484.
— — aromaticum, II 483.
— Rhei, II. 483 484.
— — amarum, II. 484.
— — aromaticum, II. 483.
— — composit., II. 483.
— — palmati arom., II. 483.
— Rhenanum. II. 713.
— — arte factum. 95.
— Ribesiorum, II 489.
— roborans, 9. 529.
Vinum rubrum, II. 713.
— Salviae, II. 529.
— Sambuci Baccarum, II. 538.
— Scillae, II. 566.
— — alcalinum, II. 567.
— — maritimae, II. 566.
— scilliticum, II. 566.
— — compositum, II. 566.
— Scillites, II. 566.
— Sennae, II. 585.
— Sinapios, II. 602.
— stibiatum, 255.
— — c. Extr. narcot., 257.
— stomachicum, 444. 531. 737.
— Stramonii, 641.
— stypticum. 617.
— Sulphatis Chinini s. Quinin. 539.
— sulphuratum, 147.
— Tabaci, II. 248.
— ex Tartrate Antimonii, 255.
— Tartrat. s Tartrit. Antim., 255.
— — Potass. et Antim., 255.
— — Stibii et Potass., 255.
— Tartritis Potassae et Ferri, 703.
— temperatum Hoffm., 563.
— tonico-stimulans, 529.
— tonicum, 737.
— — et antiperiod., 529.
— Trifolii fibr., II. 694
— Valerianae, II. 704.
— Veratri, 779.
— — albi, 779.
— — viridis, 780.
— vermifugum, II. 484.
— Vincetoxici amarum, 476.
— Viperarum s. viperinum, 721.
— Xerense s. Xeres, II. 713.
Viola. II. 714
— canina, II 714.
— dentaria, 644.
— Jatamarensis, II 243.
— Ipecacuanha. II. 12.
— odorata, II. 714.
— pedata, II. 714.
— tricolor, II. 23.
Violaria, II. 714.
Viperae s. Viperarum Caro et Spinae. 719.
— praeparatae, 719.
Viperina, 280. 656. II. 573.
Virga aurea. II. 716.
Viride Aeris, 627.
— — crystallisat, 627.
— — praeparat., 628.
— cubicum, 685
— montanum, 619.
Viscago, II. 599.
Visci Lignum, II. 716.
Viscum s. Viscus, II. 716.
— album, II. 716.
— Betulae — V. album.
— Coryli — V. album.
— quercinum, II. 716.
— quernum II. 716.
— Salicis — V. album.
— Tiliae — V. album.
— Xylobalsamum, — Xylobals.
Vismuthum, 349.
Vitellum s. Vitellus Ovi. II. 314.
Vitex Agnus castus, 87.
Vitis Idaea, II. 698.
— Pampini, II. 717.
— vinifera II 717.
Vitri Herba, II. 527.
Vitrioli Gilla Theophrasti — Gilla
— Phlegma s. Ros, II. Add.
— Terra dulcis — Terra Vitr. dulcis.
Vitriolum album, II, 723.
— — purum, II 728.
— ammoniacale, 179.
— Anglicum, 685.
— Argentoratense, 685.
— camphoratum, 622.
— coeruleum, 620.
— — purum, 620.
— cupratum, 620.
— Cupri, 620.
— — factitium, 620.
— Cyprinum, 620.
— Cyprium, 620.
— de Cypro, 620.
— ferratum s. ferreum, 685.
— Ferri, 685.
— — Sulphas venale, 685.
— Gedanense. 685.
— Goslariense, 685. 728.
— hermaphroditicum, 685.
— Hungaricum, 620. 685.
— Londinense, 685.
— Magnesiae, II. 95.
— martiale, 685.
— Martis, 685.
— — ad albedinem calcinat., 686.
— — calcinatum, 686.
— — exsiccatum, 686.
— — factitium. 686.
— — liquidum, 697.
— — purum. 685.
— — siccatum, 686.
— Pisanum, 685.
— ponderosum, 337.
— Potassae, II. 406.
— Romanum, 685.
— Sodae, II. 614.
— Veneris 620.
— viride, 685.
— vulgare, II. 728.
— — Anglicanum, 685
— Zinci, II. 728.
— — factitium, II. 728.
Vitrum Antimonii, 228.
— — ceratum, 228.
— — hyacinthinum, 228.
— — Moscoviticum — Alumen scissile.
— Stibii, 228.
Viverra Civetta, II. 721.
— Zibetha. II. 721.
Volkameria aculeata. 500.
Vulneraire, Baume s, II. 653.
Vulnerarium Helveticum, 282.
Vulpis Caro et Spinae, 719
Vulvaria, 496.

W.

Wakaka Indorum, II. 708.
Wash, black, II. 147.
— , Hanway's preventive, II. 393
— , sulphur. II. 638.,
— , white, II. 301.
— , yellow, II. 148.
Water, lavender, II. 63. 64.
— , myrtle, II. 241.
— , pearl II. 443.
Wintera aromatica, 605.
— Canella, 402.
Winteranus Cortex, 605.
— — spurius — Cort. Wint. spurius.

Wismuthum, 340.
Wrightia antidysenterica, 95. 500. 584.

X.

Xanthium, II. 719.
— strumarium, II. 718.
Xantorrhoea hastilis, II. 719.
Xylaloës, II. 71.
Xylobalsamum, 204.
Xylocassia, 403.
Xyris, II. 19.

Z.

Zanthorhiza apiifolia, II. 719.
Zanthoxylum Clava Herculis, II. 719.
— clevatum, II 719.
— fraxineum. II. 719.
Zarsa. II. 544.
Zarsaparilla, II. 544.
Zea Mays, II. 719.
Zedoaria, II. 719.
— longa, II. 719.
— rotunda, II. 719.
Zerumbet, 457.
Zibebae II. 717.
Zibetha. II. 721.
Zinci Acetas, II. 733.
— — impurus, II. 733.
— Carbonas, II. 723.
— Flores, II. 723
— Magisterium, II. 723.
— Oxycarbonas, II. 723.
— Oxydum, II. 723.
— — album, II. 723.
— — impurum, II. 723.
— — per se, II. 723.
— — p. praecipitat., II. 723.
— Protoxydum. II. 723.
— Sulphas, II. 728.
Zincum, II. 721.
— acetatum, II. 733.
— aceticum, II. 733.
— album, II. 723
— calcinatum, II. 723.
— hydrocyanicum, II. 722
— hydrojodicum oxydatum, II. 722.
— oxydatum. II. 722.
Zincum oxydat. album., II. 723.
— — calaminare, II. 722.
— — sulphuricum, II. 728.
— — via humida parat., II. 723.
— praecipitatum, II. 723.
— purum, II. 721.
— Silesiacum, II. 45.
— sulphuricum, II. 728.
— — venale, II. 728.
— terrestre, II. 722.
— vitriolatum, II. 729.
Zingiber, II. 734.
— album II. 734.
— — Germanicum, 295.
— commune, II. 734.
— conditum, II. 736.
— nigrum, II. 734.
— officinale, II. 734.
— officinarum. II. 734.
— vulgare, II. 734.
Zinziber, II 734.
— vulgare. II. 734.
Zirconium, II. 736.
Ziziphora Mariana, 616.
Zizyphus, II. 36. 37.
— sativus, II. 36
— vulgaris, II. 36.
Zostera marina, 781. II. 338.

Acetum Castorei comp 66.
— de Framboesiis — A. Rub. Id.
— Lilior. Convall., 602.
— pestilentiale — A. aromaticum.
— plumbosum, II. 358.
— pyroxylicum — A. pyrolignosum.
— stillatitium — A. destill.
Acidum carbonic. aeroïdeum — A. carb.
— chloro-nitrosum, 274.
— hydriodosum, II. 9.
— hydrochlorinicum, 332.
— hydrothionic. liq. extemp., 44.
— muriatico nitrosum, 274
— muriat. oxygen. aëroideum, 540.
— Nitri dulcificatum, 77.
— nitricum fumans — A. Nitri fum.
— Ossium — A. phosphoricum.
— Phosphori p. deliq., 55.
— — perfectum, 53.
— pyroxylicum — A. pyrolign.
— Salis dulcificatum. 77.
— Vitrioli phlogisticat. s. volatile 61.
Aër phlogisticatus — Gas azot.
Aerugo destillata, 630.
Aether Cupri, 625.
— oxygenatus — Liq. anod. succ.
Aethiops mercurialis, II. 142.
— mineralis apyrus s. via sicca paratus, II. 142.
— — via humida par. II. 142.
Album Bismuthi, — Mag. Bis.
Alcali fluor. 155.
— minerale aërat. s. mite, II. 608.
— — vitriolicum, II. 614.
— vegetabile acetatum, II. 420.
— volatile salitum, 181.
Almond paste, II. 744.
Alumen album glaciale — Alumen.
Amalgama Auri, 316.
Ammonium aëratum — A. carbon.
— hydrogenato-sulphur., 184.
— liquid. caust., 155.
— muriat. ferratum, 693.
— nitricum, 180.
Andira inermis, retusa, Surinamensis — Geoffraea inerm., Surin.
Antipertussis, II, 744*d*.
Apozema de Cochlear. comp., II. 467.
Aqua Calcariae c. Cera, 270.
— chlorata — Liquor Chlori.
— hydrogenato-sulphurata, 44.
— Hyssoni, 585.
— laxans Youngii, II. 744*b*.
— phagedaenica mitis, II. 147.
— Raphan. rust. — A. Armorac
— sulphurato-stibiata, 249.
— viridis Hartmanni, 631.
— Vitae Germanica — Tinct purg.
Aquae iodatae c. Kalii od., II. 10.
Argentum nitr. oxydat. fus., cry t., 277.
Argyritis — Lithargyrum.
Arsenicum oxydat. alb. — A. alb.
— sulphurat. u. s. flavum — A. flav.
Aselli — Millepedae.
Athamantha Oreoselin. — Oreosel.
Aurum crepitans s. diaphoret s. sclopetans — A. fulminans.
— limatum, 316.
— oxydat. ammoniat. — A. fulmin.
— suboxydatum, 318.
Balsam of horehound, II. 744 *e*.
— Godbold's vegetable, II. 744*f*.
— of Liquorice, pectoral. II. 744*f*.
Balsamum Libani — B. Carpath.
— Lithuanicum — Ol. betulin.
— Mechae. 326.
— Myristicae, II. 232. 233.
— Resinar. antirheum. Liboschitzii, 427.
— Rigaense — B. Carpath.
— Terebinth. Framii, II. 655.
— vulner. Stahlii, II. 652.
Baume de vie — Decoct. Aloës comp.
Baynton's adhesive plaster, II. 677.
Bezoarticum metallic. — Aurum oxydat.
— pestilentiale — Acet. quat. latr.
Bicarburetum Sulphuris — Alcoh. Sulph.
Bichlorides Mercurii — Sublimatus.
Bolus moschatus s. anodynus, II. 744*a*. tonicus, ib. diureticus, ib. emeticus, II. 744. catharticus, ib diaphoreticus, II. 744*c*. contra taeniam, II. 744*d*.
Boras hydrargyrosus, II. 196.
Borussias ferroso-ferricus, 707.
— — kalicus, 40.
— hydrargyricus, II. 195.
Cahincae s. Caincae Radix, II. 744*f*.
Calcareum sulphuratum, 376.
Calcaria acetica, 390.
— caustica — C. usta.
— chlorata, 377.
— hydrochlorica, 377.
Calophyllum Tacamahaca — Tacamah.
Calx sulphurata, 376.
— pura — C. usta.
Caphura — Camphora.
Carbonas biplumbicus — Cerussa.
— calcicus, 378.
Cassia cocta — Conserva Cass.
— solutiva — Pulpa Cass.

Cataplasma Conii, II. 744a.
— de Farinis et Pulpis. — C. emolliens.
— c. Kinakina et Camph. — C. antisept.
— de Papav. et Hyosc., 792.
— e Pipere et Aceto — C. antipleuret.
— de Pulpis et Unguento — C. maturans.
— ad suppurat. promov. — C. maturans.
Ceratum Kinakina medicat., 517.
Cerevisia abietina comp., 3.
— de Kinakina, 528.
— Pini Laricis, II. 744e.
Chelsea pensioner, II. 744e.
Cheltenham Salts, Real II. 95. 016. Efflorescence of, II. 744e.
Chloretum Amm. c. Oxydo hydr. — Hydr. amm. mur
Chloris calcicus — Calcaria chlorin. venal.
Chrysitis — Lithargyrum.
Clavus secalinus — Secale cornut.
Clematis Flammula — Cl. erecta.
Conditum Vermium majal., II. 116
Confectio de Croco, 610.
Conserva Cynorrhodi, II. 494.
— Helenii, II. 744e.
Corn plaster, II. 744e.
Cordial, Godfrey's, II. 744f.
Court plaster, sticking pl. — Tela Ichthyoc. glutin., 729.
Corydalis tuberosa — Aristolochia fabacea
Cream, cold — Ceratum Galeni.
Crême de noyau, II. 744d.
Cremor Tart. volat., II. 436.
Crocus Auri ceraunochryson — Aur. fulm.
— Martis obstructivus, 678
— — Zwelferi, 679
Cyanetum Kali et Ferri c. Aqua ven., 40.
— Plumbi, II. 351.
Cyanuretum Ferri c. Cyane to F., 707.
— Kali et Ferri c. Aqua, 40.
Decoctum Lusitanicum, II. 744e.
— de Panis Medulla, II. 320.
— Specier. Pini comp., II. 341.
Drops, Grindle's cough, II. 744e. dutch, Haerlem, ib. scouring, II. 744f. Norris's, ib. Ward's red, ib.
Electuarium anthelmint., II. 744d.
— — Mathieui, II. 624.
— antispasmodicum, II. 744a.
— catharticum, II. 744b.
— de Croco, 610.
— demulcens, II. 744d.
— emmenagogum, II. 744b.
— de Kinakina — E. Chinae.
— opiat. adstring., II. 304.
— purgans, II. 744b.
Elixir s. Elixirium ad scrophulas — Tinct. Gent. alcalina.
Embrocation for hooping cough, II. 633.
— Lynch's, II. 744f.
Emulsio expectorans, II. 744c.
Emplastrum ad nodos mammar. — E. Meliloti camphor.
— stimul. et rubefac. II. 744d.
— anodynum, II. 744a.
— piceum comp., II. 675.
Enema opiatum Hartmanni, II. 744c. antispasmod., ibid camphorat., II. 744d. Amyli, ib.
Epithema refrigerans, II. 744c
Essence, Madden's vegetable, II. 744f.
— of coltsfoot, II. 744c of bitter almonds, ib. Whitehead's of mustard, ib. of mustard pills, ib.
— of Senna, Selway's prepared, II. 744c. of Spruce ib.
Extractum Aconiti vinos., 66.
— Cinae Semin. aeth., 552.
— Kinaekinae — E. Chinae.
— Menyanthis — E. Trifol. fibr.
— Pini Turionum, 2.
— Rhamni cathart. — Rob.
— Ribesior. — Rob.
— ex Uvis — Sapa.
Eye Salve, Singleton's, 286
Ferrugo — Ferri Rubigo.
Ferrum Boruss. oxydato-oxydulat., 707.
— hydriod. oxydul., II. 11
— limatum — Limat. Ferri.
— muriat. rubrum, 692.
— — viride, 690.
— oxydat. nigrum, 675.
— — rubrum, 678.
— oxydulatum, 675.
— — arsenicicum, 292.
— pomat. semiliquid — Extr F. pomat.
— potabile Willisii, 700.
— sulphur. viride — F. sulphur oxydul.
Fomentum anod. s. Conii, II. 744a.
Gargarisma aluminosum, II. 744b.
Gas azotic. oxydatum, 320.
— hydrosulphuricum, 43
— hydrothionicum, 43.
— nitrogenium — G. azot.
— — dephlogist. — G. azot. oxydat.
— oxydum nitros., 320.
Globuli Tart. ferrati, 702.
Gowland's Lotion, II. 744d.
Green's drops, II. 744d.
Gummi Opopanacis, II. 309.
Guttae Ammoniaci — G. Ammon. var.
— anodynae s. Morphiae Acetat., II. 744d. iodatae, ibid.
Hannay's Lotion, II. 393.
Haustus anodynus, II. 744a. ieniens, ibid. narcoticus, ibid. pectoralis, ibid. carminativus, ib. antispasmodicus, ib. roborans s. tonicus. ib. in diarrhoea, ib adstringens, II. 744b. antihaemorrhagicus, ib. emeticus, ib. purgans. ib. catharticus, ib. diuret. et stimul., ib. diureticus. II. 744c. expectorans. ib. lithontripticus, ib. in calculo, ib. demulc. et febrifugus, II. 744d. Chininae Sulphat., ib.
Hepar Calcis — H. Sulph cal car.
Honeywater, 572.
Hordeum praep. Thilenii. 785.
Hyacinthus Muscari — M. ambros
Hydrargyrum ammoniato-muriatic. insolubile. II, 206.
— — — solubile — Sal Alembroth.
— Boruss. s. hydrocyan. oxydat — H. Boruss. et hydrocyan.
Hydrargyrum chlorat. in maximo — H. muriat. corros.
— — mite praep. — H. mur. mite.
— cyanatum, II 195.
— iodatum, II. 194.
— mellitum, II. 130.
— nitric. oxydatum, II. 201.
— — oxydulat., II. 201.
— oxydat. subsulphuric., II. 197.
— oxydulat. aceticum, II. 211.
— — calcareum — H. c. Creta.
— — magnesiat. — H. c. Magnes.
— — saccharat, II. 130.
— phosphoric. oxydulat., II. 197.
— sulphuratum. II. 156
— — oxydulat., II. 141.
Hydras aluminicus — Terra Aluminis.
— natricus — Natron caust.
— Oxydi ferrici, 680.
Hydriodas ferrosus, II. 11.
— Kali, II. 9.
— zincicus, II. 722.
Jesuit drops, Walker et Wessel's, II. 744e.
Infusum Rhei Chinensis, II. 478
— — — c. Alcali, II. 481.
Injectio adstringens, II. 744b.
Injection, Matthew's, II. 744f.
Jodetum Ferri, II. 11.
— Hydrargyri, II. 194.
Kadmium sulph. oxydat., II. 45.
Kali arsenicosi Liquor, II. 737.
— Borussicum ferrat., 40.
— caust. sicc. in bacillis — K. c. fus.
— chloratum, II. 419.
— hydrocyanicum, 40.
— — ferratum, 40.
— hydrothionic. c. Stibio hydrothion. — Sapo stibiatus.
— hyperoxymuriaticum, II. 419.
— muriaticum, II. 420.
— — hyperoxygenat., II. 419.
— nitrosum — Nitrum antimoniat.
— oxalic. acidum, II. 425.
— purum mite, II. 398.
— subcarb. e Cin. clavell., e Tart. — Kali carb. e Cin. etc.
— Succo Citri neutralis., II. 246.
— sulphurat. stibiatum, 240.
— tartaric. ammoniatum, II. 436.
— — ferrat. — Ferr potab. Willis.

Kali tartar.c. hydrargyrat. oxydulat., II. 213.
— — natronatum, II. 435.
— — stibiat. oxydat., 251.
Kalium chloratum, II. 420.
Lapis Aetites, 678.
Ammoniaci — Ammon.var.
Lemons, essential salt of, II. 744e.
Lignum Sassafras, II. 653.
Limatura Auri, 316.
Linctus Olei Terebinthinae, II. 744b
Linimentum hydrosulphurat. saponac. II. 596.
— saponato - terebinthinat., II. 609.
— ex Vitello Ovor., II. 314.
Liquor Acetatis triplumbici, II. 385.
— acetatus Ammonii, 185.
— ex Ammonia Oleo Succini commixto — Aq. Luciae.
— Ammonii acet. dilut. — Spir. Mind.
— — oleosi — Sal volat. oleos.
— — spirituosus, 159.
— anod. Fuchsii — Liq. anod. succin., II. 633.
— — martialis Klaprothii, 698.
— — valerianatus, II. 706.
— antarthriticus Pottii, II. 668.
— Hydrarg. ammoniato-muriat., II. 207.
— — oxydati, II. 202.
— — — phosphorici, II. 197.
— Iodinae — Solutio Coindeti, II. 10.
— Kali hydriodici, II. 9.
— — — indurati, II. 10.
— Stibii chlorici s. muriat. oxydulat, 250.
— stypticus Loofii, 691.
Liquorice, refined, II. 744g.
Lisbon diet drink, II. 744f.
Lithontripticum Sennerti, II. 744h.
Lixivium kalinum, II. 390.
Lotio hydrocyanica, II. 744e.
— refrigerans, II. 744d.
Lotion for hooping cough, Struve's, II. 744g
Lozenges, aromatic of steel, II. 744f. Tolu, II. 744g.
Magnesia carbonica gravior s. ponderosior et levior v. Magn. carbonica.
— Muriae, II. 90.
Magnesium hyperoxydatum, II. 101.
— muriat. oxydulat., II. 101.
— oxydatum cinereo - nigrum, II. 101.
— sulphuricum oxydulat., II. 102.
Malaguetta — Maniguetta, 745.
Marcasita alba Hispan. — Magist. Bism.
Marsden's antiscorbut. drops., II. 744e.
Massa caustica — Pulv. arsenic. Rousselot.
— de Dactylis etc. v. Pasta.
— mercurialis — Ung. Hydr. citrin.
Mercurius cinereus Moscati, II. 145.
— griseus, M. praecip. Saund., II. 207.
Mercurius nitrosus calide paratus, II. 202.
— — frigore paratus, II. 201.
— phosphoratus Fuchsii, II. 197.
— tartarisat. liquidus, II. 200.
Milk, Virgin's, II. 744h.
Mixtura ammonio-citrica, 30.
— antacida absorbens, II. 744d.
— antihysterica, II. 744b.
— antirheumat., II. 744d.
— carminativa, II. 744b.
— cathartica, II. 744c.
— demulcens, II. 744e.
— emetica, II. 744c.
— emmenagoga et antispasmodica, II. 744c.
— expectorans et antispasmod., II. 744d. expectorans, ibid.
— hydrocyanica, II. 744e.
— kalino. et natro-citrica, 29. 30.
— — — — sulph., 30. 31.
— in tussi convulsiva, II. 744h.
Mock Arrack, II. 744c.
Morphina s. Morphinum acet., II. 223
— sulphurica, II. 222.
Morsuli stibiato-sulphurati, 236.
Mucago v. Mucilago.
Mucilago Hydrargyri II. 127.
Murias ammonicus ferratus, 694.
— Ferri c. Aqua, 690.
Naphtha chlorica s. muriatica - Spir. muriat. aeth.
— Petrae — N. Petrolei.
— Zinci — Aether Zinci.
Narceina — Morphina acetica.
Natri arsenicosi Liquor, II. 737.
Natron boracic. simpl. s. natronatum — Borax.
— caust. — Liq. Natri caust.
— chloricum, II. 606.
— hyperoxymuriat. — N. chloratum.
— muriat. hyperoxygenat. — N. chlorat.
— phlogiston — Nitrum flamm.
— phosphoric. simpl. s. natronat., II. 613.
— potassino-tartaric., II. 435.
— subcarbon. depuratum, II. 608.
— — siccum, II. 608.
— sulphuricum siccum, II. 614.
Nitras ammonicus immixto Oxydo hydrargyrico — Hydr. oxydulat. nigr.
— Ammonii, 180.
— argenticus, 277.
— hydrargyricus, II. 202.
— hydrargyrosus, II. 201.
— quadribismuthic. — Magist. Bism.
— strychnicus, II. 628.
Nitrum Argenti, 277.
— non fixum — N. flamm.
— regeneratum — N. flamm.
— semivolatile — N. flamm.
Norton's drops, II. 744c.
Novum antidysentericum — Ipecac.
Nuces Cacao — Cacao.
— Myristicae — N. mosch.
— purgantes — Been.
Ointment, golden, 286.
— Plunkett's, II. 744f. — Edinburgh, ib. for the eye, Smellome's, II. 744h.
Oleum infernale — Ol. Ricin. Amer.
— Kuori — O. betulinum.
— Lauro-Cerasi — O. Amygd. amar.
— Moringae — O. Been.
— Ocymi — O. Basilici.
Opodeldoc, Steer's, II. 744f.
Orellana, II. 312.
Oxydum Alumii, 141.
— Ferri ferrato-boruss. — Ferr. bor.
— Stibii album, 227. 229. 250.
— — c. Chloreto Stibii — Pulv. Algaroth.
— — praecipitando parat., 229.
— — c. Sulphureto Stibii — Croc. metall.
Pasta Amygdalarum, II. 744e.
Phosphas ferricus u. ferrosus acidulus et simplex — P. Ferri.
— hydrargyrosus, II. 197.
Pills, Dinner, Crespigny's, Lady Webster's v. Pil. ante cibum.
— Hooper's, II. 744f. Peter's, ib. everlasting, II. 744g. Moseley's, ib.
— Matthew's, Starkey's, 777.
Pilulae Aloës et Cambogiae, 112. 772.
— adstringentes, II. 744b.
— antacidae, II. 744d
— Cambog. et Scammon, 772.
— anodynae, II. 744a.
— catharticae, II. 744c.
— diaphoreticae, II. 744c.
— diureticae, II. 744c.
— Hoffmanni — P. balsamicae.
— e Hydrarg. mur. corros., II. 187.
— lenientes, II. 744a.
— narcoticae, II. 744a.
— sialagogae, II. 744d.
— in typho, II. 744a.
Platina s. Platinum muriat., II. 350.
Plumbum acetic. oxydat. — Liq. Pl. acet. basici u. Sacch. Sat.
— — oxydul. acid — Sacch. Sat.
— album — Stannum.
— Borussicum, II. 351.
— oxydulat. carbonic. — Cerussa.
Pomatum epispast. flav. et mitius — Ung.
— — viride — Unguent.
Pothos foetida — Dracontium foet.
Potio antispasmodica, 83.
— emetica antimoniata, 256.
— — c. Ipecac., II. 15. 16.
— expectorans, II. 744d.
— ad pertussim, II. 17.
Potiuncula Hulmiana, 30.
Potus refrigerans, II. 744d.
Poudre subtil, Delcroix's, II. 744f.
Powder, Hunt's economical breakfast, II. 744f. Patent Seitlitz, II. 744g. Sodaic, ib. — of Ethiopia, Guy's, II. 744f.
Ptisana ex Flor. bechic, II. 100.
— — Chamaemeli — ut Ptis. ex Fl. bech.
— — Sambuci et Tiliae v. Infus.
— de Foliis Borag., Buglos.,

Chamaedr., Inulae v. Infus. et Tisana.
Ptisana de Fructibus — Tis. de Fr. pect.
— de Radice Gram.— Decoct. Gram.
Pulpa de Plant. emoll. — P. emoll.
Pulvis aëroph. Vogleri, 28.
— aloëtic. c. Guajaco, 113.
— anthelminticus, II. 744c.
— antipodagricus Portlandii, 733.
— Auri — Aurum fulmin.
— in calculo, II. 744d.
— Cambog. s. G. Gutt. comp s. hydragogus, II. 24.
— contra cardialgiam, II. 744d
— catharticus II. 744c.
— Comitissae — China.
— diaphoreticus, II. 744d.
— diureticus, II. 744c.
— expectorans, II. 744d.
— hypnoticus Krielii, II. 141.
— Jacobi febrifug.—P. James.
— Jalap. et Scamm. comp., II. 24. 25.
— Jesuitarum s Patrum — China.
— Ipecacuanh.opiatus, II.284.
— magnesio-tartaricus, 28.
— Myrrhae expectorans, II. 744d.
— natroso-tartaricus. 28.
— Sapo veget. — P. gummos. alcalin.
— de Scamm. et Oxydo Stib. comp. — P. Cornachin.
— — Senna, Scamm. et Lignis comp., II. 578.
— de Sulphureto Hydrarg. nigro et Scamm. comp., II 141.
— vermifugus absque Merc., 782.
Quadristibias kalicus — Antim. diaphor.
Remedium ad aures Taylori, II. 744c.
— odontalgicum, II. 744c.
Remedy for cancer, Davidson's, II. 744f for the stone, II. 744c. 744h.
Resina Ligni Guaj. artific. — Extr. G. spir.
— Lupulini — Extr. Lupulini alcoholic.
Rob Rhamni cathart., II. 471.
— antisyph. de Laffecteur, II. 551.
Royal preventive, II. 361.
Rubinus Antimonii — Magnesia opalina.
Sal Alkali min. crudum, II. 608.
— Ammoniac. Cupri — Cuprum ammoniat.
— Anglicanus volatilis, 171.
— aperitiv. Frideric. — S. mir. Glaub.
— mirabile delapsum, II. 615.
— Plantar. Tachenii modo parat. — Sal Tachenian.
— Rochellense, II. 435.
— volatile Vitrioli narcoticum, 26.
Salt of bark, essential, II. 744c.
Salts, Godfrey's smelling, II. 744c.
Sapo Cacao, II. 437.
— Antimonii resinos. c. Amm. Kaempfii, II. 737.
— ceraceus s. ceratus, II. 604.
— Crotonis, 612.
— hydrargyratus — S. mercurialis.
— medicus s. purissimus, II. 437.
Sapo Sulphuris — Kali sulphuratum.
Semichloretum Hydrarg. — Merc. dulc.
Semiiodetum Hydrargyri, II. 194.
Semina ex Ombellif. s. carminat. — Pulv. carm.
Serapinum s. Serapium — Sagapenum.
Sericum epispasticum Guilberti, 424.
Sesquisulphuretum Stibii — Antimon. crud. praep.
Solomon's antiimpetigines, II. 744c.
Solutio arsenicalis kalina, 290.
— — natrosa, II. 737.
— ad balneum salino-gelatin., 726
— Merc. calide parati — Liq. Bellostii.
Solution of charcoal, concentrated, II. 744f.
Species ad tussim — Sp. bechicae.
Specificum antipodagricum Emerigonis — Tinct. Guaj. c. Taffia.
Spilsburry's antiscorbutic drops, II. 744c.
Spirit of scurvy grass, golden, II. 744g.
Spiritus acetico-ferratus, 697.
— chlorico-aethereus, 76.
— e faecibus Vini — Sp. Vini.
— muriatico-oleosus, 76.
— saponat. comp., II. 670.
— Seminum Colchici ammoniat., 587.
— Succi Sacchari — Taffia.
— sulphuratus Beguini, 184.
— sulphurico-acidus — Mixt. sulph. ac.
— — aethereus muriatico-ferratus, 692.
— Vini alcoholisatiss. — Alcohol absol.
— volat. aromatico-oleos., 161.
Stibium calcareo-phosphorat. — Pulv. Jacobi febrifug.
— hydrothionic. oxydat. — Sulphur stibiat. rubrum.
— oxydat. alb. kalisat. — St. ox. alb.
Styptic, Eaton's, II. 744f.
Suboxyphosphas Ferri — Ferr. phosphoric.
Succus Chermes, 498.
— Uvarum immat. — S. Omphacii.
Suffumigatio Smithiana v. Fumigatio.
Sulphas Aluminis et Potass. purus., 144.
— Ammonii, 180.
— Hydrarg. peroxydati, II. 197.
— kadmicus c. Aqua, II. 45.
— Kadmii, II. 45.
— manganosus c. Aqua, II. 102.
Sulphur aurat. Antim. saponat., 246.
— lozenges — Tabellae de Sulphure simplices.
Sulphuretum Stibii c. Sulphate Calcii — Calcaria sulphurato-stibiata.
— — — — Kalii — Kali sulphurat. stibiatum.
— de Adianto Canad. — S. Capill. Ven.
— hydrocyanicus, 38.
Suppositorium anthelmint., II. 744c. cathartic., ib.
Syrupus Cuisinier, II. 744f.
Tabellae de Acido tart., 64.
— de Concrement. s. Lapid. Cancror., 382.
— — Ipecacuanha, II. 14.
— — Kinakina, 515.
Tartarus hydrargyratus, II. 213.
— vitriolat. acidus — Kali sulph. acid.
Tartras Hydrargyri, II. 213.
— hydrargyrosus, II. 213.
Terra aluminaris, 142.
— muriatica — Magnesia carbon.
Terre feuilletée mercurielle de Pressavin, II. 213.
Tinctura Acetatis ferrosi, 697.
— Ammoniaci, 760.
— Antimonii Thedenii — Liq. Kali acet. spirit.
— antispast. Lentini — T. Valer. aeth.
— Aurant. comp. — Elixir. A. comp.
— Copaivae, 322.
— Cupri volatilis, 626.
— Ferri acet. oxydul., 697.
— — muriat. aeth., 692.
— — vinosa — Vin. martiat.
— Klaprothii, 692.
— Ligni Guajaci, 751.
— Martis Edinburgensium, 691.
— Rhei purg. Edinburgensium, 123.
— sacra Edinburgens, 123.
— Saponis stibiati — T. Antim. Jacobi.
— saturnina Gramanni, II. 371.
— c. Sodae Carbonate — Elix. Peyrilhe.
— Succini volat. — Spir. Sal. Amm. succinat.
— Sulph. volat. Hoffm. — Liq. fum. Boylei.
— Veneris volat., 626.
— Vitrioli Ludovici — T. Ferri tart.
Tincture for the gout, Wilson's, II. 744f.
— for the teeth, Greenough's, II. 744c. Ruspini's, ibid.
Trisulphuretum Kalii c. Sulphate kalico — Kali sulphurat.
Turbith min. — Turpethum m.
Turpethum mercuriale — T. minerale.
Unguentum antipsoric. Batemanni, II. 744f.
— cineritium, II. 132.
— Hydrarg. coeruleum, II. 132.
— — griseum, II. 132.
— — terebinthinat. s. c. Terebinth., II. 134.
— Iodeti Kali, II. 10.
— mercuriale comp. — U. Hydr. terebinth.
— — Cirilli, II. 186.
— Mercurii nitrati, II. 204.
— — praecip. albi, II. 209.
— — — rubri, II. 151.
— de Mucaginibus — Empl.
— ex Ol. volatilibus — Balsi nervin.
— — Ovor. Vitellis — Digestis simpl.
— ad scabiem Werlhofii, II. 209.
— sulphuratum alcalinum, II. 395.
— therebinthinat. comp., II. 656.
Vesicans Anglicum — Empl. vesic. Angl.
Vinum de Kinakina — V. Chinae.
Worm cakes, Storey's, II. 744f.
Zincum Boruss. s. zooticum, II. 722.

Anhang.

Pharmacopöe der homöopathischen Lehre.

Die Bereitungsweise der homöopathischen, d. h., solcher Arzneien, welche Krankheiten heilen sollen, deren Symptome sie in ihrer Primärwirkung auf den gesunden Körper in möglichster Aehnlichkeit hervorrufen, gründet sich auf den doppelten Entzweck:

1) Die einem Arzneikörper innewohnende Arzneikraft von dem Stoff, ihrem materiellen Träger, so weit als möglich zu befreien, oder die latente Arzneikraft zu entwickeln. Dieß geschieht durch lang fortgesetztes Reiben des in Pulver verwandelten Arzneikörpers mit einem andern indifferenten Pulver, oder durch Schütteln des flüssigen Arzneikörpers (des Saftes oder der Tinctur) mit einer unarzneilichen Flüssigkeit. Zur erstern Bereitungsweise bedienen wir uns des Milchzuckers, zur letztern des Weingeistes. Hierdurch wird die Arzneikraft von ihrem zeitherigen Träger mehr und mehr entbunden, und dem Milchzucker oder Weingeist, wiewohl in einem weit weniger innigen Grade, übertragen; sie wird aus einer latenten oder doch sehr unvollkommen zu befreienden Kraft in eine freie und schnellwirkende verwandelt: ein Gesetz, dessen Analogie wir am deutlichsten in der Electricität wiederfinden.

2) Der andere Zweck der eigenthümlichen Bereitungsweise der homöopathischen Arzneien beruht auf der Nothwendigkeit, die Arzneigabe zur Anwendung in Krankheiten so zu verkleinern, daß ihre Primärwirkungen nur flüchtig und nur eben so stark auftreten, um den kranken Organismus zu derjenigen Reaction zu bestimmen, welche, da Primärwirkung der gegebenen Arznei und vorhandene Krankheit gleichnamig sind, beiden entgegenarbeitet, und somit den Anfangspunct des Genesungsprocesses bildet: nicht aber, was bei zu großen Dosen der Fall seyn würde, durch zu stark oder zu andauernd auftretende Primärwirkung die Naturkraft völlig zu lähmen, oder wenigstens in ihrem Wirken aufzuhalten. Dieser zweite Zweck wird erreicht, indem man die Mittel je nach ihrer größern oder geringern Wirksamkeit zu verdünnen fortfährt.

Durch dieses Verfahren werden also einestheils höchst intensive Mittel zu unschuldigen Arzneien, andererseits schließen uns Stoffe, die zeither als völlig indifferent betrachtet (wie Kieselerde, Thonerde) oder nur ihrer chemischen Qualität nach angewandt wurden, wie die basischen Erden, die unglaublichsten zur Heilung der bedeutendsten Krankheiten brauchbaren Kräfte auf.

Das Verfahren bei dieser der Homöopathie eigenen Arzneibereitung ist folgendes:

a. sämmtliche Arzneisubstanzen, welche man nicht aus frischen Pflanzensäften bereiten kann, behandelt man auf die Weise, daß man einen Gran derselben in Pulver (von Bergöl statt eines Grans einen Tropfen) mit hundert Gran Milchzucker, welchen man aber nach und nach, zu ungefähren Dritttheilen, zusetzt, in einer unglasurten oder mit nassem Sande auf dem Boden mattgeriebenen porcellainenen Reibschaale mit einem beinernen oder hölzernen Spatel untereinandermischt, und alsdann das Gemisch mit einiger Kraft mittelst einer ebenfalls mattgeriebenen oder unglasurten porcellaine-

nen Reibkeule zusammenreibt, wobei man nach ungefähr sechs Minuten langem Reiben das Geriebene von dem Boden der Reibschaale und der Reibkeule abscharrt, (worauf man etwa vier Minuten rechnet,) und dieses wiederum sechs Minuten lang verreibt, und abermals abscharrt. Theilt man obige Hundert Gran Milchzucker in drei Theile, welche man nach und nach zu besagter Reibung verwendet, so bedarf man zu der ganzen Procedur ungefähr einer Stunde.

Von diesem ersten Pulver, von welchem jeder Gran $\frac{1}{100}$ Gran Arznei enthält, wird wiederum 1 Gran mit 100 Gran Milchzucker auf dieselbe Weise verrieben.

Eben so verfährt man bei der dritten Verreibung, von welcher jeder Gran $\frac{1}{10000}$ Gran der Arznei enthält. Sie wird mit I. bezeichnet.

Um von hier aus weiter zu verdünnen, bringt man 1 Gran des Pulvers I. in eine Mischung von 50 Tropfen destillirtem Wasser und 50 Tropfen wasserfreiem Weingeist (weil sich der Milchzucker nicht in reinem Weingeiste auflös't), dreht das dann verstopfte Gläschen langsam einige Minuten um seine Axe, bis das Pulver aufgelös't ist, und schüttelt es mit zwei kräftigen Armschlägen. Es wird mit 100 I. bezeichnet. Hiervon wird ein Tropfen zu 100 Tropfen reinem Weingeiste getröpfelt, das dann verstopfte Gläschen mit zwei Armschlägen geschüttelt und mit 10000 I. bezeichnet. Das nächste eben so zu bereitende bezeichnet man mit II.; es enthält die Billionverdünnung. Von da aus verdünnt man nun auf dieselbe Art und Weise fort bis zur 9ten (Trillion III.), 12ten (Quadrillion, IV.), 15ten (Quintillion, V.), 18ten (Sextillion, VI.), 24ten (Octillion, VIII.), 30ten (Decillion, X.) Verdünnung, welche letztere bei den meisten Mitteln am häufigsten in Anwendung kömmt. Das Tröpfeln des Weingeistes erspart man sich durch kleine Mensurgläser, welche genau 100 Tropfen fassen.

b. Von allen Pflanzen, welche man sich völlig frisch verschaffen kann, wird der ausgepreßte Saft, als das die Gesammtkraft der ganzen Pflanze Enthaltende, benutzt. Die frischen Pflanzen werden in Stücke zerschnitten, und in einem steinernen Mörser zerstampft, sodann durch ein reines leinenes Tuch gepreßt; sind sie sehr trocken, so rührt man sie in dem Mörser vor dem Auspressen mit etwas Weingeist an. Den erhaltenen Saft vermischt man sogleich mit dem gleichen Volumen Weingeist, wodurch sich der Faserstoff, Schleim u. s. f. eher abscheidet. Sind alle unbrauchbaren Theile zu Boden gefallen, was nach etwa sechs Tagen der Fall ist, so filtrirt man die helle Flüssigkeit davon ab und bewahrt sie auf. Wärme darf hierbei nie angewendet werden. Von dieser ersten Tinctur werden, behufs der Entwickelung und endlichen Verdünnung, zwei Tropfen mit 98 Tropfen Weingeist vermischt und mittelst einiger Armschläge geschüttelt ($\frac{1}{100}$); von dieser ersten Verdünnung ein Tropfen mit 100 Tropfen Weingeist ebenso geschüttelt ($\frac{1}{10000}$) u. s. f., wie sub. a. gelehrt wurde, bis I., II., IV., X.

Trockne vegetabilische Substanzen können außer ihrer Verreibung wie unter a. auch zur Tinctur (ein Theil gepulverte Substanz auf zwanzig Theile Weingeist) binnen 6 bis 8 Tagen ohne Wärme ausgezogen und dann weiter verdünnt werden, wobei man das erstemal zwanzig Tropfen der Tinctur zu achtzig Tropfen Weingeist tröpfelt.

Ehe ich zu den einzelnen homöopathischen Arzneien übergehe, halte ich es für nothwendig, noch Einiges vorauszuschicken über die

Einrichtung einer homoopathischen Apotheke.

Da das Selbstgeben der Arzneien den homöopathischen Aerzten in vielen Staaten noch nicht gestattet ist, so müssen nothwendigerweise an solchen Orten, wo homöopathische Aerzte leben, auch besondere Apotheken für sie eingerichtet werden. Diese müssen, wenn sie den Anforderungen des Arztes genügen sollen, folgendermaaßen beschaffen seyn:

1) der Raum, in welchem sich die homöopathischen Arzneien befinden, muß von allen übrigen Aufbewahrungsorten der allöopathischen Arzneien gesondert seyn, und zwar so vollständig, daß auch Arzneigerüche durchaus nicht in denselben dringen können.

2) Der für die homöopathischen Arzneien bestimmte Zimmerraum, in welchem auch die Recepte gefertigt werden, muß vollkommen helle seyn, damit bei der nöthigen Feinheit der Dosen und bei der Wahl des vorgeschriebenen Verdünnungsgrades keine Irrung vorfalle.

3) Die Arzneien selbst müssen vor dem Licht völlig geschützt seyn; sie sind daher in einem dunklen Schrank ohne Glasthüren aufzubewahren.

4) Die in dem Schrank befindlichen Arzneien müssen sorgfältig und genau von einander getrennt seyn; auch muß verhütet werden, daß der Dunst der einen Arznei zu den andern dringen könne; demzufolge müssen die einzelnen Arzneien nebst ihren Verdünnungsgraden in, am besten mittelst eingeschmergelter Glasstöpsel luftdicht verschlos-

senen Gläsern, aufbewahrt werden. Von starkriechenden Arzneien, z. B., Moschus, dürfen nur die Verdünnungen in dem allgemeinen Arzneischrank stehen. Die bequemste Form der Arzneigläser ist die Cylinderform; ihre Größe sey so, daß sie 150 Tropfen Weingeist fassen, ihr Hals nicht allzueng.

5) Zu jeder Arznei gehört ein feines, mit ihrem Namen bezeichnetes Glasröhrchen, durch dessen Eintauchen in die arzneiliche Flüssigkeit bis zu einem vorgezeichneten Strich man einen stets gleich großen Tropfen herausheben kann.

6) Der Arzneischrank öffnet sich am besten mit Einer Thür von der Fensterseite abwärts, damit sie bei'm Receptiren nicht verdunkele. Er enthält eine gewisse Anzahl von Schubkästen, an deren Außenseite ihr Inhalt bemerkt ist, z. B., Acidum nitricum bis Dulcamara. Jeder Kasten ist wieder in Fächer abgetheilt, deren jedes fünf Gläschen bequem fassen kann. Die Arzneien werden nun alphabetisch und mit der Aufeinanderfolge ihrer Verdünnungsgrade geordnet; doch können der Raumersparniß wegen Zwischen-Verdünnungen wegfallen, und es braucht nur je der vierte Verdünnungsgrad vorräthig zu seyn: z. B., von Antimonium würde im ersten Fache stehen: die erste, zweite, dritte Pulverreibung und die erste daraus bereitete flüssige Verdünnung: im zweiten Fach die neunte, zwölfte, funfzehnte und achtzehnte; im dritten endlich die vier und zwanzigste und dreißigste nebst zwei Gläschen, mit Streukügelchen von der Größe des Mohnsaamens, aus Zucker und Stärke bereitet, bis zur Hälfte gefüllt, welche zum täglichen Verbrauch mit der in der Regel verordneten 30sten Verdünnung befeuchtet, vorräthig zu halten sind, um nicht jedesmal die Flüssigkeit selbst von neuem schütteln und öffnen zu müssen, was mehrere Unannehmlichkeiten, namentlich zu starke Potenzirung derselben und bei verschiedenen Recepten Dunstvermischung, auch einen größern Zeitaufwand zur Folge hat. Das Befeuchten der Streukügelchen geschieht, indem man einen Tropfen an dem innern Rande des sie enthaltenden Gläschens auf sie herunterlaufen läßt, und das Gläschen alsdann so lange schüttelnd um seine Axe dreht, bis sämmtliche Streukügelchen befeuchtet erscheinen

7) In einem besondern, am bequemsten durch Aufklappen der Schrankdecke zu öffnenden Fach, ist eine Quantität von feinem Milchzucker, so wie eine hinlängliche Anzahl von aus dichtem und feinem Papier bereiteten Kapseln und Umschlägen vorräthig zu halten. Man nimmt bei'm Receptiren eine Messerspitze voll Milchzucker, schiebt die vorgeschriebene Anzahl von Streukügelchen, oder den ganzen Arzneitropfen, in denselben, und bewahrt das so gefertigte Pulver in einem besondern, durch eine Klappe sich öffnenden Kasten, in einiger Entfernung vom Arzneischrank, auf. Für den seltnern Fall, wo die Arznei flüssig verordnet wird, dürfen Gläschen, die eine Quente Wasser halten, so wie ein mäßiger Vorrath von reinem destillirten Wasser, nicht fehlen. Man füllt erforderlichen Falls das Gläschen mit dem Wasser, nachdem man das oder die arzneilichen Streukügelchen, oder den Arzneitropfen in ersteres fallen ließ.

8) Zur Bereitung der Arzneien, nach homöopathischen Grundsätzen, bedarf man folgender Geräthschaften:

a. mehrere unglasurte, oder mit nassem Sand auf dem Boden mattgeriebene porcellanene Reibschaalen nebst gleichbeschaffenen Reibkeulen;

b. einige beinerne oder hörnerne Spatel;
(Diese Instrumente werden, ehe man sie zu einer neuen Arznei benutzt, sorgfältig mit kochendem Wasser gereinigt und ausgewischt.)

c. feine Feilen zum Feilen der Metalle, und zwar für jedes Metall eine besondere;

d. Seihetücher, ebenfalls für jede Arznei ein besonderes;

e. Trichter;

f. eine reichliche Anzahl von cylinderförmigen Gläschen, welche durch 100 Tropfen Weingeist bis auf ein Dritttheil angefüllt werden Am Sichersten benutzt man dieselben Gläser nur zu einer Arznei; doch können sie im Nothfall vollkommen gereinigt werden, indem man sie mit heißem Wasser ausspült, auswischt und in einem Gestell von einer kleinen durchlöcherten Eisenplatte mit Drathfüßen über einer Spirituslampe erhitzt;

g. ein Mensurgläschen, welches genau 100 Tropfen hält.

A.

Acidum hydrocyanicum.

Blausäure.

(Pharmacopoea Universalis I. p. 36. 37. u. 38.)

Die nach der Ittner'schen Methode bereitete Blausäure, bis zur dreißigsten Verdünnung gebracht, und im Dunkeln aufbewahrt.

℞. Spiritus vini . guttas centum.
Acidi hydrocyanici methodo Ittneriana parati . guttam unam.
Misce tribus brachii agitationibus. Signa $\overline{100}$; hujus mixturae guttam unam cum aliis spiritus vini guttis centum dilue atque agita; dein signa $\overline{1000}$. Eodem modo perge usque ad trigesimam extenuationem, quam signa $\overline{X}$.

Dosis: ein bis drei mit der dritten bis dreißigsten Verdünnung befeuchtete Streukügelchen $\frac{0\,00\,000}{1}$ — $\frac{0\,00\,0^{0}0}{X}$.

Wirkungsdauer kurz, von etwa 12 bis 16 Stunden.

Acidum muriaticum s. hydrochloricum.

Reine Salzsäure.

(Ph. Un. I. p. 32.)

℞. Acidi muriatici puri . guttam.
Aq. destillatae . guttas centum.
Misce et signa $\overline{100}$; hujus mixturae guttam cum spiritus vini et aquae destillatae singulorum guttis quinquaginta bis terve agitando misce et signa $\overline{10000}$. Dein perge usque ad trigesimam extenuationem, $\overline{X}$ signandam.

Dosis: die 3. bis 30. Verdünnung, zu einigen Streukügelchen.

Symptome: Hahnemann's Arzneimittellehre. 5ter Theil.

Acidum nitricum purum.

Reine Salpetersäure.

(Ph. Un. I. p. 47.)

Wie acidum muriaticum.

Dosis: meistens die dreißigste Verdünnung. Wirkung dauert mehrere Wochen in chronischen Uebeln.

Sehr wirksam gegen manche venerische Uebel, gegen Quecksilberkrankheiten, Exulcerationen und Blutungen.

Symptome: Hahnemann's chron. Krankh. 2ter Theil.

Acidum phosphoricum.

Phosphorsäure.

(Pharm. Univ. I. p. 53.)

Ein Pfund weißgebrannte zerstückelte Knochen werden in einem porcellanenen Gefäße mit einem Pfunde der stärksten Schwefelsäure übergossen, und das Gemisch vier und zwanzig Stunden hindurch öfters mit einer Glasröhre umgerührt. Dieser Brei wird mit zwei Pfunden gutem Branntwein genau verdünnt, und das Ganze nun, in einen leinenen Sack gebunden, zwischen zwei reinen Bretern ausgepreßt. Der Rest im Sacke kann wieder mit zwei Pfunden Branntwein verdünnt, und nochmals ausgepreßt werden. Die hiervon erhaltenen Flüssigkeiten läßt man ein Paar Tage lang ihre Trübheit absetzen, dickt das Helle über dem Feuer in einem porcellanenen Geschirre ein, und schmelzt das Eingedickte in einem gleichen Geschirre in Glühhitze. Die geschmolzene crystallhelle Phosphorsäure wird in verschlossenen Gläsern aufbewahrt.

℞. Acidi phosphorici sicci
granum unum,
solve in
Aquae destillatae guttis nonaginta.
Spiritus vini . . guttis decem.
Misce et signa $\overline{100}$; cujus solutionis guttam unam misce agitando cum Spiritus vini guttis centum. Perge eodem modo usque ad sextam extenuationem.

Dosis: ein kleiner Theil eines Tropfens oder ein ganzer Tropfen der 2ten, 3ten bis 6ten Verdünnung. — Die Phosphorsäure hat sich wirksam gezeigt bei schwächendem Säfteverlust, besonders Diarrhöen, und namentlich gegen die Cholerine.

Symptome: Hahnemann's A. L. 5ter Theil.

Acidum sulphuricum purum.

Reine Schwefelsäure.

(Ph. Un. I. p. 57.)

Wie Acidum muriaticum.

Dosis: dieselbe.

Symptome: Archiv für die homöop. Heilk. Bd. VIII. Heft 3.

Aconitum.

Aconitum Napellus, L.

Blauer Sturmhut oder Eisenhut.

(Ph. Un. I. p. 65.)

℞. Succi herbae aconiti (cum planta florescit collectae) expressi,
Spiritus vini . partes aequales.
Stent in digestione sine calore per dies quinque — sex; dein separa fluidum clarum et serva: cujus tincturae guttam cum spiritus vini guttis centum agitando bis terve misce. Perge eodem modo usque ad trigesimum extenuationis gradum.

Dosis: ein, zwei, drei befeuchtete Streukügelchen, bis ein Tropfen der 12ten bis 30ten Verdünnung.

Antidot: Gewächssäuren und Wein. Ist specifisch in allgemein entzündlichen Zu-

ständen und fast allen reinen Entzündungen, namentlich serösen Gebilde.
Symptome: Hahnemann. A. L. 1. Theil.

Aether nitricus.

Salpeteräther.

(Ph. U. I. p. 77.)

Dosis: ein Tropfen (wiederholt).
(In der febris nervosa stupida.)

Agaricus muscarius.

Fliegenpilz.

Amanita muscaria, Persoon.

Der Fliegenschwamm wächst häufig auf sandigen Wiesen und in Wäldern; er dient den Kamtschadalen als Berauschungsmittel; Nachtrinken von Wasser steigert seine Wirkung; ölige Mittel mildern sie. Der Urin bekömmt nach dem Genusse des Fliegenschwamms noch stärkere berauschende Eigenschaften, als der Schwamm selbst.

℞. Agarici muscarii caute siccati granum,
Sacchari lactis grana Centum, tere per horam, et signa $\overline{100}$. Perge eodem modo usque ad tertiam extenuationem, I signandam. Hujus (tertii) pulveris granum in Spiritus vini aqua diluti guttis centum solve agitando. Dein perge usque ad trigesimam extenuationem, X signandam.

Dosis: einige mit letzter Verdünnung befeuchtete Streukügelchen.
Antidot: Kampher.

Gegen Veitstanz und ähnliche Krämpfe.

Symptome: Archiv. Bd. IX. Heft 1. u. Bd. X. Heft 2.

Agnus castus.

Vitex Agnus castus, L.

(Ph. Un. I. p. 87.)

Keuschlamm.

Aus den frischen Beeren wird der Saft ausgepreßt und dieser sechsmal verdünnt.
Dosis: sechste Verdünnung.
Gegen Impotenz.
Symptome: Archiv. Bd. X. Heft 1.

Alumina.

Argilla, Thonerde.

Reine, durch Glühen in porcellanener Schaale völlig ausgetrocknete kochsalzsaure Kalkerde wird noch heiß gepulvert und in, so viel nöthig, Alcohol aufgelöst. Mittelst dieser Auflösung wird aus einem Lothe weißem Römischen Alaun von Solfatara, welcher vorher in fünf Theilen destillirten Wassers aufgelöst, und zur Beseitigung der etwa anhängenden Erde filtrirt worden, die Schwefelsäure zu Gyps niedergeschlagen, bis beim weitern Zutröpfeln der weingeistigen Auflösung der salzsauren Kalkerde keine Trübung mehr erfolgt. Die oben stehende wasserhelle Flüssigkeit enthält salzsaure Thonerde, aus welcher die Erde durch weingeistigen Salmiakgeist niedergeschlagen, wohl ausgesüßt, und, zur völligen Entfernung des Ammoniums, geglüht, das Pulver aber, als die reine Alaunerde, noch warm in einem verschlossenen Glase verwahrt wird.

Verreibung mit Milchzucker und weitere Verdünnung mit Weingeist geschieht auf die in der Einleitung beschriebene Weise bis zum dreißigsten Grad.

Ein bis drei Streukügelchen mit der dreißigsten Verdünnung bilden die gewöhnliche Dosis, auf mehrere Wochen.

Gehört zu den von Hahnemann so genannten antipsorischen Mitteln.

Symptome: Archiv. Bd. IX. H. 3.

Ambra.

(Pharm. Univ. I. p. 152.)

Ein Gran Ambra wird dreimal mit Milchzucker verrieben und dann mit Weingeist weiter verdünnt.

Dosis: dritte bis zwölfte Verdünnung.

Ammonium carbonicum.

(Ph. U. I. p. 155.)

Das, aus wohl zusammengeriebenen, gleichen Theilen Salmiaks und crystallinischen Natrums bei mäßiger Hitze sublimirte Salz.
Verreibung und Verdünnung bis zum dreißigsten Grad, wie bei alumina.

Gewöhnliche Dosis dreißigste Verdünnung.
Ist ein antipsoricum.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krkh. 2ter Theil.

Anacardium.

Malaccanuß.

Anacardium longifolium, Lmk.

(Ph. U. I. p. 204.)

Eine Drachme des feingepülverten Saamens wird mit zwanzig Drachmen Weingeist unter öfterm Umschütteln binnen sechs Tagen ausgezogen; die Tinctur dann weiter verdünnt.

Oder:

Ein Gran des gepülverten Saamens wird mit 100 Gran Milchzucker dreimal verrieben und dann weiter verdünnt, wie bei agaricus.

Gegen Gedächtnißschwäche u. s. w.

Dosis; die sechste bis zwölfte Verdünnung. Symptome: Archiv. Bd. II. Heft 1.

Angelica.

Engelwurzel.

Angelica Archangelica, L.

(Ph. U. I. p. 211.)

Zweifache Behandlungsweise der Wurzel, wie sie bei den Saamen von anacardium vorgeschrieben wurde.

℞. Radicis Angelicae pulveratae drachmam digere per dies sex cum Spiritus vini . drachmis viginti. Fluidum clarum separa, serva et dilue lege artis ad duodecimum gradum.

℞. Pulveris radicis Angelicae granum, Sacchari lactis . grana centum, tere per horam. — Eodem modo perge ut de agarico doctum est.

Angustura.

Cortex Angusturae, Angusturarinde.

Galipea Cusparia, Decand.

(Ph. U. I. p. 219.)

Bereitung wie die der Angelicawurzel; Weiterverdünnung bis zum dreißigsten Grad. Dosis: nach den Umständen verschieden. Ihre Symptome versprechen Heilkräfte gegen Starrkrampf.

Symptome: Hahnemann, A. L. 6ter Theil.

Anisum.

Sternanis.

Illicium anisatum, L.

(Ph. U. I. p. 224.)

Eine Drachme der gepulverten Saamen mit zwanzig Drachmen Weingeist binnen sechs Tagen ausgezogen. Dosis: die unverdünnte Tinctur: zu einem Tropfen.

Antimonium.

Spießglanz.

(Pharm. Univ. I. p. 225.)

Ein Gran reguliniſcher Spießglanz wird ganz fein abgefeilt, und auf die ſchon bekannte Weiſe dreimal mit Milchzucker verrieben, und bis zum dreißigſten Grade verdünnt.

Letzteres iſt die gewöhnliche Doſis.

Hülfreich gegen comatöſe Zuſtände, und Erbrechen; auch in den Pocken.

Antimonium tartaricum.

Brechweinſtein, Tartarus stibiatus.

(Ph. U. I. p. 251.)

Ein Gran gepulverter Brechweinſtein wird ebenſo behandelt wie das Antimoniummetall.

Symptome: Archiv. Bd. III. H. 1.

Argentum.

Silber.

(Pharm. Univ. I. p. 276.)

Ein Gran reines Blattſilber (argentum foliatum) ganz ſo wie Antimonium zum dreißigſten Verdünnungsgrade gebracht.

Gegen Diabetes.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

Aristolochia.

Oſterluzey, Aristolochia Clematitis, L.

(Ph. Un. I. p. 279.)

Der friſche Saft der ganzen Pflanze vor der Blüthe ausgepreßt und dann mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht. Weiterbehandlung wie bei Aconitum.

Doſis: die erſten drei Verdünnungen.

Armoracia.

Meerrettig, Cochlearia armoracia, L.

(Ph. Un. I. p. 579.)

Der friſche Saft der Wurzel mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht.

Doſis: ein Tropfen der erſten drei Verdünnungen.

Arnica.

Fallkraut, Arnica montana, L.

(Ph. Un. I. p. 282.)

Die friſchgepulverte Wurzel wird ganz ſo behandelt wie Radix Angelicae.

Doſis: der zwölfte bis achtzehnte Verdünnungsgrad.

Specifiſch bei Blutextravaſaten, Zerreißungen, Quetſchungen und ihren Folgen.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erſter Theil.

Arsenicum.

(Pharm. Univ. I. p. 287.)

Arsenicum album, Acidum arsenicosum.

Ein Gran gepülverter weißer Arſenik mit ſechs gemeſſenen Quentchen deſtillirtem Waſſer in einem etwas langen Arzneiglaſe mit dünnem Boden über einem brennenden Licht bis zur völligen Auflöſung gekocht; das indeß verdampfte Waſſer erſetzt, dann mit einem gleichen Maaße Weingeiſt (ſechs Quentchen nach dem Menſurglas) wohl gemiſcht, die Menge nach Tropfen gezählt, und ſo viel von einer Miſchung aus gleichen Theilen Waſſer und Weingeiſt (von etwa achtzig Graden) hinzugetröpfelt und untereinandergeſchüttelt, daß das Ganze die Menge von 1000 Tropfen ausmache.

So enthält dieſe Flüſſigkeit in jedem Tropfen ein $\frac{1}{1000}$ Gran Arſenik.

Zehen ſolche Tropfen in ein Glas getröpfelt, welches ſchon neunzig Tropfen Wein-

geist enthielt, bilden, nach gehörigem Umschütteln, eine Mischung, welche in jedem Tropfen $\frac{1}{10000}$ eines Granes Arsenik in sich enthält. Von hieraus verdünnt man auf die gewöhnliche Weise weiter, bis man zum dreißigsten Verdünnungsgrade gelangt. Die Dosis ist ein Streukügelchen mit der dreißigsten Verdünnung.

Gegen Steckflüsse, mancherlei Affectionen des Herzens, gegen hartnäckige Ausschläge u. s. w.

Symptome: Hahnemann, R. A. Zweiter Theil.

Asa.

Stinkasant, Asa foetida.

Ferula asa foetida.

(Ph. Univ. I. p. 296.)

Eine Drachme Asa foetida wird mit zwanzig Drachmen Weingeist binnen vier Tagen ausgezogen und bis zur dreißigsten Verdünnung gebracht, wobei man die erste aus 20 Tropfen der Tinctur und 80 Tropfen Weingeist bereitet. Dosis nach Verhältnissen verschieden.

Erweis't sich wirksam bei caries.

Symptome: Archiv. B. I Heft 3.

Asarum.

Haselwurz, Asarum Europaeum, L.

(Ph. U. I. p. 305.)

Der frische Saft des ganzen Krautes und der Wurzel wird mit gleichen Theilen Weingeist gemischt und, wie Aconitum, bis zur vier und zwanzigsten Verdünnung gebracht.

Dosis: die zwölfte bis vier und zwanzigste Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Aurum.

Gold.

(Ph. U. 1. p. 315.)

Behandlung und Dosis ganz die des Silbers. Wirksam gegen Melancholie mit Trieb zum Selbstmord, so wie gegen manche Formen der Mercurialkrankheit.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

B.

Baryta carbonica.

(Pharm. Univ. I. p. 333. ff.)

Krystallinische kochsalzsaure Schwererde, fein gepülvert, wird mit sechs Theilen Weingeist ein paar Minuten, um den salzsauren Strontian wegzunehmen, gekocht, das rückbleibende Pulver in sechs Theilen kochendem, destillirten Wasser aufgelöst, und mit mildem Ammonium niedergeschlagen. Die gefällte Schwererde wird ausgesüßt und getrocknet.

Verreibung u. s. w. wie bei Alumina. Ist ein antipsoricum.

Symptome: Hahnemann, Chronische Krankheit. Zweiter Th.

Belladonna.

Tollkraut, Atropa Belladonna, L.

(Ph. U. I. p. 312.)

Bereitung, Verdünnung und Dosis ganz wie bei Aconitum. Erweis't sich hülfreich bei Erisypelas, angina faucium und vorzüglich im ächten Scharlach. Als Schutzmittel dagegen giebt man alle sechs Tage einen kleinsten Theil der dreißigsten Verdünnung; ferner gegen Hundswuth (als Schutz- und Heilmittel); Gehirnentzündung und sonstige entzündliche Leiden der Kinder.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erster Theil.

Bismuthum.

Wismuth.

(Ph. U. I. p. 350.)

Wie Antimonium.

Symptome: Hahnemann, R. A. Sechster Theil.

Bovista.

Bovist, Lycoperdon Bovista, L.

(Ph. U. I. p. 353.)

Wie Agaricus muscarius behandelt.

Bryonia.

Zaunrebe, Bryonia alba, L.

(Ph. U. I. p. 356.)

Der aus der frischen Wurzel gepreßte und mit gleichen Theilen Weingeist gemischte Saft. Verdünnung bis zum 30sten Grade nach Art des aconitum.

Ist wichtig im Typhus; bei mancher Gicht und bei Lungen- und Leberentzündungen.

Symptome: Hahnemann's R. A. Zweiter Theil.

C.

Calcaria Carbonica.

(*acetica, chlorica.*)

Kohlensaure Kalkerde (essigsaure K. und Chlorkalk.)

(Ph. U. I. p. 373.)

Wie Alumina.

Erstere ist ein kräftiges antipsoricum. Specifisch gegen Epilepsie, chronische Augenleiden, chronische Diarrhöen, Gicht, vorzüglich die im Nervensystem vorkommende Form.

Dosis: der kleinste Theil der 30sten Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, chron. Kr. Zweiter Theil.

Camphora.

Kampher, von Laurus Camphora, L.
(Ph. Un. I. p. 393.)

℞. Camphorae . . . . . granum
solve in
Spiritus vini guttis centum.

Dosis: ein Tropfen einmal oder öfters wiederholt; erstere vorzüglich bei Rothlauf, letztere besonders gegen die zu starke Wirkung vieler Arzneimittel, und in der Influenza; vorzüglich im Anfang der Cholera.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

Cannabis.

Hanf, Cannabis sativa, L.
(Ph. Un. I. p. 422.)

Der frische Saft der Blätter, besonders der Krautspitzen der blühenden Pflanzen, mit gleichen Theilen Weingeist gemischt und sechsmal verdünnt.

Bei Lungenentzündungen mit vorherrschendem Druckschmerz; gegen catarrhalische Augenentzündung mit Aconitum abwechselnd; auch gegen frische gonorrhoea.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erster Theil.

Cantharides.

Spanische Fliegen, Cantharis vesicatoria, L.
(Ph. Un. I. p. 422.)

Verreibung und Verdünnung wie bei Anacardium. Dosis: gewöhnlich 30ste Verdünnung.

In manchen Krankheiten des systema uropoëticum.

Capsicum.

Spanischer Pfeffer, Capsicum annuum.
(Ph. Un. II. p 342.)

Aus einem Theil der gepulverten reifen Saamen wird mit 20 Theilen Weingeist die Tinctur ausgezogen, und, wie Anacardium, bis zur zwölften Verdünnung gebracht.

Symptome: Hahnemann, R. A. Sechster Theil.

Carbo.

Kohle.
(Ph. Un. I. p. 436.)

a) Carbo animalis, Thierkohle.

Ein Stück dickes Rindsleder wird zwischen glühende Kohlen gelegt, bis das letzte Flämmchen verschwunden ist, dann bringt man es schnell zwischen zwei Steinplatten, damit es nicht fortglimme.

b) Carbo vegetabilis, Holzkohle.

Wohl ausgeglühete Kohle von Buchenholz. Verreibung u. s. w. wie bei Alumina. Ist ein antisepticum und wirkt selbst in kleinster Dosis gegen 50 Tage fort.

Symptome: Hahnemann's chr. Krankheiten. Vierter Theil.

Cascarilla.

Cascarillrinde, Croton Cascarilla, L.
(Ph. Un. I. p. 451.)

Tincturbereitung und Verdünnung wie bei Angustura.

Castoreum.

Bibergeil.
(Pharm. Univ. I. pag. 457.)

Behandlung wie die der Ambra.
Dosis: 2te bis 12te Verdünnung.

Causticum.

Aetzstoff.

Um den Aetzstoff rein darzustellen, nimmt man ein Stück frischgebrannten Kalk von etwa zwei Pfunden, taucht dieses Stück in ein Gefäß voll destillirten Wassers, eine Minute lang, legt es dann in einen trocknen Napf, wo es bald, unter Entwickelung vieler Hitze und dem eigenen Geruch, Kalkdunst genannt, in Pulver zerfällt. Von diesem feinen Pulver nimmt man zwei Unzen, mischt damit in der (erwärmten) porcellänenen Reibeschaale eine Auflösung von zwei Unzen bis zum Glühen erhitztem und geschmolzenem, dann, wieder erkühlt, gepülvertem doppeltsaurem, schwefelsaurem Kali (Bisulphas kalicus) in zwei Unzen siedendheißem Wasser, trägt dieß dickliche Magma in einen kleinen gläsernen Kolben, klebt mit nasser Blase den Helm auf, und an die Röhre des letztern die halb in Wasser liegende Vorlage, und destillirt unter allmäliger Annäherung eines Kohlenfeuers von unten, das ist, bei gehörig starker Hitze, alle Flüssigkeit bis zur Trockenheit ab. Dieses etwas über anderthalb Unzen betragende Destillat, von Wasserhelle, enthält in conzentrirter Gestalt jene erwähnte Substanz, das Causticum, riecht wie Aetz-Kali-Lauge und schmeckt auf der Zunge schrumpfend und ungemein brennend im Halse, gefriert bei tiefern Kältegraden als Wasser, und befördert sehr die Fäulniß hineingelegter thierischer Substanzen: auf Zusatz von salzsaurem Baryt läßt es keine Spur Schwefelsäure, und auf Zusatz von Oxal-Ammonium, keine Spur von Kalkerde wahrnehmen.

Von diesem Destillate thut man einen Tropfen in ein mit hundert Tropfen bis

zu zwei Dritteln angefülltes Gläschen, potenzirt die Mischung durch zwei Schüttelschläge, und fährt auf diese Weise bis zur dreißigsten Verdünnung fort: von dieser bildet der kleinste Theil die Dosis auf 50 und mehr Tage Wirkung.

Ist ein kräftiges Antipsoricum.

Symptome: Hahnemann, Chr Krkh. Vierter Theil.

Chamomilla.

Gemeine Chamille, Matricaria chamomilla, L.

(Ph. Un. I. p. 484.)

Der frische Saft der ganzen Pflanze. Behandlung wie Asarum. Dosis, gewöhnlich die zwölfte Verdünnung.

Besonders wirksam gegen Polycholie, galliges Erbrechen, gallige Diarrhöen; Zahnreißen mit Erisypelas; übermäßige Gebärmutterblutungen; Ohrenzwang der Kinder ꝛc.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Chelidonium.

Schöllkraut. Chelidonium majus, L.

(Ph. Un. I. p. 494.)

Der frisch ausgepreßte Saft der ganzen Pflanze, wie bei Chamomilla. Dosis, dieselbe.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

China.

Chinarinde. Cinchona Condaminea, L. und lancifolia Mut.?

(Ph. Un. I. p. 500.)

Ein Theil des Pulvers der feinsten Königsrinde wird mit zwanzig Theilen Weingeist binnen sechs Tagen ohne Wärme ausgezogen und bis zur dreißigsten Verdünnung gebracht, oder ein Gran der Rinde mit hundert Gran Milchzucker nach Art der Erden, z. B., der Alumina, verrieben und verdünnt.

Dosis, die unverdünnte Tinctur bis zur dreißigsten Verdünnung. Besonders wirksam gegen die von Säfteverlust erzeugte reine Schwäche; gegen gewisse Wechselfieber; und gegen Keuchhusten.

Symptome: Hahnemann's R. A. Dritter Theil.

Cicuta.

Wütherich. Cicuta virosa, L.

(Ph. Un. I. p. 544.)

Der frische Saft des zu blühen anfangenden Krautes dreißigmal verdünnt, wie Aconitum.

Symptome: Hahnemann's R. A. Sechster Theil.

Cina.

Wurmsaamen. Artemisia judaica? L.

(Ph. Un. I. p. 551.)

Behandlung ganz wie die des Chinapulvers.

Wirksam gegen sogenannte Wurmfieber und flüchtige Wurmzufälle (Erbrechen); fast specifisch bei einer leichtern Form des Keuchhustens (nächtlich).

Symptome: Hahnemann's R. A. Erster Theil.

Clematis.

Waldrebe Clematis erecta, L.

(Ph. Un. I. pag. 576.)

Wie Aconitum

Bei Ausschlägen und psorischen Augenentzündungen.

Symptome: Archiv für die hom. Heilk. B. VII. Heft 1.

Coccinella.

Sonnenkäfer. Coccinella septempunctata und andere, L.

(Pharm. Un. I. pag. 578.)

Ein Theil der gepulverten Käfer mit zwanzig Theilen Weingeist extrahirt.

Gegen Zahnschmerz.

Cocculus.

Fischkörner. Menispermum Cocculus, L.

(Ph. Un. I. p. 578.)

Die gepulverten Saamen werden (ein Theil mit zwanzig Theilen) ausgezogen, und dann die Verdünnung fortgesetzt bis zum dreißigsten Grad. Heilsam bei schleichenden Nervenfiebern, manchen Unterleibskrämpfen und (schmerzhaften) unvollkommenen Lähmungen der Muskeln.

Kampher hebt die Wirkung auf.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erster Theil.

Coffea.

Kaffeebohnen.

(Ph. Univ. I. pag. 584.)

Eine Drachme der besten Levantischen ungebrannten Kaffeebohnen werden in einem eisernen, mäßig erwärmten Mörser zu feinem Pulver gestoßen, wobei die Masse öfters aufgekratzt wird. Das Pulver wird in einem Glase, mit zwölf Drachmen Alcohol übergossen, und damit einige Tage in Berührung gehalten, dann die Flüssigkeit vom Bodensatze abgegossen, und letzterer durch Ausdrückung von aller Feuchtigkeit befreit; das ausgedrückte Pulver wird nun mit vier Unzen destillirten Wassers in einem gläsernen Kolben bis auf eine Unze eingekocht; die Flüssigkeit colirt und mit der weingeistigen Tinctur vermischt, so daß das Verhältniß von 1 zu 20 beobachtet wird.

Einfacher und eben ſo wirkſam iſt die Verreibung eines Grans fein gefeilten Pulvers der friſchen Kaffeebohne mit hundert Gran Milchzucker, mit welcher man weiter verfährt, wie bei China.

Sehr wirkſam als Zwiſchenmittel in Fiebern und chroniſchen, beſonders Nervenkrankheiten, zur Beruhigung eines allzu beweglichen aufgeregten Nervenſyſtems, vorzüglich bei Mangel an Schlaf wegen lebhaften Ideenganges und Zudrang von Bildern.

Doſis, meiſt die vierte bis zwölfte Verdünnung

Symptome: Archiv f. d. hom. Heilk. B. II. Hft. 3.

Colchicum.

Zeitloſe. Colchicum autumnale.

(Ph. U. I. p. 585.)

Wie Aconitum

Bei der herbſtlichen Brechruhr wirkſam, auch gegen acute Rheumatismen anwendbar.

Symptome: Archiv. B. VI. Hft. 1.

Colocynthis.

Koloquinte. Cucumis Colocynthis.

(Ph. Un. I. p. 587.)

Die gepülverte trockene Frucht kann auf doppelte Weiſe behandelt werden, wie bei China. S. daſ.

Gegen Kopfgicht, Hüftweh und Algieen der benachbarten Theile, Proctalgie.

Doſis: 30ſte Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R.B. Sechster Theil.

Conium.

Gefleckter Schierling. Conium maculatum.

(Ph. Univ. I. p. 545.)

Wie Cicuta.

Antipsoricum. Beſonders dienlich in der Hypochondrie, und in Drüſenleiden.

Symptome: Hahnemann, Chr.Krankh. Vierter Theil.

Copaiva.

Von Copaifera officinalis.

(Ph. Un. I. p. 321.)

Ein Gran in hundert Tropfen Weingeiſt gelöſ't und bis zum zwölften Grade verdünnt.

Bei friſchen Gonorrhöen.

Coralliа rubra.

Rothe Korallen. Isis nobilis, L.

Ein Gran gepülverte rothe Koralle, wie Alumina behandelt.

Symptome: Archiv. B. XI. Hft. 3.

Crocus.

Safran. Crocus sativus, L.

(Ph. Un. I. p. 607.)

Wie China.

Doſis: 12te bis 30ſte Verdünnung.

Symptome: Archiv. B. I. Hft. 2.

Cuprum.

Kupfer.

(Ph. Univ. I. p. 617.)

Behandlung ganz wie die der übrigen Metalle.

Doſis, die dreißigſte Verdünnung. Heilſam in clonicſchen Krämpfen; hat gute Dienſte geleiſtet in der orientaliſchen Cholera.

Symptome: Archiv. B. III. Hft. 1.

Cyclamen.

(Pharm. Univ. I. pag. 633)

Wie Aconitum.

Symptome: Hahnemann, R.A. Fünfter Theil

D.

Digitalis.

Fingerhut. Digitalis purpurea, L.

(Pharm. Univ. I. pag. 646)

Der friſche Saft der ganzen Pflanze mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht und bis zur 30ſten Verdünnung gebracht.

Hülfreich in manchen Herzkrankheiten und Gelbſuchten (beſ. mit Diarrhöe).

Symptome: Hahnemann, R.A. Vierter Theil.

Drosera.

Sonnenthau. Drosera rotundifolia, L.

(Ph. Un. I. p. 653.)

Der friſche Saft des Krautes mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht und 30 Mal verdünnt.

Iſt ſpecifiſch im Keuchhuſten, doch nur in kleinſter Doſis, und erſt nach mehrtägiger Wirkung.

Symptome: Hahnemann, R.A. Sechster Theil.

Dulcamara.

Bitterſüß. Solanum Dulcamara, L.

(Ph. Univ. I. pag. 654.)

Der ausgepreßte Saft der jungen Stängel und Blätter mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht und 30 mal verdünnt.

Symptome: Hahnemann, R.A. Erſter Theil.

E.

Eugenia.

Eugenie. Eugenia Jambos.

Ein ſtrauchartiger Baum des ſüdlichen America, deſſen Früchte lieblich ſchmecken

und riechen. Die Kerne derselben, besonders ihr äußeres Häutchen, werden als giftig betrachtet.

Ein Theil frischer Kerne zu Brei gestampft, mit zehn Theilen Weingeist vermischt, werden eine Woche digerirt. Die davon abgegossene helle Tinctur ähnelt in Geruch und Wirkung der Opiumtinctur.

Die Symptome derselben s. Archiv f. d. hom. Heilk. B. XII. Hft. 1.

Euphorbium.

Der getrocknete Milchsaft der Euphorbia officinarum, L.
(Ph. U. I. p 663)

Ein Theil des officinellen Harzes wird mit 20 Theilen Weingeist 8 Tage digerirt; dann das Helle abgegossen, und bis zum 30sten Grade verdünnt.

Symptome: Archiv f. d. h. Heilk. B. VI. Hft. 3.

Euphrasia.

Augentrost. Euphrasia offficinalis, L.
(Ph. Un. I. p. 664.)

Der frische Saft der ganzen Pflanze, so wie aconitum behandelt.

Symptome: Hahnemann, R. A. Fünfter Theil.

F.

Ferrum.

Eisen.
(Ph. Univ. I. pag. 669.)

1) Ferrum regulinum

ganz feine Eisenfeile wird genau so behandelt wie Antimonium, und bis zur 30fachen Verdünnung getrieben. Die gewöhnliche Dosis in chronischen Krankheiten ist die dritte oder sechste Verdünnung, in acuten die dreißigste.

Bei Blutstürzen, besonders der Gebärmutter.

2) Ferrum aceticum,

oxydulirtes kohlensaures Eisen, wird in Essigsäure aufgelöst, diese verdampft, und der Rückstand gesammelt. Von diesem wird ein Gran in hundert Tropfen Weingeist aufgelöst und bis zur zwölften Verdünnung gebracht.

Symptome: Hahnemann, R.A. Zweiter Theil.

G.

Graphites.

Reißblei, eine Verbindung des Kohlenstoffes mit Eisen.
(Pharm. Univ. I. pag. 673.)

Man pülvert einen Gran des reinsten Reißbleies aus einem feinen Englischen Bleistifte und verfährt damit, wie bei'm metallischen Eisen gelehrt wurde. Dosis, auf 30 und mehr Tage Wirkung, der kleinste Theil der 30sten Verdünnung.

Ist fast specifisch in den meisten Verhaltungen der Menstruation; auch in vielen Bandwurmbeschwerden und asthmatischen Zuständen (Brustwassersucht.)

Symptome: Hahnemann chronische Krankh. Zweiter Theil.

Gratiola.

Gnadenkraut. Gratiola officinalis, L.
(Ph. Univ. I. p. 746.)

Der frische Saft der ganzen Pflanze wie Aconitum behandelt und 30 mal verdünnt.

Guajacum.

Pockenholz. Guajacum officinale, L.
(Ph. Univ. I. pag. 747.)

Fünf Gran Resina Guajaci werden in 100 Tropfen Weingeist aufgelöst und 30 mal verdünnt.

Symptome: Hahnemann, R A. Vierter Theil.

H.

Helleborus niger.

Schwarznieswurz. Helleborus niger, L.
(Pharm. Univ. I. pag. 776.)

Die Wurzel wird behandelt wie Radix Angelicae und 30 mal verdünnt.

In manchen Geisteskrankheiten.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Hyoscyamus.

Bilsenkraut. Hyoscyamus niger, L.
(Ph. Un. I. p. 789.)

Behandlung genau wie die der Digitalis.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

I.

Ignatia.

Ignazbohne. Ignatia amara.
(Ph. Un. I. p. 665.)

Der in mäßig warmem Mörser gepülverte Saame unterliegt derselben Behandlung wie Anacardium und wird bis zur 30sten Verdünnung gebracht.

Dosis, gewöhnlich die zwölfte Verdünnung.

Eignet sich für viele acute Zustände, besonders catarrhalische und gastrisch-nervöse

bei vorherrschend sanftem Gemüth und weinerlicher Stimmung.

Symptome: Hahnemann, R.A. Zweiter Theil.

Iodium.

Jodine.

(Pharm. Un. II. p. 7)

Ein Gran Jodine wird genau so behandelt, wie bei Ammonium gelehrt wurde. Auch wird hier derselbe Verdünnungsgrad nothwendig.

Gilt als antipsoricum.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krankheiten. Zweiter Theil.

Ipecacuanha.

Brechwurzel. Cephaëlis Ipecacuanha, Rich.

(Ph. Un. II. p. 12.)

Ein Theil der feingepülverten Wurzel wird mit 20 Theilen Weingeist extrahirt und dann zweimal auf die bekannte Weise verdünnt; oder ein Gran derselben mit 100 Gran Milchzucker verrieben und ebenfalls diese Operation mit neuem Milchzukker noch zweimal wiederholt. Sie wirkt nur flüchtig und kann nach mehreren Stunden wiederholt werden.

Anwendung bei unablässigem leerem Brechreiz; besonders aber in wiederholten Dosen bei intermittirenden Fiebern in der Apyrexie.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

K.

Kali carbonicum.

Kohlensaures Kali.

(Pharm. Univ. II. pag. 390.)

Ein Gran ganz chemisch reines kohlensaures Kali wird wie Ammonium carbonicum behandelt.

Antipsoricum: besonders in Lungenschwindsucht und Herzleiden; auch ungemein hülfreich in acuten Lungenentzündungen nach vorausgeschicktem Aconitum.

Symptome: Hahnemann, Chr. Kr. Vierter Theil.

Kali nitricum.

Salpeter.

(Ph. Un. II. p. 390. ff.)

Ein Gran chemisch reiner Salpeter wie das vorige behandelt.

Hülfreich in sthenisch-entzündlichen Zuständen.

Dosis: 24ste bis 30ste Verdünnung.

Symptome: Archiv. B. XI Hft. 2.

L.

Lamium.

Weißer Bienensaug. Lamium album, L.

(Pharm. Un. II. pag. 54.)

Der frisch ausgepreßte Saft der ganzen Pflanze, wie Asarum behandelt.

Symptome: Archiv. B. XI. Drittes Heft.

Lauro-Cerasus.

Kirschlorbeer. PrunusLauro-Cerasus.

Der Saft der frischen Blätter mit gleichen Theilen Weingeist gemischt und dreimal verdünnt.

Ledum.

Porsch. Ledum palustre, L.

(Ph. Un. II. p. 65.)

Behandlung wie Angelica.

Man benutzt die ganze Pflanze zur Bereitung der concentrirten Tinctur:

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

Lolium temulentum.

Taumellolch. Lolium temulentum, L.

Der frische Saft des ganzen Gewächses wie der des Aconitum behandelt.

Lycopodium.

Bärlappmoos. Lycopodium clavatum, L.

(Ph. Un. II. pag. 89.)

Ein Gran des reinen Blüthenstaubes des Lycopodium clavatum wird mit 100 Gran Milchzucker nach Art der Alumina verrieben und dann bis zum 30sten Grade verdünnt. Dosis: gewöhnlich der kleinste Theil des letztern.

Antipsoricum. Wirksam in zahlreichen Unterleibs-, besonders Blähungsbeschwerden; vielen Formen der Gicht (Ischias); chronischen Eitercatarrhen; Wundseyn der Kinder; krankhafter Geistes-, vorzüglich Gedächtnißschwäche.

Symptome: Hahnemann, Chron. Kr. Zweiter Theil.

M.

Manganum.

Braunstein.

(Pharm. Univ. II. pag. 101.)

Ein Gran schwarzes Manganoxyd wird wie Antimonium verrieben uno verdünnt.

Symptome: Hahnemann, R.A. Sechster Theil.

Magnesia.

1) Carbonica, kohlensaure Magnesie.
2) Muriatica, salzsaure Magnesie.

(Ph. Un. II. p. 90)

Wie Ammonium carbonicum.

Antipsoricum. Dosis: 30. Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krankheiten. Zweiter Theil.

Marum verum.

Katzenkraut.

Der frischausgepreßte Saft mit gleichen Theilen Weingeist vermischt.

Symptome: Archiv. B. V. Heft 2.

Menyanthes.

Fieberklee. Menyanthes trifoliata, L.

(Ph. Un. I. p. 692.)

Wie Aconitum.

Dosis: zwölfte Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Fünfter Theil.

Mercurius.

Queckſilber.

(Pharm. Univ. II. pag. 125ff.)

1) Mercurius vivus.
2) Mercurius solubilis Hahnemanni.
3) Mercurius dulcis.
4) Mercurius praecipitatus ruber,
5) Mercurius sublimatus corrosivus.
6) Cinnabaris.

Das reine Queckſilber und deſſen genannte Präparate werden wie Antimonium verrieben und weiter behandelt.

Gegen reine Syphilis werden in der Regel nur die zwei erſten angewendet zur dritten bis dreißigſten Verdünnung. Gegen die Herbſtruhr der mercurius sublimatus corrosivus zur 18ten bis 30ſten Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erſter Theil.

Mezereum.

Seidelbaſt. Daphne Mezereum, L.

(Pharm. Univ. I. p. 633.)

Der aus der friſchen während des Aufblühens geſammelten Rinde gepreßte Saft wird wie Aconitum behandelt.

Dosis: 30ſte Verdünnung.

Symptome: Archiv f. d. hom. Heilk. Bd. IV. Hft. 2.

Millefolium.

Schafgarbe. Achillea Millefolium, L.

(Ph. Un. II. p. 215.)

Der friſche Saft des jungen Krautes mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht und bis zur zwölften Verdünnung gebracht.

In manchen Hämorrhoidalbeſchwerden.

Moschus orientalis.

Moſchus.

(Ph. Un. II. p. 225.)

Verreibung mit Milchzucker und Weiterverdünnung wie bei Ambra.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erſter Theil.

N.

Natrum carbonicum.

Kohlenſaures Natrum.

Natrum muriaticum,

Salzſaures Natrum.

(Pharm. Univ. II. pag. 605.)

Wie Ammonium carbonicum.

Beides antipsorica. Dosis: 30ſte Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, Chroniſche Krankh. Zweiter und vierter Theil.

Nerium.

Roſenlorbeer. Nerium Oleander, L.

(Ph. Un. II. p. 245.)

Eine Unze der friſchen grünen Blätter zur anfangenden Blüthenzeit gepflückt, werden klein geſchnitten, erſt mit ſo viel Weingeiſt im Mörſer befeuchtet, als zur Erlangung eines dicken, fein geſtampften Breies hinreicht, dann aber der übrige Weingeiſt, zuſammen eine Unze, zur Verdünnung der Maſſe angewandt; der Saft aber durch ein feines Tuch gepreßt und einige Tage zur Abſetzung ſeines Faſer- und Eiweißſtoffes hingeſtellt, dann colirt und aufbewahrt. Die Verdünnung geht bis zum zwölften Grade.

Gegen Stumpfſinn und Gedächtnißſchwäche; doch nur als flüchtiges Mittel.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erſter Theil.

Nicotiana.

Tabak. Nicotiana Tabacum, L.

(Pharm Un. II. p. 245)

Der friſch ausgepreßte Saft des friſchen Krautes, zur Zeit der Blüthe, wird weiter behandelt wie Aconitum.

Wirkt nur flüchtig: gegen Schwindel, Erbrechen und Diarrhöe (Brechruhr).

Nux vomica.

Krähenaugen. Strychnos nux vomica, L.

(Pharm. Un. II. pag. 250.)

Der im warmen Mörſer fein gepülverte Saamen wird auf zweifache Weiſe behandelt, wie bei China gelehrt wurde. Gewöhnliche Gabe iſt ein kleinſter Theil der 30ſten Verdünnung. Das ſicherſte Gegenmittel ihrer zu ſtarken Wirkung iſt der Kampher. Auch heben Wein und Kaffee großentheils ihre Wirkungen auf. Höchſt wirkſam, bei gaſtriſchen, beſonders galligen Fiebern und Zuſtänden, bei Gaſtralgie, bei Koliken mit hartnäckiger Stuhlverhal-

tung; Gicht und Rheumatismen, besonders fieberhaften; bei Catarrhalfiebern (Influenza). Vorzüglich eignet sie sich für lebhafte, zu Zorn geneigte, Individuen Specifisch gegen Seekrankheit, jeden Morgen genommen.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erster Theil.

O.

Oleum animale aethereum.

Thierisch-ätherisches Oel.

(Pharmac. Universalis I. pag. 730.)

Ein Tropfen mit 100 Gran Milchzucker verrieben und bis zur 12ten Verdünnung gebracht.

Oleum Crotonis.

Crotonöl.

(Pharm. Un. I. pag. 612.)

Wie oleum animale

Dreißigste Verdünnung.

Opium.

Mohnsaft, Papaver somniferum, L.

(Pharm. Un. I. p. 257.)

Verreibung und Verdünnung wie Agaricus muscarius.

Symptome: Hahnemann, R. A. Erster Theil.

Oreoselinum.

Bergsilie. Athamanta Oreoselinum, L.

(Ph. Un. II. p. 576.)

Der frische Saft mit gleichen Theilen Weingeist gemischt; das Helle nach 8 Tagen abgegossen. Wird unverdünnt gegeben.

P.

Paris.

Einbeer. Paris quadrifolia, L.

(Ph. Un. II. p. 329.)

Der aus der ganzen Pflanze zu Anfang der Blüthe ausgepreßte Saft bis zur zwölften Verdünnung gebracht, wie Aconitum.

In entzündlich-catarrhalischen Leiden der Luftröhre; als Zwischenmittel in der Luftröhrenschwindsucht.

Symptome: Archiv. B. VIII. Hft. 1.

Petroleum.

Bergöl.

(Pharm. Un. II. p. 332.)

Es muß zum Arzneigebrauch dünnflüssig und hellgelb von Farbe seyn. Bei dieser Dünnflüssigkeit ist es nicht wohl möglich, daß es mit fetten Gewächsölen verfälscht seyn könnte. Um sich aber dennoch hiervon zu überzeugen, prüft man es durch zugemischte starke Schwefelsäure, welche das Bergöl unberührt läßt und bloß die etwa beigemischten fremden Oele in eine Art Schwefel umwandelt; auf eine einfachere Weise aber, indem man auf ein Stück weißes Schreibpapier einen Tropfen Bergöl tröpfelt, welches an der freien Luft oder an einer warmen Stelle bald verfliegt, ohne einen durchscheinenden Fleck zurückzulassen, wenn kein fettes Oel beigemischt war. Oefterer mag ein Zusatz eines flüchtigen, vegetabilischen, z. B., Terpentinöls, stattgefunden haben. Um hiervor sicher zu seyn, mischt man das Bergöl mit doppelt so viel Weingeist, schüttelt es einigemal um und scheidet es durch vorher mit Weingeist befeuchtetes Fließpapier wo das reine Bergöl im Filtrum zurückbleibt, was man darauf in versiegelten Fläschchen aufbewahrt

Ein Tropfen des Bergöls wird mit 100 Gran Milchzucker auf dieselbe Weise verrieben, wie das Oleum Crotonis, und bis zum 30sten Grade potenzirt und verdünnt.

Antipsoricum, Gabe: 30ste Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krankh. Dritter Theil.

Petroselinum.

Petersilie. Apium Petroselinum, L.

Der frische Saft des Krautes mit gleichen Theilen Weingeist vermischt. Dosis: ein unverdünnter Tropfen. Bei frischer Gonorrhöe mit stetem lästigen Drang zum Urinlassen.

Phellandrium.

Wasserfenchel. Phellandrium aquaticum, L.

(Ph. Un. II. p. 334.)

Der Saame wird so behandelt wie Semen Anisi.

Dosis: die neunte bis zwölfte Verdünnung.

Phosphorus.

Phosphor.

(Pharm. Univ. II. p. 335.)

Zu hundert Gran Milchzucker, welche man auf einmal in die Reibschaale thut, und mit etwa 15 Tropfen Wasser mittelst der Reibkeule zum dicklichen Brei macht, setzt man einen Gran Phosphor, in viele Stückchen geschnitten, knetet ihn, mit der feuchten Keule kräftig stampfend, darunter und streicht öfters die an der Keule hängenbleibende Masse herunter. So zerreiben sich die kleinen Phosphor-Krümchen in dem dicklichen Brei binnen den ersten zwölf Minuten, ohne daß ein Fünkchen zu sehen ist; nun kann das Stampfen in Reiben übergehen. Erst gegen das

Ende der Verreibung fängt das Pulver an, ſanft zu leuchten und riecht ſehr ſchwach. Die ferneren Verreibungen und Verdünnungen bis zum 30ſten Grade geſchehen, wie bei Agaricus muscarius vorgeſchrieben iſt.

Antipsoricum. Sehr wirkſam bei chroniſchen Lungen- und Magenkrankheiten, bei Exulcerationen der Schleimhaut des Darmcanals und der darauf gegründeten Diarrhöe, bei der neuerlichſt bekannter gewordenen Dothinenteritis.

Symptome: Hahnemann, Chroniſche Krankh Dritter Theil.

Platinum.

Platina.

(Pharm. Univ. II. p. 350.)

Ein Gran chemiſch reine metalliſche Platina in feinſtes Pulver gebracht, wird wie die übrigen Metalle, z. B., Antimonium, behandelt. Leiſtet viel in activen Metrorhagien, und bei Nymphomanie.

Doſis: dreißigſte Verdünnung.

Symptome: Archiv. Bd. I. Heft 1.

Plumbum.

Blei.

(Pharm. Univ. II. p. 351.)

Wie Antimonium.

Hülfreich bei den hartnäckigſten Arten der Verſtopfung mit Colik.

Doſis: dreißigſte Verdünnung.

Pulsatilla.

Küchenſchelle. Anemone Pulsatilla, L.

(Ph. Un. I. p. 206.)

Wie Aconitum.

Eignet ſich beſonders bei ſanfter weinerlicher Stimmung, Neigung zu Froſt, bei vorherrſchender Venoſität: in vielfachen acuten Krankheiten, namentlich im zweiten Stadium der catarrhaliſchen Entzündungen, bei Diarrhöen mit vielem tenesmus; bei krampfhaft unterdrückter Menſtruation. Specifiſch wirkt es gegen alle Saburralzuſtände, wo es oft ſogar Brechen erregt, dann aber ſchnell die Geneſung herbeiführt.

Doſis: die zwölfte bis dreißigſte Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Zweiter Theil.

R.

Ranunculus.

Hahnenfuß. Ranunculus bulbosus, L.

(Pharm. Univ. II. p. 462.)

Wie Aconitum.

Symptome: Archiv. Bd. VII. Heft 3.

Rheum.

Rhabarber. Rheum palmatum, L.

Wie China.

Symptome: Hahnemann, R. A. Zweiter Theil.

Rhododendron.

Schneeroſe. Rhododendron chrysanthum, L.

(Pharm. Univ. II. p. 486.)

Die Blätter werden ſo behandelt, wie bei China gelehrt wurde; kann man ſie friſch bekommen, wie Nerium.

Bei einigen Formen der Gicht wirkſam.

Doſis: dreißigſte Verdünnung.

Symptome: Archiv. Bd X. Heft 3.

Rhus.

Giftſumach. Rhus radicans und toxicodendron.

(Pharm. Univ. II. p. 487.)

Wie Aconitum.

Gebräuchlich bei Blatterroſe und ähnlichen Ausſchlägen, z. B., Pemphigus und Zona, vorzüglich aber abwechſelnd mit Bryonia im typhus

Doſis: die dreißigſte Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Zweiter Theil.

Ruta.

Raute. Ruta graveolens, L.

(Ph. Un. II. p. 518.)

Wie Paris.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

S.

Sabadilla.

Läuſeſaamen. Veratrum Sabadilla, Re

(Ph. Un. II. p. 521.)

Ein Theil der fein gepülverten Saamen mit zwanzig Theilen Weingeiſt ausgezogen und dreißigmal verdünnt, wie Anacardium.

Symptome: Archiv Bd. IV. Heft 3.

Sabina.

Sadebaum. Juniperus Sabinae, L.

(Ph. Un. II. p. 38.)

Der friſche Saft der Blätter mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht und bis zur vierundzwanzigſten Verdünnung gebracht.

Symptome: Archiv. Bd. V. Heft 1.

Sambucus.

Hollunder. Sambucus nigra, L.

(Ph. Un. II. p. 585.)

Der friſche Saft aus Blättern und Blumen wird mit gleichen Theilen Weingeiſt

gemiſcht. Doſis: ein unverdünnter Tropfen, oder die erſte Verdünnung.

Sarsaparilla.

Sarſaparille. Smilax Salsaparilla, L.

(Pharm. Univ. II. p. 544.)

Eben ſo wie Angelica.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

Sassafras.

Saſſafras. Laurus Sassafras, L.

(Pharm. Univ. II. p. 544)

Behandlung wie Radix Angelicae.

Secale cornutum.

Mutterkorn.

(Pharm. Univ. II. p. 574.)

Ein Gran des in feuchtwarmen Sommern geſammelten Mutterkorns, wird ganz ſo verrieben und bis zum dreißigſten Grade verdünnt, wie bei Agaricus muscarius vorgeſchrieben iſt.

Symptome: Annalen der homöop. Klin. v. Hartlaub und Trinks. Bd. III. Heft 2.

Sedum.

Mauerpfeffer. Sedum acre, L.

(Pharm. Univ. II. p. 575.)

Der friſche Saft mit gleichen Theilen Weingeiſt gemiſcht.

Senna.

Senna. Cassia Senna. L.

(Ph. Un. II. p. 577.)

Auf doppelte Weiſe wie China behandelt.

Sepia.

Sepiaſaft, Sepia octopoda. L.

Der braun-ſchwarze Saft (bisher zum Zeichnen gebräuchlich) iſt im Leibe des Dintenfiſches (Sepia octopus) in einer Blaſe befindlich, und wird von ihm zuweilen ausgeſpritzt, um das Waſſer um ſich her zu verdunkeln. Dieſe Saftblaſe wird zum Verkauf getrocknet. Die Verreibung und Verdünnung des trocknen Sepiaſaftes geſchieht wie bei Agaricus muscarius bis zum dreißigſten Grad.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krankh. Dritter Theil.

Senega.

Senega. Polygala Senega, L.

(Ph. Un. II. p. 385.)

Wie Radix Angelicae.

In einigen entzündlichen und congeſtiven Lungenleiden.

Serpentaria.

Serpentarie. Aristolochia Serpentaria, L.

(Pharm. Univ. II. p. 280.)

Wie Radix Angelicae.

Silicea.

Kieſelerde.

Ein Loth, durch mehrmaliges Glühen und Ablöſchen in kaltem Waſſer zerkleinter Bergcryſtall oder mit deſtillirtem Eſſig gewaſchener reiner weißer Sand wird mit vier Loth zerfallenem Natrum gemiſcht, im eiſernen Schmelztiegel geſchmolzen, bis alles Aufbrauſen vorüber iſt, und die Maſſe in klarem Fluſſe ſteht, wo man ſie dann auf eine Marmorplatte ausgießt. Das ſo entſtandene cryſtallhelle Glas wird in einem gläſernen Geſchirre mit einem vierfachen Gewicht deſtillirten Waſſers übergoſſen und mit Papier überdeckt. Während dieſer Auflöſung fällt die ſchneeweiße Kieſelerde von ſelbſt zu Boden, abgeſchieden vom Natrum, welches Kohlenſäure anzieht. Die hell abgegoſſene Flüſſigkeit iſt reines kohlenſaures Natrum in Waſſer aufgelöſ't. Zum Entlaugen der Kieſelerde muß das Waſſer mit etwas Weingeiſt vermiſcht werden, damit ſich die lockere Kieſelerde leichter zu Boden ſenke. Auf einem Löſchpapier-Filtrum wird ſie entwäſſert, welches man zuletzt zwiſchen mehrfach s trockenes Löſchpapier legt und mit einem ſtarken Gewichte beſchwert, um vollends alle Feuchtigkeit auszuziehen, worauf man ſie an der Luft oder einer warmen Stelle ganz trokken werden läßt.

Ein Gran wird ſo wie Alumina potenzirt und verdünnt.

Ein Antipsoricum, vorzüglich hülfreich in Lähmungen; bei epilepsia nocturna, bei Amenorrhöe, bei der tuberculöſen Schwindſucht, caries, rhachitis u. ſ w.

Symptome: Hahnemann, Chr. Krankh. Dritter Theil.

Spigelia.

Wurmkraut. Spigelia anthelmia, L.

(Ph. Un. II. p. 620.)

Wie China.

Doſis: gemeiniglich die dreißigſte Verdünnung. Hülfreich in dem ächten Fothergill'ſchen Geſichtsſchmerz und aneurysmatiſchem Herzklopfen.

Symptome: Hahnemann, R. A. Fünfter Theil.

Solanum.

Nachtſchatten. Solanum nigrum, L.

(Ph. Un. II. pag. 618.)

Wie Aconitum.

Hülfreich gegen die ächte Kriebelkrankheit.

Symptome: Archiv. B. I. Hft. 3. S. 86.

Spongia marina.

Badeschwamm.

(Ph. Un. II. p. 622.)

Der Badeschwamm wird in mäßige kleine Stücke geschnitten, in einer blechernen Kaffeetrommel unter Umdrehen über glühenden Kohlen so lange geröstet, bis er braun wird und sich ohne Mühe zu Pulver reiben läßt. Die Verreibung dieses Pulvers, so wie dessen weitere Verdünnung geschieht, wie bei Alumina gelehrt wurde.

Wirkt sehr specifisch bei häutiger Bräune nach Aconitum.

Dosis: die 12te bis 24ste Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Sechster Theil.

Squilla.

Meerzwiebel. Scilla maritima, L.

(Pharm. Un. II. p. 559.)

Das möglichst frische Pulver wird mit Milchzucker auf die bekannte Weise verrieben, und ein Gran der dritten Verreibung mit Weingeist bis zum 18ten Grade verdünnt. S. Agaricus.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Stannum.

Zinn.

(Pharm. Univ. II. pag. 622)

Wie Argentum.

Kömmt vorzüglich in Anwendung, gegen eine bestimmte Form der Lungensucht mit grünem Auswurf; es dient auch zur Beschwichtigung von Bandwurmzufällen.

Dosis: die zwölfte bis dreißigste Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Sechster Theil.

Staphysagria.

Stephanskörner. Delphinium Staphysagria, L.

(Ph. Un. I. pag. 643.)

Die Saamen wie Anacardium behandelt. Dosis: dreißigste Verdünnung.

Gegen Kopf- und andere Ausschläge.

Symptome: Hahnemann, R. Arzneikunde. Fünfter Theil.

Stramonium.

Stechapfel. Datura strammonium.

(Ph. Un. II. p. 640.)

Der frische, aus dem Kraut gepreßte Saft, mit Weingeist gemischt, und weiter behandelt, wie Aconitum.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Sulphur.

Schwefel.

(Pharm. Un. IIiv. pag. 633.)

1) Spiritus sulphuratus.

Fünf Gran gewaschener Schwefelblumen werden in ein Gläschen, was mit 100 Tropfen Weingeist bis auf ein Drittheil angefüllt ist, eingetragen; das Gläschen wird verstopft, mit einigen Armschlägen geschüttelt, und 24 Stunden zur Absetzung des Schwefelpulvers hingestellt; hierauf aber das Helle in ein reines Gläschen abgegossen, aus welchem man dann einen Tropfen mit abermals 100 Tropfen Weingeist zusammenschüttelt, und so bis zur 30sten Verdünnung fortfährt.

2) Ein Gran gewaschener Schwefelblumen werden mit 100 Gran Milchzucker verrieben und dann weiter behandelt wie Alumina.

Symptome: Hahnemann Chr. Krkh. Vierter Theil.

3) Hepar sulphuris calcareum, Schwefelleber.

(Ph. Univ. I. pag. 376.)

Verreibung und Verdünnung bis zum zwölften Grade wie Alumina.

Hülfreich gegen die übeln Folgen des Quecksilbermißbrauchs, gegen Gicht, Ausschläge, auch gegen die häutige Bräune.

Symptome: Hahnemann, R. A. Vierter Theil.

T.

Taraxacum.

Löwenzahn. Leontodon Taraxacum, L.

(Ph. Un. II. p. 649.)

Der frisch ausgepreßte Saft mit gleichen Theilen Weingeist gemischt, wird unverdünnt angewendet.

Symptome: Hahnemann, R. A. Fünfter Theil.

Thea.

Thee. Thea viridis, L.

(Ph. Un. II. p. 683.)

Eine Drachme fein gepülverten Kaiserthee wird mit 20 Drachmen Weingeist extrahirt.

Dosis, ein Tropfen.

Thuja.

Lebensbaum. Thuja occidentalis, L.

Wie Nerium. Dosis: der unverdünnte Saft bis zur dreißigsten Verdünnung. Sehr wirksam gegen Kondylome. Veraltete werden mit dem unverdünnten Saft täglich oder einen Tag um den andern betupft.

Symptome: Hahnemann, R A. Fünfter Theil.

Tiglium.

Purgirholzbaum. Croton Tiglium.
(Ph. Un. II. pag. 612.)

Die gepülverten Saamen werden wie die Saamen der Ignatia amara behandelt.

V.

Valeriana.

Baldrian. Valeriana officinalis, L.
(Ph. Un. II. p. 699.)

Wie Radix Angelicae.
Symptome: Archiv. B. II. Hft. 2.

Veratrum.

Weißnieswurz. Veratrum album, L.
(Ph. Univ. I. p. 775.)

Wie Aconitum; oder wenn man das frische Kraut nicht haben könnte, wie Radix Angelicae.

Gegen Wechselfieber. Hat sich sehr wirksam in der orientalischen Cholera erwiesen.

Dosis: zwölfte bis dreißigste Verdünnung.

Symptome: Hahnemann, R. A. Dritter Theil.

Verbascum.

Königskerze. Verbascum Thapsus, L.
(Pharm. Un. II. p. 709.)

Wie Taraxacum.

Symptome: Hahnemann, R. A. Sechster Theil.

Viola odorata.

Veilchen. Viola odorata, L.
(Ph. Un. II. p. 714)

Der frische Saft der ganzen in Blüthe stehenden Pflanze wird mit gleichen Theilen Weingeist gemischt.

Symptome: Archiv. B. VIII. Heft 2.

Viola tricolor.

Freisamkraut. Viola tricolox, L

Der frische Saft des jungen Krautes mit gleichen Theilen Weingeist vermischt.

Symptome: Archiv. B. VII. Hft. 2.

Z.

Zincum.

Zink.
(Pharm. Un. II. p. 721.)

Wie Antimonium.

Antipsoricum, Dosis: dreißigste bis vierzigste Verdünnung.

Symptome: Archiv. B. VII. Hft. 2.

Zingiber.

Ingwer. Amomum Zingiber.
(Pharm. Un. II. pag. 734.)

Wie Radix Angelicae.

BIBLIOTHECA
MEDICA
VINDOBONENSIS.

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google